

[Інформаційна сторінка](#) / Мої курси / [KROK / KROK](#) / [Крок 3 / Krak 3](#) / [Крок 3 Загальна лікарська підготовка 2022](#)

Розпочато вівторок 1 листопад 2022 7:14

Стан Завершено

Завершено вівторок 1 листопад 2022 7:17

Витрачено часу 2 хв 39 сек

Балів 0/150

Оцінка 0 з можливих 10 (0%)

Питання 1

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 25-ти років захворіла гостро. Підвищилася температура тіла до 40оС, з'явилися різкий головний біль, багаторазове блювання. Об'єктивно: стан важкий, позитивні менінгеальні симптоми. Яке дослідження слід призначити у першу чергу?

- a. Енцефалографія
- b. Люмбальна пункция та дослідження ліквору
- c. Доплерографія судин головного мозку
- d. Комп'ютерна томографія головного мозку
- e. Загальне дослідження крові

Правильна відповідь: Люмбальна пункция та дослідження ліквору

Питання 2

Неправильно

Балів 0 з 1

До приймального відділення доставлено дитину віком 12 років зі скаргами на сухість у роті, світлобоязнь та порушення зору. Об'єктивно спостерігається: шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. Під час подальшого обстеження було встановлено діагноз: отруєння алкалоїдами беладонни. Який із лікарських засобів доцільно застосувати для надання допомоги дитині?

- a. Неостигмін
- b. Дипіроксим
- c. Армін
- d. Пілокарпін ✗
- e. Діазепам

Правильна відповідь: Неостигмін

Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 24 роки госпіталізована до лікарні. Скаржиться на біль унизу живота з іррадіацією в задній прохід, слабкість та запаморочення. Остання менструація була 2 місяці тому. Об'єктивно встановлено: шкіра бліда, АТ --- 60/40 мм рт. ст., пульс --- 110/хв., температура тіла --- 36,6 $^{\circ}$ C. Живіт напружений, різко болючий, більше з лівого боку, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Який попередній діагноз ?

- a. Апоплексія яєчника
- b. Позаматкова вагітність
- c. Гострий сальпінгофорит
- d. Гострий апендицит
- e. Кишкова непрохідність

Правильна відповідь: Позаматкова вагітність

Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час лекції один зі студентів став збудженим, кричав, що за ним стежать незнайомці, хочуть його убити, благав про допомогу. Викладач зі студентами намагалися його заспокоїти, але на їх слова він не реагував. До якого відділення треба госпіталізувати пацієнта?

- a. Психосоматичного відділення
- b. Психіатричного відділення
- c. Реанімаційного відділення
- d. Терапевтичного відділення
- e. Неврологічного відділення

Правильна відповідь: Психіатричного відділення

Питання 5

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час грози розряд блискавки влучив в дерево, під яким був пастух, 48-ми років. У нього мали місце збудження, дезорієнтація, періодичні судоми. Артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., пульс - 120/хв., дихання аритмічне. Які медикаменти необхідно призначити негайно?

- a. Адреналін
- b. Теофілін
- c. Серцеві глюкозиди
- d. Седативні
- e. Глюкокортикоїди

Правильна відповідь: Седативні

Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У доношеної дитини через 2 години від народження після годування розпочалась сильна блювота неперетравленим молоком з домішками жовчі. Відійшла меконіальна пробка, після чого випорожнень не спостерігалось. Живіт здутий у верхніх відділах і запалий у нижніх. На оглядовій рентгенограммі - два рівні рідини. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Пілоростеноз
- b. Висока кишкова непрохідність
- c. Кишкова інфекція
- d. Низька кишкова непрохідність
- e. Пілороспазм

Правильна відповідь: Висока кишкова непрохідність

Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 46 років скаржиться на загальну слабкість, нудоту, рідкі дьогтеподібні випорожнення. Під час обстеження встановлено: пацієнт у свідомості, шкіра бліда, ЧСС --- 100/хв., АТ --- 105/60 мм рт. ст., ЧД --- 16/хв, тремор пальців рук, асцит, розширення вен передньої черевної стінки, печінка щільна +8 см, селезінка збільшена. У результаті аналізу крові виявлено: Hb --- 90 г/л, КП --- 0,95, білірубін --- 156 мкмоль/л, протромбін --- 65%. Визначте ймовірний діагноз та ускладнення, що виникло у пацієнта.

- a. Хронічний гепатит, кровотеча з гемороїдальних вен
- b. Виразка шлунка, кровотеча
- c. Цироз печінки, шлункова кровотеча з варикозно-розширених вен
- d. Неспецифічний виразковий коліт, кишкова кровотеча
- e. Гепато-реальна недостатність, кишкова кровотеча

Правильна відповідь: Цироз печінки, шлункова кровотеча з варикозно-розширених вен

Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У роділлі 18-ти років з крупним плодом через 12 годин від початку полового діяльності виникли ознаки клінічно вузького тазу, у зв'язку з чим прийнято рішення про розрідження шляхом кесаревого розтину. При укладанні жінки на операційний стіл у положенні лежачі на спині раптово стан її погіршився: з'явилися скарги на задишку, нудоту, шкіра стала блідою з мармуровим малюнком. Артеріальний тиск - 70/50 мм рт.ст. При повертанні жінки на лівий бік стан її покращився. Ваш діагноз:

- a. Передчасне відшарування плаенти
- b. Розрив матки
- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Синдром нижньої порожнистої вени
- e. Емболія навколоплідними водами

Правильна відповідь: Синдром нижньої порожнистої вени

Питання 9

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини діагноз: гостра ниркова недостатність. Під час біохімічного моніторингу визначено: фібриноген --- 4,5 г/л, натрій плазми --- 145 мМ/л, креатинін плазми --- 380 мкмоль/л. За результатами лабораторного дослідження сечі виявлено: білок --- 0,67 г/л, лейкоцити --- 3--5 у полі зору мікроскопу, еритроцити --- 6--8 у полі зору мікроскопа. Який показник із наведених нижче є найінформативнішим для визначення ступеня гострого ураження нирок?

- a. Протеїнурія
- b. Формені елементи крові в осаді сечі
- c. Натрій плазми крові
- d. Креатинін плазми крові
- e. Фібриноген плазми крові

Правильна відповідь: Креатинін плазми крові

Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого з ГРВІ нарстають явища гострої дихальної недостатності, наявний біль в лівій половині грудної клітки, що посилюється на висоті вдоху. При аускультації виявлено ослаблення дихання ліворуч. Рентгенологічно: масивне затемнення аж до рівня III ребра, що було розцінено як ексудативний плеврит. З чого варто розпочати лікувальні заходи?

- a. Дренування лівої плевральної порожнини в V-VI міжребер'ї по середній паховій лінії
- b. Антибактеріальна + дегідратаційна терапія, за неефективності - пункция і дренування плевральної порожнини
- c. Пункция плевральної порожнини в II міжребер'ї по середньоключичної лінії
- d. Симптоматична + антибактеріальна терапія
- e. Пункция плевральної порожнини в VII-VIII міжребер'ї по задній аксилярній лінії

Правильна відповідь: Пункция плевральної порожнини в VII-VIII міжребер'ї по задній аксилярній лінії

Питання 11

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У палаті інтенсивної терапії перебуває новонароджена дитина з респіраторним дистрес-синдромом I типу, III ступеня та інtranatal'noю асфіксією важкого ступеня. Дитина народилася на 30 тижні вагітності. Вона отримує штучну вентиляцію легень у примусовому режимі. Об'єктивно виявляється: порушення гемодинаміки, середній артеріальний тиск --- 20 мм рт. ст. Який лікарський засіб треба насамперед увести дитині?

- a. 25\% - й розчин \$Mg SO_4\$, 1 мл/кг
- b. Допамін 10 мкг/кг/хв
- c. 10\% - й розчин глюкози 2 мл/кг
- d. Фенобарбітал 20 мг/кг
- e. 5\% - й розчин глюкози 4 мл/кг

Правильна відповідь: Допамін 10 мкг/кг/хв

Питання 12

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини з гострою нирковою недостатністю при біохімічному моніторингу визначено: фібриноген - 4,5 г/л, натрій плазми - 145 mM/л, креатинін плазми - 380 мкМ/л. В сечі: білок - 0,67 г/л, лейкоцити - 3-5 в п/з, еритроцити - 6-8 в п/з. Який показник з наведених є найбільш інформативним для визначення ступеня гострого ураження нирок?

- a. Креатинін плазми
- b. Протеїнурія
- c. Формені елементи крові в осаді сечі
- d. Натрій плазми крові
- e. Фібриноген плазми крові

Правильна відповідь: Креатинін плазми

Питання 13

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого на цукровий діабет розвинувся коматозний стан. При лабораторному обстеженні виявлено: глюкоза - 65 ммоль/л, pH крові - 7,35, осмолярність крові - 390 мосм/кг, K_+ - 2,2 ммоль/л, ацетон - 12 ммоль/л. Яке найбільш імовірне метаболічне порушення є причиною коми хворого:

- a. Гіперкаліємія
- b. Кетонемія
- c. Ацидоз
- d. Гіперосмолярність
- e. Гіпокаліємія

Правильна відповідь: Гіперосмолярність

Питання 14

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На полі бою знаходиться потерпілий з вогнепальним пораненням правого стегна, кінцівка в ділянці середньої третини деформована. З рані під коліном йде яскраво-червона кров. Ви діагностуєте вогнепальний перелом стегна з кровотечею зі стегнової артерії. Що слід першочергово здійснити на етапі домедичної допомоги потерпілому?

- a. Накласти джгут на кінцівку вище місця перелому
- b. Іммобілізувати кінцівку
- c. Накласти джгут на середню третину стегна
- d. Накласти джгут на верхню третину стегна
- e. Накласти давлячу асептичну пов'язку на рану

Правильна відповідь: Накласти джгут на кінцівку вище місця перелому

Питання 15

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 54 років під час вживання їжі раптово закашлявся. Об'єктивно спостерігається: психомоторне збудження, виражений ціаноз, набухання вен шиї, неефективність дихання. Які дії потрібно виконати насамперед для надання допомоги пацієнту?

- a. Звільнити ротову порожнину від їжі та слизу
- b. Виконати інтубацію трахеї
- c. Застосувати заспокійливі засоби
- d. Застосувати прийом Геймліха
- e. Виконати конікотомію

Правильна відповідь: Застосувати прийом Геймліха

Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої від III вагітності дитини група крові --- B(III) Rh(+), у матері дитини --- O(I) Rh(--). На другу добу життя дитина адінамічна, рефлекси пригнічені, шкіра і видимі слизові оболонки жовтого кольору. Лабораторно виявлено: загальний білірубін --- 450 мкмоль/л, прямий --- 10 мкмоль/л, темп зростання білірубіну --- 9 мкмоль/л/год. Який метод терапії найефективніший у цьому разі?

- a. Плазмаферез
- b. Інфузійна терапія
- c. Фототерапія
- d. Імунотерапія
- e. Замінне переливання крові

Правильна відповідь: Замінне переливання крові

Питання 17

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дівчину віком 25 років було згвалтовано два роки тому. Скаржиться на те, що <<картини згвалтування>> постійно переслідують її у нав'язливих ремінісценціях, яскравих сновидіннях страхітливого змісту. Помічає потяг до уникнення обставин, що асоціюються зі спогадами про сексуальне насилля. Яке порушення психічного стану у пацієнтки?

- a. Розлад адаптації
- b. Депресивний розлад
- c. Істеричний розлад особистості
- d. Шизофренія
- e. Посттравматичний стресовий розлад

Правильна відповідь: Посттравматичний стресовий розлад

Питання 18

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 22-х років через 30 хвилин після нанесення мазі на руку з'явилося шкірне свербіння, гіперемія, потім численні уртикарні висипи. Ваш діагноз:

- a. Токсикодермія
- b. Короста
- c. Нейродерміт
- d. Гостра крапивниця
- e. Атопічний дерматит

Правильна відповідь: Гостра крапивниця

Питання 19

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 10-ти років доставлена в лікарню в непритомному стані. Часте, поверхневе дихання. Виражена неврологічна симптоматика: гіпертонус м'язів, ністагм, позитивні менінгеальні ознаки. Шкірна складка розгладжується більше 2 секунд. Глюкоза крові - 45 ммоль/л, рівень кетонових тіл в крові в нормі; кетонурії немає; осмолярність крові - 390 мосм/л. Який найбільш імовірний стан?

- a. Гіперосмолярна кома
- b. Кетоацидотична кома
- c. Гіпоглікемічна кома
- d. Лактатацидотична кома
- e. Гіпотиреоїдна кома

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

Питання 20

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінку віком 40 років госпіталізовано до лікарні зі скаргами на виражену слабкість, нудоту, блювання та біль у животі. Під час опитування з'ясувалося, що за 2 години до появи симптомів працювала на полі, що напередодні було оброблено метилмеркаптофосом. Об'єктивно спостерігається: звуження зіниць, гіпергідроз шкіри, бронхорея, пульс --- 56/хв., ритмічний. Назвіть провідний синдром гострої інтоксикації фосфорорганічними сполуками.

- a. Астено-вегетативний синдром
- b. Диспептичний синдром
- c. Бронхообструктивний синдром
- d. Мускариноподібний синдром
- e. Нікотиноподібний синдром

Правильна відповідь: Мускариноподібний синдром

Питання 21

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 24-х років через 2 тижні після пологів з'явився біль у лівій нижній кінцівці. Ліве стегно і голівка різко збільшилися в об'ємі за рахунок набряку. Спостерігається синюшність шкірних покривів. Пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий артеріальний тромбоз
- b. Попереково-крижовий радикуліт
- c. Облітеруючий ендартеріїт
- d. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен
- e. Ілеофеморальний тромбоз

Правильна відповідь: Ілеофеморальний тромбоз

Питання 22

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При огляді роділлі встановлено: пологова діяльність активна, положення плода поперечне, перша позиція. При піхвовому обстеженні: відкриття шийки матки 8-9 см, випадіння ручки плода, плід у матці нерухомий. Серцебиття плода відсутнє. Який метод пологорозрішення?

- a. Вакуум-екстракція
- b. Накладання акушерських лещат
- c. Через природні пологові шляхи
- d. Плодоруйнівна операція
- e. Кесарів розтин

Правильна відповідь: Плодоруйнівна операція

Питання 23

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 63 роки звернувся до лікаря зі скаргами на біль унизу живота, загальну слабкість та неможливість сечовипускання. З анамнезу відомо, що утруднене сечовипускання пацієнт спостерігає близько 6 місяців, характерна ніктурія. Об'єктивно встановлено: стан задовільний, живіт під час пальпації напруженій та болючий внизу, над лобком пальпуються еластичне утворення 10x10 см. Симптоми подразнення очеревини --- негативні. Встановіть попередній діагноз.

- a. Гострий цистит
- b. Гостра затримка сечі
- c. Гострий простатит
- d. Правобічна ниркова коліка
- e. Анурія

Правильна відповідь: Гостра затримка сечі

Питання 24

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 55-ти років працювала на городі, коли раптом відчула різкий головний біль, нудоту, слабкість, а потім знепритомніла та впала. Під час огляду в стаціонарі: рівень свідомості - сопор, відзначається психомоторне збудження, артеріальний тиск - 200/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 92/хв. Спеціаліст якого профілю повинен оглянути хвору в першу чергу?

- a. Хірург
- b. Невропатолог
- c. Нейрохірург
- d. Інфекціоніст
- e. Реаніматолог

Правильна відповідь: Невропатолог

Питання 25

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 1,5 років із септичним шоком виникла кровотеча з місць ін'єкцій, по шлунковому зонду надходить "кавова гуща". При визначені показників гемостазу збільшено міжнародне нормалізаційне відношення, АЧТЧ, рівень D-димеру, знижений фібриноген, тромбоцити - 30 · 10⁹/л. Діагностовано ДВЗ-синдром. Що у першу чергу треба призначити пацієнту для корекції факторів гемостазу?

- a. Транексамову кислоту
- b. Тромбоцитарну масу
- c. Етамзилат
- d. Хлорид кальцію
- e. Вітамін K

Правильна відповідь: Тромбоцитарну масу

Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У роділлі віком 25 років другі термінові пологи. Перейми по 20--25 сек. за 5--6 хвилин. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малій таз, розкриття шийки матки 7--8 см. Який період пологів відбувається?

- a. Прелімінарний
- b. Післяродовий
- c. Перший
- d. Другий
- e. Третій

Правильна відповідь: Перший

Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Бригадою екстренної (швидкої) медичної допомоги до приймального відділення доставлено семирічну дитину без свідомості. З анамнезу відомо, що після перенесеного грипу спостерігалися спрага, підвищення апетиту, часте сечовипускання. Напередодні з'явилися блювання, запах ацетону з рота, біль у животі. Під час огляду зіниці звужені, слабка реакція їх на світло, шкірні покриви бліді, холодні на дотик, дихання шумне, тахікардія, тахіпноє. Яке дослідження треба провести насамперед для уточнення діагнозу?

- a. Глюкозуричний профіль
- b. Загальний аналіз сечі
- c. Визначення рівня глюкози і кетонових тіл у крові
- d. Спинномозкову пункцию
- e. УЗД ОЧП

Правильна відповідь: Визначення рівня глюкози і кетонових тіл у крові

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 32-х років після перебування у лісі та контакту з мурахами з'явилися набряк суглобів рук, блювання, біль у шлунку, остуда, утруднене дихання, загальна слабкість. При огляді хворого відзначено набряк обличчя, шкірні покриви гіперемовані. Над легенями вислуховуються жорстке дихання, сухі свистячі хрипи. Тахікардія. Артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Які заходи невідкладної допомоги необхідно провести хворому?

- a. Введення антигістамінних препаратів
- b. Введення серцевих глікозидів
- c. Введення кордіаміну
- d. Призначення сорбентів
- e. Введення адреналіну

Правильна відповідь: Введення адреналіну

Питання 29

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки 29-ти років вдома відбулися стрімкі II пологи у терміні 36 тижнів вагітності. Народився живий хлопчик масою 2300,0 г. Лікар швидкої допомоги, який був викликаний, при огляді породіллі зазначив, що послід не виділився (після народження дитини пройшло 40 хвилин). Ознак кровотечі немає. Яку допомогу повинен надати лікар швидкої допомоги?

- a. Негайно транспортувати жінку до полового відділення III рівня
- b. Негайно транспортувати жінку до полового відділення II рівня
- c. Ввести в/в 10 Од окситоцину і дочекатися виділення посліду
- d. Провести ручне віddілення посліду
- e. Негайно транспортувати жінку і дитину до найближчого полового відділення

Правильна відповідь: Негайно транспортувати жінку і дитину до найближчого полового відділення

Питання 30

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 32-х років страждає на виразкову хворобу дванадцятипалої кишki протягом 6-ти років. Годину назад після їжі з'явився раптово різкий біль в епігастральній області. Загальний стан важкий, стогне від болю в животі. Живіт різко напруженій, болісний у всіх відділах, черевна стінка відстає в акті дихання. При пальпації печінка на 1 см нижче реберної дуги. При перкусії визначається відсутність печінкової тупості. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гостра кишкова непрохідність
- b. Гострий холецистит
- c. Гострий панкреатит
- d. Перфоративна виразка
- e. Цироз печінки

Правильна відповідь: Перфоративна виразка

Питання 31

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 58-ми років раптово відчув задишку, різкий біль в грудній клітці, кровохаркання, запаморочення. В анамнезі тромбофлебіт. Об'єктивно: дифузний ціаноз, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., акцент II тону на легеневій артерії, сухі розсіяні хрипи в нижніх відділах легень. На ЕКГ: високий зубець Р у II та III, глибокий S в I, патологічний Q в III, негативний T в II та III. На Ro спостерігається клиновидне затемнення в середніх відділах справа. Ваш діагноз:

- a. Тромбоемболія легеневої артерії
- b. Інфаркт легені
- c. Спонтанний пневмоторакс
- d. Q-інфаркт міокарда по задній стінці лівого шлуночка
- e. Кардіогенний шок

Правильна відповідь: Тромбоемболія легеневої артерії

Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінці віком 22 роки для знеболення введено внутрішньом'язево 2 мл 50%-го розчину анальгіну (метамізолу). Після цього на лівій половині обличчя, навколо рота, на губах, слизовій оболонці ротової порожнини з'явився набряк (твердий, не утворює ямок під час натискування). Через декілька годин стан погіршився: з'явилася охриплість голосу та <<гавкаючий>> кашель. Об'єктивно встановлено: частота дихання --- 20/хв; частота серцевих скорочень --- 92/хв; AT --- 100/70 мм рт.ст; температура тіла --- 37.1^oC. Які з нижченаведених препаратів треба увести пацієнти?

- a. Кортикостероїди
- b. Свіжозаморожену плазму
- c. Норадреналін
- d. Нестероїдні протизапальні
- e. Серцеві глікозиди

Правильна відповідь: Кортикостероїди

Питання 33

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт 15-ти років доставлений зі скаргами на головний біль, запаморочення, блювання, а також появу множинних синців на шкірі, асиметрію очних щілин, згладженість лівої носової складки, девіацію язика вправо. Спостерігається позитивний симптом Керніга зліва. В аналізі крові на _cito_: тромбоцити - $55,5 \cdot 10^9/\text{л}$. Яке ускладнення тромбоцитопенічної пурпuri має місце?

- a. Геморагічний шок
- b. Мікроангіотромбоз
- c. Ішемічний інсульт
- d. Геморагічний інсульт
- e. Тромбоемболія

Правильна відповідь: Геморагічний інсульт

Питання 34

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 32-х років з'явилися загальна слабкість, пітливість, відчуття печіння та м'язові посмикування в правій стопі, яка була травмована за три дні до цього під час прогулянки в лісі. При надходженні до стаціонару температура тіла - $37,1^\circ\text{C}$, куточки рота відтягнуті догори, очні щілини звужені, дрібні зморшки в куточках очей та на лобі. Права стопа набрякла, гіперемована, на підошві колота рана. Тонус м'язів рук і ніг, за винятком кистей і стоп, тулуба значно підвищений. Під час огляду з'явилися генералізовані судоми. Яку невідкладну допомогу потрібно надати хворому?

- a. Введення пеніциліну
- b. Застосування міорелаксантів та переведення на штучну вентиляцію легень (ШВЛ)
- c. Введення лікувальної сироватки та первинна хірургічна обробка рани
- d. Первинна хірургічна обробка та введення спазмолітиків
- e. Застосування хлоралгідрату, нейролептаналгезія та введення лікувальної сироватки

Правильна відповідь: Застосування хлоралгідрату, нейролептаналгезія та введення лікувальної сироватки

Питання 35

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 35 років після апендектомії різко піднявся з ліжка після дового перебування у горизонтальному положенні, упав та знепритомнів. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, пульс частий, слабкого наповнення. Дихання поверхневе. АТ --- 80/40мм рт.ст. Яку допомогу треба надати пацієнту найперше?

- a. Призначити серцеві глікозиди
- b. Призначити кардіотоніки
- c. Надати положення за Тренделенбургом
- d. Призначити антиаритмічні препарати
- e. Призначити внутрішньовенно адреналін

Правильна відповідь: Надати положення за Тренделенбургом

Питання 36

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Солдат перебуває у військовому польовому пересувному госпіталі з кульовим пораненням середньої третини правого стегна. Стан важкий, шкіра бліда, температура тіла - 37,8°C, пульс - 106/хв., артеріальний тиск - 90/70 мм рт.ст. Останні 3 дні турбує кашель з харкотинням. При аускультації у нижній частці лівої легені вологі хрипи. З чим пов'язане погіршення стану?

- a. Плеврит
- b. Приєднання пневмонії
- c. Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ)
- d. Пневмоторакс
- e. Набряк легень

Правильна відповідь: Приєднання пневмонії

Питання 37

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 45-ти років страждає на хронічну надніркову недостатність внаслідок туберкульозу наднірників. Під час відпочинку після тривалого перебування на сонці у нього посилилася загальна слабкість, тахікардія досягла 150/хв., артеріальний тиск знизився до 70/20 мм рт.ст., з'явилися олігурія, адінамія, нудота, блювання, біль у животі, депресія. Який діагноз найбільш імовірний у даного хворого?

- a. Гостра серцева недостатність
- b. Гостра ниркова недостатність
- c. Гостра печінкова недостатність
- d. Гостра наднірникова недостатність
- e. Сонячний удар

Правильна відповідь: Гостра наднірникова недостатність

Питання 38

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час проведення реанімаційних заходів у пацієнта із раптовою зупинкою сея, який перебуває на стаціонарному лікуванні, протягом 5 хвилин спостерігається рефрактерна асистолія. Реаніматологу повідомили, що пацієнт перед зупинкою серця випадково отримав внутрішньовенну ін'екцію 50 мл 4%-го калію хлориду замість 0,9%-го хлориду натрію. Який препарат треба терміново додати до комплексу реанімаційних заходів?

- a. 1 мл 0,025%-го дигоксину внутрішньовенно
- b. 10 мл 10%-го кальцію хлориду внутрішньовенно
- c. 10 мл аспаркаму внутрішньовенно
- d. 5 мл 3%-го кордарону внутрішньовенно
- e. 40 мл 40%-ї глюкози внутрішньовенно

Правильна відповідь: 10 мл 10%-го кальцію хлориду внутрішньовенно

Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка на 41-му тижні вагітності готується до екстреного оперативного втручання під загальним знеболенням. Під час інтубації трахеї у неї виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів, але виник ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, з'явилися вологі хріпки. Яка причина такого стану у пацієнтки?

- a. Аспірація кислого шлункового вмісту
- b. Інфаркт міокарду
- c. Набряк легень
- d. Емболія навколоплідними водами
- e. Шок

Правильна відповідь: Аспірація кислого шлункового вмісту

Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 39-ти років скаржиться на раптову появу задишки, болю в грудній клітці, серцебиття після пробіжки в парку. В анамнезі: тривалий прийом оральних контрацептивів, паління. Об'єктивно: стан важкий, дифузний ціаноз. Частота дихання - 36/хв., пульс - 124/хв., малого наповнення, ритмічний. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. ЕКГ: блокада правої ніжки пучка Гіса, глибокий зубець QIII, глибокі зубці S I, aVL, високий загострений зубець RII. Визначте серологічний маркер даного невідкладного стану:

- a. Креатинфосфокіназа
- b. Аспартатамінотрансфераза
- c. Антинуклеарні антитіла
- d. Д-димер в крові
- e. Тропонін

Правильна відповідь: Д-димер в крові

Питання 41

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Після перенесеного бойового стресу у військовослужбовця спостерігаються страх, тривога, роздратованість, пригнічений настрій, відчуження, жахливі сновидіння про минулі події. Який попередній діагноз?

- a. Іпохондричний розлад
- b. Посттравматичний стресовий розлад
- c. Соматизований розлад
- d. Гостра реакція на стрес
- e. Депресивний розлад

Правильна відповідь: Посттравматичний стресовий розлад

Питання 42

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт віком 83 роки, який перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Зафіксовано клінічну смерть. Яка послідовність реанімаційних заходів?

- a. Послідовність C-A-B
- b. Послідовність A-B-C-D
- c. Послідовність B-A-C
- d. ---
- e. Послідовність A-B-C

Правильна відповідь: Послідовність C-A-B

Питання 43

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дівчина віком 25 років госпіталізована до інфекційного відділення у перший день захворювання в тяжкому стані з температурою $39,5^{\circ}\text{C}$, явищами катарального синдрому, висипом геморагічного характеру неправильної форми на шкірі тулуба і кінцівок, деякі елементи з некрозом у центрі. Який імовірний діагноз?

- a. Тромбоцитопенічна пурпурा (хвороба Верльгофа)
- b. Алергічна реакція
- c. Геморагічний васкуліт (хвороба Шенлейна-Геноха)
- d. Менінгококова інфекція, генералізована форма, менінгококцемія
- e. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом

Правильна відповідь: Менінгококова інфекція, генералізована форма, менінгококцемія

Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До приймальногоного відділення лікарні після ДТП госпіталізовано постраждалого віком 72 роки з тяжкою політравмою. Об'єктивно спостерігається: стан чоловіка вкрай тяжкий, спонтанне дихання агональне, гемодинаміка нестабільна. Під час перекладання постраждалого з нош виникла зупинка кровообігу. Реанімаційні заходи, які треба розпочати мають включати штучну вентиляцію легенів та непряму компресію міокарда у співвідношенні:

- a. 2:30
- b. 1:5
- c. 2:15
- d. 1:2
- e. 1:1

Правильна відповідь: 2:30

Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 30-ти років щорічно у весняний період відмічає появу нежитю, чхання, сльозотечі. Симптоми тривають близько місяця, пізніше зникають. Після проведення шкірно-алергологічних проб був поставлений діагноз: поліноз, алергія на амброзію. Хворій рекомендовано для досягнення максимального ефекту:

- a. Пролонговані ін'єкційні глюкокортикоїди в осінній період
- b. Таблетовані глюкокортикоїди коротким курсом
- c. Фітотерапію
- d. Специфічну імунотерапію
- e. Передsezонне призначення антигістамінних препаратів

Правильна відповідь: Специфічну імунотерапію

Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної в терміні 36 тижнів з'явилися скарги на локальний біль у матці, який надалі поширився на всю матку; спостерігаються кров'янисті виділення зі статевих шляхів. При пальпації матка напружена, асиметрична, не розслабляється. Дрібні частини плоду не визначаються. Серцебиття плоду не вислуховується. Яка найбільш імовірна причина загибелі плоду?

- a. Пізній гестоз
- b. Розрив матки
- c. Передлежання плаценти
- d. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- e. Загроза передчасних пологів

Правильна відповідь: Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

Питання 47

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної 29-ти років виникли скарги на головний біль, нудоту, блюмоту на висоті головного болю, мерехтіння "мушок" перед очима, озnob з тремором кінцівок, порушення зору. АТ-145/90 мм рт.ст., пульс - 86/хв. Периферичні набряки відсутні. Напередодні підйому АТ вагітна відзначала емоційну напругу. Після надання допомоги виділилася світла сеча, протеїнурія відсутня. Який попередній діагноз має бути встановлений?

- a. Прееклампсія середнього ступеня
- b. Прееклампсія легкого ступеня
- c. Гіпертонічний криз
- d. Прееклампсія тяжкого ступеня
- e. Еклампсія

Правильна відповідь: Гіпертонічний криз

Питання 48

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 39 років скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C , озноб, профузне потовиділення. Захворів 2 дні тому після переохолодження. Симптом Пастернацького різко позитивний з обох боків. Результати аналізу крові такі: лейкоцити --- $\$15\cdotp10^9/\text{l}$, ШОЕ --- 25 мм/год, еритроцити --- 2%, паличковядерні --- 15%, сегментоядерні --- 45%, лімфоцити --- 30%, моноцити --- 8%. Результати аналізу сечі: питома вага --- 1011, білок --- 0,135 г/л, лейкоцити --- вкривають усе поле зору мікроскопа, еритроцити --- 8--10 у полі зору мікроскопа, слиз +++, бактерії +++. Встановіть діагноз.

- a. Хронічний піелонефрит
- b. Амілодіз нирок
- c. Гострий двобічний піелонефрит
- d. Підгострий гломерулонефрит
- e. Гострий двобічний гломерулонефрит

Правильна відповідь: Гострий двобічний піелонефрит

Питання 49

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хлопець віком 16 років захворів раптово. Скаржиться на біль у животі, часті, мізерні, рідкі випорожнення з домішками слизу та прожилками крові, тенезми. Об'єктивно спостерігається: температура тіла --- 38°C , болюча та спазмована сигмовидна кишка. У копrogramі виявлено слиз, лейкоцити, еритроцити. Яке з наведених досліджень є найінформативнішим для встановлення діагнозу?

- a. Визначення гемоглобіну
- b. Бактеріологічне дослідження випорожнень
- c. Рентгеноскопія шлунку
- d. Ректороманоскопія
- e. Визначення гематокриту

Правильна відповідь: Бактеріологічне дослідження випорожнень

Питання 50

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 25-ти років п'ять днів тому перенесла аборт. В анамнезі - гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ). Об'єктивно: стан тяжкий, температура тіла - 37оС, млява, сонлива. Шкіра суха, сірого кольору. Дихання поверхневе, частота 30/хв. Тони серця глухі, ритм синусовий, частота серцевих скорочень 100/хв., артеріальний тиск - 90/70 мм рт.ст. Діурез за добу 120 мл. Яка у хворої стадія гострой ниркової недостатності?

- a. Олігоанурична
- b. Одужання
- c. Поліурії
- d. Латентна
- e. Початкова

Правильна відповідь: Олігоанурична

Питання 51

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Моряк прилетів з Гонконгу. 2 дні температура тіла - 39-41оС, озноб, пітливість, безсоння. Сьогодні порушилась свідомість. Об'єктивно: у сомнолентному стані з проявами психічного збудження і судом в кінцівках. Легка ригідність потиличних м'язів. Шкіра субіктерична, печінка +3 см. Вкажіть методи діагностики тропічної малярії:

- a. Алергологічні проби
- b. Мазок і товста крапля крові
- c. Вірусологічні методи
- d. Гемокультура
- e. Біологічний метод

Правильна відповідь: Мазок і товста крапля крові

Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 55 років спостерігалися порушення мови та оніміння правої руки, що тривали протягом години. Лікар діагностував гостре порушення мозкового кровообігу. Який критерій буде головним для диференційної діагностики транзиторного і органічного порушення мозкового кровообігу у пацієнта?

- a. Ступінь вираженості вогнищової симптоматики
- b. Наявність або відсутність крові у лікворі
- c. Тривалість вогнищової симптоматики не більше, ніж одну добу
- d. Ступінь вираженості загальномозкової симптоматики
- e. Наявність або відсутність <<світлого проміжку>>

Правильна відповідь: Тривалість вогнищової симптоматики не більше, ніж одну добу

Питання 53

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Яке трансфузійне середовище має оптимальний гемостатичний ефект у разі лікування гіпокоагуляційних кровотеч?

- a. Нативна плазма
- b. Кріопреципітат
- c. Еритроцитарна маса
- d. Фібриноген
- e. Свіжозаморожена плазма

Правильна відповідь: Свіжозаморожена плазма

Питання 54

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого з проникаючим пораненням грудної клітини крововтрата 40% ОЦК. В анамнезі численні гемотрансфузії, більшість з яких супроводжувалась гемотрансфузійними реакціями. Виберіть компонент крові для переливання:

- a. Свіжозаморожена плазма
- b. Відміті еритроцити
- c. Кріопреципітат
- d. Еритроцитарна суспензія
- e. Концентрат тромбоцитів

Правильна відповідь: Відміті еритроцити

Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 34 роки госпіталізований до стаціонару у тяжкому стані. У результаті клініко-лабораторних досліджень встановлено: фруктовий запах із рота, гіпотензія, дегідратація, електролітні порушення, гіперглікемія, кетонурія. Визначте ймовірний діагноз у пацієнта.

- a. Нецукровий діабет
- b. Синдром неадекватної секреції антidiуретичного гормону
- c. Гостра надниркова недостатність
- d. Діабетичний кетоацидоз
- e. Гіперосмолярний гіперглікемічний синдром

Правильна відповідь: Діабетичний кетоацидоз

Питання 56

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 32 роки без постійного місця проживання звернувся до лікаря на 5-й день хвороби. Скаржиться на гарячку, сильний головний біль, безсоння. Об'єктивно спостерігається: температура тіла --- 40\$^{\circ}\text{C}\$, пульс --- 110/хв. Пацієнт збуджений, говіркий. Обличчя гіперемоване, склерит. На тілі рясній рожево-розеольозно-петехіальний висип. Позитивний симптом Говорова-Годельє. Пальпуються збільшенні печінки та селезінка. Що в епіданамнезі буде вказувати на імовірну етіологію цього захворювання?

- a. Контакт із гризунами
- b. Укус собаки
- c. Наявність вошів
- d. Наявність парентеральних втручань
- e. Споживання недоброякісної їжі

Правильна відповідь: Наявність вошів

Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки, яка хворіє на дифузну форму токсичного зоба, після психоемоційного стресу погіршився стан. З'явилися скарги на сильний головний біль, серцебиття. Об'єктивно: психічне та моторне збудження, профузний піт, шкірні покриви гіперемовані, фебрильна температура, частота серцевих скорочень - 150/хв., артеріальний тиск - 150/50 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки?

- a. Мікседематозна кома
- b. Пароксим миготливої тахіаритмії
- c. Адреналовий криз
- d. Тиреотоксичний криз
- e. Гострий гіперпаратиреоз

Правильна відповідь: Тиреотоксичний криз

Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Новонароджена дівчинка масою 3500 г, довжиною 52 см від першої вагітності, що перебігала на тлі анемії ІІ ступеня важкості, народилася із серцебиттям 140/хв., закричала одразу, крик голосний, рефлекси живі, м'язовий тонус дещо знижений, є акроціаноз. Яка оцінка новонародженої за шкалою Апгар?

- a. 7-8 балів
- b. 5-6 балів
- c. 9-10 балів
- d. 1-2 балів
- e. 3-4 балів

Правильна відповідь: 7-8 балів

Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки 35-ти років через вживання забруднених харчових продуктів в організм потрапила значна кількість радіоактивного йоду-131. Які заходи необхідні в першу чергу?

- a. Провести антибіотикотерапію для профілактики вторинної інфекції на тлі пригнічення імунітету
- b. Негайно промити шлунок
- c. Негайно провести евакуацію жінки
- d. Ретельно зібрати харчові продукти в закриту тару для подальшого аналізу
- e. Якнайшвидше розпочати йодну профілактику

Правильна відповідь: Якнайшвидше розпочати йодну профілактику

Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У потерпілого під час медичного сортування встановлено частоту дихання - 6/хв., свідомість за шкалою ком Глазго - 8 балів, пульс на периферійних судинах не пальпується. До якої сортувальної групи належить потерпілий?

- a. "Червоної"
- b. "Чорної"
- c. "Жовтої"
- d. "Зеленої"
- e. "Фіолетової"

Правильна відповідь: "Червоної"

Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Водій віком 48 років скаржиться на біль за грудиною пекучого характеру та тривалістю понад 30 хвилин. Напади загрудинного болю під час фізичного навантаження виникали протягом кількох років, але завжди минали після приймання нітрогліцерину. Під час огляду встановлено: стан середньої тяжкості, тони серця приглушенні. Артеріальний тиск --- 120/70 мм рт. ст. Пульс --- 80/хв., ритмічний. Який із наведених лікарських засобів є стандартом для лікування на догоспітальному етапі надання медичної допомоги?

- a. Триметазидин
- b. Фуросемід
- c. Ніфедипін
- d. Ацетилсаліцилова кислота
- e. Дигоксин

Правильна відповідь: Ацетилсаліцилова кислота

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 76 років госпіталізована до лікарні. Скаржиться на сильні та різкі болі у черевній порожнині, що виникли раптово, здуття живота, затримку відходження газів і калу. З анамнезу відомо, що хворіє на миготливу аритмію. Об'єктивно спостерігається: живіт дещо здутий, м'який та різко болючий під час пальпації. Перистальтика відсутня. Перкуторно виявлено у всіх відділах тимпаніт. \emph{Per rectum} виявлено: ампула порожня, на рукавиці є залишки калу малинового кольору. За результатами аналізу крові виявлено лейкоцитоз --- \$28\cdot10^9\$/л. Який імовірний діагноз у пацієнтки?

- a. Обтураційна кишкова непрохідність
- b. Перфоративна виразка
- c. Гострий панкреатит
- d. Мезентеріальний тромбоз
- e. Інфаркт міокарда, абдомінальна форма

Правильна відповідь: Мезентеріальний тромбоз

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпіла 25-ти років доставлена в хірургічне відділення через 2 години після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з закритою травмою живота з ознаками внутрішньоочеревинної кровотечі. Доставлено в операційну. Під час ревізії в черевній порожнині знайдено до 1,5 л рідкої крові. Селезінка пошкоджена в декількох місцях. Інших пошкоджень не виявлено. Який вид трансфузії слід застосувати?

- a. Пряма гемотрансфузія
- b. Реінфузія крові
- c. Трансфузія замороженої плазми
- d. Замінне переливання
- e. Трансфузія еритроцитарної маси

Правильна відповідь: Реінфузія крові

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При наданні першої медичної допомоги хворому 20-ти років фельдшер виявив, що з глибини рані, нанесеної ножем, на лівому плечі виділяється кров пульсуючим струменем яскраво-червоного кольору. Яка це кровотеча та які методи її тимчасової зупинки повинен використати медпрацівник?

- a. Венозна кровотеча, накладання джгута проксимальніше рані
- b. Кровотеча венозна, стискаюча асептична пов'язка на рану з метою зупинки кровотечі
- c. Кровотеча артеріальна, стискаюча асептична пов'язка на рану
- d. Артеріальна кровотеча, пальцеве натискання плечової артерії проксимальніше рані
- e. Артеріальна кровотеча, накладання джгута проксимальніше рані

Правильна відповідь: Артеріальна кровотеча, накладання джгута проксимальніше рані

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 16-ти років звернулась до лікаря зі скаргами на інтенсивний головний біль, підвищена температура тіла, сонливість. На шиї слід від укусу кліща з зоною гіперемії. Запідозрений кліщовий енцефаліт. Якою має бути екстремна специфічна профілактика?

- a. Введення специфічного донорського імуноглобуліну
- b. Специфічна профілактика не проводиться
- c. Вакцинація
- d. Введення інтерферону
- e. Профілактичний прийом антибіотиків

Правильна відповідь: Введення специфічного донорського імуноглобуліну

Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого з ангіною раптово на різних ділянках шкіри з'явилися схильні до злиття пухирі. Їх поява супроводжувалася нестерпним свербінням, підвищеннем температури тіла до 37,2°C. У аналізі крові: еозінофілія. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Пухирчатка
- b. Синдром Лайелла
- c. Синдром Стівена-Джонса
- d. Крапивниця
- e. Вітряна віспа

Правильна відповідь: Крапивниця

Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 9-ти місяців з важкою формою дизентерії Флекслера на фоні гіпертермії та діареї з'явилися блювання та судоми. Чим викликано погіршення стану дитини?

- a. Токсикозом з ексикозом
- b. Приєданням менінгіту
- c. Пухлиною мозку
- d. Нейротоксикозом
- e. Травмою голови

Правильна відповідь: Нейротоксикозом

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Учасник ліквідації аварії на АЕС направлений у стаціонар з діагнозом "променева хвороба". Протягом 8 днів перебування в стаціонарі не знайдено ніяких суттєвих відхилень від норми. Чи можна очікувати прояви гострого радіаційного ураження у майбутньому?

- a. Так, протягом року
- b. Так, протягом першого місяця
- c. Так, протягом піврока
- d. Не очікується
- e. Так, протягом двох місяців

Правильна відповідь: Не очікується

Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 44-х років після вживання алкоголю з'явились нудота, багаторазове блювання, спочатку їжею, а потім згортками крові, слабкість. При огляді: шкіряні покриви та слизові оболонки бліді, пульс - 120/хв., при пальпації живіт м'який, безболісний у всіх відділах; в лівому підребер'ї визначається збільшена, тверда селезінка. У хворого підозрюється кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу. Яку тактику слід обрати?

- a. Ургентна лапаротомія, пластика стравоходу
- b. Спостереження в умовах хірургічного стаціонару
- c. Введення холодної амінокапронової кислоти через зонд
- d. Ендоскопічна зупинка кровотечі
- e. Застосування методики керованої гіпотензії

Правильна відповідь: Ендоскопічна зупинка кровотечі

Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 65-ти років після побутової травми скажиться на біль у кульшовому суглобі та неможливість рухів нижньої кінцівки. Об'єктивно: кінцівка вкорочена і ротована назовні, симптом "прилиплої п'яти". Виберіть оптимальний метод надання першої медичної допомоги:

- a. Транспортувати в лікарню на жорстких ношах
- b. Накласти шину Беллера
- c. Транспортна іммобілізація шиною Дітеріхса, знеболення анальгетиками
- d. Виконати репозицію відламків та транспортну іммобілізацію
- e. Знеболення місця перелому, іммобілізація шиною Крамера

Правильна відповідь: Транспортна іммобілізація шиною Дітеріхса, знеболення анальгетиками

Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час роботи в шахті чоловік 37-ми років пошкодив кабель високої напруги, та був уражений струмом. Об'єктивно: стан вкрай тяжкий, дихання - 9/хв., частота серцевих скорочень - 56/хв. Яких лікувальних заходів треба негайно вжити?

- a. Введення атропіну сульфату
- b. Штучна вентиляція легенів
- c. Введення дихальних аналептиків
- d. Електродефібриляція
- e. Введення адреналіну гідрохлориду

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легенів

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 10-місячної дитини внаслідок порушення правил вигодовування виникло багаторазове блювання, рідкі випорожнення 20 разів на добу. При огляді сімейним лікарем дитина різко загальмована, дихання стогнуче. Втрата маси тіла понад 10%. Велике тім'ячко та очні яблука запалі, слизові сухі. Тургор шкіри знижений, шкіра з мармуровим малюнком. Час заповнення капілярів становить 6 сек. ЧСС- 182/хв., АТ- 73/24 мм рт.ст., ЧДР- 66/хв. Останнє сечовипускання було 18 годин тому. Який імовірний діагноз?

- a. Помірне зневоднення
- b. Септичний шок
- c. Синдром Рея
- d. Кардіогенний шок
- e. Гіповолемічний шок

Правильна відповідь: Гіповолемічний шок

Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого з гострим інфарктом міокарда з'явилися скарги на серцебиття, лихоманку, загальну слабкість. Загальний стан важкий, артеріальний тиск - 85/50 мм рт.ст., пульс - 190/хв., аритмічний. Дихання везикулярне. Набряки відсутні. ЕКГ: миготлива аритмія, частота серцевих скорочень - 220/хв. З чого треба розпочати лікування?

- a. Введення строфантину в/в
- b. Електроімпульсна терапія
- c. Введення кордарону в/в
- d. Введення лідокаїну в/в
- e. Введення верапамілу в/в

Правильна відповідь: Електроімпульсна терапія

Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 64 роки, який хворіє на варикозне розширення вен нижніх кінцівок, виник біль у літкових м'язах, що посилюється у гомілковостопному суглобі під час рухів. Об'єктивно спостерігається: набряк та біль у м'язах гомілки під час пальпації, позитивні симптоми Хоманса та Мозеса. Який метод інструментальної діагностики треба застосувати для подальшого обстеження насамперед?

- a. Ультразвукове дослідження судин
- b. Сфігмографія
- c. Радіоізотопна флеображення
- d. Шкірна термометрія
- e. Капіляроскопія

Правильна відповідь: Ультразвукове дослідження судин

Питання 75

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Рядового віком 19 років, який отримав опіки тулуба і верхніх кінцівок під час вибуху ємності з пальним, направили до медичної роти бригади. Стан середньої тяжкості. Об'єктивно спостерігається: АТ --- 100/65 мм рт. ст., пульс --- 105/хв. На верхніх кінцівках і грудній клітці визначаються ділянки гіперемії та набряку міхурів, блідість шкіри з утратою бальової і тактильної чутливості. Яку допомогу треба надати на цьому етапі медичної евакуації?

- a. Накласти суху асептичну пов'язку
- b. Обробити рани масляним розчином
- c. Обробити рани дегазуючою рідиною
- d. Увести дексаметазон
- e. Увести допамін в/в крапельно

Правильна відповідь: Накласти суху асептичну пов'язку

Питання 76

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінку віком 28 років, у терміні вагітності 23---24 тижні, госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії пологового будинку. Пацієнта перебуває в стані геморагічного шоку через вагінальну кровотечу, зумовлену передчасним відшаруванням плаенти. Анамнез зібрати не вдається через тяжкий стан пацієнтки. Зі слів родичів, вагітність перша, протікала без особливостей. Однак вагітна хворіє на артеріальну гіпертензію II ст. Об'єктивно встановлено: свідомість відсутня, пульс ниткоподібний, артеріальний тиск виміряти не вдається. За 2 хвилини після приїзду до лікарні на кардіомоніторі зафіковано фібриляцію шлуночків. Негайно розпочато компресії грудної клітки. Які повинні бути найперші невідкладні дії лікаря?

- a. Уведення адреналіну, дефібриляція протипоказана
- b. Переливання резус-сумісної крові
- c. Проведення медикаментозної кардіоверсії
- d. Уведення окситоцину, електрична дефібриляція
- e. Проведення електричної дефібриляції

Правильна відповідь: Проведення електричної дефібриляції

Питання 77

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої дитини на 4-й день життя з'явилися кривава блювота до 3- 4 разів на день, випорожнення темнокоричневого кольору до 4-5 разів на добу, кровотеча з пупкової ранки, петехіально-плямистий висип на тулубі та кінцівках. Який діагноз найімовірніший?

- a. Гемолітична хвороба новонароджених
- b. Геморагічна хвороба новонароджених
- c. Вада розвитку шлунково-кишкового тракту
- d. Синдром проковтнутої материнської крові
- e. Пологова травма

Правильна відповідь: Геморагічна хвороба новонароджених

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хлопчика 11-ти років гостро з'явилися головний біль, втрата свідомості. При обстеженні: свідомість потьмарена, артеріальний тиск - 130/85 мм рт.ст., ригідність м'язів потилиці, температура - 38,2°C. Яке діагностичне дослідження необхідно провести дитині першочергово?

- a. Люмбальна пункция
- b. Рентгенографія черепа
- c. Електроенцефалографія
- d. Комп'ютерна томографія (КТ) головного мозку
- e. Визначення лейкоцитів та швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) у крові

Правильна відповідь: Люмбальна пункция

Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дворічного хлопчика, який хворіє на тетраду Фалло, раптово збільшилася інтенсивність ціанозу, з'явила задишка, він присів навпочіпки. Що з наведеного нижче має призначити лікар у цьому разі?

- a. Антибіотики
- b. Оксигенотерапію
- c. Серцеві глікозиди
- d. Бронхолітики
- e. Сечогінні

Правильна відповідь: Оксигенотерапію

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 27-ми років звернулася до лікаря зі скаргами на біль внизу живота, підвищення температури до 38,7°C, слабкість. Об'єктивно: артеріальний тиск -120/80 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Симптом Щоткіна- Блюмберга позитивний в гіпогастральній ділянці. Вагінальне дослідження: матка та додатки не визначаються через напруження передньої очеревинної стінки. Заднє склепіння нависає, різко болюче. Яким буде діагноз?

- a. Пельвіоперитоніт
- b. Гострий ендометрит
- c. Гострий сальпінгофорит
- d. Апоплексія яєчника
- e. Позаматкова вагітність

Правильна відповідь: Пельвіоперитоніт

Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 42-х років доставлена машиною швидкої допомоги зі скаргами на різку загальну слабкість, схуднення, відсутність апетиту, нудоту, блювання, біль у животі. При огляді: гіперпігментація шкіри, артеріальний тиск - 70/45 мм рт.ст., брадикардія. В додаткових дослідженнях: знижений вміст альдостерону та кортизолу в крові, знижена екскреція 17-КС та 17-ОКС з сечею, гіпонатріемія, гіпохлоремія, гіпокаліємія. Яких лікувальних заходів потрібно вжити?

- a. Призначення преднізолону
- b. Призначення глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів, дієти з підвищеним вмістом кухонної солі
- c. Призначення інсуліну
- d. Призначення альдостерону
- e. Призначення дієтотерапії з підвищеним вмістом кухонної солі

Правильна відповідь: Призначення глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів, дієти з підвищеним вмістом кухонної солі

Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 4-х років після відпочинку на морі розвинулось багаторазове блювання. Випорожнення ахолічне. Сеча світла. Доставлена у стаціонар з ознаками токсико-екзикозу на 3 день захворювання. З рота запах прілих фруктів. Які лабораторні дані першочергово потрібні для призначення терапії?

- a. Загальний аналіз і печінкові проби крові, цукор крові
- b. Кров на кетонові тіла, протеїнограма крові, ліпіди крові
- c. Загальний аналіз і печінкові проби крові, бак. посів блювотних мас
- d. Кров на білірубін, АЛТ, цукор
- e. Цукор крові, сеча на ацетон

Правильна відповідь: Цукор крові, сеча на ацетон

Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 2-х років під час їжі раптово почався напад надсадного гавкаючого кашлю, інспіраторна задишка, періо-ральний ціаноз, різка слабкість, дитина неспокійна, периферичний пульс слабкий, ЧСС- 146/хв, ЧД- 40/хв., втягнення піддатливих місць грудної клітки. Який лікувально-діагностичний метод необхідно застосувати у дитини?

- a. Бронхоскопія
- b. Торакоцентез
- c. Пульсоксиметрія
- d. Бронхографія
- e. Гастродуоденоскопія

Правильна відповідь: Бронхоскопія

Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки після укусу оси в обличчя розвинулось тахіпnoе до 38/хв., пульс - 120/хв., артеріальний тиск знизився до 60/40 мм рт.ст. З чого треба почати невідкладну допомогу?

- a. Допоміжна вентиляція легенів
- b. Оксигенотерапія
- c. Димедрол
- d. Преднізолон
- e. Адреналін

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 48 років постраждав від ураження блискавкою. Під час огляду у пацієнта спостерігається: збудження, дезорієнтація, періодичні судоми. Артеріальний тиск --- 140/90 мм рт.ст., пульс --- 120/хв, дихання аритмічне. Які лікарські засоби треба призначити пацієнту терміново?

- a. Теофілін
- b. Адреналін
- c. Глюкокортикоїди
- d. Седативні
- e. Серцеві глюкозиди

Правильна відповідь: Седативні

Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Першовагітна в терміні 11-12 тижнів скаржиться на інтенсивний переймоподібний біль внизу живота та кровотечу зі статевих шляхів. Піхвове дослідження: канал шийки матки відкрито на 2 см, в ньому визначається нижній полюс плодового яйця. Кров'янисті виділення рясні. Яка стадія мимовільного аборту?

- a. Неповний аборт
- b. Аборт у ходу
- c. Повний аборт
- d. Загрозливий аборт
- e. Аборт, що не стався

Правильна відповідь: Аборт у ходу

Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнта 19-ти років доставлено з місця ДТП, ліва нижня кінцівка іммобілізована шиною Дітеріхса. Свідомість потьмарена, шкірні покриви бліді, з синюшним відтінком. Пульс - 130/хв., артеріальний тиск - 70/0 мм рт.ст. Дихання поверхневе, часте. Спостерігається гіпопрефлексія, м'язова гіпотензія. Який патофізіологічний стан супроводжує дане пошкодження?

- a. Кома глибока
- b. Травматичний шок II ступеня
- c. Травматичний шок I ступеня
- d. Травматичний шок III ступеня
- e. Кома помірна

Правильна відповідь: Травматичний шок III ступеня

Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 42-х років, на другу добу після субtotальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зобу, з'явилися серцебиття, задишка, пітливість, пронос, відчуття страху. При огляді: хвора збуджена, шкіра волога, гаряча на дотик. Температура тіла - 39,2°C. Тони серця приглушенні, тахікардія. Пульс - 160/хв., артеріальний тиск - 85/40 мм рт.ст. Живіт м'який, безболісний. Які дослідження потрібно провести для установлення діагнозу?

- a. Вміст трансаміназ в сироватці крові
- b. Вміст 17-КС, 17-ОКС в сечі
- c. Вміст тиреоїдних гормонів
- d. Вміст адреналіну та норадреналіну в крові
- e. Вміст цукру в крові

Правильна відповідь: Вміст тиреоїдних гормонів

Питання 89

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 11-ти місяців спостерігаються адінамія, фебрильна температура, кашель, ціаноз, дистантні хрипи. Частота дихання - 90/хв. Фізикальні дані: перкуторно-коробковий звук, аускультивно-жорстке дихання, тотальні дрібноміхурцеві хрипи. 20 хвилин проводилась інсуфляція 100% кисню через маску. Рентгенологічно - ознаки емфіземи. В артеріальній крові: PaO₂ - 55 мм рт.ст., pH-7,1. З чого доцільно розпочати терапію?

- a. Інгаляція й інфузія глюокортикоїдів і амброксолу
- b. Киснева палатка з інгаляцією амброксолу
- c. Штучна вентиляція легень
- d. Гіпербарична оксигенация
- e. Киснева маска з інфузією глюокортикоїдів

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 90

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 25-ти років через 40 хвилин після прийому оксациліну з'явились захриплість голосу, "гавкаючий" кашель, утруднення дихання із задишкою інспіраторного характеру, задуха. Об'єктивно: хвора неспокійна, метушлива. Дихання шумне, стридорозне. Обличчя ціанотичне. Аускультивно: розсіяні сухі свистячі хрипи. Ваш діагноз:

- a. Гострий фарингіт
- b. Стороннє тіло трахеї
- c. Напад бронхіальної астми
- d. Паротонзиллярний абсцес
- e. Гострий набряк Квінке

Правильна відповідь: Гострий набряк Квінке

Питання 91

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хвороїз гострим інфарктом міокарда різка слабкість, запаморочення, ціаноз губ, акроцианоз, дихання самостійне, артеріальний тиск на периферичних судинах не визначається. На ЕКГ: крупно-хвильова фібриляція шлуночків. Яких заходів треба вжити насамперед?

- a. Інтубація трахеї
- b. Прекардіальний удар
- c. Електрична дефібриляція
- d. Закритий масаж серця
- e. Ввести повітровід

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

Питання 92

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта віком 30 років на ЕКГ зафіксована фібриляція шлуночків. Проведено три безрезультатні спроби відновити серцевий ритм за допомогою електричної дефібриляції. Скільки разів поспіль дозволяється проводити дефібриляцію одному пацієнту?

- a. Не більше ніж 10 розрядів
- b. Не більше ніж 3--5 розрядів
- c. Проводити протягом години
- d. Поки на ЕКГ реєструється асистолія
- e. Поки на ЕКГ реєструється фібриляція

Правильна відповідь: Поки на ЕКГ реєструється фібриляція

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У військовослужбовця, який перебував в зоні бойових дій в ситуації загрози його життю, спостерігалось рухове збудження, порушення орієнтації в місці та часі, неадекватні вчинки, небезпечні для оточуючих. Який попередній діагноз?

- a. Депресивні та тривожні розлади
- b. Гострий реактивний стан
- c. Психопатоподібна поведінка
- d. Шизофренія
- e. Невроз

Правильна відповідь: Гострий реактивний стан

Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпілий перебував у вогнищі застосування напалму та продуктів горіння. Доставлений через 1,4-2 години. Скаржиться на головний біль пульсуючого характеру, шум у вухах, появу "туману" перед очима, нарощуючу м'язову слабкість (переважно в ногах). Спостерігається психомоторний розлад, гіпремія обличчя, ейфорія. Пульс - 100/хв., тони серця ослаблені, артеріальний тиск - 85/60 мм рт.ст., частота дихання - 24/хв., дихання везикулярне. Температура тіла - 37,3° С. Поставте діагноз:

- a. Гостре пероральне отруєння дихлоретаном важкого ступеня
- b. Отруєння димом (продуктами горіння, нітрогази)
- c. Інгаляційне отруєнням хлорованими вуглеводнями
- d. Гостре отруєння окисом вуглецю
- e. Отруєння димом легкого ступеня

Правильна відповідь: Гостре отруєння окисом вуглецю

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнта віком 19 років із ревматичною хворобою серця, комбінованою мітральною вадою серця під час складання іспитів втратила свідомість. Об'єктивно встановлено: свідомість відсутня, пульс на променевих і сонних артеріях не визначається, дихання поверхневе, шумне, АТ не визначається, тони серця не вислуховуються. Який метод діагностики буде найінформативнішим у цьому разі?

- a. Ехокардіографія
- b. Електрокардіографія
- c. Рентгенографія органів грудної порожнини
- d. Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини
- e. Коронароангіографія

Правильна відповідь: Електрокардіографія

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 70-річного пацієнта скарги на біль в правій поперековій ділянці з іrrадіацією в статеві органи, часте болюче сечовипускання, підвищення температури тіла до 38,3°C, лихоманку, блювання. Аналіз сечі: реакція кисла, лейкоцитів більше 110, еритроцитів - 48 в полі зору, сеча каламутна, бурого кольору. Ультрасонографічно виявлено нерівномірно виражені зміни паренхіми, значне розширення миски правої нирки. Попередній діагноз:

- a. Загострення хронічного піелонефриту
- b. Сосочковий некроз
- c. Карбункул нирки. Гострий гнійний паранефрит
- d. Сечно-сольовий діатез. Абсцес нирки
- e. Сечокам'яна хвороба

Правильна відповідь: Сечокам'яна хвороба

Питання 97

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіка віком 54 роки знайдено зимио вранці на вулиці. Він скаржиться на пекучий біль, свербіння і <<розпирання>> пальців ніг. Об'єктивно встановлено: відчувається сильний запах алкоголю, пацієнт агресивний, ступні набряклі, на фоні побілілої шкіри є червоно-фіолетові плями, декілька пухирів, наповнених світлою рідиною. Встановіть діагноз.

- a. Обмороження II ст.
- b. Гострий тромбоз підколінної артерії
- c. Синдром позиційного здавлення ступні
- d. Обмороження I ст.
- e. Обмороження III ст.

Правильна відповідь: Обмороження II ст.

Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної жінки, яка скаржиться на переймоподібний біль унизу живота, спостерігаються кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Остання менструація була 2 місяці тому. Під час бімануального дослідження встановлено: матка болісна та збільшена до 5--6 тижнів вагітності, вагінальна частина шийки матки укорочена, розм'якшена, канал шийки матки розкритий, у цервіальному каналі розташовані елементи плідного яйця та згустки крові. Який патологічний стан розвинувся у жінки?

- a. Загрозливий аборт
- b. Неповний мимовільний аборт
- c. Аборт у ходу
- d. Аборт, що невідбувся
- e. Повний мимовільний аборт

Правильна відповідь: Аборт у ходу

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпіла віком 28 років упала на вулиці з опорою на руку. Під час огляду виявляється: деформація на рівні середньої третини передпліччя, біль у разі навантаження, патологічна рухливість. Розладів магістрального кровообігу не виявлено, але пацієнта скаржиться на парестезію у ділянці кисті. Яке положення передпліччя для транспортної іммобілізації потерпілої є оптимальним?

- a. Максимальна супінація
- b. Супінація 45 градусів від максимальної
- c. Пронація 45 градусів від максимальної
- d. Середнє між пронацією та супінацією
- e. Максимальна пронація

Правильна відповідь: Середнє між пронацією та супінацією

Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальне відділення звернувся хворий 31-го року зі скаргами на гострий біль у попереку справа та правій половині живота. Біль віддавав у праву пахову область та яєчко. Відзначається нудота, блювання, часті позиви до сечовипускання. В аналізі сечі - гематурія. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий апендицит
- b. Ниркова коліка справа
- c. Гострий орхоепідидиміт
- d. Гострий піелонефрит
- e. Гіпернефрома правої нирки

Правильна відповідь: Ниркова коліка справа

Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дівчинка віком 12 років, яка хворіє на цукровий діабет, госпіталізована до клініки непритомною. Об'єктивно встановлено: шкірні покриви сухі. Виражена неврологічна симптоматика: гіпертонус м'язів, ністагм, позитивні менінгеальні ознаки; ЧСС --- 120/хв; нижній край печінки виступає на 3,5 см з-під краю реберної дуги. У крові виявлено: глукоза --- 43 ммоль/л., осмолярність плазми --- 360 мОsm/л. Реакція сечі на ацетон негативна. Який невідкладний стан виник у дитини?

- a. Гіперосмолярна кома
- b. Кетоацидотична кома
- c. Гостра ниркова недостатність
- d. Гостра надниркова недостатність
- e. Гіпоглікемічна кома

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 30-ти років після тряскової їзди з'явився інтенсивний нападоподібний біль у поперековій ділянці, що іrrадіює в пахову ділянку, часті позиви до сечовипускання, кров у сечі. Об'єктивно: артеріальний тиск - 145/85 мм рт.ст., позитивний симптом Пастернацького ліворуч. Аналіз сечі: білок - 0,066 г/л, L-4-5 в п/зору, еритроцити - все поле зору, оксалати. Ваш попередній діагноз:

- a. Позаматкова вагітність
- b. Киста яєчника
- c. Гострий піелонефрит
- d. Ниркова колька
- e. Гострий цистит

Правильна відповідь: Ниркова колька

Питання 103

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнта віком 56 років госпіталізовано до лікарні. Скаржиться на сухий кашель, холодний піт, задишку, що посилюється в положенні лежачи. Об'єктивно спостерігається: частота дихання --- 30/хв, артеріальний тиск --- 180/100 мм рт. ст., Аускультивно виявляються: глухі серцеві тони, акцент II тону над легеневою артерією, ритм галопу, над легенями вислуховується жорстке дихання, в нижніх відділах сухі та вологі дрібнопухирцеві хрипи. Який попередній діагноз?

- a. Гіпертензивний криз неускладений
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Астматичний статус
- d. Ішемічна кардіоміопатія
- e. Набряк легень

Правильна відповідь: Набряк легень

Питання 104

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На підприємстві з виробництва ртутних термометрів один з працівників порушив правила техніки безпеки, внаслідок чого відбувся витік парів ртути у великому об'ємі. Усі потерпілі працівники були негайно доставлені до приймального відділення найближчої лікарні з діагнозом гостре отруєння парами ртути. Який антидотний засіб використав лікар для невідкладної допомоги?

- a. Прозерин
- b. Налоксон
- c. Дипіроксим
- d. Унітіол
- e. Пілокарпін

Правильна відповідь: Унітіол

Питання 105

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У післяопераційного пацієнта розвинувся інфаркт міокарда та виникла пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Об'єктивно спостерігається: ЧСС --- 150/хв., АТ --- 105/70 мм рт. ст. Який антиаритмічний лікарський засіб треба використати?

- a. Дилтіазем
- b. Дизопірамід
- c. Лідокаїн
- d. Верапаміл
- e. Дигоксин

Правильна відповідь: Лідокаїн

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 68 років госпіталізований за 2 години після появи раптового стискаючого болю за грудиною. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, акроціаноз, пульс ниткоподібний, 130/хв, АТ --- 70/50 мм рт. ст., діяльність серця ритмічна, тони приглушені, частота дихання - 30/хв, у нижніх відділах легень прослуховуються вологі хрипи. На ЕКГ у відведеннях V1-V4 комплекс QRS типу QS, сегмент ST вище ізолінії, негативний зубець T. Які лікарські засоби необхідно призначити пацієнту насамперед?

- a. Серцеві глікозиди
- b. Діуретики
- c. Інгібтори ангіотензинперетворювального ферменту
- d. Тромболітики
- e. Реополіглюкін

Правильна відповідь: Тромболітики

Питання 107

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіку віком 60 років із клінічними симптомами гемотампонади серця треба терміново провести пункцию перикарда. Визначте місце пункциї.

- a. Справа від основи мечоподібного відростка. Знизу-вгору-вліво по задній поверхні грудини
- b. Нижче мечоподібного відростка. Знизу-вгору по задній поверхні грудини
- c. Зліва від основи мечоподібного відростка. Знизу-вгору-вправо по задній поверхні грудини
- d. Крізь грудину. Ззовні-всередину
- e. У четвертому міжребер'ї на 3 см ліворуч від грудини. Ззовні-всередину

Правильна відповідь: Зліва від основи мечоподібного відростка. Знизу-вгору-вправо по задній поверхні грудини

Питання 108

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка з діагнозом: перелом кісток таза, стегнової та великогомілкової кісток, на другу добу травматичної хвороби виникла немотивована задишка, порушення свідомості, петехіальні висипання на кон'юнктиві та шкірі шиї і грудної клітки. Об'єктивно спостерігається: температура тіла --- 39 $^{\circ}$ C, ЧСС --- 120/хв. На оглядовій рентгенограмі легень спостерігаються білатеральні інфільтрати. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Сепсис
- b. Кардіогенний набряк легень
- c. Жирова емболія
- d. Нозокоміальна пневмонія
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

Правильна відповідь: Жирова емболія

Питання 109

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 54 роки раптово втратила свідомість, дихання відсутнє, серцева діяльність не реєструється. Лікар-реаніматолог самостійно надає невідкладну допомогу. В якому співвідношенні треба проводити непрямий масаж серця та штучне дихання?

- a. 10 компресій грудної клітки --- 2 вдохи
- b. 5 компресій грудної клітки --- 2 вдохи
- c. 40 компресій грудної клітки --- 2 вдохи
- d. 50 компресій грудної клітки --- 2 вдохи
- e. 30 компресій грудної клітки --- 2 вдохи

Правильна відповідь: 30 компресій грудної клітки --- 2 вдохи

Питання 110

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час ремонту в квартирі жінці в праве око потрапив розчин гашеного вапна. В оці з'явилися сильний біль, світлобоязнь, слізотеча, знизився зір. Гострота зору правого ока 0,2 н/к. В правому оці очна щілина рефлекторно звужена, світлобоязнь, слізотеча. Кон'юнктива повік гіперемована, місцями бліда, набрякла. Змішана ін'єкція кон'юнктиви очного яблука. Рогівка сірого кольору, набрякла. Зіниця звужена, глибокі середовища ока дослідити неможливо у зв'язку з вираженою світлобоязнью. Яку допомогу необхідно надати першочергово?

- a. Промити кон'юнктивальний мішок фізіологічним розчином
- b. Закапати дезінфікуючі розчини (0,25% розчин левоміцетину чи 20% розчин сульфацил натрію)
- c. Закласти гормональну мазь
- d. Рясно промити кон'юнктивальну порожнину водою протягом 15-20 хвилин
- e. Закласти 1% тетрациклінову мазь

Правильна відповідь: Рясно промити кон'юнктивальну порожнину водою протягом 15-20 хвилин

Питання 111

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Населення, яке одержало радіаційне ураження внаслідок бойових дій іонізуючим випромінюванням в районі ядерного вибуху та в зонах радіаційного зараження, відносять до:

- a. Радіаційних втрат
- b. Бойових втрат
- c. Масових втрат
- d. -
- e. Санітарних втрат

Правильна відповідь: Радіаційних втрат

Питання 112

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Восьмимісячна дитина, якій встановлено діагноз: вроджена вада серця (тетрада Фалло), раптом стала неспокійною, посилився ціаноз, прискорилося дихання. Аускультивно в легенях --- без особливостей, ЧД --- 48/хв., ЧСС --- 144/хв, пульс ритмічний. Яка причина погіршення стану у дитини?

- a. Емболія
- b. Задишково-цианотичний напад
- c. Колапс
- d. Гостра коронарна недостатність
- e. Непритомність

Правильна відповідь: Задишково-цианотичний напад

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У палату інтенсивної терапії новонароджених переведено недоношенну дитину, яка народилася на 30-му тижні гестації. Оцінка за шкалою Апгар при народженні --- 5--6 балів, вага --- 1900 г, помірні дихальні розлади та неврологічна симптоматика, рівень глюкози в крові --- 2,0 ммоль/л. Яку лікувальну тактику треба обрати, враховуючи такі показники глюкози в крові немовляти?

- a. Розпочати в/в уведення 10%-го розчину глюкози
- b. Розпочати в/в уведення 5%-го розчину глюкози
- c. Розпочати в/в уведення 20%-го розчину глюкози
- d. Рівень глюкози крові не потребує корекції
- e. Розпочати в/в уведення 0,9%-го розчину натрію хлориду

Правильна відповідь: Розпочати в/в уведення 10%-го розчину глюкози

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У п'ятимісячного хлопчика після першого введення прикорму з'явився гострий переймоподібний біль у животі, блевота, затримка випорожнень. При ректальному дослідженні - кров "стигла вишня". Ваш діагноз:

- a. Гострий холецистит
- b. Пухлина черевної порожнини
- c. Внутрішня грижа
- d. Глистна інвазія
- e. Кишкова інвагінація

Правильна відповідь: Кишкова інвагінація

Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнт 56-ти років протягом 50-ти годин перебуває на штучній вентиляції легень, що проводиться через ендотрахеальну трубку, у нього сильна лихоманка, артеріальний тиск - 85/40 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 120/хв., PaO₂/FiO₂ - 260 мм рт.ст., центральний венозний тиск - 12 мм вод.ст., лейкоцитоз (18 Г/л), паличкоядерний зсув (18%). Якій причині сепсису відповідає даний діагноз?

- a. Інфекція, пов'язана з центральним венозним катетером
- b. Вентилятор-асоційована пневмонія
- c. Гострий безкам'яний холецистит
- d. Інтраабдомінальний сепсис
- e. Синусит

Правильна відповідь: Вентилятор-асоційована пневмонія

Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При виході з оточення у військовій частині виникли значні санітарні втрати. Для надання пораненим і хворим медичної допомоги на етапах медичної евакуації начальник медичної служби Армійського корпусу наказав організувати евакуацію "На себе". Які є види медичної евакуації можна використати з метою доставки поранених і хворих на етапи медичної евакуації?

- a. Від себе, на сусіда, за собою, через себе
- b. Від себе, від сусіда, через сусіда
- c. За собою, через сусіда, через себе
- d. На сусіда, на ВППГ, через себе
- e. За собою, за сусідом, на сусіда

Правильна відповідь: Від себе, на сусіда, за собою, через себе

Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Після поранення у ліве стегно, у військовослужбовця виникла кровотеча та сильний біль у рані. Об'єктивно спостерігається: пацієнт на ногу стати не може, кінцівка неприродно зігнута на рівні середньої третини стегна, пульсація тильної артерії стопи збережена. На передній поверхні стегна рана розміром 1x1 см, на задній --- 3x5 см. Які найперші дії санінструктора під час надання домедичної допомоги пораненому?

- a. Накласти асептичну пов'язку
- b. Увести внутрішньом'язово знеболювальний засіб зі шприц-тубика
- c. Дати потерпілому антибіотик з аптечки медичної індивідуальної
- d. Зупинити кровотечу з рані
- e. Провести іммобілізацію кінцівки за допомогою підручних засобів

Правильна відповідь: Зупинити кровотечу з рані

Питання 118

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 25 років раптово втратив свідомість. Лікар екстреної (швидкої) медичної допомоги встановив: стан ускрай тяжкий, періодично виникають клонічні судомі кінцівок, на тілі --- множинна геморагічна зірчаста висипка різної величини, на шкірі тулуба і кінцівок темно-багряні плями. Тони серця глухі, пульс --- 140--160/хв, АТ --- 40/0 мм рт. ст., дихання поверхневе, 40/хв. Які невідкладні заходи треба провести лікарю?

- a. Увести преднізолон та провести інфузійну терапію
- b. Увести доксициклін
- c. Увести діазepam
- d. Провести конікотомію
- e. Увести аміодарон

Правильна відповідь: Увести преднізолон та провести інфузійну терапію

Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час гасіння пожежі на військовому складі у військовослужбовців виникла клінічна картина отруєння монооксидом вуглецю середнього ступеня тяжкості. Який показник необхідно дослідити для підтвердження діагнозу?

- a. Трансамінази сироватки крові
- b. Карбоксигемоглобін
- c. Псевдохолінестеразу
- d. ЯМР-томограму мозку
- e. Електрокардіограму

Правильна відповідь: Карбоксигемоглобін

Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпілий з опіком полум'ям. У відділені інтенсивної терапії почали нарости явища дихальної недостатності. Яка невідкладна допомога?

- a. Введення дихальних аналептиків
- b. Інтубація трахеї та ШВЛ
- c. Трахеостома
- d. Введення брохолітиків
- e. Інгаляція зволоженого кисню

Правильна відповідь: Інтубація трахеї та ШВЛ

Питання 121

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У п'ятирічної дівчинки, яка хворіє на цукровий діабет I типу протягом 2-х років і отримує інсулін, раптово виникло занепокоєння, відчуття голоду, тремор у кінцівках, блідість. Дитина втратила свідомість. Рівень глюкози у крові --- 2,2 ммоль/л. Який препарат насамперед треба призначити дитині?

- a. Глюкозу
- b. Адреналін
- c. Глюкагон
- d. Ноотропіл
- e. Преднізолон

Правильна відповідь: Глюкозу

Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Декілька працівників фармацевтичного підприємства під час пожежі виявилися заблокованими без можливості самостійної евакуації. Засоби індивідуального захисту на випадок пожежі також були недоступними. Після евакуації рятувальниками до безпечного місця потерпілі мали такі симптоми: запаморочення, порушення зору, нудоту, часте дихання, задишку, вишневий колір обличчя. Для якого виду гіпоксії характерні такі симптоми?

- a. Циркуляторна
- b. Гемічна
- c. Токсична
- d. Тканинна
- e. Респіраторна

Правильна відповідь: Гемічна

Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 19-ти річної жінки у III періоді пологів проведено ручне відокремлення та видалення посліду в зв'язку з інтимним прирошенням плаценти. Одразу після пологів з'явився гострий плевральний біль, занепокоєння, лихоманка, кашель. Шкірні покриви бліді, температура - 38,9°C, частота пульсу - 98/хв., артеріальний тиск - 100/70; 90/60 мм рт.ст., розпочалась маткова кровотеча, проте матка контурується. На ЕКГ - синусова тахікардія, гостре легеневе серце [SIQ III; P - pulmonale], парціальний тиск O₂ становить 64 мм рт.ст., тиск CO₂ -18 мм рт.ст. Встановіть діагноз:

- a. Синдром Мендельсона
- b. Емболія амніотичною рідиною
- c. Інфаркт міокарду
- d. Повітряна емболія
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

Правильна відповідь: Емболія амніотичною рідиною

Питання 124

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнтки віком 33 роки внаслідок розриву аневризми мозкових судин і крововиливу в ділянці стовбура головного мозку, виникла клінічна смерть. Який метод ШВЛ буде найменш ефективним під час проведення реанімаційних заходів?

- a. Рот до носа
- b. Метод Сільвестра
- c. Рот до рота
- d. З застосуванням мішка Амбу
- e. Рот до маски

Правильна відповідь: Метод Сільвестра

Питання 125

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнт 34-х років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, відсутність апетиту. Захворів гостро 2 дні тому на тлі лікування туберкульозу легень. Об'єктивно: на питання відповідає з затримкою, визначається тремор рук, жовтяниця, гепатомегалія. В крові: загальний білірубін - 170 мкмоль/л, непрямий - 90 мкмоль/л, АЛТ- 3,4 ммоль//г·л. Який препарат міг спричинити такий стан?

- a. Піразинамід
- b. Рифампіцин
- c. Індінавір
- d. Етамбутол
- e. Ізоніазид

Правильна відповідь: Ізоніазид

Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Першовагітна жінка з терміном гестації 34 тижні надійшла у пологовий стаціонар зі скаргами на блювання, носову кровотечу, слабкість. Шкірні покриви та склери жовтушні, температура тіла підвищена до 37,4°C, артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., білірубін - 70,4 мкмоль/л; лейкоцитів - 14·10⁹/л, тромбоцитів - 95·10⁹/л; АЛТ і АСТ підвищені у 6 разів, фібриноген не визначається, рівень факторів згортання знижений, білка в сечі немає. Яку терапію необхідно обрати?

- a. Магнію сульфат, ліжковий режим
- b. Призначення ацикловіру
- c. Спостереження, терапія гепатопротекторами
- d. Розродження з інфузією свіжозамороженої плазми
- e. Лапароскопічна холецистектомія

Правильна відповідь: Розродження з інфузією свіжозамороженої плазми

Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка на 5-ту добу після оперативного втручання виникли симптоми тромбоемболії легеневої артерії, що спричинило раптову коронарну смерть. Який препарат треба було призначати пацієнту для профілактики цього ускладнення?

- a. Вазотоніки
- b. Антиферментні засоби
- c. Дезагреганти
- d. Тромболітики
- e. Низькомолекулярні гепарини

Правильна відповідь: Низькомолекулярні гепарини

Питання 128

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час вибуху офіцер отримав удар твердим предметом по голові. Короткочасно втратив свідомість. Відчуває помірну нудоту. У лобно-тім'яній ділянці справа - великий синець, садна. Загальмований, млявий. Скарги на сильний головний біль, пульс - 60/хв., напруженій. Повторне блювання. Анізокорія, права зіниця ширша. Сухожильні рефлекси справа знижені. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Відкрита черепно-мозкова травма
- b. Забій головного мозку II ступеня тяжкості
- c. ЗЧМТ, наростаюча внутрішньочерепна гематома
- d. Перелом кісток черепа, субарахноїдальний крововилив зліва
- e. Струс головного мозку

Правильна відповідь: ЗЧМТ, наростаюча внутрішньочерепна гематома

Питання 129

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 16-ти років скаржиться на інтенсивний біль у горлі зліва, що віддає у вухо, різке утруднення ковтання та відкриття рота, підвищення температури тіла до 39,2оС . Хворіє третю добу, за тиждень до початку скрг лікувалася у дільничного лікаря з приводу ангіни. Відкриття рота значно утруднене (тризм жувальних м'язів), асиметрія зіву за рахунок випинання лівого мигдалика, піднебінно-язикова дужка різко гіперемована, інфільтрована, набрякла. За кутом нижньої щелепи визначаються збільшені та болючі лімфовузли. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Хронічний тонзиліт
- b. Паратонзиллярний абсцес
- c. Дифтерія
- d. Фарингіт
- e. Ангіна

Правильна відповідь: Паратонзиллярний абсцес

Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 3-х років, що страждає на тетраду Фалло, раптово збільшилась інтенсивність ціанозу, з'явилася задишка, вона присіла навпочіпки. Ваші дії:

- a. Призначити антибіотики
- b. Призначити сечогінні
- c. Призначити серцеві глікозиди
- d. Призначити бронходилататори
- e. Призначити оксигенотерапію

Правильна відповідь: Призначити оксигенотерапію

Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На сортувальному майданчику медичної роти бригади пораненому встановлено попередній діагноз: мінно-вибухова травма. Травматичний шок. В ролі лікаря сортувальної бригади зробіть сортувальний висновок (черговість направлення та функціональний підрозділ):

- a. Перша черга, госпітальне віddлення
- b. Перша черга, протишокова для поранених
- c. Друга черга, операційна для тяжкопоранених
- d. Перша черга, перев'язочна для поранених середньої тяжкості
- e. Перша черга, перев'язочна для легкопоранених

Правильна відповідь: Перша черга, протишокова для поранених

Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт, який хворіє на гемофілію А, отримав травму, що ускладнилася кровотечею. Які невідкладні заходи треба застосувати?

- a. Увести етамзилат натрію
- b. Перелити еритроцитарну масу
- c. Увести антикоагулянти прямої дії
- d. Увести в/в кріопреципітат або препарати рекомбінантного фактору VIII
- e. Увести амінокапронову кислоту

Правильна відповідь: Увести в/в кріопреципітат або препарати рекомбінантного фактору VIII

Питання 133

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Мати хворої дитини віком 9 місяців скаржиться на підвищення температури тіла до 39оС, кашель, утруднення дихання протягом 3-х діб. Об'єктивно: блідість шкіри та слизових оболонок, ціаноз носогубного трикутника. Над легенями з обох боків вислуховуються дрібнопухирчасті хрипи. Яке найбільш інформативне інструментальне обстеження слід призначити хворому?

- a. Протеїнограма
- b. Рентгенографія органів грудної клітки
- c. Бактеріологічне дослідження харкотиння
- d. Клінічний аналіз крові
- e. Гострофазові показники

Правильна відповідь: Рентгенографія органів грудної клітки

Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 1,5 років із септичним шоком виникла кровотеча з місць ін'екцій, по шлунковому зонду надходить "кавова гуща". При визначені показників гемостазу збільшено МНС, АЧТЧ, рівень D-димеру, знижений фібриноген, тромбоцити - $30 \cdot 10^9/\text{л}$. Яку патологію запідоозрив лікар-куратор?

- a. Дефіцит вітаміну K
- b. Тромботична тромбоцитопенічна пурпura
- c. Хвороба Віллебранда
- d. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпura
- e. Синдром ДВЗ

Правильна відповідь: Синдром ДВЗ

Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 17-ти років була вжалена комахою в ділянку лівого передпліччя 5 діб тому. Через дві доби в ділянці вжалення з'явилася інфільтрація, гіперемія, набряк, посилився біль. Температура тіла - 37,8°C. В середній третині лівого передпліччя в підшкірній клітковині інфільтрат 4x4 см, з нечіткими контурами з флюктуацією в центрі. Шкіра над інфільтратом гіперемована, локальне підвищення температури тіла. Ваш діагноз:

- a. Запальний інфільтрат
- b. Алергічна реакція на вжалення комахою
- c. Бешиха
- d. Абсцес
- e. Тромбофлебіт вен передпліччя

Правильна відповідь: Абсцес

Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На виробництві з виготовлення пластмасових контейнерів сталася аварія. Через 1 годину після цього працівник звернувся до медпункту зі скаргами на шум у вухах, головний біль, запаморочення, загальну слабкість, підвищення температури тіла, слизотечу та діарею, сірий колір шкіри. Через півтори години до медпункту звернулися ще 6 працівників зі схожим клінічними проявами. В усіх постраждалих в крові було виявлено метгемоглобінією. Яка речовина викликала таке отруєння?

- a. Сірководень
- b. Моноксид вуглецю
- c. Синильна кислота
- d. Похідні фенолу
- e. Аміак

Правильна відповідь: Похідні фенолу

Питання 137

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 52-х років доставлений машиною швидкої допомоги до гастроenterологічного відділення зі скаргами на сильний біль за грудиною, печію, блювання яскраво-червоною кров'ю, після чого біль та печія зменшуються, дисфагію, зниження маси тіла. При рентгеноскопії стравоходу спостерігається "ніша" 2,5 см діаметром. Яких лікувальних заходів потрібно вжити?

- a. Консервативне ведення хворого, призначення наркотичних анальгетиків
- b. Оперативне втручання
- c. Тактика спостереження за хворим
- d. Проведення спазмолітичної терапії
- e. Призначення антисекреторних препаратів

Правильна відповідь: Оперативне втручання

Питання 138

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 32 роки захворів раптово. Скаржиться на підвищення температури тіла до 39\$^o\\$C, біль у суглобах та м'язах, появу висипу на шкірі та слизових оболонках. Із анамнезу хвороби відомо: під час лікування ГРВІ приймав антибіотики та ацетилсаліцилову кислоту. На 5-й день з'явився висип на шкірі, загальний стан погіршився, посилилася слабкість. Об'єктивно спостерігається: стан пацієнта середньої тяжкості, на шкірі кінцівок і стегон множинний плямисто-папульозний висип та пухирі. На слизовій оболонці порожнини рота та статевих органах --- великі пухирі та кровоточиві ерозії, ознаки катарального кон'юнктивіту. Симптом Нікольского негативний. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- a. Стрептодермії
- b. Вульгарної пухирчатки
- c. Синдрому Стівенса-Джонсона
- d. Оперізуючого герпесу
- e. Доброкісної пухирчатки слизових оболонок

Правильна відповідь: Синдрому Стівенса-Джонсона

Питання 139

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної на 40-му тижні гестації почалися пологи. Відійшли навколоплідні води, сильно забруднені меконієм. Народилася доношена дівчинка, шкірні покриви рожеві, сильно забруднені меконієм, закричала одразу, м'язовий тонус фізіологічний. Якою повинна бути тактика лікаря в пологовій залі?

- a. Вимити дитину, обсушити, викласти на живіт матері
- b. Санація рото- та носоглотки, оксигенотерапія
- c. Інтубація трахеї, штучна вентиляція легень (ШВЛ)
- d. Викласти на живіт матері, обсушити
- e. Інтубація трахеї, санація верхніх дихальних шляхів

Правильна відповідь: Викласти на живіт матері, обсушити

Питання 140

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт віком 50 років із гіпертензивною кризою під час транспортування до стаціонару спеціалізованою кардіологічною бригадою раптово втратив свідомість. На кардіомоніторі спостерігається великохвильова фібриляція шлуночків. Що повинен зробити лікар насамперед?

- a. Виконати дефібриляцію
- b. Увести внутрішньосерцево адреналін
- c. Провести інтубацію трахеї та штучну вентиляцію легень
- d. Установити тимчасовий кардіостимулатор
- e. Виконати прямий масаж серця

Правильна відповідь: Виконати дефібриляцію

Питання 141

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Тяжкопоранений солдат зі значною крововтратою вертольотом доставлений у госпіталь. В приймальному відділенні розпочато переливання крові. Одразу після початку переливання відзначили почервоніння обличчя, з'явився біль у поперековій ділянці, знизився артеріальний тиск, прискорився пульс, з'явилися нудота та запаморочення. Якими будуть першочергові дії в цьому випадку?

- a. Відключити систему з кров'ю та підключити з фізіологічним розчином
- b. Ввести серцеві глікозиди
- c. Прискорити гемотрансфузію
- d. Негайно замінити флакон з кров'ю на інший цієї ж групи
- e. Припинити переливання крові, вийти з вени

Правильна відповідь: Відключити систему з кров'ю та підключити з фізіологічним розчином

Питання 142

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка, 25-ти років, була згвалтована та побита невідомим, після чого рідними госпіtalізована в стані мовного та рухового збудження. При огляді: дезорієнтована, на запитання не відповідає. Раптово стає метушливою, рве на собі одяг, намагається кудись бігти, відчуває страх, тривогу. Для невідкладної допомоги слід застосувати:

- a. Галоперидол
- b. Діазепам
- c. Амітриптилін
- d. Пірацетам
- e. Дифенгідраміну гідрохлорид

Правильна відповідь: Діазепам

Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 40-ка років, який 3 дні тому повернувся з Індії, раптово з'явилися озноб, жар, сильний головний біль, запаморочення, неспокій, надмірна рухливість, гіперемія обличчя і кон'юнктиви. Язык сухий, вкритий білим нальотом, петехіальний висип. В паховій ділянці справа з'явився сильний біль, у тому ж місці незабаром утворився бубон. У гемограмі: значний нейтрофільний лейкоцитоз, збільшення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). Ваш попередній діагноз:

- a. Чума
- b. Псевдотуберкульоз
- c. Пахвинний фурункул
- d. Туляремія
- e. Сибирка

Правильна відповідь: Чума

Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 25-ти років, яка надійшла до приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги з приводу гострої ниркової недостатності, виникла зупинка роботи серця. Що наймовірніше стало причиною цього?

- a. Гіпокаліємія
- b. Уремія
- c. Гіперкаліємія
- d. Гіперфосфатемія
- e. Ацидоз

Правильна відповідь: Гіперкаліємія

Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 56-ти років звернувся зі скаргами на біль та набряк лівої гомілки. Об'єктивно: ліва гомілка збільшена в діаметрі (+5 см у порівнянні з правою), тепла на дотик. Болючість та напруженій набряк гомілки при пальпації. Для уточнення діагнозу першочергово необхідно виконати:

- a. Коагулограму
- b. Рентгенографію нижніх кінцівок
- c. Флебографію нижніх кінцівок
- d. Плетизмографію нижніх кінцівок
- e. Доплерографію вен нижніх кінцівок

Правильна відповідь: Доплерографію вен нижніх кінцівок

Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У потерпілого внаслідок тривалого впливу високих концентрацій чадного газу діагностовано тяжкий ступінь отруєння. Назвіть найбільш ефективну схему проведення кисневої терапії:

- a. 100% кисень протягом 1 години
- b. 60% киснево-повітряна суміш протягом 4 годин
- c. Гіпербарична оксигенация
- d. 80% киснево-повітряна суміш протягом 2 годин
- e. 40% киснево-повітряна суміш протягом 6 годин

Правильна відповідь: Гіпербарична оксигенация

Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Для зниження артеріального тиску жінка прийняла кілька таблеток клофеліну. За 30--40 хв у неї з'явилися запаморочення, слабкість, порушення орієнтації в просторі та погіршення пам'яті. Об'єктивно спостерігається: помірна брадикардія --- 50/хв, зниження артеріального тиску до 100/60 мм рт.ст., частота дихання --- 14/хв. Який із наведених заходів доцільно на самперед застосувати для надання допомоги пацієнці?

- a. Увести атропін
- b. Використати активоване вугілля
- c. Увести внутішньовенно кордіамін
- d. Провести форсований діурезу
- e. Розпочати інфузію допаміну

Правильна відповідь: Використати активоване вугілля

Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка з політравмою та гострою крововтратою за 5 хвилин після початку гемотрансфузії з'явилися біль за грудиною і в попереку та миготіння мушок перед очима. Сеча набула кольору <<м'ясних помийв>>. Плазма крові після центрифугування червона. Яке ускладнення найімовірніше виникло у пацієнта?

- a. Синдром масивної трансфузії
- b. Жирова емболія
- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Гострий гемоліз
- e. Алергічна реакція

Правильна відповідь: Гострий гемоліз

Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У першовагітної 27-ми років вагітність 39-40 тижнів, положення плоду поздовжнє, голівка притиснута до площини входу в малий таз. Розміри тазу 23-26-29-18. Перейми болючі, тривалість 10 годин, навколо пілдні води відійшли 2 години тому, роділля неспокійна. Серцебиття плоду ритмічне, 160/хв. При зовнішньому акушерському обстеженні встановлено: кон- тракційне кільце розташоване косо, знаходиться вище пупа, ознака Вастена позитивна, матка в нижньому сегменті різко болюча, круглі зв'язки матки напружені. Про яку патологію слід думати?

- a. Розрив матки, що відбувся
- b. Дискоординована пологова діяльність
- c. Загроза розриву матки
- d. Слабкість полової діяльності
- e. Передчасне відшарування плаценти

Правильна відповідь: Загроза розриву матки

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальні відділення лікарні доставлено вагітну жінку (38 тижнів) з клінікою гострого ілеофеморального тромбозу. Який із вказаних симптомів найбільше відповідає даному захворюванню?

- a. Нудота і блювання
- b. Біль у паховій ділянці
- c. Набряк гомілки
- d. Набряк стегна і гомілки
- e. Гектична температура

Правильна відповідь: Набряк стегна і гомілки

[◀ Крок 3 Фармація \(вітчизняні UA\)](#)

Перейти до...

[Крок 3 Стоматологія 2022 ►](#)

Розпочато	середа 2 листопад 2022 10:41
Стан	Завершено
Завершено	четвер 3 листопад 2022 1:11
Витрачено часу	2 години 30 хв
Балів	1/150
Оцінка	0 з можливих 10 (1%)

Питання 1

Правильно

Балів 1 з 1

Жінка 27-ми років відзначає виділення з неприємним запахом зі статевих шляхів, біль в нижній частині живота, підвищення температури. Вищезазначені скарги з'явилися 2 дні тому. В анамнезі: тиждень тому жінці було виконано хірургічне переривання вагітності у терміні 8 тижнів. Огляд у дзеркалах: шийка матки чиста, з зовнішнього вічка виділення з неприємним запахом. Вагінальне дослідження: матка в антєфлексію, рухлива, болюча, дещо збільшена. Додатки без особливостей. Поставте діагноз:

- a. Післяабортний ендометрит ✓
- b. Апендицит
- c. Сальпінгоофорит
- d. Ентероколіт
- e. Гостре респіраторне захворювання

Правильна відповідь: Післяабортний ендометрит

Питання 2

Неправильно

Балів 0 з 1

У вагітної жінки, яка скаржиться на переймоподібний біль унизу живота, спостерігаються кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Остання менструація була 2 місяці тому. Під час бімануального дослідження встановлено: матка болісна та збільшена до 5–6 тижнів вагітності, вагінальна частина шийки матки укорочена, розм'якшена, канал шийки матки розкритий, у цервікальному каналі розташовані елементи плідного яйця та згустки крові. Який патологічний стан розвинувся у жінки?

- a. Загрозливий аборт
- b. Повний мимовільний аборт
- c. Аборт у ходу
- d. Аборт, що невідбувся ✗
- e. Неповний мимовільний аборт

Правильна відповідь: Аборт у ходу

Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Тяжкопоранений солдат зі значною крововтратою вертольотом доставлений у госпіталь. В приймальному відділенні розпочато переливання крові. Одразу після початку переливання відзначили почервоніння обличчя, з'явився біль у поперековій ділянці, знизився артеріальний тиск, прискорився пульс, з'явилися нудота та запаморочення. Якими будуть першочергові дії в цьому випадку?

- a. Прискорити гемотрансфузію
- b. Ввести серцеві глікозиди
- c. Припинити переливання крові, вийти з вени
- d. Негайно замінити флакон з кров'ю на інший цієї ж групи
- e. Відключити систему з кров'ю та підключити з фізіологічним розчином

Правильна відповідь: Відключити систему з кров'ю та підключити з фізіологічним розчином

Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Народилась недоношена дитина, гестаційний вік 32 тижні, з вагою 1700 г, рівень глюкози крові становить 2,1 ммоль/л. У дитини відзначається порушення стану, судомна готовність. Виберіть першочергову допомогу для дитини:

- a. 0,9% розчин натрію хлориду, 10 мл/кг
- b. 10% розчин натрію хлориду, 4 мл/кг
- c. 10% розчин глюкози, 2 мл/кг
- d. 25% розчин MgSO₄, 1 мл/кг
- e. Фенобарбітал, 20 мг/кг

Правильна відповідь: 10% розчин глюкози, 2 мл/кг

Питання 5

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженого хлопчика чоловічої статі з 2-го тижня життя спостерігається невпинне блювання, кволість та явища зневоднення. При надходженні до стаціонару - виражені ознаки гіповолемічного шоку. У крові: калій - 6,5 ммоль/л, натрій - 120 ммоль/л, глукоза - 2,1 ммоль/л, ознаки ацидозу. Призначте додаткове обстеження, що дозволить виключити або підтвердити наявність у дитини вродженої гіперплазії кори надирників:

- a. Каріотипування та дерматогліфіка
- b. Визначення 17-гідроксіпрогестерону в крові та 17-кетостероїдів у сечі
- c. Визначення хоріонічного гонадотропіну крові
- d. Визначення гонадотропінів у крові та сечі
- e. Визначення кортизолу крові та тестостерону сечі

Правильна відповідь: Визначення 17-гідроксіпрогестерону в крові та 17-кетостероїдів у сечі

Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 20-ти років, який надійшов до інфекційного відділення на 3-й день захворювання, діагностовано дифтерію ротоглотки. На 5-й день стан погіршився: температура досягла 39,7оС, підсилився біль у горлі, поширився плівчастий наліт, поскаржився на прогресуючу слабкість, біль у епігастрії, повторне блювання. Блідий. Ціаноз губ. Частота дихання - 28/хв. Межі серця розширені. Ритм галупу. Артеріальний тиск - 70/50 мм рт.ст. Чим обумовлена тяжкість стану хворого?

- a. Кардіогенний шок
- b. Медіастиніт
- c. Гостра дихальна недостатність
- d. Токсичний міокардит
- e. Інфекційно-токсичний шок

Правильна відповідь: Токсичний міокардит

Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чотиримісячна дитина раптово втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: зіниці розширені, пульс на магістральних артеріях відсутній. Непрямий масаж серця виявився неефективним. Прийнято рішення про проведення електричної дефібриляції. Яка величина розряду дефібрилятора повинна використовуватися у цьому разі ?

- a. Перший розряд --- 2 Дж/кг, у разі неефективності --- 4 Дж/кг
- b. Перший розряд --- 4 Дж/кг, повторні --- 2 Дж/кг
- c. Перший розряд --- 3 Дж/кг, повторні --- 2 Дж/кг
- d. Перший розряд --- 4 Дж/кг, повторні --- 8 Дж/кг
- e. Перший розряд --- 3 Дж/кг, у разі неефективності повторити двічі

Правильна відповідь: Перший розряд --- 2 Дж/кг, у разі неефективності --- 4 Дж/кг

Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Визначте причину порушення функції нирок під час застосування норадреналіну.

- a. Ураження канальців
- b. Токсична дія на мозковий шар нирок
- c. Причина ураження нирок не зрозуміла
- d. Ураження кіркового шару нирок
- e. Спазм артерій і вен мозкового шару нирок

Правильна відповідь: Спазм артерій і вен мозкового шару нирок

Питання 9

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Рядовий надійшов у медичну роту через 1,5 години після поранення в живіт уламком снаряду. Об'єктивно: стан тяжкий, блідий, пульс - 132/хв., артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст. В ділянці правого підребер'я накладена пов'язка з ППІ, яка просякнута кров'ю. Живіт напружений. Перкуторно визначається тупість у відлогих місцях, що переміщується при зміні положення тіла. Визначаються симптоми подразнення очеревини. В якому функціональному підрозділі повинна бути надана допомога такому пораненому?

- a. В палаті інтенсивної терапії для нетранспортабельних поранених
- b. В перев'язочній для тяжкопоранених і поранених середньої тяжкості
- c. В сортувальній для тяжкопоранених і поранених середньої тяжкості
- d. В перев'язочній для легкопоранених
- e. В операційній

Правильна відповідь: В операційній

Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дитина народилася з такими показниками крові: Hb --- 100 г/л, еритроцити --- \$2,3\cdot 10^{12}/л, Ht --- 0,25. З анамнезу відомо, що у матері дитини під час пологів виникло передчасне відшарування нормально розташованої плаценти з крововтратою до 1,5 л. З лікувальною метою новонародженій дитині призначено гемотрансфузію. Який компонент крові потрібно використати у цій ситуації для зменшення ризику ускладнень?

- a. Свіжозаморожену плазму
- b. Кріопреципітат
- c. Цільну кров
- d. Концентрат протромбінового комплексу
- e. Відміті еритроцити

Правильна відповідь: Відміті еритроцити

Питання 11

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпілий 32-х років був водієм легкового автомобіля, що перевернувся і зайнявся. Спостерігалася короткочасна втрата свідомості. Об'єктивно: анізокорія. Тахіпне до 30/хв. Крепітація 6-10 ребер зліва по передній паховій лінії. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Деформація правого передпліччя в нижній третині за типом "багнета", гематома. Має місце опікова рана грудей, тулуба та стегон, площею 36% з наявністю великої кількості епідермальних пухирів що прорвалися. Який вид травми у хворого?

- a. Комбінована
- b. Монолокальна
- c. Поліфокальна
- d. Поєднана
- e. Множинна

Правильна відповідь: Комбінована

Питання 12

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При огляді кардіологом хворий 11-ти років, який страждає на вроджену ваду серця, раптово знепритомнів. Шкіра та слизові блідо-ціанотичні. Дихання агональне. Пульс на магістральних артеріях не визначається. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Колапс
- b. Зупинка серцевої діяльності
- c. Простий синкопальний стан
- d. Кома
- e. Запаморочення

Правильна відповідь: Зупинка серцевої діяльності

Питання 13

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнтка віком 19 років із ревматичною хворобою серця, комбінованою мітральною вадою серця під час складання іспитів втратила свідомість. Об'єктивно встановлено: свідомість відсутня, пульс на променевих і сонних артеріях не визначається, дихання поверхневе, шумне, АТ не визначається, тони серця не вислуховуються. Який метод діагностики буде найінформативнішим у цьому разі?

- a. Ехокардіографія
- b. Коронароангіографія
- c. Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини
- d. Рентгенографія органів грудної порожнини
- e. Електрокардіографія

Правильна відповідь: Електрокардіографія

Питання 14

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 40-ка років, інженер, має скарги на пароксизми гострого болю в лівій половині обличчя, тривалістю 1-2 хвилини. Частота нападів до 10 разів на добу. Провокуються напади болю вмиванням, вживанням їжі, розмовами, дотиком до лівої щоки ("куркова зона"). Хворобливість при пальпації супраорбітальної точки зліва. Сформулюйте клінічний діагноз:

- a. Невралгія трійчастого нерва
- b. Пухлина головного мозку
- c. Невралгія великого потиличного нерву
- d. Неврит лицевого нерву
- e. Лицева симпаталгія

Правильна відповідь: Невралгія трійчастого нерва

Питання 15

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 38-ми років скаржиться на виражену сонливість, набряки обличчя, мерзлякуватість, порушення пам'яті, головний біль, порушення менструального циклу, виражену загальну слабкість. Об'єктивно: зріст - 162 см, маса тіла - 87 кг Частота серцевих скорочень - 62/хв., артеріальний тиск - 115/70 мм рт.ст., при пальпації молочні залози м'якої консистенції, виділення незначної кількості молока. Поставте діагноз:

- a. Гіпоталамічний синдром
- b. Аденома гіпофіза
- c. Гіперпролактинемія
- d. Первинний гіпотиреоз, вторинна гіперпролактинемія
- e. Синдром "порожнього" турецького сідла

Правильна відповідь: Первинний гіпотиреоз, вторинна гіперпролактинемія

Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 25-ти років скаржиться на плаксивість, різкі зміни настрою, прискорене серцебиття, що пов'язує з втомою - місяць тому народила близнюків. З ранку відчула "зупинки" серцевої діяльності. При огляді з боку внутрішніх органів патології не встановлено. Артеріальний тиск - 130/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 115/хв., часті екстрасистоли, частота дихання - 17/хв. Щитоподібна залоза збільшена до другого ступеня, безболісна. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

- a. Гострий вірусний тиреоїдит, гіпертиреоз
- b. Гострий вірусний тиреоїдит, гіпотиреоз
- c. Післяпологовий тиреоїдит, гіпертиреоз
- d. Післяпологовий тиреоїдит, гіпотиреоз
- e. Підгострий вірусний тиреоїдит, гіпертиреоз

Правильна відповідь: Післяпологовий тиреоїдит, гіпертиреоз

Питання 17

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 43 роки на тлі загальної різкої слабкості з'явилися фібрілярні посмікування м'язів кінцівок із подальшим переходом у генералізовані тонічні судоми. З анамнезу відомо, що три місяці тому переніс субтотальну структомію. Під час огляду спостерігається: свідомість збережена, дихання адекватне, АТ --- 140/80 мм рт.ст. Симптом Трусссо позитивний. Визначте тактику лікаря у цьому разі.

- a. Увести калію хлорид 50 мл внутрішньовенно
- b. Забезпечити адекватну оксигенацию
- c. Уводити кальцію хлорид 10% внутрішньовенно до припинення тетанії
- d. Увести діазепам 10 мг внутрішньом'язово
- e. Увести фуросемід 40 мг внутрішньовенно

Правильна відповідь: Уводити кальцію хлорид 10% внутрішньовенно до припинення тетанії

Питання 18

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 33-х років після введення анальгіну з'явилась слабкість, шум у вухах, почуття страху, серцебиття. На шкірі обличчя - уртикарні висипання. Шкіра вкрита холодним, липким потом. Артеріальний тиск - 50/20 мм рт.ст. Пульс слабкий, ниткоподібний, його не можливо підрахувати. Через 15 хвилин з'явилися здуття живота, тиск у епігастральній області, нудота, блювання. Який найбільш імовірний діагноз у даного хворого?

- a. Гострий панкреатит
- b. Анафілактичний шок
- c. Геморагічний шок
- d. Прободна виразка шлунка
- e. Гостра кишкова непрохідність

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

Питання 19

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При проведенні реанімаційних заходів дитині 5-ти років із зупинкою кровообігу у позалікарняних умовах було інтубовано трахею, але венозний доступ відсутній. Який лікувальний засіб може бути введено ендотрахеально?

- a. Адреналін
- b. Трікамін
- c. Бретиліум
- d. Гідрокарбонат натрію
- e. Хлорид кальцію

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 20

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальне відділення батько доставив дитину 2-х років у термінальному стані. З його слів з'ясувалося, що на тлі повного здоров'я дитина почала кашляти, задихатися. При огляді: шкіра ціанотична, м'язова гіпотенія, тони серця не прослуховуються. Що з перерахованого нижче є невідкладною та першочерговою дією?

- a. Вентиляція 100% кисню за допомогою мішка Амбу
- b. Очищення дихальних шляхів та забезпечення їх прохідності
- c. Введення адреналіну 0,1% 0,01 мг/кг
- d. Штучна вентиляція "рот в рот"
- e. В/в введення 4% розчину NaHCO₃

Правильна відповідь: Очищення дихальних шляхів та забезпечення їх прохідності

Питання 21

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіку віком 30 років, який отримав ураження електричним струмом, проводився комплекс реанімаційних заходів, у результаті чого було відновлено і стабілізовано центральну гемодинаміку і ефективне самостійне дихання, але свідомість не відновилася. Який метод протиішемічного захисту головного мозку найефективніший у цьому разі?

- a. Уведення тіопенталу натрію внутрішньовено
- b. Уведення діазепаму внутрішньовенно
- c. Гіпервентиляція за допомогою апарату ШВЛ
- d. Уведення оксибутирату натрію внутрішньовенно
- e. Краніоцеребральна гіпотермія

Правильна відповідь: Краніоцеребральна гіпотермія

Питання 22

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 46 років, після емоційного навантаження, раптово відчула сильний біль за грудиною та втратила свідомість. Об'єктивно встановлено: тони сердця відсутні, апноє, АТ та пульс не визначається. На ЕКГ спостерігається: хвилі різної висоти та ширини, неоднакової форми. Який із наведених нижче заходів буде найбільш ефективним у цьому разі?

- a. Адреналін в/с
- b. Електрична дефібриляція
- c. Страфантин в/с
- d. Атропін в/с
- e. Дігоксін в/с

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

Питання 23

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У медичну роту 14-ї механізованої бригади з району ведення бойових дій аеропорту Донецьк надійшло 12 поранених. Сортуючою бригада виконує медичне сортування поранених. Яким принципом повинен керуватися медичний персонал під час проведення медичного сортування?

- a. Розподілом поранених та хворих на групи для направлення їх у функціональні підрозділи
- b. Єдиною класифікацією хвороб і травм та єдиними вимогами до методики сортування
- c. Визначенням характеру поранення, встановленням черговості надання медичної допомоги
- d. Встановленням черговості надання медичної допомоги
- e. Розподілом поранених та хворих на групи згідно з евакуаційним призначенням

Правильна відповідь: Єдиною класифікацією хвороб і травм та єдиними вимогами до методики сортування

Питання 24

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого на 5-й день хвороби спостерігаються гіперемія та набряк мигдаликів, щільні білі плівчасті нашарування, які не знімаються, набряк підшкірної клітковини шиї, загальний ціаноз шкіри, температура тіла – 38,8°C, задишка до 50/хв., шумне дихання, афонія, тахікардія – 140/хв., пульс не визначається, свідомість на рівні сопору. Який лікувальний захід показаний у першу чергу?

- a. Штучне дихання рот-до-рота
- b. Введення серцевих глікозидів
- c. Парові лужні інгаляції
- d. Непрямий масаж серця
- e. Трахеостомія

Правильна відповідь: Трахеостомія

Питання 25

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 42 роки госпіталізований до лікарні з діагнозом: гостре отруєння етиленгліколем. Який антидотний препарат треба призначити пацієнту?

- a. Мекаптид 40\%-й --- 2,0 в/м'язово
- b. Бензилпеніциліну натрієва сіль 250 мг/кг/добу
- c. Унітіол 5\%-й --- 5--150 мг/кг/добу
- d. Налоксон гідрохлорид у дозі 0,8--2,0 мг внутрішньовенно
- e. Фомепізол у дозі 15 мг/кг

Правильна відповідь: Фомепізол у дозі 15 мг/кг

Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До приймального відділення госпіталізована чотирирічна дитина із температурою тіла 38,8\$^oC та проявами ГРВІ. Який лікарський засіб треба застосувати насамперед для зменшення гіпертермії у дитини?

- a. Мефенамінову кислоту
- b. Парацетамол
- c. Діазепам
- d. Димедрол
- e. Німесулід

Правильна відповідь: Парацетамол

Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У повторновагітної 28-ми років, з прееклампсією середнього ступеня важкості, при вагітності 32 тижні, з'явилася жовтяниця та ознаки загальної інтоксикації. Лабораторно: гіпокоагуляція – тромбоцити – 80·109/л, ПДФ++, загальний білірубін – 90 ммол/л (прямий – 25 ммол/л, непрямий – 65 ммол/л), АлАТ- 3,5 ммол/л·кг·год, АсАТ- 2,6 ммол/л·кг·год. Яке ускладнення виникло у вагітності?

- a. Гостра жирова дистрофія печінки
- b. Вірусний гепатит
- c. HELLP-синдром
- d. Синдром Жильбера
- e. Синдром Бадда-Кіарі

Правильна відповідь: HELLP-синдром

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 52-х років з наявним трансфузіологічним анамнезом одразу після початку внутрішньовенного введення свіжозамороженої плазми винikли непродуктивний кашель, бронхоспазм, задуха, нудота, біль у животі, гіпотонія, після чого наступила втрата свідомості. Які найбільш правильні лікувальні заходи?

- a. Негайна зупинка інфузії, інтубація трахеї, штучна вентиляція легень (ШВЛ)
- b. Джгут вище місця введення, обколювання розчином адреналіну, гідрокortизон в/в
- c. Негайна зупинка інфузії, в/в введення адреналіну, преднізолону, еуфіліну, інгаляція кисню
- d. Продовження інфузії, введення адреностимуляторів, глюкокортикостероїдів
- e. В/в введення еуфіліну, гідрокortизону, інфузійна терапія, інгаляція кисню

Правильна відповідь: Негайна зупинка інфузії, в/в введення адреналіну, преднізолону, еуфіліну, інгаляція кисню

Питання 29

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 55 років спостерігалися порушення мови та оніміння правої руки, що тривали протягом години. Лікар діагностував гостре порушення мозкового кровообігу. Який критерій буде головним для диференційної діагностики транзиторного і органічного порушення мозкового кровообігу у пацієнта?

- a. Ступінь вираженості вогнищової симптоматики
- b. Наявність або відсутність крові у лікворі
- c. Ступінь вираженості загальномозкової симптоматики
- d. Наявність або відсутність <> світлого проміжку>>;
- e. Тривалість вогнищової симптоматики не більше, ніж одну добу

Правильна відповідь: Тривалість вогнищової симптоматики не більше, ніж одну добу

Питання 30

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У потерпілого під час медичного сортування встановлено частоту дихання - 6/хв., свідомість за шкалою ком Глазго - 8 балів, пульс на периферійних судинах не пальпується. До якої сортувальної групи належить потерпілий?

- a. "Фіолетової"
- b. "Зеленої"
- c. "Червоної"
- d. "Жовтої"
- e. "Чорної"

Правильна відповідь: "Червоної"

Питання 31

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка з діагнозом: перелом кісток таза, стегнової та великомілкової кісток, на другу добу травматичної хвороби виникла немотивована задишка, порушення свідомості, петехіальні висипання на кон'юнктиві та шкірі шиї і грудної клітки. Об'єктивно спостерігається: температура тіла --- 39\$^{\circ}\text{C}\$, ЧСС --- 120/хв. На оглядовій рентгенограмі легень спостерігаються білатеральні інфільтрати. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Жирова емболія
- b. Сепсис
- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Нозокоміальна пневмонія
- e. Кардіогенний набряк легень

Правильна відповідь: Жирова емболія

Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 65-ти років, який 8 років страждає на ІХС, раптово виник пекучий біль за грудиною, що іrrадіює у ліву лопатку, плече, передпліччя. АТ- 140/90 мм рт.ст. Пульс - 80/хв. На ЕКГ: реєструються негативні зубці T та депресія сегменту S-T у відведеннях II, III, V5-V6, співвідношення зубця Q до зубця R в цих відведеннях 1:5. Який діагноз найбільш імовірний у цьому випадку?

- a. Міжреберна невралгія
- b. ТЕЛА
- c. Інфаркт міокарду без елевації сегмента ST
- d. Інфаркт міокарду з елевацією сегмента ST
- e. Міокардит

Правильна відповідь: Інфаркт міокарду без елевації сегмента ST

Питання 33

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 24-х років через 2 тижні після пологів з'явився біль у лівій нижній кінцівці. Ліве стегно і гомілка різко збільшилися в об'ємі за рахунок набряку. Спостерігається синюшність шкірних покривів. Пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Ілеофеморальний тромбоз
- b. Облітеруючий ендarterіїт
- c. Гострий артеріальний тромбоз
- d. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен
- e. Попереково-крижовий радикуліт

Правильна відповідь: Ілеофеморальний тромбоз

Питання 34

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 30-ти років скаржиться на головний біль, марення. Об'єктивно: температура тіла - 39оС, збуджена, обличчя гіперемоване, позитивний симптом Говорова-Годельє, петехіальний висип на тулубі, кінківках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., гепатосplenомегалія. Вживає алкоголь, ін'єкційні наркотики, живе в приміщенні підвального типу. Поставте попередній діагноз:

- a. ВІЛ-інфекція
- b. Лептоспіroz
- c. Грип
- d. Алкогольний психоз
- e. Висипний тиф

Правильна відповідь: Висипний тиф

Питання 35

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 28 років скаржиться на біль у животі, який супроводжується блюванням "кавовою гущею", лихоманкою, дрібними висипаннями на ногах, болем у суглобах. Об'єктивно встановлено: петехії різної інтенсивності на кінцівках, живіт м'який, здутий, болючий вздовж кишківника. Гомілкові суглоби припухлі, гарячі на дотик; в загальному аналізі крові лейкоцити --- \$11,2\cdot10^9\$/л, тромбоцити --- \$258\cdot10^9\$/л, ЦІК --- 249 ОД. Який імовірний діагноз?

- a. Тромбоцитопенічна пурпурा
- b. Геморагічний васкуліт
- c. Неспецифічний виразковий коліт
- d. Портальна гіпертензія
- e. Виразкова хвороба шлунка

Правильна відповідь: Геморагічний васкуліт

Питання 36

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Населення, яке одержало радіаційне ураження внаслідок бойових дій іонізуючим випромінюванням в районі ядерного вибуху та в зонах радіаційного зараження, відносять до:

- a. Масових втрат
- b. Бойових втрат
- c. -
- d. Санітарних втрат
- e. Радіаційних втрат

Правильна відповідь: Радіаційних втрат

Питання 37

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дівчину віком 20 років, через 3 дні після згвалтування, шпиталізовано до психіатричного відділення. Під час клініко-психопатологічного обстеження у психічному статусі пацієнтки спостерігаються пригнічений настрій та підвищена тривога. Вона уникає спогадів та нездатна відтворити в пам'яті основні, важливі елементи травматичної ситуації. Скаржиться на труднощі із засинанням, нічні кошмири, пов'язані з психотравматичною подією, що постійно повторюються, неможливість сконцентрувати увагу, втрату колишніх інтересів і захоплень. Яке порушення психічного стану розвинулося в пацієнтки?

- a. Змішаний тривожний і депресивний розлад
- b. Неврастенія
- c. Панічний розлад
- d. Дисоціативна амнезія
- e. Посттравматичний стресовий розлад

Правильна відповідь: Посттравматичний стресовий розлад

Питання 38

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Лікарем на полі бою оглядається хворий 22-х років, що скаржиться на різкий біль в лівій нижній кінцівці. В нижній третині внутрішньої поверхні лівого стегна відзначається рвана рана $3,5 \times 4,5$ см з активною артеріальною кровотечею. Які заходи домедичної допомоги необхідно провести?

- a. Обробити рану перекисом водню
- b. Ввести гемостатичні препарати
- c. Накласти джгут на ліву нижню кінцівку
- d. Виконати пальцеве притискання судини, що кровоточить
- e. Виконати туге бинтування рани

Правильна відповідь: Накласти джгут на ліву нижню кінцівку

Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки, яка хворіє на хронічний вірусний гепатит С, раптово розвинулися сонливість, спутаність свідомості, носова кровотеча. На шкірі з'явилися геморагічні висипання та відчувається солодкуватий запах з рота. Яке ускладнення найімовірніше виникло у пацієнтки?

- a. Кетоацидоз
- b. Гостра ниркова недостатність
- c. Жовчнокам'яна хвороба
- d. Гіперглікемічний стан
- e. Гостра печінкова недостатність

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженого у перші дні життя з'явилася прогресивна дихальна недостатність, задишка, напади ціанозу доходять до задишково-ціанотичного кризу, тахікардія. Органи середостіння зміщені в правий бік, перкуторно зліва тимпаніт, аускультивно дихання відсутнє. На рентгенограмі: посилення прозорості легеневого малюнка зліва. Яка вада розвитку у новонародженого?

- a. Аплазія легені
- b. Лівостороння діафрагмова грижа
- c. Напружене кіста лівої легені
- d. Напруженій пневмоторакс
- e. Вроджена лівостороння часткова емфізема легень

Правильна відповідь: Вроджена лівостороння часткова емфізема легень

Питання 41

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 10-ти років доставлена в лікарню в непрітомному стані. Часте, поверхневе дихання. Виражена неврологічна симптоматика: гіпертонус м'язів, ністагм, позитивні менінгеальні ознаки. Шкірна складка розгладжується більше 2 секунд. Глюкоза крові - 45 ммоль/л, рівень кетонових тіл в крові в нормі; кетонурії немає; осмолярність крові - 390 мосм/л. Який найбільш імовірний стан?

- a. Гіперосмолярна кома
- b. Гіпотиреоїдна кома
- c. Кетоацидотична кома
- d. Лактатацидотична кома
- e. Гіпоглікемічна кома

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

Питання 42

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У підлітка 15-ти років під час забору крові спостерігалася раптова короткочасна втрата свідомості зі спонтанним відновленням стану. Під час огляду помірна блідість шкірних покривів, виражений гіпергідроз кінцівок, частота дихання - 20/хв., тони серця звучні, ритмічні, частота серцевих скорочень - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Який невідкладний стан розвинувся у дитини?

- a. Психогенна атака
- b. Синкопе
- c. Гіпоглікемічний стан
- d. Повна AV-блокада
- e. Епілептичний напад

Правильна відповідь: Синкопе

Питання 43

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 27 років потрапив у ДТП. У нижній третині лівої гомілки виявляється деформація, патологічна рухливість кісткових сегментів, рана 5x3 см з якої непульсуючим струменем витікає темна кров. Який оптимальний метод зупинки кровотечі у пацієнта?

- a. Стискальна асептична пов'язка
- b. Накладення джгута вище рані
- c. Накладення джгута нижче рані
- d. Пальцеве перетискання в пахвинній ділянці
- e. Асептична пов'язка

Правильна відповідь: Стискальна асептична пов'язка

Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної в 34 тижні під час доплерографічного ультразвукового обстеження виявили стійкий реверсивний діастолічний кровоплин у судинах плода й провели кесарів розтин. У новонародженого відсутні дихання і м'язовий тонус. Вентиляція мішком і маскою не забезпечує адекватні рухи грудної клітки і, після наступних 20 секунд вентиляції, частота серцевих скорочень не збільшується. Який наступний етап реанімації?

- a. Введення атропіну
- b. Припинити надавати допомогу
- c. Введення натрію бікарбонату
- d. Введення адреналіну
- e. Інтубація трахеї немовляти

Правильна відповідь: Інтубація трахеї немовляти

Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 56-ти років госпіталізований з приводу гострої затримки сечі. 15 років хворіє на хронічний простатит. При пальцевому ректальному дослідженні простата розмірами 2х2 см, симетрична, щільна, неболюча, дно сечового міхура - на 5 см вище лобкової кістки. При УЗД: сечовий міхур переповнений, залишкова сеча - 450 мл, простата розмірами - 23x24 мм, з кальцинатами. Концентрація загального PSA - 2 нг/мл, креатиніну - 320 мкмоль/л. Визначте найбільш імовірний діагноз:

- a. Цистоцеле
- b. Склероз простати, постренальна гостра ниркова недостатність
- c. Нейрогенний сечовий міхур
- d. Рак простати
- e. Доброкісна гіперплазія простати

Правильна відповідь: Склероз простати, постренальна гостра ниркова недостатність

Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Солдат перебуває у військовому польовому пересувному госпіталі з кульовим пораненням середньої третини правого стегна. Стан важкий, шкіра бліда, температура тіла - 37,8°C, пульс - 106/хв., артеріальний тиск - 90/70 мм рт.ст. Останні 3 дні турбує кашель з харкотинням. При аускультації у нижній частці лівої легені вологі хрипи. З чим пов'язане погіршення стану?

- a. Набряк легень
- b. Плеврит
- c. Пневмоторакс
- d. Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ)
- e. Приєднання пневмонії

Правильна відповідь: Приєднання пневмонії

Питання 47

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Яке трансфузійне середовище має оптимальний гемостатичний ефект у разі лікування гіпокоагуляційних кровотеч?

- a. Нативна плазма
- b. Еритроцитарна маса
- c. Фібриноген
- d. Свіжозаморожена плазма
- e. Кріопреципітат

Правильна відповідь: Свіжозаморожена плазма

Питання 48

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 32 роки, який госпіталізований до лікарні з діагнозом: лептоспіроз, розвинувся септичний шок. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкіри і слизових, центральний венозний тиск --- 20 мм вод. ст., артеріальний тиск --- 80/40 мм рт. ст. Які лікарські засоби з наведених нижче треба додати до інтенсивної терапії?

- a. Симпатоміметики
- b. Вазодилататори
- c. Аналгетики
- d. Діуретики
- e. Гепарин

Правильна відповідь: Симпатоміметики

Питання 49

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Бригадою екстренної (швидкої) медичної допомоги до приймального відділення доставлено семирічну дитину без свідомості. З анамнезу відомо, що після перенесеного грипу спостерігалися спрага, підвищення апетиту, часте сечовипускання. Напередодні з'явилися блювання, запах ацетону з рота, біль у животі. Під час огляду зіниці звужені, слабка реакція їх на світло, шкірні покриви бліді, холодні на дотик, дихання шумне, тахікардія, тахіпnoe. Яке дослідження треба провести насамперед для уточнення діагнозу?

- a. УЗД ОЧП
- b. Спинномозкову пункцію
- c. Глюкозуричний профіль
- d. Загальний аналіз сечі
- e. Визначення рівня глюкози і кетонових тіл у крові

Правильна відповідь: Визначення рівня глюкози і кетонових тіл у крові

Питання 50

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При огляді дівчинки 9-місячного віку лікар виявив: різке збудження дитини, температура тіла - 38,5°C, голова закинута назад, несиметричний поодинокий геморагічний висип на нижніх кінцівках. До яких першочергових заходів на догоспітальному етапі слід вдатись?

- a. Провести катетеризацію центральної вени
- b. Ввести внутрішньовенно преднізолон та левоміцетин
- c. Ввести внутрішньовенно дексаметазон
- d. Катетеризувати центральну вену, ввести тетрациклін
- e. Провести катетеризацію центральної та периферичної вен

Правильна відповідь: Ввести внутрішньовенно преднізолон та левоміцетин

Питання 51

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого, який лікується у стаціонарі з приводу апендикулярного інфільтрату, на 5 добу посилився біль у правій здухвинній ділянці, з'явилася гарячка до 39оС з ознобом. Яка найбільш імовірна причина такого стану?

- a. Флегмона передньої черевної стінки
- b. Гостра кишкова непрохідність
- c. Флегмона заочеревинного простору
- d. Дифузний перитоніт
- e. Апендикулярний абсцес

Правильна відповідь: Апендикулярний абсцес

Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Моряк, який повернувся із закордонного плавання, скаржиться на високу температуру тіла до 40\$^o\$C та кашель із пінистою іржавою мокротою. Об'єктивно встановлено: блідий, ціаноз слизових, ЧД --- 30/хв, тахікардія, дихання в легенях ослаблене, поодинокі вологі хрипи, крепітація. Попередній діагноз: чума, первинно-легенева форма. Який лікарський засіб треба призначити пацієнту?

- a. Цефтілаксон
- b. Пеніцилін
- c. Стрептоміцин
- d. Людський імуноглобулін
- e. Інфліксимаб

Правильна відповідь: Стрептоміцин

Питання 53

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 30-ти років після тряскової їзди з'явився інтенсивний нападоподібний біль у поперековій ділянці, що іррадіює в пахову ділянку, часті позиви до сечовипускання, кров у сечі. Об'єктивно: артеріальний тиск - 145/85 мм рт.ст., позитивний симптом Пастернацького ліворуч. Аналіз сечі: білок - 0,066 г/л, L- 4-5 в п/зору, еритроцити - все поле зору, оксалати. Ваш попередній діагноз:

- a. Позаматкова вагітність
- b. Кіста яєчника
- c. Гострий цистит
- d. Ниркова колька
- e. Гострий піелонефрит

Правильна відповідь: Ниркова колька

Питання 54

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка, який перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу гострого інфаркту міокарда і отримує гепарин у дозі 5000 Од підшкірно 4 рази на добу, з'явилися різка слабість, блідість, випорожнення чорного кольору. Гемоглобін --- 96 г/л. Що треба застосувати для нейтралізації дії гепарину?

- a. Амінокапронову кислоту
- b. Апротинін
- c. Кальцію хлорид
- d. Протаміну сульфат
- e. Свіжозаморожену плазму

Правильна відповідь: Протаміну сульфат

Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 37-ми років з тяжким вірусним гепатитом В, яка перебуває в інфекційному відділенні, з'явилися сплутаність свідомості, печінковий запах з рота, посилилася жовтяниця, блювання "кавовою гущею", носова і маткова кровотеча, крововиливи в місцях ін'екцій. Артеріальний тиск - 95/60 мм рт.ст., загальний білорубін - 289 мкмоль/л, прямий - 100 мкмоль/л, загальний білок - 45 г/л, протромбіновий індекс - 64%. Яка основна причина геморагічного синдрому, який розвинувся у пацієнтки?

- a. Пошкодження судин вірусом гепатиту В
- b. Зниження синтетичної функції печінки
- c. Зниження дезінтоксикаційної функції печінки
- d. Розвиток універсального капіляротоксикозу
- e. Портальна гіпертензія

Правильна відповідь: Зниження синтетичної функції печінки

Питання 56

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 32-х років з'явилися загальна слабкість, пітливість, відчуття печіння та м'язові посмікування в правій стопі, яка була травмована за три дні до цього під час прогулянки в лісі. При надходженні до стаціонару температура тіла - 37,1°C, куточки рота відтягнуті дотори, очні щілини звужені, дрібні зморшки в куточках очей та на лобі. Права стопа набрякла, гіперемована, на підошві колота рана. Тонус м'язів рук і ніг, за винятком кистей і стоп, тулуба значно підвищений. Під час огляду з'явилися генералізовані судоми. Яку невідкладну допомогу потрібно надати хворому?

- a. Первина хірургічна обробка та введення спазмолітиків
- b. Застосування хлоралгідрату, нейролептаналгезія та введення лікувальної сироватки
- c. Введення лікувальної сироватки та первина хірургічна обробка рани
- d. Застосування міорелаксантів та переведення на штучну вентиляцію легень (ШВЛ)
- e. Введення пеніциліну

Правильна відповідь: Застосування хлоралгідрату, нейролептаналгезія та введення лікувальної сироватки

Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На фармацевтичному підприємстві сталась пожежа. Декілька працівників виявились заблокованими без можливості самостійної евакуації. Засоби індивідуального захисту на випадок пожежі також виявились недоступними. Коли рятувальники евакуювали їх до безпечного місця потерпілі мали наступні симптоми: запаморочення, порушення зору, нудота, часте дихання, задишка, вишневий колір обличчя. Який вид гіпоксії розвивається при таких умовах?

- a. Токсична
- b. Гіпоксична
- c. Циркуляторна
- d. Гемічна
- e. Тканинна

Правильна відповідь: Гемічна

Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 37 років 10 днів тому отримав тупу травму лівого стегна. Одразу ж виникли набряк та біль у ділянці травми. За 7 днів біль значно посилився, підвищилася температура тіла, з'явилися слабкість та нудота. Об'єктивно спостерігається: температура тіла --- 39\$^\circ\text{C}\$, ЧД --- 28/хв, ЧСС --- 110/хв, набряк, гіперемія та різкий біль під час пальпації у ділянці лівого стегна, сукровичні виділення. У загальному аналізі крові виявлено лейкоцитоз зі зсувом лейкоцитарної формулі вліво. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Тромбофлебіт підшкірних вен лівого стегна
- b. Нагноєння гематоми лівого стегна
- c. Флегмона лівого стегна
- d. Лімфангойт лівого стегна
- e. Бешихове запалення лівого стегна

Правильна відповідь: Нагноєння гематоми лівого стегна

Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 30-ти років швидкою допомогою доставлена у непрітомному стані з місця автоаварії. Об'єктивно: свідомість відсутня, на більові подразники або спонтанно з'являється тонічне напруження м'язів з випростуванням рук і ніг та закиданням голови назад, двосторонні стопні патологічні рефлекси. Дихання Чейн-Стокса, пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., температура - 37,9°C. Назвіть найбільш імовірний діагноз:

- a. Гостре порушення мозкового кровообігу
- b. Аневризма судин головного мозку
- c. Менінгіт
- d. Забій головного мозку важкого ступеня
- e. Внутрішньочерепна гематома

Правильна відповідь: Забій головного мозку важкого ступеня

Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Семирічний хлопчик травмував око, шматочок скла проник у праве оче яблуко. За 3 години після травмування скло видалили. Проводилося закапування ока атропіном. Повторно робилися ін'екції атропіну. За добу хлопчик став неспокійним, в афекті страху і тривоги то ховався, то відганяв щось від себе. Перестав упізнавати матір та не розумів, що перебуває у лікарні. Спостерігається мідріаз, сухість у роті, тахікардія. Яке лікування треба призначити дитині?

- a. Аміназин
- b. Снодійне
- c. Прозерин
- d. Дезінтоксикаційне
- e. Галоперідол

Правильна відповідь: Прозерин

Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Солдат в результаті вибуху отримав поранення правої руки. При огляді були виявлені уламкові поранення правого передпліччя, відрив II та III пальців, зовнішня кровотеча. Евакуація і допомога надається:

- a. Стоячи, в першу чергу
- b. В лежачому положенні, в другу чергу
- c. В сидячому положенні, в першу чергу
- d. В сидячому положенні, в другу чергу
- e. В лежачому положенні, в першу чергу

Правильна відповідь: В сидячому положенні, в другу чергу

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У доношеної здорової дитини через 8 годин після пологів з'явилаася субкітеричність шкірних покривів. Дитина від третьої вагітності, других термінових пологів. Перша вагітність закінчилася абортом. Група крові матері II(A), резус "-", дитини A (II), резус "+". Пуповинний білірубін - 56 мкмоль/л. Через 4 годин - 84 мкмоль/л. Дитина на грудному вигодовуванні. Який імовірний Ваш діагноз?

- a. Фізіологічна жовтяниця
- b. Гемолітична хвороба новонародженого
- c. Жовтяниця, пов'язана з грудним молоком
- d. Атрезія жовчних протоків
- e. Гепатит

Правильна відповідь: Гемолітична хвороба новонародженого

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Який лікарський засіб треба використати для надання невідкладної допомоги шестирічному хлопчику із гострою кровотратою до 20% ОЦК?

- a. Цільну кров
- b. Неогемодез
- c. Свіжозаморожену плазму
- d. Розчин глюкози
- e. 0,9% розчин хлориду натрію

Правильна відповідь: 0,9% розчин хлориду натрію

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пораненому, який надійшов до медичної роти бригади встановлено попередній діагноз: кульове поранення черевної порожнини, стан середнього ступеня тяжкості та рекомендована евакуація на наступний етап. Який документ у цьому випадку необхідно заповнити на пораненого?

- a. Сортувальну марку
- b. Медичну книжку
- c. Первинну медичну карту
- d. Евакуаційний конверт
- e. Історію хвороби

Правильна відповідь: Первинну медичну карту

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 69-ти років скончалася за груди і раптово впала. Свідомість, дихання та серцева діяльність відсутні. Який імовірний діагноз?

- a. Кардіологічний шок
- b. Раптова коронарна смерть
- c. Гіпертонічний криз
- d. Колапс
- e. Набряк легень

Правильна відповідь: Раптова коронарна смерть

Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У роділлі 18-ти років з крупним плодом через 12 годин від початку пологової діяльності виникли ознаки клінічно вузького тазу, у зв'язку з чим прийнято рішення про розрідження шляхом кесаревого розтину. При укладанні жінки на операційний стіл у положенні лежачи на спині раптovo стан її погіршився: з'явилися скарги на задишку, нудоту, шкіра стала блідою з мармуровим малюнком. Артеріальний тиск – 70/50 мм рт.ст. При повертанні жінки на лівий бік стан її покращився. Ваш діагноз:

- a. Емболія навколоплідними водами
- b. Синдром нижньої порожнистої вени
- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Передчасне відшарування плаценти
- e. Розрив матки

Правильна відповідь: Синдром нижньої порожнистої вени

Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінці віком 22 роки для знеболення введено внутрішньом'язево 2 мл 50%-го розчину анальгіну (метамізолу). Після цього на лівій половині обличчя, навколо рота, на губах, слизовій оболонці ротової порожнини з'явився набряк (твердий, не утворює ямок під час натискування). Через декілька годин стан погіршився: з'явилася охриплість голосу та <<гавкаючий>> кашель. Об'ективно встановлено: частота дихання --- 20/хв; частота серцевих скорочень --- 92/хв; АТ --- 100/70 мм рт.ст; температура тіла --- 37.1\$^o\$C. Які з нижченаведених препаратів треба увести пацієнтці?

- a. Кортикостероїди
- b. Нестероїдні протизапальні
- c. Свіжозаморожену плазму
- d. Серцеві глікозиди
- e. Норадреналін

Правильна відповідь: Кортикостероїди

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнт віком 50 років із гіпертензивною кризою під час транспортування до стаціонару спеціалізованою кардіологічною бригадою раптово втратив свідомість. На кардіомоніторі спостерігається великохвильова фібриляція шлуночків. Що повинен зробити лікар насамперед?

- a. Виконати дефібриляцію
- b. Виконати пряний масаж серця
- c. Провести інтубацію трахеї та штучну вентиляцію легень
- d. Установити тимчасовий кардіостимулатор
- e. Увести внутрішньосерцево адреналін

Правильна відповідь: Виконати дефібриляцію

Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дворічного хлопчика, який хворіє на тетраду Фалло, раптово збільшилася інтенсивність ціанозу, з'явилася задишка, він присів навпочіпки. Що з наведеного нижче має призначити лікар у цьому разі?

- a. Сечогінні
- b. Серцеві глікозиди
- c. Антибіотики
- d. Оксигенотерапію
- e. Бронхолітики

Правильна відповідь: Оксигенотерапію

Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час гасіння пожежі на військовому складі у військовослужбовців виникла клінічна картина отруєння монооксидом вуглецю середнього ступеня тяжкості. Який показник необхідно дослідити для підтвердження діагнозу?

- a. Карбоксигемоглобін
- b. ЯМР-томограму мозку
- c. Псевдохолінестеразу
- d. Електрокардіограму
- e. Трансамінази сироватки крові

Правильна відповідь: Карбоксигемоглобін

Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 68 років госпіталізований за 2 години після появи раптового стискаючого болю за грудиною. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, акроціаноз, пульс ниткоподібний, 130/хв, АТ --- 70/50 мм рт. ст., діяльність серця ритмічна, тони приглушені, частота дихання - 30/хв, у нижніх відділах легень прослуховуються вологі хріпи. На ЕКГ у відведеннях V1-V4 комплекс QRS типу QS, сегмент ST вище ізолінії, негативний зубець Т. Які лікарські засоби необхідно призначити пацієнту насамперед?

- a. Серцеві глікозиди
- b. Інгібтори ангіотензинперетворюального ферменту
- c. Тромболітики
- d. Діуретики
- e. Реополіглюкін

Правильна відповідь: Тромболітики

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час роботи в шахті чоловік 37-ми років пошкодив кабель високої напруги, та був уражений струмом. Об'єктивно: стан вкрай тяжкий, дихання - 9/хв., частота серцевих скорочень - 56/хв. Яких лікувальних заходів треба негайно вжити?

- a. Введення атропіну сульфату
- b. Введення дихальних аналептиків
- c. Штучна вентиляція легенів
- d. Електродефібриляція
- e. Введення адреналіну гідрохлориду

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легенів

Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальне відділення доставлений потерпілий з опіком полум'ям III Б-IV ст. обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Волосся у ніздрях обгоріло, слизова губ, язик сіро-білого кольору. Голос хрипливий, дихання часте, поверхневе; "трубний кашель", що супроводжується виділенням харкотиння з домішками кіптяви. Під час транспортування у відділення інтенсивної терапії почали нарости явища дихальної недостатності. Який необхідний об'єм допомоги?

- a. Інгаляція зволоженого кисню
- b. Введення муколітиків
- c. Введення дихальних аналептиків
- d. Інгаляції β_2 -агоністів короткої дії
- e. Інтубація трахеї та ШВЛ

Правильна відповідь: Інтубація трахеї та ШВЛ

Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої в післяпологовому періоді в пологовому будинку гостро виникло різке зниження настрою. Відзначається швидке, катастрофічне нарощання почуттів нестерпної туги, безвиході, відчаю. Пацієнта рухливо збуджена, не знаходить собі місця, кричить, стогне, ридає, наполегливо завдає собі ушкодження, активно проявляє суїциdalні тенденції. Який імовірний діагноз і необхідні рекомендації?

- a. Епілептичні сутінки. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-невролога
- b. Травматичний делірій. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-нейрохірурга
- c. Тяжкий депресивний епізод. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-психіатра
- d. Аментивний тип порушення свідомості. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-терапевта
- e. Гострий напад шизофренії. Рекомендується переведення до психіатричного стаціонару

Правильна відповідь: Тяжкий депресивний епізод. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-психіатра

Питання 75

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 1,5 років із септичним шоком виникла кровотеча з місць ін'єкцій, по шлунковому зонду надходить "кавова гуща". При визначені показників гемостазу збільшено МНС, АЧТЧ, рівень D-димеру, знижений фібриноген, тромбоцити - 30 · 109/л. Яку патологію запідозрив лікар-куратор?

- a. Хвороба Віллебранда
- b. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпуря
- c. Тромботична тромбоцитопенічна пурпуря
- d. Синдром ДВЗ
- e. Дефіцит вітаміну _K_

Правильна відповідь: Синдром ДВЗ

Питання 76

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Доношена дитина, народжена природнім шляхом одразу після народження мала нерегулярне дихання та знижений м'язовий тонус. Після надання початкової реанімаційної допомоги --- дитина голосно кричить, дихання --- 40/хв, м'язовий тонус задовільний, ЧСС --- 140/хв. Яку подальшу тактику треба вибрати лікарю?

- a. Викласти дитину на живіт матері
- b. Дати 100%-й кисень вільним потоком
- c. Почати ШВЛ мішком та маскою атмосферним повітрям
- d. Почати ШВЛ мішком та маскою 100%-м киснем
- e. Повторити санацію ВДШ гумовою грушою

Правильна відповідь: Викласти дитину на живіт матері

Питання 77

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнт, який хворіє на гемофілію А, отримав травму, що ускладнилася кровотечею. Які невідкладні заходи треба застосувати?

- a. Увести антикоагулянти прямої дії
- b. Увести в/в кріопреципітат або препарати рекомбінантного фактору VIII
- c. Перелити еритроцитарну масу
- d. Увести амінокапронову кислоту
- e. Увести етамзилат натрію

Правильна відповідь: Увести в/в кріопреципітат або препарати рекомбінантного фактору VIII

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 46 років із діагнозом: Q-інфаркт міокарда через 2 години після початку захворювання та проведення фібринолітичної терапії раптово знепритомнів, посинів, з'явилися судоми. Об'єктивно спостерігається: пульс та АТ не визначаються, на моніторі велика кількість альтернуючих хвиль подібних до QRS-комплексів. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Гостра кровотеча
- b. Ідовентрикулярний ритм
- c. Фібриляція передсердъ
- d. Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія
- e. Фібриляція шлуночків

Правильна відповідь: Фібриляція шлуночків

Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час роботи на одному з блоків АЕС один із працівників через необережність порувив техніку безпеки, унаслідок чого він протягом 35 хвилин перебував у зоні радіоактивного опромінення. Показники індивідуального дозиметра --- 1,0 Гр. Потерпілий скарг не має. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви та видимі слизові оболонки звичайного кольору, пульс --- 84/хв, AT --- 138/82 мм рт. ст., живіт під час пальпації м'який, неболючий. Який лікувально-профілактичний захід треба провести стосовно цього працівника?

- a. Призначити антибактеріальну терапію
- b. Призначити препарати йоду
- c. Призначити цистамін
- d. Призначити унітіол
- e. Профілактичного лікування не потребує

Правильна відповідь: Призначити цистамін

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнта 52-х років доставлено у відділення реанімації в перші години гострого інфаркту міокарда. Стан вкрай важкий: свідомість відсутня, шкірні покриви бліді, слизові оболонки ціанотичні, м'язова атонія, поодинокі поверхневі вдихи, пульс на променевих та сонних артеріях не визначається. На ЕКГ виявлено великохвильову фібриляцію шлуночків. Якого терапевтичного заходу слід вжити в першу чергу?

- a. Введення лідокаїну
- b. Введення кальцію хлориду
- c. Електрична дефібриляція
- d. Введення адреналіну гідрохлориду
- e. Введення аміодарону

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До військового шпиталю госпіталізовано 8 солдат із місця події. У потерпілих спостерігається слабкість, нудота, гіркота у роті, слинотеча. У одного бійця шкіра та слизові оболонки яскраво-червоного кольору, брадипное, брадикардія, судоми. Зі слів потерпілих, на місці події відчувається різкий запах гіркого мигдалю. Яка отруйна речовина спричинила такий стан військовослужбовців?

- a. Зарин
- b. Іприт
- c. Фосген
- d. Синильна кислота
- e. Зоман

Правильна відповідь: Синильна кислота

Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Лікар бригади швидкої допомоги надає невідкладну допомогу дівчинці 10-ти років, яку збила машина. У зв'язку з неадекватністю самостійного дихання проведена інтубація трахеї. При проведенні пробних вдихів за допомогою мішка Амбу виявлено, що дихальні шуми зліва проводяться слабше. Що треба зробити, щоб виправити ситуацію?

- a. Переінтубувати трахею
- b. Просунути інтубаційну трубку нижче
- c. Підтягнути інтубаційну трубку вище
- d. Підвищити об'єм дихання
- e. Підвищити тиск в дихальних шляхах

Правильна відповідь: Підтягнути інтубаційну трубку вище

Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У сержанта 30-ти років після вибуху авіабомби ліва гомілка була притиснута бетонною стіною до землі. Звільнення від стиснення гомілки відбулося через 3 години, потерпілого доставлено у госпіталь. Шкіра гомілки блідо-ціанотична, холодна на дотик, набрякла. Тони серця приглушенні, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, 120/хв. У сечі: міоглобін, протеїнурія та циліндрурія, колір - бурий. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Синдром тривалого стиснення, проміжний період
- b. Гострий гломерулонефрит
- c. Синдром тривалого стиснення, ранній період
- d. Гострий венозний тромбоз
- e. Гостра печінкова недостатність

Правильна відповідь: Синдром тривалого стиснення, ранній період

Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Десятирічна дитина перебуває у стані клінічної смерті. Повний комплекс заходів легенево-серцевої реанімації проводився протягом 60 хвилин. У весь цей час на кардіомоніторі спостерігалася електрична асистолія. Яка подальша тактика реанімаційної бригади?

- a. Увести препарати кальцію у віковій дозі
- b. Увести внутрішньосерцево адреналін у віковій дозі
- c. Продовжувати проведення серцево-легеневої реанімації з повторними введеннями адреналіну у віковій дозі
- d. Провести електричну дефібриляцію
- e. Причинити проведення легенево-серцевої реанімації

Правильна відповідь: Причинити проведення легенево-серцевої реанімації

Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 48-ми років скаржиться на наявність пульсуючого болю в ділянці інфільтрату промежини, температура тіла - 38,9°C. При огляді виявлено округлий інфільтрат зліва від ануса, шкіра над ним гіперемована. Per rectum: верхня межа інфільтрату вище гребінцевої лінії, пальпація його різко болісна. Ваш діагноз:

- a. Туберкульозний наплив в періанальній ділянці
- b. Киста парапектальної ділянки
- c. Фурункул періанальної ділянки
- d. Гострий гнійний парапроктит
- e. Нагноєння епітеліальних куприкових ходів

Правильна відповідь: Гострий гнійний парапроктит

Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час вибуху офіцер отримав удар твердим предметом по голові. Короткочасно втратив свідомість. Відчуває помірну нудоту. У лобно-тім'яній ділянці справа - великий синець, садна. Загальмований, млявий. Скарги на сильний головний біль, пульс - 60/хв., напружений. Повторне блювання. Анізокорія, права зініця ширша. Сухожильні рефлекси справа знижені. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Відкрита черепно-мозкова травма
- b. Перелом кісток черепа, субарахноїдальний крововилив зліва
- c. ЗЧМТ, наростаюча внутрішньочерепна гематома
- d. Струс головного мозку
- e. Забій головного мозку II ступеня тяжкості

Правильна відповідь: ЗЧМТ, наростаюча внутрішньочерепна гематома

Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У солдата, що перебуває в зоні АТО 4 місяці, почастішали сварки з товаришами, по телефону посварився з дружиною. Щоночі довго не може заснути, часто прокидається під час сну від незначного шуму і без причини. Визначте вид посттравматичної стресової реакції, яка розвинулась у солдата:

- a. Інtrузія
- b. Гіперреактивність
- c. Депресія
- d. Уникання
- e. Галюциноз

Правильна відповідь: Гіперреактивність

Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 3 тижнів із гіпертрофованим клітором значно погіршився стан: постійне блювання, дефіцит ваги 15%, ЧСС- 178/хв, шкіра мармурова, м'язова гіпотензія, артеріальна гіпотензія. При додатковому обстеженні характерними для цієї патології є:

- a. Гіпоглікемія, гіпернатріємія
- b. Гіпокаліємія, гіпернатріємія
- c. Гіпокаліємія, гіперглікемія
- d. Гіпонатріємія, гіперкаліємія
- e. Гіпоглікемія, гіпокаліємія

Правильна відповідь: Гіпонатріємія, гіперкаліємія

Питання 89

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінці 34-х років, яка потрапила до лікарні з тяжкою кровотечею, призначено переливання свіжозамороженої плазми. Можна використати плазму групи AB (IV), якщо хвора має:

- a. Групу крові A (II)
- b. Групу крові O (I)
- c. Будь-яку групу крові
- d. Групу крові B (III)
- e. Групу крові AB (IV)

Правильна відповідь: Групу крові AB (IV)

Питання 90

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У лікаря, який оглянув хворих з високою температурою на півдні Судану, виникли лихоманка, головний біль, біль у м'язах і суглобах, загальна слабкість, пронос. На 4-й день хвороби на тілі з'явився макуло-папульозний висип, 5-й день - криваве блювання, мелена, гіпотонія. Поставте діагноз:

- a. Малярія
- b. Лептоспіroz
- c. Лихоманка Ебола
- d. Висипний тиф
- e. Псевдотуберкульоз

Правильна відповідь: Лихоманка Ебола

Питання 91

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 49-ти років під час тривалої роботи на присадибній ділянці втратив свідомість. Зі слів родичів хворіє на цукровий діабет близько 2-х років, отримує глібенкламід 20 мг на добу. Об'єктивно: шкіра волога, тонус м'язів кінцівок підвищений. Пульс - 98/хв., ритмічний. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Дихання - 20/хв., ритмічне. Вогнищової симптоматики не виявлено. Яке ускладнення розвинулось у хворого?

- a. Синкопе
- b. Кетоацидоз
- c. Гостре порушення мозкового кровообігу
- d. Лактацидоз
- e. Гіпоглікемія

Правильна відповідь: Гіпоглікемія

Питання 92

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 1,5 років з діагнозом сепсис спостерігаються: потьмарення свідомості, контактний сопор, фоторефлекси збережені, акроціаноз, пульс slabkого наповнення, артеріальний тиск - 60/15 мм рт.ст. Який стадії термінального стану відповідає дана клінічна картина?

- a. Клінічна смерть
- b. Біологічна смерть
- c. Передагонія
- d. Агонія
- e. Соціальна смерть

Правильна відповідь: Передагонія

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 17-ти років була вжалена комахою в ділянку лівого передпліччя 5 діб тому. Через дві доби в ділянці вжалення з'явилася інфільтрація, гіперемія, набряк, посилився біль. Температура тіла - 37,8оС. В середній третині лівого передпліччя в підшкірній клітковині інфільтрат 4x4 см, з нечіткими контурами з флюктуацією в центрі. Шкіра над інфільтратом гіперемована, локальне підвищення температури тіла. Ваш діагноз:

- a. Алергічна реакція на вжалення комахою
- b. Бешиха
- c. Запальний інфільтрат
- d. Абсцес
- e. Тромбофлебіт вен передпліччя

Правильна відповідь: Абсцес

Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 59 років раптово на вулиці втратив свідомість. Діагностовані ознаки клінічної смерті. З чого треба починати реанімаційні заходи?

- a. Уведення атропіну та адреналіну
- b. Виконання потрійного прийому Сафара
- c. Виконання зовнішнього масажу серця
- d. Виконання конікотомії
- e. Уведення аміодарону чи лідокаїну

Правильна відповідь: Виконання потрійного прийому Сафара

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 34-х років страждає на епілептичні напади з 12-річного віку. Мають місце генералізовані тоніко-клонічні напади, пароксизми втрати свідомості на секунду із "бліманням", прогресує зниження пам'яті, інертність мислення. Годину тому почалися генералізовані напади з послідовною зміною фаз тонічних та клонічних судом. Перенесла п'ять нападів, свідомість не відновлювалася, на запитання не відповідає. Яке першочергове інструментальне обстеження слід призначити?

- a. Електроенцефалографію
- b. Магнітно-резонансну томографію
- c. Реоенцефалографію
- d. Аксіальну комп'ютерну томографію
- e. Рентгенографію кісток черепа

Правильна відповідь: Електроенцефалографію

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У районі бомбардування, внаслідок спалахування нафтопроводу, знайдено та доставлено у МедР групу обпечених. Якими головними критеріями повинен керуватися лікар приймально-сортувального відділення МедР для ранньої діагностики опікового шоку?

- a. Ціаноз, задуха
- b. Відчуття холоду, блідість шкіри поза межами опіку
- c. Спрага, м'язове тремтіння
- d. Задуха, тахікардія
- e. Глибина та площа ураження

Правильна відповідь: Глибина та площа ураження

Питання 97

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Військовослужбовці постраждали через використання суперником фосгену під час військової операції. В усіх потерпілих спостерігається кашель, слинотеча, утруднення дихання, відчуття стискання за грудиною. Ці симптоми минули після припинення дії отруйної речовини і не повторювалися протягом 4-х годин. Розвиток якого патологічного стану може спричинити ця отруйна речовина?

- a. Токсичної енцефалопатії
- b. Анафілактичного шоку
- c. Токсичного гепатиту
- d. Гемолізу
- e. Токсичного набряку легень

Правильна відповідь: Токсичного набряку легень

Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 46-ти років надійшов зі скаргами на сухий кашель, задишку, яка посилюється в положенні лежачи, вкритий холодним потом. Об'єктивно: частота дихання - 30/хв., артеріальний тиск - 180/100 мм рт.ст., Cor - тони глухі, акцент II тону над легеневою артерією, ритм галопу, над легеннями - жорстке дихання, в н/відділах сухі та вологі дрібнопухирцеві хрипи. Який попередній діагноз більш імовірний?

- a. Тромбоемболія легеневої артерії
- b. Набряк легень
- c. Астматичний статус
- d. Гіпертензивний криз
- e. Ішемічна кардіоміопатія

Правильна відповідь: Набряк легень

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу дванадцяталої кишki, на тлі вживання алкоголю з'явилися різка слабкість, запаморочення та блювання <<кавовою гущею>>. Об'єктивно спостерігається: обличчя бліде, шкіра волога. Артеріальний тиск -- - 80/50 мм рт. ст., пульс --- 120/хв. Лікар діагностував шлунково-кишкову кровотечу, геморагічний шок. Які показники треба дослідити для визначення величини крововтрати?

- a. Уміст гемоглобіну, гематокрит
- b. Уміст сечовини та креатиніну в сироватці крові
- c. Парціальний тиск кисню у венозній крові
- d. Уміст хлору, натрію, кальцію в сироватці крові
- e. Співвідношення нейтрофілів та лімфоцитів крові

Правильна відповідь: Уміст гемоглобіну, гематокрит

Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час проведення реанімаційних заходів у пацієнта із раптовою зупинкою сеця, який перебуває на стаціонарному лікуванні, протягом 5 хвилин спостерігається рефрактерна асистолія. Реаніматологу повідомили, що пацієнт перед зупинкою серця випадково отримав внутрішньовенну ін'єкцію 50 мл 4%-го калію хлориду замість 0,9%-го хлориду натрію. Який препарат треба терміново додати до комплексу реанімаційних заходів?

- a. 10 мл аспаркаму внутрішньовенно
- b. 10 мл 10%-го кальцію хлориду внутрішньовенно
- c. 1 мл 0,025%-го дигоксину внутрішньовенно
- d. 40 мл 40%-ї глюкози внутрішньовенно
- e. 5 мл 3%-го кордарону внутрішньовенно

Правильна відповідь: 10 мл 10%-го кальцію хлориду внутрішньовенно

Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У шестирічної дитини раптово підвищилася температура тіла до $39,0^{\circ}\text{C}$, з'явився біль у м'язах, першіння в горлі. На 2-гу добу з'явився сухий кашель та біль за грудиною. Батьки займалися самолікуванням дитини та використовували аспірин. На 5-ту добу у дитини зберігається підвищена температура тіла та з'явилося блювання. Об'єктивно спостерігається: дитина збуджена, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 2 см. Яке імовірне ускладнення розвинулось у дитини?

- a. Пневмонія
- b. Синдром Рея
- c. Геморагічний інсульт
- d. Медикаментозне отруєння
- e. Енцефаліт

Правильна відповідь: Синдром Рея

Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка діагностовано клінічні ознаки напруженого пневмотораксу. Екстрена допомога у разі цієї патології --- пункция плевральної порожнини у:

- a. II міжребер'ї по середньооключичній лінії на боці ураження
- b. V-VI міжребер'ї по середній аксилярній лінії на боці ураження
- c. II міжребер'ї по середньооключичній лінії на здоровому боці
- d. VIII-IX міжребер'ї по задній аксилярній лінії на здоровому боці
- e. VIII-IX міжребер'ї по задній аксилярній лінії на боці ураження

Правильна відповідь: II міжребер'ї по середньооключичній лінії на боці ураження

Питання 103

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Народився живий доношений хлопчик, масою 3300 г, довжиною 52 см, з тугим обвіттям пуповини навколо шиї. Навколоплідні води без домішок меконію. Нормальне дихання протягом першої хвилини після народження не встановлюється, частота серцевих скорочень - 110/хв., тонус м'язів помірно знижений, незначна відповідь на подразнення. Якою має бути тактика лікаря?

- a. Санація дихальних шляхів
- b. Дати струмінь кисню на обличчя
- c. Вдарити по сідницях
- d. Стиснути грудну клітку
- e. Облити дитину холодною водою

Правильна відповідь: Санація дихальних шляхів

Питання 104

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 12-ти років під час внутрішньовенного введення рентгенконтрастної речовини (тріомбрасту) раптово погіршився стан: з'явилися головний біль, відчуття здавлення в грудях з браком повітря. Через декілька хвилин знепритомніла. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, акроціаноз. Пульс ниткоподібний. Тони серця різко ослаблені. Частота серцевих скорочень - 110/хв., артеріальний тиск - 60/30 мм рт.ст. Вкажіть препарат вибору для надання невідкладної допомоги:

- a. Допамін
- b. Адреналін
- c. Супрастин
- d. Еуфілін
- e. Преднізолон

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 105

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Першовагітна 22-х років, термін вагітності 8 тижнів, скаржиться на рясні кров'янисті виділення зі статевих шляхів та біль внизу живота переймоподібного характеру. При піхвовому дослідженні: матка збільшена відповідно до 8 тижнів вагітності, шийка матки вкорочена, цервіальний канал вільно пропускає 1 палець і в ньому визначається плодовий міхур та частини плодового яйця; виділення рясні кров'янисті. Яка тактика лікаря?

- a. Вишкрібання порожнини матки
- b. Ультразвукове дослідження
- c. Спостереження за вагітною
- d. Призначення препаратів, що пролонгують вагітність
- e. Кольпоскопія

Правильна відповідь: Вишкрібання порожнини матки

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 32-х років, праля, захворіла гостро 5 днів тому: озноб, гарячка, сильний головний біль, виражена слабість, безсоння. При огляді: температура тіла - 40оС, збуджена, гіперемія й одутлість обличчя, ін'екція судин склер, рясна розеольозно-петехіальна екзантема, тремор язика, тахікардія, гепатосplenомегалія. Виявлено педикульоз. Якою буде тривалість медичного спостереження за контактними особами?

- a. Спостереження не проводиться
- b. Впродовж 21 дня
- c. Впродовж 7 днів
- d. Впродовж 14 днів
- e. Впродовж 25 днів

Правильна відповідь: Впродовж 25 днів

Питання 107

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 58-ми років з IХС на прийомі у дільничного лікаря розвинувся пароксизм надшлуночкової тахікардії, зареєстрований на ЕКГ. Які першочергові заходи доцільно провести?

- a. Внутрішньовенне введення адреналіну
- b. Електроімпульсна терапія
- c. Черезстравохідна електрокардіостимулляція
- d. Вагусні проби
- e. Ввести кордарон

Правильна відповідь: Вагусні проби

Питання 108

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Після падіння з опором на праве плече потерпілий скаржиться на біль, обмеження рухів, деформацію в ділянці плечового суглоба. Яких заходів на цьому етапі надання допомоги необхідно вжити?

- a. Накладення шини Дітеріхса
- b. Блокада місця перелому
- c. Накладення шини Крамера від пальців до плечового суглоба
- d. Транспортна іммобілізація, знеболення
- e. Накладення гіпової пов'язки

Правильна відповідь: Транспортна іммобілізація, знеболення

Питання 109

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На полі бою оглядається військовослужбовець 18-ти років, що скаржиться на різкий біль в правій половині грудної клітки, задишку. Відомо, що потерпілий зазнав колото-різаного поранення грудної клітки. При огляді в 4 міжребер'ї по передній аксилярній лінії справа визначається рана 3x4 см, через яку з плевральної порожнини надходить повітря. Що повинен зробити санітарний інструктор на полі бою?

- a. Обробити рану антисептиком
- b. Ввести антибактеріальні препарати
- c. Виконати дренування плевральної порожнини
- d. Виконати пункцию плевральної порожнини
- e. Накласти оклюзійну пов'язку з клапаном на рану

Правильна відповідь: Накласти оклюзійну пов'язку з клапаном на рану

Питання 110

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 48-ми років, працівник хімічної лабораторії доставлений в лікарню зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, головний біль, заплітання язика при розмові, бл涓ання, кашель, дертя в горлі, кровотечу з носа, часте болісне сечовипускання. Об'єктивно: шкіра сіро-синього кольору, судоми м'язів. Кров шоколадно-бура, вміст MtHb у крові - 60%, еритроцити з тільцями Гейнца- Ерліха - 25%. В сечі: протеїнурія, макрогематурія. Ваш попередній діагноз:

- a. Інтоксикація аміносполуками бензолу
- b. Інтоксикація сірковуглецем
- c. Інтоксикація тетраетилсвинцем
- d. Інтоксикація ртуттю
- e. Інтоксикація марганцем

Правильна відповідь: Інтоксикація аміносполуками бензолу

Питання 111

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У півторарічної дитини із септичним шоком виникла кровотеча з місць ін'єкцій, по шлунковому зонду надходить <<кавова гуща>>. Під час визначення показників гемостазу виявлено: збільшено МНВ, АЧТЧ, рівень D-димеру, знижений фібриноген, тромбоцити --- \$30\cdot 10^9\$/л. Для якого патологічного процесу характерні такі показники?

- a. Синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
- b. Ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури
- c. Дефіциту вітаміну K
- d. Тромботичної тромбоцитопенічної пурпури
- e. Хвороби Віллебранда

Правильна відповідь: Синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові

Питання 112

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Військовослужбовець унаслідок вибухової хвилі отримав сильний удар грудьми об кам'яну брилу. Об'єктивно спостерігається: у постраждалого ціаноз обличчя, акроцианоз, тахіпnoе до 40/хв., роздуті шийні вени, АТ - 65/40 мм рт. ст., тони серця глухі. Який попередній діагноз?

- a. Напруженій пневмоторакс
- b. Гострий респіраторний дистрес-синдром
- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Тампонада серця
- e. Гемоторакс

Правильна відповідь: Тампонада серця

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 6-ти місяців діагностований гострий стенозуючий ларинготрахеїт III ст. Наростає клініка гострої дихальної недостатності. Встановити інтубаційну трубку в трахею не вдалось. Яка маніпуляція дозволить відновити прохідність дихальних шляхів?

- a. Встановлення повітроводу
- b. Виведення нижньої щелепи
- c. Розгинання голови в шийному віddілі
- d. Проведення конікотомії
- e. Встановлення ларингеальної маски

Правильна відповідь: Проведення конікотомії

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 29-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на кров'янисті виділення з піхви та біль у правій здухвинній ділянці. Остання менструація була 11 тижнів тому. Вміст ХГ у сироватці крові нижче за нормативні показники для передбачуваного терміну вагітності. За даними ультразвукового дослідження (УЗД) плідне яйце в порожнині матки не визначається. В Дугласовому просторі виявлено вільну рідину з гіперхогенними включеннями. При піхвовому дослідженні: нависання склепінья, "крик Дугласа". При пункциї заднього склепіння отримана кров, що не згортается. Поставте діагноз:

- a. Перекрут кісти яєчника
- b. Порушена позаматкова вагітність
- c. Аборт, що розпочався
- d. Кровотеча з жовтого тіла яєчника
- e. Міхурцевий занесок

Правильна відповідь: Порушена позаматкова вагітність

Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіка віком 40 років доставлено до приймального відділення у коматозному стані (кома ймовірно алкогольного генезу). Після проведення дезінтоксикаційної терапії свідомість відновилася, проте надалі стан пацієнта погіршився, з'явилися задишка, психомоторне збудження, тахікардія, гіпертензія. У загальному аналізі крові виявлено лейкоцитоз із паличкоядерним зсувом лейкоцитарної формулі вліво. Яке із наведених досліджень треба провести насамперед для з'ясування причини погіршення стану пацієнта?

- a. Люмбальну пункцію
- b. МРТ головного мозку
- c. Рентгенографію органів грудної клітки
- d. Загальний аналіз сечі
- e. Визначення вмісту глукози в крові

Правильна відповідь: Рентгенографію органів грудної клітки

Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У післяопераційного пацієнта розвинувся інфаркт міокарда та виникла пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Об'єктивно спостерігається: ЧСС --- 150/хв., АТ --- 105/70 мм рт. ст. Який антиаритмічний лікарський засіб треба використати?

- a. Лідокаїн
- b. Дилтіазем
- c. Дизопірамід
- d. Дигоксин
- e. Верапаміл

Правильна відповідь: Лідокаїн

Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У юнака віком 14 років, який перебуває у лікарні з діагнозом: гострий інфекційний ендокардит, раптово у нього з'явився інтенсивний біль у поперековій ділянці зліва. Спостерігається слабкість, нудота, здуття живота, гематурія, зниження добового діурезу, підвищення артеріального тиску. Пацієнту проведено знеболювання наркотичними анальгетиками. Для якого патологічного стану характері такі симптоми?

- a. Гострого піелонефриту
- b. Інфаркту лівої нирки
- c. Кровотечі з сечового міхура
- d. Хронічного піелонефриту
- e. Ниркової кольки

Правильна відповідь: Інфаркту лівої нирки

Питання 118

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта віком 45 років на шосту добу гострого інфаркту міокарда раптово розвинулася виражена задишка та кашель із виділенням рожевого мокротиння. Об'єктивно встановлено: набухання шийних вен, пульс --- 110/хв., AT --- 85/55 мм рт. ст., акцент II-го тону над легеневою артерією. Яка причина погіршення стану пацієнта?

- a. Синдром Дреслера
- b. Гостра лівошлуночкова недостатність
- c. Ателектаз легень
- d. Повторний інфаркт міокарда
- e. Пневмонія

Правильна відповідь: Гостра лівошлуночкова недостатність

Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта 72-х років три дні тому з'явився помірний біль в животі постійного характеру, який поступово став переймоподібним. Причину захворювання пов'язує з вживанням великої кількості мучної їжі. За останні 2 години блювання коричневого кольору з неприємним фекальним запахом. Стілець відсутній. Живіт здутий, м'який, болючий в нижній половині. Симптоми подразнення очеревини відсутні. Перистальтика посиlena, звучна. В правій здухвинній ділянці нечіткий інфільтрат. Позитивний симптом Склерова. Ректально - болючості, нависання немає, на рукавичці слиз. Ваш попередній діагноз:

- a. Гостра обтураційна кишкова непрохідність
- b. Гострий панкреатит
- c. Апендикулярний інфільтрат
- d. Гострий гастроентерит
- e. Защемлена грижа

Правильна відповідь: Гостра обтураційна кишкова непрохідність

Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До приймального відділення лікарні після ДТП госпіталізовано постраждалого віком 72 роки з тяжкою політравмою. Об'єктивно спостерігається: стан чоловіка вкрай тяжкий, спонтанне дихання агональне, гемодинаміка нестабільна. Під час перекладання постраждалого з нош виникла зупинка кровообігу. Реанімаційні заходи, які треба розпочати мають включати штучну вентиляцію легенів та непряму компресію міокарда у співвідношенні:

- a. 2:15
- b. 1:1
- c. 1:5
- d. 1:2
- e. 2:30

Правильна відповідь: 2:30

Питання 121

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 25-ти років 2 тижні тому народила здорову дівчинку. Вагітність та пологи перебігали без ускладнень. Виписані на 2-гу добу. Психосоматичний анамнез не обтяжений. Після виписки з полового будинку родичі звернули увагу на її агресивність, часті зміни настрою, відсутність бажання доглядати за дитиною. Маті викликала дільничного лікаря у зв'язку з тим, що дочка зробила спробу задушити немовля. На запитання "чому?" відповідала, що чула голос, який сказав, що вона повинна вбити дитину. Виникла підоозра на післяпологовий психоз. Якою буде тактика лікаря у цьому випадку?

- a. Дати направлення на консультацію до психіатра
- b. Призначити антидепресанти та вітамінотерапію
- c. Негайна госпіталізація до спеціалізованого стаціонару
- d. Дати рекомендації щодо режиму праці та відпочинку
- e. Призначити повне клінічне обстеження

Правильна відповідь: Негайна госпіталізація до спеціалізованого стаціонару

Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіка віком 50 років госпіталізовано до лікарні у непрітомному стані. 2 тижні тому отримав ЧМТ. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, шкірні покриви бліді, дихання не порушене, АТ --- 130/85 мм рт.ст., пульс --- 60/хв, анізокорія S>D, асиметрія нижньолицьових м'язів справа, сухожильна анізорефлексія D>S, абдомінальні рефлекси D<S, позитивні стопні патологічні рефлекси справа. Менінгеальні симптоми відсутні. Для якого патологічного стану характерні такі клінічні прояви?

- a. Субдуральної гематоми
- b. Ішемічного інсульту
- c. Пухлини головного мозку
- d. Субарахноїального крововиливу
- e. Менінгіту

Правильна відповідь: Субдуральної гематоми

Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого з менінгококовою інфекцією, синдромом Уотерхауса-Фрідеріксена в приймальному відділенні виникла зупинка дихання, артеріальний тиск виміряти не вдається, ЧСС- 58/хв. Які невідкладні дії лікаря приймального відділення?

- a. Введення великих доз глюкокортикоїдів
- b. Термінова трахеостомія
- c. Введення кордіаміну
- d. Введення адреналіну
- e. Вентиляція мішком Амбу

Правильна відповідь: Вентиляція мішком Амбу

Питання 124

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 54-х років з приводу відсутності пульсу на сонних артеріях і дихання вже протягом 10 хвилин бригадою екстреної медичної допомоги (ЕМД) проводяться реанімаційні заходи: зовнішній масаж серця, штучне дихання мішком Амбу, введення адреналіну, дефібриляція. Стан залишається без змін. З якою частотою і на яку глибину має здійснюватися компресія грудної клітки?

- a. 60-80/хв. та 4-5 см
- b. 100-120/хв. та 3-4 см
- c. 140/хв. та 4-5 см
- d. 90-100/хв. та 4-5 см
- e. 100-120/хв. та 5-6 см

Правильна відповідь: 100-120/хв. та 5-6 см

Питання 125

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 4-х років після відпочинку на морі розвинулось багаторазове блювання. Випорожнення ахолічне. Сеча світла. Доставлена у стаціонар з ознаками токсико-ексикозу на 3 день захворювання. З рота запах прілих фруктів. Які лабораторні дані першочергово потрібні для призначення терапії?

- a. Кров на кетонові тіла, протеїнограма крові, ліпіди крові
- b. Цукор крові, сеча на ацетон
- c. Кров на білірубін, АЛТ, цукор
- d. Загальний аналіз і печінкові проби крові, цукор крові
- e. Загальний аналіз і печінкові проби крові, бак. посів блювотних мас

Правильна відповідь: Цукор крові, сеча на ацетон

Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 44-річного чоловіка після вживання сурогатів алкоголью виникло багаторазове блювання шлунковим вмістом та дворазове блювання малозміненою кров'ю. Пульс - 100/хв. Артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Гемоглобін -110 Г/л. При ендоскопічному обстеженні у кардіальному відділі шлунка виявлена лінійна тріщина слизової оболонки. Який діагноз можна встановити на основі клініки й ендоскопічних даних?

- a. Варикозне розширення вен кардіального відділу шлунка, кровотеча
- b. Синдром Меллорі-Вейса
- c. Ерозивний гастрит, ускладнений кровотечею
- d. Гостра виразка шлунка, кровотеча
- e. Грижа стравохідного отвору діафрагми

Правильна відповідь: Синдром Меллорі-Вейса

Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 37-ми років є підозра на холеру. Об'єктивно: акроціаноз, суха шкіра, шкірна складка не розправляється, руки "прачки", судомі кінцівок, температура - 35,6°C, ниткоподібний пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 75/40 мм рт.ст., анурія. Які препарати необхідно ввести?

- a. Допамін
- b. Трисіль, квартасіль
- c. Преднізолон, гідрокортизон
- d. Кордіамін, мезатон
- e. 5% розчин глюкози

Правильна відповідь: Трисіль, квартасіль

Питання 128

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Рядовий був притиснутий уламками зруйнованого будинку протягом 7 годин. Хворий збуджений, погано орієнтується у навколишньому середовищі. Пульс - 92/хв., слабкого наповнення і напруження, набряк всієї правої нижньої кінцівки, на зовнішній поверхні стегна та гомілки шкіра має синьо-багряний колір. Рухи в колінному та гомілково-ступневому суглобах відсутні. Протягом доби поранений не мочився. Поставте діагноз:

- a. Синдром тривалого розчавлення легкого ступеня
- b. Травматичний шок середнього ступеня, еректильна фаза
- c. Синдром тривалого розчавлення
- d. Синдром тривалого розчавлення тяжкого ступеня, II стадія
- e. Травматичний шок тяжкого ступеня, торпідна фаза

Правильна відповідь: Синдром тривалого розчавлення тяжкого ступеня, II стадія

Питання 129

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Підліток 14-ти років перебуває на диспансерному обліку з приводу артеріальної гіпертензії. Після емоційного стресу у хворого розвинувся гіпертензивний криз. Артеріальний тиск - 170/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 50/хв. Який медикаментозний засіб ви призначите?

- a. Кордіамін
- b. Панангін
- c. Корвітол
- d. Каптоприл
- e. Дигоксин

Правильна відповідь: Каптоприл

Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини з гострою нирковою недостатністю при біохімічному моніторингу визначено: фібриноген - 4,5 г/л, натрій плазми - 145 мМ/л, креатинін плазми - 380 мкМ/л. В сечі: білок - 0,67 г/л, лейкоцити - 3-5 в п/з, еритроцити - 6-8 в п/з. Який показник з наведених є найбільш інформативним для визначення ступеня гострого ураження нирок?

- a. Формені елементи крові в осаді сечі
- b. Креатинін плазми
- c. Фібриноген плазми крові
- d. Натрій плазми крові
- e. Протеїнурія

Правильна відповідь: Креатинін плазми

Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 56-ти років випив 150 мл невідомої рідини. Скаржиться на слино- і слізотечу, нудоту, блювання, біль у животі, пронос, утруднене дихання. Дезорієнтований, спостерігається фібрілярні посіпування м'язів, тремор верхніх кінцівок, брадикардія, бронхоспазм, значна кількість хрипів у легенях, міоз. Якою речовою викликане гостре отруєння?

- a. Бензином
- b. Припікаючою рідиною
- c. Чотирьоххлористим вуглецем
- d. Дихлоретаном
- e. Фосфорорганічною сполукою

Правильна відповідь: Фосфорорганічною сполукою

Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У роділлі, яка після ускладнених хоріамніонітом пологів отримує антибактеріальну терапію (цефазолін 3 г на добу), срімко погрішився загальний стан. Спостерігається підвищення температури тіла до $39,0^{\circ}\text{C}$, ЧСС --- 120/хв, ЧДД --- 26/хв, зниження АТ до 80/40 мм рт. ст. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки?

- a. Напад бронхіальної астми
- b. Септичний шок
- c. Набряк Квінке
- d. Анафілактичний шок
- e. Ортостатичний колапс

Правильна відповідь: Септичний шок

Питання 133

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У лікарню доставлена група потерпілих у результаті бійки із застосуванням холодної і вогнепальної зброї. Які поранення найбільш несприятливі для прогнозу розвитку інфекційних ускладнень?

- a. Проникні
- b. Колото-різані
- c. Різані
- d. Рвано-різані
- e. Вогнепальні

Правильна відповідь: Вогнепальні

Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На виробництві з виготовлення пластмасових контейнерів відбулась аварія. Через 1 годину після цього працівник звернувся до медичного пункту зі скаргами на шум у вухах, головний біль, запаморочення, загальну слабкість, підвищення температури тіла до фебрильної, слинотечу та пронос, сірий відтінок шкірних покривів. Через півтори години звернулись ще 6 працівників зі схожою клінікою. У всіх постраждалих в крові було виявлено метгемоглобінемію. Яка речовина найбільш імовірно викликала таке отруєння?

- a. Похідні фенолу
- b. Синильна кислота
- c. Аміак
- d. Сірководень
- e. Моноксид вуглецю

Правильна відповідь: Похідні фенолу

Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки віком 25 років за 40 хвилин після прийому оксациліну з'явилися захриплість голосу, <<гавкаючий>> кашель, утрудненість дихання із задишкою інспіраторного характеру, задуха. Об'єктивно встановлено: пацієнта неспокійна, метушлива. Дихання шумне, стридорозне. Обличчя ціанотичне. Аускультивно вислуховуються поодинокі розсіяні сухі свистячі хрипи. Який найімовірніший діагноз?

- a. Паратонзиллярний абсцес
- b. Гострий набряк Квінке
- c. Гострий фарингіт
- d. Стороннє тіло в трахеї
- e. Напад бронхіальної астми

Правильна відповідь: Гострий набряк Квінке

Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальне відділення лікарні ургентно доставлений хворий 19-ти років. Під час обстеження спостерігаються багаторазові повторні генералізовані тоніко-клонічні судомні напади, непритомний, піна з рота, шкіра сірувато-бліого кольору, на лобі підшкірна гематома 1x2 см, частота серцевих скорочень - 120/хв., коливання артеріального тиску від 130/80 до 170/100 мм рт.ст. При неврологічному обстеженні: зіниці на світло не реагують, погляд не фокусує, патологічні рефлекси нижніх кінцівок. Який стан у хворого?

- a. Правецеь
- b. Епілептичний статус
- c. Гостре порушення мозкового кровообігу
- d. Менінгіт
- e. Делірій

Правильна відповідь: Епілептичний статус

Питання 137

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На сортувальному майданчику медичної роти бригади пораненому встановлено попередній діагноз: мінно-вибухова травма. Травматичний шок. В ролі лікаря сортувальної бригади зробіть сортувальний висновок (черговість направлення та функціональний підрозділ):

- a. Перша черга, перев'язочна для поранених середньої тяжкості
- b. Перша черга, госпітальне відділення
- c. Перша черга, протишокова для поранених
- d. Друга черга, операційна для тяжкопоранених
- e. Перша черга, перев'язочна для легкопоранених

Правильна відповідь: Перша черга, протишокова для поранених

Питання 138

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнта 28-ми років протягом 2 тижнів лежить у ліжку, голова піднята над подушкою, покриви обличчя сальні. Тонус м'язів підвищений, на запитання не відповідає, інструкції не виконує. З боку внутрішніх органів без патології. Артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст., пульс - 62/хв, температура тіла - 36,7оС. Який Ваш попередній діагноз?

- a. Кататонічний ступор
- b. Депресивний ступор
- c. Психогенний ступор
- d. Апатичний ступор
- e. Епілептичний ступор

Правильна відповідь: Кататонічний ступор

Питання 139

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 45-ти років після конфліктної ситуації на роботі відчула інтенсивний головний біль, була нудота та неодноразове блювання. До цього вважала себе здоровою. Об'єктивно: свідомість ясна, артеріальний тиск - 160/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 70/хв., серцева діяльність ритмічна, загальна гіперестезія, фото-фонофобія, ригідність м'язів потилиці. Парезів та інших неврологічних розладів не виявлено. Найбільш імовірний діагноз:

- a. Істеричний невроз
- b. Менінгіт
- c. Гостра гіпертонічна енцефалопатія
- d. Субарахноїдальний крововилив
- e. Ішемічний інсульт

Правильна відповідь: Субарахноїдальний крововилив

Питання 140

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Першовагітна в терміні 11-12 тижнів скаржиться на інтенсивний переймоподібний біль внизу живота та кровотечу зі статевих шляхів. Піхвове дослідження: канал шийки матки відкрито на 2 см, в ньому визначається нижній полюс плодового яйця. Кров'янисті виділення рясні. Яка стадія мимовільного аборту?

- a. Неповний аборт
- b. Аборт, що не стався
- c. Загрозливий аборт
- d. Аборт у ходу
- e. Повний аборт

Правильна відповідь: Аборт у ходу

Питання 141

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини двох років раптово з'явився біль спастичного характеру у животі. При первинному огляді дитина заспокоїлась, болю нема. Був стілець з домішкою крові. В правій нижній ділянці живота пальпується пухлиноподібне утворення, циліндричної форми. Який Ваш попередній діагноз?

- a. Кишкова інвагінація
- b. Черевний тиф
- c. Хвороба Гіршпрунга
- d. Дизентерія
- e. Хвороба Кроне

Правильна відповідь: Кишкова інвагінація

Питання 142

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У п'ятирічної дівчинки, яка хворіє на цукровий діабет I типу протягом 2-х років і отримує інсулін, раптово виникло занепокоєння, відчуття голоду, тремор у кінцівках, блідість. Дитина втратила свідомість. Рівень глюкози у крові --- 2,2 ммоль/л. Який препарат насамперед треба призначити дитині?

- a. Глюкозу
- b. Адреналін
- c. Преднізолон
- d. Ноотропіл
- e. Глюкагон

Правильна відповідь: Глюкозу

Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 14-річного хлопчика під час тривалого стояння раптово з'явилися запаморочення, потемніння в очах, хлопчик знепритомнів. Об'єктивно: дитина без свідомості, блідість шкірних покривів, холодний піт. Відзначаються тахікардія, ниткоподібний пульс, зниження артеріального тиску. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гостра коронарна недостатність
- b. Тампонада серця
- c. Кома
- d. Колапс
- e. Гостра серцева недостатність

Правильна відповідь: Колапс

Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка на місці укусу бджоли швидко розвинувся значний набряк шкіри та м'яких тканин, спостерігається "гавкаючий" кашель, осипливість голосу, задишка та стридорозне дихання. Під час огляду виявлено: обличчя ціанотичне, збудження змінилося загальмованістю, різко збільшилася частота серцевих скорочень. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Гострий респіраторний дистрес-синдром
- b. Напад епілепсії
- c. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- d. Напад бронхіальної астми
- e. Ангіоневротичний набряк

Правильна відповідь: Ангіоневротичний набряк

Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Породілля 21 рік. Знаходиться у післяпологовому відділенні на сумісному перебуванні з дитиною. З доба після пологів. Під час огляду лікаря збуджена, відмовляється від огляду, збирається додому. На запитання відповідає, що не розуміє, що вона знаходиться у лікарні, що ще незаміжня та дітей не народжувала. Пологи I, перебіг вагітності без ускладнень, психосоматичний анамнез не ускладнений. Температура тіла нормальна. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Післяпологова депресія
- b. Органічний психосиндром
- c. Шизофренія
- d. Інтоксикаційний психоз
- e. Післяпологовий психоз

Правильна відповідь: Післяпологовий психоз

Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпілий з опіком полум'ям. У відділені інтенсивної терапії почали нарости явища дихальної недостатності. Яка невідкладна допомога?

- a. Інтубація трахеї та ШВЛ
- b. Введення брохолітиків
- c. Інгаляція зволоженого кисню
- d. Трахеостома
- e. Введення дихальних аналептиків

Правильна відповідь: Інтубація трахеї та ШВЛ

Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки 25-ти років при виконанні інструментальної ревізії порожнини матки у зв'язку з неповним самовільним викиднем відбулася перфорація стінки матки в ділянці дна. Кровотеча з піхви незначна. Яка тактика ведення хворої?

- a. Призначити утеротоніки, спостереження
- b. Екстирпація матки
- c. Ліжковий режим, спостереження
- d. Ушивання перфораційного отвору
- e. Надпіхвова ампутація матки

Правильна відповідь: Ушивання перфораційного отвору

Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У п'ятимісячного хлопчика після першого введення прикорму з'явився гострий переймоподібний біль у животі, блювота, затримка випорожнень. При ректальному дослідженні - кров "стигла вишня". Ваш діагноз:

- a. Внутрішня грижа
- b. Глистна інвазія
- c. Кишкова інвагінація
- d. Пухлина черевної порожнини
- e. Гострий холецистит

Правильна відповідь: Кишкова інвагінація

Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки після укусу оси в обличчя розвинулось тахіпnoе до 38/хв., пульс - 120/хв., артеріальний тиск знизився до 60/40 мм рт.ст. З чого треба почати невідкладну допомогу?

- a. Оксигенотерапія
- b. Преднізолон
- c. Адреналін
- d. Допоміжна вентиляція легенів
- e. Димедрол

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт віком 48 років, який протягом 16 років хворіє на стеноз пілоруса, як наслідок виразкової хвороби, скаржиться на слабкість, масивне блювання протягом тижня, спрагу, різке схуднення. Об'єктивно спостерігається: збуджений, блідий, АТ --- 90/60 мм рт.ст., ЧСС --- 110--130/хв., аритмія, ЦВТ --- 0 мм вод. ст., діурез менше 10 мл/год, гематокрит --- 52%, \$Na⁺ --- 125 ммол/л, \$K⁺ --- 2,7 ммол/л, pH --- 7,6, BE --- +13. Чим визначається тяжкість стану пацієнта?

- a. Геморагічним шоком
- b. Аритмією та респіраторним алкалозом
- c. Метаболічним ацидозом
- d. Кардіогенним шоком
- e. Дегідратацією та метаболічним алкалозом

Правильна відповідь: Дегідратацією та метаболічним алкалозом

◀ Крок 3 Фармація (вітчизняні UA)

Перейти до...



Крок 3 Стоматологія 2022 ►

Розпочато	вівторок 1 листопад 2022 7:51
Стан	Завершено
Завершено	вівторок 1 листопад 2022 7:59
Витрачено часу	8 хв 30 сек
Балів	3/150
Оцінка	0 з можливих 10 (2%)

Питання 1

Правильно

Балів 1 з 1

Чоловік віком 48 років постраждав від ураження блискавкою. Під час огляду у пацієнта спостерігається: збудження, дезорієнтація, періодичні судоми. Артеріальний тиск --- 140/90 мм рт.ст., пульс --- 120/хв, дихання аритмічне. Які лікарські засоби треба призначити пацієнту терміново?

- a. Глюкокортикоїди
- b. Седативні
- c. Серцеві глюкозиди
- d. Теофілін
- e. Адреналін

Правильна відповідь: Седативні

Питання 2

Неправильно

Балів 0 з 1

При надзвичайних ситуаціях, таких, як масові промислові отруєння, для максимально ефективного надання допомоги найбільш можливій кількості постраждалих потрібно визначитись з необхідністю, черговістю та об'ємом надання медичної допомоги рятувальними службами. З цією метою використовується система медичного сортування "START". Який перший крок передбачає ця система?

- a. Зупинка кровотечі, потерпілим, які цього потребують
- b. Оцінка самостійного дихання і спонтанного кровообігу
- c. Оцінка рівня свідомості і психічного стану
- d. Заповнення реєстраційних форм про НС
- e. Оцінка можливості самостійно пересуватись

Правильна відповідь: Оцінка можливості самостійно пересуватись

Питання 3

Правильно

Балів 1 з 1

Декілька працівників фармацевтичного підприємства під час пожежі виявилися заблокованими без можливості самостійної евакуації. Засоби індивідуального захисту на випадок пожежі також були недоступними. Після евакуації рятувальниками до безпечного місця потерпілі мали такі симптоми: запаморочення, порушення зору, нудоту, часте дихання, задишку, вишневий колір обличчя. Для якого виду гіпоксії характерні такі симптоми?

- a. Тканинна
- b. Циркуляторна
- c. Токсична
- d. Гемічна
- e. Респіраторна



Правильна відповідь: Гемічна

Питання 4

Правильно

Балів 1 з 1

У жінки, яка хворіє на дифузну форму токсичного зоба, після психоемоційного стресу погіршився стан. З'явилися скарги на сильний головний біль, серцебиття. Об'ективно: психічне та моторне збудження, профузний піт, шкірні покриви гіперемовані, фебрильна температура, частота серцевих скорочень - 150/хв., артеріальний тиск - 150/50 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки?

- a. Адреналовий криз
- b. Гострий гіперпаратиреоз
- c. Мікседематозна кома
- d. Пароксизм миготливої тахіаритмії
- e. Тиреотоксичний криз



Правильна відповідь: Тиреотоксичний криз

Питання 5

Неправильно

Балів 0 з 1

Пораненому, який надійшов до медичної роти бригади встановлено попередній діагноз: кульове поранення черевної порожнини, стан середнього ступеня тяжкості та рекомендована евакуація на наступний етап. Який документ у цьому випадку необхідно заповнити на пораненого?

- a. Евакуаційний конверт
- b. Первінну медичну карту
- c. Сортувальну марку
- d. Медичну книжку
- e. Історію хвороби

✖

Правильна відповідь: Первінну медичну карту

Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 55 років спостерігалися порушення мови та оніміння правої руки, що тривали протягом години. Лікар діагностував гостре порушення мозкового кровообігу. Який критерій буде головним для диференційної діагностики транзиторного і органічного порушення мозкового кровообігу у пацієнта?

- a. Наявність або відсутність крові у лікворі
- b. Ступінь вираженості вогнищової симптоматики
- c. Тривалість вогнищової симптоматики не більше, ніж одну добу
- d. Ступінь вираженості загальномозкової симптоматики
- e. Наявність або відсутність <> світлого проміжку<>

Правильна відповідь: Тривалість вогнищової симптоматики не більше, ніж одну добу

Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнтки віком 33 роки внаслідок розриву аневризми мозкових судин і крововиливу в ділянці стовбура головного мозку, виникла клінічна смерть. Який метод ШВЛ буде найменш ефективним під час проведення реанімаційних заходів?

- a. Метод Сільвестра
- b. Рот до рота
- c. З застосуванням мішка Амбу
- d. Рот до маски
- e. Рот до носа

Правильна відповідь: Метод Сільвестра

Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 49 років, який зловживає алкогolem, госпіталізований до хірургічного відділення для оперування грижі.

Наступного дня після успішної операції у пацієнта спостерігається порушення орієнтації, він метушливий, не впізнає лікаря, каже, що по шкірі повзають павуки, що він у в'язниці і його не випускають стіни. Об'єктивно виявлено: температура тіла --- 38 $^{\circ}$ C, тремор, озноб, пульс аритмічний, гіпергідроз, живіт спокійний. Для якого патологічного стану характерні такі симптоми?

- a. Післяопераційний психоз
- b. Гостра енцефалопатія Гайє-Верніке
- c. Алкогольний делірій
- d. Гострий алкогольний параноїд
- e. Гострий алкогольний галюциноз

Правильна відповідь: Алкогольний делірій

Питання 9

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У юнака віком 14 років, який перебуває у лікарні з діагнозом: гострий інфекційний ендокардит, раптово у нього з'явився інтенсивний біль у поперековій ділянці зліва. Спостерігається слабкість, нудота, здуття живота, гематурія, зниження добового діурезу, підвищення артеріального тиску. Пациєнту проведено знеболювання наркотичними анальгетиками. Для якого патологічного стану характері такі симптоми?

- a. Гострого піелонефриту
- b. Хронічного піелонефриту
- c. Кровотечі з сечового міхура
- d. Ниркової кольки
- e. Інфаркту лівої нирки

Правильна відповідь: Інфаркту лівої нирки

Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого лихоманка 38-39оС протягом 6-ти днів, головний біль, біль в м'язах, жовтяниця, носова кровотеча, олігоурія. Лейкоцити крові - 16,5 · 109/л, ШОЕ- 52 мм/год, аналіз сечі: білок - 0,125 г/л, лейкоцити - 15-20 в полі зору, еритроцити - 5-8 в полі зору, цилінди гіалінові - 2-3. Ваш діагноз:

- a. Лептоспіroz
- b. Сепсис
- c. Гострий гломерулонефрит
- d. Гострий піелонефрит
- e. Геморагічна гарячка

Правильна відповідь: Лептоспіroz

Питання 11

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 51-го року скаржиться на біль в періанальній ділянці та в зоні ануса, підвищення температури тіла до 39°C. Біль постійний, розпирального характеру. Об'ективно: в періанальній ділянці виявлено інфільтрат з нечіткими контурами, різко болючий, розповсюджується до прямої кишки. Шкіра над інфільтратом гіперемована. Пальцеве дослідження прямої кишки різко болюче. Поставте діагноз:

- a. Геморой
- b. Випадіння прямої кишки
- c. Атрезія ануса
- d. Гострий парапроктит
- e. Рак прямої кишки

Правильна відповідь: Гострий парапроктит

Питання 12

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 45-ти років п'ятнадцятирічний анамнез виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Протягом 7-ми днів спостерігалося багаторазове блювання вмістом шлунка, загальна слабкість. Пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст., тургор шкіри знижений, пальпаторно живіт дещо болючий в епігастрії. На рентгенограмі велика кількість рідини у шлунку. Поставте діагноз:

- a. Загострення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки
- b. Пілоростеноз
- c. Гостре розширення шлунка
- d. Шлунково-кишкова кровотеча
- e. Гостра кишкова непрохідність

Правильна відповідь: Пілоростеноз

Питання 13

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіку віком 83 роки ампутували нижню кінцівку на рівні стегна з приводу діабетичної стопи. За добу після оперативного втручання стан хворого почав раптово прогресивно погіршуватися. Порушилася свідомість, виникло часте поверхневе дихання, помірне оглушення, хворий став блідим, з'явився холодний піт. На ЕКГ спостерігається: суправентрикулярна тахікардія з ЧСС --- 188/хв, блокада правої ніжки пучка Гіssa, ознаки перенапруження правого шлуночка. Хірург припустив ТЕЛА і викликав реаніматолога. На момент огляду реаніматологом пацієнта на ЕКГ спостерігається: ізолінія, свідомість на рівні коми, пульс на магістральних судинах відсутній, дихання відсутнє. Які найперші дії має виконати реаніматолог?

- a. Електричну дефібриляцію
- b. В/в уведення метопрололу
- c. Оксигенотерапію
- d. Непрямий масаж серця
- e. В/в введення гепарину

Правильна відповідь: Непрямий масаж серця

Питання 14

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого на цироз печінки з синдромом порталової гіпертензії IV ступеня з'явилися випорожнення темного кольору, розвинулися різка слабкість та запаморочення. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., пульс - 110/хв. Який прогноз подальшого стану хворого?

- a. Розвиток гіперосмолярної коми
- b. Розвиток хронічної серцевої недостатності
- c. Розвиток ТЕЛА
- d. Розвиток печінкової коми
- e. Одужання

Правильна відповідь: Розвиток печінкової коми

Питання 15

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 46 років скаржиться на загальну слабкість, нудоту, рідкі дьогтеподібні випорожнення. Під час обстеження встановлено: пацієнт у свідомості, шкіра бліда, ЧСС --- 100/хв., АТ --- 105/60 мм рт. ст., ЧД --- 16/хв, тремор пальців рук, асцит, розширення вен передньої черевної стінки, печінка щільна +8 см, селезінка збільшена. У результаті аналізу крові виявлено: Hb --- 90 г/л, КП --- 0,95, білірубін --- 156 мкмоль/л, протромбін --- 65%. Визначте ймовірний діагноз та ускладнення, що виникло у пацієнта.

- a. Виразка шлунка, кровотеча
- b. Гепато-ренальна недостатність, кишкова кровотеча
- c. Цироз печінки, шлункова кровотеча з варикозно-розширених вен
- d. Неспецифічний виразковий коліт, кишкова кровотеча
- e. Хронічний гепатит, кровотеча з гемороїдальних вен

Правильна відповідь: Цироз печінки, шлункова кровотеча з варикозно-розширених вен

Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На місті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з пошкодженої автівки вилучено дитину 10-ти років з численними забоями та відкритим переломом гомілки. При огляді спостерігаються задуха, ціаноз шкіри. Права половина грудної клітини не бере участі у диханні. Перкуторно над нею визначається високий тимпаніт, аускультивно дихання не прослуховується, межі серцевої тупості зміщено вліво. Тони серця глухі, прискорені. Ви діагностували напруженій правобічний пневмоторакс. Якими будуть Ваші дії?

- a. Негайно транспортувати постраждалу дитину до лікарні
- b. Призначити оксигенотерапію
- c. Негайна декомпресія правої плевральної порожнини
- d. Розпочати штучну вентиляцію легень (ШВЛ)
- e. Призначити кордіамін підшкірно

Правильна відповідь: Негайна декомпресія правої плевральної порожнини

Питання 17

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 50-ти років, шкіряник, звернувся в поліклініку зі скаргами на підвищення температури до 38,5оС, головний біль, виражений безболісний набряк в ділянці тилу лівої кисті, наявність виразки з чорною кірочкою. За три дні до захворювання поранив руку на роботі. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Еризипелоїд
- b. Туляремія
- c. Сибірка
- d. Стафілококовий карбункул
- e. Бешиха

Правильна відповідь: Сибірка

Питання 18

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 30-ти років помилково випила кілька ковтків оцтової есенції. Після надходження до лікарні на наступну добу в неї знизвіся діурез, сеча набула червоно-коричневого кольору. Причиною ураження нирок в цій ситуації є:

- a. Шлункова кровотеча
- b. Метаболічний ацидоз
- c. Гострий гемоліз
- d. Дегідратація
- e. Пряма дія оцтової кислоти

Правильна відповідь: Гострий гемоліз

Питання 19

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 45-ти років після конфліктної ситуації на роботі відчула інтенсивний головний біль, була нудота та неодноразове блювання. До цього вважала себе здорововою. Об'єктивно: свідомість ясна, артеріальний тиск – 160/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень – 70/хв., серцева діяльність ритмічна, загальна гіперестезія, фото-фонофобія, ригідність м'язів потилиці. Парезів та інших неврологічних розладів не виявлено. Найбільш імовірний діагноз:

- a. Істеричний невроз
- b. Ішемічний інсульт
- c. Менінгіт
- d. Гостра гіпertonічна енцефалопатія
- e. Субарахноїдальний крововилив

Правильна відповідь: Субарахноїдальний крововилив

Питання 20

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого, що перебуває у стані септичного шоку, який виник на тлі менінгококової інфекції, проведене дослідження біохімічних показників плазми крові. Який з показників свідчить про наявність тяжкої тканинної гіпоперфузії?

- a. Лактат плазми крові 5,7 ммоль/л
- b. Іонізований калій плазми крові 2,8 ммоль/л
- c. Сечовина плазми крові 16,1 ммоль/л
- d. Глюкоза плазми крові 13,4 ммоль/л
- e. Загальний протеїн плазми крові 52 г/л

Правильна відповідь: Лактат плазми крові 5,7 ммоль/л

Питання 21

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До приймального відділення доставлено дитину віком 12 років зі скаргами на сухість у роті, світлобоязнь та порушення зору. Об'єктивно спостерігається: шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. Під час подальшого обстеження було встановлено діагноз: отруєння алкалоїдами беладонни. Який із лікарських засобів доцільно застосувати для надання допомоги дитині?

- a. Неостигмін
- b. Пілокарпін
- c. Дипіроксим
- d. Армін
- e. Діазепам

Правильна відповідь: Неостигмін

Питання 22

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпілий 32-х років був водієм легкового автомобіля, що перевернувся і зайнявся. Спостерігалася короткочасна втрата свідомості. Об'єктивно: анізокорія. Тахіпное до 30/хв. Крепітація 6-10 ребер зліва по передній пахтовій лінії. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Деформація правого передпліччя в нижній третині за типом "багнета", гематома. Має місце опікова рана грудей, тулуба та стегон, площею 36% з наявністю великої кількості епідермальних пухирів що прорвалися. Який вид травми у хворого?

- a. Монолокальна
- b. Множинна
- c. Комбінована
- d. Поєднана
- e. Поліфокальна

Правильна відповідь: Комбінована

Питання 23

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При наданні невідкладної допомоги хлопцю 7-ми років із гострою крововтратою до 10% ОЦК, яка зумовлена ушкодженням вен нижньої кінцівки, необхідно відновити обсяг циркулюючої крові. Оберіть оптимальний інфузійний розчин:

- a. Цільна кров
- b. Реополіглюкін
- c. Розчин глюкози
- d. Кристалоїди
- e. Свіжозаморожена плазма

Правильна відповідь: Кристалоїди

Питання 24

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 55-ти років впродовж 2-х місяців спостерігалася сеча червоного кольору, схуд на 5 кг. В загальному аналізі крові: еритроцити - 3,7 · 1012/л, Hb- 100 г/л, кольоровий показник - 0,9, лейкоцити - 4,5·109/л, швидкість осідання еритроцитів - 45 мм/год. В загальному аналізі сечі: білок - 0,165 г/л, лейкоцити - 3-4 в п/з, еритроцити - 10-15 вп/з. На УЗД нирок: розміри правої нирки - 150x80 мм, в паренхімі спостерігається гіпоекогенна зона 20 мм в діаметрі, без чітких контурів. Яке обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?

- a. Комп'ютерна томографія
- b. Оглядова урографія
- c. Проба Реберга-Тареєва
- d. Хромоцистоскопія
- e. Проба з водним навантаженням

Правильна відповідь: Комп'ютерна томографія

Питання 25

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На виробництві мінеральних добрив працівники скаржаться на різкий біль у порожнині рота та стравоході. Під час огляду виявлено: губи та слизова оболонка порожнини рота набряклі, з жовтуватим відтінком. Яка кислота ймовірно викликала отруєння працівників?

- a. Хлористоводнева
- b. Оцтова
- c. Сірчана
- d. Азотна
- e. Фосфорна

Правильна відповідь: Азотна

Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Рядовий 20-ти років поранений осколком міни в шию. На передній поверхні шиї кровоточива рана 1x1 см, з виділенням бульбашок повітря, підшкірна емфізема. Дихання утруднене. Кашель. Пульс - 100/хв. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Які невідкладні дії треба застосувати для припинення розвитку асфіксії?

- a. Призначення протикашльових препаратів
- b. Киснева терапія
- c. Штучна вентиляція легенів методом "rot в rot"
- d. Трахеостомія через рану
- e. Введення дихальних аналептиків

Правильна відповідь: Трахеостомія через рану

Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпілого було витягнуто з автомобіля після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Скаржиться на біль у шийному відділі хребта, який посилюється під час рухів головою. Вкажіть, який метод транспортної іммобілізації потрібен при даному пошкодженні:

- a. Положення хворого на спині з валиком під головою
- b. Положення хворого на жорстких ношах з валиком під шию
- c. Іммобілізація жорстким головоутримувачем
- d. Положення хворого на животі на жорстких ношах
- e. Іммобілізація шиною Крамера від потилиці до поперекового відділу хребта

Правильна відповідь: Іммобілізація жорстким головоутримувачем

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальне відділення лікарні доставлено вагітну жінку (38 тижнів) з клінікою гострого ілеофеморального тромбозу. Який із вказаних симптомів найбільше відповідає даному захворюванню?

- a. Набряк стегна і гомілки
- b. Нудота і бл涓ання
- c. Біль у паховій ділянці
- d. Набряк гомілки
- e. Гектична температура

Правильна відповідь: Набряк стегна і гомілки

Питання 29

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 45-ти років страждає на хронічну надниркову недостатність внаслідок туберкульозу наднирників. Під час відпочинку після тривалого перебування на сонці у нього посилилася загальна слабкість, тахікардія досягла 150/хв., артеріальний тиск знизився до 70/20 мм рт.ст., з'явилися олігурія, адінамія, нудота, блювання, біль у животі, депресія. Який діагноз найбільш імовірний у даного хворого?

- a. Гостра наднирникова недостатність
- b. Гостра печінкова недостатність
- c. Гостра серцева недостатність
- d. Сонячний удар
- e. Гостра ниркова недостатність

Правильна відповідь: Гостра наднирникова недостатність

Питання 30

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальному відділенні лікарні чоловік віком 30 років скаржиться на інтенсивний <<кинжалний>> біль в епігастрії, тошноту та загальну слабкість. Захворів раптово 2 години тому. З анамнезу відомо, що виразкового ураження ШКТ не було. Об'єктивно спостерігається: загальний стан відносно середнього ступеню тяжкості, температура тіла --- 37,0°C, пульс --- 110/хв, АТ --- 100/70 мм рт. ст. Живіт в акті дихання участі не бере, напруженій. <<Печінкова тупість>> не визначається. Симптомом подразнення брюшини позитивний у всіх відділах. Для якого патологічного стану характерні такі симптоми?

- a. Загострення виразкової хвороби шлунку
- b. Гострий панкреатит. Асцит
- c. Гострий апендицит. Локальний перитоніт
- d. Перфорація порожнистого органа. Болювий синдром
- e. Розрив аневризми аорти. Геморагічний шок

Правильна відповідь: Перфорація порожнистого органа. Болювий синдром

Питання 31

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 39 років скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C , озноб, профузне потовиділення. Захворів 2 дні тому після переохолодження. Симптом Пастернацького різко позитивний з обох боків. Результати аналізу крові такі: лейкоцити --- $15\cdot10^9/\text{l}$, ШОЕ --- 25 мм/год, еритроцити --- 2%, паличкоядерні --- 15%, сегментоядерні --- 45%, лімфоцити --- 30%, моноцити --- 8%. Результати аналізу сечі: питома вага --- 1011, білок --- 0,135 г/л, лейкоцити --- вкривають усе поле зору мікроскопа, еритроцити --- 8--10 у полі зору мікроскопа, слиз +++, бактерії +++. Встановіть діагноз.

- a. Амілоїдоз нирок
- b. Підгострий гломерулонефрит
- c. Гострий двобічний гломерулонефрит
- d. Гострий двобічний пієлонефрит
- e. Хронічний пієлонефрит

Правильна відповідь: Гострий двобічний пієлонефрит

Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіка віком 48 років було звільнено з-під уламків будівлі. У постраждалого об'єктивно спостерігається: слабкість, тахікардія, різкий біль під час пальпації кісток таза, неможливість підняти кінцівки від підлоги. Попередній діагноз: перелом кісток таза. Який вид транспортування треба використати у цьому разі?

- a. У положенні лежачи на животі
- b. На ношах у напівсидячому положенні
- c. На жорстких ношах з приведеними ногами
- d. На жорстких ношах в положенні Волковича
- e. У положенні сидячі

Правильна відповідь: На жорстких ношах в положенні Волковича

Питання 33

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У роділлі 36-ти років, яка перебуває в кінці I періоду пологів з великим плодом, з'явилися потуги при високому розташуванні голівки плода, відсутність поступального руху голівки, позитивний симптом Генкеля-Вастена, симптоми вдавлення сечового міхура. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Слабкість пологової діяльності
- b. Клінічно вузький таз
- c. Анатомічно вузький таз
- d. Фізіологічний I період пологів
- e. Дискоординована пологова діяльність

Правильна відповідь: Клінічно вузький таз

Питання 34

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінку віком 28 років, у терміні вагітності 23---24 тижні, госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії пологового будинку. Пацієнта перебуває в стані геморагічного шоку через вагінальну кровотечу, зумовлену передчасним відшаруванням плаценти. Анамнез зібраний не вдається через тяжкий стан пацієнтки. Зі слів родичів, вагітність перша, протікала без особливостей. Однак вагітна хворіє на артеріальну гіпертензію II ст. Об'єктивно встановлено: свідомість відсутня, пульс ниткоподібний, артеріальний тиск виміряти не вдається. За 2 хвилини після приїзду до лікарні на кардіомоніторі зафіксовано фібриляцію шлуночків. Негайно розпочато компресії грудної клітки. Які повинні бути найперші невідкладні дії лікаря?

- a. Переливання резус-сумісної крові
- b. Проведення медикаментозної кардіоверсії
- c. Уведення адреналіну, дефібриляція протипоказана
- d. Уведення окситоцину, електрична дефібриляція
- e. Проведення електричної дефібриляції

Правильна відповідь: Проведення електричної дефібриляції

Питання 35

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У породіллі в ранньому післяпологовому періоді виник геморагічний шок у зв'язку з гіпотонічною кровотечею, що триває, незважаючи на лікування, крововтрати становить 1400 мл. Якою буде лікарська тактика?

- a. Оперативне лікування
- b. Лікування порушеної функції нирок
- c. Лікування геморагічного шоку паралельно з оперативною зупинкою кровотечі
- d. Наркоз і проведення інтенсивної терапії
- e. Лікування геморагічного шоку

Правильна відповідь: Лікування геморагічного шоку паралельно з оперативною зупинкою кровотечі

Питання 36

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У доношеної здорової дитини через 8 годин після пологів з'явила субіктеричність шкірних покривів. Дитина від третьої вагітності, других термінових пологів. Перша вагітність закінчилася абортом. Група крові матері II(A), резус "-", дитини A (II), резус "+". Пуповинний білірубін - 56 мкмоль/л. Через 4 годин - 84 мкмоль/л. Дитина на грудному вигодовуванні. Який імовірний Ваш діагноз?

- a. Жовтяниця, пов'язана з грудним молоком
- b. Гепатит
- c. Фізіологічна жовтяниця
- d. Гемолітична хвороба новонародженого
- e. Атрезія жовчних протоків

Правильна відповідь: Гемолітична хвороба новонародженого

Питання 37

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 32 роки, який госпіталізований до лікарні з діагнозом: лептоспіроз, розвинувся септичний шок. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкіри і слизових, центральний венозний тиск --- 20 мм вод. ст., артеріальний тиск --- 80/40 мм рт. ст. Які лікарські засоби з наведених нижче треба додати до інтенсивної терапії?

- a. Вазодилататори
- b. Аналгетики
- c. Симпатоміметики
- d. Діуретики
- e. Гепарин

Правильна відповідь: Симпатоміметики

Питання 38

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 28-ми років, білява, з блакитними очима, рудим волоссям була на відкритому сонці у липні місяці з 10 ранку до 15 години. Наступного дня шкіра відкритих ділянок, що перебували на сонці – гіперемована, з набряком, на тлі еритеми – множинні бульозні елементи. Висипка супроводжується болем та печінням. Поставте діагноз:

- a. Справжня екзема
- b. Герпетиформний дерматоз Дюрінга
- c. Простий контактний дерматит
- d. Алергічний дерматит
- e. Акантолітична пухирчатка

Правильна відповідь: Простий контактний дерматит

Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Підліток 15-ти років доставлений до лікарні у стані непритомності. В анамнезі: часте блювання, блювотні маси чорного кольору, мелена. При огляді: блідість шкірних покривів. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. Частота серцевих скорочень - 125/хв. Пульс ниткоподібний. Тони серця приглушенні, ритмічні. Живіт при пальпації м'який. Який невідкладний стан розвинувся у хворого?

- a. Шлунково-кишкова кровотеча
- b. Непритомність
- c. Гостра судинна недостатність
- d. Гостра серцева недостатність
- e. Колапс

Правильна відповідь: Шлунково-кишкова кровотеча

Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Моряк, який повернувся із закордонного плавання, скаржиться на високу температуру тіла до 40\$^o\$C та кашель із пінистою іржавою мокротою. Об'єктивно встановлено: блідий, ціаноз слизових, ЧД --- 30/хв, тахікардія, дихання в легенях ослаблене, поодинокі вологі хріпи, крепітація. Попередній діагноз: чума, первинно-легенева форма. Який лікарський засіб треба призначити пацієнту?

- a. Стрептоміцин
- b. Пеніцилін
- c. Інфліксимаб
- d. Людський імуноглобулін
- e. Цефтіаксон

Правильна відповідь: Стрептоміцин

Питання 41

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хлопчика 9-ти років після перенесеної ГВВІ з'явилися полідипсія, поліурія, слабкість, нудота. При обстеженні: свідомість потъмарена, шкіра суха, очні яблука м'які, дихання Куссмауля, запах ацетону з рота, серцеві тони глухі, живіт м'який, неболючий. Глюкоза крові - 19 ммоль/л. Які цукрознижувальні препарати слід призначити в комплексній терапії?

- a. Інсулін середньої дії
- b. Препарати сульфонілсечовини
- c. Інсулін пролонгований
- d. Бігуаніди
- e. Інсулін короткої дії

Правильна відповідь: Інсулін короткої дії

Питання 42

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На підприємстві з виробництва ртутних термометрів один з працівників порушив правила техніки безпеки, внаслідок чого відбувся витік парів ртуті у великому об'ємі. Усі потерпілі працівники були негайно доставлені до приймального відділення найближчої лікарні з діагнозом гостре отруєння парами ртуті. Який антидотний засіб використав лікар для невідкладної допомоги?

- a. Дипіроксим
- b. Прозерин
- c. Налоксон
- d. Пілокарпін
- e. Унітіол

Правильна відповідь: Унітіол

Питання 43

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До яких захворювань призводить недіагностована чи несвоєчасно пролікова гіпоглікемія у новонароджених і дітей раннього віку?

- a. Розладів функціонування міокарду
- b. Розладів функціонування печінки
- c. Розладів функціонування ЦНС
- d. Розладів функціонування нирок
- e. Розладів функціонування підшлункової залози

Правильна відповідь: Розладів функціонування ЦНС

Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У військовий польовий шпиталь надійшло 8 солдат з місця події. У потерпілих відзначається слабкість, нудота, гіркота у роті, слинотеча. В одного бійця шкіра та слизові оболонки яскраво-червоного кольору, брадипное, брадикардія, судомі. Зі слів потерпілих, на місці події відзначався різкий запах гіркого мигдалю. Найімовірніше, отруйною речовиною є:

- a. Зарин
- b. Іприт
- c. Фосген
- d. Зоман
- e. Синильна кислота

Правильна відповідь: Синильна кислота

Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час проведення закритого масажу серця з'явився специфічний хрускіт, який свідчить про перелом ребер. Яка тактика лікаря стосовно продовження заходів серцево-легеневої реанімації?

- a. Продовжувати масаж, нічого не змінюючи
- b. Продовжити масаж, встановивши основи долонь на груддину
- c. Припинити масаж внаслідок небезпеки розвитку кардіопульмонального шоку
- d. Припинити масаж серця і ввести адреналіну гідрохлорид внутрішньовенно
- e. Виконати новокаїнову блокаду місць переломів і продовжити масаж серця

Правильна відповідь: Продовжити масаж, встановивши основи долонь на груддину

Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 39 років одразу після щеплення від грипу розвинувся анафілактичний шок. Який із наведених препаратів треба увести насамперед?

- a. Кофеїн
- b. Мезатон
- c. Налоксон
- d. Строфантин
- e. Адреналін

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 47

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 10-місячної дитини внаслідок порушення правил вигодовування виникло багаторазове блювання, рідкі випорожнення 20 разів на добу. При огляді сімейним лікарем дитина різко загальмована, дихання стогнуче. Втрата маси тіла понад 10%. Велике тім'ячко та очні яблука запалі, слизові сухі. Тургор шкіри знижений, шкіра з мармуровим малюнком. Час заповнення капілярів становить 6 сек. ЧСС- 182/хв., АТ- 73/24 мм рт.ст., ЧДР- 66/хв. Останнє сечовипускання було 18 годин тому. Який імовірний діагноз?

- a. Кардіогенний шок
- b. Синдром Рея
- c. Помірне зневоднення
- d. Септичний шок
- e. Гіповолемічний шок

Правильна відповідь: Гіповолемічний шок

Питання 48

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Студент 15 хвилин тому в хімічній лабораторії випадково пролив собі на стегна розчин гідроксиду натрію. При огляді: на обох стегнах по передніх та бічних поверхнях плями неправильної форми, яскраво червоного кольору, вологі, з набряком навколошніх тканин, чутливість різко знижена. Яку невідкладну допомогу слід надати?

- a. Накладання асептичної пов'язки
- b. Промивання водою протягом тривалого часу
- c. Промивання 2% розчином лимонної кислоти
- d. Обробка місця опіку розчинами антисептиків
- e. Введення наркотичних анальгетиків

Правильна відповідь: Промивання водою протягом тривалого часу

Питання 49

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 24-х років через 2 тижні після пологів з'явився біль у лівій нижній кінцівці. Ліве стегно і гомілка різко збільшилися в об'ємі за рахунок набряку. Спостерігається синюшність шкірних покривів. Пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий артеріальний тромбоз
- b. Ілеофеморальний тромбоз
- c. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен
- d. Попереково-крижовий радикуліт
- e. Облітеруючий ендarterіїт

Правильна відповідь: Ілеофеморальний тромбоз

Питання 50

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Постраждалий віком 19 років у непритомному стані госпіталізований з місця ДТП. Об'ективно встановлено: свідомість відсутня, у відповідь на бальові подразники мимовільно з'являється тонічне напруження м'язів із випростовуванням рук і ніг та закиданням голови назад, двосторонні стопні патологічні рефлекси. Дихання <<машинне>>, пульс --- 110/хв, артеріальний тиск --- 160/100 мм рт. ст., температура тіла --- 37,9°C Встановіть попередній діагноз.

- a. Менінгіт
- b. Гостре порушення мозкового кровообігу
- c. Внутрішньочерепна гематома
- d. Аневризма судин головного мозку
- e. Забій головного мозку важкого ступеня

Правильна відповідь: Забій головного мозку важкого ступеня

Питання 51

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 47 років скаржиться на збільшення температури тіла до 39°C , загальну слабкість, виражену задишку, непродуктивний кашель, відчуття важкості й повноти в правій половині грудної клітки. Об'єктивно встановлено: пацієнт лежить на правому боці, акроціаноз, відставання правої половини грудної клітки в акті дихання, притуплення перкуторного звуку справа до рівня II ребра. Встановіть попередній діагноз.

- a. Масивний ексудативний плеврит
- b. Масивний ексудативний перикардит
- c. Спонтанний пневмоторакс справа
- d. Правобічна крупозна пневмонія
- e. Міліарний туберкульоз

Правильна відповідь: Масивний ексудативний плеврит

Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 15-ти років. На цукровий діабет хворіє 10 років. Протягом останнього тижня хворіла на ентероколіт, скаржилася на слабкість, поліурію. Сьогодні з'явилися галюцинації, олігурія, втрата свідомості. Відзначаються судоми. Шкіра і слизові оболонки сухі, бліді, тургор знижений. Язык сухий. Гіпертонус м'язів, визначаються менінгеальні знаки. Очні яблука м'які. З роту запаху ацетону немає. Дихання - часте, поверхневе. Тони серця - глухі до 110/хв. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. Живіт м'який. З якого розрахунку Ви призначите початкову дозу інсуліну?

- a. 0,1 ОД/кг маси тіла в/в струминно
- b. 0,5 ОД/кг маси тіла в/в крапельно
- c. 0,1 ОД/кг маси тіла п/ш
- d. 0,5 ОД/кг маси тіла в/в струминно
- e. 0,1 ОД/кг/год маси тіла в/в крапельно

Правильна відповідь: 0,1 ОД/кг маси тіла в/в струминно

Питання 53

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 56 років, яка протягом 12 років хворіє на гіпертонічну хворобу, скаржиться на раптовий головний біль, нудоту, загальну слабкість. Під час огляду спостерігається: гіперемія обличчя, приглушення серцевих тонів, ЧСС --- 86/хв, АТ --- 180/110 мм рт. ст. Який із наведених лікарських засобів треба застосовати для надання медичної допомоги на догоспітальному етапі?

- a. Каптоприл
- b. Дексаметазон
- c. Преднізолон
- d. Нітроглцерин
- e. Пентамін

Правильна відповідь: Каптоприл

Питання 54

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта, який хворіє на виразкову хворобу дванадцятипалої кишki, на тлі вживання алкоголю з'явилися різка слабкість, запаморочення та блювання <<кавовою гущею>>. Об'єктивно спостерігається: обличчя бліде, шкіра волога. Артеріальний тиск --- 80/50 мм рт. ст., пульс --- 120/хв. Лікар діагностував шлунково-кишкову кровотечу, геморагічний шок. Які показники треба дослідити для визначення величини крововтрати?

- a. Уміст сечовини та креатиніну в сироватці крові
- b. Співвідношення нейтрофілів та лімфоцитів крові
- c. Уміст гемоглобіну, гематокрит
- d. Уміст хлору, натрію, кальцію в сироватці крові
- e. Парціальний тиск кисню у венозній крові

Правильна відповідь: Уміст гемоглобіну, гематокрит

Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт 40-ка років раптово, виходячи з тролейбуса, падає на землю. У нього відсутнє самостійне дихання, та пульсація на магістральних артеріях, розширені зіници. Ваш діагноз:

- a. Гострий інфаркт міокарда
- b. Запаморочення
- c. Ортостатичний колапс
- d. Клінічна смерть
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

Правильна відповідь: Клінічна смерть

Питання 56

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта віком 45 років на шосту добу гострого інфаркту міокарда раптово розвинулася виражена задишка та кашель із виділенням рожевого мокротиння. Об'єктивно встановлено: набухання шийних вен, пульс --- 110/хв., АТ --- 85/55 мм рт. ст., акцент II-го тону над легеневою артерією. Яка причина погіршення стану пацієнта?

- a. Синдром Дресслера
- b. Ателектаз легень
- c. Гостра лівошлуночкова недостатність
- d. Пневмонія
- e. Повторний інфаркт міокарда

Правильна відповідь: Гостра лівошлуночкова недостатність

Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 30-ти років швидкою допомогою доставлена у непрітомному стані з місця автоаварії. Об'єктивно: свідомість відсутня, на більові подразники або спонтанно з'являється тонічне напруження м'язів з випростуванням рук і ніг та закиданням голови назад, двосторонні стопні патологічні рефлекси. Дихання Чейн-Стокса, пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., температура - 37,9°C. Назвіть найбільш імовірний діагноз:

- a. Гостре порушення мозкового кровообігу
- b. Забій головного мозку важкого ступеня
- c. Менінгіт
- d. Аневризма судин головного мозку
- e. Внутрішньочерепна гематома

Правильна відповідь: Забій головного мозку важкого ступеня

Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки 29-ти років вдома відбулися стрімкі II пологи у терміні 36 тижнів вагітності. Народився живий хлопчик масою 2300,0 г. Лікар швидкої допомоги, який був викликаний, при огляді породіллі зазначив, що послід не виділився (після народження дитини пройшло 40 хвилин). Ознак кровотечі немає. Яку допомогу повинен надати лікар швидкої допомоги?

- a. Ввести в/в 10 ОД окситоцину і дочекатися виділення посліду
- b. Негайно транспортувати жінку до полового відділення III рівня
- c. Негайно транспортувати жінку до полового відділення II рівня
- d. Провести ручне відділення посліду
- e. Негайно транспортувати жінку і дитину до найближчого полового відділення

Правильна відповідь: Негайно транспортувати жінку і дитину до найближчого полового відділення

Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка діагностовано клінічні ознаки напруженого пневмотораксу. Екстрена допомога у разі цієї патології --- пункція плевральної порожнини у:

- a. V-VI міжребер'ї по середній аксилярній лінії на боці ураження
- b. VIII-IX міжребер'ї по задній аксилярній лінії на здоровому боці
- c. II міжребер'ї по середньоключичної лінії на здоровому боці
- d. II міжребер'ї по середньоключичної лінії на боці ураження
- e. VIII-IX міжребер'ї по задній аксилярній лінії на боці ураження

Правильна відповідь: II міжребер'ї по середньоключичної лінії на боці ураження

Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хлопець віком 16 років захворів раптово. Скаржиться на біль у животі, часті, мізерні, рідкі випорожнення з домішками слизу та прожилками крові, тенезми. Об'ективно спостерігається: температура тіла --- 38 $^{\circ}$ C, болюча та спазмована сигмовидна кишка. У копограмі виявлено слиз, лейкоцити, еритроцити. Яке з наведених досліджень є найінформативнішим для встановлення діагнозу?

- a. Рентгеноскопія шлунку
- b. Визначення гемоглобіну
- c. Бактеріологічне дослідження випорожнень
- d. Ректороманоскопія
- e. Визначення гематокриту

Правильна відповідь: Бактеріологічне дослідження випорожнень

Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У шестирічної дитини раптово підвищилася температура тіла до $39,0^{\circ}\text{C}$, з'явився біль у м'язах, першіння в горлі. На 2-гу добу з'явився сухий кашель та біль за грудиною. Батьки займалися самолікуванням дитини та використовували аспірин. На 5-ту добу у дитини зберігається підвищена температура тіла та з'явилося блювання. Об'ективно спостерігається: дитина збуджена, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 2 см. Яке імовірне ускладнення розвинулось у дитини?

- a. Медикаментозне отруєння
- b. Енцефаліт
- c. Синдром Рея
- d. Пневмонія
- e. Геморагічний інсульт

Правильна відповідь: Синдром Рея

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 75 років через 2 години після парентерального введення 1 мл 0,1%-го розчину атропіну виник різкий біль у надлобковій ділянці та в ділянці промежини, що іrrадіює у весь живіт. Спостерігається здуття живота, відсутність сечовипускання. В анамнезі --- adenoma передміхурової залози. Яку лікувальну процедуру треба провести насамперед?

- a. УЗД органів черевної порожнини
- b. Пункцію сечового міхура
- c. Катетерізацію сечового міхура
- d. Цистоскопію
- e. Лапароскопію

Правильна відповідь: Катетерізацію сечового міхура

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 56-ти років госпіталізований з приводу гострої затримки сечі. 15 років хворіє на хронічний простатит. При пальцевому ректальному дослідженні простата розмірами 2х2 см, симетрична, щільна, неболюча, дно сечового міхура - на 5 см вище лобкової кістки. При УЗД: сечовий міхур переповнений, залишкова сеча - 450 мл, простата розмірами - 23x24 мм, з кальцинатами. Концентрація загального PSA - 2 нг/мл, креатиніну - 320 мкмоль/л. Визначте найбільш імовірний діагноз:

- a. Доброякісна гіперплазія простати
- b. Цистоцеле
- c. Нейрогенний сечовий міхур
- d. Рак простати
- e. Склероз простати, постренальна гостра ниркова недостатність

Правильна відповідь: Склероз простати, постренальна гостра ниркова недостатність

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної 29-ти років встановлений діагноз: вагітність 1, 32 тижня. Прееклампсія тяжкого ступеня. Який із перерахованих препаратів необхідно призначити для профілактики виникнення судом?

- a. Сульфат магнію
- b. Діазepam
- c. Ніфедипін
- d. Клонідину сульфат
- e. Бензогексоній

Правильна відповідь: Сульфат магнію

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Новонароджений дитині з тяжкою асфіксією під час народження проводиться реанімація в пологовому залі. Після 40 секунд проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень 100% киснем у дитини встановлено ЧСС --- 50/хв. Яка подальша лікувальна тактика?

- a. Внутрішньовенно ввести розчин налоксону
- b. Внутрішньовенно ввести атропін
- c. Продовжувати штучну вентиляцію легень
- d. Внутрішньовенно ввести адреналін, продовжувати непрямий масаж серця
- e. Продовжувати непрямий масаж серця

Правильна відповідь: Продовжувати непрямий масаж серця

Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На полі бою знаходиться потерпілий з вогнепальним пораненням правого стегна, кінцівка в ділянці середньої третини деформована. З рані під коліном йде яскраво-червона кров. Ви діагностуєте вогнепальний перелом стегна з кровотечею зі стегнової артерії. Що слід першочергово здійснити на етапі домедичної допомоги потерпілому?

- a. Накласти джгут на середню третину стегна
- b. Накласти давлячу асептичну пов'язку на рану
- c. Накласти джгут на кінцівку вище місця перелому
- d. Накласти джгут на верхню третину стегна
- e. Іммобілізувати кінцівку

Правильна відповідь: Накласти джгут на кінцівку вище місця перелому

Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік унаслідок ДТП отримав закритий перелом тазових кісток та правої стегнової кістки. Лікарем екстреної (швидкої) медичної допомоги виконано транспортну іммобілізацію та знеболення. За годину після госпіталізації стан пацієнта різко змінився: виражена блідість шкіри, холодний липкий піт, пульс слабкий до 140/хв, АТ --- 60--70/0 мм рт. ст. Яка причина погіршення стану пацієнта?

- a. Травматичний шок
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Гострий інфаркт міокарда
- d. Струс головного мозку
- e. Кровотеча, що продовжується

Правильна відповідь: Кровотеча, що продовжується

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 2-х років під час їжі раптово почався напад надсадного гавкаючого кашлю, інспіраторна задишка, періо- ральний ціаноз, різка слабкість, дитина неспокійна, периферичний пульс слабкий, ЧСС- 146/хв, ЧД- 40/хв., втягнення піддатливих місць грудної клітки. Який лікувально-діагностичний метод необхідно застосувати у дитини?

- a. Бронхоскопія
- b. Бронхографія
- c. Пульсоксиметрія
- d. Гастродуоденоскопія
- e. Торакоцентез

Правильна відповідь: Бронхоскопія

Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої дитини після проведення всього комплексу реанімаційних заходів виявлено ознаки біологічної смерті. Яка подальша тактика лікаря?

- a. Продовжити реанімаційні заходи щонайменше 30 хв
- b. Перевірити правильність виконання основних реанімаційних заходів та продовжити реанімацію
- c. Продовжити реанімаційні заходи до 40 хв
- d. З'ясувати інші можливі причини незадовільної реакції немовляти на реанімацію і продовжувати її
- e. Припинити реанімацію

Правильна відповідь: Припинити реанімацію

Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 1,5 року з ознаками гострої респіраторної інфекції ввечері з'явилася інспіраторна задишка, "гавкаючий" кашель, захриплість голосу. Під час огляду: дихання стенотичне, інспіраторна задуха за участю допоміжної дихальної мускулатури, втягування поступливих ділянок грудної клітки. При аускультації дихання у легенях дифузно ослаблене. Тахікардія, випадання пульсової хвилі на вдиху. Поставте діагноз:

- a. Вірусний круп
- b. Стороннє тіло дихальних шляхів
- c. Обструктивний бронхіт
- d. Дифтерійний круп
- e. Пневмонія

Правильна відповідь: Вірусний круп

Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 29-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на кров'янисті виділення з піхви та біль у правій здухвинній ділянці. Остання менструація була 11 тижнів тому. Вміст ХГ у сироватці крові нижче за нормативні показники для передбачуваного терміну вагітності. За даними ультразвукового дослідження (УЗД) плідне яйце в порожнині матки не визначається. В Дугласовому просторі виявлено вільну рідину з гіперехогенними включеннями. При піхвовому дослідженні: нависання склепіння, "крик Дугласа". При пункциї заднього склепіння отримана кров, що не згортається. Поставте діагноз:

- a. Кровотеча з жовтого тіла яєчника
- b. Порушена позаматкова вагітність
- c. Аборт, що розпочався
- d. Міхурцевий занесок
- e. Перекрут кісти яєчника

Правильна відповідь: Порушена позаматкова вагітність

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Розривом міни бійця відкинуло лівим боком на кам'яну брилу, після чого він тимчасово втратив свідомість. Під час огляду блідий, постійно поривається сісти. Порушення цілісності ребер та кісток не виявлено. Живіт болючий в лівому підребер'ї, притуплення перкуторного звуку в бокових відділах. Артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст. Пульс - 120/хв. Який попередній діагноз?

- a. Тупа травма живота, розрив аневризми черевної частини аорти, геморагічний шок
- b. Тупа травма живота без пошкодження внутрішніх органів
- c. Тупа травма живота, розрив печінки, травматичний шок
- d. Закрита травма живота, розрив селезінки, геморагічний шок
- e. Закрита травма живота, розрив тонкої кишки, геморагічний шок

Правильна відповідь: Закрита травма живота, розрив селезінки, геморагічний шок

Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 30-ти років під час сильного кашлю виникли різка задишка та гострий біль в правій половині грудної клітки, який посилюється при диханні. Хворіє на бронхіт другу добу. Об'єктивно: артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 80/хв. Аускультивно: над легенями праворуч дихання не прослуховується. Який метод дослідження найбільш інформативний в цьому випадку?

- a. УЗД органів черевної порожнини
- b. Клінічний аналіз крові
- c. Рентгеноскопія ОГК
- d. УЗД серця
- e. ЕКГ

Правильна відповідь: Рентгеноскопія ОГК

Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Немовля віком 1 місяць. Протягом 10-ти діб має місце блювання, що виникає не після кожного прийому їжі, однак об'єм блювотних мас перевищує об'єм одноразового годування. Блювотні маси являють собою згорнуте материнське молоко з кислим запахом. Апетит не порушений, але вага тіла прогресивно зменшується. Найбільш імовірний діагноз:

- a. Інвагінація
- b. Пілоростеноз
- c. Гастроентерит
- d. Кишкова непрохідність
- e. Пухлина мозку

Правильна відповідь: Пілоростеноз

Питання 75

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної 40 тижнів під час запису ЕКГ раптово виникло відчуття задухи, головокружіння, блідість, миготіння "мушок" перед очима, артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. На ЕКГ - синусова брадикардія. Ваші першочергові дії:

- a. Дати вдихати пари аміачного спирту
- b. Катетеризувати вену та почати інфузію дофаміну з швидкістю 10 мкг/хв
- c. Катетеризувати вену та ввести 1 мг атропіну сульфату
- d. Забезпечити інгаляцію 100% кисню через носо-лицеву маску
- e. Повернути на лівий бік

Правильна відповідь: Повернути на лівий бік

Питання 76

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 48-ми років відчула біль в літкових м'язах. Спостерігається незначний набряк в ділянці щиколоток, гіперемія шкіри. Позитивний симптом Хоманса. Запідозreno тромбоз глибоких вен гомілки. Які діагностичні методи потрібно застосувати для підтвердження діагнозу?

- a. Радіонуклідне дослідження міченим фібриногеном
- b. Провести венографію
- c. Визначити надлишковий вміст фібрину-мономеру; продуктів деградації фібрину та фібриногену в плазмі
- d. Дослідити коагулограму або орієнтуватися на показники тромбоеластограми
- e. Дуплексне ультразвукове сканування венозних судин кінцівок

Правильна відповідь: Дуплексне ультразвукове сканування венозних судин кінцівок

Питання 77

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У десятимісячної дитини із діагнозом: септичний шок розвинувся геморагічний синдром (кровотеча з місць ін'єкцій, по шлунковому зонду надходить <<кавова гуща>>). Під час визначення показників гемостазу виявлено підвищення міжнародного нормалізаційного відношення, АЧТЧ, рівня D-димеру, а також зниження фібриногену та тромбоцитів. Діагностовано ДВЗ-синдром. Що насамперед треба призначити дитині для корекції гемостазу?

- a. Дезагреганти
- b. Хлорид кальцію
- c. Свіжозаморожену плазму
- d. Етамзилат натрію
- e. Вітамін K

Правильна відповідь: Свіжозаморожену плазму

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого на 5-й день хвороби спостерігаються гіперемія та набряк мигдаликів, щільні білі плівчасті нашарування, які не знімаються, набряк підшкірної клітковини шиї, загальний ціаноз шкіри, температура тіла - 38,8°C, задишка до 50/хв., шумне дихання, афонія, тахікардія - 140/хв., пульс не визначається, свідомість на рівні сопору. Який лікувальний захід показаний у першу чергу?

- a. Трахеостомія
- b. Парові лужні інгаляції
- c. Введення серцевих глікозидів
- d. Непрямий масаж серця
- e. Штучне дихання рот-до-рота

Правильна відповідь: Трахеостомія

Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 40-ка років надійшла у стаціонар зі скаргами на нудоту, бливоту з домішками жовчі, біль в ділянці серця, що триває 4 години, але слабшив після вживання нітрогліцерину. Об'єктивно: позитивні симптоми Кера, Мерфі, Ортнера-Грекова, артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., пульс - 100/хв. З анамнезу: хворіє на калькульозний холецистит, напередодні вживала жирну їжу. ЕКГ - без особливостей. Який імовірний діагноз?

- a. Інфаркт міокарду
- b. Стенокардія Принцметала
- c. Виразка шлунка
- d. Напад жовчної коліки
- e. Панкреонекроз

Правильна відповідь: Напад жовчної коліки

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 48-ми років скаржиться на наявність пульсуючого болю в ділянці інфільтрату промежини, температура тіла - 38,9оС. При огляді виявлено округлий інфільтрат зліва від ануса, шкіра над ним гіперемована. Per rectum: верхня межа інфільтрату вище гребінцевої лінії, пальпація його різко болісна. Ваш діагноз:

- a. Туберкульозний наплив в періанальній ділянці
- b. Кіста парапектальної ділянки
- c. Фурункул періанальної ділянки
- d. Нагноення епітеліальних куприкових ходів
- e. Гострий гнійний парапроктит

Правильна відповідь: Гострий гнійний парапроктит

Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дівчину віком 20 років, через 3 дні після з'ївлтування, шпиталізовано до психіатричного відділення. Під час клініко-психопатологічного обстеження у психічному статусі пацієнтки спостерігаються пригнічений настрій та підвищена тривога. Вона уникає спогадів та нездатна відтворити в пам'яті основні, важливі елементи травматичної ситуації. Скаржиться на труднощі із засинанням, нічні кошмири, пов'язані з психотравматичною подією, що постійно повторюються, неможливість сконцентрувати увагу, втрату колишніх інтересів і захоплень. Яке порушення психічного стану розвинулося в пацієнтки?

- a. Дисоціативна амнезія
- b. Неврастенія
- c. Посттравматичний стресовий розлад
- d. Змішаний тривожний і депресивний розлад
- e. Панічний розлад

Правильна відповідь: Посттравматичний стресовий розлад

Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 32-х років, праля, захворіла гостро 5 днів тому: озноб, гарячка, сильний головний біль, виражена слабість, безсоння. При огляді: температура тіла - 40°C, збуджена, гіперемія й одутлість обличчя, ін'екція судин склер, рясна розеольозно-петехіальна екзантема, тремор язика, тахікардія, гепатосplenомегалія. Виявлено педикульоз. Якою буде тривалість медичного спостереження за контактними особами?

- a. Впродовж 21 дня
- b. Спостереження не проводиться
- c. Впродовж 25 днів
- d. Впродовж 7 днів
- e. Впродовж 14 днів

Правильна відповідь: Впродовж 25 днів

Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 34 роки госпіталізований до стаціонару у тяжкому стані. У результаті клініко-лабораторних досліджень встановлено: фруктовий запах із рота, гіпотензія, дегідратація, електролітні порушення, гіперглікемія, кетонурія. Визначте ймовірний діагноз у пацієнта.

- a. Діабетичний кетоацидоз
- b. Гостра надниркова недостатність
- c. Нецукровий діабет
- d. Гіперосмолярний гіперглікемічний синдром
- e. Синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону

Правильна відповідь: Діабетичний кетоацидоз

Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка на 41-му тижні вагітності готується до екстреного оперативного втручання під загальним знеболенням. Під час інтубації трахеї у неї виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів, але виник ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, з'явилися вологі хрипи. Яка причина такого стану у пацієнтки?

- a. Набряк легень
- b. Інфаркт міокарду
- c. Емболія навколоплідними водами
- d. Аспірація кислого шлункового вмісту
- e. Шок

Правильна відповідь: Аспірація кислого шлункового вмісту

Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 56-ти років, раптово втратив свідомість. Об'єктивно: пульс на сонних артеріях відсутній, еккурсій грудної клітки немає. Розпочата термінова реанімація: зовнішній масаж та штучне дихання. Яке має бути співвідношення між числом компресій до частоти дихання у даного хворого для забезпечення оптимального співвідношення між кровотоком і доставкою кисню?

- a. 5:1
- b. 50:2
- c. 15:4
- d. 30:2
- e. 15:2

Правильна відповідь: 30:2

Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 11-ти місяців на тлі гострої респіраторної інфекції виник генералізований судомний напад тривалістю до 4 хвилини. При огляді шкіра гіперемована, гаряча, суха на дотик, температура тіла - 39,9°C. Вогнищевої неврологічної симптоматики не відмічається, ЕЕГ - варіант норми. В крові: Hb- 129 г/л, Ca - 2,4 ммоль/л, глюкоза - 6,0 ммоль/л. Який найбільш ймовірний діагноз?

- a. Фебрильні судоми
- b. Епілепсія
- c. Гіпоглікемія
- d. Менінгіт
- e. Спазмофілія

Правильна відповідь: Фебрильні судоми

Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки 35-ти років через вживання забруднених харчових продуктів в організм потрапила значна кількість радіоактивного йоду-131. Які заходи необхідні в першу чергу?

- a. Негайно промити шлунок
- b. Ретельно зібрати харчові продукти в закриту тару для подальшого аналізу
- c. Провести антибіотикотерапію для профілактики вторинної інфекції на тлі пригнічення імунітету
- d. Якнайшвидше розпочати йодну профілактику
- e. Негайно провести евакуацію жінки

Правильна відповідь: Якнайшвидше розпочати йодну профілактику

Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Солдат активний, рухливий, метушливий. Чинить опір обстеженню. Говорить швидко, голосно. Вислови спонтанні, непослідовні. Поставте діагноз:

- a. Ейфорія
- b. Психомоторне збудження
- c. Кататонічне збудження
- d. Аменція
- e. Делірій

Правильна відповідь: Психомоторне збудження

Питання 89

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 46 років із діагнозом: Q-інфаркт міокарда через 2 години після початку захворювання та проведення фібринолітичної терапії раптово знепритомнів, посинів, з'явилися судоми. Об'єктивно спостерігається: пульс та АТ не визначаються, на моніторі велика кількість альтернуючих хвиль подібних до QRS-комплексів. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Фібриляція шлуночків
- b. Фібриляція передсердь
- c. Гостра кровотеча
- d. Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія
- e. Ідіовентрикулярний ритм

Правильна відповідь: Фібриляція шлуночків

Питання 90

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини за 10 годин після народження з'явилися жовтяниця, гіпотонія, гіпоефлексія та виявлено помірну гепатосplenомегалію. Випорожнення та сеча звичайного кольору. Білірубін пуповинної крові --- 51 мкмоль/л за рахунок непрямого. Результати дослідження венозної крові такі: еритроцити --- $3,5 \cdot 10^{12}/\text{л}$, Hb --- 140 г/л, ретикулоцити --- 1,5%, білірубін --- 111 мкмоль/л, (прямий --- 11 мкмоль/л), АлАТ --- 40 Од, АсАТ --- 30 Од. Група крові матері --- A (II) Rh (--), дитини A(II) Rh (+). Яке лабораторне дослідження треба провести для уточнення діагнозу?

- a. Дослідження маркерів вірусного гепатиту
- b. Еритроцитометрію
- c. Пробу Кумбса
- d. Визначення осмотичної резистентності еритроцитів
- e. Визначення в еритроцитах глюкоз-6-фосфатдегідрогенази

Правильна відповідь: Пробу Кумбса

Питання 91

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 68-ми років виникла зупинка серця. Після інтубації і зовнішнього масажу серця у хворого з'явився пульс, артеріальний тиск - 40/0 мм рт.ст. Яке лікування буде оптимальним?

- a. Інфузія сольових розчинів
- b. Призначення альбуміну
- c. Інфузія допаміну
- d. Призначення еуфіліну
- e. Серцеві глікозиди

Правильна відповідь: Інфузія допаміну

Питання 92

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час проведення реанімаційних заходів у пацієнта із раптовою зупинкою сеця, який перебуває на стаціонарному лікуванні, протягом 5 хвилин спостерігається рефрактерна асистолія. Реаніматологу повідомили, що пацієнт перед зупинкою серця випадково отримав внутрішньовенну ін'єкцію 50 мл 4%-го калію хлориду замість 0,9%-го хлориду натрію. Який препарат треба терміново додати до комплексу реанімаційних заходів?

- a. 5 мл 3%-го кордарону внутрішньовенно
- b. 40 мл 40%-ї глюкози внутрішньовенно
- c. 10 мл 10%-го кальцію хлориду внутрішньовенно
- d. 10 мл аспаркаму внутрішньовенно
- e. 1 мл 0,025%-го дигоксину внутрішньовенно

Правильна відповідь: 10 мл 10%-го кальцію хлориду внутрішньовенно

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 19-ти річної жінки у III періоді пологів проведено ручне відокремлення та видалення посліду в зв'язку з інтимним прирошенням плаценти. Одразу після пологів з'явився гострий плевральний біль, занепокоєння, лихоманка, кашель. Шкірні покриви бліді, температура - 38,9°C, частота пульсу - 98/хв., артеріальний тиск - 100/70; 90/60 мм рт.ст., розпочалась маткова кровотеча, проте матка контурується. На ЕКГ - синусова тахікардія, гостре легеневе серце [SIQ III; P - pulmonale], парціальний тиск О₂ становить 64 мм рт.ст., тиск СО₂ -18 мм рт.ст. Встановіть діагноз:

- a. Емболія амніотичною рідиною
- b. Інфаркт міокарду
- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Синдром Мендельсона
- e. Повітряна емболія

Правильна відповідь: Емболія амніотичною рідиною

Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час вживання їжі у чоловіка раптово виникло стридорозне дихання, задишка понад 30/хв та втрата свідомості. Що могло спричинити гостру дихальну недостатність у пацієнта?

- a. Бронхоспазм
- b. Астматичний статус
- c. Гостре порушення мозкового кровообігу
- d. ГДН центрального генезу
- e. Обструкція трахеї стороннім тілом

Правильна відповідь: Обструкція трахеї стороннім тілом

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка на місці укусу бджоли швидко розвинувся значний набряк шкіри та м'яких тканин, спостерігається "гавкаючий" кашель, осипливість голосу, задишка та стридорозне дихання. Під час огляду виявлено: обличчя ціанотичне, збудження змінилося загальмованістю, різко збільшилася частота серцевих скорочень. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Напад бронхіальної астми
- b. Ангіоневротичний набряк
- c. Гострий респіраторний дистрес-синдром
- d. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- e. Напад епілепсії

Правильна відповідь: Ангіоневротичний набряк

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 25 із 80 відпочивальників у санаторії протягом доби виникло гостре кишкове захворювання, нез'ясованої етіології. Пацієнти харчувалися у різні зміни, страви обирали згідно з меню. Водопостачання у санаторії централізоване. Який шлях передачі найбільш імовірний при даному спалаху?

- a. Харчовий
- b. Водний
- c. Ґрунтовий
- d. Контактно-побутовий
- e. Артифіціальний

Правильна відповідь: Харчовий

Питання 97

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час пожежі чоловік 28-ми років вистрибнув із вікна 3-го поверху. При огляді лікарем швидкої медичної допомоги (ШМД) запідозрено компресійний перелом хребта. У якому положенні необхідно транспортувати потерпілого у лікарню?

- a. Положення з підведеним головним кінцем
- b. Положення на правому боці із згинанням лівої ноги
- c. Горизонтальне положення на спині на вакуумному матраці або твердій поверхні
- d. Положення на животі з підкладанням валика під живот
- e. Положення на лівому боці із згинанням правої ноги

Правильна відповідь: Горизонтальне положення на спині на вакуумному матраці або твердій поверхні

Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого з ГРВІ нарстають явища гострої дихальної недостатності, наявний біль в лівій половині грудної клітки, що посилюється на висоті вдоху. При аускультації виявлено ослаблення дихання ліворуч. Рентгенологічно: масивне затемнення аж до рівня III ребра, що було розцінено як ексудативний плеврит. З чого варто розпочати лікувальні заходи?

- a. Антибактеріальна + дегідратаційна терапія, за неефективності - пункция і дренування плевральної порожнини
- b. Дренування лівої плевральної порожнини в V-VI міжребер'ї по середній пахвовій лінії
- c. Пункция плевральної порожнини в II міжребер'ї по середньоключичній лінії
- d. Пункция плевральної порожнини в VII-VIII міжребер'ї по задній аксилярній лінії
- e. Симптоматична + антибактеріальна терапія

Правильна відповідь: Пункция плевральної порожнини в VII-VIII міжребер'ї по задній аксилярній лінії

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час огляду родилі спостерігається: пологова діяльність активна, положення плода поперечне, перша позиція. Результати вагінального обстеження такі: відкриття шийки матки на 8--9 см, випадіння ручки плода, відсутність серцевиття та рухів плода у матці. Якій тактиці ведення пологів треба надати перевагу у цьому разі?

- a. Плодоруйнівна операція
- b. Накладання акушерських щипців
- c. Ведення пологів природнім шляхом
- d. Вакуум-екстракція
- e. Кесарів розтин

Правильна відповідь: Плодоруйнівна операція

Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт, який хворіє на гемофілію А, отримав травму, що ускладнилася кровотечею. Які невідкладні заходи треба застосувати?

- a. Увести в/в кріопреципітат або препарати рекомбінантного фактору VIII
- b. Увести амінокапронову кислоту
- c. Увести антикоагулянти прямої дії
- d. Увести етамзилат натрію
- e. Перелити еритроцитарну масу

Правильна відповідь: Увести в/в кріопреципітат або препарати рекомбінантного фактору VIII

Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час святкування дня народження одному з гостей раптово стає погано: зблід, кашляє. Присутні підозрюють, що він вдихнув кістку з риби. Найбільш специфічним проявом наявності стороннього тіла гортані є:

- a. Напад інспіраторної ядухи
- b. Почеконіння обличчя
- c. Напад експіраторної ядухи
- d. Посиніння обличчя
- e. Розвиток гіпотонії

Правильна відповідь: Напад інспіраторної ядухи

Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 54-х років знайдений зимию вранці на вулиці. Скарги на пекучий біль, свербіння і "розпирання" пальців ніг. Об'єктивно: відчувається сильний запах алкоголю з роту, хворий агресивний, ступні набряклі, на фоні побілілої шкіри є червоно-фіолетові плями, декілька пухирів, наповнених світлою рідиною. Встановіть діагноз:

- a. Відмороження I ст.
- b. Відмороження III ст.
- c. Синдром позиційного здавлення ступні
- d. Відмороження II ст.
- e. Гострий тромбоз підколінної артерії

Правильна відповідь: Відмороження II ст.

Питання 103

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної жінки, яка скаржиться на переймоподібний біль унизу живота, спостерігаються кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Остання менструація була 2 місяці тому. Під час бімануального дослідження встановлено: матка болісна та збільшена до 5--6 тижнів вагітності, вагінальна частина шийки матки укорочена, розм'якшена, канал шийки матки розкритий, у цервіальному каналі розташовані елементи плідного яйця та згустки крові. Який патологочний стан розвинувся у жінки?

- a. Повний мимовільний аборт
- b. Загрозливий аборт
- c. Неповний мимовільний аборт
- d. Аборт у ходу
- e. Аборт, що невідбувся

Правильна відповідь: Аборт у ходу

Питання 104

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 27-ми років відзначає виділення з неприємним запахом зі статевих шляхів, біль в нижній частині живота, підвищення температури. Вищезазначені скарги з'явилися 2 дні тому. В анамнезі: тиждень тому жінці було виконано хірургічне переривання вагітності у терміні 8 тижнів. Огляд у дзеркалах: шийка матки чиста, з зовнішнього вічка виділення з неприємним запахом. Вагінальне дослідження: матка в антефлексіо, рухлива, болюча, дещо збільшена. Додатки без особливостей. Поставте діагноз:

- a. Ентероколіт
- b. Сальпінгоофорит
- c. Післяabortний ендометрит
- d. Гостре респіраторне захворювання
- e. Апендицит

Правильна відповідь: Післяabortний ендометрит

Питання 105

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки віком 32 роки з терміном вагітності 36 тижнів виникло блювання, що не зупиняється ніякими методами, погіршився зір та з'явилися сильні головні болі. Під час комп'ютерної томографії виявлено об'ємне утворення у головному мозку. Який імовірний діагноз?

- a. Прееклампсія
- b. Гостре порушення мозкового кровообігу
- c. Арахноїдит
- d. Пухлина мозку
- e. Набряк мозку

Правильна відповідь: Пухлина мозку

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 80-ти років була збита машиною на пішохідному переході. Непритомна протягом 5 хвилин. Самостійного дихання немає. Який симптом є первинним для постановки діагнозу "зупинка кровообігу"?

- a. Відсутність свідомості
- b. Поява блідо-сірого кольору шкіри обличчя
- c. Відсутність пульсу на сонних артеріях
- d. Розширення зіниць
- e. Відсутність дихання

Правильна відповідь: Відсутність пульсу на сонних артеріях

Питання 107

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 8-ми років захворювання мало поступовий початок з підвищення температури до 37,5-38оС, нежитю, сухого "гавкаючого" кашлю, осипlostі голосу. На третю добу хвороби стан дитини погіршився, з'явилось шумне дихання з втяжнням міжреберних проміжків. Яке захворювання з числа ГРВІ найбільш імовірно має місце у дитини?

- a. Парагрип
- b. РС-інфекція
- c. Аденовірусна інфекція
- d. Риновірусна інфекція
- e. Грип

Правильна відповідь: Парагрип

Питання 108

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 49-ти років під час тривалої роботи на присадибній ділянці втратив свідомість. Зі слів родичів хворіє на цукровий діабет близько 2-х років, отримує глібенкламід 20 мг на добу. Об'єктивно: шкіра волога, тонус м'язів кінцівок підвищений. Пульс - 98/хв., ритмічний. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Дихання - 20/хв., ритмічне. Вогнищової симптоматики не виявлено. Яке ускладнення розвинулось у хворого?

- a. Гостре порушення мозкового кровообігу
- b. Кетоацидоз
- c. Лактацидоз
- d. Гіпоглікемія
- e. Синкопе

Правильна відповідь: Гіпоглікемія

Питання 109

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Мати залишила здорового сина 2,5 років із старшою дочкою, хвоюю на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Вона через 3 години повернулася додому і помітила у сина частий кашель. На другий день стан його погіршився, температура тіла - 38оС, частота дихання - 42/хв., частота серцевих скорочень - 132/хв., ціаноз шкіри. Перкуторно: справа нижче кута лопатки вкорочення звуку, аускультивно в цьому місці різке ослаблення дихання. На Ro ОГК ателектаз правих сегментів S4 і S5, тінь органів середостіння зміщена вправо. Яка імовірна причина такого стану дитини?

- a. Гострий обструктивний бронхіт
- b. Напружений пневмоторакс
- c. Гостра респіраторна вірусна інфекція
- d. Гостра пневмонія
- e. Стороннє тіло бронхів

Правильна відповідь: Стороннє тіло бронхів

Питання 110

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Учасник ліквідації аварії на АЕС направлений у стаціонар з діагнозом "променева хвороба". Протягом 8 днів перебування в стаціонарі не знайдено ніяких суттєвих відхилень від норми. Чи можна очікувати прояви гострого радіаційного ураження у майбутньому?

- a. Так, протягом двох місяців
- b. Так, протягом першого місяця
- c. Так, протягом півроку
- d. Так, протягом року
- e. Не очікується

Правильна відповідь: Не очікується

Питання 111

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 56 років раптово виник дзвін у вухах, що супроводжувався нудотою, блюванням, <<миготінням мушок>> і потемнінням в очах. Об'єктивно спотерігається: АТ --- 210/100 мм рт. ст., пульс --- 62/хв. Встановлено діагноз: неускладнена гіпертензивна криза. Який лікарський засіб треба використати у цьому разі?

- a. Еналаприлат
- b. Верапаміл
- c. Аміодарон
- d. Резерпін
- e. Метопролол

Правильна відповідь: Еналаприлат

Питання 112

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час лекції один зі студентів став збудженим, кричав, що за ним стежать незнайомці, хочуть його убити, благав про допомогу. Викладач зі студентами намагалися його заспокоїти, але на їх слова він не реагував. До якого відділення треба госпіталізувати пацієнта?

- a. Психосоматичного відділення
- b. Реанімаційного відділення
- c. Психіатричного відділення
- d. Терапевтичного відділення
- e. Неврологічного відділення

Правильна відповідь: Психіатричного відділення

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 62-х років під час операції з приводу видалення пухлини лівої легені під загальним комбінованим знеболенням з однолегеневою інтубацією раптово наступила зупинка роботи серця. Які дії лікаря є оптимальними?

- a. Проведення відкритого масажу серця
- b. Проведення закритого масажу серця
- c. Введення міорелаксантів
- d. Проведення дефібриляції
- e. Екстубація хворого

Правильна відповідь: Проведення відкритого масажу серця

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 50-ти років з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок після фізичного навантаження з'явилася виражена задишка, біль в грудній клітці з правого боку, серцебиття, запаморочення, минущі порушення свідомості. Об'єктивно: шкіра блідо-ціанотична. Тахіпnoe - 40/хв., сухі свистячі хріпи. Тахікардія - 130/хв. Артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. На ЕКГ - відхилення електричної осі праворуч, блокада правої ніжки пучка Гіса. Який діагноз найбільш імовірний у хворого?

- a. Інфаркт міокарду
- b. Гостра інтерстиціальна пневмонія
- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Спонтанний пневмоторакс
- e. Плеврит

Правильна відповідь: Тромбоемболія легеневої артерії

Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 38-ми років скаржиться на виражену сонливість, набряки обличчя, мерзлякуватість, порушення пам'яті, головний біль, порушення менструального циклу, виражену загальну слабкість. Об'єктивно: зріст - 162 см, маса тіла - 87 кг Частота серцевих скорочень - 62/хв., артеріальний тиск - 115/70 мм рт.ст., при пальпації молочні залози м'якої консистенції, виділення незначної кількості молока. Поставте діагноз:

- a. Гіпоталамічний синдром
- b. Гіперпролактинемія
- c. Синдром "порожнього" турецького сідла
- d. Первінний гіпотиреоз, вторинна гіперпролактинемія
- e. Аденома гіпофіза

Правильна відповідь: Первінний гіпотиреоз, вторинна гіперпролактинемія

Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого з менінгококовою інфекцією, синдромом Уотерхауса-Фрідеріксена в приймальному відділенні виникла зупинка дихання, артеріальний тиск вимірюти не вдається, ЧСС - 58/хв. Які невідкладні дії лікаря приймального відділення?

- a. Введення адреналіну
- b. Вентиляція мішком Амбу
- c. Введення кордіаміну
- d. Термінова трахеостомія
- e. Введення великих доз глюкокортикоїдів

Правильна відповідь: Вентиляція мішком Амбу

Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого, що перебував в інфекційному відділенні з діагнозом гострий гепатит В, на 10-й день хвороби посилилася жовтяниця, з'явилось збудження, ейфорія, "печінковий" запах з роту, сухожилкові рефлекси підвищені, температура субфебрильна. У зв'язку з яким ускладненням погіршився стан хворого?

- a. Менінгіт
- b. Панкреатит
- c. Холангіт
- d. Інфекційно-токсичний шок
- e. Печінкова енцефалопатія

Правильна відповідь: Печінкова енцефалопатія

Питання 118

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпіла віком 28 років упала на вулиці з опорою на руку. Під час огляду виявляється: деформація на рівні середньої третини передпліччя, біль у разі навантаження, патологічна рухливість. Розладів магістрального кровообігу не виявлено, але пацієнта скаржиться на парестезію у ділянці кисті. Яке положення передпліччя для транспортної іммобілізації потерпілої є оптимальним?

- a. Пронація 45 градусів від максимальної
- b. Максимальна супінація
- c. Супінація 45 градусів від максимальної
- d. Середнє між пронацією та супінацією
- e. Максимальна пронація

Правильна відповідь: Середнє між пронацією та супінацією

Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої дитини наприкінці 1-ї доби життя спостерігається іктеричність шкірних покривів, збільшення розмірів печінки та селезінки, загальна кволість. Рівень білірубіну в крові - 200 ммол/л, в основному за рахунок вільної фракції, погодинний приріст його 8,1 ммол/л. Рівень гемоглобіну - 100 г/л, ретикулоцити - 5%. Ваша подальша тактика:

- a. Фототерапія
- b. Призначення фенобарбіталу
- c. Інфузійна терапія
- d. Замінне переливання крові
- e. Ентеросорбенти

Правильна відповідь: Замінне переливання крові

Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки після укусу оси в обличчя розвинулось тахіпnoе до 38/хв., пульс - 120/хв., артеріальний тиск знизився до 60/40 мм рт.ст. З чого треба почати невідкладну допомогу?

- a. Преднізолон
- b. Димедрол
- c. Допоміжна вентиляція легенів
- d. Адреналін
- e. Оксигенотерапія

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 121

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 19-ти років під час їзди в переповненому автобусі відчула мерехтіння перед очима, шум в голові, запаморочення, втратила свідомість. Через 1,5-2 хвилини, прийшовши до тями, відчувала виражену загальну слабість, головний біль. Об'єктивно: блідість шкірних покривів, артеріальний тиск - 85/60 мм рт.ст., на електроенцефалограмі переважання альфа-ритму, патологічної активності не виявлено. Визначте прогноз щодо життя та працевздатності хворої:

- a. Сприятливий щодо працевздатності та життя
- b. Несприятливий щодо працевздатності, сприятливий щодо відновлення функції
- c. Несприятливий щодо життя та працевздатності
- d. Несприятливий щодо працевздатності, сприятливий щодо життя
- e. Несприятливий щодо працевздатності, несприятливий щодо відновлення функції

Правильна відповідь: Сприятливий щодо працевздатності та життя

Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час ремонту в квартирі жінці в праве око потрапив розчин гашеного вапна. В оці з'явилися сильний біль, світлобоязнь, слізотеча, знизився зір. Гострота зору правого ока 0,2 н/к. В правому оці очна щілина рефлекторно звужена, світлобоязнь, слізотеча. Кон'юнктива повік гіперемована, місцями бліда, набрякла. Змішана ін'екція кон'юнктиви очного яблука. Рогівка сірого кольору, набрякла. Зініця звужена, глибокі середовища ока дослідити неможливо у зв'язку з вираженою світлобоязнью. Яку допомогу необхідно надати першочергово?

- a. Закласти 1% тетрациклінову мазь
- b. Рясно промити кон'юнктивальну порожнину водою протягом 15-20 хвилин
- c. Промити кон'юнктивальний мішок фізіологічним розчином
- d. Закапати дезінфікуючі розчини (0,25% розчин левоміцетину чи 20% розчин сульфацил натрію)
- e. Закласти гормональну мазь

Правильна відповідь: Рясно промити кон'юнктивальну порожнину водою протягом 15-20 хвилин

Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта на прийомі у сімейного лікаря розвинувся напад генералізованих тоніко-клонічних судом. Які найперші дії лікаря у цьому разі?

- a. Покласти пацієнта в положення по Тренделенбургу
- b. Покласти пацієнта на спину з піднятим головним кінцем
- c. Ужити заходів для попередження травматизації пацієнта
- d. Увести розчин діазепаму внутрішньовенно
- e. Увести розчин дімедролу внутрішньом'язово

Правильна відповідь: Ужити заходів для попередження травматизації пацієнта

Питання 124

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Підліток віком 16 років скаржиться на біль у правій здухвинній ділянці з іrrадіацією в калитку та збільшення її розмірів. Температура тіла --- 37,8 $^{\circ}$ C) Три дні тому, граючи у футбол, хлопець отримав удар м'ячем у пах. Об'єктивно встановлено: шкіра бліда. Під час пальпації живота змін не виявлено, спостерігається потовщення і болючість придатка та гіпремія калитки. Встановіть діагноз.

- a. Гостре гідроцеле
- b. Перекрут яєчка
- c. Кіста придатка
- d. Гострий інфекційний орхіт
- e. Гострий епідидимоорхіт справа

Правильна відповідь: Гострий епідидимоорхіт справа

Питання 125

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Першовагітна жінка з терміном гестації 34 тижні надійшла у пологовий стаціонар зі скаргами на блювання, носову кровотечу, слабкість. Шкірні покриви та склери жовтушні, температура тіла підвищена до 37,4 $^{\circ}$ C, артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., білірубін - 70,4 мкмоль/л; лейкоцитів - 14·10⁹/л, тромбоцитів - 95·10⁹/л; АЛТ і АСТ підвищені у 6 разів, фібриноген не визначається, рівень факторів згортання знижений, білка в сечі немає. Яку терапію необхідно обрати?

- a. Лапароскопічна холецистектомія
- b. Розродження з інфузією свіжозамороженої плазми
- c. Призначення ацикловіру
- d. Спостереження, терапія гепатопротекторами
- e. Магнію сульфат, ліжковий режим

Правильна відповідь: Розродження з інфузією свіжозамороженої плазми

Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 64-х років спостерігаються спрага, слабкість, сухість у роті, часте сечовипускання, сонливість. В анамнезі ниркова недостатність. Хворий загальмований, шкіра суха, зморшкувата, очні яблука запалі, періодичні судоми кінцівок. Запаху ацетону немає. Цукор крові – 48 ммоль/л, pH крові – 7,38. Яке дослідження слід призначити першочергово?

- a. Визначення ліпідного спектру крові
- b. Визначення білкового спектру крові
- c. Визначення трансаміназ сироватки крові
- d. Визначення осмолярності крові
- e. Визначення мікроелементів крові

Правильна відповідь: Визначення осмолярності крові

Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 16-ти років звернулась до лікаря зі скаргами на інтенсивний головний біль, підвищену температуру тіла, сонливість. На ший слід від укусу кліща з зоною гіперемії. Запідозрений кліщовий енцефаліт. Якою має бути екстрена специфічна профілактика?

- a. Профілактичний прийом антибіотиків
- b. Введення інтерферону
- c. Специфічна профілактика не проводиться
- d. Вакцинація
- e. Введення специфічного донорського імуноглобуліну

Правильна відповідь: Введення специфічного донорського імуноглобуліну

Питання 128

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпіла 25-ти років доставлена в хірургічне відділення через 2 години після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з закритою травмою живота з ознаками внутрішньоочеревинної кровотечі. Доставлено в операційну. Під час ревізії в черевній порожнині знайдено до 1,5 л рідкої крові. Селезінка пошкоджена в декількох місцях. Інших пошкоджень не виявлено. Який вид трансфузії слід застосувати?

- a. Реінфузія крові
- b. Трансфузія еритроцитарної маси
- c. Замінне переливання
- d. Пряма гемотрансфузія
- e. Трансфузія замороженої плазми

Правильна відповідь: Реінфузія крові

Питання 129

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Народилася доношена дитина в асфіксії середнього ступеня тяжкості з слабким неритмічним диханням, незначною флексією кінцівок, серцевим скороченням менше ніж 100/хв, ціанозом кінцівок, гримасою обличчя на тактильну стимуляцію.

Відсмоктування секрету з носа і рота резиновою грушою ефекту не дало. Які наступні реанімаційні заходи треба виконати?

- a. Провести штучну вентиляцію легень
- b. Інтубувати трахею і провести відсмоктування вмісту з дихальних шляхів через ендотрахеальну трубку
- c. Застосувати кисневу терапію з використанням маски
- d. Застосувати лікарські засоби
- e. Провести непрямий масаж серця

Правильна відповідь: Інтубувати трахею і провести відсмоктування вмісту з дихальних шляхів через ендотрахеальну трубку

Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хлопця віком 17 років після нервово-психічної травми раптово з'явилися скарги на головний біль, запаморочення, нудоту, блювання, погіршення зору, біль у серці та відчуття серцебиття. Об'єктивно виявлено: ЧСС --- 120/хв, озноб, м'язове тремтіння, пітливість, гіперемія шкіри, пацієнт збуджений. На ЕКГ спостерігаються ознаки гіпертрофії та систолічного перевантаження лівого шлуночка. З анамнезу відомо, що батько пацієнта хворіє на гіпертонічну хворобу. Яку терапію треба призначити для усунення нападу?

- a. Ентерально клонідин
- b. Сублінгвально фенігідин
- c. Сублінгвально каптопріл
- d. Сублінгвально пропранолол
- e. Парентерально фуросемід

Правильна відповідь: Сублінгвально пропранолол

Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Військовослужбовець унаслідок вибухової хвилі отримав сильний удар грудьми об кам'яну брилу. Об'єктивно спостерігається: у постраждалого ціаноз обличчя, акроцианоз, тахіпnoе до 40/хв., роздуті шийні вени, АТ - 65/40 мм рт. ст., тони серця глухі. Який попередній діагноз?

- a. Тампонада серця
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Гемоторакс
- d. Гострий респіраторний дистрес-синдром
- e. Напруженій пневмоторакс

Правильна відповідь: Тампонада серця

Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 35-ти років, що страждає на закрепи, скаржиться на сильний, довготривалий біль після дефекації, наявність "смужки" крові в калі. Через біль обмежила вживання їжі. Поставте попередній діагноз:

- a. Неповна параректальна нориця
- b. Гострий тромбоз гемороїдальних вузлів
- c. Анальна тріщина
- d. Гострий парапроктит
- e. Анокуприковий більовий синдром

Правильна відповідь: Анальна тріщина

Питання 133

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 25-ти років відчула себе погано в приміщенні аптеки. Стоїть, спираючись на підвіконня з фіксованим плечовим поясом. Об'єктивно: обличчя одутле, вдих короткий, видих подовжений, частота дихання - 22/хв., частота серцевих скорочень - 100/хв., артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст., над легенями при перкусії коробковий відтінок перкуторного звуку. При аускультації - дихання везикулярне, жорстке, сухі, свистячі хрипи, більше на видиху. Сог - акцент II тону над легеневою артерією. Живіт без особливостей. Попередній діагноз:

- a. Тромбоемболія легеневої артерії
- b. Гострий ларинготрахеїт
- c. Трахеобронхіальна дискінезія
- d. Бронхіальна астма
- e. ХОЗЛ

Правильна відповідь: Бронхіальна астма

Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнт під час переливання крові відчув слабкість, серцебиття, холод у кінцівках. Об'єктивно спостерігається: шкіра вкрита холодним липким потом, ціаноз кінцівок, АТ --- 60/30 мм рт. ст., пульс --- 110/хв., дихання часте та поверхневе, сеча темного кольору. Якою буде тактика надання невідкладної допомоги пацієнту?

- a. Припинити гемотрансфузію, увести антикоагулянти
- b. Реанімація за системою CAB
- c. Продовжити гемотрансфузію, увести кордіамін
- d. Продовжити гемотрансфузію, увести преднізолон
- e. Припинити гемотрансфузію, увести адреналін

Правильна відповідь: Припинити гемотрансфузію, увести адреналін

Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Новонароджена дівчинка масою 3500 г, довжиною 52 см від першої вагітності, що перебігала на тлі анемії II ступеня важкості, народилася із серцебиттям 140/хв., закричала одразу, крик голосний, рефлекси живі, м'язовий тонус дещо знижений, є акроціаноз. Яка оцінка новонародженої за шкалою Апгар?

- a. 5-6 балів
- b. 9-10 балів
- c. 1-2 балів
- d. 3-4 балів
- e. 7-8 балів

Правильна відповідь: 7-8 балів

Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 50-річного чоловіка протягом 2-х днів відзначаються рідкі випорожнення черного кольору. Болю у епігастральній ділянці немає. При огляді: блідість шкірних покривів і кон'юнктиви, "судинні зірочки" на шкірі грудей, розширення вен передньої стінки живота, гепатомегалія. Артеріальний тиск - 105/60 мм рт.ст. Промивні води шлунка типу "кавової гущі". Лікар визначив кровотечу з вен стравоходу. Які препарати разом з трансфузійною та гемостатичною терапією слід призначити в першу чергу?

- a. Вазопресин
- b. Метоклопрамід
- c. Алюмінію гідроокис
- d. Тіотриазолін
- e. Аргініну глутамат

Правильна відповідь: Вазопресин

Питання 137

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

За 3 доби після переохолодження хлопець віком 14 років скаржиться на значний пекучий біль, свербіння та порушення чутливості шкіри в ділянці пальців обох ступнів. Об'єктивно спостерігається: у ділянці пальців нижніх кінцівок помірний набряк, ціаноз, поодинокі напружені пухирі, що заповнені прозорою рідиною, жовтого кольору, парестезії. Який попередній діагноз?

- a. Краш-синдром
- b. Відмороження I ступеня
- c. Відмороження III ступеня
- d. Відмороження VI ступеня
- e. Відмороження II ступеня

Правильна відповідь: Відмороження II ступеня

Питання 138

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 32-х років після перебування у лісі та контакту з мурахами з'явилися набряк суглобів рук, біль у шлунку, остуда, утруднене дихання, загальна слабкість. При огляді хворого відзначено набряк обличчя, шкірні покриви гіперемовані. Над легенями вислуховуються жорстке дихання, сухі свистячі хрипи. Тахікардія. Артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Які заходи невідкладної допомоги необхідно провести хворому?

- a. Призначення сорбентів
- b. Введення кордіаміну
- c. Введення серцевих глікозидів
- d. Введення антигістамінних препаратів
- e. Введення адреналіну

Правильна відповідь: Введення адреналіну

Питання 139

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнта віком 19 років із ревматичною хворобою серця, комбінованою мітральною вадою серця під час складання іспитів втратила свідомість. Об'єктивно встановлено: свідомість відсутня, пульс на променевих і сонніх артеріях не визначається, дихання поверхневе, шумне, АТ не визначається, тони серця не вислуховуються. Який метод діагностики буде найінформативнішим у цьому разі?

- a. Електрокардіографія
- b. Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини
- c. Рентгенографія органів грудної порожнини
- d. Коронароангіографія
- e. Ехокардіографія

Правильна відповідь: Електрокардіографія

Питання 140

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У породіллі 23-х років на 17 добу післяполового періоду з'явилося відчуття страху, агресії до оточуючих. Зі слів родичів була суїциdalна спроба. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Шизофренія
- b. Синдром хронічної втоми
- c. Маніакально-депресивний психоз
- d. Гострий невроз
- e. Гострий післяпологовий психоз

Правильна відповідь: Гострий післяпологовий психоз

Питання 141

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого з гострим інфарктом міокарда з'явилися скарги на серцебиття, лихоманку, загальну слабкість. Загальний стан важкий, артеріальний тиск - 85/50 мм рт.ст., пульс - 190/хв., аритмічний. Дихання везикулярне. Набряки відсутні. ЕКГ: миготлива аритмія, частота серцевих скорочень - 220/хв. З чого треба розпочати лікування?

- a. Введення верапамілу в/в
- b. Введення строфантину в/в
- c. Електроімпульсна терапія
- d. Введення лідокаїну в/в
- e. Введення кордарону в/в

Правильна відповідь: Електроімпульсна терапія

Питання 142

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 59-ти років більше 2-х років тому діагностована гіпертензія. Систематично не лікувався. Впродовж тижня відзначає погіршення самопочуття: з'явився сильний головний біль, який супроводжувався нудотою, серцебиттям, болем колючого характеру в ділянці серця. Вночі гостро виникла важка задишка інспіраторного характеру, що супроводжувалась кашлем з виділенням великої кількості вологого харкотиння, серцебиття. При огляді: акроціаноз. Частота серцевих скорочень - 120/хв. Тони серця - глухі, тахікардія. Артеріальний тиск - 240/105 мм рт.ст. В легенях на тлі ослабленого везикулярного дихання вислуховується велика кількість вологих різноманітних хрипів. Ваш попередній діагноз:

- a. Гіпертензивний криз, ускладнений гострою серцевою недостатністю
- b. Симпатоадреналовий криз
- c. Гіпертензивний криз, ускладнений гострою гіпертензивною енцефалопатією
- d. Неускладнений кардіальний криз
- e. Вагоінсуллярний криз

Правильна відповідь: Гіпертензивний криз, ускладнений гострою серцевою недостатністю

Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У повторновагітної 28-ми років, з прееклампсією середнього ступеня важкості, при вагітності 32 тижні, з'явилася жовтянича та ознаки загальної інтоксикації. Лабораторно: гіпокоагуляція - тромбоцити - 80-109/л, ПДФ++, загальний білірубін - 90 ммол/л (прямий - 25 ммол/л, непрямий - 65 ммол/л), АлАТ- 3,5 ммол//л·кг·год, АсАТ- 2,6 ммол//л·кг·год. Яке ускладнення виникло у вагітності?

- a. Синдром Жильбера
- b. Синдром Бадда-Кіарі
- c. Вірусний гепатит
- d. Гостра жирова дистрофія печінки
- e. HELLP-синдром

Правильна відповідь: HELLP-синдром

Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У медичну роту 14-ї механізованої бригади з району ведення бойових дій аеропорту Донецьк надійшло 12 поранених. Сортуючальна бригада виконує медичне сортування поранених. Яким принципом повинен керуватися медичний персонал під час проведення медичного сортування?

- a. Розподілом поранених та хворих на групи згідно з евакуаційним призначенням
- b. Встановленням черговості надання медичної допомоги
- c. Визначенням характеру поранення, встановленням черговості надання медичної допомоги
- d. Розподілом поранених та хворих на групи для направлення їх у функціональні підрозділи
- e. Єдиною класифікацією хвороб і травм та єдиними вимогами до методики сортування

Правильна відповідь: Єдиною класифікацією хвороб і травм та єдиними вимогами до методики сортування

Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 7-ми років після хіміотерапії з'явилася петехіальна висипка на шкірі, а потім виникла важка кровотеча з носа. Які заходи слід провести в обласній лікарні для зупинки кровотечі?

- a. Гемотрансфузія, тампонада
- b. Тампонада, трансфузія тромбоконцентрату
- c. Тампонада, введення преднізолону
- d. Тампонада, трансфузія плазми
- e. Тампонада, введення вікасолу

Правильна відповідь: Тампонада, трансфузія тромбоконцентрату



Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 19-ти років надійшла на 4-й день хвороби. У пацієнтки блювання, різка слабкість, сонливість, виражена жовтяниця. Через добу хвора не орієнтується в часі, свідомість потьмарена, періодичне психомоторне збудження. Зменшилися розміри печінки. Яке ускладнення зумовило таку клінічну картину?

- a. Гіповолемічний шок
- b. Механічна жовтяниця
- c. Гостра надниркова недостатність
- d. Гостра печінкова колька
- e. Гостра печінкова недостатність

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Після падіння з опором на праве плече потерпілий скаржиться на біль, обмеження рухів, деформацію в ділянці плечового суглоба. Яких заходів на цьому етапі надання допомоги необхідно вжити?

- a. Блокада місця перелому
- b. Накладення гіпової пов'язки
- c. Транспортна іммобілізація, знеболення
- d. Накладення шини Дітеріхса
- e. Накладення шини Крамера від пальців до плечового суглоба

Правильна відповідь: Транспортна іммобілізація, знеболення

Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 3-х років, яка перебуває у стаціонарі, на тлі гострої респіраторної інфекції 3 рази було блювання, непокоїть гострий біль у животі. Температура тіла - 38,5°C. Шкіра бліда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор крові - 4,0 ммол/л. Який з діагнозів найбільш імовірний?

- a. Цукровий діабет
- b. Ацетонемічний стан
- c. Гострий апендицит
- d. Діабетична кома
- e. Гострий гастроентерит

Правильна відповідь: Ацетонемічний стан

Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Лаборанта, який у портовому місті під час дослідження матеріалу померлих від епізоотії щурів виявив короткі палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, госпіталізовано до інфекційної лікарні. Скаржиться на ріжучий біль у грудях, підвищення температури тіла до 40°C, задуху, кашель із виділенням спочатку слизового, а потім кров'янисто мокротиння. Об'ективно спостерігається: стан пацієнта україн тяжкий, сатурація --- 65%, виражена блідість шкірних покривів, тотальній ціаноз. Аускультивативно вислуховується дифузне ослаблене дихання в легенях з обох сторін. Укажіть найімовірніший етіологічний фактор, що спричинив розвиток такого стану в пацієнта?

- a. *{Yersinia pestis}*
- b. *{Francisella tularensis}*
- c. *{Bacillus anthracis}*
- d. *{Yersinia pseudotuberculosis}*
- e. *{Streptococcus pneumoniae}*

Правильна відповідь: *{Yersinia pestis}*

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 46 років, після емоційного навантаження, раптово відчула сильний біль за грудиною та втратила свідомість. Об'єктивно встановлено: тони сердця відсутні, апное, АТ та пульс не визначається. На ЕКГ спостерігається: хвилі різної висоти та ширини, неоднакової форми. Який із наведених нижче заходів буде найбільш ефективним у цьому разі?

- a. Страфантин в/с
- b. Атропін в/с
- c. Дігоксін в/с
- d. Адреналін в/с
- e. Електрична дефібриляція

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

[◀ Крок 3 Фармація \(вітчизняні UA\)](#)

[Перейти до...](#)



[Крок 3 Стоматологія 2022 ►](#)

Розпочато четвер 3 листопад 2022 12:56

Стан Завершено

Завершено четвер 3 листопад 2022 12:57

Витрачено часу 32 сек

Балів 0/150

Оцінка 0 з можливих 10 (0%)

Питання 1

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 24 роки госпіталізована до лікарні. Скаржиться на біль унізу живота з іррадіацією в задній прохід, слабкість та запаморочення. Остання менструація була 2 місяці тому. Об'єктивно встановлено: шкіра бліда, АТ --- 60/40 мм рт. ст., пульс --- 110/хв., температура тіла --- 36,6^oC. Живіт напружений, різко болючий, більше з лівого боку, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Який попередній діагноз ?

- a. Гострий сальпінгоофорит
- b. Кишкова непрохідність
- c. Позаматкова вагітність
- d. Гострий апендицит
- e. Апоплексія яєчника

Правильна відповідь: Позаматкова вагітність

Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дозиметрист-розвідник у загальновійськовому захисному костюмі і протигазі виїхав у зону радіоактивного забруднення. Яким компонентом екіпіровки має бути дооснащений дозиметрист для підвищення особистої безпеки від негативного впливу радіоактивного випромінювання?

- a. Індивідуальним протихімічним пакетом
- b. Слабоалкогольним напоєм
- c. Таблетками аквасепту
- d. Індивідуальним перев'язувальним пакетом
- e. Індивідуальним дозиметром

Правильна відповідь: Індивідуальним дозиметром

Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої дитини після проведення всього комплексу реанімаційних заходів виявлено ознаки біологічної смерті. Яка подальша тактика лікаря?

- a. З'ясувати інші можливі причини незадовільної реакції немовляти на реанімацію і продовжувати її
- b. Припинити реанімацію
- c. Продовжити реанімаційні заходи щонайменше 30 хв
- d. Перевірити правильність виконання основних реанімаційних заходів та продовжити реанімацію
- e. Продовжити реанімаційні заходи до 40 хв

Правильна відповідь: Припинити реанімацію

Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта на прийомі у сімейного лікаря розвинувся напад генералізованих тоніко-клонічних судом. Які найперші дії лікаря у цьому разі?

- a. Увести розчин дімедролу внутрішньом'язово
- b. Увести розчин діазепаму внутрішньовенно
- c. Покласти пацієнта в положення по Тренделенбургу
- d. Ужити заходів для попередження травматизації пацієнта
- e. Покласти пацієнта на спину з піднятим головним кінцем

Правильна відповідь: Ужити заходів для попередження травматизації пацієнта

Питання 5

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дев'ятимісячної дитини, яка хворіє на гострий гнійний менінгіт, під час парентерального введення сечогінного засобу підвищилася температура тіла, з'явилися свербіння та плямисто-папульозний висип на шкірі тулуба. Який патологічний стан розвинувся у дитини?

- a. Анафілактичний шок
- b. Алергічна реакція
- c. Гіпертермічний синдром
- d. Менінгеальний синдром
- e. Септичний шок

Правильна відповідь: Алергічна реакція

Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 3-х років, що страждає на тетраду Фалло, раптово збільшилась інтенсивність ціанозу, з'явилась задишка, вона присіла навпочіпки. Ваші дії:

- a. Призначити антибіотики
- b. Призначити оксигенотерапію
- c. Призначити бронходилататори
- d. Призначити сечогінні
- e. Призначити серцеві глікозиди

Правильна відповідь: Призначити оксигенотерапію

Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт віком 83 роки, який перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Зафіксовано клінічну смерть. Яка послідовність реанімаційних заходів?

- a. Послідовність А-В-С-Д
- b. Послідовність А-В-С
- c. ---
- d. Послідовність С-А-В
- e. Послідовність В-А-С

Правильна відповідь: Послідовність С-А-В

Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час роботи на одному з блоків АЕС один із працівників через необережність порувив техніку безпеки, унаслідок чого він протягом 35 хвилин перебував у зоні радіоактивного опромінення. Показники індивідуального дозиметра — 1,0 Гр. Потерпілий скарг не має. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви та видимі слизові оболонки звичайного кольору, пульс — 84/хв, АТ — 138/82 мм рт. ст., живіт під час пальпації м'який, неболючий. Який лікувально-профілактичний захід треба провести стосовно цього працівника?

- a. Призначити унітіол
- b. Профілактичного лікування не потребує
- c. Призначити препарати йоду
- d. Призначити цистамін
- e. Призначити антибактеріальну терапію

Правильна відповідь: Призначити цистамін

Питання 9

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До медичної роти госпіталізовано військовослужбовця з вогнепальним пораненням верхньої третини правого передпліччя та переломом правої ліктьової кістки через 5 годин після поранення. Об'єктивно спостерігається: загальний стан середнього ступеня тяжкості, порушені гемодинаміки немає. До якої сортувальної групи треба зарахувати пораненого?

- a. Тих, які потребують надання медичної допомоги в першу чергу
- b. Небезпечні для оточення
- c. Тих, які отримали ураження несумісні з життям і потребують лише догляду (агонуючі)
- d. Тих, які не потребують медичної допомоги
- e. Тих, які потребують надання медичної допомоги в другу чергу

Правильна відповідь: Тих, які потребують надання медичної допомоги в другу чергу

Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 45-ти років після конфліктної ситуації на роботі відчула інтенсивний головний біль, була нудота та неодноразове блювання. До цього вважала себе здорововою. Об'єктивно: свідомість ясна, артеріальний тиск - 160/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 70/хв., серцева діяльність ритмічна, загальна гіперестезія, фото-фонофобія, ригідність м'язів потилиці. Парезів та інших неврологічних розладів не виявлено. Найбільш імовірний діагноз:

- a. Гостра гіпертонічна енцефалопатія
- b. Менінгіт
- c. Істеричний невроз
- d. Ішемічний інсульт
- e. Субарахноїдальний крововилив

Правильна відповідь: Субарахноїдальний крововилив

Питання 11

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 29-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на кров'янисті виділення з піхви та біль у правій здухвинній ділянці. Остання менструація була 11 тижнів тому. Вміст ХГ у сироватці крові нижче за нормативні показники для передбачуваного терміну вагітності. За даними ультразвукового дослідження (УЗД) плідне яйце в порожнині матки не визначається. В Дугласовому просторі виявлено вільну рідину з гіперехогенними включеннями. При піхвовому дослідженні: нависання склепінь, "крик Дугласа". При пункциї заднього склепіння отримана кров, що не згортається. Поставте діагноз:

- a. Порушена позаматкова вагітність
- b. Аборт, що розпочався
- c. Кровотеча з жовтого тіла яєчника
- d. Перекрут кісти яєчника
- e. Міхурцевий занесок

Правильна відповідь: Порушена позаматкова вагітність

Питання 12

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки 29-ти років вдома відбулися стрімкі II пологи у терміні 36 тижнів вагітності. Народився живий хлопчик масою 2300,0 г. Лікар швидкої допомоги, який був викликаний, при огляді породіллі зазначив, що послід не виділився (після народження дитини пройшло 40 хвилин). Ознак кровотечі немає. Яку допомогу повинен надати лікар швидкої допомоги?

- a. Негайно транспортувати жінку до пологового відділення II рівня
- b. Провести ручне віddілення посліду
- c. Негайно транспортувати жінку і дитину до найближчого пологового відділення
- d. Вести в/в 10 Од окситоцину і дочекатися виділення посліду
- e. Негайно транспортувати жінку до пологового відділення III рівня

Правильна відповідь: Негайно транспортувати жінку і дитину до найближчого пологового відділення

Питання 13

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка на 41-му тижні вагітності готується до екстреного оперативного втручання під загальним зневоленням. Під час інтубації трахеї у неї виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів, але виник ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, з'явилися вологі хрипи. Яка причина такого стану у пацієнтки?

- a. Шок
- b. Аспірація кислого шлункового вмісту
- c. Емболія навколоплідними водами
- d. Набряк легень
- e. Інфаркт міокарду

Правильна відповідь: Аспірація кислого шлункового вмісту

Питання 14

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 25-ти років відчула себе погано в приміщенні аптеки. Стоїть, спираючись на підвіконня з фіксованим плечовим поясом. Об'єктивно: обличчя одутле, вдих короткий, видих подовжений, частота дихання - 22/хв., частота серцевих скорочень - 100/хв., артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст., над легенями при перкусії коробковий відтінок перкуторного звуку. При аускультації - дихання везикулярне, жорстке, сухі, свистячі хрипи, більше на видиху. Cor - акцент II тону над легеневою артерією. Живіт без особливостей. Попередній діагноз:

- a. ХОЗЛ
- b. Гострий ларинготрахеїт
- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Трахеобронхіальна дискінезія
- e. Бронхіальна астма

Правильна відповідь: Бронхіальна астма

Питання 15

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У шестимісячної дитини спостерігається блювання до 10 разів та рідкі випорожнення 12–15 разів. Лікарем-педіатром об'ективно встановлено: дитина млява, адінаамічна, шкірні покриви бліді з <<мармуровим>> малюнком, симптомом <<білої плями>> упродовж 5 секунд. Тургор тканин знижений, велике джерельце та очні яблука запалі, сліз немає. ЧСС --- 180/хв, артеріальний тиск --- 60/40 мм рт. ст. Які лікарські заходи треба провести дитині насамперед?

- a. Оральну регідратаційну терапію
- b. Інфузію 10-20% розчину глукози в/в
- c. Антибактеріальну терапію
- d. Інфузію реополіглюкіну або неогемодезу в/в
- e. Інфузію розчину \$NaCl\\$ 0,9\% в/в

Правильна відповідь: Інфузію розчину \$NaCl\\$ 0,9\% в/в

Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка з політравмою та гострою крововтратою за 5 хвилин після початку гемотрансфузії з'явилися біль за грудиною і в попереку та миготіння мушок перед очима. Сеча набула кольору <<м'ясних помийв>>. Плазма крові після центрифугування червона. Яке ускладнення найімовірніше виникло у пацієнта?

- a. Алергічна реакція
- b. Синдром масивної трансфузії
- c. Гострий гемоліз
- d. Жирова емболія
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

Правильна відповідь: Гострий гемоліз

Питання 17

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого після проведеного оперативного втручання раптово розвинулися тетанічні судоми дистальних віddілів кінцівок ("рука акушера"), спостерігаються явища брохоспазму. Яка невідкладна терапія необхідна?

- a. Введення розчину калію хлориду
- b. Введення розчину сульфату магнію
- c. Введення розчину фуросеміду
- d. Введення сибазону
- e. Введення розчину кальцію хлориду

Правильна відповідь: Введення розчину кальцію хлориду

Питання 18

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У одинадцятимісячної дівчинки спостерігаються адінамія, фебрильна температура тіла, кашель, ціаноз, дистанційні хрипи, частота дихання -- 90/хв. Фізикальні показники такі: перкуторно над легенями вислуховується коробковий звук, аускультивно -- жорстке дихання, рясні дрібноміхурцеві хрипи. Протягом 20-ти хвилин проводилася інсуфляція зволоженого 100%-го кисню через маску. Рентгенологічно виявлено ознаки емфіземи. Результати дослідження артеріальної крові такі: $\text{PaO}_2 = 55 \text{ mm rt.st.}$, $\text{pH} = 7,2$. З чого доцільно розпочати терапію?

- a. Помістити до кисневої палатки з інгаляцією амброксолу
- b. З дренажного масажу
- c. Зі штучної вентиляції легень
- d. Накласти кисневу маску з інгаляцією глюкокортикоїдів
- e. З гіпербаричної оксигенациї

Правильна відповідь: Зі штучної вентиляції легень

Питання 19

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 38-ми років скаржиться на виражену сонливість, набряки обличчя, мерзлякуватість, порушення пам'яті, головний біль, порушення менструального циклу, виражену загальну слабкість. Об'єктивно: зріст - 162 см, маса тіла - 87 кг Частота серцевих скорочень - 62/хв., артеріальний тиск - 115/70 мм рт.ст., при пальпації молочні залози м'якої консистенції, виділення незначної кількості молока. Поставте діагноз:

- a. Гіперпролактинемія
- b. Аденома гіпофіза
- c. Первінний гіпотиреоз, вторинна гіперпролактинемія
- d. Гіпоталамічний синдром
- e. Синдром "порожнього" турецького сідла

Правильна відповідь: Первінний гіпотиреоз, вторинна гіперпролактинемія

Питання 20

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час патрулювання військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму. Об'єктивно: ліва стопа відсутня, із рані гомілки спостерігається виражена кровотеча. Шкіра бліда, пульс на променевій артерії відсутній, на сонній артерії - 112/хв. В чому полягає алгоритм надання домедичної допомоги?

- a. Знеболення, накладання кровоспинного джгута, накладання асептичної пов'язки
- b. Накладання джгута та асептичної пов'язки, транспортна іммобілізація, знеболення
- c. Накладання асептичної пов'язки, у разі неможливості зупинки кровотечі - накладання кровоспинного джгута
- d. Знеболення та негайна евакуація на наступний етап
- e. Знеболення, накладання кровоспинного джгута та негайна евакуація на наступний етап

Правильна відповідь: Накладання джгута та асептичної пов'язки, транспортна іммобілізація, знеболення

Питання 21

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіку віком 83 роки ампутували нижню кінцівку на рівні стегна з приводу діабетичної стопи. За добу після оперативного втручання стан хворого почав раптово прогресивно погіршуватися. Порушилася свідомість, виникло часте поверхневе дихання, помірне оглушення, хворий став блідим, з'явився холодний піт. На ЕКГ спостерігається: суправентрикулярна тахікардія з ЧСС — 188/хв, блокада правої ніжки пучка Гіssa, ознаки перенапруження правого шлуночка. Хірург припустив ТЕЛА і викликав реаніматолога. На момент огляду реаніматологом пацієнта на ЕКГ спостерігається: ізолінія, свідомість на рівні коми, пульс на магістральних судинах відсутній, дихання відсутнє. Які найперші дії має виконати реаніматолог?

- a. Оксигенотерапію
- b. В/в уведення метопрололу
- c. В/в введення гепарину
- d. Непрямий масаж серця
- e. Електричну дефібриляцію

Правильна відповідь: Непрямий масаж серця

Питання 22

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дванадцятирічної дівчинки після вживання двох таблеток аспірину температура тіла підвищилася до 39–40,0 $^{\circ}\text{C}$ Спостерігається загальне нездужання, запаморочення, раптова поява червоних плям на шкірі з утворенням пухирів та відшаровуванням епідермісу з ерозуванням поверхні. Ураження на шкірі нагадують опіки другого ступеню. Симптом Нікольського — позитивний. Який імовірний діагноз?

- a. Гострий епідермальний некроліз
- b. Токсикодермія
- c. Еритродермія
- d. Багатоформна ексудативна еритема
- e. Вульгарна пухирчатка

Правильна відповідь: Гострий епідермальний некроліз

Питання 23

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 19-ти років під час їзди в переповненому автобусі відчула мерехтіння перед очима, шум в голові, запаморочення, втратила свідомість. Через 1,5-2 хвилини, прийшовши до тями, відчувала виражену загальну слабість, головний біль. Об'єктивно: блідість шкірних покривів, артеріальний тиск - 85/60 мм рт.ст., на електроенцефалограмі переважання альфа-ритму, патологічної активності не виявлено.

Визначте прогноз щодо життя та працевдатності хворої:

- a. Сприятливий щодо працевдатності та життя
- b. Несприятливий щодо працевдатності, несприятливий щодо відновлення функції
- c. Несприятливий щодо життя та працевдатності
- d. Несприятливий щодо працевдатності, сприятливий щодо відновлення функції
- e. Несприятливий щодо працевдатності, сприятливий щодо життя

Правильна відповідь: Сприятливий щодо працевдатності та життя

Питання 24

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнта віком 56 років госпіталізовано до лікарні. Скаржиться на сухий кашель, холодний піт, задишку, що посилюється в положенні лежачи. Об'єктивно спостерігається: частота дихання --- 30/хв, артеріальний тиск --- 180/100 мм рт. ст., Аускультивно виявляються: глухі серцеві тони, акцент II тону над легеневою артерією, ритм галопу, над легенями вислуховується жорстке дихання, в нижніх відділах сухі та вологі дрібнопухирцеві хрипи. Який попередній діагноз?

- a. Ішемічна кардіоміопатія
- b. Астматичний статус
- c. Тромбоемболія легеневої артерії
- d. Гіпертензивний криз неускладений
- e. Набряк легень

Правильна відповідь: Набряк легень

Питання 25

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 36-ти років скарги на біль в шиї, м'язах гомілок, спині, суглобах, кістках, жовтяницею, знижений діурез. є підоєра на лептоспіроз. Які дослідження можуть підтвердити цей діагноз?

- a. Серологічні
- b. Вірусологічні
- c. Копрологічні
- d. Електрокардіографічні
- e. Біохімічні

Правильна відповідь: Серологічні

Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 62-х років на 5-й день після операції апендектомії розвинулися явища перитоніту. Після чергової операції та масивної антибактеріальної терапії розвинулись явища інфекційно-токсичного шоку. Який з препаратів найкраще використовувати для стабілізації гемодинаміки після відновлення волемії?

- a. Адреналін
- b. Ефедрин
- c. Дофамін
- d. Мезатон
- e. Сульфокамфокаїн

Правильна відповідь: Дофамін

Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дівчину віком 20 років, через 3 дні після згвалтування, шпиталізовано до психіатричного відділення. Під час клініко-психопатологічного обстеження у психічному статусі пацієнтки спостерігаються пригнічений настрій та підвищена тривога. Вона уникає спогадів та нездатна відтворити в пам'яті основні, важливі елементи травматичної ситуації. Скаржиться на труднощі із засинанням, нічні кошмари, пов'язані з психотравматичною подією, що постійно повторюються, неможливість сконцентрувати увагу, втрату колишніх інтересів і захоплень. Яке порушення психічного стану розвинулося в пацієнтки?

- a. Неврастенія
- b. Панічний розлад
- c. Змішаний тривожний і депресивний розлад
- d. Дисоціативна амнезія
- e. Посттравматичний стресовий розлад

Правильна відповідь: Посттравматичний стресовий розлад

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта 35-ти років після надмірного вживання алкоголю і калорійної їжі з'явилися гострий біль у верхній частині живота, блювання без домішок жовчі, здуття, температура - 38°C. Поступово наростиав метеоризм, розвинулася затримка газів і випорожнень. При аускультації кишкові шуми не вислуховуються. Поставте діагноз:

- a. Гострий холецистит
- b. Панкреонекроз
- c. Гострий панкреатит з явищами парезу кишечника
- d. Гостра кишкова непрохідність
- e. Перфорація виразки

Правильна відповідь: Гострий панкреатит з явищами парезу кишечника

Питання 29

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Лікар бригади швидкої допомоги надає невідкладну допомогу дівчинці 10-ти років, яку збила машина. У зв'язку з неадекватністю самостійного дихання проведена інтубація трахеї. При проведенні пробних вдихів за допомогою мішка Амбу виявлено, що дихальні шуми зліва проводяться слабше. Що треба зробити, щоб відправити ситуацію?

- a. Підтягнути інтубаційну трубку вище
- b. Підвищити об'єм дихання
- c. Підвищити тиск в дихальних шляхах
- d. Просунути інтубаційну трубку нижче
- e. Переінтубувати трахею

Правильна відповідь: Підтягнути інтубаційну трубку вище

Питання 30

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У роділлі віком 22 роки за 20 хвилин після народження дитини ознак відшарування плаценти і зовнішньої кровотечі немає. Яка подальша тактика ведення пологів?

- a. ---
- b. Очікувальна 10 хв
- c. Очікувальна 30 хв
- d. Очікувальна 60 хв
- e. Очікувальна 20 хв

Правильна відповідь: Очікувальна 10 хв

Питання 31

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки віком 27 років діагностовано позагоспітальну пневмонію. В анамнезі --- цукровий діабет I типу. Отримувала 36 ОД інсуліну на добу. За 2 дні значно посилилися слабкість, полідипсія, поліурія, з'явилися нудота, блювання. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, тургор її знижений, очні яблука м'які, запах ацетону в повітрі, що видихається, пульс --- 112/х, АТ --- 95/55 мм рт. ст. Які дослідження треба провести насамперед?

- a. Аналіз крові на вміст заліза та кальцію
- b. Аналіз крові на вміст білірубіну і його фракцій
- c. Аналіз крові на вміст електролітів
- d. Аналіз крові на вміст глюкози та аналіз сечі на кетонові тіла
- e. Аналіз крові на креатинін і сечовину

Правильна відповідь: Аналіз крові на вміст глюкози та аналіз сечі на кетонові тіла

Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 30-ти років відзначає кров'янисті виділення із статевих шляхів протягом 2-х тижнів. В анамнезі: 2 тижні тому жінці було виконано хірургічне переривання вагітності у терміні 8 тижнів. Огляд у дзеркалах: шийка матки чиста, з зовнішнього вічка помірні кров'янисті виділення. Вагінальне дослідження: матка в антефлексії, рухлива, безболісна, трохи збільшена. Додатки без особливостей. Ваш діагноз:

- a. Порушення менструального циклу
- b. Неповний аборт
- c. Загроза аборту
- d. Післяabortний ендометрит
- e. Гіперменорея

Правильна відповідь: Неповний аборт

Питання 33

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 10-ти років доставлена в лікарню в непритомному стані. Часте, поверхневе дихання. Виражена неврологічна симптоматика: гіпертонус м'язів, ністагм, позитивні менінгеальні ознаки. Шкірна складка розгладжується більше 2 секунд. Глюкоза крові - 45 ммоль/л, рівень кетонових тіл в крові в нормі; кетонурії немає; осмолярність крові - 390 мосм/л. Який найбільш імовірний стан?

- a. Гіпоглікемічна кома
- b. Гіпотиреоїдна кома
- c. Кетоацидотична кома
- d. Лактатацидотична кома
- e. Гіперосмолярна кома

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

Питання 34

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 32 роки, який госпіталізований до лікарні з діагнозом: лептоспіроз, розвинувся септичний шок. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкіри і слизових, центральний венозний тиск -- 20 мм вод. ст., артеріальний тиск -- 80/40 мм рт. ст. Які лікарські засоби з наведених нижче треба додати до інтенсивної терапії?

- a. Вазодилататори
- b. Аналгетики
- c. Симпатоміметики
- d. Гепарин
- e. Діуретики

Правильна відповідь: Симпатоміметики

Питання 35

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 54 роки раптово втратила свідомість, дихання відсутнє, серцева діяльність не реєструється. Лікар-реаніматолог самостійно надає невідкладну допомогу. В якому співвідношенні треба проводити непрямий масаж серця та штучне дихання?

- a. 5 компресій грудної клітки --- 2 вдохи
- b. 50 компресій грудної клітки --- 2 вдохи
- c. 10 компресій грудної клітки --- 2 вдохи
- d. 40 компресій грудної клітки --- 2 вдохи
- e. 30 компресій грудної клітки --- 2 вдохи

Правильна відповідь: 30 компресій грудної клітки --- 2 вдохи

Питання 36

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 56-ти років випив 150 мл невідомої рідини. Скаржиться на слино- і слізозотечу, нудоту, блювання, біль у животі, пронос, утруднене дихання. Дезорієнтований, спостерігаються фібрілярні посіпування м'язів, тремор верхніх кінцівок, брадикардія, бронхоспазм, значна кількість хрипів у легенях, міоз. Якою речовиною викликане гостре отруєння?

- a. Дихлоретаном
- b. Бензином
- c. Фосфорорганічною сполукою
- d. Припікаючою рідиною
- e. Чотирьоххлористим вуглецем

Правильна відповідь: Фосфорорганічною сполукою

Питання 37

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У потерпілого під час медичного сортування встановлено частоту дихання - 6/хв., свідомість за шкалою ком Глазго - 8 балів, пульс на периферійних судинах не пальпується. До якої сортувальної групи належить потерпілий?

- a. "Фіолетової"
- b. "Зеленої"
- c. "Жовтої"
- d. "Червоної"
- e. "Чорної"

Правильна відповідь: "Червоної"

Питання 38

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Після падіння з опором на праве плече потерпілий скаржиться на біль, обмеження рухів, деформацію в ділянці плечового суглоба. Яких заходів на цьому етапі надання допомоги необхідно вжити?

- a. Блокада місця перелому
- b. Накладення шини Крамера від пальців до плечового суглоба
- c. Накладення шини Дітеріхса
- d. Транспортна іммобілізація, знеболення
- e. Накладення гіпсової пов'язки

Правильна відповідь: Транспортна іммобілізація, знеболення

Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнтки 8 місяців назад відбулися II термінові пологи, без ускладнень. З метою контрацепції використовує метод лактаційної аменореї. Менструації після пологів не було. Останні дні зауважила збільшення об'єму живота, відчуття "пе-реливів" у череві. Який імовірний діагноз?

- a. Позаматкова вагітність
- b. Повторна маткова вагітність
- c. Пухлина молочної залози з метастазами у черевну порожнину
- d. Пухлина черевної порожнини
- e. Асцит нез'ясованої етіології

Правильна відповідь: Повторна маткова вагітність

Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта віком 18 років під час лікування з приводу бактеріального ендокардиту раптово на фоні емоційного напруження розвинувся генералізований судомний напад. Після нападу в неврологічному статусі визначалися: центральний параліч VII, XII пар черепних нервів, геміанестезія та центральний параліч праворуч. Який імовірний діагноз у пацієнта?

- a. Лакунарний інсульт
- b. Кардіоемболічний інсульт
- c. Генералізований епілептичний напад
- d. Субарахноїдальний крововилив
- e. Гемодинамічний інсульт

Правильна відповідь: Кардіоемболічний інсульт

Питання 41

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 24-х років через 2 тижні після пологів з'явився біль у лівій нижній кінцівці. Ліве стегно і гомілка різко збільшилися в об'ємі за рахунок набряку. Спостерігається синюшність шкірних покривів. Пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Облітеруючий ендартеріїт
- b. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен
- c. Ілеофеморальний тромбоз
- d. Попереково-крижовий радикуліт
- e. Гострий артеріальний тромбоз

Правильна відповідь: Ілеофеморальний тромбоз

Питання 42

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 30-ти років скаржиться на головний біль, марення. Об'єктивно: температура тіла - 39оС, збуджена, обличчя гіперемоване, позитивний симптом Говорова-Годельє, петехіальний висип на тулубі, кінківках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., гепатосplenомегалія. Вживає алкоголь, ін'єкційні наркотики, живе в приміщенні підвального типу. Поставте попередній діагноз:

- a. Грип
- b. ВІЛ-інфекція
- c. Лептоспіроз
- d. Висипний тиф
- e. Алкогольний психоз

Правильна відповідь: Висипний тиф

Питання 43

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінці віком 22 роки для знеболення введено внутрішньом'язево 2 мл 50%-го розчину анальгіну (метамізолу). Після цього на лівій половині обличчя, навколо рота, на губах, слизовій оболонці ротової порожнини з'явився набряк (твердий, не утворює ямок під час натискування). Через декілька годин стан погіршився: з'явилася охриплість голосу та <<гавкаючий>> кашель. Об'єктивно встановлено: частота дихання -- 20/хв; частота серцевих скорочень -- 92/хв; АТ -- 100/70 мм рт.ст; температура тіла -- 37.1°C. Які з нижче наведених препаратів треба увести пацієнтці?

- a. Серцеві глікозиди
- b. Кортикостероїди
- c. Норадреналін
- d. Нестероїдні протизапальні
- e. Свіжозаморожену плазму

Правильна відповідь: Кортикостероїди

Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 43-х років, якого було госпіталізовано у гастроентерологічне відділення з діагнозом цироз печінки з порталовою гіпертензією III ступеня, після проведеного форсованого діурезу з'явилися ознаки печінкової енцефалопатії III ступеня. Призначення яких препаратів повинно бути першочерговим?

- a. Інсулін
- b. Діуретики
- c. Інгібтори протеаз
- d. Гепатопротектори
- e. Лактулоза

Правильна відповідь: Лактулоза

Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У п'ятимісячного хлопчика після першого введення прикорму з'явився гострий передмоподібний біль у животі, блювота, затримка випорожнень. При ректальному дослідженні - кров "стигла вишня". Ваш діагноз:

- a. Пухлина черевної порожнини
- b. Внутрішня грижа
- c. Глистна інвазія
- d. Кишкова інвагінація
- e. Гострий холецистит

Правильна відповідь: Кишкова інвагінація

Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Водій віком 48 років скаржиться на біль за грудиною пекучого характеру та тривалістю понад 30 хвилин. Напади загрудинного болю під час фізичного навантаження виникали протягом кількох років, але завжди минали після приймання нітрогліцерину. Під час огляду встановлено: стан середньої тяжкості, тони серця приглушенні. Артеріальний тиск -- 120/70 мм рт. ст. Пульс -- 80/хв., ритмічний. Який із наведених лікарських засобів є стандартом для лікування на догоспітальному етапі надання медичної допомоги?

- a. Ніфедипін
- b. Фуросемід
- c. Ацетилсаліцилова кислота
- d. Дигоксин
- e. Триметазидин

Правильна відповідь: Ацетилсаліцилова кислота

Питання 47

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Немовля віком 1 місяць. Протягом 10-ти діб має місце блювання, що виникає не після кожного прийому їжі, однак об'єм блювотних мас перевищує об'єм одноразового годування. Блювотні маси являють собою згорнуте материнське молоко з кислим запахом. Апетит не порушений, але вага тіла прогресивно зменшується. Найбільш імовірний діагноз:

- a. Інвагінація
- b. Кишкова непрохідність
- c. Гастроентерит
- d. Пілоростеноз
- e. Пухлина мозку

Правильна відповідь: Пілоростеноз

Питання 48

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 27-ми років скаржиться на появу сверблячих висипів, загальне нездужання, підвищення температури тіла до 37,8°C. Висипи з'явилися в період захворювання ангіною, з приводу якої приймала антибіотик, полоскала горло розчином перманганату калію. Об'єктивно: на шкірі тулуба, обличчя, верхніх і нижніх кінцівок спостерігається рясний рожево-зелено-папульозний висип рожево-червоного кольору, схильний до злиття. Місцями є нечисленні петехії. Поставте діагноз:

- a. Алергічний дерматит
- b. Синдром Лаєлла
- c. Гостра екзема
- d. Гостра крапив'янка
- e. Токсикодермія

Правильна відповідь: Токсикодермія

Питання 49

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час грози розряд блискавки влучив в дерево, під яким був пастух, 48-ми років. У нього мали місце збудження, дезорієнтація, періодичні судоми. Артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., пульс - 120/хв., дихання аритмічне. Які медикаменти необхідно призначити негайно?

- a. Теофілін
- b. Серцеві глюкозиди
- c. Седативні
- d. Глюкокортикоїди
- e. Адреналін

Правильна відповідь: Седативні

Питання 50

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При обстеженні дитини отримано аналіз сечі, забарвлений кров'ю. При лабораторному дослідженні виявлено незмінені еритроцити. Яке, на вашу думку, найбільш імовірне джерело гематуриї?

- a. Нефрон
- b. Клубочки
- c. Петля Генле
- d. Нижні сечовивідні шляхи
- e. Канальці

Правильна відповідь: Нижні сечовивідні шляхи

Питання 51

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У однорічної дитини з'явилися нежить, сухий кашель, підвищення температури тіла до 39.5°C . За 30 хв після госпіталізації з'явилися тоніко-клонічні судоми тривалістю 2 хв із подальшою втратою свідомості. Яка найімовірніша причина судом?

- a. Епілепсія
- b. Набряк мозку
- c. Менінгоенцефаліт
- d. Лихоманка
- e. Спазмофілія

Правильна відповідь: Лихоманка

Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної 29-ти років виникли скарги на головний біль, нудоту, блівоту на висоті головного болю, мерехтіння "мушок" перед очима, озноб з тремором кінцівок, порушення зору. АТ-145/90 мм рт.ст., пульс - 86/хв. Периферичні набряки відсутні. Напередодні підйому АТ вагітна відзначала емоційну напругу. Після надання допомоги виділилася світла сечи, протеїнурія відсутня. Який попередній діагноз має бути встановлений?

- a. Гіпертонічний криз
- b. Еклампсія
- c. Прееклампсія середнього ступеня
- d. Прееклампсія легкого ступеня
- e. Прееклампсія тяжкого ступеня

Правильна відповідь: Гіпертонічний криз

Питання 53

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпіла віком 28 років упала на вулиці з опорою на руку. Під час огляду виявляється: деформація на рівні середньої третини передпліччя, біль у разі навантаження, патологічна рухливість. Розладів магістрального кровообігу не виявлено, але пацієнтки скаржиться на парестезію у ділянці кисті. Яке положення передпліччя для транспортної іммобілізації потерпілої є оптимальним?

- a. Максимальна супінація
- b. Середнє між пронацією та супінацією
- c. Пронація 45 градусів від максимальної
- d. Максимальна пронація
- e. Супінація 45 градусів від максимальної

Правильна відповідь: Середнє між пронацією та супінацією

Питання 54

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 65 років за 20 хв після ураження електричним струмом скаржиться на перебої в роботі серця. Об'єктивно встановлено: ціаноз видимих слизових оболонок. Частота дихання — 20/хв. Тони серця приглушені, аритмічні, частота серцевих скорочень — 152/хв. АТ — 100/70 мм рт. ст. До якого відділення треба госпіталізувати цього пацієнта?

- a. Терапевтичного відділення
- b. Неврологічного відділення
- c. Інфарктного відділення
- d. Реанімаційного відділення
- e. Кардіологічного відділення

Правильна відповідь: Реанімаційного відділення

Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота спостерігаються кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Остання менструація 2 місяці тому. При бімануальному огляді матка збільшена до 5-6 тижнів вагітності, болісна при пальпації. При огляді шийки матки в дзеркалах виявлено: шийка вкорочена. В каналі шийки матки визначаються елементи плідного яйця та згортки крові. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- a. Загроза переривання вагітності
- b. Повний мимовільний викиденъ
- c. Викиденъ, що розпочався
- d. Викиденъ в ходу
- e. Неповний мимовільний викиденъ

Правильна відповідь: Викиденъ в ходу

Питання 56

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 27-ми років відзначає виділення з неприємним запахом зі статевих шляхів, біль в нижній частині живота, підвищення температури. Вищезазначені скарги з'явилися 2 дні тому. В анамнезі: тиждень тому жінці було виконано хірургічне переривання вагітності у терміні 8 тижнів. Огляд у дзеркалах: шийка матки чиста, з зовнішнього вічка виділення з неприємним запахом. Вагінальне дослідження: матка в антефлексії, рухлива, болюча, дещо збільшена. Додатки без особливостей. Поставте діагноз:

- a. Сальпінгоофорит
- b. Ентероколіт
- c. Післяабортний ендометрит
- d. Апендицит
- e. Гостре респіраторне захворювання

Правильна відповідь: Післяабортний ендометрит

Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час огляду роділлі спостерігається: пологова діяльність активна, положення плода поперечне, перша позиція. Результати вагінального обстеження такі: відкриття шийки матки на 8–9 см, випадіння ручки плода, відсутність серцевиття та рухів плода у матці. Якій тактиці ведення пологів треба надати перевагу у цьому разі?

- a. Ведення пологів природнім шляхом
- b. Плодоруйнівна операція
- c. Вакуум-екстракція
- d. Накладання акушерських щипців
- e. Кесарів розтин

Правильна відповідь: Плодоруйнівна операція

Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 22 роки прооперована з приводу позаматкової вагітності. У післяопераційний період з замісною метою їй призначили трансфузію еритроцитарної маси. Під час її проведення у пацієнтки виникла різка слабість, запоморочення, пропасниця, сильний біль за грудиною та в поперековій ділянці, одноразове блювання. Об'єктивно спостерігається: тахікардія до 120/хв, АТ знишився до 80/60 мм рт. ст. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- a. Цирратний шок
- b. Анафілактичний шок
- c. Гемотрансфузійний шок
- d. Гостра ниркова недостатність
- e. Гостра серцево-судинна недостатність

Правильна відповідь: Гемотрансфузійний шок

Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік раптово відчув слабкість та запаморочення. Спостерігається тахікардія, зниження артеріального тиску, з'явилися повторні дьогтьоподібні випорожнення (мелена). У якому відділі шлунково-кишкового тракту, найімовірніше, виникла кровотеча?

- a. Сигмовидна кишка
- b. Шлунок і дванадцятипала кишка
- c. Пряма кишка
- d. Тонка кишка
- e. Клубова кишка

Правильна відповідь: Шлунок і дванадцятипала кишка

Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час ремонту в квартирі жінці в праве око потрапив розчин гашеного вапна. В оці з'явилися сильний біль, світлобоязнь, слізотеча, знизився зір. Гострота зору правого ока 0,2 н/к. В правому оці очна щілина рефлекторно звужена, світлобоязнь, слізотеча. Кон'юнктиви повік гіперемована, місцями бліда, набрякла. Змішана ін'екція кон'юнктиви очного яблука. Рогівка сірого кольору, набрякла. Зіниця звужена, глибокі середовища ока дослідити неможливо у зв'язку з вираженою світлобоязнь. Яку допомогу необхідно надати першочергово?

- a. Закласти 1% тетрациклінову мазь
- b. Промити кон'юнктивальний мішок фізіологічним розчином
- c. Закапати дезінфікуючі розчини (0,25% розчин левоміцетину чи 20% розчин сульфацил натрію)
- d. Рясно промити кон'юнктивальну порожнину водою протягом 15-20 хвилин
- e. Закласти гормональну мазь

Правильна відповідь: Рясно промити кон'юнктивальну порожнину водою протягом 15-20 хвилин

Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 70 років госпіталізований до судинного відділення з приводу лівобічного ілеофеморального тромбозу на 7-му добу після початку захворювання. Під час дуплексного дослідження виявлено венозний тромбоз стегнової вени без явищ флотації верхівки, розташований пристінково. Який вид лікування треба застосувати пацієнту?

- a. Плікацію нижньої порожнистої вени
- b. Установлення кава-фільтра
- c. Консервативне лікування
- d. Еластичну компресію, антикоагулянтну та гемореологічну терапію
- e. Тромбектомію

Правильна відповідь: Консервативне лікування

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 43 роки працює водієм вантажного автотранспорту. Під час переливання бензину через шланг із однієї ємності в іншу, заковтнув невелику кількість рідини. За 3 дні після цього звернувся до лікаря зі скаргами на головний біль за типом мігрені, запаморочення, поганий сон, дратівливість, відчуття повзання мурах по тілу, наявність відчуття <<клубка волосся>> в роті, кошмарні сновидіння. Який попередній діагноз?

- a. Інтоксикація бензолом
- b. Інтоксикація тетраетилсвинцем
- c. Інтоксикація ртутьорганічними сполуками
- d. Інтоксикація етиленгліколем
- e. Інтоксикація фосфорорганічними сполуками

Правильна відповідь: Інтоксикація тетраетилсвинцем

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У реанімаційне відділення доставлений хлопчик 10-ти років з гострим отруєнням свинцем. Млявий, шкіра бліда, артеріальний тиск - 110/55 мм рт.ст., ендогенний креатинін - 1,098 ммол/л, сечовина - 20,8 ммол/л, калій плазми - 7,9 ммол/л, діурез - 200 мл/добу. Що слід призначити першочергово?

- a. Хелатоутворювачі
- b. Активоване вугілля
- c. Плазмаферез
- d. Ентеросгель
- e. Лазикс

Правильна відповідь: Хелатоутворювачі

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час святкування дня народження одному з гостей раптово стає погано: зблід, кашляє. Присутні підоозрюють, що він вдихнув кістку з риби. Найбільш специфічним проявом наявності стороннього тіла в гортані є:

- a. Напад інспіраторної ядухи
- b. Почервоніння обличчя
- c. Посиніння обличчя
- d. Напад експіраторної ядухи
- e. Розвиток гіпотонії

Правильна відповідь: Напад інспіраторної ядухи

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дворічного хлопчика, який хворіє на тетраду Фалло, раптово збільшилася інтенсивність ціанозу, з'явилася задишка, він присів навпочіпки. Що з наведеного нижче має призначити лікар у цьому разі?

- a. Серцеві глікозиди
- b. Бронхолітики
- c. Оксигенотерапію
- d. Сечогінні
- e. Антибіотики

Правильна відповідь: Оксигенотерапію

Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнт кардіологічного відділення віком 54 роки з діагнозом: дилатаційна кардіоміопатія, серцева недостатність II-Б ст, функціональний клас III у коридорі раптово знепритомнів та перестав дихати. Постова медсестра негайно викликала лікаря, який діагностував клінічну смерть. Яка тактика лікаря насамперед?

- a. Провести УЗД серця
- b. Розпочати заходи легенево-серцевої реанімації
- c. Провести прекардіальний удар
- d. Провести ЕКГ дослідження
- e. Виконати дефібриляцію

Правильна відповідь: Розпочати заходи легенево-серцевої реанімації

Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У роділлі з доношеною вагітністю з початком пологової діяльності на тлі головного болю підвищився артеріальний тиск (180/120 мм рт.ст.), почалися судоми. Після в/в введення 4 г сульфату магнію та загальної анестезії тіопенталом натрію судоми припинилися. Розпочата штучна вентиляція легень. Яким методом потрібно провести розрідження?

- a. Внутрішньовенна стимуляція окситоцин-простагландином
- b. -
- c. Внутрішньовенна стимуляція окситоцином
- d. Кесарів розтин
- e. Внутрішньовенна стимуляція простагландином

Правильна відповідь: Кесарів розтин

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт віком 48 років, який протягом 16 років хворіє на стеноз пілоруса, як наслідок виразкової хвороби, скаржиться на слабкість, масивне блювання протягом тижня, спрагу, різке схуднення. Об'єктивно спостерігається: збуджений, блідий, АТ — 90/60 мм рт.ст., ЧСС — 110-130/хв., аритмія, ЦВТ — 0 мм вод. ст., діурез менше 10 мл/год, гематокрит — 52%, $\text{Na}^+ + \text{K}^+$ — 125 ммол/л, $\text{K}^+ + \text{H}^+$ — 2,7 ммол/л, pH — 7,6, BE — +13. Чим визначається тяжкість стану пацієнта?

- a. Аритмією та респіраторним алкалозом
- b. Геморагічним шоком
- c. Кардіогенним шоком
- d. Метаболічним ацидозом
- e. Дегідратацією та метаболічним алкалозом

Правильна відповідь: Дегідратацією та метаболічним алкалозом

Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 46 років із діагнозом: Q-інфаркт міокарда через 2 години після початку захворювання та проведення фібринолітичної терапії раптово знепритомнів, посинів, з'явилися судоми. Об'єктивно спостерігається: пульс та АТ не визначаються, на моніторі велика кількість альтернуочих хвиль подібних до QRS-комплексів. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Ідіовентрикулярний ритм
- b. Фібриляція шлуночків
- c. Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія
- d. Фібриляція передсердь
- e. Гостра кровотеча

Правильна відповідь: Фібриляція шлуночків

Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 47 років скаржиться на збільшення температури тіла до 39 $^{\circ}$ C, загальну слабкість, виражену задишку, непродуктивний кашель, відчуття важкості й повноти в правій половині грудної клітки. Об'єктивно встановлено: пацієнт лежить на правому боці, акроціаноз, відставання правої половини грудної клітки в акті дихання, притуплення перкуторного звуку справа до рівня II ребра. Встановіть попередній діагноз.

- a. Масивний ексудативний плеврит
- b. Правобічна крупозна пневмонія
- c. Спонтанний пневмоторакс справа
- d. Масивний ексудативний перикардит
- e. Міліарний туберкульоз

Правильна відповідь: Масивний ексудативний плеврит

Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної жінки, яка скаржиться на переймоподібний біль унизу живота, спостерігаються кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Остання менструація була 2 місяці тому. Під час бімануального дослідження встановлено: матка болісна та збільшена до 5–6 тижнів вагітності, вагінальна частина шийки матки укорочена, розм'якшена, канал шийки матки розкритий, у цервіальному каналі розташовані елементи плідного яйця та згустки крові. Який патологічний стан розвинувся у жінки?

- a. Повний мимовільний аборт
- b. Неповний мимовільний аборт
- c. Аборт у ходу
- d. Аборт, що невідбувся
- e. Загрозливий аборт

Правильна відповідь: Аборт у ходу

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дівчину віком 21 рік без свідомості госпіталізовано до лікарні. Хворіє на хронічну наднірникову недостатність. Протягом декількох годин з'явився біль у животі, акроціаноз, знишився АТ до 70/50 мм рт. ст., втратила свідомість. Результати лабораторного дослідження: калій крові — 7,2 ммоль/л, глюкоза крові — 2,0 ммоль/л. На ЕКГ спостерігається: високі загострені зубці Т, подовження інтервалу S-T та розширення комплексу QRS. Який імовірний діагноз?

- a. Гіpopітуїтарна кома
- b. Гіперглікемічна кома
- c. Гіперацидотична кома
- d. Гіпертонічний криз
- e. Аддісонічний криз

Правильна відповідь: Аддісонічний криз

Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дівчина віком 19 років, під час забору крові для аналізу, раптово відчула загальну слабкість, запаморочення, сильне серцебиття, короткочасно втратила свідомість. Об'ективно спостерігається: шкіра бліда, виражений гіпергідроз, АТ -- 100/60 мм рт. ст., пульс -- 98/хв, слабкого наповнення. Судом не було, рефлекси збережені, патологічні рефлекси відсутні. Який імовірний діагноз?

- a. Ортостатична гіпотензія
- b. Непритомність
- c. Транзиторна ішемічна атака
- d. Геморагічний інсульт
- e. Епілептичний напад

Правильна відповідь: Непритомність

Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпілого 36-ти років переведено до хірургічного відділення військового госпіталю через 4 доби лікування в районній лікарні. Діагноз: уламкове сліпе множинне поранення лівої кінцівки. У пацієнта підвищилася температура тіла, рана почервоніла, набрякла. Який вид хірургічної допомоги слід надати потерпілому?

- a. Відкладена первинна хірургічна обробка рани
- b. Рання первинна хірургічна обробка рани
- c. Ампутація кінцівки
- d. Пізня первинна хірургічна обробка рани
- e. Вторинна хірургічна обробка рани

Правильна відповідь: Вторинна хірургічна обробка рани

Питання 75

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт під час переливання крові відчув слабкість, серцебиття, холод у кінцівках. Об'ективно спостерігається: шкіра вкрита холодним липким потом, ціаноз кінцівок, АТ — 60/30 мм рт. ст., пульс — 110/хв., дихання часте та поверхневе, сеча темного кольору. Якою буде тактика надання невідкладної допомоги пацієнту?

- a. Припинити гемотрансфузію, увести антикоагулянти
- b. Реанімація за системою САВ
- c. Продовжити гемотрансфузію, увести кордіамін
- d. Припинити гемотрансфузію, увести адреналін
- e. Продовжити гемотрансфузію, увести преднізолон

Правильна відповідь: Припинити гемотрансфузію, увести адреналін

Питання 76

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хлопця віком 17 років після нервово-психічної травми раптово з'явилися скарги на головний біль, запаморочення, нудоту, блювання, погіршення зору, біль у серці та відчуття серцебиття. Об'ективно виявлено: ЧСС — 120/хв, озноб, м'язове тремтіння, пітливість, гіперемія шкіри, пацієнт збуджений. На ЕКГ спостерігаються ознаки гіпертрофії та систолічного перевантаження лівого шлуночка. З анамнезу відомо, що батько пацієнта хворіє на гіпертонічну хворобу. Яку терапію треба призначити для усунення нападу?

- a. Сублінгвально каптоприл
- b. Сублінгвально пропранолол
- c. Парентерально фуросемід
- d. Сублінгвально фенігідин
- e. Ентерально клонідин

Правильна відповідь: Сублінгвально пропранолол

Питання 77

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт, який хворіє на гемофілію А, отримав травму, що ускладнилася кровотечею. Які невідкладні заходи треба застосувати?

- a. Увести етамзилат натрію
- b. Увести амінокапронову кислоту
- c. Увести в/в кріопреципітат або препарати рекомбінантного фактору VIII
- d. Увести антикоагулянти прямої дії
- e. Перелити еритроцитарну масу

Правильна відповідь: Увести в/в кріопреципітат або препарати рекомбінантного фактору VIII

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 38-ми років через 8 днів після поранення ступні з'явились тягучий біль, тонічне напруження й судомні скорочення жувальних м'язів та кінцівок, печіння в ділянці рані. На 4-й день відзначено напруження м'язів кінцівок. На 9-й день хвороби на тлі підвищеного тонусу м'язів з'явилися загальні клоніко-тонічні судоми, тривалістю від кількох секунд до хвилини. Пульс напружений, 110/хв., артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., тони серця глухі. Обстеження на яку хворобу треба провести?

- a. Бешиха
- b. Бактеріальний менінгіт
- c. Сказ
- d. Туляремія
- e. Правець

Правильна відповідь: Правець

Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час проведення закритого масажу серця з'явився специфічний хрускіт, який свідчить про перелом ребер. Яка тактика лікаря стосовно продовження заходів серцево-легеневої реанімації?

- a. Припинити масаж внаслідок небезпеки розвитку кардіопульмонального шоку
- b. Припинити масаж серця і ввести адреналіну гідрохлорид внутрішньовенно
- c. Виконати новокайному блокаду місць переломів і продовжити масаж серця
- d. Продовжувати масаж, нічого не змінюючи
- e. Продовжити масаж, встановивши основи долонь на груддину

Правильна відповідь: Продовжити масаж, встановивши основи долонь на груддину

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У півторарічної дитини із септичним шоком виникла кровотеча з місць ін'єкцій, по шлунковому зонду надходить <<кавова гуща>>. Під час визначення показників гемостазу виявлено: збільшено МНВ, АЧТЧ, рівень D-димеру, знижений фібриноген, тромбоцити — $30 \cdot 10^9 / \text{л}$. Для якого патологічного процесу характерні такі показники?

- a. Синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
- b. Ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпурі
- c. Дефіциту вітаміну K
- d. Тромботичної тромбоцитопенічної пурпурі
- e. Хвороби Віллебранда

Правильна відповідь: Синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові

Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 46 років, після емоційного навантаження, раптово відчула сильний біль за грудиною та втратила свідомість. Об'єктивно встановлено: тони сердця відсутні, апное, АТ та пульс не визначається. На ЕКГ спостерігається: хвилі різної висоти та ширини, неоднакової форми. Який із наведених нижче заходів буде найбільш ефективним у цьому разі?

- a. Електрична дефібриляція
- b. Дігоксін в/с
- c. Адреналін в/с
- d. Атропін в/с
- e. Страфантин в/с

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Прaporщик 38-ми років звернувся в медичний пункт з приводу колотої рани стопи, в минулому двічі вакцинований і ревакцинований у плановому порядку проти правцю 8 років тому. Вкажіть тактику щодо специфічної профілактики правцю:

- a. Ввести противправцевий імуноглобулін
- b. Ввести АП-анатоксин
- c. Ввести протидифтерійний анатоксин
- d. Ввести АДП-м анатоксин
- e. Ввести АКДП вакцину

Правильна відповідь: Ввести АП-анатоксин

Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 59 років раптово на вулиці втратив свідомість. Діагностовані ознаки клінічної смерті. З чого треба починати реанімаційні заходи?

- a. Виконання зовнішнього масажу серця
- b. Виконання потрійного прийому Сафара
- c. Виконання конікотомії
- d. Уведення аміодарону чи лідокаїну
- e. Уведення атропіну та адреналіну

Правильна відповідь: Виконання потрійного прийому Сафара

Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Породілля перебуває у пологовому залі. Пологи тривають 11 годин, розпочався другий період пологів. При проведенні кардіотокографії плода встановлено, що частота серцевих скорочень знизилася до 100/хв. При проведенні піхвового дослідження встановлено, що голівка плода розташована у вузькій частині порожнини малого тазу. Який стан плода найбільш імовірний?

- a. Фізіологічна брадикардія плода
- b. Агональний стан плода
- c. Краніоспінальна травма
- d. Фетоплацентарна недостатність плода
- e. Дистрес плода

Правильна відповідь: Фізіологічна брадикардія плода

Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної 29-ти років встановлений діагноз: вагітність 1, 32 тижня. Прееклампсія тяжкого ступеня. Який із перерахованих препаратів необхідно призначити для профілактики виникнення судом?

- a. Клонідину сульфат
- b. Сульфат магнію
- c. Бензогексоній
- d. Ніфедипін
- e. Діазепам

Правильна відповідь: Сульфат магнію

Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 16-ти років звернулась до лікаря зі скаргами на інтенсивний головний біль, підвищену температуру тіла, сонливість. На шиї слід від укусу кліща з зоною гіперемії. Запідоозрений кліщовий енцефаліт. Якою має бути екстрена специфічна профілактика?

- a. Введення специфічного донорського імуноглобуліну
- b. Вакцинація
- c. Профілактичний прийом антибіотиків
- d. Введення інтерферону
- e. Специфічна профілактика не проводиться

Правильна відповідь: Введення специфічного донорського імуноглобуліну

Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У сержанта 30-ти років після вибуху авіабомби ліва гомілка була притиснута бетонною стіною до землі. Звільнення від стиснення гомілки відбулося через 3 години, потерпілого доставлено у госпіталь. Шкіра гомілки блідо-ціанотична, холодна на дотик, набрякла. Тони серця приглушені, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, 120/хв. У сечі: міoglobін, протеїнурія та циліндрурія, колір - бурій. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Синдром тривалого стиснення, проміжний період
- b. Синдром тривалого стиснення, ранній період
- c. Гостра печінкова недостатність
- d. Гострий венозний тромбоз
- e. Гострий гломерулонефрит

Правильна відповідь: Синдром тривалого стиснення, ранній період

Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У десятимісячної дитини із діагнозом: септичний шок розвинувся геморагічний синдром (кровотеча з місць ін'екцій, по шлунковому зонду надходить <<кавова гуща>>). Під час визначення показників гемостазу виявлено підвищення міжнародного нормалізаційного відношення, АЧТЧ, рівня D-димеру, а також зниження фібриногену та тромбоцитів. Діагностовано ДВЗ-синдром. Що насамперед треба призначити дитині для корекції гемостазу?

- a. Свіжозаморожену плаズму
- b. Етамзилат натрію
- c. Дезагреганти
- d. Вітамін К
- e. Хлорид кальцію

Правильна відповідь: Свіжозаморожену плаズму

Питання 89

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини віком 6 років після вживання шоколадних цукерок раптово на різних ділянках шкіри з'явилися висипання у вигляді множинних і схильних до злиття елементів. Їх поява супроводжувалася нестерпним свербіжем, підвищеннем температури тіла до $37,2^{\circ}\text{C}$. За результатом клінічного аналізу крові виявлено еозинофілю. Для якого захворювання характерні такі клініко-лабораторні показники?

- a. Вітряна віспа
- b. Синдром Стівена-Джонса
- c. Синдром Лайелла
- d. Пухирчатка
- e. Крапив'янка

Правильна відповідь: Крапив'янка

Питання 90

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Визначте причину порушення функції нирок під час застосування норадреналіну.

- a. Ураження кіркового шару нирок
- b. Токсична дія на мозковий шар нирок
- c. Причина ураження нирок не зрозуміла
- d. Ураження канальців
- e. Спазм артерій і вен мозкового шару нирок

Правильна відповідь: Спазм артерій і вен мозкового шару нирок

Питання 91

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 49 років, який зловживає алкоголем, госпіталізований до хірургічного відділення для оперування грижі. Наступного дня після успішної операції у пацієнта спостерігається порушення орієнтації, він метушливий, не впізнає лікаря, каже, що по шкірі повзають павуки, що він у в'язниці і його не випускають стіни. Об'єктивно виявлено: температура тіла — 38,5°C, тремор, озноб, пульс аритмічний, гіпергідроз, живіт спокійний. Для якого патологічного стану характерні такі симптоми?

- a. Післяопераційний психоз
- b. Гострий алкогольний параноїд
- c. Алкогольний делірій
- d. Гостра енцефалопатія Гайє-Верніке
- e. Гострий алкогольний галюциноз

Правильна відповідь: Алкогольний делірій

Питання 92

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнта 28-ми років протягом 2 тижнів лежить у ліжку, голова піднята над подушкою, покриви обличчя сальні. Тонус м'язів підвищений, на запитання не відповідає, інструкції не виконує. З боку внутрішніх органів без патології. Артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст., пульс - 62/хв, температура тіла - 36,7°C. Який Ваш попередній діагноз?

- a. Депресивний ступор
- b. Кататонічний ступор
- c. Апатичний ступор
- d. Епілептичний ступор
- e. Психогенний ступор

Правильна відповідь: Кататонічний ступор

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Лаборанта, який у портовому місті під час дослідження матеріалу померлих від епізоотії шурів виявив короткі палички овоїдної форми з біполлярним забарвленням, госпіталізовано до інфекційної лікарні. Скаржиться на ріжучий біль у грудях, підвищення температури тіла до 40.5°C , задуха, кашель із виділенням спочатку слизового, а потім кров'янистої мокротиння. Об'єктивно спостерігається: стан пацієнта україн тяжкий, сатурація — 65%, виражена блідість шкірних покривів, тотальний ціаноз. Аускультивно вислуховується дифузне ослаблене дихання в легенях з обох сторін. Укажіть найімовірніший етіологічний фактор, що спричинив розвиток такого стану в пацієнта?

- a. *\emph{Yersinia pseudotuberculosis}*
- b. *\emph{Streptococcus pneumoniae}*
- c. *\emph{Bacillus anthracis}*
- d. *\emph{Yersinia pestis}*
- e. *\emph{Francisella tularensis}*

Правильна відповідь: *\emph{Yersinia pestis}*

Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого, що перебував в інфекційному відділенні з діагнозом гострий гепатит В, на 10-й день хвороби посилилася жовтяниця, з'явилося збудження, ейфорія, "печінковий" запах з роту, сухожилкові рефлекси підвищені, температура субфебрильна. У зв'язку з яким ускладненням погіршився стан хворого?

- a. Менінгіт
- b. Холангіт
- c. Печінкова енцефалопатія
- d. Інфекційно-токсичний шок
- e. Панкреатит

Правильна відповідь: Печінкова енцефалопатія

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 48 років постраждав від ураження блискавкою. Під час огляду у пацієнта спостерігається: збудження, дезорієнтація, періодичні судоми. Артеріальний тиск — 140/90 мм рт.ст., пульс — 120/хв, дихання аритмічне. Які лікарські засоби треба призначити пацієнту терміново?

- a. Теофілін
- b. Серцеві глюкозиди
- c. Адреналін
- d. Глюкокортикоїди
- e. Седативні

Правильна відповідь: Седативні

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта віком 32 роки із діагнозом: вірусний гепатит В розвинулася гостра печінкова недостатність із ознаками сомноленції (прекома). Які лабораторні показники характерні для цього стану?

- a. Зниження рівня білірубіну та АлАТ
- b. Підвищення рівня білірубіну та альбуміну
- c. Підвищення АлАТ і протромбінового індексу
- d. Підвищення рівня білірубіну та МНВ
- e. Підвищення протромбінового індексу

Правильна відповідь: Підвищення рівня білірубіну та МНВ

Питання 97

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка, який хворіє хронічною наднірковою недостатністю, після апендектомії різко погіршився стан: спостерігається прогресуюче зниження АТ, глухість тонів серця, тахікардія, пульс слабкого наповнення, акроціаноз, <<мармуровість>> шкіри. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Перитоніт
- b. Кишкова непрохідність
- c. Гіповолемічний шок
- d. Гостра надніркова недостатність
- e. Серцева недостатність

Правильна відповідь: Гостра надніркова недостатність

Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальне відділення звернувся хворий 31-го року зі скаргами на гострий біль у попереку справа та правій половині живота. Біль віддавав у праву пахову область та яєчко. Відзначається нудота, блювання, часті позиви до сечовипускання. В аналізі сечі - гематурія. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий орхеопідидиміт
- b. Гострий апендицит
- c. Гострий піелонефрит
- d. Гіпернефрона правої нирки
- e. Ниркова коліка справа

Правильна відповідь: Ниркова коліка справа

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Після поранення у ліве стегно, у військовослужбовця виникла кровотеча та сильний біль у рані. Об'єктивно спостерігається: пацієнт на ногу стати не може, кінцівка неприродно зігнута на рівні середньої третини стегна, пульсація тильної артерії стопи збережена. На передній поверхні стегна рана розміром 1x1 см, на задній --- 3x5 см. Які найперші дії санінструктора під час надання домедичної допомоги пораненому?

- a. Накласти асептичну пов'язку
- b. Увести внутрішньом'язово знеболювальний засіб зі шприц-тюбика
- c. Провести іммобілізацію кінцівки за допомогою підручних засобів
- d. Зупинити кровотечу з рані
- e. Дати потерпілому антибіотик з аптечки медичної індивідуальної

Правильна відповідь: Зупинити кровотечу з рані

Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого з гострим інфарктом міокарда з'явилися скарги на серцебиття, лихоманку, загальну слабкість. Загальний стан важкий, артеріальний тиск - 85/50 мм рт.ст., пульс - 190/хв., аритмічний. Дихання везикулярне. Набряки відсутні. ЕКГ: миготлива аритмія, частота серцевих скорочень - 220/хв. З чого треба розпочати лікування?

- a. Введення строфантину в/в
- b. Введення верапамілу в/в
- c. Електроімпульсна терапія
- d. Введення лідокаїну в/в
- e. Введення кордарону в/в

Правильна відповідь: Електроімпульсна терапія

Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 55-ти років працювала на городі, коли раптом відчула різкий головний біль, нудоту, слабкість, а потім зневідомніла та впала. Під час огляду в стаціонарі: рівень свідомості - сопор, відзначається психомоторне збудження, артеріальний тиск - 200/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 92/хв. Спеціаліст якого профілю повинен оглянути хвору в першу чергу?

- a. Невропатолог
- b. Інфекціоніст
- c. Нейрохірург
- d. Хірург
- e. Реаніматолог

Правильна відповідь: Невропатолог

Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На виробництві з виготовлення пластмасових контейнерів відбулась аварія. Через 1 годину після цього працівник звернувся до медичного пункту зі скаргами на шум у вухах, головний біль, запаморочення, загальну слабкість, підвищення температури тіла до фебрильної, слинотечу та пронос, сірий відтінок шкірних покривів. Через півтори години звернулись ще 6 працівників зі схожою клінікою. У всіх постраждалих в крові було виявлено метгемоглобінємію. Яка речовина найбільш імовірно викликала таке отруєння?

- a. Похідні фенолу
- b. Синильна кислота
- c. Аміак
- d. Моноксид вуглецю
- e. Сірководень

Правильна відповідь: Похідні фенолу

Питання 103

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого лихоманка 38-39оС протягом 6-ти днів, головний біль, біль в м'язах, жовтяниця, носова кровотеча, олігоурія. Лейкоцити крові - 16,5 · 10⁹/л, ШОЕ- 52 мм/год, аналіз сечі: блок - 0,125 г/л, лейкоцити - 15-20 в полі зору, еритроцити - 5-8 в полі зору, циліндри гіалінові - 2-3. Ваш діагноз:

- a. Гострий гломерулонефрит
- b. Сепсис
- c. Лептоспіroz
- d. Гострий піелонефрит
- e. Геморагічна гарячка

Правильна відповідь: Лептоспіroz

Питання 104

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої дитини наприкінці 1-ї доби життя спостерігається іктеричність шкірних покривів, збільшення розмірів печінки та селезінки, загальна кволість. Рівень білірубіну в крові - 200 ммол/л, в основному за рахунок вільної фракції, погодинний приріст його 8,1 ммол/л. Рівень гемоглобіну - 100 г/л, ретикулоцити - 5%. Ваша подальша тактика:

- a. Ентеросорбенти
- b. Призначення фенобарбіталу
- c. Фототерапія
- d. Інфузійна терапія
- e. Замінне переливання крові

Правильна відповідь: Замінне переливання крові

Питання 105

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого, що перебуває у стані септичного шоку, який виник на тлі менінгококової інфекції, проведено дослідження біохімічних показників плазми крові. Який з показників свідчить про наявність тяжкої тканинної гіпоперфузії?

- a. Лактат плазми крові 5,7 ммоль/л
- b. Загальний протеїн плазми крові 52 г/л
- c. Іонізований калій плазми крові 2,8 ммоль/л
- d. Сечовина плазми крові 16,1 ммоль/л
- e. Глюкоза плазми крові 13,4 ммоль/л

Правильна відповідь: Лактат плазми крові 5,7 ммоль/л

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 25-ти років через 40 хвилин після прийому оксациліну з'явилися захриплість голосу, "гавкаючий" кашель, утруднення дихання із задишкою інспіраторного характеру, задуха. Об'єктивно: хвора неспокійна, метушлива. Дихання шумне, стридорозне. Обличчя ціанотичне. Аускультивно: розсіяні сухі свистячі хрипи. Ваш діагноз:

- a. Напад бронхіальної астми
- b. Паратонзиллярний абсцес
- c. Гострий фарингіт
- d. Гострий набряк Квінке
- e. Стороннє тіло трахеї

Правильна відповідь: Гострий набряк Квінке

Питання 107

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 58-ми років, що переніс Q-інфаркт міокарда, з'явилися напади серцебиття, що супроводжуються задишкою, болем за грудиною, загальною слабкістю. Об'єктивно: акроціаноз, пульс - 160/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 105/65 мм рт.ст., тони серця ослаблені. На ЕКГ: зубці Р відсутні, QRS - деформовані, розширені - 0,14 с., зубці Т направлені в протилежну сторону від QRS. Яке порушення ритму розвинулося в хворого?

- a. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- b. Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія
- c. Фібриляція шлуночків
- d. Синусова тахікардія
- e. Пароксизмальна форма фібриляції передсердь

Правильна відповідь: Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

Питання 108

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини за 10 годин після народження з'явилися жовтяниця, гіпотонія, гіпопефлексія та виявлено помірну гепатосplenомегалію. Випорожнення та сеча звичайного кольору. Білірубін пуповинної крові — 51 мкмоль/л за рахунок непрямого. Результати дослідження венозної крові такі: еритроцити --- \$3,5\cdot10^{12}/л, Hb --- 140 г/л, ретикулоцити --- 1,5%, білірубін --- 111 мкмоль/л, (прямий --- 11 мкмоль/л), АлАТ --- 40 ОД, АсАТ --- 30 ОД. Група крові матері --- A (II) Rh (-), дитини A(II) Rh (+). Яке лабораторне дослідження треба провести для уточнення діагнозу?

- a. Еритроцитометрію
- b. Дослідження маркерів вірусного гепатиту
- c. Пробу Кумбса
- d. Визначення осмотичної резистентності еритроцитів
- e. Визначення в еритроцитах глюкоз-6-фосфатдегідрогенази

Правильна відповідь: Пробу Кумбса

Питання 109

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 25-ти років 2 тижні тому народила здорову дівчинку. Вагітність та пологи перебігали без ускладнень. Виписані на 2-гу добу. Психосоматичний анамнез не обтяжений. Після виписки з полового будинку родичі звернули увагу на її агресивність, часті зміни настрою, відсутність бажання доглядати за дитиною. Маті викликала дільничного лікаря у зв'язку з тим, що дочка зробила спробу задушити немовля. На запитання "чому?" відповідала, що чула голос, який сказав, що вона повинна вбити дитину. Виникла підозра на післяпологовий психоз. Якою буде тактика лікаря у цьому випадку?

- a. Дати направлення на консультацію до психіатра
- b. Призначити антидепресанти та вітамінотерапію
- c. Дати рекомендації щодо режиму праці та відпочинку
- d. Призначити повне клінічне обстеження
- e. Негайна госпіталізація до спеціалізованого стаціонару

Правильна відповідь: Негайна госпіталізація до спеціалізованого стаціонару

Питання 110

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 64 роки, який хворіє на варикозне розширення вен нижніх кінцівок, виник біль у литкових м'язах, що посилюється у гомілковостопному суглобі під час рухів. Об'єктивно спостерігається: набряк та біль у м'язах гомілки під час пальпації, позитивні симптоми Хоманса та Мозеса. Який метод інструментальної діагностики треба застосувати для подальшого обстеження насамперед?

- a. Капілярoscопія
- b. Радіоізотопна флеображення
- c. Ультразвукове дослідження судин
- d. Сфігмографія
- e. Шкірна термометрія

Правильна відповідь: Ультразвукове дослідження судин

Питання 111

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіка віком 50 років госпіталізовано до лікарні у непрітомному стані. 2 тижні тому отримав ЧМТ. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, шкірні покриви бліді, дихання не порушене, АТ — 130/85 мм рт.ст., пульс — 60/хв, анізокорія S>D, асиметрія нижньолицевих м'язів справа, сухожильна анізорефлексія D>S, абдомінальні рефлекси D<S, позитивні стопні патологічні рефлекси справа. Менінгеальні симптоми відсутні. Для якого патологічного стану характерні такі клінічні прояви?

- a. Пухлини головного мозку
- b. Менінгіту
- c. Субдуральної гематоми
- d. Ішемічного інсульту
- e. Субарахноїдального крововиливу

Правильна відповідь: Субдуральної гематоми

Питання 112

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Медичне сортування проводиться під час надзвичайних ситуацій, що пов'язані з великою кількістю поранених. На скільки сортувальних категорій розподіляються потерпілі та за якими критеріями?

- a. Три сортувальні групи за станом здоров'я
- b. Дві сортувальні групи за станом здоров'я та потребою в однорідних лікувальних та евакуаційних заходах
- c. Дві сортувальні групи за потребою в евакуаційних заходах
- d. Чотири сортувальні групи за станом здоров'я та потребою в однорідних лікувальних та евакуаційних заходах
- e. На догоспітальному етапі медичне сортування не проводиться

Правильна відповідь: Чотири сортувальні групи за станом здоров'я та потребою в однорідних лікувальних та евакуаційних заходах

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пораненого в ділянку черепа спостерігається біль у грудях, кровохаркання, кашель, задишка. Температура тіла - 37,0°C. При обстеженні: дихання в легенях ослаблено, хрипів немає. При рентгенологічному дослідженні виявляються множинні дрібні тіні в обох легенях. Яка причина виявленіх змін?

- a. Пневмоторакс
- b. Гемоперикард
- c. Крововилив у легені
- d. Аспіраційна пневмонія
- e. Гемоторакс

Правильна відповідь: Крововилив у легені

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Солдат перебуває у військовому польовому пересувному госпіталі з кульовим пораненням середньої третини правого стегна. Стан важкий, шкіра бліда, температура тіла - 37,8°C, пульс - 106/хв., артеріальний тиск - 90/70 мм рт.ст. Останні 3 дні турбує кашель з харкотинням. При аускультації у нижній частці лівої легені вологі хрипи. З чим пов'язане погіршення стану?

- a. Приєднання пневмонії
- b. Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ)
- c. Пневмоторакс
- d. Плеврит
- e. Набряк легень

Правильна відповідь: Приєднання пневмонії

Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 37-ми років на вулиці раптово втратила свідомість. Розвинулися судомі, відбулося неконтрольоване сечовиділення. Об'єктивно: хвора без ознак свідомості, позитивні менінгеальні симптоми, спонтанна рухова активність лівих кінцівок. В яке відділення слід госпіталізувати хвору?

- a. Нейрохірургічне
- b. Ендокринологічне
- c. Інфекційне
- d. Неврологічне
- e. Кардіологічне

Правильна відповідь: Неврологічне

Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 65-ти років після побутової травми скаржиться на біль у кульшовому суглобі та неможливість рухів нижньої кінцівки. Об'єктивно: кінцівка вкорочена і ротована назовні, симптом "прилиплої п'яти".
Виберіть оптимальний метод надання першої медичної допомоги:

- a. Транспортна іммобілізація шиною Дітеріхса, знеболення анальгетиками
- b. Транспортувати в лікарню на жорстких ношах
- c. Знеболення місця перелому, іммобілізація шиною Крамера
- d. Накласти шину Беллера
- e. Виконати репозицію відламків та транспортну іммобілізацію

Правильна відповідь: Транспортна іммобілізація шиною Дітеріхса, знеболення анальгетиками

Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У підлітка 15-ти років під час забору крові спостерігалася раптова короткочасна втрата свідомості зі спонтанним відновленням стану. Під час огляду помірна блідість шкірних покривів, виражений гіпергідроз кінцівок, частота дихання - 20/хв., тони серця звучні, ритмічні, частота серцевих скорочень - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Який невідкладний стан розвинувся у дитини?

- a. Повна AV-блокада
- b. Гіпоглікемічний стан
- c. Епілептичний напад
- d. Синкопе
- e. Психогенна атака

Правильна відповідь: Синкопе

Питання 118

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Вагітна у терміні 37 тижнів госпіталізована зі скаргами на сильний головний біль, погіршення зору, слуху. Об'єктивно встановлено: анасарка, АТ — 220/120 мм рт. ст. За результатами лабораторних досліджень: сечовина — 30 ммол/л, білок сечі — 6,6 г/л, Hb — 90 г/л. Серцебиття плоду — 110/хв. Перебуваючи у приймальному відділенні у пацієнтки з'явилися посмикування м'язів обличчя, що перейшли у тонічні та клонічні судоми. Вона втратила свідомість. Який метод ведення пологів треба обрати у цьому разі?

- a. Ведення пологів із проведенням епізіотомії
- b. Ведення пологів із накладанням акушерських щипців
- c. Консервативне лікування протягом 6 годин
- d. Терміновий кесарів роєтин
- e. Консервативне лікування протягом 24 годин

Правильна відповідь: Терміновий кесарів роєтин

Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 79-ти років раптово виник біль в нижній частині живота. Хворий страждає на атеросклеротичну енцефалопатію II-III ступеня, контакт з ним утруднений. Об'єктивно: артеріальний тиск - 160/90 мм рт.ст., пульс - 78/хв. Язык вологий. Живіт м'який, болючий у нижніх відділах, де пальпується об'ємне еластичне утворення. Діурез відсутній. Яких заходів необхідно вжити на етапі приймального віddлення?

- a. Консультація невропатолога, ЕКГ, ЕЕГ
- b. Комп'ютерна томографія
- c. Виведення сечі м'яким катетером
- d. Пункція сечового міхура
- e. Цистоскопія

Правильна відповідь: Виведення сечі м'яким катетером

Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Військовослужбовець звернувся до лікаря зі скаргами на постійне безсоння, відчуття немотивованої пильності, епізоди <<напливу жахливих спогадів>>, <<відчуття провини за те, що вижив>>. Який психічний розлад розвинувся у пацієнта?

- a. Невроз нав'язливих станів
- b. Посттравматичний стресовий розлад
- c. Біполярний розлад
- d. Великий депресивний розлад
- e. Нейроциркуляторна астенія

Правильна відповідь: Посттравматичний стресовий розлад

Питання 121

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини двох років раптово з'явився біль спастичного характеру у животі. При первинному огляді дитина заспокоїлась, болю нема. Був стілець з домішкою крові. В правій нижній ділянці живота пальпується пухлиноподібне утворення, циліндричної форми. Який Ваш попередній діагноз?

- a. Хвороба Крона
- b. Черевний тиф
- c. Дизентерія
- d. Хвороба Гіршпрунга
- e. Кишкова інвагінація

Правильна відповідь: Кишкова інвагінація

Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Підліток 14-ти років перебуває на диспансерному обліку з приводу артеріальної гіпертензії. Після емоційного стресу у хворого розвинувся гіпертензивний криз. Артеріальний тиск - 170/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 50/хв. Який медикаментозний засіб ви призначите?

- a. Корвітол
- b. Кордіамін
- c. Дигоксин
- d. Каптоприл
- e. Панангін

Правильна відповідь: Каптоприл

Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 4-х років після відпочинку на морі розвинулось багаторазове блювання. Випорожнення ахолічне. Сеча світла. Доставлена у стаціонар з ознаками токсико-екзикозу на 3 день захворювання. З рота запах прілих фруктів. Які лабораторні дані першочергово потрібні для призначення терапії?

- a. Кров на кетонові тіла, протеїнограма крові, ліпіди крові
- b. Кров на білірубін, АЛТ, цукор
- c. Загальний аналіз і печінкові проби крові, бак. посів блювотних мас
- d. Загальний аналіз і печінкові проби крові, цукор крові
- e. Цукор крові, сеча на ацетон

Правильна відповідь: Цукор крові, сеча на ацетон

Питання 124

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка на 5-ту добу після оперативного втручання виникли симптоми тромбоемболії легеневої артерії, що спричинило раптову коронарну смерть. Який препарат треба було призначати пацієнту для профілактики цього ускладнення?

- a. Тромболітики
- b. Низькомолекулярні гепарини
- c. Вазотоніки
- d. Антиферментні засоби
- e. Дезагреганти

Правильна відповідь: Низькомолекулярні гепарини

Питання 125

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 56-ти років, раптово втратив свідомість. Об'єктивно: пульс на сонних артеріях відсутній, експурсій грудної клітки немає. Розпочата термінова реанімація: зовнішній масаж та штучне дихання. Яке має бути співвідношення між числом компресій до частоти дихання у даного хворого для забезпечення оптимального співвідношення між кровотоком і доставкою кисню?

- a. 15:4
- b. 50:2
- c. 15:2
- d. 30:2
- e. 5:1

Правильна відповідь: 30:2

Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого через 48 годин після застілля, де він їв в'ялену рибу, з'явилися слабкість у м'язах, порушення зору, сухість у роті, порушення дихання.
Куди треба госпіталізувати хворого?

- a. ВРІТ інфекційної лікарні
- b. Очне відділення
- c. Неврологічне відділення
- d. Терапевтичне відділення
- e. Ревматологічне відділення

Правильна відповідь: ВРІТ інфекційної лікарні

Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіка віком 54 роки знайдено зимио вранці на вулиці. Він скаржиться на пекучий біль, свербіння і <>розпирання>> пальців ніг. Об'єктивно встановлено: відчувається сильний запах алкоголю, пацієнт агресивний, ступні набряклі, на фоні побіліої шкіри є червоно-фіолетові плями, декілька пухирів, наповнених світлою рідиною. Встановіть діагноз.

- a. Обмороження III ст.
- b. Гострий тромбоз підколінної артерії
- c. Синдром позиційного здавлення ступні
- d. Обмороження I ст.
- e. Обмороження II ст.

Правильна відповідь: Обмороження II ст.

Питання 128

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінку віком 40 років прооперовано з приводу вузлового тиреотоксичного зобу --- проведено субtotальну тиреоїдектомію. Операція пройшла без особливостей, проте до вечора стан пацієнтки погіршився. З'явилися задишка, неприємні відчуття в ділянці серця, гіперемія шкіри, виражена пітливість, тахікардія до 130/хв, підвищилася температура тіла. Визначте патологічний синдром, що розвинувся у пацієнтки.

- a. Тромбоемболія легеневої артерії
- b. Порушення мозкового кровообігу
- c. Гіпотиреоїдний криз
- d. Гострий коронарний синдром
- e. Тиреотоксичний криз

Правильна відповідь: Тиреотоксичний криз

Питання 129

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Мати хвою дитини віком 9 місяців скаржиться на підвищення температури тіла до 39оС, кашель, утруднення дихання протягом 3-х діб. Об'єктивно: блідість шкіри та слизових оболонок, ціаноз носогубного трикутника. Над легенями з обох боків вислуховуються дрібнопухирчасті хріпи. Яке найбільш інформативне інструментальне обстеження слід призначити хворому?

- a. Гострофазові показники
- b. Рентгенографія органів грудної клітки
- c. Протеїнограма
- d. Бактеріологічне дослідження харкотиння
- e. Клінічний аналіз крові

Правильна відповідь: Рентгенографія органів грудної клітки

Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 30 років під час купання у водоймі випадково захлинувся та протягом 4 хвилин знаходився під водою. Об'єктивно спостерігається: свідомість та самостійне дихання відсутні, шкірні покриви бліді з ціанотичним відтінком. Пальпуються слабкий пульс на центральних судинах. Зіниці в'яло реагують на світло. У роті та носі виявлено багато мулу та піни. Що найперше треба зробити під час надання невідкладної допомоги?

- a. Покласти потерпілого з підвищеним головним кінцем
- b. Розпочати непрямий масаж серця
- c. Виконати прекардіальний удар
- d. Відновити прохідність верхніх дихальних шляхів
- e. Розпочати штучне дихання методом <<rot do rot>>

Правильна відповідь: Відновити прохідність верхніх дихальних шляхів

Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Моряк прилетів з Гонконгу. 2 дні температура тіла - 39-41°C, озноб, пітливість, безсоння. Сьогодні порушилась свідомість. Об'єктивно: у сомнолентному стані з проявами психічного збудження і судом в кінцівках. Легка ригідність потиличних м'язів. Шкіра субіктерична, печінка +3 см. Вкажіть методи діагностики тропічної малярії:

- a. Вірусологічні методи
- b. Біологічний метод
- c. Мазок і товста крапля крові
- d. Алергологічні проби
- e. Гемокультура

Правильна відповідь: Мазок і товста крапля крові

Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У шестимісячної дитини на тлі ГРВІ швидко наростає млявість, адинамія, "гавкаючий" кашель, тахіпне, інспіраторна задишка, акроціаноз, парадоксальне шумне дихання із напруженням м'язів черевної стінки, короткочасні апноє, тахікардія. Аускультивно над легенями вислуховується жорстке ослаблене дихання, крепітація в нижніх відділах. Якій тактиці треба надати перевагу для стабілізації функції зовнішнього дихання?

- a. Інтубація трахеї
- b. Ультразвукова інгаляція гідрокарбонатом натрію
- c. Установлення повітровода
- d. Дренажний масаж
- e. Установлення ларингеальної маски

Правильна відповідь: Інтубація трахеї

Питання 133

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої в післяпологовому періоді в пологовому будинку гостро виникло різке зниження настрою. Відзначається швидке, катастрофічне нарощання почуттів нестерпної туги, безвиході, відчаю. Пацієнта рухливо збуджена, не знаходить собі місця, кричить, стогне, ридає, наполегливо завдає собі ушкодження, активно проявляє суїциdalні тенденції. Який імовірний діагноз і необхідні рекомендації?

- a. Епілептичні сутінки. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-невролога
- b. Аментивний тип порушення свідомості. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-терапевта
- c. Тяжкий депресивний епізод. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-психіатра
- d. Травматичний делірій. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-нейрохірурга
- e. Гострий напад шизофренії. Рекомендується переведення до психіатричного стаціонару

Правильна відповідь: Тяжкий депресивний епізод. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-психіатра

Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної жінки віком 30 років (термін вагітності 23 тижні) після падіння на слизькому тротуарі з'явилися кров'яністі виділення з піхви в об'ємі близько 150 мл одномоментно та продовжуються далі. Що треба зробити насамперед?

- a. Негайно госпіталізувати пацієнту
- b. Увести кровозупинні препарати
- c. Увести утеротоніки
- d. Покласти міхур із льодом на низ живота
- e. Провести УЗД органів малого таза

Правильна відповідь: Негайно госпіталізувати пацієнту

Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 32 роки захворів раптово. Скаржиться на підвищення температури тіла до 39.5°C , біль у суглобах та м'язах, появу висипу на шкірі та слизових оболонках. Із анамнезу хвороби відомо: під час лікування ГРВІ приймав антибіотики та ацетилсаліцилову кислоту. На 5-й день з'явився висип на шкірі, загальний стан погіршився, посилилася слабкість. Об'єктивно спостерігається: стан пацієнта середньої тяжкості, на шкірі кінцівок і стегон множинний плямисто-папульозний висип та пухирі. На слизовій оболонці порожнини рота та статевих органах — великі пухирі та кровоточиві ерозії, ознаки катарального кон'юнктивіту. Симптом Нікольського негативний. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- a. Оперізуючого герпесу
- b. Доброякісної пухирчатки слизових оболонок
- c. Вульгарної пухирчатки
- d. Синдрому Стівенса-Джонсона
- e. Стрептодермії

Правильна відповідь: Синдрому Стівенса-Джонсона

Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Працівник АЕС зі стажем роботи 15 років звернувся до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, головний біль, поганий сон, поганий апетит. При обстеженні: анізорефлексія сухожилкових та черевних рефлексів, незначна атаксія при пробі Ромберга; напади пароксизмальної тахікардії з підвищеннем температури та похолоданням кінцівок. На ЕКГ - знижений вольтаж зубців Р і Т, АТ знижений. В крові: кількість лейкоцитів - 1,5 Г/л, нейтропенія, лімфоцитопенія. ШКТ - кислотність шлункового вмісту знижена, спостерігаються диспепсичні розлади. Який попередній діагноз в даного хворого?

- a. Нейроциркуляторна дистонія
- b. Синдром хронічної втоми
- c. Хронічна променева хвороба
- d. Астенічний синдром
- e. Гостра променева хвороба тяжкого ступеня

Правильна відповідь: Хронічна променева хвороба

Питання 137

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 42-х років, на другу добу після субtotальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зобу, з'явилися серцебиття, задишка, пітливість, пронос, відчуття страху. При огляді: хвора збуджена, шкіра волога, гаряча на дотик. Температура тіла - 39,2оС. Тони серця приглушенні, тахікардія. Пульс - 160/хв., артеріальний тиск - 85/40 мм рт.ст. Живіт м'який, безболісний. Які дослідження потрібно провести для установлення діагнозу?

- a. Вміст трансаміназ в сироватці крові
- b. Вміст 17-КС, 17-ОКС в сечі
- c. Вміст адреналіну та норадреналіну в крові
- d. Вміст цукру в крові
- e. Вміст тиреоїдних гормонів

Правильна відповідь: Вміст тиреоїдних гормонів

Питання 138

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 46 років, у якого в анамнезі є виразкова хвороба шлунку, за годину після приймання їжі з'явився біль в епігастрії, а через декілька годин на фоні загальної слабкості виникла одноразова блювота типу <<кавової гущі>>. Пацієнт викликав екстрену (швидку) медичну допомогу. Об'єктивно спостерігається: пацієнт у свідомості, гемодинаміка стабільна. Якими будуть подальші дії лікаря екстреної (швидкої) медичної допомоги?

- a. Призначити знеболюючі та протиблювотні засоби
- b. Призначити дезінтоксикаційну терапію
- c. Рекомендувати планове амбулаторне обстеження
- d. Призначити консультацію гастроenterолога
- e. Транспортувати пацієнта до хірургічного відділення

Правильна відповідь: Транспортувати пацієнта до хірургічного відділення

Питання 139

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіка госпіталізовано до реанімаційного відділення без свідомості. З анамнезу відомо, що пацієнт протягом останніх 2 годин відчував виражений пекучий біль за грудиною. Шкірні покриви бліді, акроціаноз, АТ -- 60/40 мм рт. ст. На ЕКГ виявлено шлуночкову тахікардію. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

- a. Аритмогенний шок
- b. Розрив міокарда
- c. Бліскавичний набряк легень
- d. Тампонада серця
- e. Анафілактичний шок

Правильна відповідь: Аритмогенний шок

Питання 140

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 3 тижнів із гіпертрофованим клітором значно погіршився стан: постійне блювання, дефіцит ваги 15%, ЧСС- 178/хв, шкіра мармурова, м'язова гіпотонія, артеріальна гіпотензія. При додатковому обстеженні характерними для цієї патології є:

- a. Гіпонатріемія, гіперкаліємія
- b. Гіпокаліємія, гіпернатріемія
- c. Гіпоглікемія, гіпокаліємія
- d. Гіпокаліємія, гіперглікемія
- e. Гіпоглікемія, гіпернатріемія

Правильна відповідь: Гіпонатріемія, гіперкаліємія

Питання 141

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 30-ти років помилково випила кілька ковтків оцтової есенції. Після надходження до лікарні на наступну добу в ній знишився діурез, сеча набула червоно-коричневого кольору. Причиною ураження нирок в цій ситуації є:

- a. Дегідратація
- b. Шлункова кровотеча
- c. Метаболічний ацидоз
- d. Гострий гемоліз
- e. Пряма дія оцтової кислоти

Правильна відповідь: Гострий гемоліз

Питання 142

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При наданні невідкладної допомоги хлопцю 7-ми років із гострою крововтратою до 10% ОЦК, яка зумовлена ушкодженням вен нижньої кінцівки, необхідно відновити обсяг циркулюючої крові. Оберіть оптимальний інфузійний розчин:

- a. Реополіглюкін
- b. Свіжозаморожена плазма
- c. Кристалоїди
- d. Цільна кров
- e. Розчин глюкози

Правильна відповідь: Кристалоїди

Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 63 роки звернувся до лікаря зі скаргами на біль унизу живота, загальну слабкість та неможливість сечовипускання. З анамнезу відомо, що утруднене сечовипускання пацієнт спостерігається близько 6 місяців, характерна ніктурія. Об'єктивно встановлено: стан задовільний, живіт під час пальпації напружений та болючий внизу, над лобком пальпуються еластичне утворення 10x10 см. Симптоми подразнення очеревини --- негативні. Встановіть попередній діагноз.

- a. Гостра затримка сечі
- b. Анурія
- c. Гострий простатит
- d. Гострий цистит
- e. Правобічна ниркова коліка

Правильна відповідь: Гостра затримка сечі

Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Ліквідатор, який отримав радіаційне опромінення сумарною дозою 8 Гр., скаржиться на слабкість, часті носові кровотечі, появу синців на тілі, серцевиття, задишку. В крові: еритроцити - 1,2·10¹²/л, Hb- 54 г/л, лейкоцити - 1,7·10⁹/л, е.- 0%, п.- 0%, с.- 32%, л.- 62%, м.- 6%; ШОЕ- 52 мм/год; тромбоцити - 30 · 10⁹/л. В стернальному пунктаті - тотальне спустошення кісткового мозку. Яке лікування найбільш доцільне в даному випадку?

- a. Антилімфоцитарний імуноглобулін
- b. Переливання тромбоцитарної маси
- c. Пересадка кісткового мозку
- d. Переливання цільної крові
- e. Переливання еритроцитарної маси

Правильна відповідь: Пересадка кісткового мозку

Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 55 років спостерігалися порушення мови та оніміння правої руки, що тривали протягом години. Лікар діагностував гостре порушення мозкового кровообігу. Який критерій буде головним для диференційної діагностики транзиторного і органічного порушення мозкового кровообігу у пацієнта?

- a. Ступінь вираженості вогнищової симптоматики
- b. Наявність або відсутність крові у лікворі
- c. Наявність або відсутність <> світлого проміжку<>
- d. Ступінь вираженості загальномозкової симптоматики
- e. Тривалість вогнищової симптоматики не більше, ніж одну добу

Правильна відповідь: Тривалість вогнищової симптоматики не більше, ніж одну добу

Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У породіллі в ранньому післяпологовому періоді виник геморагічний шок у зв'язку з гіпотонічною кровотечею, що триває, незважаючи на лікування, крововтрата становить 1400 мл. Якою буде лікарська тактика?

- a. Лікування геморагічного шоку паралельно з оперативною зупинкою кровотечі
- b. Лікування геморагічного шоку
- c. Оперативне лікування
- d. Лікування порушеної функції нирок
- e. Наркоз і проведення інтенсивної терапії

Правильна відповідь: Лікування геморагічного шоку паралельно з оперативною зупинкою кровотечі

Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Мати залишила здорового сина 2,5 років із старшою дочкою, хворою на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Вона через 3 години повернулася додому і помітила у сина частий кашель. На другий день стан його погіршився, температура тіла - 38оС, частота дихання - 42/хв., частота серцевих скорочень - 132/хв., ціаноз шкіри. Перкуторно: справа нижче кута лопатки вкорочення звуку, аускультивно в цьому місці різке ослаблення дихання. На Ro ОГК ателектаз правих сегментів S4 і S5, тінь органів середостіння зміщена вправо. Яка імовірна причина такого стану дитини?

- a. Гостра респіраторна вірусна інфекція
- b. Гостра пневмонія
- c. Стороннє тіло бронхів
- d. Напружений пневмоторакс
- e. Гострий обструктивний бронхіт

Правильна відповідь: Стороннє тіло бронхів

Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт 25-ти років демобілізований та госпіталізований на 3-ю добу після сильного обстрілу під час бою. Скаржиться на тривогу, відстороненість, відсутність апетиту, слабкість, швидку зміну настрою. Симптоми швидко припинилися після дії стресового фактору через 48 годин. Поставте діагноз:

- a. Депресивний синдром
- b. Дисоціативний розлад особистості
- c. Гостра реакція на стрес
- d. Розлад свідомості
- e. Тривожний синдром

Правильна відповідь: Гостра реакція на стрес

Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта на 17-й день лихоманки з'явилися дьогтеподібні випорожнення. Під час огляду спостерігається: шкірні покриви бліді, температура тіла — 37,3°C, пульс — 118/хв, АТ — 90/60 мм рт. ст. Коричневий наліт на язиці, живіт помірно роздутий, безболісний, гепатосplenомегалія. Яке ймовірно ускладнення розвинулося у пацієнта?

- a. Тромбоз мезентеріальних судин
- b. Дисбіоз кишечника
- c. Активація ендогенної флори
- d. Шлунково-кишкова кровотеча
- e. Перфорація кишок

Правильна відповідь: Шлунково-кишкова кровотеча

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Півторарічну дитину госпіталізовано до приймального відділення. Об'єктивно спостерігається: шкіра дитини бліда, дихання поверхневе, пульс ниткоподібний. Які з наведених нижче послідовних дій лікаря щодо оцінювання стану свідомості є правильними?

- a. Перевірка рефлекторної збудливості
- b. Гучний оклик та легке потрушування за плечі
- c. Укол голкою
- d. Перевірка зіничної реакції на світло
- e. Перевірка больової реакції

Правильна відповідь: Гучний оклик та легке потрушування за плечі

[← Крок 3 Фармація \(вітчизняні UA\)](#)

Перейти до...

[Крок 3 Стоматологія 2022 →](#)

[Інформаційна сторінка](#) / Мої курси / [KROK / KROK](#) / [Крок 3 / Krak 3](#) / [Крок 3 Загальна лікарська підготовка 2022](#)

Розпочато середа 2 листопад 2022 7:24

Стан Завершено

Завершено середа 2 листопад 2022 7:27

Витрачено часу 2 хв 37 сек

Балів 0/150

Оцінка 0 з можливих 10 (0%)

Питання 1

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При роботі на хімкомбінаті у зв'язку з порушенням герметичності газопроводу виник вихід газу, хімічний склад якого спочатку був невідомий. Враховуючи характер виробництва, це могли бути пари азотної, сірчаної кислот, бензолу, нітробензолу, окисів азоту. Через 3 години після перебування в забрудненому приміщенні у робітника з'явився головний біль, головокружіння, тахікардія, задишка, ціаноз губ і рук. Об'єктивно: шкіра і слизові оболонки сіро-синього забарвлення, печінка збільшена, в крові - ретикулоцитоз 40%. Наявністю якої сполуки в крові зумовлене забарвлення шкіри?

- a. Карбемоглобін
- b. Карбоксигемоглобін
- c. Оксигемоглобін
- d. Метгемоглобін
- e. Відновлений гемоглобін

Правильна відповідь: Метгемоглобін

Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 68-ми років виникла зупинка серця. Після інтубації і зовнішнього масажу серця у хворого з'явився пульс, артеріальний тиск - 40/0 мм рт.ст. Яке лікування буде оптимальним?

- a. Інфузія допаміну
- b. Серцеві глікозиди
- c. Інфузія сольових розчинів
- d. Призначення еуфіліну
- e. Призначення альбуруму

Правильна відповідь: Інфузія допаміну

Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 19-ти років надійшла на 4-й день хвороби. У пацієнтки блювання, різка слабкість, сонливість, виражена жовтяниця. Через добу хвора не орієнтується в часі, свідомість потьмарена, періодичне психомоторне збудження. Зменшилися розміри печінки. Яке ускладнення зумовило таку клінічну картину?

- a. Гостра печінкова недостатність
- b. Гостра надніркова недостатність
- c. Механічна жовтяниця
- d. Гостра печінкова колька
- e. Гіповолемічний шок

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини віком 10 років після дорожньо-транспортної пригоди спостерігається тривала кровотеча, відкритий перелом плеча, тупа травма живота, перелом стегна. Частота серцевих скорочень --- 120/хв, артеріальний тиск --- 60/40 мм рт. ст. У результаті дослідження крові виявлено: Hb --- 96 г/л, еритроцити --- \$3,8\cdot 10^{12}/л, Ht --- 0,37. З яких кровозамінників треба розпочати інфузійну терапію?

- a. Цільна кров
- b. Альбумін
- c. Еритроцитарна маса
- d. Кристалоїди
- e. Свіжозаморожена плазма

Правильна відповідь: Кристалоїди

Питання 5

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 57-ми років на тлі гострого порушення мозкового кровообігу розвинулася гостра затримка сечі. Назвіть першочерговий лікувальний захід:

- a. Антибактеріальна терапія
- b. Цистостомія
- c. Пункція сечового міхура
- d. Постійна катетеризація сечового міхура
- e. Призначення а-адреноблокаторів

Правильна відповідь: Постійна катетеризація сечового міхура

Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 6-ти місяців діагностований гострий стенозуючий ларинготрахеїт III ст. Наростає клініка гострої дихальної недостатності. Встановити інтубаційну трубку в трахею не вдалось. Яка маніпуляція дозволить відновити прохідність дихальних шляхів?

- a. Виведення нижньої щелепи
- b. Проведення конікотомії
- c. Встановлення ларингеальної маски
- d. Встановлення повітроводу
- e. Розгинання голови в шийному відділі

Правильна відповідь: Проведення конікотомії

Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 50-ти років, шкіряник, звернувся в поліклініку зі скаргами на підвищення температури до 38,5оС, головний біль, виражений безболісний набряк в ділянці тилу лівої кисті, наявність виразки з чорною кірочкою. За три дні до захворювання поранив руку на роботі. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Бешика
- b. Страфілококовий карбункул
- c. Сибірка
- d. Еризипелоїд
- e. Туляремія

Правильна відповідь: Сибірка

Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У родиллі з багатоводдям під час положення на спині раптово з'явилися запаморочення, загальна слабкість, миготіння <<мушок>> перед очима, задишка. Спостерігається зниження АТ до 90/40 мм рт. ст. Для якого патологічного стану характерні такі симптоми?

- a. Синдром нижньої порожнистої вени
- b. Кардіогенний шок
- c. Геморагічний шок
- d. Анафілактичний шок
- e. Септичний шок

Правильна відповідь: Синдром нижньої порожнистої вени

Питання 9

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У районі бомбардування, внаслідок спалахування нафтопроводу, знайдено та доставлено у МедР групу обпечених. Якими головними критеріями повинен керуватися лікар приймально-сортувального відділення МедР для ранньої діагностики опікового шоку?

- a. Відчуття холоду, блідість шкіри поза межами опіку
- b. Ціаноз, задуха
- c. Задуха, тахікардія
- d. Глибина та площа ураження
- e. Спрага, м'язове трептіння

Правильна відповідь: Глибина та площа ураження

Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної під час стрімких пологів з'явилися відчуття задухи, ціаноз, падіння артеріального тиску. Через деякий час кров, що надходила з піхви, перестала згортатися. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Серцева недостатність
- b. Гіпотонічна маткова кровотеча
- c. Анафілактичний шок
- d. Емболія навколоплідними водами
- e. Бронхіальна астма

Правильна відповідь: Емболія навколоплідними водами

Питання 11

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка 26-ти років в нижній третині лівого стегна є рана 7x3 см неправильної форми з рваними краями та помірною кровотечею. Близько 20-ти хвилин тому хворогокусив бродячий пес. Якою буде перша допомога?

- a. -
- b. ПХО. Рану не зашивати. Амбулаторне спостереження хірурга та рабіолога
- c. Накладання стискальної пов'язки. Рану не зашивати. Госпіталізація в хірургічний стаціонар для проведення антирабічної профілактики
- d. ПХО. Рану зашити. Амбулаторне спостереження хірурга та рабіолога
- e. ПХО. Рану зашити. Госпіталізація в хірургічний стаціонар для проведення антирабічної профілактики

Правильна відповідь: Накладання стискальної пов'язки. Рану не зашивати. Госпіталізація в хірургічний стаціонар для проведення антирабічної профілактики

Питання 12

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 25-ти років 2 тижні тому народила здорову дівчинку. Вагітність та пологи перебігали без ускладнень. Виписані на 2-гу добу. Психосоматичний анамнез не обтяжений. Після виписки з полового будинку родичі звернули увагу на її агресивність, часті зміни настрою, відсутність бажання доглядати за дитиною. Маті викликала дільничного лікаря у зв'язку з тим, що дочка зробила спробу задушити немовля. На запитання "чому?" відповідала, що чула голос, який сказав, що вона повинна вбити дитину. Виникла підозра на післяпологовий психоз. Якою буде тактика лікаря у цьому випадку?

- a. Негайна госпіталізація до спеціалізованого стаціонару
- b. Призначити антидепресанти та вітамінотерапію
- c. Призначити повне клінічне обстеження
- d. Дати рекомендації щодо режиму праці та відпочинку
- e. Дати направлення на консультацію до психіатра

Правильна відповідь: Негайна госпіталізація до спеціалізованого стаціонару

Питання 13

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальне відділення лікарні ургентно доставлений хворий 19-ти років. Під час обстеження спостерігаються багаторазові повторні генералізовані тоніко-клонічні судомні напади, непритомний, піна з рота, шкіра сірувато-блілого кольору, на лобі підшкірна гематома 1x2 см, частота серцевих скорочень - 120/хв., коливання артеріального тиску від 130/80 до 170/100 мм рт.ст. При неврологічному обстеженні: зіниці на світло не реагують, погляд не фокусує, патологічні рефлекси нижніх кінцівок. Який стан у хворого?

- a. Гостре порушення мозкового кровообігу
- b. Епілептичний статус
- c. Менінгіт
- d. Делірій
- e. Правець

Правильна відповідь: Епілептичний статус

Питання 14

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чотиримісячна дитина раптово втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: зіниці розширені, пульс на магістральних артеріях відсутній. Непрямий масаж серця виявився неефективним. Прийнято рішення про проведення електричної дефібриляції. Яка величина розряду дефібрилятора повинна використовуватися у цьому разі ?

- a. Перший розряд --- 3 Дж/кг, повторні --- 2 Дж/кг
- b. Перший розряд --- 4 Дж/кг, повторні --- 8 Дж/кг
- c. Перший розряд --- 2 Дж/кг, у разі неефективності --- 4 Дж/кг
- d. Перший розряд --- 3 Дж/кг, у разі неефективності повторити двічі
- e. Перший розряд --- 4 Дж/кг, повторні --- 2 Дж/кг

Правильна відповідь: Перший розряд --- 2 Дж/кг, у разі неефективності --- 4 Дж/кг

Питання 15

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хлопчика 9-ти років впродовж останнього року спостерігаються повторні епізоди гострого пульсуючого однобічного головного болю в асоціації з нудотою, блюванням та болем у животі. Головний біль виникає після вживання шоколаду, сиру, горіхів та йому передують візуальні розлади та м'язова слабкість. Звичайно сон полегшує головний біль. Поза приступами дитина здорована. У матері в дитинстві були подібні напади. Ваш попередній діагноз:

- a. Пухлина мозку
- b. Мігрень
- c. Епілепсія
- d. Харчова алергія
- e. Головний біль напруги

Правильна відповідь: Мігрень

Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт 32-х років звернувся до лікаря зі скаргами на нездужання, підвищення температури тіла до 38°C, періодичний біль у надчревній ділянці, нудоту й блювання. На другий день погіршився зір, неможливо стало читати газету, з'явився туман та сітка перед очима. Об'єктивно: двобічний птоз, анізокорія, ністагм, погіршення ковтання. За два дні до цього вживав рибні консерви. У хворого є підозра на ботулізм. Основним напрямком у лікуванні є призначення:

- a. Протиботулінічної антитоксичної сироватки
- b. Левоміцетину в дозі 0,5 г 4 рази на добу
- c. Церебральної пункції
- d. Сольових розчинів
- e. Серцевих глікозитів

Правильна відповідь: Протиботулінічної антитоксичної сироватки

Питання 17

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 30 років під час купання у водоймі випадково захлинувся та протягом 4 хвилин знаходився під водою. Об'єктивно спостерігається: свідомість та самостійне дихання відсутні, шкірні покриви бліді з ціанотичним відтінком. Пальпуються слабкий пульс на центральних судинах. Зіниці в'яло реагують на світло. У роті та носі виявлено багато мулу та піни. Що найперше треба зробити під час надання невідкладної допомоги?

- a. Виконати прекардіальний удар
- b. Розпочати штучне дихання методом <<rot do rot>>
- c. Покласти потерпілого з підвищеним головним кінцем
- d. Розпочати непрямий масаж серця
- e. Відновити прохідність верхніх дихальних шляхів

Правильна відповідь: Відновити прохідність верхніх дихальних шляхів

Питання 18

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 54 років скаржиться на гострий біль, набряк і почервоніння суглобів великого пальця лівої ноги. Під час огляду виявлено: температура тіла --- 37,5°C, палець збільшений в об'ємі, активні і пасивні рухи в ньому різко болючі, в інших суглобах змін немає. За результатами лабораторних дослідження: еритроцити --- 4,4·10¹²/л, гемоглобін --- 130 г/л, лейкоцити --- 10·10⁹/л, в сечі --- кристали уратів +++. Для якого захворювання характерні такі клініко-лабораторні показники?

- a. Хвороба Бехтерєва
- b. Гострий спондиліт
- c. Подагра
- d. Ревматоїдний артрит
- e. Деформуючий остеоартроз

Правильна відповідь: Подагра

Питання 19

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 32-х років, яка страждає на бронхіальну астму, при вдиханні запаху одеколону розвинувся приступ ядухи. Приступ не купувався інгаляційним введенням сальбутамолу через кожні 15 хвилин протягом години та в/в введенням еуфіліну. Загальний стан хворої середньої важкості, незначний ціаноз обличчя, частота дихання - 30-34/хв., частота серцевих скорочень - 92-100/хв., артеріальний тиск - 145/80 мм рт.ст. Першочерговим лікувальним заходом при наданні невідкладної допомоги буде:

- a. Продовжити інгаляцію сальбутамолу
- b. Повторне в/в введення еуфіліну
- c. В/в введення амброксолу
- d. В/в введення преднізолону
- e. В/в введення атропіну

Правильна відповідь: В/в введення преднізолону

Питання 20

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На полі бою оглядається військовослужбовець 18-ти років, що скаржиться на різкий біль в правій половині грудної клітки, задишку. Відомо, що потерпілий зазнав колото-різаного поранення грудної клітки. При огляді в 4 міжребер'ї по передній аксилярній лінії справа визначається рана 3x4 см, через яку з плевральної порожнини надходить повітря. Що повинен зробити санітарний інструктор на полі бою?

- a. Обробити рану антисептиком
- b. Накласти оклюзійну пов'язку з клапаном на рану
- c. Виконати пункцию плевральної порожнини
- d. Ввести антибактеріальні препарати
- e. Виконати дренування плевральної порожнини

Правильна відповідь: Накласти оклюзійну пов'язку з клапаном на рану

Питання 21

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини з гострою кишковою інфекцією розвинулася клініка парезу кишечника - живіт здутий, гази відходять погано, кишкові шуми ледве прослуховуються. Введення якого препарату має першочергове значення?

- a. Цефазолін
- b. Альбумін
- c. Неогемодез
- d. Хлорид калію
- e. Глюкоза

Правильна відповідь: Хлорид калію

Питання 22

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта скарги на сльозотечу, світлобоязнь, біль в оці та зниження зору правого ока. Гострота зору правого ока - 0,06, з корекцією не покращується, гострота зору лівого ока - 1,0. В правому оці виявлено змішану ін'єкцію, блефароспазм, сльозотечу. На рогівці в центральній зоні в середніх шарах спостерігається інфільтрат у вигляді диску. Чутливість рогівки знижена. Яка імовірна етіологія процесу?

- a. Бактеріальна
- b. Глистна інвазія
- c. Вірусна
- d. Амебіаз
- e. Грибкова

Правильна відповідь: Вірусна

Питання 23

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 28 років тривалий час хворіє на епілепсію. Після порушення режиму лікування у нього з'явилися часті велики судомні напади, між якими у пацієнта свідомість не відновлюється. На бульові подразники не реагує. Зіниці вузькі, реакція на світло знижена. Тонус м'язів знижений. Який патологічний стан спостерігається у пацієнта?

- a. Гіпоглікемічна кома
- b. Гіперглікемічна кома
- c. Кома внаслідок інтоксикації
- d. Епілептичний статус
- e. Алкогольна кома

Правильна відповідь: Епілептичний статус

Питання 24

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 46-ти років виведена з вогнища пожежі. Бригада екстреної медичної допомоги діагностувала термічні опіки верхніх дихальних шляхів. З чого необхідно розпочати невідкладну допомогу?

- a. Серцево-легеневої реанімації
- b. Довенного введення 2,4% розчину еуфіліну
- c. Інгаляції сальбутамолу (вентоліну)
- d. Аналгезії наркотичними аналгетиками
- e. Інгаляції 100% киснем через лицьову маску

Правильна відповідь: Інгаляції 100% киснем через лицьову маску

Питання 25

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дівчину віком 20 років, через 3 дні після згвалтування, шпиталізовано до психіатричного відділення. Під час клініко-психопатологічного обстеження у психічному статусі пацієнтки спостерігаються пригнічений настрій та підвищена тривога. Вона уникне спогадів та нездатна відтворити в пам'яті основні, важливі елементи травматичної ситуації. Скаржиться на труднощі із засинанням, нічні кошмари, пов'язані з психотравматичною подією, що постійно повторюються, неможливість сконцентрувати увагу, втрату колишніх інтересів і захоплень. Яке порушення психічного стану розвинулося в пацієнтки?

- a. Панічний розлад
- b. Дисоціативна амнезія
- c. Неврастенія
- d. Посттравматичний стресовий розлад
- e. Змішаний тривожний і депресивний розлад

Правильна відповідь: Посттравматичний стресовий розлад

Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 33-х років, незаміжня, проживає одна, працює бухгалтером. Звернулася до лікаря зі скаргами на дещо пригнічений настрій, "почуття незахищеності". Зміни в психічному стані пов'язує зі спробою згвалтування, що відбулася тиждень тому. Орієнтована всебічно правильно, мовному контакту доступна, відверто розповідає лікарю про психотравмуючу ситуацію, прагне підтримки спеціаліста. Наявність суїциdalних думок категорично заперечує, буде реальні плани на майбутнє. Якою буде тактика?

- a. Призначити психотерапію
- b. Госпіталізувати у психіатричний стаціонар
- c. Призначити терапію анксиолітиками
- d. Призначити антидепресивну терапію
- e. Призначити антипсихотичну терапію

Правильна відповідь: Призначити психотерапію

Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 50-ти років був збитий автомобілем в результаті чого отримав відкритий перелом лівого стегна в середній третині з кутовим та поздовжнім зміщенням уламків. Який оптимальний метод транспортної іммобілізації слід застосувати?

- a. Три драбинчасті шини
- b. Шину Дітеріха та Крамера
- c. Дві драбинчасті шини
- d. Шину Томаса
- e. Шину Дітеріха

Правильна відповідь: Три драбинчасті шини

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У лісі знайдено молодого чоловіка в тяжкому стані. Об'єктивно: хворий перебуває в коматозному стані, дихання Чейн-Стокса, шкіра гаряча на дотик, волога, відзначаються судоми тетанічного характеру. На лівій гомілці 4 точкові ранки, по краях яких геморагічний набряк. Що спричинило розвиток невідкладного стану?

- a. Укус бджоли
- b. Епілептичний напад
- c. Діабетична кома
- d. Правеце
- e. Укус гадюки

Правильна відповідь: Укус гадюки

Питання 29

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 38-ми років через 8 днів після поранення ступні з'явилися тягучий біль, тонічне напруження й судомні скорочення жувальних м'язів та кінцівок, печіння в ділянці рани. На 4-й день відзначено напруження м'язів кінцівок. На 9-й день хвороби на тлі підвищеного тонусу м'язів з'явилися загальні клоніко-тонічні судоми, тривалістю від кількох секунд до хвилини. Пульс напруженій, 110/хв., артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., тони серця глухі. Обстеження на яку хворобу треба провести?

- a. Сказ
- b. Правець
- c. Туляремія
- d. Бактеріальний менінгіт
- e. Бешика

Правильна відповідь: Правець

Питання 30

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Першовагітна 22-х років, термін вагітності 8 тижнів, скаржиться на рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів та біль внизу живота передимоподібного характеру. При піхвовому дослідженні: матка збільшена відповідно до 8 тижнів вагітності, шийка матки вкорочена, цервікальний канал вільно пропускає 1 палець і в ньому визначається плодовий міхур та частини плодового яйця; виділення рясні кров'яністі. Яка тактика лікаря?

- a. Ультразвукове дослідження
- b. Призначення препаратів, що пролонгають вагітність
- c. Спостереження за вагітною
- d. Кольпоскопія
- e. Вишкрібання порожнини матки

Правильна відповідь: Вишкрібання порожнини матки

Питання 31

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пораненого в ділянку черепа спостерігається біль у грудях, кровохаркання, кашель, задишка. Температура тіла - 37,0°C. При обстеженні: дихання в легенях ослаблено, хрипів немає. При рентгенологічному дослідженні виявляються множинні дрібні тіні в обох легенях. Яка причина виявлених змін?

- a. Аспіраційна пневмонія
- b. Гемоперикард
- c. Крововилив у легені
- d. Гемоторакс
- e. Пневмоторакс

Правильна відповідь: Крововилив у легені

Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дозиметрист-розвідник у загальновійськовому захисному костюмі і протигазі виїхав у зону радіоактивного забруднення. Яким компонентом екіпіровки має бути дооснащений дозиметрист для підвищення особистої безпеки від негативного впливу радіоактивного випромінювання?

- a. Таблетками акваселту
- b. Індивідуальним противімічним пакетом
- c. Індивідуальним дозиметром
- d. Індивідуальним перев'язувальним пакетом
- e. Слабоалкогольним напоєм

Правильна відповідь: Індивідуальним дозиметром

Питання 33

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 38-ми років скаржиться на напади головного болю одностороннього характеру. Головний біль інтенсивний, ло- калізується в лобно-скроневій ділянці, починається раптово, триває від 3 до 10 годин. Перед нападом відзначається "затуманення" зору. Між нападами головного болю - стан задовільний. Неврологічний статус без особливостей. Які з наведених продуктів можуть спровокувати напад?

- a. Ананас
- b. Смажена картопля
- c. Шоколад
- d. Білий хліб
- e. Молочнокислі продукти

Правильна відповідь: Шоколад

Питання 34

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 56 років раптово виник дзвін у вухах, що супроводжувався нудотою, блюванням, <<миготінням мушок>> і потемнінням в очах. Об'єктивно спостерігається: АТ --- 210/100 мм рт. ст., пульс --- 62/хв. Встановлено діагноз: неускладнена гіпертензивна криза. Який лікарський засіб треба використати у цьому разі?

- a. Еналаприлат
- b. Верапаміл
- c. Метопролол
- d. Резерпін
- e. Аміодарон

Правильна відповідь: Еналаприлат

Питання 35

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Військовослужбовець віком 35 років унаслідок обстрілу артилерією був привалений деревом. Скаржиться на біль у ділянці таза, найменші рухи посилюють біль, гемодинаміка субкомпенсирована. Об'єктивно спостерігається: деформація тазового кільця зі зміщенням лівої половини таза догори, синець у ділянці калитки і промежини. Під час спроби стиснення крил клубових кісток таза біль різко посилюється. Яке ушкодження найімовірніше?

- a. Двобічний перелом крил клубових кісток
- b. Множинні переломи кісток таза
- c. Ушкодження таза з порушенням безперервності переднього півкільца
- d. Ушкодження таза з порушенням безперервності заднього півкільца
- e. Ушкодження таза з порушенням безперервності переднього та заднього півкільца

Правильна відповідь: Ушкодження таза з порушенням безперервності переднього та заднього півкільца

Питання 36

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До реанімаційного відділення госпіталізовано чоловіка віком 54 років, без свідомості, із проявами клонічних судом. Під час огляду пацієнта виявлено: екскурсія грудної клітки та пульсація на магістральних судинах відсутні, зіниці помірно розширені, на світло не реагують. На кардіомоніторі електрична активність серця збережена. Який із нижченаведених заходів буде малоефективним у цьому разі?

- a. Непрямий масаж серця
- b. Внутрішньовенне струменеве введення адреналіну
- c. Штучна вентиляція легень
- d. Електрична дефібриляція
- e. Забезпечення прохідності дихальних шляхів

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

Питання 37

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 12-річної дівчинки після вживання двох таблеток аспірину температура тіла підвищилася до 39-40°C. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподівану появу червоних плям на шкірі з утворенням пухирів та відшаруванням епідермісу з ерозуванням поверхні. Ураження на шкірі нагадують опіки другого ступеню. Симптом Нікольського - позитивний. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Вульгарна пухирчатка
- b. Еритродермія
- c. Багатоформна ексудативна еритема
- d. Гострий епідермальний некроліз
- e. Токсикодермія

Правильна відповідь: Гострий епідермальний некроліз

Питання 38

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 30-ти років скаржиться на головний біль, марення. Об'єктивно: температура тіла - 39°C, збуджена, обличчя гіперемоване, позитивний симптом Говорова-Годельє, петехіальний висип на тулубі, кінківках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., гепатосplenомегалія. Вживає алкоголь, ін'єкційні наркотики, живе в приміщенні підвального типу. Поставте попередній діагноз:

- a. ВІЛ-інфекція
- b. Грип
- c. Лептоспіроз
- d. Висипний тиф
- e. Алкогольний психоз

Правильна відповідь: Висипний тиф

Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 50-річного чоловіка протягом 2-х днів відзначаються рідкі випорожнення чорного кольору. Болю у епігастральній ділянці немає. При огляді: блідість шкірних покривів і кон'юнктиви, "судинні зірочки" на шкірі грудей, розширення вен передньої стінки живота, гепатомегалія. Артеріальний тиск - 105/60 мм рт.ст. Промивні води шлунка типу "кавової гущі". Лікар визначив кровотечу з вен стравоходу. Які препарати разом з трансфузійною та гемостатичною терапією слід призначити в першу чергу?

- a. Метоклопрамід
- b. Вазопресин
- c. Аргініну глутамат
- d. Тіотриазолін
- e. Алюмінію гідроокис

Правильна відповідь: Вазопресин

Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До лікарні госпіталізовано чоловіка у непритомному стані. Об'єктивно спостерігається: самостійне дихання відсутнє, шкіра блідо-цианотична, тони серця ледь вислуховуються. Який захід надання медичної допомоги є невідкладним у цьому разі?

- a. Уведення мезатону
- b. Уведення дихальних анолептиків
- c. Штучна вентиляція легенів
- d. Електрокардіографія
- e. Уведення атропіну

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легенів

Питання 41

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнта з діагнозом: тотальна тиреоїдектомія, скаржиться на загальну слабкість, сонливість, зуття живота, відсутність сечі протягом доби, набряки ніг. Під час обстеження спостерігається: обличчя одутле, <<твірді>> набряки на ногах, сухожильні рефлекси сповільнені, температура тіла --- 33,1°C, AT --- 90/60 мм рт. ст., пульс --- 62/хв, глікемія --- 3,1 ммол/л. Який попередній діагноз?

- a. Гостра ниркова недостатність
- b. Загальне переохолодження
- c. Гіпоглікемія
- d. Мікседематозна прекома
- e. Гіпоксично-циркуляторний синдром

Правильна відповідь: Мікседематозна прекома

Питання 42

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини після укусу гадюки в ногу виникли різкий біль, заніміння, двоїння в очах, порушення ковтання, афонія, порушення свідомості. Яких лікувальних заходів слід вжити в першу чергу?

- a. Припідните положення ураженої ноги
- b. Припекти місце укусу
- c. Дати алкогольний напій
- d. Зробити надрізи у місці укусу
- e. Ввести протизміїну сироватку

Правильна відповідь: Ввести протизміїну сироватку

Питання 43

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 33 роки, який постраждав у ДТП, скаржиться на біль у ділянці таза, грудної клітки та лівого стегна. Об'єктивно спостерігається: блідість обличчя, АТ --- 90/60 мм рт. ст., пульс --- 130/хв, крепітація на рівні VI--IX ребер зліва, симптоми нестабільності тазового кільця, посередині лівого стегна виявлено деформацію та патологічну рухливість. Проведено іммобілізацію та введено знеболювальні засоби, викликано реанімобіль. З яких препаратів треба розпочати інфузійну протишокову терапію?

- a. Кристалоїдних розчинів
- b. Вазопресорів
- c. Білкових препаратів
- d. Глюкозо-новокайнової суміші
- e. Колоїдних розчинів

Правильна відповідь: Кристалоїдних розчинів

Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дівчину віком 21 рік без свідомості госпіталізовано до лікарні. Хворіє на хронічну наднірникову недостатність. Протягом декількох годин з'явився біль у животі, акроціаноз, знизвися АТ до 70/50 мм рт. ст., втратила свідомість. Результати лабораторного дослідження: калій крові --- 7,2 ммоль/л, глюкоза крові --- 2,0 ммоль/л. На ЕКГ спостерігається: високі загострені зубці Т, подовження інтервалу S-T та розширення комплексу QRS. Який імовірний діагноз?

- a. Аддісонічний криз
- b. Гіпертонічний криз
- c. Гіперацидотична кома
- d. Гіpopітітарна кома
- e. Гіперглікемічна кома

Правильна відповідь: Аддісонічний криз

Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Підліток 14-ти років перебуває на диспансерному обліку з приводу артеріальної гіпертензії. Після емоційного стресу у хворого розвинувся гіпертензивний криз. Артеріальний тиск - 170/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 50/хв. Який медикаментозний засіб ви призначите?

- a. Дигоксин
- b. Каптоприл
- c. Панангін
- d. Кордіамін
- e. Корвітол

Правильна відповідь: Каптоприл

Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини, хворої на бронхіальну астму, після катетеризації правої підключичної вени різко погіршилося самопочуття: збуджена, акроціаноз при огляді, задишка. Артеріальний тиск підвищений. Тони серця ритмічні, приглушені. Над легенями - різко ослаблене дихання з боку пункції. Перкуторно - тимпаніт справа. Який Ваш діагноз?

- a. Повітряна емболія легеневої артерії
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Астматичний статус
- d. Напруженій пневмоторакс з боку пункції
- e. Кардіогенний шок

Правильна відповідь: Напруженій пневмоторакс з боку пункції

Питання 47

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнт кардіологічного відділення віком 54 роки з діагнозом: дилатаційна кардіоміопатія, серцева недостатність ІІ-Б ст, функціональний клас ІІІ у коридорі раптово знепритомнів та перестав дихати. Постова медсестра негайно викликала лікаря, який діагностував клінічну смерть. Яка тактика лікаря насамперед?

- a. Провести прекардіальний удар
- b. Виконати дефібриляцію
- c. Провести ЕКГ дослідження
- d. Провести УЗД серця
- e. Розпочати заходи легенево-серцевої реанімації

Правильна відповідь: Розпочати заходи легенево-серцевої реанімації

Питання 48

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 14-річного хлопчика під час тривалого стояння раптово з'явилися запаморочення, потемніння в очах, хлопчик знепритомнів. Об'єктивно: дитина без свідомості, блідість шкірних покривів, холодний піт. Відзначаються тахікардія, ниткоподібний пульс, зниження артеріального тиску. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Кома
- b. Гостра серцева недостатність
- c. Колапс
- d. Тампонада серця
- e. Гостра коронарна недостатність

Правильна відповідь: Колапс

Питання 49

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої дитини з'явилося адекватне самостійне дихання після відновлення прохідності дихальних шляхів, частота дихання -- 40/хв., частота серцевих скорочень --- 102/хв., акроцианоз. Яка подальша тактика лікаря у цьому разі?

- a. Інгаляція кисеню через лицеву маску
- b. Дренажний масаж
- c. Дитина не потребує подальшого спостереження
- d. Непрямий масаж серця
- e. ШВЛ шляхом інтубації трахеї

Правильна відповідь: Інгаляція кисеню через лицеву маску

Питання 50

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 8-ми років захворювання мало поступовий початок з підвищення температури до 37,5-38°C, нежитю, сухого "гавкаючого" кашлю, осипlostі голосу. На третю добу хвороби стан дитини погіршився, з'явилося шумне дихання з втяжінням міжреберних проміжків. Яке захворювання з числа ГРВІ найбільш імовірно має місце у дитини?

- a. Риновірусна інфекція
- b. РС-інфекція
- c. Грип
- d. Парагрип
- e. Аденовірусна інфекція

Правильна відповідь: Парагрип

Питання 51

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіку віком 83 роки ампутували нижню кінцівку на рівні стегна з приводу діабетичної стопи. За добу після оперативного втручання стан хворого почав раптово прогресивно погіршуватися. Порушилася свідомість, виникло часте поверхневе дихання, помірне оглушення, хворий став блідим, з'явився холодний піт. На ЕКГ спостерігається: суправентрикулярна тахікардія з ЧСС --- 188/хв, блокада правої ніжки пучка Гіssa, ознаки перенапруження правого шлуночка. Хірург припустив ТЕЛА і викликав реаніматолога. На момент огляду реаніматологом пацієнта на ЕКГ спостерігається: ізолінія, свідомість на рівні коми, пульс на магістральних судинах відсутній, дихання відсутнє. Які найперші дії має виконати реаніматолог?

- a. Оксигенотерапію
- b. Електричну дефібриляцію
- c. В/в введення гепарину
- d. Непрямий масаж серця
- e. В/в уведення метопрололу

Правильна відповідь: Непрямий масаж серця

Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хлопця віком 17 років після нервово-психічної травми раптово з'явилися скарги на головний біль, запаморочення, нудоту, блювання, погіршення зору, біль у серці та відчуття серцебиття. Об'єктивно виявлено: ЧСС --- 120/хв, озноб, м'язове тремтіння, пітливість, гіперемія шкіри, пацієнт збуджений. На ЕКГ спостерігаються ознаки гіпертрофії та систолічного перевантаження лівого шлуночка. З анамнезу відомо, що батько пацієнта хворіє на гіпертонічну хворобу. Яку терапію треба призначити для усунення нападу?

- a. Сублінгвально пропранолол
- b. Сублінгвально фенігідин
- c. Парентерально фуросемід
- d. Ентерально клонідин
- e. Сублінгвально каптоприл

Правильна відповідь: Сублінгвально пропранолол

Питання 53

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У підлітка 16-ти років 4 місяці тому діагностовано туберкульоз легенів. Після лікування впродовж 2-х місяців дитина самостійно перервала прийом протитуберкульозних препаратів. У зв'язку з погіршенням стану було повторно призначене лікування. Через 2 тижні з'явилися втрата рівноваги, зниження слуху, дзвін у вухах. Прийом якого препарату зумовив появу таких симптомів і потребує відміни?

- a. Стрептоміцин
- b. Ріфампіцин
- c. Ізоніазід
- d. Піразінамід
- e. Етамбутол

Правильна відповідь: Стрептоміцин

Питання 54

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При надзвичайних ситуаціях, таких, як масові промислові отруєння, для максимально ефективного надання допомоги найбільш можливій кількості постраждалих потрібно визначитись з необхідністю, черговістю та об'ємом надання медичної допомоги рятувальними службами. З цією метою використовується система медичного сортування "START". Який перший крок передбачає ця система?

- a. Оцінка можливості самостійно пересуватись
- b. Оцінка самостійного дихання і спонтанного кровообігу
- c. Оцінка рівня свідомості і психічного стану
- d. Заповнення реєстраційних форм про НС
- e. Зупинка кровотечі, потерпілим, які цього потребують

Правильна відповідь: Оцінка можливості самостійно пересуватись

Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Лікарем швидкої медичної допомоги у хворого констатовані ознаки клінічної смерті, розпочато реанімаційні заходи. Для введення лікарських засобів обрана пункция крікотиреоїдної зв'язки та ендотрахеальне введення. Як змінюється доза препаратів для цього шляху введення?

- a. Збільшується в 4 рази
- b. Зменшується в 2 рази
- c. Залишається незмінною
- d. Збільшується в 6 разів
- e. Збільшується в 2 рази

Правильна відповідь: Збільшується в 2 рази

Питання 56

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт 64-х років, що перебуває у стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. При огляді діагностовані зупинка серцевої діяльності та дихання, розпочато серцево-легеневу реанімацію. На ЕКГ шлуночкова тахікардія. Який захід є необхідним далі?

- a. Ввести внутрішньосерцево адреналін
- b. Ввести внутрішньовенно кальцію хлорид
- c. Дефібриляція
- d. Ввести внутрішньосерцево атропін
- e. Ввести внутрішньовенно магнію сульфат

Правильна відповідь: Дефібриляція

Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого через 48 годин після застілля, де він їв в'ялену рибу, з'явилися слабкість у м'язах, порушення зору, сухість у роті, порушення дихання. Куди треба госпіталізувати хворого?

- a. Очне відділення
- b. Неврологічне відділення
- c. ВРІТ інфекційної лікарні
- d. Ревматологічне відділення
- e. Терапевтичне відділення

Правильна відповідь: ВРІТ інфекційної лікарні

Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 48 років госпіталізована до відділення реанімації інфекційної лікарні. Об'єктивно спостерігається: ригідність м'язів глотки та гортані, зростаюче напруження скелетної мускулатури, свідомість не порушена, поодинокі судоми мімічної мускулатури за типом сардонічної гримаси, нарощують явища артеріальної гіпертензії та гіпоксемії, гіпертермічний синдром ($40,5^{\circ}\text{C}$). Які невідкладні заходи треба провести пацієнці на самперед?

- a. Допоміжну вентиляцію, інфузійно-детоксикаційну терапію, сироваткову терапію
- b. Перевести на ШВЛ з уведенням міорелаксантів, корекцію енергозатрат, метаболічних та гемодинамічних порушень, застосування протиправцевої сироватки
- c. Застосування протиправцевої сироватки, проведення інфузійно-детоксикаційної терапії
- d. Допоміжну вентиляцію, корекцію метаболічних та гемодінамічних порушень
- e. Корекцію енергозатрат, метаболічних та гемодинамічних порушень, застосування протиправцевої сироватки

Правильна відповідь: Перевести на ШВЛ з уведенням міорелаксантів, корекцію енергозатрат, метаболічних та гемодинамічних порушень, застосування протиправцевої сироватки

Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної жінки віком 30 років (термін вагітності 23 тижні) після падіння на слизькому тротуарі з'явилися кров'янисті виділення з піхви в об'ємі близько 150 мл одномоментно та продовжуються далі. Що треба зробити на самперед?

- a. Увести утеротоніки
- b. Увести кровозупинні препарати
- c. Негайно госпіталізувати пацієнту
- d. Провести УЗД органів малого таза
- e. Покласти міхур із льодом на низ живота

Правильна відповідь: Негайно госпіталізувати пацієнту

Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Ліквідатор, який отримав радіаційне опромінення сумарною дозою 8 Гр., скаржиться на слабкість, часті носові кровотечі, появу синців на тілі, серцевиття, задишку. В крові: еритроцити - 1,2·1012/л, Hb- 54 г/л, лейкоцити - 1,7·109/л, е.- 0%, п.- 0%, с.- 32%, л.- 62%, м.- 6%; ШОЕ- 52 мм/год; тромбоцити - 30 · 109/л. В стернальному пунктаті - тотальне спустошення кісткового мозку. Яке лікування найбільш доцільне в даному випадку?

- a. Антилімфоцитарний імуноглобулін
- b. Переливання цільної крові
- c. Переливання еритроцитарної маси
- d. Пересадка кісткового мозку
- e. Переливання тромбоцитарної маси

Правильна відповідь: Пересадка кісткового мозку

Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дванадцятирічної дівчинки після вживання двох таблеток аспірину температура тіла підвищилася до 39--40,0\$^\circ\text{C}\$. Спостерігається загальне нездужання, запаморочення, раптова поява червоних плям на шкірі з утворенням пухирів та відшаруванням епідермісу з ерозуванням поверхні. Ураження на шкірі нагадують опіки другого ступеню. Симптом Нікольського --- позитивний. Який імовірний діагноз?

- a. Гострий епідермальний некроліз
- b. Токсикодермія
- c. Багатоформна ексудативна еритема
- d. Вульгарна пухирчатка
- e. Еритродермія

Правильна відповідь: Гострий епідермальний некроліз

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої дитини від матері-носія поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) стан задовільний. Активна, дихальних розладів нема. Печінка на 2 см нижче реберної дуги. Сеча світла, меконій відходить. Які профілактичні заходи треба призначити дитині?

- a. Вакцинація проти гепатиту В на I добі життя
- b. Ізоляція дитини, щоб уникнути поширення інфекції
- c. Скринінг матері на антиген гепатиту В
- d. Скринінг дитини на HBsAg, вакцинація заборонена
- e. Очікувальна тактика, вакцинацію відкласти

Правильна відповідь: Вакцинація проти гепатиту В на I добі життя

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У потерпілого 22-х років ножове поранення, перерізана артерія лівої руки, крововтрата - 1,0 л, Hb- 95 г/л, геморагічний шок I ступеня. Чи показане такому хворому переливання еритроцитарної маси?

- a. Не показане
- b. Інфузійна терапія взагалі не показана
- c. Альбумін
- d. Краще свіжозаморожена плазма
- e. Показане

Правильна відповідь: Не показане

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 1,5 років з діагнозом сепсис спостерігаються: потьмарення свідомості, контактний сопор, фоторефлекси збережені, акроціаноз, пульс слабкого наповнення, артеріальний тиск - 60/15 мм рт.ст. Який стадії термінального стану відповідає дана клінічна картина?

- a. Передагонія
- b. Клінічна смерть
- c. Біологічна смерть
- d. Соціальна смерть
- e. Агонія

Правильна відповідь: Передагонія

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнт 25-ти років демобілізований та госпіталізований на 3-ю добу після сильного обстрілу під час бою. Скаржиться на тривогу, відстороненість, відсутність апетиту, слабкість, швидку зміну настрою. Симптоми швидко припинилися після дії стресового фактору через 48 годин. Поставте діагноз:

- a. Гостра реакція на стрес
- b. Тривожний синдром
- c. Депресивний синдром
- d. Дисоціативний розлад особистості
- e. Розлад свідомості

Правильна відповідь: Гостра реакція на стрес

Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Новонароджений, який народився у стані важкої асфіксії, на 3-тю добу життя мають місце ністагм, опістотонус, часті напади судом, відсутні рефлекси смоктання та ковтання. Запідохрено внутрішньочерепний крововилив. Який метод дослідження слід призначити для підтвердження діагнозу?

- a. Клінічний аналіз крові
- b. УЗД головного мозку
- c. Кислотно-лужний баланс крові
- d. Люмбальна пункция
- e. Електроенцефалографія

Правильна відповідь: УЗД головного мозку

Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 25 із 80 відпочивальників у санаторії протягом доби виникло гостре кишкове захворювання, нез'ясованої етіології. Пацієнти харчувалися у різні зміни, страви обирали згідно з меню. Водопостачання у санаторії централізоване. Який шлях передачі найбільш імовірний при даному спалаху?

- a. Харчовий
- b. Артифіціальний
- c. Контактно-побутовий
- d. Ґрунтовий
- e. Водний

Правильна відповідь: Харчовий

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Лікарем на полі бою оглядається хворий 22-х років, що скаржиться на різкий біль в лівій нижній кінцівці. В нижній третині внутрішньої поверхні лівого стегна відзначається рвана рана 3,5x4,5 см з активною артеріальною кровотечею. Які заходи домедичної допомоги необхідно провести?

- a. Ввести гемостатичні препарати
- b. Виконати пальцеве притискання судини, що кровоточить
- c. Виконати туге бинтування рани
- d. Обробити рану перекисом водню
- e. Накласти джгут на ліву нижню кінцівку

Правильна відповідь: Накласти джгут на ліву нижню кінцівку

Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У постраждалого в дорожньо- транспортній пригоді (ДТП) чоловіка 31-го року лікар швидкої медичної допомоги діагностував закритий перелом правого стегна, травматичний шок 2 ступеня. В комплексі протишокової терапії почав швидку в/в інфузію кристалоїдів. Через 10 хвилин систолічний артеріальний тиск стабілізовано на 90 мм рт.ст. Яка подальша інфузійна терапія потрібна потерпілому?

- a. Крапельне введення розчину крохмалю
- b. Повільне крапельне введення кристалоїдів
- c. Крапельне введення еритроцитарної маси
- d. Швидке введення альбуміну
- e. Швидке введення розчину низькомолекулярних декстранів

Правильна відповідь: Повільне крапельне введення кристалоїдів

Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 70 років госпіталізований до судинного відділення з приводу лівобічного ілеофеморального тромбозу на 7-му добу після початку захворювання. Під час дуплексного дослідження виявлено венозний тромбоз стегнової вени без явищ флотації верхівки, розташований пристінково. Який вид лікування треба застосувати пацієнту?

- a. Плікацію нижньої порожнистої вени
- b. Установлення кава-фільтра
- c. Еластичну компресію, антикоагулантну та гемореологічну терапію
- d. Тромбектомію
- e. Консервативне лікування

Правильна відповідь: Консервативне лікування

Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Військовослужбовці постраждали через використання суперником фосгену під час військової операції. В усіх потерпілих спостерігається кашель, слинотеча, утруднення дихання, відчуття стискання за грудиною. Ці симптоми минули після припинення дії отруйної речовини і не повторювалися протягом 4-х годин. Розвиток якого патологічного стану може спричинити ця отруйна речовина?

- a. Токсичного гепатиту
- b. Гемолізу
- c. Токсичної енцефалопатії
- d. Анафілактичного шоку
- e. Токсичного набряку легень

Правильна відповідь: Токсичного набряку легень

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 46 років із діагнозом: Q-інфаркт міокарда через 2 години після початку захворювання та проведення фібринолітичної терапії раптово знепритомнів, посинів, з'явилися судоми. Об'єктивно спостерігається: пульс та АТ не визначаються, на моніторі велика кількість альтернуочих хвиль подібних до QRS-комплексів. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Ідіовентрикулярний ритм
- b. Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія
- c. Фібриляція передсердъ
- d. Фібриляція шлуночків
- e. Гостра кровотеча

Правильна відповідь: Фібриляція шлуночків

Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 40-ка років, інженер, має скарги на пароксизми гострого болю в лівій половині обличчя, тривалістю 1-2 хвилини. Частота нападів до 10 разів на добу. Провокуються напади болю вмиванням, вживанням іжі, розмовами, дотиком до лівої щоки ("куркова зона"). Хворобливість при пальпації супраорбітальної точки зліва. Сформулюйте клінічний діагноз:

- a. Пухлина головного мозку
- b. Лицева симпаталгія
- c. Неврит лицевого нерву
- d. Невралгія великого потиличного нерву
- e. Невралгія трійчастого нерва

Правильна відповідь: Невралгія трійчастого нерва

Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До приймального відділення госпіталізована чотирирічна дитина із температурою тіла 38,8°C та проявами ГРВІ. Який лікарський засіб треба застосувати насамперед для зменшення гіпертермії у дитини?

- a. Димедрол
- b. Парацетамол
- c. Німесулід
- d. Діазепам
- e. Мефенамінову кислоту

Правильна відповідь: Парацетамол

Питання 75

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки віком 25 років за 40 хвилин після прийому оксациліну з'явилися захриплість голосу, <<гавкаючий>> кашель, утрудненість дихання із задишкою інспіраторного характеру, задуха. Об'єктивно встановлено: пацієнта неспокійна, метушлива. Дихання шумне, стридорознє. Обличчя ціанотичне. Аускультивно вислуховуються поодинокі розсіяні сухі свистячі хрипи. Який найімовірніший діагноз?

- a. Напад бронхіальної астми
- b. Стороннє тіло в трахеї
- c. Гострий набряк Квінке
- d. Гострий фарингіт
- e. Паратонзиллярний абсцес

Правильна відповідь: Гострий набряк Квінке

Питання 76

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час огляду роділлі спостерігається: пологова діяльність активна, положення плода поперечне, перша позиція. Результати вагінального обстеження такі: відкриття шийки матки на 8–9 см, випадіння ручки плода, відсутність серцевиття та рухів плода у матці. Якій тактиці ведення пологів треба надати перевагу у цьому разі?

- a. Кесарів розтин
- b. Вакуум-екстракція
- c. Ведення пологів природнім шляхом
- d. Накладання акушерських щипців
- e. Плодоруйнівна операція

Правильна відповідь: Плодоруйнівна операція

Питання 77

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 7-ми років після хіміотерапії з'явилася петехіальна висипка на шкірі, а потім виникла важка кровотеча з носа. Які заходи слід провести в обласній лікарні для зупинки кровотечі?

- a. Тампонада, трансфузія плазми
- b. Тампонада, введення вікасолу
- c. Гемотрансфузія, тампонада
- d. Тампонада, введення преднізолону
- e. Тампонада, трансфузія тромбоконцентрату

Правильна відповідь: Тампонада, трансфузія тромбоконцентрату

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 10-ти років після дорожньо-транспортної пригоди спостерігається тривала кровотеча, відкритий перелом плеча, тупа травма живота, перелом стегна. Частота серцевих скорочень - 120/хв., артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст. У крові: Hb- 96 г/л, еритроцити - 3,8·10¹²/л, Ht- 0,37. З яких кровозамінників необхідно розпочинати терапію?

- a. Кристалоїди
- b. Свіжозаморожена плазма
- c. Еритроцитарна маса
- d. Цільна кров
- e. Альбумін

Правильна відповідь: Кристалоїди

Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У породіллі в ранньому післяпологовому періоді виник геморагічний шок у зв'язку з гіпотонічною кровотечею, що триває, незважаючи на лікування, крововтрата становить 1400 мл. Якою буде лікарська тактика?

- a. Наркоз і проведення інтенсивної терапії
- b. Оперативне лікування
- c. Лікування геморагічного шоку паралельно з оперативною зупинкою кровотечі
- d. Лікування геморагічного шоку
- e. Лікування порушеної функції нирок

Правильна відповідь: Лікування геморагічного шоку паралельно з оперативною зупинкою кровотечі

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Породілля 21 рік. Знаходиться у післяпологовому відділенні на сумісному перебуванні з дитиною. З доба після пологів. Під час огляду лікаря збуджена, відмовляється від огляду, збирається додому. На запитання відповідає, що не розуміє, що вона знаходиться у лікарні, що ще незаміжня та дітей не народжувала. Пологи I, перебіг вагітності без ускладнень, психосоматичний анамнез не ускладнений. Температура тіла нормальна. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Післяпологовий психоз
- b. Післяпологова депресія
- c. Інтоксикаційний психоз
- d. Органічний психосиндром
- e. Шизофренія

Правильна відповідь: Післяпологовий психоз

Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 37 років 10 днів тому отримав тупу травму лівого стегна. Одразу ж виникли набряк та біль у ділянці травми. За 7 днів біль значно посилився, підвищилася температура тіла, з'явилися слабкість та нудота. Об'єктивно спостерігається: температура тіла --- 39\$^{\circ}\text{C}\$, ЧД --- 28/xv, ЧСС --- 110/xv, набряк, гіперемія та різкий біль під час пальпації у ділянці лівого стегна, сукровичні виділення. У загальному аналізі крові виявлено лейкоцитоз зі зсувом лейкоцитарної формулі вліво. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Тромбофлебіт підшкірних вен лівого стегна
- b. Флегмона лівого стегна
- c. Лімфангіт лівого стегна
- d. Нагноєння гематоми лівого стегна
- e. Бешихове запалення лівого стегна

Правильна відповідь: Нагноєння гематоми лівого стегна

Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнт під час переливання крові відчув слабкість, серцебиття, холод у кінцівках. Об'єктивно спостерігається: шкіра вкрита холодним липким потом, ціаноз кінцівок, АТ --- 60/30 мм рт. ст., пульс --- 110/хв., дихання часте та поверхневе, сеча темного кольору. Якою буде тактика надання невідкладної допомоги пацієнту?

- a. Припинити гемотрансфузію, увести адреналін
- b. Продовжити гемотрансфузію, увести кордіамін
- c. Продовжити гемотрансфузію, увести преднізолон
- d. Припинити гемотрансфузію, увести антикоагулянти
- e. Реанімація за системою CAB

Правильна відповідь: Припинити гемотрансфузію, увести адреналін

Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 39 років одразу після щеплення від грипу розвинувся анафілактичний шок. Який із наведених препаратів треба увести насамперед?

- a. Мезатон
- b. Налоксон
- c. Адреналін
- d. Кофеїн
- e. Строфантин

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальне відділення доставлено хлопчика 7-ми років з електротравмою (взявся за оголений електропровід). У потерпілого опіки 2 ступеня I та II пальців правої кисті та порушення серцевого ритму. Які обстеження необхідно провести першочергово?

- a. Фонокардіограма
- b. Електрокардіограма
- c. Клінічний аналіз крові
- d. Аналіз крові на електроліти
- e. Ультразвукове дослідження серця

Правильна відповідь: Електрокардіограма

Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта віком 18 років під час лікування з приводу бактеріального ендокардиту раптово на фоні емоційного напруження розвинувся генералізований судомний напад. Після нападу в неврологічному статусі визначалися: центральний параліч VII, XII пар черепних нервів, геміанестезія та центральний параліч праворуч. Який імовірний діагноз у пацієнта?

- a. Лакунарний інсульт
- b. Генералізований епілептичний напад
- c. Субарахноїдальний крововилив
- d. Гемодинамічний інсульт
- e. Кардіоемболічний інсульт

Правильна відповідь: Кардіоемболічний інсульт

Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 28-ми років, білява, з блакитними очима, рудим волоссям була на відкритому сонці у липні місяці з 10 ранку до 15 години. Наступного дня шкіра відкритих ділянок, що перебували на сонці - гіперемована, з набряком, на тлі еритеми - множинні бульзозні елементи. Висипка супроводжується болем та печінням. Поставте діагноз:

- a. Герпетиформний дерматоз Дюрінга
- b. Акантолітична пухирчатка
- c. Алергічний дерматит
- d. Справжня екзема
- e. Простий контактний дерматит

Правильна відповідь: Простий контактний дерматит

Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У лікаря, який оглядав пацієнтів із високою температурою тіла в одній із південних країн, виникли гарячка, головний біль, біль у м'язах і суглобах, загальна слабкість, діарея. На 4-й день хвороби на тілі з'явився макуло-папульозний висип, на 5-й день --- криваве блювання, мелена, гіпотонія. Який імовірний діагноз?

- a. Висипний тиф
- b. Псевдотуберкульоз
- c. Лептоспіроз
- d. Малярія
- e. Лихоманка Ебола

Правильна відповідь: Лихоманка Ебола

Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини двох років раптово з'явився біль спастичного характеру у животі. При первинному огляді дитина заспокоїлась, болю нема. Був стілець з домішкою крові. В правій нижній ділянці живота пальпуються пухлиноподібне утворення, циліндричної форми. Який Ваш попередній діагноз?

- a. Черевний тиф
- b. Кишкова інвагінація
- c. Хвороба Гіршпрунга
- d. Дизентерія
- e. Хвороба Кроні

Правильна відповідь: Кишкова інвагінація

Питання 89

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 52-х років з наявним трансфузіологічним анамнезом одразу після початку внутрішньовенного введення свіжозамороженої плазми виникли непродуктивний кашель, бронхоспазм, задуха, нудота, біль у животі, гіпотенія, після чого наступила втрата свідомості. Які найбільш правильні лікувальні заходи?

- a. В/в введення еуфіліну, гідрокортизону, інфузійна терапія, інгаляція кисню
- b. Негайна зупинка інфузії, інтубація трахеї, штучна вентиляція легень (ШВЛ)
- c. Джгут вище місця введення, обколювання розчином адреналіну, гідрокортизон в/в
- d. Негайна зупинка інфузії, в/в введення адреналіну, преднізолону, еуфіліну, інгаляція кисню
- e. Продовження інфузії, введення адреностимулаторів, глюокортикоістериоїдів

Правильна відповідь: Негайна зупинка інфузії, в/в введення адреналіну, преднізолону, еуфіліну, інгаляція кисню

Питання 90

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Рядовий 19-ти років помилково зробив 2 ковтки антифризу, після чого з'явилися запаморочення, слабкість, похитування при ході. Викликав блювання, випив розчин питної соди. Було проведено зондове промивання шлунку. Об'єктивно: стан задовільний, свідомість не порушена, обличчя гіперемоване, ін'екція склер. Пальценоносову пробу виконує невпевнено. Над легенями дихання везикулярне. Межі серця не змінені, серцеві тони звучні, ритмічні. Частота серцевих скорочень - 90/хв., артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Живіт м'який, трохи болючий у епігастрії. Печінка біля краю реберної дуги. Набряків нема. Який наступний крок у наданні допомоги потерпілому?

- a. Сольове проносне, перфеназин в/м
- b. Етиловий спирт в/в
- c. Атропіну сульфат в/в, фуросемід в/в
- d. Строфантин в/в
- e. Преднізолон в/м

Правильна відповідь: Етиловий спирт в/в

Питання 91

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіка віком 55 років із діагнозом: інсулінозалежний цукровий діабет, госпіталізовано до лікарні. Він скаржиться на загальну слабість, поліурію, гіпотонію, тахікардію. У газовому складі крові виявлено: pH --- 7,31, PaCO₂ --- 35 мм рт. ст., PaO₂ --- 80 мм рт.ст., стандартний бікарбонат --- 17 ммол/л, істинний бікарбонат --- 15 ммол/л, дефіцит основ --- 1,5 ммол/л, натрій --- 132 ммол/л, глукоза --- 25 ммол/л, хлориди --- 102 ммол/л, кетонові тіла. Визначте порушення кислотно-основного стану пацієнта.

- a. Респіраторний ацидоз
- b. Метаболічний алкалоз
- c. Метаболічний ацидоз
- d. Змішаний ацидоз
- e. Респіраторний алкалоз

Правильна відповідь: Метаболічний ацидоз

Питання 92

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 12-ти років під час внутрішньовенного введення рентгенконтрастної речовини (тріомбрасту) раптово погіршився стан: з'явилися головний біль, відчуття здавлення в грудях з браком повітря. Через декілька хвилин знепритоміла. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, акроціаноз. Пульс ниткоподібний. Тони серця різко ослаблені. Частота серцевих скорочень - 110/хв., артеріальний тиск - 60/30 мм рт.ст. Вкажіть препарат вибору для надання невідкладної допомоги:

- a. Адреналін
- b. Супрастин
- c. Преднізолон
- d. Еуфілін
- e. Допамін

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Працівник фабрики шкіряних виробів захворів гостро: протягом 3-х днів температура тіла - 38,5-39,5°C, слабкість, зниження апетиту, свербіння і печіння в ділянці правої кисті. Об'єктивно: на кисті правої руки на щільній основі розташована безболісна, вкрита темною кіркою, виразка діаметром 1,5 см, яка оточена гіперемією, везикулами і набряком драглистої консистенції. Пальпуються регіонарні лімфовузли діаметром 0,5 см, помірно болючі, рухомі. Тони серця приглушенні, ритмічні, артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. Яке захворювання є найбільш імовірним?

- a. Чума
- b. Сибірка
- c. Токсоплазмоз
- d. Лімфогранулематоз
- e. Туляремія

Правильна відповідь: Сибірка

Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Прaporщик 38-ми років звернувся в медичний пункт з приводу колотої рани стопи, в минулому двічі вакцинований і ревакцинований у плановому порядку проти правцю 8 років тому. Вкажіть тактику щодо специфічної профілактики правцю:

- a. Ввести АП-анатоксин
- b. Ввести протиправцевий імуноглобулін
- c. Ввести протидифтерійний анатоксин
- d. Ввести АКДП вакцину
- e. Ввести АДП-м анатоксин

Правильна відповідь: Ввести АП-анатоксин

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальне відділення доставлений потерпілий з опіком полум'ям III Б-ІV ст. обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Волосся у ніздрях обгоріло, слизова губ, язик сіро-бліого кольору. Голос хриплий, дихання часте, поверхневе; "трубний кашель", що супроводжується виділенням харкотиння з домішками кіптяви. Під час транспортування у відділення інтенсивної терапії почали нарости явища дихальної недостатності. Який необхідний об'єм допомоги?

- a. Інтубація трахеї та ШВЛ
- b. Інгаляція зволоженого кисню
- c. Введення дихальних аналептиків
- d. Введення муколітиків
- e. Інгаляції β_2 -agonістів короткої дії

Правильна відповідь: Інтубація трахеї та ШВЛ

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта на 5-ту добу після операції розвинулася клінічна картина тромбоемболії легеневої артерії, настало раптова коронарна смерть. Який препарат необхідно було призначити для профілактики цього ускладнення?

- a. Трендерал
- b. Аспірин
- c. Реополіглюкін
- d. Еноксипарин
- e. Курантіл

Правильна відповідь: Еноксипарин

Питання 97

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт віком 48 років, який протягом 16 років хворіє на стеноз пілоруса, як наслідок виразкової хвороби, скаржиться на слабкість, масивне блювання протягом тижня, спрагу, різке схуднення. Об'єктивно спостерігається: збуджений, блідий, АТ --- 90/60 мм рт.ст., ЧСС --- 110--130/хв., аритмія, ЦВТ --- 0 мм вод. ст., діурез менше 10 мл/год, гематокрит --- 52%, \$Na⁺ --- 125 ммол/л, \$K⁺ --- 2,7 ммол/л, pH --- 7,6, BE --- +13. Чим визначається тяжкість стану пацієнта?

- a. Кардіогенним шоком
- b. Дегідратацією та метаболічним алкалозом
- c. Метаболічним ацидозом
- d. Геморагічним шоком
- e. Аритмією та респіраторним алкалозом

Правильна відповідь: Дегідратацією та метаболічним алкалозом

Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У недоношеної новонародженої дитини протягом перших 6 годин після народження з'явилися почастішання дихання до 60/хв., асинхронність руху грудної клітки і черевної стінки, роздування крил носа, втягнення міжреберних проміжків та груднини, участь допоміжних м'язів в акті дихання. Яке діагностичне дослідження треба провести?

- a. Діафаноскопію черепа
- b. Рентгенографію черепа
- c. Ультразвукове дослідження мозку
- d. Рентгенографію черевної порожнини
- e. Рентгенографію грудної клітки

Правильна відповідь: Рентгенографію грудної клітки

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки, яка хворіє на хронічний вірусний гепатит С, раптово розвинулися сонливість, сплутаність свідомості, носова кровотеча. На шкірі з'явилися геморагічні висипання та відчувається солодкуватий запах з рота. Яке ускладнення найімовірніше виникло у пацієнтки?

- a. Гостра печінкова недостатність
- b. Гіперглікемічний стан
- c. Жовчнокам'яна хвороба
- d. Гостра ниркова недостатність
- e. Кетоацидоз

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У повторновагітної 28-ми років, з прееклампсією середнього ступеня важкості, при вагітності 32 тижні, з'явилась жовтяниця та ознаки загальної інтоксикації. Лабораторно: гіпокоагуляція - тромбоцити - 80-109/л, ПДФ+++, загальний білірубін - 90 ммоль/л (прямий - 25 ммоль/л, непрямий - 65 ммоль/л), АлАТ- 3,5 ммоль//л·кг·год, АсАТ- 2,6 ммоль//л·кг·год. Яке ускладнення виникло у вагітної?

- a. Гостра жирова дистрофія печінки
- b. HELLP-синдром
- c. Синдром Жильбера
- d. Синдром Бадда-Кіарі
- e. Вірусний гепатит

Правильна відповідь: HELLP-синдром

Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 59 років раптово на вулиці втратив свідомість. Діагностовані ознаки клінічної смерті. З чого треба починати реанімаційні заходи?

- a. Виконання зовнішнього масажу серця
- b. Уведення аміодарону чи лідокаїну
- c. Виконання конікотомії
- d. Виконання потрійного прийому Сафара
- e. Уведення атропіну та адреналіну

Правильна відповідь: Виконання потрійного прийому Сафара

Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Моряк, який повернувся із закордонного плавання, скаржиться на високу температуру тіла до 40°C та кашель із пінистою іржавою мокротою. Об'єктивно встановлено: блідий, ціаноз слизових, ЧД --- 30/хв, тахікардія, дихання в легенях ослаблене, поодинокі вологі хрипи, крепітакія. Попередній діагноз: чума, первинно-легенева форма. Який лікарський засіб треба призначити пацієнту?

- a. Пеніцилін
- b. Людський імуноглобулін
- c. Цефтріаксон
- d. Стрептоміцин
- e. Інфліксимаб

Правильна відповідь: Стрептоміцин

Питання 103

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У десятимісячної дитини із діагнозом: септичний шок розвинувся геморагічний синдром (кровотеча з місць ін'екцій, по шлунковому зонду надходить <<кавова гуща>>). Під час визначення показників гемостазу виявлено підвищення міжнародного нормалізаційного відношення, АЧТЧ, рівня D-димеру, а також зниження фібриногену та тромбоцитів. Діагностовано ДВЗ-синдром. Що на самперед треба призначити дитині для корекції гемостазу?

- a. Свіжозаморожену плазму
- b. Хлорид кальцію
- c. Етамзилат натрію
- d. Вітамін К
- e. Дезагреганти

Правильна відповідь: Свіжозаморожену плазму

Питання 104

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта на 17-й день лихоманки з'явилися дьогтеподібні випорожнення. Під час огляду спостерігається: шкірні покриви бліді, температура тіла --- 37,3 $^{\circ}\text{C}$, пульс --- 118/хв, АТ --- 90/60 мм рт. ст. Коричневий наліт на язиці, живіт помірно роздутий, безболісний, гепатосplenомегалія. Яке ймовірно ускладнення розвинулося у пацієнта?

- a. Дисбіоз кишечника
- b. Тромбоз мезентеріальних судин
- c. Перфорація кишок
- d. Шлунково-кишкова кровотеча
- e. Активація ендогенної флори

Правильна відповідь: Шлунково-кишкова кровотеча

Питання 105

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 6-місячної дитини, яка отримувала терапію з приводу гострого ешерихіозного ентероколіту, з'явилися млявість, блідість шкірних покривів, набряклість обличчя, ін'екція склер, а через дві доби - олігурія, жовтяничність, петехіальний висип, одноразова носова кровотеча. Сеча іржаво-коричневого кольору. У загальному аналізі крові: тромбоцитопенія. У цьому випадку можна припустити:

- a. Спадкову гемолітичну анемію
- b. Гемолітико-уремічний синдром
- c. Гострий пієлонефрит
- d. Гострий гломерулонефрит
- e. Дисбіоз кишечника

Правильна відповідь: Гемолітико-уремічний синдром

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини захворювання почалося з підвищення температури до 38°C та появи висипу. Спочатку висип мав вигляд плям, потім з'явилися пухирці. Під час огляду на шкірі обличчя, тулуба, кінцівок і на волоссяній частині голови спостерігається рясний висип: папули, везикули, кірочки. Діагноз: вітряна віспа. Протягом якого періоду дитина має бути ізольована?

- a. До появи останніх висипів
- b. Ізоляції не потрібно
- c. 21 день
- d. 14 днів
- e. До 5-го дня після появи останніх висипів

Правильна відповідь: До 5-го дня після появи останніх висипів

Питання 107

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 38 років під час огляду скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, блювання темно-коричневими масами, випорожнення чорного кольору. Раніше періодично турбував біль в епігастрії. Об'єктивно встановлено: шкіра та видимі слизові оболонки блідого кольору, вологі. Пульс --- 98/хв., слабкого наповнення. АТ --- 90/60 мм рт. ст. Гемоглобін --- 108 г/л, еритроцити --- 2,9 Т/л. Реакція на приховану кров у калі позитивна. Встановіть попередній діагноз.

- a. Черевний тиф
- b. Виразкова хвороба шлунку або ДПК
- c. Рак шлунку
- d. Хвороба Кроне
- e. Неспецифічний виразковий коліт

Правильна відповідь: Виразкова хвороба шлунку або ДПК

Питання 108

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 72 роки унаслідок фібриляції шлуночків настала зупинка кровообігу. Проводиться комплекс елементарної серцево-легеневої реанімації (зовнішній масаж серця та штучна вентиляція легень). Тричі проведена дефібриляція, яка виявилася неефективною. Яку медикаментозну терапію треба провести?

- a. Увести в/в адреналін
- b. Увести в/в атропін
- c. Увести в/в натрію гідрокарбонат
- d. Увести в/в магнія сульфат
- e. Увести в/в дофамін

Правильна відповідь: Увести в/в адреналін

Питання 109

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Після падіння з опором на праве плече потерпілий скаржиться на біль, обмеження рухів, деформацію в ділянці плечового суглоба. Яких заходів на цьому етапі надання допомоги необхідно вжити?

- a. Накладення шини Крамера від пальців до плечового суглоба
- b. Транспортна іммобілізація, знеболення
- c. Накладення шини Дітеріхса
- d. Блокада місця перелому
- e. Накладення гіпової пов'язки

Правильна відповідь: Транспортна іммобілізація, знеболення

Питання 110

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт 40-ка років раптово, виходячи з тролейбуса, падає на землю. У нього відсутнє самостійне дихання, та пульсація на магістральних артеріях, розширені зіниці. Ваш діагноз:

- a. Запаморочення
- b. Клінічна смерть
- c. Гострий інфаркт міокарда
- d. Тромбоемболія легеневої артерії
- e. Ортостатичний колапс

Правильна відповідь: Клінічна смерть

Питання 111

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 40 років отримав електротравму. За допомогою до лікаря не звертався. Наступного дня відчув погіршення стану здоров'я. Бригада екстремої (швидкої) медичної допомоги діагностувала шлуночкову екстрасистолію. Під час огляду встановлено: пацієнт у свідомості, АТ --- 120/80 мм рт. ст., пульс --- 84/хв, ритмічний, ЧД --- 16/хв. На правій та лівій руках наявні специфічні <<знаки>> від електричного струму. Пацієнту уведено протиправцеву сироватку та оброблено рані. Визначте подальшу тактику лікаря.

- a. Рекомендувати пройти ЕКГ обстеження в поліклініці за місцем проживання впродовж тижня
- b. Госпіталізувати пацієнта до реанімаційного відділення
- c. Госпіталізувати пацієнта до терапевтичного відділення
- d. Рекомендувати пройти ЕКГ обстеження в поліклініці за місцем проживання через три дні
- e. Провести ЕКГ обстеження і, за відсутності серцевої патології, відпустити пацієнта додому

Правильна відповідь: Госпіталізувати пацієнта до реанімаційного відділення

Питання 112

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної в 34 тижні під час доплерографічного ультразвукового обстеження виявили стійкий реверсивний діастолічний кровоплин у судинах плода й провели кесарів розтин. У новонародженого відсутні дихання і м'язовий тонус. Вентиляція мішком і маскою не забезпечує адекватні рухи грудної клітки і, після наступних 20 секунд вентиляції, частота серцевих скорочень не збільшується. Який наступний етап реанімації?

- a. Припинити надавати допомогу
- b. Інтубація трахеї немовляти
- c. Введення адреналіну
- d. Введення атропіну
- e. Введення натрію бікарбонату

Правильна відповідь: Інтубація трахеї немовляти

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Народилась недоношена дитина, гестаційний вік 32 тижні, з вагою 1700 г, рівень глюкози крові становить 2,1 ммоль/л. У дитини відзначається порушення стану, судомна готовність. Виберіть першочергову допомогу для дитини:

- a. 0,9% розчин натрию хлориду, 10 мл/кг
- b. 10% розчин глюкози, 2 мл/кг
- c. 25% розчин MgSO₄, 1 мл/кг
- d. 10% розчин натрию хлориду, 4 мл/кг
- e. Фенобарбітал, 20 мг/кг

Правильна відповідь: 10% розчин глюкози, 2 мл/кг

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки 32-х років стан після операції кесаревого розтину. На третю добу відзначено збільшення в об'ємі лівої нижньої кінцівки, появу болю за ходом глибоких вен гомілки і гіперемія шкіри. Температура тіла - 37,8°C . Яких заходів необхідно вжити після операції для профілактики глибокого венозного тромбозу?

- a. Лікування антибіотиками
- b. Озонотерапія
- c. Лікування цитостатиками
- d. Введення фраксипарину
- e. Лікування утеротонічними препаратами

Правильна відповідь: Введення фраксипарину

Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 58-ми років з IХС на прийомі у дільничного лікаря розвинувся пароксимзм надшлуночкової тахікардії, зареєстрований на ЕКГ. Які першочергові заходи доцільно провести?

- a. Вагусні проби
- b. Внутрішньовенне введення адреналіну
- c. Черезстравохідна електрокардіостимуляція
- d. Ввести кордарон
- e. Електроімпульсна терапія

Правильна відповідь: Вагусні проби

Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки віком 32 роки з терміном вагітності 36 тижнів виникло блювання, що не зупиняється ніякими методами, погіршився зір та з'явилися сильні головні болі. Під час комп'ютерної томографії виявлено об'ємне утворення у головному мозку. Який імовірний діагноз?

- a. Гостре порушення мозкового кровообігу
- b. Прееклампсія
- c. Арахноїдит
- d. Набряк мозку
- e. Пухлина мозку

Правильна відповідь: Пухлина мозку

Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 50-ти років з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок після фізичного навантаження з'явилаася виражена задишка, біль в грудній клітці з правого боку, серцевиття, запаморочення, минущі порушення свідомості. Об'єктивно: шкіра блідо-цианотична. Тахіпное - 40/хв., сухі свистячі хрипи. Тахікардія - 130/хв. Артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. На ЕКГ - відхилення електричної осі праворуч, блокада правої ніжки пучка Гіса. Який діагноз найбільш імовірний у хворого?

- a. Інфаркт міокарду
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Плеврит
- d. Гостра інтерстиціальна пневмонія
- e. Спонтанний пневмоторакс

Правильна відповідь: Тромбоемболія легеневої артерії

Питання 118

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнтки 28-ми років під час вагітності (ІІІ триместр) та захворювання на гострий гепатит Е стався викиденъ, після чого різко погіршився стан: з'явилися психомоторне збудження, сплутаність свідомості, "хлопаючий" тремор, агресивність, дезорієнтованість у часі, тахікардія, блювання "кавовою гущею", значно зменшилися розміри печінки. Як оцінюється стан хворої лікарем?

- a. Шлунково-кишкова кровотеча
- b. Гостра печінкова недостатність
- c. Гострий реактивний психоз
- d. Септичний шок
- e. Геморагічний шок

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 35-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 39оС, біль по передній поверхні шиї, що посилюється при ковтанні, повороті голови. При огляді: щитоподібна залоза збільшена у розмірах, при пальпації різко болюча, з почервонінням шкіри та флюктуацією. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Гострий медіастиніт
- b. Гострий гнійний тиреоїдит
- c. Зоб Ріделя
- d. Тиреоїдит Хашімото
- e. Тиреоїдит де Кервена

Правильна відповідь: Гострий гнійний тиреоїдит

Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта віком 45 років на шосту добу гострого інфаркту міокарда раптово розвинулася виражена задишка та кашель із виділенням рожевого мокротиння. Об'єктивно встановлено: набухання шийних вен, пульс --- 110/хв., AT --- 85/55 мм рт. ст., акцент II-го тону над легеневою артерією. Яка причина погіршення стану пацієнта?

- a. Ателектаз легень
- b. Синдром Дреслера
- c. Повторний інфаркт міокарда
- d. Пневмонія
- e. Гостра лівошлуночкова недостатність

Правильна відповідь: Гостра лівошлуночкова недостатність

Питання 121

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки віком 27 років діагностовано позагоспітальну пневмонію. В анамнезі --- цукровий діабет I типу. Отримувала 36 ОД інсуліну на добу. За 2 дні значно посилилися слабкість, полідипсія, поліурія, з'явилися нудота, блювання. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, тургор її знижений, очні яблука м'які, запах ацетону в повітрі, що видихається, пульс --- 112/х, AT --- 95/55 мм рт. ст. Які дослідження треба провести насамперед?

- a. Аналіз крові на вміст білірубіну і його фракцій
- b. Аналіз крові на вміст глюкози та аналіз сечі на кетонові тіла
- c. Аналіз крові на креатинін і сечовину
- d. Аналіз крові на вміст електролітів
- e. Аналіз крові на вміст заліза та кальцію

Правильна відповідь: Аналіз крові на вміст глюкози та аналіз сечі на кетонові тіла

Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У сержанта 30-ти років після вибуху авіабомби ліва гомілка була притиснута бетонною стіною до землі. Звільнення від стиснення гомілки відбулося через 3 години, потерпілого доставлено у госпіталь. Шкіра гомілки блідо-ціанотична, холодна на дотик, набрякла. Тони серця приглушені, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс slabkого наповнення, 120/хв. У сечі: міоглобін, протеїнурія та циліндрурія, колір - бурій. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Синдром тривалого стиснення, проміжний період
- b. Синдром тривалого стиснення, ранній період
- c. Гостра печінкова недостатність
- d. Гострий венозний тромбоз
- e. Гострий гломерулонефрит

Правильна відповідь: Синдром тривалого стиснення, ранній період

Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіку віком 43 роки через гостре отруєння фосфорорганічними сполуками за добу введено понад 100 мг атропіну сульфату. Під ранок у пацієнта розвинувся психоз із галюцінаціями та судоми. АТ --- 90/60 мм рт. ст. Який лікарський засіб треба насамперед ввести пацієнту для лікування ускладнення, що виникло?

- a. Аміназин
- b. Галантаміну гідробромід
- c. Унітіол
- d. Галоперидол
- e. Налоксон

Правильна відповідь: Галантаміну гідробромід

Питання 124

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час вживання їжі у чоловіка раптово виникло стридорозне дихання, задишка понад 30/хв та втрата свідомості. Що могло спричинити гостру дихальну недостатність у пацієнта?

- a. Бронхоспазм
- b. Астматичний статус
- c. ГДН центрального генезу
- d. Обструкція трахеї стороннім тілом
- e. Гостре порушення мозкового кровообігу

Правильна відповідь: Обструкція трахеї стороннім тілом

Питання 125

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Рядового солдата віком 19 років, який під час вибуху ємкості з пальним отримав опіки тулуба і верхніх кінцівок, транспортувано до медичної роти бригади. Об'єктивно спостерігається: стан середньої тяжкості, AT --- 100/65 мм рт. ст., пульс --- 105/хв, на шкірі верхніх кінцівок та грудної клітки виявлено гіперемію, набряк, пухирі, втрата бельової і тактильної на цих ділянках. Яка медична допомога пацієнту на цьому етапі?

- a. Оброблення ран масляним розчином
- b. Уведення допаміну в/в крапельно
- c. Оброблення ран дегазуючою рідиною
- d. Уведення дексаметазону
- e. Накладення сухої асептичної пов'язки

Правильна відповідь: Накладення сухої асептичної пов'язки

Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На місті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з пошкодженого автомобілю витягнуто хлопчика 12-ти років з численними забоями грудної клітки та відкритим переломом гомілки. При огляді: задуха, ціаноз шкіри. Права половина грудної клітини не бере участі у диханні. При перкусії: над нею визначається високий тимпаніт, аускультивно дихання не прослуховується, межі серцевої тупості зміщено вліво. Тони серця глухі, прискорені. Про який небезпечний стан це свідчить?

- a. Ателектаз правої легені
- b. Гемоторакс
- c. Напруженій правобічний пневмоторакс
- d. Відкритий пневмоторакс
- e. Забій легені

Правильна відповідь: Напруженій правобічний пневмоторакс

Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта віком 45 років на тлі тяжкого перебігу черевного тифу, розвинулася кишкова кровотеча. Об'єктивно спостерігається: швидке нарощання анемії, уміст еритроцитів --- \$2,1\cdot 10^{12}/л. Показана гемотрансфузія. Які біологічні рідини треба підготувати для проведення проби на індивідуальну сумісність?

- a. Кров донора та кров реципієнта
- b. Кров донора та формені елементами крові реципієнта
- c. Кров донора та сироватку реципієнта
- d. Кров донора та тромбоцити реципієнта
- e. Формені елементи крові донора та кров реципієнта

Правильна відповідь: Кров донора та сироватку реципієнта

Питання 128

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У однорічної дитини з'явилися нежить, сухий кашель, підвищення температури тіла до 39°C. За 30 хв після госпіталізації з'явилися тоніко-клонічні судоми тривалістю 2 хв із подальшою втратою свідомості. Яка найімовірніша причина судом?

- a. Менінгоенцефаліт
- b. Набряк мозку
- c. Епілепсія
- d. Спазмофілія
- e. Лихоманка

Правильна відповідь: Лихоманка

Питання 129

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 48-ми років скаржиться на наявність пульсуючого болю в ділянці інфільтрату промежини, температура тіла - 38,9°C. При огляді виявлено округлий інфільтрат зліва від ануса, шкіра над ним гіперемована. *Per rectum*: верхня межа інфільтрату вище гребінцевої лінії, пальпація його різко болісна. Ваш діагноз:

- a. Туберкульозний наплив в періанальній ділянці
- b. Кіста парапектальної ділянки
- c. Нагноєння епітеліальних куприкових ходів
- d. Фурункул періанальної ділянки
- e. Гострий гнійний парапроктит

Правильна відповідь: Гострий гнійний парапроктит

Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Новонароджений дитині з тяжкою асфіксією під час народження проводиться реанімація в пологовому залі. Після 40 секунд проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень 100% киснем у дитини встановлено ЧСС --- 50/хв. Яка подальша лікувальна тактика?

- a. Внутрішньовенно ввести атропін
- b. Продовжувати непрямий масаж серця
- c. Внутрішньовенно ввести розчин налоксону
- d. Внутрішньовенно ввести адреналін, продовжувати непрямий масаж серця
- e. Продовжувати штучну вентиляцію легень

Правильна відповідь: Продовжувати непрямий масаж серця

Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 20-ти років, який надійшов до інфекційного віddлення на 3-й день захворювання, діагностовано дифтерію ротоглотки. На 5-й день стан погіршився: температура досягла 39,7°C, підсилився біль у горлі, поширилася плівчастий наліт, поскаржився на прогресуючу слабкість, біль у епігастрії, повторне бл涓ання. Блідий. Ціаноз губ. Частота дихання - 28/хв. Межі серця розширені. Ритм галопу. Артеріальний тиск - 70/50 мм рт.ст. Чим обумовлена тяжкість стану хворого?

- a. Медіастиніт
- b. Токсичний міокардит
- c. Гостра дихальна недостатність
- d. Інфекційно-токсичний шок
- e. Кардіогенний шок

Правильна відповідь: Токсичний міокардит

Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної 40 тижнів під час запису ЕКГ раптово виникло відчуття задухи, головокружіння, блідість, миготіння "мушок" перед очима, артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. На ЕКГ - синусова брадикардія. Ваші першочергові дії:

- a. Забезпечити інгаляцію 100% кисню через носо-лицеву маску
- b. Катетеризувати вену та ввести 1 мг атропіну сульфату
- c. Повернути на лівий бік
- d. Дати вдихати пари аміачного спирту
- e. Катетеризувати вену та почати інфузію дофаміну з швидкістю 10 мкг/хв

Правильна відповідь: Повернути на лівий бік

Питання 133

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Доношена дитина, народжена природнім шляхом одразу після народження мала нерегулярне дихання та знижений м'язовий тонус. Після надання початкової реанімаційної допомоги --- дитина голосно кричить, дихання --- 40/хв, м'язовий тонус задовільний, ЧСС --- 140/хв. Яку подальшу тактику треба вибрати лікарю?

- a. Почати ШВЛ мішком та маскою 100\%-м киснем
- b. Дати 100\%-й кисень вільним потоком
- c. Почати ШВЛ мішком та маскою атмосферним повітрям
- d. Викласти дитину на живіт матері
- e. Повторити санацію ВДШ гумовою грушею

Правильна відповідь: Викласти дитину на живіт матері

Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіка госпіталізовано до реанімаційного відділення без свідомості. З анамнезу відомо, що пацієнт протягом останніх 2 годин відчував виражений пекучий біль за грудиною. Шкірні покриви бліді, акроцианоз, АТ --- 60/40 мм рт. ст. На ЕКГ виявлено шлуночкову тахікардію. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

- a. Бліскавичний набряк легень
- b. Аритмогенний шок
- c. Тампонада серця
- d. Розрив міокарда
- e. Анафілактичний шок

Правильна відповідь: Аритмогенний шок

Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У лікарню доставлена група потерпілих у результаті бійки із застосуванням холодної і вогнепальної зброї. Які поранення найбільш несприятливі для прогнозу розвитку інфекційних ускладнень?

- a. Різані
- b. Рвано-різані
- c. Колото-різані
- d. Вогнепальні
- e. Проникні

Правильна відповідь: Вогнепальні

Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Постраждалий віком 19 років у непримому стані госпіталізований з місця ДТП. Об'єктивно встановлено: свідомість відсутня, у відповідь на болові подразники мимовільно з'являється тонічне напруження м'язів із випростовуванням рук і ніг та закиданням голови назад, двосторонні стопні патологічні рефлекси. Дихання <<машинне>>, пульс --- 110/хв, артеріальний тиск --- 160/100 мм рт. ст., температура тіла --- 37,9\$^{\circ}\text{C}. Встановіть попередній діагноз.

- a. Внутрішньочерепна гематома
- b. Аневризма судин головного мозку
- c. Менінгіт
- d. Забій головного мозку важкого ступеня
- e. Гостре порушення мозкового кровообігу

Правильна відповідь: Забій головного мозку важкого ступеня

Питання 137

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка, який хворіє хронічною наднирковою недостатністю, після апендектомії різко погіршився стан: спостерігається прогресуюче зниження АТ, глухість тонів серця, тахікардія, пульс слабкого наповнення, акроціаноз, <<мармуровість>> шкіри. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Гіповолемічний шок
- b. Серцева недостатність
- c. Гостра надниркова недостатність
- d. Кишкова непрохідність
- e. Перитоніт

Правильна відповідь: Гостра надниркова недостатність

Питання 138

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час патрулювання військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму. Об'єктивно: ліва стопа відсутня, із рані гомілки спостерігається виражена кровотеча. Шкіра бліда, пульс на променевій артерії відсутній, на сонній артерії - 112/хв. В чому полягає алгоритм надання домедичної допомоги?

- a. Накладання джгута та асептичної пов'язки, транспортна іммобілізація, знеболення
- b. Знеболення, накладання кровоспинного джгута та негайна евакуація на наступний етап
- c. Накладання асептичної пов'язки, у разі неможливості зупинки кровотечі - накладання кровоспинного джгута
- d. Знеболення та негайна евакуація на наступний етап
- e. Знеболення, накладання кровоспинного джгута, накладання асептичної пов'язки

Правильна відповідь: Накладання джгута та асептичної пов'язки, транспортна іммобілізація, знеболення

Питання 139

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 22 роки прооперована з приводу позаматкової вагітності. У післяопераційний період з замісною метою їй призначили трансфузію еритроцитарної маси. Під час її проведення у пацієнтки виникла різка слабість, запоморочення, пропасниця, сильний біль за грудиною та в поперековій ділянці, одноразове блювання. Об'єктивно спостерігається: тахікардія до 120/хв, АТ знизвся до 80/60 мм рт. ст. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

- a. Гемотрансфузійний шок
- b. Цирратний шок
- c. Анафілактичний шок
- d. Гостра серцево-судинна недостатність
- e. Гостра ниркова недостатність

Правильна відповідь: Гемотрансфузійний шок

Питання 140

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого на 5-й день хвороби спостерігаються гіперемія та набряк мигдаликів, щільні білі плівчасті нашарування, які не знімаються, набряк підшкірної клітковини шиї, загальний ціаноз шкіри, температура тіла - 38,8°C, задишка до 50/хв., шумне дихання, афонія, тахікардія - 140/хв., пульс не визначається, свідомість на рівні сопору. Який лікувальний захід показаний у першу чергу?

- a. Введення серцевих глікозидів
- b. Штучне дихання рот-до-рота
- c. Непрямий масаж серця
- d. Трахеостомія
- e. Парові лужні інгаляції

Правильна відповідь: Трахеостомія

Питання 141

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У лікарню доставлено хворого з цукровим діабетом в анамнезі, пацієнт скаржиться на спрагу, виражену загальну слабкість, блювання, біль по всьому животі, що розвинулися після алкогольно-харчового експресу. При обстеженні: шкіра суха, тургор знижений, пульс - 120/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., тахіпное, запах ацетону з рота. Які обстеження необхідно виконати у першу чергу?

- a. Кислотно-лужний баланс
- b. Аналіз сечі на цукор
- c. Ультразвукове обстеження черевної порожнини
- d. Аналіз сечі на аміазу
- e. Аналіз крові на цукор

Правильна відповідь: Аналіз крові на цукор

Питання 142

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіку віком 48 років було звільнено з-під уламків будівлі. У постраждалого об'єктивно спостерігається: слабкість, тахікардія, різкий біль під час пальпації кісток таза, неможливість підняти кінцівки від підлоги. Попередній діагноз: перелом кісток таза. Який вид транспортування треба використати у цьому разі?

- a. У положенні лежачи на животі
- b. На жорстких ношах в положенні Волковича
- c. На жорстких ношах з приведеними ногами
- d. У положенні сидячі
- e. На ношах у напівсидячому положенні

Правильна відповідь: На жорстких ношах в положенні Волковича

Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час роботи на одному з блоків АЕС один із працівників через необережність порувши техніку безпеки, унаслідок чого він протягом 35 хвилин перебував у зоні радіоактивного опромінення. Показники індивідуального дозиметра --- 1,0 Гр. Потерпілий скарг не має. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви та видимі слизові оболонки звичайного кольору, пульс --- 84/хв, АТ --- 138/82 мм рт. ст., живіт під час пальпації м'який, неболючий. Який лікувально-профілактичний захід треба провести стосовно цього працівника?

- a. Призначити антибактеріальну терапію
- b. Профілактичного лікування не потребує
- c. Призначити цистамін
- d. Призначити унітіол
- e. Призначити препарати йоду

Правильна відповідь: Призначити цистамін

Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У підлітка 15-ти років під час забору крові спостерігалася раптова короткочасна втрата свідомості зі спонтанним відновленням стану. Під час огляду помірна блідість шкірних покривів, виражений гіпергідроз кінцівок, частота дихання - 20/хв., тони серця звучні, ритмічні, частота серцевих скорочень - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Який невідкладний стан розвинувся у дитини?

- a. Повна AV-блокада
- b. Епілептичний напад
- c. Синкопе
- d. Психогенна атака
- e. Гіпоглікемічний стан

Правильна відповідь: Синкопе

Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 1,5 року з ознаками гострої респіраторної інфекції ввечері з'явилася інспіраторна задишка, "гавкаючий" кашель, захриплість голосу. Під час огляду: дихання стенотичне, інспіраторна задуха за участю допоміжної дихальної мускулатури, втягування поступливих ділянок грудної клітки. При аускультації дихання у легенях дифузно ослаблене. Тахікардія, випадання пульсової хвилі на вдиху.

Поставте діагноз:

- a. Дифтерійний круп
- b. Обструктивний бронхіт
- c. Пневмонія
- d. Вірусний круп
- e. Стороннє тіло дихальних шляхів

Правильна відповідь: Вірусний круп

Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 21-го року надійшла в ургентному порядку після удару тупим предметом у живіт. Стан важкий, свідомість порушена. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. Пульс - 110/хв., слабкого наповнення. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Якою буде тактика лікування?

- a. КТ черевної порожнини і таза з контрастом
- b. Реанімаційні заходи і динамічне спостереження
- c. Інфузійна терапія і лапароцентез
- d. Переливання крові й оглядова рентгеноскопія черевної порожнини
- e. Протишокові заходи і термінова лапаротомія

Правильна відповідь: Протишокові заходи і термінова лапаротомія

Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 54-х років знайдений зимио вранці на вулиці. Скарги на пекучий біль, свербіння і "розпирання" пальців ніг. Об'єктивно: відчувається сильний запах алкоголю з роту, хворий агресивний, ступні набряклі, на фоні побілілої шкіри є червоно-фіолетові плями, декілька пухирів, наповнених світлою рідиною. Встановіть діагноз:

- a. Синдром позиційного здавлення ступні
- b. Відмороження I ст.
- c. Гострий тромбоз підколінної артерії
- d. Відмороження III ст.
- e. Відмороження II ст.

Правильна відповідь: Відмороження II ст.

Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпілий 64-х років був вилучений із під уламків зруйнованої будівлі через 8 годин. При об'єктивному обстеженні виявлено синдром тривалого розчавлювання лівої кінцівки, ішемія III ступеню. Який об'єм першої медичної допомоги?

- a. Невідкладна госпіталізація
- b. Звільнення кінцівок, охолодження, іммобілізація
- c. Знеболювання, іммобілізація, введення антибіотиків
- d. Бинтування кінцівок, охолодження, іммобілізація
- e. Накладання джгута, знеболювання, іммобілізація

Правильна відповідь: Накладання джгута, знеболювання, іммобілізація

Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Військовослужбовець унаслідок вибухової хвилі отримав сильний удар грудьми об кам'яну брилу. Об'єктивно спостерігається: у постраждалого ціаноз обличчя, акроцианоз, тахіпnoе до 40/хв., роздуті шийні вени, АТ - 65/40 мм рт. ст., тони серця глухі. Який попередній дiагноз?

- a. Гострий респіраторний дистрес-синдром
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Напружений пневмоторакс
- d. Тампонада серця
- e. Гемоторакс

Правильна відповідь: Тампонада серця

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Новонароджений дитині з важкою асфіксією під час народження проведено первинну реанімацію в пологовому залі. Після стабілізації стану дитину перевели до відділення інтенсивної терапії та розпочали моніторинг лабораторних досліджень. Які з наведених нижче лабораторних показників потребують корегування?

- a. Рівень загального кальцію 2,1 ммол/л
- b. Рівень натрію 140 ммоль/л
- c. Рівень глюкози в крові 2,5 ммол/л
- d. Рівень глюкози в крові 5,5 ммол/л
- e. Рівень калію 5,0 ммоль/л

Правильна відповідь: Рівень глюкози в крові 2,5 ммол/л

◀ Крок 3 Фармація (вітчизняні UA)

Перейти до...

Крок 3 Стоматологія 2022 ►

[Інформаційна сторінка](#) / Мої курси / [KROK / KROK](#) / [Крок 3 / Krok 3](#) / [Крок 3 Загальна лікарська підготовка 2022](#)

Розпочато середа 2 листопад 2022 10:43

Стан Завершено

Завершено середа 2 листопад 2022 10:45

Витрачено часу 1 хв 49 сек

Балів 0/150

Оцінка 0 з можливих 10 (0%)

Питання 1

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 14-ти років з феохромоцитомою розвинувся гіпертензивний криз. Який з перерахованих медикаментів є препаратом вибору для лікування гіпертонічного кризу при феохромоцитомі?

- a. Есмолол
- b. Атенолол
- c. Гідралазін
- d. Ніфедипін
- e. Фентоламін

Правильна відповідь: Фентоламін

Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хлопчика 9-ти років після перенесеної ГВВІ з'явилися полідипсія, поліурія, слабкість, нудота. При обстеженні: свідомість потьмарена, шкіра суха, очні яблука м'які, дихання Куссмауля, запах ацетону з рота, серцеві тони глухі, живіт м'який, неболючий. Глюкоза крові - 19 ммоль/л. Які цукрознижувальні препарати слід призначити в комплексній терапії?

- a. Інсулін середньої дії
- b. Інсулін короткої дії
- c. Інсулін пролонгований
- d. Бігуаніди
- e. Препарати сульфонілсечовини

Правильна відповідь: Інсулін короткої дії

Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого через 48 годин після застілля, де він їв в'ялену рибу, з'явилися слабкість у м'язах, порушення зору, сухість у роті, порушення дихання. Куди треба госпіталізувати хворого?

- a. Неврологічне відділення
- b. Терапевтичне відділення
- c. Очне відділення
- d. ВРІТ інфекційної лікарні
- e. Ревматологічне відділення

Правильна відповідь: ВРІТ інфекційної лікарні

Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У роділлі 18-ти років з крупним плодом через 12 годин від початку пологової діяльності виникли ознаки клінічно вузького тазу, у зв'язку з чим прийнято рішення про розрідження шляхом кесаревого рогину. При укладанні жінки на операційний стіл у положенні лежачі на спині раптово стан її погіршився: з'явилися скарги на задишку, нудоту, шкіра стала блідою з мармуровим малюнком.

Артеріальний тиск - 70/50 мм рт.ст. При повертанні жінки на лівий бік стан її покращився. Ваш діагноз:

- a. Тромбоемболія легеневої артерії
- b. Емболія навколоплідними водами
- c. Передчасне відшарування плаценти
- d. Розрив матки
- e. Синдром нижньої порожнистої вени

Правильна відповідь: Синдром нижньої порожнистої вени

Питання 5

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 65 років за 20 хв після ураження електричним струмом скаржиться на перебої в роботі серця. Об'єктивно встановлено: ціаноз видимих слизових оболонок. Частота дихання --- 20/хв. Тони серця приглушенні, аритмічні, частота серцевих скорочень --- 152/хв. АТ --- 100/70 мм рт. ст. До якого відділення треба госпіталізувати цього пацієнта?

- a. Інфарктного відділення
- b. Терапевтичного відділення
- c. Кардіологічного відділення
- d. Реанімаційного відділення
- e. Неврологічного відділення

Правильна відповідь: Реанімаційного відділення

Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 32-х років страждає на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки протягом 6-ти років. Годину назад після їжі з'явився раптово різкий біль в епігастральній області. Загальний стан важкий, стогне від болю в животі. Живіт різко напруженій, болісний у всіх відділах, черевна стінка відстає в акті дихання. При пальпації печінка на 1 см нижче реберної дуги. При перкусії визначається відсутність печінкової тупості. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Перфоративна виразка
- b. Гостра кишкова непрохідність
- c. Гострий холецистит
- d. Гострий панкреатит
- e. Цироз печінки

Правильна відповідь: Перфоративна виразка

Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До лікарні госпіталізовано чоловіка у непрітомному стані. Об'єктивно спостерігається: самостійне дихання відсутнє, шкіра блідо-цианотична, тони серця ледь вислуховуються. Який захід надання медичної допомоги є невідкладним у цьому разі?

- a. Уведення мезатону
- b. Електрокардіографія
- c. Уведення дихальних анопептиків
- d. Уведення атропіну
- e. Штучна вентиляція легенів

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легенів

Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої дитини на 4-й день життя з'явилися кривава блювота до 3- 4 разів на день, випорожнення темнокоричневого кольору до 4-5 разів на добу, кровотеча з пупкової ранки, петехіально-плямистий висип на тулубі та кінцівках. Який діагноз найімовірніший?

- a. Пологова травма
- b. Синдром проковтнутої материнської крові
- c. Геморагічна хвороба новонароджених
- d. Вада розвитку шлунково-кишкового тракту
- e. Гемолітична хвороба новонароджених

Правильна відповідь: Геморагічна хвороба новонароджених

Питання 9

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 27-ми років відзначає виділення з неприємним запахом зі статевих шляхів, біль в нижній частині живота, підвищення температури. Вищезазначені скарги з'явилися 2 дні тому. В анамнезі: тиждень тому жінці було виконано хірургічне переривання вагітності у терміні 8 тижнів. Огляд у дзеркалах: шийка матки чиста, з зовнішнього вічка виділення з неприємним запахом. Вагінальне дослідження: матка в антелефлексіо, рухлива, болюча, дещо збільшена. Додатки без особливостей. Поставте діагноз:

- a. Сальпінгоофорит
- b. Апендицит
- c. Ентероколіт
- d. Післяabortний ендометрит
- e. Гостре респіраторне захворювання

Правильна відповідь: Післяabortний ендометрит

Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дитина народилася з такими показниками крові: Hb --- 100 г/л, еритроцити --- $2,3 \cdot 10^{12}/\text{л}$, Ht --- 0,25. З анамнезу відомо, що у матері дитини під час пологів виникло передчасне відшарування нормально розташованої плаценти з крововтратою до 1,5 л. З лікувальною метою новонародженній дитині призначено гемотрансфузію. Який компонент крові потрібно використати у цій ситуації для зменшення ризику ускладнень?

- a. Відміті еритроцити
- b. Цільну кров
- c. Свіжозаморожену плазму
- d. Концентрат протромбінового комплексу
- e. Кріопреципітат

Правильна відповідь: Відміті еритроцити

Питання 11

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У роділлі 36-ти років, яка перебуває в кінці I періоду пологів з великим плодом, з'явилися потуги при високому розташуванні голівки плода, відсутність поступального руху голівки, позитивний симптом Генкеля-Вастена, симптоми вдавлення сечового міхура. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Слабкість пологової діяльності
- b. Анатомічно вузький таз
- c. Дискоординована пологова діяльність
- d. Фізіологічний I період пологів
- e. Клінічно вузький таз

Правильна відповідь: Клінічно вузький таз

Питання 12

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнтки 8 місяців назад відбулися II термінові пологи, без ускладнень. З метою контрацепції використовує метод лактаційної аменореї. Менструації після пологів не було. Останні дні зауважила збільшення об'єму живота, відчуття "пе- реливів" у череві. Який імовірний діагноз?

- a. Повторна маткова вагітність
- b. Позаматкова вагітність
- c. Асцит нез'ясованої етіології
- d. Пухлина черевної порожнини
- e. Пухлина молочної залози з метастазами у черевну порожнину

Правильна відповідь: Повторна маткова вагітність

Питання 13

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженого у перші дні життя з'явилася прогресивна дихальна недостатність, задишка, напади ціанозу доходять до задишково-ціанотичного кризу, тахікардія. Органи середостіння зміщені в правий бік, перкуторно зліва тимпаніт, аускультивно дихання відсутнє. На рентгенограмі: посилення прозорості легеневого малюнка зліва. Яка вада розвитку у новонародженого?

- a. Вроджена лівостороння часткова емфізема легень
- b. Лівостороння діафрагмова грижа
- c. Напружене кіста лівої легені
- d. Аплазія легені
- e. Напруженій пневмоторакс

Правильна відповідь: Вроджена лівостороння часткова емфізема легень

Питання 14

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дівчину віком 21 рік без свідомості госпіталізовано до лікарні. Хворіє на хронічну наднірникову недостатність. Протягом декількох годин з'явився біль у животі, акроціаноз, знизвися АТ до 70/50 мм рт. ст., втратила свідомість. Результати лабораторного дослідження: калій крові --- 7,2 ммол/л, глюкоза крові --- 2,0 ммол/л. На ЕКГ спостерігається: високі загострені зубці Т, подовження інтервалу S-T та розширення комплексу QRS. Який імовірний діагноз?

- a. Гіпертонічний криз
- b. Гіpopітуїтарна кома
- c. Аддісонічний криз
- d. Гіперглікемічна кома
- e. Гіперацидотична кома

Правильна відповідь: Аддісонічний криз



Питання 15

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 46 років із діагнозом: Q-інфаркт міокарда через 2 години після початку захворювання та проведення фібринолітичної терапії раптово знепритомнів, посинів, з'явилися судоми. Об'єктивно спостерігається: пульс та АТ не визначаються, на моніторі велика кількість альтернуочих хвиль подібних до QRS-комплексів. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- a. Ідіовентрикулярний ритм
- b. Фібриляція шлуночків
- c. Гостра кровотеча
- d. Фібриляція передсердъ
- e. Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія

Правильна відповідь: Фібриляція шлуночків

Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дівчина віком 19 років, під час забору крові для аналізу, раптово відчула загальну слабкість, запаморочення, сильне серцевиття, короткочасно втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, виражений гіпергідроз, АТ --- 100/60 мм рт. ст., пульс --- 98/хв, слабкого наповнення. Судом не було, рефлекси збережені, патологічні рефлекси відсутні. Який імовірний діагноз?

- a. Епілептичний напад
- b. Непритомність
- c. Ортостатична гіпотензія
- d. Транзиторна ішемічна атака
- e. Геморагічний інсульт

Правильна відповідь: Непритомність

Питання 17

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 32 роки, який госпіталізований до лікарні з діагнозом: лептоспіроз, розвинувся септичний шок. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкіри і слизових, центральний венозний тиск --- 20 мм вод. ст., артеріальний тиск --- 80/40 мм рт. ст. Які лікарські засоби з наведених нижче треба додати до інтенсивної терапії?

- a. Вазодилататори
- b. Діуретики
- c. Гепарин
- d. Симпатоміметики
- e. Аналгетики

Правильна відповідь: Симпатоміметики

Питання 18

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 25 із 80 відпочивальників у санаторії протягом доби виникло гостре кишкове захворювання, нез'ясованої етіології. Пацієнти харчувалися у різні зміни, страви обирали згідно з меню. Водопостачання у санаторії централізоване. Який шлях передачі найбільш імовірний при даному спалаху?

- a. Харчовий
- b. Контактно- побутовий
- c. Ґрунтовий
- d. Водний
- e. Артифіціальний

Правильна відповідь: Харчовий



Питання 19

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 38-ми років надійшла у відділення у тяжкому стані. Скаржиться на дифузний біль в животі, нудоту, часте блювання, різку загальну слабкість, запаморочення. Об'єктивно: свідомість потьмарена. Виражене схуднення. Шкіра темного кольору (інтенсивного засмагу), більше на обличчі, шиї, тильної поверхні кисті. На слизовій порожнини рота - аспідно-сірі плями. Пульс - 60/хв., малий ниткоподібний. Артеріальний тиск - 70/30 мм рт.ст. Живіт бере участь в акті дихання, м'який, при пальпації помірно болючий, більше в епігастральній ділянці. Набряки відсутні. Лабораторно: глюкоза крові - 3,0 ммоль/л, натрій крові - 128 ммоль/л, калій крові - 6,1 ммоль/л. Який патологічний стан виник у хворої?

- a. Гострий холецистит
- b. Інфаркт міокарда
- c. Тромбоз мезентеріальних судин
- d. Гострий панкреатит
- e. Аддісонічний криз

Правильна відповідь: Аддісонічний криз

Питання 20

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Прaporщик 38-ми років звернувся в медичний пункт з приводу колотої рани стопи, в минулому двічі вакцинований і ревакцинований у плановому порядку проти правцю 8 років тому. Вкажіть тактику щодо специфічної профілактики правцю:

- a. Ввести АКДП вакцину
- b. Ввести АДП-м анатоксин
- c. Ввести АП-анатоксин
- d. Ввести протиправцевий імуноглобулін
- e. Ввести протидифтерійний анатоксин

Правильна відповідь: Ввести АП-анатоксин



Питання 21

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 25-ти років відчула себе погано в приміщені аптеки. Стоїть, спираючись на підвіконня з фіксованим плечовим поясом. Об'єктивно: обличчя одутле, вдих короткий, видих подовжений, частота дихання - 22/хв., частота серцевих скорочень - 100/хв., артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст., над легенями при перкусії коробковий відтінок перкуторного звуку. При аускультації - дихання везикулярне, жорстке, сухі, свистячі хрипи, більше на видиху. Cor - акцент II тону над легеневою артерією. Живіт без особливостей. Попередній діагноз:

- a. Бронхіальна астма
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Гострий ларинготрахеїт
- d. ХОЗЛ
- e. Трахеобронхіальна дискінезія

Правильна відповідь: Бронхіальна астма

Питання 22

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної в 34 тижні під час доплерографічного ультразвукового обстеження виявили стійкий реверсивний діастолічний кровоплин у судинах плода й провели кесарів розтин. У новонародженого відсутні дихання і м'язовий тонус. Вентиляція мішком і маскою не забезпечує адекватні рухи грудної клітки і, після наступних 20 секунд вентиляції, частота серцевих скорочень не збільшується. Який наступний етап реанімації?

- a. Інтубація трахеї немовляти
- b. Введення адреналіну
- c. Введення натрію бікарбонату
- d. Введення атропіну
- e. Припинити надавати допомогу

Правильна відповідь: Інтубація трахеї немовляти



Питання 23

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час лекції один зі студентів став збудженим, кричав, що за ним стежать незнайомці, хочуть його убити, благав про допомогу. Викладач зі студентами намагалися його заспокоїти, але на їх слова він не реагував. До якого відділення треба госпіталізувати пацієнта?

- a. Психосоматичного відділення
- b. Реанімаційного відділення
- c. Терапевтичного відділення
- d. Психіатричного відділення
- e. Неврологічного відділення

Правильна відповідь: Психіатричного відділення

Питання 24

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 56 років раптово виник дзвін у вухах, що супроводжувався нудотою, блюванням, <<миготінням мушок>> і потемнінням в очах. Об'єктивно спостерігається: АТ --- 210/100 мм рт. ст., пульс --- 62/хв. Встановлено діагноз: неускладнена гіпертензивна криза. Який лікарський засіб треба використати у цьому разі?

- a. Метопролол
- b. Аміодарон
- c. Еналаприлат
- d. Верапаміл
- e. Резерпін

Правильна відповідь: Еналаприлат



Питання 25

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 49-ти років на прийомі у сімейного лікаря втратила свідомість. Під час огляду непрітомна, пульс на сонних артеріях не визначається, дихання поверхневе. Розпочато реанімаційні процедури. Як слід розташувати долоні під час проведення зовнішнього масажу серця?

- a. На межі верхньої та середньої третин груднини
- b. На мечоподібному відростку
- c. На верхній третині груднини
- d. На руків'ї груднини
- e. На межі середньої та нижньої третин груднини

Правильна відповідь: На межі середньої та нижньої третин груднини

Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У шестимісячної дитини спостерігається блювання до 10 разів та рідкі випорожнення 12--15 разів. Лікарем-педіатром об'єктивно встановлено: дитина млява, адінамічна, шкірні покриви бліді з <<мармуровим>> малюнком, симптом <<білої плями>> упродовж 5 секунд. Тургор тканин знижений, велике джерельце та очні яблука запалі, сліз немає. ЧСС --- 180/хв, артеріальний тиск --- 60/40 мм рт. ст. Які лікарські заходи треба провести дитині насамперед?

- a. Інфузію 10-20% розчину глукози в/в
- b. Антибактеріальну терапію
- c. Інфузію розчину \$NaCl\$ 0,9% в/в
- d. Інфузію реополіглюкіну або неогемодезу в/в
- e. Оральну регідратаційну терапію

Правильна відповідь: Інфузію розчину \$NaCl\$ 0,9% в/в



Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіку віком 30 років, який отримав ураження електричним струмом, проводився комплекс реанімаційних заходів, у результаті чого було відновлено і стабілізовано центральну гемодинаміку і ефективне самостійне дихання, але свідомість не відновилася. Який метод протиішемічного захисту головного мозку найефективніший у цьому разі?

- a. Уведення оксибутирату натрію внутрішньовенно
- b. Уведення тіопенталу натрію внутрішньовено
- c. Краніоцеребральна гіпотермія
- d. Гіпервентиляція за допомогою апарату ШВЛ
- e. Уведення діазепаму внутрішньовенно

Правильна відповідь: Краніоцеребральна гіпотермія

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 24 роки госпіталізована до лікарні. Скаржиться на біль унізу живота з іrrадіацією в задній прохід, слабкість та запаморочення. Остання менструація була 2 місяці тому. Об'єктивно встановлено: шкіра бліда, АТ --- 60/40 мм рт. ст., пульс --- 110/хв., температура тіла --- 36,6 $^{\circ}$ C. Живіт напружений, різко болючий, більше з лівого боку, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Який попередній діагноз ?

- a. Позаматкова вагітність
- b. Кишкова непрохідність
- c. Гострий апендицит
- d. Апоплексія яєчника
- e. Гострий сальпінгоофорит

Правильна відповідь: Позаматкова вагітність



Питання 29

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 46 років, у якого в анамнезі є виразкова хвороба шлунку, за годину після приймання їжі з'явився біль в епігастрії, а через декілька годин на фоні загальної слабкості виникла одноразова блювота типу <<кавової гущі>>. Пацієнт викликав екстрену (швидку) медичну допомогу. Об'єктивно спостерігається: пацієнт у свідомості, гемодинаміка стабільна. Якими будуть подальші дії лікаря екстременої (швидкої) медичної допомоги?

- a. Транспортувати пацієнта до хірургічного відділення
- b. Рекомендувати планове амбулаторне обстеження
- c. Призначити знеболюючі та протиблювотні засоби
- d. Призначити дезінтоксикаційну терапію
- e. Призначити консультацію гастроентеролога

Правильна відповідь: Транспортувати пацієнта до хірургічного відділення

Питання 30

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта віком 30 років на ЕКГ зафіксована фібриляція шлуночків. Проведено три безрезультатні спроби відновити серцевий ритм за допомогою електричної дефібриляції. Скільки разів поспіль дозволяється проводити дефібриляцію одному пацієнту?

- a. Проводити протягом години
- b. Не більше ніж 3--5 розрядів
- c. Поки на ЕКГ реєструється асистолія
- d. Не більше ніж 10 розрядів
- e. Поки на ЕКГ реєструється фібриляція

Правильна відповідь: Поки на ЕКГ реєструється фібриляція

Питання 31

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До лікарні госпіталізована пацієнта віком 35 років із безсимптомною макрогематурією. Урологічну патологію заперечує, гематурія розвинулася вперше. Яке інструментальне дослідження треба провести найперше?

- a. Цистоскопію
- b. Комп'ютерну томографію органів сечової системи
- c. Ультразвукове дослідження органів сечової системи
- d. Катетеризацію сечового міхура
- e. Цистографію

Правильна відповідь: Ультразвукове дослідження органів сечової системи

Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 22-х років через 30 хвилин після нанесення мазі на руку з'явилося шкірне свербіння, гіперемія, потім численні уртикарні висипи. Ваш діагноз:

- a. Гостра крапивниця
- b. Короста
- c. Атопічний дерматит
- d. Нейродерміт
- e. Токсикодермія

Правильна відповідь: Гостра крапивниця

Питання 33

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хлопець віком 15 років хворіє на цукровий діабет упродовж 10-ти років. Протягом останнього тижня у нього діагностовано ентероколіт, скаржився на слабкість та часте сечовипускання. Сьогодні з'явилися галюцинації, олігурія. Пацієнт втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: судомі, шкіра і слизові оболонки сухі, бліді, язик сухий, тургор тканин різко знижений, гіпertonus м'язів. Виявляються менінгеальні симптоми, очні яблука м'які, з рота запаху ацетона немає. Дихання часте, поверхневе. Тони серця глухі до 110/хв, AT --- 80/40 мм рт. ст, живіт м'який. Яку невідкладну терапію треба провести пацієнту?

- a. Інсулінотерапію методом малих доз, регідратацію (в/в краплинне введення 5%-го розчину глюкози)
- b. Інсулінотерапію методом малих доз, регідратацію (в/в краплинне введення 0,9%-го розчину хлориду натрію)
- c. Регідратацію (в/в краплинне введення 5%-го розчину глюкози), антибактеріальну терапію
- d. Інсулінотерапію методом малих доз, регідратацію (в/в краплинне введення 1,8%-го розчину хлориду натрію)
- e. Інсулінотерапію методом малих доз, призначити глюкокортикоїди

Правильна відповідь: Інсулінотерапію методом малих доз, регідратацію (в/в краплинне введення 0,9%-го розчину хлориду натрію)

Питання 34

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта на 17-й день лихоманки з'явилися дъогтеподібні випорожнення. Під час огляду спостерігається: шкірні покриви бліді, температура тіла --- 37,3^oC, пульс --- 118/хв, АТ --- 90/60 мм рт. ст. Коричневий наліт на язиці, живіт помірно роздутий, безболісний, гепатосplenомегалія. Яке ймовірно ускладнення розвинулося у пацієнта?

- a. Шлунково-кишкова кровотеча
- b. Перфорація кишок
- c. Дисбіоз кишечника
- d. Активація ендогенної флори
- e. Тромбоз мезентеріальних судин

Правильна відповідь: Шлунково-кишкова кровотеча

Питання 35

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 9-ти років, хворої на черевний тиф, на 18-ту добу хвороби з'явилися слабкість, блідість шкіри та слизових оболонок, холодний піт, тахікардія, артеріальний тиск - 80/20 мм рт.ст. Через 12 годин з'явилися чорні випорожнення. З чим може бути пов'язане погіршення стану?

- a. Гострим апендицитом
- b. Перфорацією кишечнику
- c. Перитонітом
- d. Кишковою кровотечею
- e. Кишечною суперінфекцією

Правильна відповідь: Кишковою кровотечею



Питання 36

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 48-ми років, працівник хімічної лабораторії доставлений в лікарню зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, головний біль, заплітання язика при розмові, блювання, кашель, дертя в горлі, кровотечу з носа, часте болісне сечовипускання. Об'єктивно: шкіра сіро-синього кольору, судоми м'язів. Кров шоколадно-бура, вміст MtHb у крові - 60%, еритроцити з тільцями Гейнца- Ерліха - 25%. В сечі: протеїнурія, макрогематуруя. Ваш попередній діагноз:

- a. Інтоксикація сірковуглецем
- b. Інтоксикація тетраетилсвинцем
- c. Інтоксикація марганцем
- d. Інтоксикація аміносполуками бензолу
- e. Інтоксикація ртуттю

Правильна відповідь: Інтоксикація аміносполуками бензолу

Питання 37

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка у терміні вагітності 39 тижнів перестала відчувати рухи плода, з'явилися болі в животі та значно підвищився АТ. З анамнезу відомо що пацієнта хворіє на гіпертонічну хворобу. Пологова діяльність бурхлива. Передбачувана маса плода --- 4000,0 г. Під час акушерського обстеження спостерігається: матка в гіпертонусі, у ділянці дна пальпуються болюче вип'ячування, голівка плода в порожнині малого тазу. Серцевиття плода не вислуховується, на УЗД не виявляється. Визначте тактику ведення пологів.

- a. Кесарів розтин
- b. Накладання акушерських щипців
- c. Пологопідсилення
- d. Вакуум-екстракція плода
- e. Плодоруйнівна операція

Правильна відповідь: Плодоруйнівна операція

Питання 38

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої від III вагітності дитини група крові --- B(III) Rh(+), у матері дитини --- O(I) Rh(--). На другу добу життя дитина адynamічна, рефлекси пригнічені, шкіра і видимі слизові оболонки жовтого кольору. Лабораторно виявлено: загальний білірубін --- 450 мкмоль/л, прямий --- 10 мкмоль/л, темп зростання білірубіну --- 9 мкмоль/л/год. Який метод терапії найефективніший у цьому разі?

- a. Фототерапія
- b. Плазмаферез
- c. Імунотерапія
- d. Інфузійна терапія
- e. Замінне переливання крові

Правильна відповідь: Замінне переливання крові

Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 45-ти років страждає на хронічну надніркову недостатність внаслідок туберкульозу наднірників. Під час відпочинку після тривалого перебування на сонці у нього посилилася загальна слабкість, тахікардія досягла 150/хв., артеріальний тиск знизився до 70/20 мм рт.ст., з'явилися олігурія, адynamія, нудота, блювання, біль у животі, депресія. Який діагноз найбільш імовірний у даного хворого?

- a. Сонячний удар
- b. Гостра печінкова недостатність
- c. Гостра наднірникова недостатність
- d. Гостра серцева недостатність
- e. Гостра ниркова недостатність

Правильна відповідь: Гостра наднірникова недостатність



Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 49-ти років під час тривалої роботи на присадибній ділянці втратив свідомість. Зі слів родичів хворіє на цукровий діабет близько 2-х років, отримує глібенкламід 20 мг на добу. Об'єктивно: шкіра волога, тонус м'язів кінцівок підвищений. Пульс - 98/хв., ритмічний. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Дихання - 20/хв., ритмічне. Вогнищової симптоматики не виявлено. Яке ускладнення розвинулось у хвогою?

- a. Лактацидоз
- b. Гостре порушення мозкового кровообігу
- c. Кетоацидоз
- d. Гіпоглікемія
- e. Синкопе

Правильна відповідь: Гіпоглікемія

Питання 41

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 46-ти років виведена з вогнища пожежі. Бригада екстреної медичної допомоги діагностувала термічні опіки верхніх дихальних шляхів. З чого необхідно розпочати невідкладну допомогу?

- a. Серцево-легеневої реанімації
- b. Аналгезії наркотичними аналгетиками
- c. Довенного введення 2,4% розчину еуфіліну
- d. Інгаляції 100% киснем через лицьову маску
- e. Інгаляції сальбутамолу (вентоліну)

Правильна відповідь: Інгаляції 100% киснем через лицьову маску



Питання 42

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У лісі знайдено молодого чоловіка в тяжкому стані. Об'єктивно: хворий перебуває в коматозному стані, дихання Чейн-Стокса, шкіра гаряча на дотик, волога, відзначаються судоми тетанічного характеру. На лівій гомілці 4 точкові ранки, по краях яких геморагічний набряк. Що спричинило розвиток невідкладного стану?

- a. Епілептичний напад
- b. Укус гадюки
- c. Укус бджоли
- d. Діабетична кома
- e. Правець

Правильна відповідь: Укус гадюки

Питання 43

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт 32-х років звернувся до лікаря зі скаргами на нездужання, підвищення температури тіла до 38°C, періодичний біль у надчревній ділянці, нудоту й блювання. На другий день погіршився зір, неможливо стало читати газету, з'явився туман та сітка перед очима. Об'єктивно: двобічний птоз, анізокорія, ністагм, погіршення ковтання. За два дні до цього вживав рибні консерви. У хворого є підозра на ботулізм. Основним напрямком у лікуванні є призначення:

- a. Серцевих глікозитів
- b. Церебральної пункції
- c. Левоміцетину в дозі 0,5 г 4 рази на добу
- d. Сольових розчинів
- e. Протиботулінічної антитоксичної сироватки

Правильна відповідь: Протиботулінічної антитоксичної сироватки



Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка похилого віку раптово знепритомніла на вулиці. Випадково опинившись поряд через одну хвилину, лікар-лаборант констатував зупинку серця. Які дії лікаря повинні бути першочерговими?

- a. Забезпечити прохідність дихальних шляхів
- b. Завдати прекардіального удару
- c. Викликати швидку допомогу
- d. Почати непрямий масаж серця
- e. Покласти під язик таблетку нітрогліцерину

Правильна відповідь: Почати непрямий масаж серця

Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої дитини виник гострий респіраторний дистрес-синдром. Який лікарський препарат в першу чергу потрібно вводити?

- a. Дофамін
- b. Маніт
- c. Теофілін
- d. Строфантин
- e. Сурфактант

Правильна відповідь: Сурфактант

Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Підліток 14-ти років перебуває на диспансерному обліку з приводу артеріальної гіпертензії. Після емоційного стресу у хворого розвинувся гіпертензивний криз. Артеріальний тиск - 170/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 50/хв. Який медикаментозний засіб ви призначите?

- a. Дигоксин
- b. Кордіамін
- c. Панангін
- d. Корвітол
- e. Каптоприл

Правильна відповідь: Каптоприл

Питання 47

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Постраждалий віком 19 років у непримітному стані госпіталізований з місця ДТП. Об'єктивно встановлено: свідомість відсутня, у відповідь на бальові подразники мимовільно з'являється тонічне напруження м'язів із випростовуванням рук і ніг та закиданням голови назад, двосторонні стопні патологічні рефлекси. Дихання <<машинне>>, пульс --- 110/хв, артеріальний тиск --- 160/100 мм рт. ст., температура тіла --- 37,9\$^{\circ}\text{C}. Встановіть попередній діагноз.

- a. Забій головного мозку важкого ступеня
- b. Внутрішньочерепна гематома
- c. Аневризма судин головного мозку
- d. Менінгіт
- e. Гостре порушення мозкового кровообігу

Правильна відповідь: Забій головного мозку важкого ступеня

Питання 48

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Військовослужбовець віком 30 років на радіоактивно забрудненій території отримав одноразову дозу випромінювання 15 Гр. Скаржиться на стискаючий головний біль, підвищена температура тіла, нудоту, дворазове блювання. Яка клінічна форма гострої променевої хвороби розвивається у потерпілого?

- a. Церебральна
- b. Кістковомозкова, тяжкого ступеня
- c. Кишкова
- d. Судинно-токсемічна
- e. Кістковомозкова, середнього ступеня тяжкості

Правильна відповідь: Кишкова

Питання 49

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 34 роки госпіталізований до стаціонару у тяжкому стані. У результаті клініко-лабораторних досліджень встановлено: фруктовий запах із рота, гіпотензія, дегідратація, електролітні порушення, гіперглікемія, кетонурія. Визначте ймовірний діагноз у пацієнта.

- a. Гіперосмолярний гіперглікемічний синдром
- b. Гостра надніркова недостатність
- c. Діабетичний кетоацидоз
- d. Нецукровий діабет
- e. Синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону

Правильна відповідь: Діабетичний кетоацидоз

Питання 50

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіку віком 83 роки ампутували нижню кінцівку на рівні стегна з приводу діабетичної стопи. За добу після оперативного втручання стан хворого почав раптово прогресивно погіршуватися. Порушилася свідомість, виникло часте поверхневе дихання, помірне оглушення, хворий став блідим, з'явився холодний піт. На ЕКГ спостерігається: суправентрикулярна тахікардія з ЧСС --- 188/хв, блокада правої ніжки пучка Гіssa, ознаки перенапруження правого шлуночка. Хірург припустив ТЕЛА і викликав реаніматолога. На момент огляду реаніматологом пацієнта на ЕКГ спостерігається: ізолінія, свідомість на рівні коми, пульс на магістральних судинах відсутній, дихання відсутнє. Які найперші дії має виконати реаніматолог?

- a. Непрямий масаж серця
- b. В/в уведення метопрололу
- c. Оксигенотерапію
- d. В/в введення гепарину
- e. Електричну дефібриляцію

Правильна відповідь: Непрямий масаж серця



Питання 51

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого з ГРВІ нарстають явища гострої дихальної недостатності, наявний біль в лівій половині грудної клітки, що посилюється на висоті вдоху. При аускультації виявлено ослаблення дихання ліворуч. Рентгенологічно: масивне затемнення аж до рівня III ребра, що було розцінено як ексудативний плеврит. З чого варто розпочати лікувальні заходи?

- a. Симптоматична + антибактеріальна терапія
- b. Пункція плевральної порожнини в II міжребер'ї по середньоключичної лінії
- c. Антибактеріальна + дегідратаційна терапія, за неефективності - пункція і дренування плевральної порожнини
- d. Дренування лівої плевральної порожнини в V-VI міжребер'ї по середній паховій лінії
- e. Пункція плевральної порожнини в VII-VIII міжребер'ї по задній аксилярній лінії

Правильна відповідь: Пункція плевральної порожнини в VII-VIII міжребер'ї по задній аксилярній лінії

Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 48 років постраждав від ураження блискавкою. Під час огляду у пацієнта спостерігається: збудження, дезорієнтація, періодичні судоми. Артеріальний тиск --- 140/90 мм рт.ст., пульс --- 120/хв, дихання аритмічне. Які лікарські засоби треба призначити пацієнту терміново?

- a. Седативні
- b. Серцеві глюкозиди
- c. Глюкокортикоїди
- d. Теофілін
- e. Адреналін

Правильна відповідь: Седативні



Питання 53

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 54-х років з приводу відсутності пульсу на сонних артеріях і дихання вже протягом 10 хвилин бригадою екстреної медичної допомоги (ЕМД) проводяться реанімаційні заходи: зовнішній масаж серця, штучне дихання мішком Амбу, введення адреналіну, дефібриляція. Стан залишається без змін. З якою частотою і на яку глибину має здійснюватися компресія грудної клітки?

- a. 140/хв. та 4-5 см
- b. 90-100/хв. та 4-5 см
- c. 100-120/хв. та 5-6 см
- d. 60-80/хв. та 4-5 см
- e. 100-120/хв. та 3-4 см

Правильна відповідь: 100-120/хв. та 5-6 см

Питання 54

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У реанімаційне відділення доставлений хлопчик 10-ти років з гострим отруєнням свинцем. Млявий, шкіра бліда, артеріальний тиск - 110/55 мм рт.ст., ендогенний креатинін - 1,098 ммол/л, сечовина - 20,8 ммол/л, калій плазми - 7,9 ммол/л, діурез - 200 мл/добу. Що слід призначити першочергово?

- a. Ентеросгель
- b. Активоване вугілля
- c. Хелатоутворювачі
- d. Плазмаферез
- e. Лазикс

Правильна відповідь: Хелатоутворювачі

Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Який лікарський засіб треба використати для надання невідкладної допомоги шестирічному хлопчику із гострою крововтратою до 20% ОЦК?

- a. Цільну кров
- b. Свіжозаморожену плазму
- c. 0,9% розчин хлориду натрію
- d. Розчин глюкози
- e. Неогемодез

Правильна відповідь: 0,9% розчин хлориду натрію

Питання 56

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 70-річного пацієнта скарги на біль в правій поперековій ділянці з іrrадіацією в статеві органи, часте болюче сечовипускання, підвищення температури тіла до 38,3°C, лихоманку, блювання. Аналіз сечі: реакція кисла, лейкоцитів більше 110, еритроцитів - 48 в полі зору, сеча каламутна, бурого кольору. Ультрасонографічно виявлено нерівномірно виражені зміни паренхіми, значне розширення миски правої нирки. Попередній діагноз:

- a. Сечокам'яна хвороба
- b. Сечно-сольовий діатез. Абсцес нирки
- c. Загострення хронічного піелонефриту
- d. Карбункул нирки. Гострий гнійний паранефрит
- e. Сосочковий некроз

Правильна відповідь: Сечокам'яна хвороба

Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У п'ятимісячного хлопчика після першого введення прикорму з'явився гострий передимоподібний біль у животі, блювота, затримка випорожнень. При ректальному дослідженні - кров "стигла вишня". Ваш діагноз:

- a. Гострий холецистит
- b. Кишкова інвагінація
- c. Пухлина черевної порожнини
- d. Глистна інвазія
- e. Внутрішня грижа

Правильна відповідь: Кишкова інвагінація

Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальне відділення лікарні доставлено вагітну жінку (38 тижнів) з клінікою гострого ілеофеморального тромбозу. Який із вказаних симптомів найбільше відповідає даному захворюванню?

- a. Гектична температура
- b. Набряк стегна і гомілки
- c. Біль у паховій ділянці
- d. Набряк гомілки
- e. Нудота і блювання

Правильна відповідь: Набряк стегна і гомілки

Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На 5-ту добу після проведення штучного аборту в терміні 8-9 тижнів vagітності у жінки з'явився озноб, біль внизу живота, підвищення температури тіла до 39°C, гнійні виділення з піхви. Яке ускладнення проведеної операції можна припустити?

- a. Ендометрит
- b. Гематометра
- c. Сальпінгоофорит
- d. Колпіт
- e. Субінволюція матки

Правильна відповідь: Ендометрит

Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 45-ти років скаржиться на появу протягом двох тижнів випорожнень кров'ю більш ніж 12 разів на добу, болю в животі, суглобах; болючі висипи у порожнині рота та нижніх кінцівках, набряк колінних та гомілковостопних суглобів, слабкість, підвищення температури тіла понад 39°C, втрату ваги тіла. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Реактивний артрит
- b. Рак прямої кишки
- c. Ревматоїдний артрит
- d. Гемороїдальна кровотеча
- e. Неспецифічний виразковий коліт

Правильна відповідь: Неспецифічний виразковий коліт

Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт кардіологічного відділення віком 54 роки з діагнозом: дилатаційна кардіоміопатія, серцева недостатність II-Б ст, функціональний клас III у коридорі раптово знепритомнів та перестав дихати. Постова медсестра негайно викликала лікаря, який діагностував клінічну смерть. Яка тактика лікаря насамперед?

- a. Провести ЕКГ дослідження
- b. Розпочати заходи легенево-серцевої реанімації
- c. Виконати дефібриляцію
- d. Провести УЗД серця
- e. Провести прекардіальний удар

Правильна відповідь: Розпочати заходи легенево-серцевої реанімації

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 19-ти років надійшла на 4-й день хвороби. У пацієнтки блювання, різка слабкість, сонливість, виражена жовтяниця. Через добу хвора не орієнтується в часі, свідомість потьмарена, періодичне психомоторне збудження. Зменшилися розміри печінки. Яке ускладнення зумовило таку клінічну картину?

- a. Механічна жовтяниця
- b. Гостра печінкова недостатність
- c. Гостра надніркова недостатність
- d. Гіповолемічний шок
- e. Гостра печінкова колька

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чотирирічної дитини, яка випила 10 таблеток парацетамолу, з'явилися нудота, шум у вухах, порушення зору, слабкість, ціаноз. Який препарат лікар має призначити у цьому разі?

- a. Кордіамін
- b. Тіотриазолін
- c. Адреналін
- d. Ацетилцистеїн
- e. Унітіол

Правильна відповідь: Ацетилцистеїн

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 59 років раптово на вулиці втратив свідомість. Діагностовані ознаки клінічної смерті. З чого треба починати реанімаційні заходи?

- a. Виконання потрійного прийому Сафара
- b. Уведення атропіну та адреналіну
- c. Виконання конікотомії
- d. Виконання зовнішнього масажу серця
- e. Уведення аміодарону чи лідокаїну

Правильна відповідь: Виконання потрійного прийому Сафара

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнт, який хворіє на гемофілію А, отримав травму, що ускладнилася кровотечею. Які невідкладні заходи треба застосувати?

- a. Увести амінокапронову кислоту
- b. Увести антикоагулянти прямої дії
- c. Перелити еритроцитарну масу
- d. Увести етамзилат натрію
- e. Увести в/в кріопреципітат або препарати рекомбінантного фактору VIII

Правильна відповідь: Увести в/в кріопреципітат або препарати рекомбінантного фактору VIII

Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта на прийомі у сімейного лікаря розвинувся напад генералізованих тоніко-клонічних судом. Які найперші дії лікаря у цьому разі?

- a. Покласти пацієнта в положення по Тренделенбургу
- b. Покласти пацієнта на спину з піднятим головним кінцем
- c. Увести розчин діазепаму внутрішньовенно
- d. Увести розчин дімедролу внутрішньом'язово
- e. Ужити заходів для попередження травматизації пацієнта

Правильна відповідь: Ужити заходів для попередження травматизації пацієнта

Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 68-ми років виникла зупинка серця. Після інтубації і зовнішнього масажу серця у хворого з'явився пульс, артеріальний тиск - 40/0 мм рт.ст. Яке лікування буде оптимальним?

- a. Серцеві глікозиди
- b. Призначення альбуспін
- c. Інфузія сольових розчинів
- d. Інфузія допаміну
- e. Призначення еуфіліну

Правильна відповідь: Інфузія допаміну

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 59-ти років більше 2-х років тому діагностована гіпертензія. Систематично не лікувався. Впродовж тижня відзначає погіршення самопочуття: з'явився сильний головний біль, який супроводжувався нудотою, серцебиттям, болем колючого характеру в ділянці серця. Вночі гостро виникла важка задишка інспіраторного характеру, що супроводжувалась кашлем з виділенням великої кількості вологого харкотиння, серцебиття. При огляді: акроціаноз. Частота серцевих скорочень - 120/хв. Тони серця - глухі, тахікардія. Артеріальний тиск - 240/105 мм рт.ст. В легенях на тлі ослабленого везикулярного дихання вислуховується велика кількість вологих ріznокаліберних хрипів. Ваш попередній діагноз:

- a. Гіпертензивний криз, ускладнений гострою серцевою недостатністю
- b. Гіпертензивний криз, ускладнений гострою гіпертензивною енцефалопатією
- c. Симпатоадреналовий криз
- d. Неускладнений кардіальний криз
- e. Вагоінсулярний криз

Правильна відповідь: Гіпертензивний криз, ускладнений гострою серцевою недостатністю

Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У медичну роту 14-ї механізованої бригади з району ведення бойових дій аеропорту Донецьк надійшло 12 поранених. Сортувальна бригада виконує медичне сортuvання поранених. Яким принципом повинен керуватися медичний персонал під час проведення медичного сортuvання?

- a. Розподілом поранених та хворих на групи згідно з евакuaційним призначенням
- b. Розподілом поранених та хворих на групи для направлення їх у функціональні підрозділи
- c. Єдиною класифікацією хвороб і травм та єдиними вимогами до методики сортuvання
- d. Встановленням черговості надання медичної допомоги
- e. Визначенням характеру поранення, встановленням черговості надання медичної допомоги

Правильна відповідь: Єдиною класифікацією хвороб і травм та єдиними вимогами до методики сортuvання



Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка на 5-ту добу після оперативного втручання виникли симптоми тромбоемболії легеневої артерії, що спричинило раптову коронарну смерть. Який препарат треба було призначати пацієнту для профілактики цього ускладнення?

- a. Антиферментні засоби
- b. Дезагреганти
- c. Тромболітики
- d. Вазотоніки
- e. Низькомолекулярні гепарини

Правильна відповідь: Низькомолекулярні гепарини

Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дворічного хлопчика, який хворіє на тетраду Фалло, раптово збільшилася інтенсивність ціанозу, з'явилася задишка, він присів навпочіпки. Що з наведеного нижче має призначити лікар у цьому разі?

- a. Антибіотики
- b. Оксигенотерапію
- c. Серцеві глікозиди
- d. Сечогінні
- e. Бронхолітики

Правильна відповідь: Оксигенотерапію

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Повторновагітна 28-ми років в терміні 36 тижнів госпіталізована у відділення патології вагітності зі скаргами на головний біль, підвищення тиску до 160/110 мм рт.ст. та значні набряки кінцівок, живота, обличчя. В сечі: білок - 1,3 г/л та циліндри. В анамнезі: гіпертонічна хвороба та хронічний піелонефрит. На тлі інтенсивної терапії стан вагітної погіршився, з'явилися порушення зору та утруднене носове дихання. Білок зріс до 2,6 г/л, а тиск піднявся до 170/120 мм рт.ст. Яка тактика лікаря?

- a. Проведення інтенсивної терапії та пролонгування вагітності
- b. Термінове розродження - кесарів розтин
- c. Індукувати пологи і 2-й період виключити акушерськими щипцями
- d. Індукувати пологи та провести розродження через природні половові шляхи
- e. Інтенсивна гіпотензивна, діуретична та седативна терапія

Правильна відповідь: Термінове розродження - кесарів розтин

Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки віком 27 років діагностовано позагоспітальну пневмонію. В анамнезі --- цукровий діабет I типу. Отримувала 36 ОД інсуліну на добу. За 2 дні значно посилилися слабкість, полідипсія, поліурія, з'явилися нудота, блювання. Об'єктивно спостерігається: шкіра суха, тургор її знижений, очні яблука м'які, запах ацетону в повітрі, що видихається, пульс --- 112/х, АТ --- 95/55 мм рт. ст. Які дослідження треба провести насамперед?

- a. Аналіз крові на вміст глюкози та аналіз сечі на кетонові тіла
- b. Аналіз крові на креатинін і сечовину
- c. Аналіз крові на вміст електролітів
- d. Аналіз крові на вміст заліза та кальцію
- e. Аналіз крові на вміст білірубіну і його фракцій

Правильна відповідь: Аналіз крові на вміст глюкози та аналіз сечі на кетонові тіла

Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки 29-ти років вдома відбулися стрімкі II пологи у терміні 36 тижнів вагітності. Народився живий хлопчик масою 2300,0 г. Лікар швидкої допомоги, який був викликаний, при огляді породіллі зазначив, що послід не виділився (після народження дитини пройшло 40 хвилин). Ознак кровотечі немає. Яку допомогу повинен надати лікар швидкої допомоги?

- a. Негайно транспортувати жінку до полового відділення III рівня
- b. Негайно транспортувати жінку до полового відділення II рівня
- c. Негайно транспортувати жінку і дитину до найближчого полового відділення
- d. Провести ручне віddілення посліду
- e. Ввести в/в 10 ОД окситоцину і дочекатися виділення посліду

Правильна відповідь: Негайно транспортувати жінку і дитину до найближчого полового відділення

Питання 75

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 9-ти місяців з важкою формою дизентерії Флекслера на фоні гіпертермії та діареї з'явилися блювання та судоми. Чим викликано погіршення стану дитини?

- a. Травмою голови
- b. Нейротоксикозом
- c. Токсикозом з ексикозом
- d. Приєднанням менінгіту
- e. Пухлиною мозку

Правильна відповідь: Нейротоксикозом

Питання 76

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Першовагітна 22-х років, термін вагітності 8 тижнів, скаржиться на рясні кров'янисті виділення зі статевих шляхів та біль внизу живота передимоподібного характеру. При піхвовому дослідженні: матка збільшена відповідно до 8 тижнів вагітності, шийка матки вкорочена, цервікальний канал вільно пропускає 1 палець і в ньому визначається плодовий міхур та частини плодового яйця; виділення рясні кров'янисті. Яка тактика лікаря?

- a. Вишкрібання порожнини матки
- b. Спостереження за вагітною
- c. Кольпоскопія
- d. Призначення препаратів, що пролонгують вагітність
- e. Ультразвукове дослідження

Правильна відповідь: Вишкрібання порожнини матки



Питання 77

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіка віком 74 роки госпіталізовано годину тому з приводу діабетичної флегмони гомілки. Раптово під час транспортування у коридорі хірургічного відділення пацієнт втратив свідомість. Черговий лікар констатував клінічну смерть. Яку маніпуляцію треба провести найперше для надання невідкладної допомоги?

- a. Прекардіальний удар
- b. Штучне дихання "рот до рота"
- c. Непрямий масаж серця
- d. Підключення ЕКГ-монітора
- e. Підключення дефібрилятора

Правильна відповідь: Непрямий масаж серця

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 72 роки унаслідок фібриляції шлуночків настала зупинка кровообігу. Проводиться комплекс елементарної серцево-легеневої реанімації (зовнішній масаж серця та штучна вентиляція легень). Тричі проведена дефібриляція, яка виявилася неефективною. Яку медикаментозну терапію треба провести?

- a. Увести в/в адреналін
- b. Увести в/в натрію гідрокарбонат
- c. Увести в/в дофамін
- d. Увести в/в атропін
- e. Увести в/в магнія сульфат

Правильна відповідь: Увести в/в адреналін



Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 30-ти років відзначає кров'янисті виділення із статевих шляхів протягом 2-х тижнів. В анамнезі: 2 тижні тому жінці було виконано хірургічне переривання вагітності у терміні 8 тижнів. Огляд у дзеркалах: шийка матки чиста, з зовнішнього вічка помірні кров'янисті виділення. Вагінальне дослідження: матка в антелефлексіо, рухлива, безболісна, трохи збільшена. Додатки без особливостей.

Ваш діагноз:

- a. Післяabortний ендометрит
- b. Гіперменорея
- c. Порушення менструального циклу
- d. Загроза аборту
- e. Неповний аборт

Правильна відповідь: Неповний аборт

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнка 14-ти років надійшла у приймальне відділення у стані геморагічного шоку. При обстеженні діагностовано позаматкову вагітність з розривом маткової труби та внутрішньою кровотечею. Об'єктивно: загальмована, шкірні покриви сухі, бліді та холодні, артеріальний тиск - 70/20 мм рт.ст., пульс - 132/хв. Сеча (з катетеру) відсутня. Контакт з батьками дівчини неможливий. Пациєнта категорично відмовляється від операції. Кому з юридичної точки зору належить право прийняття рішення щодо проведення операції в цьому випадку?

- a. Виключно батькам
- b. Судовим органам
- c. Консиліуму лікарів
- d. Виключно пацієнтці
- e. Пацієнтці за згодою її батьків

Правильна відповідь: Консиліуму лікарів



Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 40-ка років, який 3 дні тому повернувся з Індії, раптово з'явилися озноб, жар, сильний головний біль, запаморочення, неспокій, надмірна рухливість, гіперемія обличчя і кон'юнктиви. Язык сухий, вкритий білим нальотом, петехіальний висип. В паховій ділянці справа з'явився сильний біль, у тому ж місці незабаром утворився бубон. У гемограмі: значний нейтрофільний лейкоцитоз, збільшення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). Ваш попередній діагноз:

- a. Сибірка
- b. Туляремія
- c. Псевдотуберкульоз
- d. Чума
- e. Пахвинний фурункул

Правильна відповідь: Чума

Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При проведенні реанімаційних заходів дитині 5-ти років із зупинкою кровообігу у позалікарняних умовах було інтубовано трахею, але венозний доступ відсутній. Який лікувальний засіб може бути введено ендотрахеально?

- a. Адреналін
- b. Хлорид кальцію
- c. Бретиліум
- d. Гідрокарбонат натрію
- e. Трісамін

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини, хворої на бронхіальну астму, після катетеризації правої підключичної вени різко погіршилося самопочуття: збуджена, акроціаноз при огляді, задишка. Артеріальний тиск підвищений. Тони серця ритмічні, приглушенні. Над легенями - різко ослаблене дихання з боку пункциї. Перкуторно - тимпаніт справа. Який Ваш діагноз?

- a. Кардіогенний шок
- b. Напруженій пневмоторакс з боку пункциї
- c. Астматичний статус
- d. Повітряна емболія легеневої артерії
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

Правильна відповідь: Напруженій пневмоторакс з боку пункциї

Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У першовагітної 27-ми років вагітність 39-40 тижнів, положення плоду поздовжнє, голівка притиснута до площини входу в малий таз. Розміри тазу 23-26-29-18. Перейми болючі, тривалість 10 годин, навколо пілдні води відійшли 2 години тому, роділля неспокійна. Серцебиття плоду ритмічне, 160/хв. При зовнішньому акушерському обстеженні встановлено: кон- тракційне кільце розташоване косо, знаходиться вище пупа, ознака Вастена позитивна, матка в нижньому сегменті різко болюча, круглі зв'язки матки напружені. Про яку патологію слід думати?

- a. Передчасне відшарування плаенти
- b. Слабкість полового діяльності
- c. Загроза розриву матки
- d. Розрив матки, що відбувся
- e. Дискоординована полкова діяльність

Правильна відповідь: Загроза розриву матки



Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Після повернення із зони АТО військовослужбовець звернувся до лікаря зі скаргами на постійне безсоння, відчуття немотивованої пильності, епізоди "напливу жахливих спогадів", "відчуття провини за те, що вижив". Зазначені порушення є:

- a. Біполярним розладом
- b. Нейроциркуляторною астенією
- c. Бойовою психічною травмою
- d. Великим депресивним розладом
- e. Неврозом нав'язливих станів

Правильна відповідь: Бойовою психічною травмою

Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 36 років, який хворіє на цукровий діабет, після вживання алкоголю втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: шкіра на дотик волога, тепла, АТ --- 145/90 мм рт. ст., судомні посмікування м'язів, поодинокі тонічні та клонічні судоми. Дихання поверхневе, тонус очних яблук збережений, зіниці розширені, гіперрефлексія. Яка наймовірніша причина такого стану пацієнта?

- a. Лактацидоз
- b. Порушення мозкового кровообігу
- c. Гіперглікемія
- d. Гіпоглікемія
- e. Кетоацидоз

Правильна відповідь: Гіпоглікемія

Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка, який перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу гострого інфаркту міокарда і отримує гепарин у дозі 5000 Од підшкірно 4 рази на добу, з'явилися різка слабість, блідість, випорожнення чорного кольору. Гемоглобін --- 96 г/л. Що треба застосувати для нейтралізації дії гепарину?

- a. Амінокапронову кислоту
- b. Кальцію хлорид
- c. Апротинін
- d. Свіжозаморожену плазму
- e. Протаміну сульфат

Правильна відповідь: Протаміну сульфат

Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік, який хворіє на хронічний алкоголізм, скаржиться на появу вираженого болю в епігастрії. Об'єктивно спостерігається: АТ --- 125/75 мм рт. ст, пульс --- 92/хв, ритмічний. В аналізі сечі: альфа-амілаза --- 1024 Од. Попередній діагноз: хронічний панкреатит у стадії загострення. До якого відділення треба госпіталізувати чоловіка?

- a. Реанімаційного відділення
- b. Наркологічного відділення
- c. Психіатричного відділення
- d. Хірургічного відділення
- e. Терапевтичного відділення

Правильна відповідь: Хірургічного відділення

Питання 89

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До пологового відділення госпіталізовано жінку віком 30 років у терміні вагітності 35 тижнів. Зі слів родичів, вдома у неї тричі виникали судомні напади. Протягом останніх двох днів скаржилася на головний біль, набряки нижніх кінцівок. Об'єктивно спостерігається: свідомість відсутня, ціаноз шкірних покривів, пульс --- 90/хв., напружений, АТ --- 185/120 мм рт. ст. Яке захворювання розвинулося у пацієнтки?

- a. Нефропатія
- b. Інсульт
- c. Еклампсія
- d. Прееклампсія
- e. Епілепсія

Правильна відповідь: Еклампсія

Питання 90

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У десятимісячної дитини із діагнозом: септичний шок розвинувся геморагічний синдром (кровотеча з місць ін'єкцій, по шлунковому зонду надходить <<кавова гуща>>). Під час визначення показників гемостазу виявлено підвищення міжнародного нормалізаційного відношення, АЧТЧ, рівня D-димеру, а також зниження фібриногену та тромбоцитів. Діагностовано ДВЗ-синдром. Що насамперед треба призначити дитині для корекції гемостазу?

- a. Вітамін K
- b. Хлорид кальцію
- c. Дезагреганти
- d. Свіжозаморожену плазму
- e. Етамзилат натрію

Правильна відповідь: Свіжозаморожену плазму

Питання 91

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час об'єктивного обстеження новонародженої дитини на 10-ій хвилині життя виявлено, що слизові оболонки, губи та шкіра тулуба синього кольору, ЧСС --- 100/хв, крик голосний, спостерігається незначна флексія кінцівок. Оберіть найдоцільнішу лікувальну тактику.

- a. Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- b. ШВЛ
- c. Непрямий масаж серця
- d. Киснева терапія
- e. Інтубація трахеї

Правильна відповідь: Киснева терапія

Питання 92

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час роботи на одному з блоків АЕС один із працівників через необережність порувив техніку безпеки, унаслідок чого він протягом 35 хвилин перебував у зоні радіоактивного опромінення. Показники індивідуального дозиметра --- 1,0 Гр. Потерпілий скарг не має. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви та видимі слизові оболонки звичайного кольору, пульс --- 84/хв, AT --- 138/82 мм рт. ст., живіт під час пальпації м'який, неболючий. Який лікувально-профілактичний захід треба провести стосовно цього працівника?

- a. Призначити антибактеріальну терапію
- b. Призначити цистамін
- c. Профілактичного лікування не потребує
- d. Призначити препарати йоду
- e. Призначити унітіол

Правильна відповідь: Призначити цистамін

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При роботі на хімкомбінаті у зв'язку з порушенням герметичності газопроводу виник вихід газу, хімічний склад якого спочатку був невідомий. Враховуючи характер виробництва, це могли бути пари азотної, сірчаної кислот, бензолу, нітробензолу, окисів азоту. Через 3 години після перебування в забрудненому приміщенні у робітника з'явився головний біль, головокружіння, тахікардія, задишка, ціаноз губ і рук. Об'єктивно: шкіра і слизові оболонки сіро-синього забарвлення, печінка збільшена, в крові - ретикулоцитоз 40%. Наявністю якої сполуки в крові зумовлене забарвлення шкіри?

- a. Карбоксигемоглобін
- b. Карбемоглобін
- c. Відновлений гемоглобін
- d. Метгемоглобін
- e. Оксигемоглобін

Правильна відповідь: Метгемоглобін



Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Військовослужбовець віком 35 років унаслідок обстрілу артилерією був привалений деревом. Скаржиться на біль у ділянці таза, найменші рухи посилюють біль, гемодинаміка субкомпенсирована. Об'єктивно спостерігається: деформація тазового кільца зі зміщенням лівої половини таза догори, синець у ділянці калитки і промежини. Під час спроби стиснення крил клубових кісток таза біль різко посилюється. Яке ушкодження найімовірніше?

- a. Ушкодження таза з порушенням безперервності переднього та заднього півкільца
- b. Ушкодження таза з порушенням безперервності заднього півкільца
- c. Двобічний перелом крил клубових кісток
- d. Множинні переломи кісток таза
- e. Ушкодження таза з порушенням безперервності переднього півкільца

Правильна відповідь: Ушкодження таза з порушенням безперервності переднього та заднього півкільца

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У шестимісячної дитини на тлі ГРВІ швидко наростає млявість, адінамія, "гавкаючий" кашель, тахіпное, інспіраторна задишка, акроціаноз, парадоксальне шумне дихання із напруженням м'язів черевної стінки, короткочасні апноє, тахікардія. Аускультивно над легенями вислуховується жорстке ослаблене дихання, крепітациі в нижніх відділах. Якій тактиці треба надати перевагу для стабілізації функції зовнішнього дихання?

- a. Інтубація трахеї
- b. Ультразвукова інгаляція гідрокарбонатом натрію
- c. Установлення повітровода
- d. Установлення ларингеальної маски
- e. Дренажний масаж

Правильна відповідь: Інтубація трахеї

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Мати хворої дитини віком 9 місяців скаржиться на підвищення температури тіла до 39оС, кашель, утруднення дихання протягом 3-х діб. Об'єктивно: блідість шкіри та слизових оболонок, ціаноз носогубного трикутника. Над легенями з обох боків вислуховуються дрібнопухирчасті хрипи. Яке найбільш інформативне інструментальне обстеження слід призначити хворому?

- a. Рентгенографія органів грудної клітки
- b. Гострофазові показники
- c. Протеїнограма
- d. Клінічний аналіз крові
- e. Бактеріологічне дослідження харкотиння

Правильна відповідь: Рентгенографія органів грудної клітки

Питання 97

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 42 роки прооперована з приводу дифузного токсичного зоба. За місяць у неї спостерігаються періодичні судомні напади м'язів кінцівок, які супроводжуються онімінням обличчя. Результати аналізу крові такі: Hb --- 112 г/л, лейкоцити --- $4,8 \cdot 10^9 / \text{л}$, ШОЕ --- 10 мм/год, калій --- 4,2 ммоль/л, загальний кальцій --- 1,7 ммоль/л, глюкоза --- 4,1 ммоль/л. Що потрібно призначити пацієнтці для усунення нападів судом?

- a. Кальцію хлорид в/в
- b. Магнію сульфат в/в
- c. Нітрогліцерин в/в
- d. Ніфедипін сублінгвально
- e. Діазепам в/в або в/м

Правильна відповідь: Кальцію хлорид в/в



Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 46 років, після емоційного навантаження, раптово відчула сильний біль за грудиною та втратила свідомість. Об'єктивно встановлено: тони сердця відсутні, апное, АТ та пульс не визначається. На ЕКГ спостерігається: хвилі різної висоти та ширини, неоднакової форми. Який із наведених нижче заходів буде найбільш ефективним у цьому разі?

- a. Дігоксін в/с
- b. Страфантин в/с
- c. Електрична дефібриляція
- d. Атропін в/с
- e. Адреналін в/с

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпілого 40-ка років, працівника атомної електростанції (АЕС), доставлено у лікарню через 2 доби після техногенної аварії, де він отримав опромінення у дозі 15 Гр. Скарги на слабкість, адynamію, діарею, головний біль, напади болю в животі. Виражена гіперемія шкіри, гіпертермія 38,4°C. Яка причина вказаного стану хворого?

- a. Церебральна форма променевої хвороби
- b. Кишкова токсикоінфекція
- c. Кістково-мозкова форма променевої хвороби
- d. Кишкова форма променевої хвороби
- e. Токсемічна форма променевої хвороби

Правильна відповідь: Кишкова форма променевої хвороби



Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнта віком 56 років госпіталізовано до лікарні. Скаржиться на сухий кашель, холодний піт, задишку, що посилюється в положенні лежачи. Об'єктивно спостерігається: частота дихання --- 30/хв, артеріальний тиск --- 180/100 мм рт. ст., Аускультивно виявляються: глухі серцеві тони, акцент II тону над легеневою артерією, ритм галопу, над легенями вислуховується жорстке дихання, в нижніх відділах сухі та вологі дрібнопухирцеві хрипи. Який попередній діагноз?

- a. Астматичний статус
- b. Гіпертензивний криз неускладений
- c. Набряк легень
- d. Тромбоемболія легеневої артерії
- e. Ішемічна кардіоміопатія

Правильна відповідь: Набряк легень

Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час бойових дій при наданні медичної допомоги для визначення черговості її надання виникає потреба в сортуванні потерпілих. Для проведення сортування поранених та хворих в медичній роті механізованої бригади розгортається:

- a. Аптека
- b. Сортувальна площа
- c. Операційно-перев'язувальне відділення
- d. Госпітальне відділення
- e. Евакуаційне відділення

Правильна відповідь: Сортувальна площа

Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Після падіння з опором на праве плече потерпілий скаржиться на біль, обмеження рухів, деформацію в ділянці плечового суглоба. Яких заходів на цьому етапі надання допомоги необхідно вжити?

- a. Накладення гіпової пов'язки
- b. Транспортна іммобілізація, знеболення
- c. Накладення шини Крамера від пальців до плечового суглоба
- d. Накладення шини Дітеріхса
- e. Блокада місця перелому

Правильна відповідь: Транспортна іммобілізація, знеболення

Питання 103

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта віком 18 років під час лікування з приводу бактеріального ендокардиту раптово на фоні емоційного напруження розвинувся генералізований судомний напад. Після нападу в неврологічному статусі визначалися: центральний параліч VII, XII пар черепних нервів, геміанестезія та центральний параліч праворуч. Який імовірний діагноз у пацієнта?

- a. Генералізований епілептичний напад
- b. Лакунарний інсульт
- c. Субарахноїдальний крововилив
- d. Гемодинамічний інсульт
- e. Кардіоемболічний інсульт

Правильна відповідь: Кардіоемболічний інсульт

Питання 104

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнт віком 50 років із гіпертензивною кризою під час транспортування до стаціонару спеціалізованою кардіологічною бригадою раптово втратив свідомість. На кардіомоніторі спостерігається великохвильова фібриляція шлуночків. Що повинен зробити лікар насамперед?

- a. Виконати прямий масаж серця
- b. Виконати дефібриляцію
- c. Провести інтубацію трахеї та штучну вентиляцію легень
- d. Увести внутрішньосерцево адреналін
- e. Установити тимчасовий кардіостимулятор

Правильна відповідь: Виконати дефібриляцію



Питання 105

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки віком 25 років за 40 хвилин після прийому оксациліну з'явилися захриплість голосу, <<гавкаючий>> кашель, утрудненість дихання із задишкою інспіраторного характеру, задуха. Об'єктивно встановлено: пацієнта неспокійна, метушива. Дихання шумне, стридорознє. Обличчя цianотичне. Аускультивно вислуховуються поодинокі розсіяні сухі свистячі хрипи. Який найімовірніший діагноз?

- a. Напад бронхіальної астми
- b. Паратонзиллярний абсцес
- c. Гострий набряк Квінке
- d. Гострий фарингіт
- e. Стороннє тіло в трахеї

Правильна відповідь: Гострий набряк Квінке

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінку віком 74 роки госпіталізовано до приймального відділення з діагнозом: повторне гостре порушення мозкового кровообігу в правій гемісфері, лівобічний геміпарез. Із анамнезу відомо, що пацієнта перенесла геморагічний інсульт. Пацієнта неконтактна, не розмовляє, очі розплющають тільки коли відчуває біль, моторна реакція на біль - у вигляді флексії кінцівок. Оцініть стан свідомості у пацієнтки за шкалою ком Глазго.

- a. Сопор (9--12 балів)
- b. Оглушення (13--14 балів)
- c. Смерть мозку (3 бали)
- d. Ясна свідомість (15 балів)
- e. Кома (8 балів)

Правильна відповідь: Кома (8 балів)

Питання 107

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пораненого в ділянку черепа спостерігається біль у грудях, кровохаркання, кашель, задишка. Температура тіла - 37,0°C. При обстеженні: дихання в легенях ослаблено, хрипів немає. При рентгенологічному дослідженні виявляються множинні дрібні тіні в обох легенях. Яка причина виявлених змін?

- a. Пневмоторакс
- b. Гемоперикард
- c. Гемоторакс
- d. Аспіраційна пневмонія
- e. Крововилив у легені

Правильна відповідь: Крововилив у легені

Питання 108

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого з менінгококовою інфекцією, синдромом Уотерхауса-Фрідеріксена в приймальному відділенні виникла зупинка дихання, артеріальний тиск вимірюти не вдається, ЧСС- 58/хв. Які невідкладні дії лікаря приймального відділення?

- a. Вентиляція мішком Амбу
- b. Введення кордіаміну
- c. Введення адреналіну
- d. Термінова трахеостомія
- e. Введення великих доз глюкокортикоїдів

Правильна відповідь: Вентиляція мішком Амбу



Питання 109

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У лікарню доставлено хворого з цукровим діабетом в анамнезі, пацієнт скаржиться на спрагу, виражену загальну слабкість, блювання, біль по всьому животі, що розвинулися після алкогольно-харчового ексцесу. При обстеженні: шкіра суха, тургор знижений, пульс - 120/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., тахіпне, запах ацетону з рота. Які обстеження необхідно виконати у першу чергу?

- a. Кислотно-лужний баланс
- b. Аналіз сечі на цукор
- c. Аналіз крові на цукор
- d. Аналіз сечі на аміазу
- e. Ультразвукове обстеження черевної порожнини

Правильна відповідь: Аналіз крові на цукор

Питання 110

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 49-ти років надійшов зі скаргами на біль за грудиною стискального характеру, який з'явився після фізичного навантаження, іrrадіює в ліве плече. Пацієнт самостійно приймав нітрогліцерин, проте стан суттєво не змінився (за 30 хвилин). Об'єктивно: частота серцевих скорочень - 94/хв., пульс ритмічний, артеріальний тиск - 115/70 мм рт.ст. На ЕКГ: підйом сегменту ST у лівих відведеннях. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Тромбоемболія легеневої артерії
- b. Розшарувальна аневризма аорти
- c. Гострий міокардит
- d. Спонтанний пневмоторакс
- e. Гострий коронарний синдром

Правильна відповідь: Гострий коронарний синдром

Питання 111

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У повторновагітної 28-ми років, з прееклампсією середнього ступеня важкості, при вагітності 32 тижні, з'явилася жовтяниця та ознаки загальної інтоксикації. Лабораторно: гіпокоагуляція - тромбоцити - 80-109/л, ПДФ+++ , загальний білірубін - 90 ммоль/л (прямий - 25 ммоль/л, непрямий - 65 ммоль/л), АлАТ- 3,5 ммоль//л·кг·год, АсАТ- 2,6 ммоль//л·кг·год. Яке ускладнення виникло у вагітності?

- a. HELLP-синдром
- b. Гостра жирова дистрофія печінки
- c. Вірусний гепатит
- d. Синдром Жильбера
- e. Синдром Бадда-Кіарі

Правильна відповідь: HELLP-синдром

Питання 112

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 62-х років під час операції з приводу видалення пухлини лівої легені під загальним комбінованим знеболенням з однолегеневою інтубацією раптово наступила зупинка роботи серця. Які дії лікаря є оптимальними?

- a. Введення міорелаксантів
- b. Проведення закритого масажу серця
- c. Проведення дефібриляції
- d. Проведення відкритого масажу серця
- e. Екстубація хворого

Правильна відповідь: Проведення відкритого масажу серця

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Визначте причину порушення функції нирок під час застосування норадреналіну.

- a. Ураження канальців
- b. Спазм артерій і вен мозкового шару нирок
- c. Причина ураження нирок не зрозуміла
- d. Токсична дія на мозковий шар нирок
- e. Ураження кіркового шару нирок

Правильна відповідь: Спазм артерій і вен мозкового шару нирок

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки 32-х років стан після операції кесаревого розтину. На третю добу відзначено збільшення в об'ємі лівої нижньої кінцівки, появу болю за ходом глибоких вен гомілки і гіперемія шкіри. Температура тіла - 37,8°C . Яких заходів необхідно вжити після операції для профілактики глибокого венозного тромбозу?

- a. Озонотерапія
- b. Введення фраксипарину
- c. Лікування цитостатиками
- d. Лікування антибіотиками
- e. Лікування утеротонічними препаратами

Правильна відповідь: Введення фраксипарину

Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час бою солдата відкинуто вибухом на спину. Доставлений на МПБ через 2 години. Турбує задишка, біль у грудях. Пульс - 130/хв., АТ- 100/70 мм рт.ст., ЧД- 14/хв. При огляді по середньо-ключичній лінії справа, на рівні IV ребра - рвана рана 2x3 см, з якої виділяється цівкою ала кров. Яку першу лікарську допомогу слід надати пораненому?

- a. Невідкладна торакотомія
- b. Проведення ПХО рани
- c. Пальцеве притискання рани
- d. Тампонада рани
- e. Проведення гемостатичної терапії

Правильна відповідь: Тампонада рани



Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хлопчика 11-ти років гостро з'явилися головний біль, втрата свідомості. При обстеженні: свідомість потьмарена, артеріальний тиск - 130/85 мм рт.ст., ригідність м'язів потилиці, температура - 38,2°C. Яке діагностичне дослідження необхідно провести дитині першочергово?

- a. Комп'ютерна томографія (КТ) головного мозку
- b. Визначення лейкоцитів та швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) у крові
- c. Рентгенографія черепа
- d. Електроенцефалографія
- e. Люмбальна пункція

Правильна відповідь: Люмбальна пункція

Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Восьмимісячна дитина, якій встановлено діагноз: вроджена вада серця (тетрада Фалло), раптом стала неспокійною, посилився ціаноз, прискорилося дихання. Аускультивно в легенях --- без особливостей, ЧД --- 48/хв., ЧСС --- 144/хв, пульс ритмічний. Яка причина погіршення стану у дитини?

- a. Колапс
- b. Задишково-цианотичний напад
- c. Емболія
- d. Гостра коронарна недостатність
- e. Непритомність

Правильна відповідь: Задишково-цианотичний напад

Питання 118

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнтки віком 33 роки внаслідок розриву аневризми мозкових судин і крововиливу в ділянці стовбура головного мозку, виникла клінічна смерть. Який метод ШВЛ буде найменш ефективним під час проведення реанімаційних заходів?

- a. Метод Сільвестра
- b. Рот до носа
- c. З застосуванням мішка Амбу
- d. Рот до рота
- e. Рот до маски

Правильна відповідь: Метод Сільвестра

Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 65-ти років, який 8 років страждає на ІХС, раптово виник пекучий біль за грудиною, що іррадіює у ліву лопатку, плече, передпліччя. АТ- 140/90 мм рт.ст. Пульс - 80/хв. На ЕКГ: реєструються негативні зубці Т та депресія сегменту S-T у відведеннях II, III, V5-V6, співвідношення зубця Q до зубця R в цих відведеннях 1:5. Який діагноз найбільш імовірний у цьому випадку?

- a. Інфаркт міокарду з елевацією сегмента ST
- b. Міжреберна невралгія
- c. Інфаркт міокарду без елевації сегмента ST
- d. ТЕЛА
- e. Міокардит

Правильна відповідь: Інфаркт міокарду без елевації сегмента ST

Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У породіллі з цукровим діабетом типу 1 та варикозною хворобою на 4 добу після пологів з'явився гострий біль у правій нижній кінцівці. Права пупартова складка згладжена, стегно синюшне, набрякле, пальпація стегнового трикутника болюча. Температура - 36,6°C. Гінекологічний статус - без патологічних відхилень. Поставте діагноз:

- a. Септичний тазовий тромбофлебіт
- b. Тромбоз порожнистої вени
- c. Пахвинний лімфаденіт
- d. Тромбоз тазових вен та вен нижньої кінцівки
- e. Тромбофлебіт варикозних вен стегна

Правильна відповідь: Тромбоз тазових вен та вен нижньої кінцівки

Питання 121

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У жінки віком 32 роки з терміном вагітності 36 тижнів виникло блювання, що не зупиняється ніякими методами, погіршився зір та з'явилися сильні головні болі. Під час комп'ютерної томографії виявлено об'ємне утворення у головному мозку. Який імовірний діагноз?

- a. Арахноїдит
- b. Набряк мозку
- c. Прееклампсія
- d. Гостре порушення мозкового кровообігу
- e. Пухлина мозку

Правильна відповідь: Пухлина мозку

Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У породіллі в ранньому післяпологовому періоді виник геморагічний шок у зв'язку з гіпотонічною кровотечею, що триває, незважаючи на лікування, крововтрата становить 1400 мл. Якою буде лікарська тактика?

- a. Лікування геморагічного шоку паралельно з оперативною зупинкою кровотечі
- b. Лікування порушеної функції нирок
- c. Наркоз і проведення інтенсивної терапії
- d. Оперативне лікування
- e. Лікування геморагічного шоку

Правильна відповідь: Лікування геморагічного шоку паралельно з оперативною зупинкою кровотечі



Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої в післяпологовому періоді в пологовому будинку гостро виникло різке зниження настрою. Відзначається швидке, катастрофічне нарощання почуттів нестерпної туги, безвиході, відчаю. Пацієнта рухливо збуджена, не знаходить собі місця, кричить, стогне, ридає, наполегливо завдає собі ушкодження, активно проявляє суїциdalні тенденції. Який імовірний діагноз і необхідні рекомендації?

- a. Епілептичні сутінки. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-невролога
- b. Травматичний делірій. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-нейрохірурга
- c. Гострий напад шизофренії. Рекомендується переведення до психіатричного стаціонару
- d. Тяжкий депресивний епізод. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-психіатра
- e. Аментивний тип порушення свідомості. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-терапевта

Правильна відповідь: Тяжкий депресивний епізод. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-психіатра

Питання 124

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 38-ми років скаржиться на напади головного болю одностороннього характеру. Головний біль інтенсивний, ло- калізується в лобно-скроневій ділянці, починається раптово, триває від 3 до 10 годин. Перед нападом відзначається "затуманення" зору. Між нападами головного болю - стан задовільний. Неврологічний статус без особливостей. Які з наведених продуктів можуть спровокувати напад?

- a. Ананас
- b. Молочнокислі продукти
- c. Шоколад
- d. Білий хліб
- e. Смажена картопля

Правильна відповідь: Шоколад

Питання 125

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До реанімаційного відділення госпіталізовано чоловіка віком 54 років, без свідомості, із проявами клонічних судом. Під час огляду пацієнта виявлено: експурсія грудної клітки та пульсація на магістральних судинах відсутні, зініці помірно розширені, на світло не реагують. На кардіомоніторі електрична активність серця збережена. Який із нижченаведених заходів буде малоектичним у цьому разі?

- a. Штучна вентиляція легень
- b. Внутрішньовенне струменеве введення адреналіну
- c. Непрямий масаж серця
- d. Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- e. Електрична дефібриляція

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 40-ка років, інженер, має скарги на пароксизми гострого болю в лівій половині обличчя, тривалістю 1-2 хвилини. Частота нападів до 10 разів на добу. Провокуються напади болю вмиванням, вживанням їжі, розмовами, дотиком до лівої щоки ("куркова зона"). Хворобливість при пальпації супраорбітальної точки зліва. Сформулюйте клінічний діагноз:

- a. Лицева симпаталгія
- b. Невралгія великого потиличного нерву
- c. Невралгія трійчастого нерва
- d. Неврит лицевого нерву
- e. Пухлина головного мозку

Правильна відповідь: Невралгія трійчастого нерва

Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 73-х років впала на вулиці. Свідомість та серцева діяльність відсутні. Реанімацію почали з непрямого масажу серця. Яка ознака свідчить про його ефективність?

- a. Посмикування кінцівок
- b. Поява пульсації на сонних артеріях
- c. Підняття грудної клітки
- d. Розширення зіниць
- e. Роздування живота

Правильна відповідь: Поява пульсації на сонних артеріях

Питання 128

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 33-х років, незаміжня, проживає одна, працює бухгалтером. Звернулася до лікаря зі скаргами на дещо пригнічений настрій, "почуття незахищеності". Зміни в психічному стані пов'язує зі спробою згвалтування, що відбулася тиждень тому. Орієнтована всебічно правильно, мовному контакту доступна, відверто розповідає лікарю про психотравмуючу ситуацію, прагне підтримки спеціаліста. Наявність суїциdalних думок категорично заперечує, буде реальні плани на майбутнє. Якою буде тактика?

- a. Госпіталізувати у психіатричний стаціонар
- b. Призначити антидепресивну терапію
- c. Призначити психотерапію
- d. Призначити антипсихотичну терапію
- e. Призначити терапію анксиолітиками

Правильна відповідь: Призначити психотерапію



Питання 129

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Мати залишила здорового сина 2,5 років із старшою дочкою, хворою на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Вона через 3 години повернулася додому і помітила у сина частий кашель. На другий день стан його погіршився, температура тіла - 38оС, частота дихання - 42/хв., частота серцевих скорочень - 132/хв., ціаноз шкіри. Перкуторно: справа нижче кута лопатки вкорочення звуку, аускультативно в цьому місці різке ослаблення дихання. На Ro ОГК ателектаз правих сегментів S4 і S5, тінь органів середостіння зміщена вправо. Яка імовірна причина такого стану дитини?

- a. Гостра пневмонія
- b. Гострий обструктивний бронхіт
- c. Гостра респіраторна вірусна інфекція
- d. Напружений пневмоторакс
- e. Стороннє тіло бронхів

Правильна відповідь: Стороннє тіло бронхів

Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної жінки віком 30 років (термін вагітності 23 тижні) після падіння на слизькому тротуарі з'явилися кров'янисті виділення з піхви в об'ємі близько 150 мл одномоментно та продовжуються далі. Що треба зробити насамперед?

- a. Увести утеротоніки
- b. Увести кровозупинні препарати
- c. Провести УЗД органів малого таза
- d. Покласти міхур із льодом на низ живота
- e. Негайно госпіталізувати пацієнту

Правильна відповідь: Негайно госпіталізувати пацієнту



Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До приймального відділення доставлено дитину віком 12 років зі скаргами на сухість у роті, світлобоязнь та порушення зору. Об'єктивно спостерігається: шкіра гіперемована, суха, зіниці розширені, тахікардія. Під час подальшого обстеження було встановлено діагноз: отруєння алкалоїдами беладонни. Який із лікарських засобів доцільно застосувати для надання допомоги дитині?

- a. Діазепам
- b. Пілокарпін
- c. Неостигмін
- d. Дипіроксим
- e. Армін

Правильна відповідь: Неостигмін

Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До приймального відділення госпіталізована чотирирічна дитина із температурою тіла 38,8°C та проявами ГРВІ. Який лікарський засіб треба застосувати насамперед для зменшення гіпертермії у дитини?

- a. Парацетамол
- b. Мефенамінову кислоту
- c. Димедрол
- d. Німесулід
- e. Діазепам

Правильна відповідь: Парацетамол

Питання 133

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнта віком 47 років готують до переливання еритроцитарної маси. Під час визначення групи крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВО з'ясувалося, що аглютинація спостерігається у краплях із сироватками 0 (I) та A (II). Кров якої групи треба перелити пацієнту?

- a. 0 (I)
- b. B (III)
- c. ---
- d. A (II)
- e. AB (IV)

Правильна відповідь: B (III)

Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої дитини з'явилося адекватне самостійне дихання після відновлення прохідності дихальних шляхів, частота дихання -- 40/хв., частота серцевих скорочень --- 102/хв., акроціаноз. Яка подальша тактика лікаря у цьому разі?

- a. Непрямий масаж серця
- b. Дитина не потребує подальшого спостереження
- c. ШВЛ шляхом інтубації трахеї
- d. Інгаляція кисеню через лицеву маску
- e. Дренажний масаж

Правильна відповідь: Інгаляція кисеню через лицеву маску

Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини віком 15 років, яка перебувала у стані діабетичної кетоацидотичної коми, за 4 години після початку інсульнотерапії на тлі поліпшення стану раптово розвинулася блідість шкірних покривів, задишка, тахікардія, слабкий пульс, м'язова гіпотензія, парез кишківника, атонія сечового міхура, зниження артеріального тиску. На ЕКГ спостерігається: подовження інтервалу Q-T, зниження S-T, розширення і сплющення зубця T. Який патологічний стан спричинив появу таких симптомів?

- a. Гіпокаліємія
- b. Гіповолемічний шок
- c. Гіпокальціємія
- d. Гіперкаліємія
- e. Гостра серцево-судинна недостатність

Правильна відповідь: Гіпокаліємія



Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 47 років скаржиться на збільшення температури тіла до 39°C , загальну слабкість, виражену задишку, непродуктивний кашель, відчуття важкості й повноти в правій половині грудної клітки. Об'єктивно встановлено: пацієнт лежить на правому боці, акроцианоз, відставання правої половини грудної клітки в акті дихання, притуплення перкуторного звуку справа до рівня II ребра. Встановіть попередній діагноз.

- a. Масивний ексудативний плеврит
- b. Спонтанний пневмоторакс справа
- c. Міліарний туберкульоз
- d. Масивний ексудативний перикардит
- e. Правобічна крупозна пневмонія

Правильна відповідь: Масивний ексудативний плеврит

Питання 137

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота спостерігаються кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Остання менструація 2 місяці тому. При бімануальному огляді матка збільшена до 5-6 тижнів вагітності, болісна при пальпації. При огляді шийки матки в дзеркалах виявлено: шийка вкорочена. В каналі шийки матки визначаються елементи плідного яйця та згортки крові. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

- a. Повний мимовільний викиденъ
- b. Викиденъ, що розпочався
- c. Викиденъ в ходу
- d. Неповний мимовільний викиденъ
- e. Загроза переривання вагітності

Правильна відповідь: Викиденъ в ходу

Питання 138

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 54 років під час вживання їжі раптово закашлявся. Об'єктивно спостерігається: психомоторне збудження, виражений ціаноз, набухання вен шиї, неефективність дихання. Які дії потрібно виконати насамперед для надання допомоги пацієнту?

- a. Виконати інтубацію трахеї
- b. Виконати конікотомію
- c. Звільнити ротову порожнину від їжі та слизу
- d. Застосувати прийом Геймліха
- e. Застосувати заспокійливі засоби

Правильна відповідь: Застосувати прийом Геймліха

Питання 139

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіка віком 55 років із діагнозом: інсулінозалежний цукровий діабет, госпіталізовано до лікарні. Він скаржиться на загальну слабість, поліурію, гіпотонію, тахікардію. У газовому складі крові виявлено: pH --- 7,31, PaCO₂ --- 35 мм рт. ст., PaO₂ --- 80 мм рт.ст., стандартний бікарбонат --- 17 ммол/л, істинний бікарбонат --- 15 ммол/л, дефіцит основ --- 1,5 ммол/л, натрій --- 132 ммол/л, глюкоза --- 25 ммол/л, хлориди --- 102 ммол/л, кетонові тіла. Визначте порушення кислотно-основного стану пацієнта.

- a. Метаболічний ацидоз
- b. Метаболічний алкалоз
- c. Змішаний ацидоз
- d. Респіраторний алкалоз
- e. Респіраторний ацидоз

Правильна відповідь: Метаболічний ацидоз



Питання 140

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної на 40-му тижні гестації почалися пологи. Відійшли навколоплідні води, сильно забруднені меконієм. Народилася доношена дівчинка, шкірні покриви рожеві, сильно забруднені меконієм, закричала одразу, м'язовий тонус фізіологічний. Якою повинна бути тактика лікаря в пологовій залі?

- a. Санація рото- та носоглотки, оксигенотерапія
- b. Інтубація трахеї, санація верхніх дихальних шляхів
- c. Інтубація трахеї, штучна вентиляція легень (ШВЛ)
- d. Вимити дитину, обсушити, викласти на живіт матері
- e. Викласти на живіт матері, обсушити

Правильна відповідь: Викласти на живіт матері, обсушити

Питання 141

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 38 років під час огляду скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, блювання темно-коричневими масами, випорожнення чорного кольору. Раніше періодично турбував біль в епігастрії. Об'єктивно встановлено: шкіра та видимі слизові оболонки блідого кольору, вологі. Пульс --- 98/хв., слабкого наповнення. АТ --- 90/60 мм рт. ст. Гемоглобін --- 108 г/л, еритроцити --- 2,9 Т/л. Реакція на приховану кров у калі позитивна. Встановіть попередній діагноз.

- a. Неспецифічний виразковий коліт
- b. Виразкова хвороба шлунку або ДПК
- c. Рак шлунку
- d. Хвороба Кроні
- e. Черевний тиф

Правильна відповідь: Виразкова хвороба шлунку або ДПК

Питання 142

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На дорожньо-транспортну пригоду була викликана бригада швидкої медичної допомоги (ШМД). Постраждалий непритомний, у нього діагностовано відкритий перелом правої стегнової кістки, артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. Якими будуть дії лікаря швидкої допомоги?

- a. Іммобілізація, транспортування в лікарню
- b. Іммобілізація, крапельне введення плазмозамінних розчинів, асептична пов'язка
- c. Знеболювання, асептична пов'язка, іммобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія
- d. Негайно транспортувати в спеціалізоване відділення
- e. Іммобілізація шинами Крамера, введення вазопресорів, блокада місця перелому

Правильна відповідь: Знеболювання, асептична пов'язка, іммобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія

Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 14-річного хлопчика під час тривалого стояння раптово з'явилися запаморочення, потемніння в очах, хлопчик знепритомнів. Об'єктивно: дитина без свідомості, блідість шкірних покривів, холодний піт. Відзначаються тахікардія, ниткоподібний пульс, зниження артеріального тиску. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Тампонада серця
- b. Гостра коронарна недостатність
- c. Колапс
- d. Гостра серцева недостатність
- e. Кома

Правильна відповідь: Колапс



Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Студент 15 хвилин тому в хімічній лабораторії випадково пролив собі на стегна розчин гідроксиду натрію. При огляді: на обох стегнах по передніх та бічних поверхнях плями неправильної форми, яскраво червоного кольору, вологі, з набряком навколошніх тканин, чутливість різко знижена. Яку невідкладну допомогу слід надати?

- a. Промивання водою протягом тривалого часу
- b. Промивання 2% розчином лимонної кислоти
- c. Обробка місця опіку розчинами антисептиків
- d. Введення наркотичних анальгетиків
- e. Накладання асептичної пов'язки

Правильна відповідь: Промивання водою протягом тривалого часу

Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Дівчину віком 25 років було згвалтовано два роки тому. Скаржиться на те, що <<картини згвалтування>> постійно переслідують її у нав'язливих ремінісценціях, яскравих сновидіннях страхітливого змісту. Помічає потяг до уникнення обставин, що асоціюються зі спогадами про сексуальне насилля. Яке порушення психічного стану у пацієнтки?

- a. Депресивний розлад
- b. Посттравматичний стресовий розлад
- c. Шизофренія
- d. Розлад адаптації
- e. Істеричний розлад особистості

Правильна відповідь: Посттравматичний стресовий розлад



Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Студент 2 дні тому прилетів з Індії. Його госпіталізовано в тяжкому стані: голос беззвучний, акроціаноз, загострені риси обличчя, "руки прачки", язик сухий, склери тъмяні. Живіт втягнутий. Генералізовані судоми м'язів. Пульс ниткоподібний, артеріальний тиск не визначається. Яка невідкладна допомога необхідна хворому?

- a. Оральна регідратація
- b. Дезінтоксикаційна терапія
- c. Ентеросорбція
- d. Дегідратаційна терапія
- e. Внутрішньовенна регідратація

Правильна відповідь: Внутрішньовенна регідратація

Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 29-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на кров'янисті виділення з піхви та біль у правій здухвинній ділянці. Остання менструація була 11 тижнів тому. Вміст ХГ у сироватці крові нижче за нормативні показники для передбачуваного терміну вагітності. За даними ультразвукового дослідження (УЗД) плідне яйце в порожнині матки не визначається. В Дугласовому просторі виявлено вільну рідину з гіперехогенними включеннями. При піхвовому дослідженні: нависання склепінъ, "крик Дугласа". При пункциї заднього склепіння отримана кров, що не згортається. Поставте діагноз:

- a. Кровотеча з жовтого тіла яєчника
- b. Порушена позаматкова вагітність
- c. Міхурцевий занесок
- d. Аборт, що розпочався
- e. Перекрут кісти яєчника

Правильна відповідь: Порушена позаматкова вагітність



Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 8-ми років захворювання мало поступовий початок з підвищення температури до 37,5-38°C, нежитю, сухого "гавкаючого" кашлю, осипlostі голосу. На третю добу хвороби стан дитини погіршився, з'явилося шумне дихання з втяжінням міжреберних проміжків. Яке захворювання з числа ГРВІ найбільш імовірно має місце у дитини?

- a. Грип
- b. Риновірусна інфекція
- c. РС-інфекція
- d. Парагрип
- e. Аденовірусна інфекція

Правильна відповідь: Парагрип

Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 25-ти років 2 тижні тому народила здорову дівчинку. Вагітність та пологи перебігали без ускладнень. Виписані на 2-гу добу. Психосоматичний анамнез не обтяжений. Після виписки з полового будинку родичі звернули увагу на її агресивність, часті зміни настрою, відсутність бажання доглядати за дитиною. Маті викликала дільничного лікаря у зв'язку з тим, що дочка зробила спробу задушити немовля. На запитання "чому?" відповідала, що чула голос, який сказав, що вона повинна вбити дитину. Виникала підозра на післяпологовий психоз. Якою буде тактика лікаря у цьому випадку?

- a. Дати направлення на консультацію до психіатра
- b. Дати рекомендації щодо режиму праці та відпочинку
- c. Призначити повне клінічне обстеження
- d. Негайна госпіталізація до спеціалізованого стаціонару
- e. Призначити антидепресанти та вітамінотерапію

Правильна відповідь: Негайна госпіталізація до спеціалізованого стаціонару

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 46 років скаржиться на загальну слабкість, нудоту, рідкі дьогтеподібні випорожнення. Під час обстеження встановлено: пацієнт у свідомості, шкіра бліда, ЧСС --- 100/хв., АТ --- 105/60 мм рт. ст., ЧД --- 16/хв, тремор пальців рук, асцит, розширення вен передньої черевної стінки, печінка щільна +8 см, селезінка збільшена. У результаті аналізу крові виявлено: Hb --- 90 г/л, КП --- 0,95, білірубін --- 156 мкмоль/л, протромбін --- 65%. Визначте ймовірний діагноз та ускладнення, що виникло у пацієнта.

- a. Неспецифічний виразковий коліт, кишкова кровотеча
- b. Гепато-ренальна недостатність, кишкова кровотеча
- c. Виразка шлунка, кровотеча
- d. Хронічний гепатит, кровотеча з гемороїдальних вен
- e. Цироз печінки, шлункова кровотеча з варикозно-розширених вен

Правильна відповідь: Цироз печінки, шлункова кровотеча з варикозно-розширених вен

◀ Крок 3 Фармація (вітчизняні UA)

Перейти до...

Крок 3 Стоматологія 2022 ►

Розпочато четвер 3 листопад 2022 12:43

Стан Завершено

Завершено четвер 3 листопад 2022 12:49

Витрачено часу 5 хв 34 сек

Балів 21/150

Оцінка 1 з можливих 10 (14%)

Питання 1

Правильно

Балів 1 з 1

У доношеної здоровової дитини через 8 годин після пологів з'явилась субіктеричність шкірних покривів. Дитина від третьої вагітності, других термінових пологів. Перша вагітність закінчилася абортом. Група крові матері II(A), резус "-", дитини A (II), резус "+". Пуповинний білірубін - 56 мкмоль/л. Через 4 годин - 84 мкмоль/л. Дитина на грудному вигодувуванні. Який імовірний Ваш діагноз?

- a. Фізіологічна жовтяниця
- b. Гепатит
- c. Атрезія жовчних протоків
- d. Жовтяниця, пов'язана з грудним молоком
- e. Гемолітична хвороба новонародженого



Правильна відповідь: Гемолітична хвороба новонародженого

Питання 2

Правильно

Балів 1 з 1

У дитини віком 15 років, яка перебувала у стані діабетичної кетоацидотичної коми, за 4 години після початку інсулінотерапії на тлі поліпшення стану раптово розвинулася блідість шкірних покривів, задишка, тахікардія, слабкий пульс, м'язова гіпотензія, парез кишківника, атонія сечового міхура, зниження артеріального тиску. На ЕКГ спостерігається: подовження інтервалу Q-T, зниження S-T, розширення і сплющення зубця T. Який патологічний стан спричинив появу таких симптомів?

- a. Гіповолемічний шок
- b. Гіперкаліємія
- c. Гіпокальціємія
- d. Гостра серцево-судинна недостатність
- e. Гіпокаліємія



Правильна відповідь: Гіпокаліємія

Питання 3

Правильно

Балів 1 з 1

У дитини 8-ми років захворювання мало поступовий початок з підвищенння температури до 37,5-38°C, нежитю, сухого "гавкаючого" кашлю, осипlostі голосу. На третю добу хвороби стан дитини погршився, з'явилося шумне дихання з втяжінням міжреберних проміжків. Яке захворювання з числа ГРВІ найбільш імовірно має місце у дитини?

- a. РС-інфекція
- b. Риновірусна інфекція
- c. Грип
- d. Аденовірусна інфекція
- e. Парагрип



Правильна відповідь: Парагрип

Питання 4

Правильно

Балів 1 з 1

У жінки 32-х років стан після операції кесаревого розтину. На третю добу відзначено збільшення в об'ємі лівої нижньої кінцівки, появу болю за ходом глибоких вен гомілки і гіперемія шкіри. Температура тіла - 37,8°C . Яких заходів необхідно вжити після операції для профілактики глибокого венозного тромбозу?

- a. Озонотерапія
- b. Лікування цитостатиками
- c. Лікування утеротонічними препаратами
- d. Введення фраксипарину ✓
- e. Лікування антибіотиками

Правильна відповідь: Введення фраксипарину

Питання 5

Правильно

Балів 1 з 1

На фармацевтичному підприємстві сталась пожежа. Декілька працівників виявились заблокованими без можливості самостійної евакуації. Засоби індивідуального захисту на випадок пожежі також виявились недоступними. Коли рятувальники евакуювали їх до безпечного місця потерпілі мали наступні симптоми: запаморочення, порушення зору, нудота, часте дихання, задишка, вишневий колір обличчя. Який вид гіпоксії розвивається при таких умовах?

- a. Тканинна
- b. Циркуляторна
- c. Токсична
- d. Гіпоксична
- e. Гемічна ✓

Правильна відповідь: Гемічна

Питання 6

Правильно

Балів 1 з 1

У чоловіка віком 39 років одразу після щеплення від грипу розвинувся анафілактичний шок. Який із наведених препаратів треба увести насамперед?

- a. Мезатон
- b. Налоксон
- c. Адреналін
- d. Страфантин
- e. Кофеїн



Правильна відповідь: Адреналін

Питання 7

Правильно

Балів 1 з 1

Хлопчик віком 10 років довго пірнав у домашньому басейні, раптом почав борсатися та ковтати воду. Його госпіталізували до лікарні. Об'єктивно спостерігається: притомний, дещо загальмований, дихання та кровообіг адекватні. Визначте тактику лікаря у цьому разі.

- a. Спостереження у приймальному покої протягом 1 години
- b. Термінова госпіталізація до відділення реанімації
- c. Спостереження в стаціонарі
- d. Амбулаторне спостереження
- e. Спостереження не потребує



Правильна відповідь: Спостереження в стаціонарі

Питання 8

Правильно

Балів 1 з 1

У вагітної 23-х років, термін гестації 22 тижні, яка хворіє на міастенію і приймає щоденно калімін, протягом останніх 2 днів з'явились скарги на гіперсалівацію, порушення зору, діарею, брадикардію, порушення дихання. Ваш діагноз:

- a. Ранній гестоз вагітних
- b. Алергічна реакція
- c. Прееклампсія вагітних
- d. Холінергічний криз
- e. Міастенічний криз



Правильна відповідь: Холінергічний криз

Питання 9

Правильно

Балів 1 з 1

У чоловіка на місці укусу бджоли швидко розвинувся значний набряк шкіри та м'яких тканин, спостерігається "гавкаючий" кашель, осипливість голосу, задишка та стридорозне дихання. Під час огляду виявлено: обличчя ціанотичне, збудження змінилося загальмованістю, різко збільшилася частота серцевих скорочень. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- b. Напад епілепсії
- c. Ангіоневротичний набряк
- d. Напад бронхіальної астми
- e. Гострий респіраторний дистрес-синдром



Правильна відповідь: Ангіоневротичний набряк

Питання 10

Неправильно

Балів 0 з 1

У хворого гостре отруєння блідою поганкою. На фоні проведеної інтенсивної терапії добовий діурез становить 350 мл, сечовина крові - 55 ммоль/л з добовим приростом більше 5 ммоль/л, калій плазми - 7,3 ммоль/л, рівень стандартного бікарбонату плазми - 8 ммоль/л. Ваша лікувальна тактика:

- a. Петльові діуретики
- b. Форсований діурез ✗
- c. Декстрани
- d. Гемосорбція
- e. Гемодіаліз

Правильна відповідь: Гемодіаліз

Питання 11

Правильно

Балів 1 з 1

Рядовий був притиснутий уламками зруйнованого будинку протягом 7 годин. Хворий збуджений, погано орієнтується у навколоишньому середовищі. Пульс - 92/хв., slabкого наповнення і напруження, набряк всієї правої нижньої кінцівки, на зовнішній поверхні стегна та гомілки шкіра має синьо-багряний колір. Рухи в колінному та гомілково-ступневому суглобах відсутні. Протягом доби поранений не мочився. Поставте діагноз:

- a. Синдром тривалого розчавлення тяжкого ступеня, II стадія ✓
- b. Синдром тривалого розчавлення
- c. Травматичний шок тяжкого ступеня, торпідна фаза
- d. Травматичний шок середнього ступеня, еректильна фаза
- e. Синдром тривалого розчавлення легкого ступеня

Правильна відповідь: Синдром тривалого розчавлення тяжкого ступеня, II стадія

Питання 12

Правильно

Балів 1 з 1

У ВРІТ інфекційної лікарні госпіталізовано хворого 26-ти років з діагнозом менінгококова інфекція, менінгококемія, тяжкий перебіг, ІТШ I-II ступеня. Призначено етіотропну та патогенетичну терапію (в тому числі і пазму). Визначте необхідність з'ясування групової належності крові донора та реципієнта:

- a. Обов'язкова за будь-яких умов ✓
- b. Не обов'язкова при відомій одногрупній реципієнта
- c. Обов'язкова при переливанні великих доз
- d. Не обов'язкова за будь-яких умов
- e. Не обов'язкова при переливанні малих доз

Правильна відповідь: Обов'язкова за будь-яких умов

Питання 13

Неправильно

Балів 0 з 1

Хворий 58-ми років раптово відчув задишку, різкий біль в грудній клітці, кровохаркання, запаморочення. В анамнезі тромбофлебіт. Об'єктивно: дифузний ціаноз, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., акцент II тону на легеневій артерії, сухі розсіяні хріпи в нижніх відділах легень. На ЕКГ: високий зубець Р у II та III, глибокий S в I, патологічний Q в III, негативний Т в II та III. На Ro спостерігається клиновидне затемнення в середніх відділах справа. Ваш діагноз:

- a. Спонтанний пневмоторакс
- b. Q-інфаркт міокарда по задній стінці лівого шлуночка
- c. Інфаркт легені ✗
- d. Кардіогенний шок
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

Правильна відповідь: Тромбоемболія легеневої артерії

Питання 14

Неправильно

Балів 0 з 1

Хворий 56-ти років звернувся зі скаргами на біль та набряк лівої гомілки. Об'єктивно: ліва гомілка збільшена в діаметрі (+5 см у порівнянні з правою), тепла на дотик. Болючість та напруженій набряк гомілки при пальпації. Для уточнення діагнозу першочергово необхідно виконати:

a. Плетизмографію нижніх кінцівок

b. Рентгенографію нижніх кінцівок

c. Коагулограму ✗

d. Доплерографію вен нижніх кінцівок

e. Флебографію нижніх кінцівок

Правильна відповідь: Доплерографію вен нижніх кінцівок

Питання 15

Неправильно

Балів 0 з 1

Чоловік віком 36 років, який хворіє на цукровий діабет, після вживання алкоголю втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: шкіра на дотик волога, тепла, АТ --- 145/90 мм рт. ст., судомні посмікування м'язів, поодинокі тонічні та клонічні судоми. Дихання поверхневе, тонус очних яблук збережений, зіниці розширені, гіперрефлексія. Яка наймовірніша причина такого стану пацієнта?

a. Гіперглікемія

b. Кетоацидоз ✗

c. Гіпоглікемія

d. Лактацидоз

e. Порушення мозкового кровообігу

Правильна відповідь: Гіпоглікемія

Питання 16

Неправильно

Балів 0 з 1

Хвора 48-ми років відчула біль в літкових м'язах. Спостерігається незначний набряк в ділянці щиколоток, гіперемія шкіри. Позитивний симптом Хоманса. Запідозрено тромбоз глибоких вен гомілки. Які діагностичні методи потрібно застосувати для підтвердження діагнозу?

- a. Визначити надлишковий вміст фібрину-мономеру; продуктів деградації фібрину та фібриногену в плазмі ✖
- b. Радіонуклідне дослідження міченим фібриногеном
- c. Дослідити коагулограму або орієнтуватися на показники тромбоеластограми
- d. Дуплексне ультразвукове сканування венозних судин кінцівок
- e. Провести венографію

Правильна відповідь: Дуплексне ультразвукове сканування венозних судин кінцівок

Питання 17

Неправильно

Балів 0 з 1

У дівчинки 11-ти місяців спостерігаються адінамія, фебрильна температура, кашель, ціаноз, дистантні хрипи. Частота дихання - 90/хв. Фізикальні дані: перкуторно-коробковий звук, аускультивно-жорстке дихання, тотальні дрібноміхурцеві хрипи. 20 хвилин проводилась інсуфляція 100% кисню через маску. Рентгенологічно - ознаки емфіземи. В артеріальній крові: PaO₂ - 55 мм рт.ст., pH- 7,1. З чого доцільно розпочати терапію?

- a. Інгаляція й інфузія глюкокортикоїдів і амброксолу
- b. Киснева палатка з інгаляцією амброксолу
- c. Киснева маска з інфузією глюкокортикоїдів
- d. Гіпербарична оксигенация ✖
- e. Штучна вентиляція легень

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 18

Неправильно

Балів 0 з 1

У п'ятирічної дівчинки, яка хворіє на цукровий діабет I типу протягом 2-х років і отримує інсулін, раптово виникло занепокоєння, відчуття голоду, тремор у кінцівках, блідість. Дитина втратила свідомість. Рівень глюкози у крові — 2,2 ммоль/л. Який препарат насамперед треба призначити дитині?

- a. Глюкозу
- b. Ноотропіл
- c. Преднізолон
- d. Адреналін
- e. Глюкагон



Правильна відповідь: Глюкозу

Питання 19

Неправильно

Балів 0 з 1

Жінка віком 76 років госпіталізована до лікарні. Скаржиться на сильні та різкі болі у черевній порожнині, що виникли раптово, здуття живота, затримку відходження газів і калу. З анамнезу відомо, що хворіє на миготливу аритмію. Об'єктивно спостерігається: живіт дещо здутий, м'який та різко болючий під час пальпації. Перистальтика відсутня. Перкуторно виявлено у всіх відділах тимпаніт. \emph{Per rectum} виявлено: ампула порожня, на рукавиці є залишки калу малинового кольору. За результатами аналізу крові виявлено лейкоцитоз — $\$28\cdot10^9\text{ л}/\text{l}$. Який імовірний діагноз у пацієнтки?

- a. Гострий панкреатит
- b. Мезентеріальний тромбоз
- c. Обтураційна кишкова непрохідність
- d. Перфоративна виразка
- e. Інфаркт міокарда, абдомінальна форма



Правильна відповідь: Мезентеріальний тромбоз

Питання 20

Правильно

Балів 1 з 1

Під час індукції в анестезію внутрішньовенним введенням діазепаму у хворого 35-ти років раптово з'явилась задишка 30/хв., шкіра обличчя з ціанозом, сухі свистячі дистанційні хріпи, артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 138/хв. Який невідкладний стан у хворого?

- a. Гостра надиркова недостатність
- b. Гостра дихальна недостатність
- c. Напад бронхіальної астми
- d. Гостра серцево-судинна недостатність
- e. Анафілактичний шок



Правильна відповідь: Анафілактичний шок

Питання 21

Неправильно

Балів 0 з 1

Солдат активний, рухливий, метушливий. Чинить опір обстеженню. Говорить швидко, голосно. Вислови спонтанні, непослідовні. Поставте діагноз:

- a. Психомоторне збудження
- b. Аменція
- c. Кататонічне збудження
- d. Делірій
- e. Ейфорія



Правильна відповідь: Психомоторне збудження

Питання 22

Неправильно

Балів 0 з 1

На місті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з пошкодженого автомобілю витягнуто хлопчика 12-ти років з численними забоями грудної клітки та відкритим переломом гомілки. При огляді: задуха, ціаноз шкіри. Права половина грудної клітини не бере участі у диханні. При перкусії: над нею визначається високий тимпаніт, аускультивно дихання не прослуховується, межі серцевої тупості зміщено вліво. Тони серця глухі, прискорені. Про який небезпечний стан це свідчить?

- a. Відкритий пневмоторакс
- b. Забій легені
- c. Напруженій правобічний пневмоторакс
- d. Ателектаз правої легені
- e. Гемоторакс



Правильна відповідь: Напруженій правобічний пневмоторакс

Питання 23

Правильно

Балів 1 з 1

Хвора 39-ти років скаржиться на раптову появу задишки, болю в грудній клітці, серцебиття після пробіжки в парку. В анамнезі: тривалий прийом оральних контрацептивів, паління. Об'єктивно: стан важкий, дифузний ціаноз. Частота дихання - 36/хв., пульс - 124/хв., малого наповнення, ритмічний. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. ЕКГ: блокада правої ніжки пучка Гіса, глибокий зубець QIII, глибокі зубці S I, aVL, високий загострений зубець PII. Визначте серологічний маркер даного невідкладного стану:

- a. Антинуклеарні антитіла
- b. Аспартатамінотрансфераза
- c. Тропонін
- d. Д-димер в крові
- e. Креатинфосфокіназа



Правильна відповідь: Д-димер в крові

Питання 24

Правильно

Балів 1 з 1

Доношена дитина народилася від фізіологічних пологів. Навколо плідні води були забруднені меконієм. Одразу після народження дитина закричала, м'язовий тонус дещо знижений, акроціаноз, ЧСС — 140 за хвилину, порушення функції дихання не має. Які подальші дії лікаря?

- a. Покласти дитину на живіт матері, забезпечити звичайний догляд ✓
- b. Віднести дитину на реанімаційний столик, провести санацію ВДШ, розпочати ШВЛ
- c. Уникаючи тактильної стимуляції віднести дитину на реанімаційний столик, провести санацію трахеї через інтубаційну трубку
- d. Віднести дитину на реанімаційний столик, провести санацію ВДШ, дати кисень вільним потоком
- e. Віднести дитину на реанімаційний столик, провести санацію ВДШ гумовою грушею

Правильна відповідь: Покласти дитину на живіт матері, забезпечити звичайний догляд

Питання 25

Неправильно

Балів 0 з 1

У трирічного хлопчика, який грався без нагляду дорослих, почався сильний напад кашлю, з'явилася задишка. На рентг'енограмі виявляється гомогенне затемнення середньої частки правої легені з підтягнутим догори контуром, тінь середостіння помірно зміщена в правий бік, стороннє тіло не виявлено. Який попередній діагноз?

- a. Плевропневмонія ✗
- b. Набряк легень
- c. Гіпоплазія правої легені
- d. Осумкований плеврит
- e. Ателектаз частки легені

Правильна відповідь: Ателектаз частки легені

Питання 26

Неправильно

Балів 0 з 1

Жінка перебуває в терміні 36 тижнів вагітності. Її зранку турбує нудота, двічі відбулося блювання, артеріальний тиск - 220/140 мм рт.ст. Впродовж 2-х тижнів спостерігалися набряки на нижніх кінцівках. В якому відділенні треба лікувати хвору?

- a. Поліклінічному
- b. Денному стаціонарі
- c. Терапевтичному
- d. Патології вагітних
- e. Кардіологічному

✗

Правильна відповідь: Патології вагітних

Питання 27

Неправильно

Балів 0 з 1

Який лікарський засіб треба використати для надання невідкладної допомоги шестирічному хлопчику із гострою крововтратою до 20% ОЦК?

- a. Свіжозаморожену плазму
- b. Неогемодез
- c. Цільну кров
- d. Розчин глюкози
- e. 0,9% розчин хлориду натрію

✗

Правильна відповідь: 0,9% розчин хлориду натрію

Питання 28

Неправильно

Балів 0 з 1

Після опромінення у госпіталь доставлений юнак 26-ти років. Показник індивідуального дозиметра 5 Гр. Скарги на різку загальну слабкість, головний біль, нудоту, повторне блювання. Об'ективно: на шкірі обличчя еритема, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., блювання продовжується. В якому клінічному періоді гострої променевої хвороби перебуває хорій?

- a. Період запалення
- b. Період вторинної реакції ✗
- c. Період виражених клінічних проявів
- d. Період первинної реакції
- e. Період розпалу

Правильна відповідь: Період первинної реакції

Питання 29

Неправильно

Балів 0 з 1

До медичної роти ОМБР, яка розгорнула в районі населеного пункту, з I механізованого батальйону надійшло 16 поранених вогнепальною зброєю та 8 хворих. Який вид медичної допомоги буде надано пораненим та хворим у функціональних підрозділах медичної роти бригади?

- a. Перша медична та перша лікарська допомога ✗
- b. Перша медична та перша лікарська медична допомога
- c. Усі види медичної допомоги
- d. Перша лікарська допомога та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги
- e. Долікарська допомога та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги

Правильна відповідь: Перша лікарська допомога та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги

Питання 30

Неправильно

Балів 0 з 1

Жінка 25-ти років скаржиться на плаксивість, різкі зміни настрою, прискорене серцебиття, що пов'язує з втому - місяць тому народила близнюків. З ранку відчула "зупинки" серцевої діяльності. При огляді з боку внутрішніх органів патології не встановлено. Артеріальний тиск - 130/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 115/хв., часті екстрасистоли, частота дихання - 17/хв. Щитоподібна залоза збільшена до другого ступеня, безболісна. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

- a. Післяпологовий тиреоїдит, гіпертиреоз
- b. Підгострий вірусний тиреоїдит, гіпертиреоз
- c. Гострий вірусний тиреоїдит, гіпертиреоз
- d. Гострий вірусний тиреоїдит, гіпотиреоз
- e. Післяпологовий тиреоїдит, гіпотиреоз



Правильна відповідь: Післяпологовий тиреоїдит, гіпертиреоз

Питання 31

Неправильно

Балів 0 з 1

Хвора 16-ти років скаржиться на інтенсивний біль у горлі зліва, що віддає у вухо, різке утруднення ковтання та відкриття рота, підвищення температури тіла до 39,2оС . Хворіє третю добу, за тиждень до початку скарг лікувалася у дільничного лікаря з приводу ангіни. Відкриття рота значно утруднене (тризм жувальних м'язів), асиметрія зіву за рахунок випинання лівого мигдалика, піднебінно-язикова дужка різко гіперемована, інфільтрована, набрякла. За кутом нижньої щелепи визначаються збільшенні та болючі лімфовузли. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Ангіна
- b. Паратонзиллярний абсцес
- c. Дифтерія
- d. Хронічний тонзиліт
- e. Фарингіт



Правильна відповідь: Паратонзиллярний абсцес

Питання 32

Неправильно

Балів 0 з 1

У приймальне відділення доставлений потерпілий з опіком полум'ям III Б-IV ст. обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Волосся у ніздрях обгоріло, слизова губ, язик сіро-білого кольору. Голос хриплий, дихання часте, поверхневе; "трубний кашель", що супроводжується виділенням харкотиння з домішками кіптяви. Під час транспортування у відділення інтенсивної терапії почали нарости явища дихальної недостатності. Який необхідний об'єм допомоги?

- a. Інгаляція зволоженого кисню ✗
- b. Введення муколітиків
- c. Інтубація трахеї та ШВЛ
- d. Інгаляції β_2 -агоністів короткої дії
- e. Введення дихальних аналептиків

Правильна відповідь: Інтубація трахеї та ШВЛ

Питання 33

Правильно

Балів 1 з 1

У хлопчика 11-ти років гостро з'явилися головний біль, втрата свідомості. При обстеженні: свідомість потъмарена, артеріальний тиск - 130/85 мм рт.ст., ригідність м'язів потилиці, температура - 38,2°C. Яке діагностичне дослідження необхідно провести дитині першочергово?

- a. Люмбальна пункція ✓
- b. Визначення лейкоцитів та швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) у крові
- c. Електроенцефалографія
- d. Комп'ютерна томографія (КТ) головного мозку
- e. Рентгенографія черепа

Правильна відповідь: Люмбальна пункція

Питання 34

Правильно

Балів 1 з 1

Потерпілий доставлений у МедР з вогнища через добу після застосування хімічної зброї. Скаржиться на сильний біль в очах, світлобоязнь, слізотечу, запаморочення, слабкість, нудоту, блювання. Зі слів постраждалого, краплі отруйної речовини (ОР) потрапили на шкіру обличчя й в очі. Через кілька хвилин з'явилися відчуття піску в очах, світлобоязнь, слізотеча, які неухильно наростили. При огляді трохи загальмований, млявий, адynamічний. Блефароспазм, виражений набряк і гіперемія повік, еритематозні вогнища на шкірі обличчя. Пульс - 60/хв., ритмічний, тони серця ослаблені артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Дихання жорстке. Якими властивостями володіє отруйна речовина?

- a. Ураження рідкою ОР шкірно-наривної дії
- b. Отруєння ароматичними вуглеводнями
- c. Ураження ОР подразливої дії
- d. Ураження пароподібним іпритом важкого ступеня
- e. Ураження рідкою ОР нервово- паралітичної дії



Правильна відповідь: Ураження рідкою ОР шкірно-наривної дії

Питання 35

Неправильно

Балів 0 з 1

У хворого 60-ти років на тлі підвищення артеріального тиску до 170/90 мм рт.ст. порушилась мова і ослабли праві кінцівки. Доставили до стаціонару через годину після виникнення симптомів. Діагностовано: ішемічний інсульт. Яке лікування слід призначити хворому для відновлення кровотоку в зоні ішемії, якщо немає протипоказань?

- a. Оперативне втручання - ендартеректомія
- b. Антиагрегантна терапія
- c. Введення антикоагулянтів
- d. Проведення тромболізису
- e. Дегідратаційна терапія



Правильна відповідь: Проведення тромболізису

Питання 36

Неправильно

Балів 0 з 1

Лікар бригади екстреної медичної допомоги надає невідкладну допомогу десятирічній дівчинці, яка постраждала під час ДТП. Через неефективність самостійного дихання проведено інтубaciю трахеї. Під час проведення пробних вдихів за допомогою мішка Амбу виявлено, що дихальні шуми зліва проводяться слабше. Що треба зробити у цьому разі?

- a. Переінтубувати трахею ✗
- b. Підвищити об'єм вдиху
- c. Підвищити тиск у дихальних шляхах
- d. Підтягнути інтубаційну трубку вгору
- e. Просунути інтубаційну трубку вниз

Правильна відповідь: Підтягнути інтубаційну трубку вгору

Питання 37

Правильно

Балів 1 з 1

У пацієнта-гіпертоніка раптово знизвився зір на праве око. Гострота зору 0,05 не коригується. На очному дні в центрі молочно-білій набряк сітківки, симптом "розвавленого помідора". Вени розширені, штопороподібно звиті, за ходом вен геморагії. Ваш діагноз:

- a. Тромбоз центральної вени сітківки ✓
- b. Відшарування сітківки
- c. Меланобластома хоріоїдеї
- d. Емболія центральної артерії сітківки
- e. Центральний хоріоретиніт

Правильна відповідь: Тромбоз центральної вени сітківки

Питання 38

Неправильно

Балів 0 з 1

У породіллі з цукровим діабетом типу 1 та варикозною хворобою на 4 добу після пологів з'явився гострий біль у правій нижній кінцівці. Права пупартова складка згладжена, стегно синюшне, набряkle, пальпація стегнового трикутника болюча. Температура - 36,6°C. Гінекологічний статус - без патологічних відхилень. Поставте діагноз:

- a. Септичний тазовий тромбофлебіт
- b. Тромбоз порожнистої вени
- c. Тромбофлебіт варикозних вен стегна
- d. Пахвинний лімфаденіт
- e. Тромбоз тазових вен та вен нижньої кінцівки



Правильна відповідь: Тромбоз тазових вен та вен нижньої кінцівки

Питання 39

Правильно

Балів 1 з 1

Рядовий 20-ти років поранений осколком міни в шию. На передній поверхні шиї кровоточива рана 1x1 см, з виділенням бульбашок повітря, підшкірна емфізема. Дихання утруднене. Кашель. Пульс - 100/хв. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Які невідкладні дії треба застосувати для припинення розвитку асфіксії?

- a. Трахеостомія через рану
- b. Киснева терапія
- c. Введення дихальних аналептиків
- d. Штучна вентиляція легенів методом "рот в рот"
- e. Призначення протикашльових препаратів



Правильна відповідь: Трахеостомія через рану

Питання 40

Неправильно

Балів 0 з 1

У дитини 9-ти місяців з важкою формою дизентерії Флекслера на фоні гіпертермії та діареї з'явилися блювання та судоми. Чим викликано погіршення стану дитини?

- a. Токсикозом з ексикозом ✖
- b. Приєднанням менінгіту
- c. Травмою голови
- d. Пухлиною мозку
- e. Нейротоксикозом

Правильна відповідь: Нейротоксикозом

Питання 41

Неправильно

Балів 0 з 1

Потерпілий перебував у вогнищі застосування напалму та продуктів горіння. Доставлений через 1,4-2 години. Скаржиться на головний біль пульсуючого характеру, шум у вухах, появу "туману" перед очима, нарastaючу м'язову слабкість (переважно в ногах). Спостерігається психомоторний розлад, гіперемія обличчя, ейфорія. Пульс - 100/хв., тони серця ослаблені, артеріальний тиск - 85/60 мм рт.ст., частота дихання - 24/хв., дихання везикулярне. Температура тіла - 37,3° С. Поставте діагноз:

- a. Інгаляційне отруєння хлорованими вуглеводнями ✖
- b. Отруєння димом легкого ступеня
- c. Отруєння димом (продуктами горіння, нітрогази)
- d. Гостре пероральне отруєння дихлоретаном важкого ступеня
- e. Гостре отруєння окисом вуглецю

Правильна відповідь: Гостре отруєння окисом вуглецю

Питання 42

Неправильно

Балів 0 з 1

У хворого 62-х років під час операції з приводу видалення пухлини лівої легені під загальним комбінованим знеболенням з однолегеневою інтубацією раптово наступила зупинка роботи серця. Які дії лікаря є оптимальними?

- a. Проведення закритого масажу серця
- b. Введення міорелаксантів
- c. Екстубація хворого
- d. Проведення відкритого масажу серця
- e. Проведення дефібриляції



Правильна відповідь: Проведення відкритого масажу серця

Питання 43

Правильно

Балів 1 з 1

До лікарні госпіталізовано чоловіка у непрітомному стані. Об'єктивно спостерігається: самостійне дихання відсутнє, шкіра блідо-цианотична, тони серця ледь вислуховуються. Який захід надання медичної допомоги є невідкладним у цьому разі?

- a. Штучна вентиляція легенів
- b. Електрокардіографія
- c. Уведення мезатону
- d. Уведення дихальних анолептиків
- e. Уведення атропіну



Правильна відповідь: Штучна вентиляція легенів

Питання 44

Неправильно

Балів 0 з 1

Дівчина віком 25 років госпіталізована до інфекційного відділення у перший день захворювання в тяжкому стані з температурою $39,5^{\circ}\text{C}$, явищами катарального синдрому, висипом геморагічного характеру неправильної форми на шкірі тулуба і кінцівок, деякі елементи з некрозом у центрі. Який імовірний діагноз?

- a. Тромбоцитопенічна пурпурा (хвороба Верльгофа) ✗
- b. Геморагічний васкуліт (хвороба Шенлейна-Геноха)
- c. Менінгококова інфекція, генералізована форма, менінгококцемія
- d. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом
- e. Алергічна реакція

Правильна відповідь: Менінгококова інфекція, генералізована форма, менінгококцемія

Питання 45

Правильно

Балів 1 з 1

Чоловіку віком 30 років, який отримав ураження електричним струмом, проводився комплекс реанімаційних заходів, у результаті чого було відновлено і стабілізовано центральну гемодинаміку і ефективне самостійне дихання, але свідомість не відновилася. Який метод протиішемічного захисту головного мозку найефективніший у цьому разі?

- a. Краніоцеребральна гіпотермія ✓
- b. Уведення тіопенталу натрію внутрішньовено
- c. Уведення оксибутирату натрію внутрішньовенно
- d. Уведення діазепаму внутрішньовенно
- e. Гіпервентиляція за допомогою апарату ШВЛ

Правильна відповідь: Краніоцеребральна гіпотермія

Питання 46

Правильно

Балів 1 з 1

Жінка 30-ти років швидкою допомогою доставлена у непритомному стані з місця автоаварії. Об'єктивно: свідомість відсутня, на більові подразники або спонтанно з'являється тонічне напруження м'язів з випростуванням рук і ніг та закиданням голови назад, двосторонні стопні патологічні рефлекси. Дихання Чейн-Стокса, пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., температура - 37,9°C. Назвіть найбільш імовірний діагноз:

- a. Забій головного мозку важкого ступеня
- b. Внутрішньочерепна гематома
- c. Менінгіт
- d. Гостре порушення мозкового кровообігу
- e. Аневризма судин головного мозку



Правильна відповідь: Забій головного мозку важкого ступеня

Питання 47

Неправильно

Балів 0 з 1

Карета "швидкої допомоги" викликана до вагітної жінки. Вагітність I, 36 тижнів. Тиждень тому жінка лікувалась у пологовому будинку з приводу прееклампсії 2 ст. 20 хвилин тому з'явився різкий біль у животі, слабкість, запаморочення, холодний піт на потилиці. При обстеженні: стан хворої тяжкий, бліда, свідомість запаморочена, артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст., пульс - 136/хв. Живіт збільшено вагітною маткою, матка деформована вип'ячуванням у ділянці дна, напружена при пальпації, дуже болісна, серцебиття плоду не вислуховується. Кров'янистих видіlenь з піхви немає. Встановіть діагноз:

- a. Передлежання плаценти
- b. Шлункова кровотеча
- c. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- d. Розрив матки
- e. Загроза розриву матки



Правильна відповідь: Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

Питання 48

Неправильно

Балів 0 з 1

Студент 2 дні тому прилетів з Індії. Його госпіталізовано в тяжкому стані: голос беззвучний, акроціаноз, загострені риси обличчя, "руки прачки", язык сухий, склери тъяні. Живіт втягнутий. Генералізовані судоми м'язів. Пульс ниткоподібний, артеріальний тиск не визначається. Яка невідкладна допомога необхідна хворому?

 a. Дегідратаційна терапія ✖ b. Ентеросорбція c. Внутрішньовенна регідратація d. Дезінтоксикаційна терапія e. Оральна регідратація

Правильна відповідь: Внутрішньовенна регідратація

Питання 49

Неправильно

Балів 0 з 1

На місті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з пошкодженої автівки вилучено дитину 10-ти років з численними забоями та відкритим переломом гомілки. При огляді спостерігаються задуха, ціаноз шкіри. Права половина грудної клітини не бере участі у диханні. Перкуторно над нею визначається високий тимпаніт, аускультивно дихання не прослуховується, межі серцевої тупості зміщено вліво. Тони серця глухі, прискорені. Ви діагностували напружений правобічний пневмоторакс. Якими будуть Ваші дії?

 a. Призначити кордіамін підшкірно ✖ b. Негайно транспортувати постраждалу дитину до лікарні c. Негайна декомпресія правої плевральної порожнини d. Розпочати штучну вентиляцію легень (ШВЛ) e. Призначити оксигенотерапію

Правильна відповідь: Негайна декомпресія правої плевральної порожнини

Питання 50

Неправильно

Балів 0 з 1

У чоловіка 26-ти років в нижній третині лівого стегна є рана 7x3 см неправильної форми з рваними краями та помірною кровотечею. Близько 20-ти хвилин тому хворого вкусив бродячий пес. Якою буде перша допомога?

- a. ПХО. Рану зашити. Госпіталізація в хірургічний стаціонар для проведення антирабічної профілактики ✖
- b. ПХО. Рану зашити. Амбулаторне спостереження хірурга та рабіолога
- c. Накладання стискальної пов'язки. Рану не зашивати. Госпіталізація в хірургічний стаціонар для проведення антирабічної профілактики
- d. -
- e. ПХО. Рану не зашивати. Амбулаторне спостереження хірурга та рабіолога

Правильна відповідь: Накладання стискальної пов'язки. Рану не зашивати. Госпіталізація в хірургічний стаціонар для проведення антирабічної профілактики

Питання 51

Неправильно

Балів 0 з 1

У 10-місячної дитини внаслідок порушення правил вигодовування виникло багаторазове блювання, рідкі випорожнення 20 разів на добу. При огляді сімейним лікарем дитина різко загальмована, дихання стогнуче. Втрата маси тіла понад 10%. Велике тім'ячко та очні яблука запалі, слизові сухі. Тургор шкіри знижений, шкіра з мармуровим малюнком. Час заповнення капілярів становить 6 сек. ЧСС- 182/хв., АТ- 73/24 мм рт.ст., ЧДР- 66/хв. Останнє сечовипускання було 18 годин тому. Який імовірний діагноз?

- a. Гіповолемічний шок
- b. Септичний шок
- c. Синдром Рея
- d. Помірне зневоднення
- e. Кардіогенний шок ✖

Правильна відповідь: Гіповолемічний шок

Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 43 роки на тлі загальної різкої слабкості з'явилися фібрілярні посмикування м'язів кінцівок із подальшим переходом у генералізовані тонічні судоми. З анамнезу відомо, що три місяці тому переніс субтотальну структомію. Під час огляду спостерігається: свідомість збережена, дихання адекватне, АТ -- 140/80 мм рт.ст.

Симптом Трусско позитивний. Визначте тактику лікаря у цьому разі.

- a. Увести фуросемід 40 мг внутрішньовенно
- b. Забезпечити адекватну оксигенацию
- c. Увести калію хлорид 50 мл внутрішньовенно
- d. Уводити кальцію хлорид 10% внутрішньовенно до припинення тетанії
- e. Увести діазепам 10 мг внутрішньом'язово

Правильна відповідь: Уводити кальцію хлорид 10% внутрішньовенно

до припинення тетанії

Питання 53

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У палату інтенсивної терапії новонароджених переведено недоношену дитину, яка народилася на 30-му тижні гестації. Оцінка за шкалою Апгар при народженні -- 5–6 балів, вага -- 1900 г, помірні дихальні розлади та неврологічна симптоматика, рівень глюкози в крові -- 2,0 ммоль/л. Яку лікувальну тактику треба обрати, враховуючи такі показники глюкози в крові немовляти?

- a. Розпочати в/в уведення 0,9%-го розчину натрію хлориду
- b. Розпочати в/в уведення 20%-го розчину глюкози
- c. Розпочати в/в уведення 5%-го розчину глюкози
- d. Рівень глюкози крові не потребує корекції
- e. Розпочати в/в уведення 10%-го розчину глюкози

Правильна відповідь: Розпочати в/в уведення 10%-го розчину глюкози

Питання 54

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 35-ти років, що страждає на закрепи, скаржиться на сильний, довготривалий біль після дефекації, наявність "смужки" крові в калі. Через біль обмежила вживання їжі. Поставте попередній діагноз:

- a. Гострий парапроктит
- b. Неповна параректальна нориця
- c. Анальна тріщина
- d. Гострий тромбоз гемороїдальних вузлів
- e. Анокуприковий бальовий синдром

Правильна відповідь: Анальна тріщина

Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Постраждалий віком 19 років у непритомному стані госпіталізований з місця ДТП. Об'ективно встановлено: свідомість відсутня, у відповідь на больові подразники мимовільно з'являється тонічне напруження м'язів із випростовуванням рук і ніг та закиданням голови назад, двосторонні стопні патологічні рефлекси. Дихання <<машинне>>, пульс --- 110/хв, артеріальний тиск --- 160/100 мм рт. ст., температура тіла --- 37,9 $^{\circ}$ C) Встановіть попередній діагноз.

- a. Забій головного мозку важкого ступеня
- b. Аневризма судин головного мозку
- c. Менінгіт
- d. Гостре порушення мозкового кровообігу
- e. Внутрішньочерепна гематома

Правильна відповідь: Забій головного мозку важкого ступеня

Питання 56

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 48-ми років скаржиться на наявність пульсуючого болю в ділянці інфільтрату промежини, температура тіла - 38,9°C. При огляді виявлено округлий інфільтрат зліва від ануса, шкіра над ним гіперемована. _Per rectum_: верхня межа інфільтрату вище гребінцевої лінії, пальпація його різко болісна. Ваш діагноз:

- a. Нагноєння епітеліальних куприкових ходів
- b. Туберкульозний наплив в періанальній ділянці
- c. Фурункул періанальної ділянки
- d. Гострий гнійний парапроктит
- e. Кіста парапектальної ділянки

Правильна відповідь: Гострий гнійний парапроктит

Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Першовагітна у терміні 39 тижнів скаржиться на регулярний передмоподібний біль протягом 3-х годин, тривалістю по 20-25 секунд через 3-4 хвилини. При акушерському дослідженні: шийка матки центрована, згладжена, відкриття цервікального каналу - 5 см, плодовий міхур цілий, передлежить головка плоду, стріловидний шов у лівому косому розмірі. Визначте діагноз:

- a. 2-й період перших термінових пологів
- b. 1-й період других термінових пологів, активна фаза
- c. Патологічний прелімінарний період
- d. 1-й період перших термінових пологів, латентна фаза
- e. 1-й період перших термінових пологів, активна фаза

Правильна відповідь: 1-й період перших термінових пологів, активна фаза

Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 28-ми років з виразковою хворобою шлунка внаслідок пілоростенозу розвинувся гіпохлоремічний метаболічний алкалоз. Введення фізіологічного розчину не поліпшило стан. Який із наступних засобів необхідно додати?

- a. Гіпертонічний розчин натрію хлориду
- b. Хлористий кальцій
- c. Хлористий амоній
- d. Хлористий калій
- e. Альбумін

Правильна відповідь: Хлористий калій

Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Восьмимісячна дитина, якій встановлено діагноз: вроджена вада серця (тетрада Фалло), раптом стала неспокійною, посилився ціаноз, прискорилося дихання. Аускультивно в легенях — без особливостей, ЧД — 48/хв., ЧСС — 144/хв, пульс ритмічний. Яка причина погіршення стану у дитини?

- a. Емболія
- b. Непритомність
- c. Гостра коронарна недостатність
- d. Колапс
- e. Задишково-цианотичний напад

Правильна відповідь: Задишково-цианотичний напад

Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпілого було витягнуто з автомобіля після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Скаржиться на біль у шийному відділі хребта, який посилюється під час рухів головою. Вкажіть, який метод транспортної іммобілізації потрібен при даному пошкодженні:

- a. Положення хворого на жорстких ношах з валиком під шию
- b. Іммобілізація жорстким головоутримувачем
- c. Положення хворого на животі на жорстких ношах
- d. Іммобілізація шиною Крамера від потилиці до поперекового відділу хребта
- e. Положення хворого на спині з валиком під головою

Правильна відповідь: Іммобілізація жорстким головоутримувачем

Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Першовагітна в терміні 11-12 тижнів скаржиться на інтенсивний передимоподібний біль внизу живота та кровотечу зі статевих шляхів. Піхвове дослідження: канал шийки матки відкрито на 2 см, в ньому визначається нижній полюс плодового яйця. Кров'янисті виділення рясні. Яка стадія мимовільного аборту?

- a. Повний аборт
- b. Аборт у ходу
- c. Аборт, що не стався
- d. Загрозливий аборт
- e. Неповний аборт

Правильна відповідь: Аборт у ходу

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Повторновагітна 28-ми років в терміні 36 тижнів госпіталізована у відділення патології вагітності зі скаргами на головний біль, підвищення тиску до 160/110 мм рт.ст. та значні набряки кінцівок, живота, обличчя. В сечі: білок - 1,3 г/л та циліндри. В анамнезі: гіпертонічна хвороба та хронічний піелонефрит. На тлі інтенсивної терапії стан вагітної погіршився, з'явилися порушення зору та утруднене носове дихання. Білок зрос до 2,6 г/л, а тиск піднявся до 170/120 мм рт.ст. Яка тактика лікаря?

- a. Індукувати пологи і 2-й період виключити акушерськими щипцями
- b. Термінове розродження - кесарів розтин
- c. Проведення інтенсивної терапії та пролонгування вагітності
- d. Індукувати пологи та провести розродження через природні пологові шляхи
- e. Інтенсивна гіпотензивна, діуретична та седативна терапія

Правильна відповідь: Термінове розродження - кесарів розтин

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальне відділення батько доставив дитину 2-х років у термінальному стані. З його слів з'ясувалося, що на тлі повного здоров'я дитина почала кашляти, задихатися. При огляді: шкіра ціанотична, м'язова гіпотонія, тони серця не прослуховуються. Що з перерахованого нижче є невідкладною та першочерговою дією?

- a. Введення адреналіну 0,1% 0,01 мг/кг
- b. Вентиляція 100% кисню за допомогою мішка Амбу
- c. Штучна вентиляція "рот в рот"
- d. В/в введення 4% розчину NaHCO₃
- e. Очищення дихальних шляхів та забезпечення їх прохідності

Правильна відповідь: Очищення дихальних шляхів та забезпечення їх прохідності

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 45-ти років на 1 добу після субtotальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зоба виникли психомоторне збудження, профузна пітливість, тремор рук, гіперемія обличчя, гіпертермія - 40°C, частота серцевих скорочень - 140/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у даного пацієнта?

- a. Гострий інфаркт міокарда
- b. Гіпотиреоз
- c. Пневмоторакс
- d. Тиреотоксичний криз тяжкого ступеня
- e. Гострий гіпопаратиреоз

Правильна відповідь: Тиреотоксичний криз тяжкого ступеня

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого на 5-й день хвороби спостерігаються гіперемія та набряк мигдаликів, щільні білі плівчасті нашарування, які не знімаються, набряк підшкірної клітковини шиї, загальний ціаноз шкіри, температура тіла - 38,8°C, задишка до 50/хв., шумне дихання, афонія, тахікардія - 140/хв., пульс не визначається, свідомість на рівні сопору. Який лікувальний захід показаний у першу чергу?

- a. Парові лужні інгаляції
- b. Непрямий масаж серця
- c. Введення серцевих глікозидів
- d. Трахеостомія
- e. Штучне дихання рот-до-рота

Правильна відповідь: Трахеостомія

Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 12-річної дівчинки після вживання двох таблеток аспірину температура тіла підвищилася до 39-40оС. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподівану появу червоних плям на шкірі з утворенням пухирів та відшаруванням епідермісу з ерозуванням поверхні. Ураження на шкірі нагадують опіки другого ступеню. Симптом Нікольського - позитивний. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Вульгарна пухирчатка
- b. Багатоформна ексудативна еритема
- c. Токсикодермія
- d. Гострий епідермальний некроліз
- e. Еритродермія

Правильна відповідь: Гострий епідермальний некроліз

Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 19-ти років надійшла на 4-й день хвороби. У пацієнтки блювання, різка слабкість, сонливість, виражена жовтяниця. Через добу хвора не орієнтується в часі, свідомість потьмарена, періодичне психомоторне збудження. Зменшилися розміри печінки. Яке ускладнення зумовило таку клінічну картину?

- a. Гостра надніркова недостатність
- b. Гостра печінкова недостатність
- c. Гостра печінкова колька
- d. Механічна жовтяниця
- e. Гіповолемічний шок

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Декілька працівників фармацевтичного підприємства під час пожежі виявилися заблокованими без можливості самостійної евакуації. Засоби індивідуального захисту на випадок пожежі також були недоступними. Після евакуації рятувальниками до безпечного місця потерпілі мали такі симптоми: запаморочення, порушення зору, нудоту, часте дихання, задишку, вишневий колір обличчя. Для якого виду гіпоксії характерні такі симптоми?

- a. Циркуляторна
- b. Токсична
- c. Гемічна
- d. Респіраторна
- e. Тканинна

Правильна відповідь: Гемічна

Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Розривом міни бійця відкинуло лівим боком на кам'яну брилу, після чого він тимчасово втратив свідомість. Під час огляду блідий, постійно поривається сісти. Порушення цілісності ребер та кісток не виявлено. Живіт болючий в лівому підребер'ї, притуплення перкуторного звуку в бокових відділах. Артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст. Пульс - 120/хв. Який попередній діагноз?

- a. Закрита травма живота, розрив селезінки, геморагічний шок
- b. Тупа травма живота, розрив аневризми черевної частини аорти, геморагічний шок
- c. Закрита травма живота, розрив тонкої кишки, геморагічний шок
- d. Тупа травма живота без пошкодження внутрішніх органів
- e. Тупа травма живота, розрив печінки, травматичний шок

Правильна відповідь: Закрита травма живота, розрив селезінки, геморагічний шок

Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 2-х років під час їжі раптово почався напад надсадного гавкаючого кашлю, інспіраторна задишка, періо- ральний ціаноз, різка слабкість, дитина неспокійна, периферичний пульс слабкий, ЧСС- 146/ хв, ЧД- 40/хв., втягнення піддатливих місць грудної клітки. Який лікувально-діагностичний метод необхідно застосувати у дитини?

- a. Гастродуоденоскопія
- b. Пульсоксиметрія
- c. Бронхоскопія
- d. Бронхографія
- e. Торакоцентез

Правильна відповідь: Бронхоскопія

Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 35 років після апендектомії різко піднявся з ліжка після довгого перебування у горизонтальному положенні, упав та знепритомнів. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, пульс частий, слабкого наповнення. Дихання поверхневе. АТ -- 80/40мм рт.ст. Яку допомогу треба надати пацієнту найперше?

- a. Надати положення за Тренделенбургом
- b. Призначити внутрішньовенно адреналін
- c. Призначити кардіотоніки
- d. Призначити антиаритмічні препарати
- e. Призначити серцеві глікозиди

Правильна відповідь: Надати положення за Тренделенбургом

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 3,5 років із тетрадою Фалло раптово виникли задуха, збудження, дифузний ціаноз і тахікардія. Після призначення пропранололу стан дитини нормалізувався. Яка причина цього епізоду задухи?

- a. Задишково-ціанотичний криз
- b. Стенозувальний ларингіт
- c. Гостра дихальна недостатність
- d. Гостра лівошлуночкова недостатність
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

Правильна відповідь: Задишково-ціанотичний криз

Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Десятирічна дитина перебуває у стані клінічної смерті. Повний комплекс заходів легенево-серцевої реанімації проводився протягом 60 хвилин. Увесь цей час на кардіомоніторі спостерігалася електрична асистолія. Яка подальша тактика реанімаційної бригади?

- a. Увести препарати кальцію у віковій дозі
- b. Увести внутрішньосерцево адреналін у віковій дозі
- c. Продовжувати проведення серцево-легеневої реанімації з повторними введеннями адреналіну у віковій дозі
- d. Провести електричну дефібриляцію
- e. Припинити проведення легенево-серцевої реанімації

Правильна відповідь: Припинити проведення легенево-серцевої реанімації

Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У районі бомбардування, внаслідок спалахування нафтопроводу, знайдено та доставлено у МедР групу обречених. Якими головними критеріями повинен керуватися лікар приймально-сортувального відділення МедР для ранньої діагностики опікового шоку?

- a. Глибина та площа ураження
- b. Задуха, тахікардія
- c. Спрага, м'язове тремтіння
- d. Відчуття холоду, блідість шкіри поза межами опіку
- e. Ціаноз, задуха

Правильна відповідь: Глибина та площа ураження

Питання 75

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпілого 40-ка років, працівника атомної електростанції (АЕС), доставлено у лікарню через 2 доби після техногенної аварії, де він отримав опромінення у дозі 15 Гр. Скарги на слабкість, адінамію, діарею, головний біль, напади болю в животі. Виражена гіперемія шкіри, гіпертермія 38,4°C. Яка причина вказаного стану хворого?

- a. Токсемічна форма променевої хвороби
- b. Кістково-мозкова форма променевої хвороби
- c. Церебральна форма променевої хвороби
- d. Кишкова форма променевої хвороби
- e. Кишкова токсикоінфекція

Правильна відповідь: Кишкова форма променевої хвороби

Питання 76

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнта віком 47 років готують до переливання еритроцитарної маси.

Під час визначення групи крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВ0 з'ясувалося, що аглютинація спостерігається у краплях із сироватками 0 (I) та A (II). Кров якої групи треба перелити пацієнту?

- a. B (III)
- b. A (II)
- c. AB (IV)
- d. --
- e. 0 (I)

Правильна відповідь: B (III)

Питання 77

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 70-ти років раптово з'явилися слабкість, запаморочення.

Виникло багаторазове випорожнення прямої кишки калом з рідиною темно-вишневого кольору, згортками крові. З анамнезу: за останні 5 місяців схуд на 17 кг, останні 3 місяці - закрепи. Об'єктивно: блідий, у лівій здухвинній ділянці пальпується нерухомий болісний інфільтрат.

Роздutі поперечний та низхідний віddіli ободової кишки. Які інструментальні дослідження на першому етапі будуть найбільш доцільними?

- a. Ректороманоскопія, іригоскопія, фіброколоноскопія
- b. Рентгенконтрастне дослідження шлунка, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
- c. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, оглядова рентгенографія грудної клітки
- d. Фіброезофагогастродуоденоскопія, екскреторна урографія
- e. Сцинтиграфія печінки, фракційне дуоденальне зондування

Правильна відповідь: Ректороманоскопія, іригоскопія, фіброколоноскопія

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка віком 28 років скаржиться на біль у животі, який супроводжується блюванням "кавовою гущею", лихоманкою, дрібними висипаннями на ногах, болем у суглобах. Об'єктивно встановлено: петехії різної інтенсивності на кінцівках, живіт м'який, здутий, болючий вздовж кишківника. Гомілкові суглоби припухлі, гарячі на дотик; в загальному аналізі крові лейкоцити — $11,2 \cdot 10^9 / \text{л}$, тромбоцити — $258 \cdot 10^9 / \text{л}$, ЦІК — 249 ОД. Який імовірний діагноз?

- a. Тромбоцитопенічна пурпурा
- b. Геморагічний васкуліт
- c. Неспецифічний виразковий коліт
- d. Портальна гіпертензія
- e. Виразкова хвороба шлунка

Правильна відповідь: Геморагічний васкуліт

Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При роботі на хімкомбінаті у зв'язку з порушенням герметичності газопроводу виник вихід газу, хімічний склад якого спочатку був невідомий. Враховуючи характер виробництва, це могли бути пари азотної, сірчаної кислот, бензолу, нітробензолу, окисів азоту. Через 3 години після перебування в забрудненому приміщенні у робітника з'явився головний біль, головокружіння, тахікардія, задишка, ціаноз губ і рук. Об'єктивно: шкіра і слизові оболонки сіро-синього забарвлення, печінка збільшена, в крові - ретикулоцитоз 40%. Наявністю якої сполуки в крові зумовлене забарвлення шкіри?

- a. Карбоксигемоглобін
- b. Оксигемоглобін
- c. Відновлений гемоглобін
- d. Метгемоглобін
- e. Карбгемоглобін

Правильна відповідь: Метгемоглобін

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнтки віком 33 роки внаслідок розриву аневризми мозкових судин і крововиливу в ділянці стовбура головного мозку, виникла клінічна смерть. Який метод ШВЛ буде найменш ефективним під час проведення реанімаційних заходів?

- a. Рот до маски
- b. З застосуванням мішка Амбу
- c. Рот до носа
- d. Метод Сільвестра
- e. Рот до рота

Правильна відповідь: Метод Сільвестра

Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При огляді кардіологом хорій 11-ти років, який страждає на вродженні ваду серця, раптово знепритомнів. Шкіра та слизові блідо-цианотичні. Дихання агональне. Пульс на магістральних артеріях не визначається. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Колапс
- b. Зупинка серцевої діяльності
- c. Кома
- d. Запаморочення
- e. Простий синкопальний стан

Правильна відповідь: Зупинка серцевої діяльності

Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Населення, яке одержало радіаційне ураження внаслідок бойових дій іонізуючим випромінюванням в районі ядерного вибуху та в зонах радіаційного зараження, відносять до:

- a. Масових втрат
- b. Санітарних втрат
- c. -
- d. Бойових втрат
- e. Радіаційних втрат

Правильна відповідь: Радіаційних втрат

Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіка віком 43 роки госпіталізовано до хірургічного відділення зі скаргами на загальну слабкість, апатію, сонливість, втрату апетиту, жовтяницею шкіри і склер, зуд, печінковий запах із рота. У пацієнта спостерігається виражений судинний малюнок черевної стінки. Печінка збільшена на 4 см, твердої консистенції. Попередній діагноз: гостра печінкова недостатність. Яке медичне дослідження треба провести пацієнту найперше?

- a. Провести УЗД печінки
- b. Провести комп'ютерну томографію печінки
- c. Визначити вміст білірубіну та рівень трансаміназ
- d. Використати відеолапароскопічний метод
- e. Провести ретроградну холангіопанкреатографію

Правильна відповідь: Визначити вміст білірубіну та рівень трансаміназ

Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної на 40-му тижні гестації почалися пологи. Відійшли навколооплідні води, сильно забруднені меконієм. Народилася доношена дівчинка, шкірні покриви рожеві, сильно забруднені меконієм, закричала одразу, м'язовий тонус фізіологічний. Якою повинна бути тактика лікаря в пологовій залі?

- a. Інтубація трахеї, санація верхніх дихальних шляхів
- b. Вимити дитину, обсушити, викласти на живіт матері
- c. Санація рото- та носоглотки, оксигенотерапія
- d. Інтубація трахеї, штучна вентиляція легень (ШВЛ)
- e. Викласти на живіт матері, обсушити

Правильна відповідь: Викласти на живіт матері, обсушити

Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Народився живий доношений хлопчик, масою 3300 г, довжиною 52 см, з тугим обвіттям пуповини навколо шиї. Навколооплідні води без домішок меконію. Нормальне дихання протягом першої хвилини після народження не встановлюється, частота серцевих скорочень - 110/хв., тонус м'язів помірно знижений, незначна відповідь на подразнення. Якою має бути тактика лікаря?

- a. Стиснути грудну клітку
- b. Санація дихальних шляхів
- c. Облити дитину холодною водою
- d. Вдарити по сідницях
- e. Дати струмінь кисню на обличчя

Правильна відповідь: Санація дихальних шляхів

Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 14-ти років з феохромоцитомою розвинувся гіпертензивний криз. Який з перерахованих медикаментів є препаратом вибору для лікування гіпертонічного кризу при феохромоцитомі?

- a. Гідралазін
- b. Есмолол
- c. Ніфедипін
- d. Фентоламін
- e. Атенолол

Правильна відповідь: Фентоламін

Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хлопчика 9-ти років після перенесеної ГВВІ з'явилися полідиспія, поліурія, слабкість, нудота. При обстеженні: свідомість потьмарена, шкіра суха, очні яблука м'які, дихання Куссмауля, запах ацетону з рота, серцеві тони глухі, живіт м'який, неболючий. Глюкоза крові - 19 ммоль/л. Які цукрознижувальні препарати слід призначити в комплексній терапії?

- a. Інсулін пролонгований
- b. Бігуаніди
- c. Інсулін короткої дії
- d. Препарати сульфонілсечовини
- e. Інсулін середньої дії

Правильна відповідь: Інсулін короткої дії

Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінка 35-ти років з 16 років страждає на генералізовані судомні напади, з 21 року епізоди психомоторного збудження із дезорієнтацією і люттю, прогресує зниження пам'яті. Тридцять хвилин тому напад тоніко-клонічних судом із нетриманням сечі. Після цього була дезорієнтована, намагалася бігти. Десять хвилин тому повторний напад. Під час огляду лежить нерухома, майже не реагує на зовнішні подразники, слабка мімічна реакція на біль. Які заходи необхідно вжити для попередження розвитку епілептичного статусу?

- a. Внутрішньом'язово ввести натріо тіопентал
- b. Внутрішньовенно ввести натріо оксибутират
- c. Ввести в клізмі хлоралгідрат
- d. Внутрішньовенно ввести діазепам
- e. Внутрішньом'язово ввести магнію сульфат

Правильна відповідь: Внутрішньовенно ввести діазепам

Питання 89

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

На виробництві мінеральних добрив працівники скаржаться на різкий біль у порожнині рота та стравоході. Під час огляду виявлено: губи та слизова оболонка порожнини рота набряклі, з жовтуватим відтінком. Яка кислота ймовірно викликала отруєння працівників?

- a. Оцтова
- b. Фосфорна
- c. Сірчана
- d. Азотна
- e. Хлористоводнева

Правильна відповідь: Азотна

Питання 90

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пацієнт віком 15 років скаржиться на головний біль, запаморочення, блювання, а також появу множинних синців на шкірі. Об'єктивно спостерігається: асиметрія очних щілин, згладженість лівої носової складки, девіація язика вправо, позитивний симптом Керніга. У загальному аналізі крові --- різке зниження кількості тромбоцитів ($\$45\cdot10^9$/л). Яке ускладнення тромбоцитопенічної пурпури можна припустити?$

- a. Мікроангіотромбоз
- b. Геморагічний інсульт
- c. Ішемічний інсульт
- d. Септичний шок
- e. Геморагічний шок

Правильна відповідь: Геморагічний інсульт

Питання 91

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До пологового віddілення госпіталізовано жінку віком 30 років у терміні вагітності 35 тижнів. Зі слів родичів, вдома у неї тричі виникали судомні напади. Протягом останніх двох днів скаржилася на головний біль, набряки нижніх кінцівок. Об'єктивно спостерігається: свідомість відсутня, ціаноз шкірних покривів, пульс --- 90/хв., напруженій, АТ --- 185/120 мм рт. ст. Яке захворювання розвинулося у пацієнтки?

- a. Інсульт
- b. Еклампсія
- c. Епілепсія
- d. Прееклампсія
- e. Нефропатія

Правильна відповідь: Еклампсія

Питання 92

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дівчинки 7-ми років після хіміотерапії з'явилася петехіальна висипка на шкірі, а потім виникла важка кровотеча з носа. Які заходи слід провести в обласній лікарні для зупинки кровотечі?

- a. Тампонада, введення преднізолону
- b. Гемотрансфузія, тампонада
- c. Тампонада, трансфузія тромбоконцентрату
- d. Тампонада, трансфузія пазми
- e. Тампонада, введення вікасолу

Правильна відповідь: Тампонада, трансфузія тромбоконцентрату

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 50-річного чоловіка протягом 2-х днів відзначаються рідкі випорожнення черного кольору. Болю у епігастральній ділянці немає. При огляді: блідість шкірних покривів і кон'юнктиви, "судинні зірочки" на шкірі грудей, розширення вен передньої стінки живота, гепатомегалія. Артеріальний тиск - 105/60 мм рт.ст. Промивні води шлунка типу "кавової гущі". Лікар визначив кровотечу з вен стравоходу. Які препарати разом з трансфузійною та гемостатичною терапією слід призначити в першу чергу?

- a. Тіотриазолін
- b. Метоклопрамід
- c. Вазопресин
- d. Аргініну глутамат
- e. Алюмінію гідроокис

Правильна відповідь: Вазопресин

Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хлопець віком 15 років хворіє на цукровий діабет упродовж 10-ти років. Протягом останнього тижня у нього діагностовано ентероколіт, скаржиться на слабкість та часте сечовипускання. Сьогодні з'явилися галюцинації, олігурія. Пацієнт втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: судоми, шкіра і слизові оболонки сухі, бліді, язик сухий, тургор тканин різко знижений, гіпертонус м'язів. Виявляються менінгеальні симптоми, очні яблука м'які, з рота запаху ацетона немає. Дихання часте, поверхневе. Тони серця глухі до 110/хв, АТ --- 80/40 мм рт. ст, живіт м'який. Яку невідкладну терапію треба провести пацієнту?

- a. Інсулінотерапію методом малих доз, регідратацію (в/в краплинне введення 5%-го розчину глюкози)
- b. Інсулінотерапію методом малих доз, регідратацію (в/в краплинне введення 0,9%-го розчину хлориду натрію)
- c. Інсулінотерапію методом малих доз, призначити глюкокортикоїди
- d. Інсулінотерапію методом малих доз, регідратацію (в/в краплинне введення 1,8%-го розчину хлориду натрію)
- e. Регідратацію (в/в краплинне введення 5%-го розчину глюкози), антибактеріальну терапію

Правильна відповідь: Інсулінотерапію методом малих доз, регідратацію (в/в краплинне введення 0,9%-го розчину хлориду натрію)

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 32-х років після перебування у лісі та контакту з мурахами з'явилися набряк суглобів рук, блювання, біль у шлунку, остуда, утруднене дихання, загальна слабкість. При огляді хворого відзначено набряк обличчя, шкірні покриви гіперемовані. Над легенями вислуховуються жорстке дихання, сухі свистячі хрипи. Тахікардія. Артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Які заходи невідкладної допомоги необхідно провести хворому?

- a. Введення антигістамінних препаратів
- b. Введення адреналіну
- c. Призначення сорбентів
- d. Введення кордіаміну
- e. Введення серцевих глікозидів

Правильна відповідь: Введення адреналіну

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 54-х років з приводу відсутності пульсу на сонних артеріях і дихання вже протягом 10 хвилин бригадою екстреної медичної допомоги (ЕМД) проводяться реанімаційні заходи: зовнішній масаж серця, штучне дихання мішком Амбу, введення адреналіну, дефібриляція. Стан залишається без змін. З якою частотою і на яку глибину має здійснюватися компресія грудної клітки?

- a. 60-80/хв. та 4-5 см
- b. 100-120/хв. та 5-6 см
- c. 140/хв. та 4-5 см
- d. 100-120/хв. та 3-4 см
- e. 90-100/хв. та 4-5 см

Правильна відповідь: 100-120/хв. та 5-6 см

Питання 97

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 50-ти років з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок після фізичного навантаження з'явилася виражена задишка, біль в грудній клітці з правого боку, серцебиття, запаморочення, минущі порушення свідомості. Об'єктивно: шкіра блідо-ціанотична. Тахіпное - 40/хв., сухі свистячі хрипи. Тахікардія - 130/хв. Артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. На ЕКГ - відхилення електричної осі праворуч, блокада правої ніжки пучка Гіса. Який діагноз найбільш імовірний у хворого?

- a. Плеврит
- b. Інфаркт міокарду
- c. Спонтанний пневмоторакс
- d. Гостра інтерстиціальна пневмонія
- e. Тромбоемболія легеневої артерії

Правильна відповідь: Тромбоемболія легеневої артерії

Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта на 5-ту добу після операції розвинулася клінічна картина тромбоемболії легеневої артерії, настала раптова коронарна смерть. Який препарат необхідно було призначити для профілактики цього ускладнення?

- a. Аспірин
- b. Реополіглюкін
- c. Трентал
- d. Курантіл
- e. Еноксипарин

Правильна відповідь: Еноксипарин

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

При огляді дівчинка 7-ми років непритомна. Шкіра та слизові блідо-цианотичні. Екскурсій грудної клітки немає. Пульс на магістральних артеріях не визначається. Ваша тактика:

- a. Констатувати смерть та викликати поліцію
- b. Покликати на допомогу педіатра
- c. Викликати "швидку"
- d. Почати внутрішньовенне введення ліків
- e. Розпочати серцево-легеневу реанімацію

Правильна відповідь: Розпочати серцево-легеневу реанімацію

Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 53 роки транспортуваний до приймального відділення з діагнозом: гострий коронарний синдром. Під час реєстрації ЕКГ раптово втратив свідомість, зіниці розширилися. На стрічці спостерігається хвиляста лінія. З чого треба розпочати невідкладну допомогу?

- a. Інтубації
- b. Уведення адреналіну
- c. Уведення кордарону
- d. Штучного дихання
- e. Дефібриляції

Правильна відповідь: Дефібриляції

Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 14-річного хлопчика під час тривалого стояння раптово з'явилися запаморочення, потемніння в очах, хлопчик знепритомнів. Об'єктивно: дитина без свідомості, блідість шкірних покривів, холодний піт. Відзначаються тахікардія, ниткоподібний пульс, зниження артеріального тиску. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Тампонада серця
- b. Гостра серцева недостатність
- c. Гостра коронарна недостатність
- d. Кома
- e. Колапс

Правильна відповідь: Колапс

Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Військовослужбовця віком 46 років доставлено до приймального відділення із поля бою. Дві години тому отримав закриту травму грудної клітки внаслідок руйнування будівлі. Об'єктивно спостерігається: частота дихання --- 30/хв, артеріальний тиск --- 90/60 мм рт. ст., пульс --- 110/хв. Шкіра обличчя та тулуба ціанотичні. На грудній клітці та ший пальпується підшкірна емфізема, перкуторно --- тимпаніт над лівою поверхнею грудної клітки. Визначте лікувально-діагностичну тактику.

- a. Дренування лівої плевральної порожнини у II міжребер'ї по середньоключичній лінії
- b. Реанімаційна торакотомія зліва
- c. Перикардіоцентез
- d. Дренування лівої плевральної порожнини у V міжребер'ї по середньоключичній лінії
- e. Дренування лівої плевральної порожнини у VII міжребер'ї по задній аксілярній лінії

Правильна відповідь: Дренування лівої плевральної порожнини у II міжребер'ї по середньоключичній лінії

Питання 103

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої дитини на 4-й день життя з'явилися кривава блювота до 3- 4 разів на день, випорожнення темнокоричневого кольору до 4-5 разів на добу, кровотеча з пупкової ранки, петехіально-плямистий висип на тулубі та кінцівках. Який діагноз найімовірніший?

- a. Вада розвитку шлунково-кишкового тракту
- b. Синдром проковтнутої материнської крові
- c. Пологова травма
- d. Геморагічна хвороба новонароджених
- e. Гемолітична хвороба новонароджених

Правильна відповідь: Геморагічна хвороба новонароджених

Питання 104

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Підліток віком 16 років скаржиться на біль у правій здухвинній ділянці з іrrадіацією в калитку та збільшення її розмірів. Температура тіла -- 37,8 $^{\circ}$ C) Три дні тому, граючи у футбол, хлопець отримав удар м'ячем у пах. Об'єктивно встановлено: шкіра бліда. Під час пальпації живота змін не виявлено, спостерігається потовщення і болючість придатка та гіпремія калитки. Встановіть діагноз.

- a. Гострий епідидимоорхіт справа
- b. Перекрут яєчка
- c. Гострий інфекційний орхіт
- d. Гостре гідроцеле
- e. Кіста придатка

Правильна відповідь: Гострий епідидимоорхіт справа

Питання 105

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У вагітної під час стрімких пологів з'явилися відчуття задухи, ціаноз, падіння артеріального тиску. Через деякий час кров, що надходила з піхви, перестала згортатися. Який найбільш імовірний діагноз?

- a. Анафілактичний шок
- b. Бронхіальна астма
- c. Серцева недостатність
- d. Емболія навколоплідними водами
- e. Гіпотонічна маткова кровотеча

Правильна відповідь: Емболія навколоплідними водами

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Для зниження артеріального тиску жінка прийняла кілька таблеток клофеліну. За 30--40 хв у неї з'явилися запаморочення, слабкість, порушення орієнтації в просторі та погіршення пам'яті. Об'єктивно спостерігається: помірна брадикардія -- 50/хв, зниження артеріального тиску до 100/60 мм рт.ст., частота дихання -- 14/хв. Який із наведених заходів доцільно насамперед застосувати для надання допомоги пацієнці?

- a. Використати активоване вугілля
- b. Провести форсований діурезу
- c. Увести внутішньовенно кордіамін
- d. Увести атропін
- e. Розпочати інфузію допаміну

Правильна відповідь: Використати активоване вугілля

Питання 107

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Потерпіла 25-ти років доставлена в хірургічне відділення через 2 години після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з закритою травмою живота з ознаками внутрішньоочеревинної кровотечі. Доставлено в операційну. Під час ревізії в черевній порожнині знайдено до 1,5 л рідкої крові. Селезінка пошкоджена в декількох місцях. Інших пошкоджень не виявлено. Який вид трансфузії слід застосувати?

- a. Реінфузія крові
- b. Трансфузія еритроцитарної маси
- c. Пряма гемотрансфузія
- d. Трансфузія замороженої плазми
- e. Замінне переливання

Правильна відповідь: Реінфузія крові

Питання 108

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 12-ти років на тлі неревматичного кардиту з'явилися занепокоєння, акроціаноз, експіраторна задишка, біль за грудниною, кінцівки холодні, вологі, артеріальна гіпотензія. Які заходи необхідні під час транспортування?

- a. Горизонтальне положення з опущеним головним кінцем
- b. Положення на правому боці
- c. Горизонтальне положення з піднятим головним кінцем
- d. Ортопное
- e. Положення на лівому боці

Правильна відповідь: Ортопное

Питання 109

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хвора 42-х років доставлена у сопорозному стані до лікарні машиною швидкої допомоги. З анамнезу, що зібраний зі слів рідних, відомо, що хвора страждає на Аддісонову хворобу. Напередодні відзначалося неодноразове блювання. Під час огляду: риси обличчя загострені, гіперпігментація шкіри, артеріальний тиск - 50/30 мм рт.ст. У додаткових дослідженнях: цукор крові - 3,5 ммоль/л, аглюкозурія, відсутність ацетону в сечі, осмолярність крові - 295 мосмоль/л. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Гіперкетонемічна прекома
- b. Гіперацидотична кома
- c. Гіpopітутарна кома
- d. Аддісонова криза
- e. Гіперлактацидемічна кома

Правильна відповідь: Аддісонова криза

Питання 110

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час бою солдата відкинуто вибухом на спину. Доставлений на МПБ через 2 години. Турбує задишка, біль у грудях. Пульс - 130/хв., АТ- 100/70 мм рт.ст., ЧД- 14/хв. При огляді по середньо-ключичній лінії справа, на рівні IV ребра - рвана рана 2x3 см, з якої виділяється цівкою ала кров. Яку першу лікарську допомогу слід надати пораненому?

- a. Проведення гемостатичної терапії
- b. Невідкладна торакотомія
- c. Пальцеве притискання рани
- d. Проведення ПХО рани
- e. Тампонада рани

Правильна відповідь: Тампонада рани

Питання 111

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

До реанімаційного відділення госпіталізовано чоловіка віком 54 років, без свідомості, із проявами клонічних судом. Під час огляду пацієнта виявлено: експурсія грудної клітки та пульсація на магістральних судинах відсутні, зіниці помірно розширені, на світло не реагують. На кардіомоніторі електрична активність серця збережена. Який із нижченаведених заходів буде малоефективним у цьому разі?

- a. Внутрішньовенне струменеве введення адреналіну
- b. Штучна вентиляція легень
- c. Непрямий масаж серця
- d. Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- e. Електрична дефібриляція

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

Питання 112

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка віком 42 роки первинно з'явився напруженій набряк правого надпліччя і всієї правої руки з ціанозом та посиленням венозного малюнку на плечі і надпліччі. Пальпаторно відзначається болючість в аксилярній ямці та по ходу судинного пучка на плечі. Пульсація артерій збережена, але ослаблена через набряк. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- a. Тромбоз правої підключичної вени
- b. Тромбоемболія правої аксилярної артерії
- c. Гнійний артрит правого плечового суглоба
- d. Флегмона правого плеча
- e. Правобічний гідраденіт

Правильна відповідь: Тромбоз правої підключичної вени

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У новонародженої дитини від матері-носія поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) стан задовільний. Активна, дихальних розладів нема. Печінка на 2 см нижче реберної дуги. Сеча світла, меконій відходить. Які профілактичні заходи треба призначити дитині?

- a. Вакцинація проти гепатиту В на I добі життя
- b. Ізоляція дитини, щоб уникнути поширення інфекції
- c. Очікувальна тактика, вакцинацію відкласти
- d. Скринінг матері на антиген гепатиту В
- e. Скринінг дитини на HBsAg, вакцинація заборонена

Правильна відповідь: Вакцинація проти гепатиту В на I добі життя

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини віком 10 років після дорожньо-транспортної пригоди спостерігається тривала кровотеча, відкритий перелом плеча, тупа травма живота, перелом стегна. Частота серцевих скорочень --- 120/хв, артеріальний тиск --- 60/40 мм рт. ст. У результаті дослідження крові виявлено: Hb --- 96 г/л, еритроцити --- $3,8 \cdot 10^{12}/\text{л}$, Ht --- 0,37. З яких кровозамінників треба розпочати інфузійну терапію?

- a. Цільна кров
- b. Еритроцитарна маса
- c. Свіжозаморожена плазма
- d. Кристалоїди
- e. Альбумін

Правильна відповідь: Кристалоїди

Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта після введення 100 мл реополіглюкіна з'явилися головний біль, шум у вухах, відчуття жару, пухірцевий висип, спастичний кашель, прискорене дихання, нудота, тахікардія. Артеріальний тиск знизився до 70/40 мм рт. ст. Які заходи терапії треба використати?

- a. Адреналін в/м, оксигенотерапію
- b. Супрастин в/в, оксигенотерапію
- c. Преднізолон, супрастин в/в
- d. Реополіглюкін, адреналін в/в
- e. Оксигенотерапію, преднізолон в/м

Правильна відповідь: Адреналін в/м, оксигенотерапію

Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 49-ти років скаржиться на тотальну макрогематурію зі згортками крові хробакоподібної форми, тупий біль у правій поперековій області. При ультразвуковому дослідженні (УЗД) - права нирка збільшена, контур верхнього полюсу горбистий. Про яке захворювання, в першу чергу, слід думати?

- a. Гострий гломерулонефрит
- b. Обструктивний пієлонефрит
- c. Аномалія розвитку нирок
- d. Пухлина сечоводу
- e. Пухлина нирки

Правильна відповідь: Пухлина нирки

Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Рядового віком 19 років, який отримав опіки тулуба і верхніх кінцівок під час вибуху ємності з пальним, направили до медичної роти бригади. Стан середньої тяжкості. Об'єктивно спостерігається: АТ — 100/65 мм рт. ст., пульс — 105/хв. На верхніх кінцівках і грудній клітці визначаються ділянки гіперемії та набряку міхурів, блідість шкіри з утратою болювої і тактильної чутливості. Яку допомогу треба надати на цьому етапі медичної евакуації?

- a. Накласти суху асептичну пов'язку
- b. Обробити рани масляним розчином
- c. Увести дексаметазон
- d. Увести допамін в/в крапельно
- e. Обробити рани дегазуючою рідиною

Правильна відповідь: Накласти суху асептичну пов'язку

Питання 118

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого з менінгококовою інфекцією, синдромом Уотерхауса-Фрідеріксена в приймальному відділенні виникла зупинка дихання, артеріальний тиск виміряти не вдається, ЧСС- 58/хв. Які невідкладні дії лікаря приймального відділення?

- a. Термінова трахеостомія
- b. Вентиляція мішком Амбу
- c. Введення великих доз глюкокортикоїдів
- d. Введення адреналіну
- e. Введення кордіаміну

Правильна відповідь: Вентиляція мішком Амбу

Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 59-ти років з пухлиною лівої легені при проведенні під інтубаційним наркозом операції (торакотомії з видаленням легені) відбулася зупинка роботи серця. Що необхідно провести першочергово?

- a. Продовжувати проведення операції
- b. Провести непрямий масаж серця
- c. Вести в/в адреналін
- d. Вести в/в атропін
- e. Провести пряний масаж серця

Правильна відповідь: Провести пряний масаж серця

Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час проведення реанімаційних заходів у пацієнта із раптовою зупинкою сечя, який перебуває на стаціонарному лікуванні, протягом 5 хвилин спостерігається рефрактерна асистолія. Реаніматолог повідомили, що пацієнт перед зупинкою серця випадково отримав внутрішньовенну ін'екцію 50 мл 4%-го калію хлориду замість 0,9%-го хлориду натрію. Який препарат треба терміново додати до комплексу реанімаційних заходів?

- a. 40 мл 40%-ї глюкози внутрішньовенно
- b. 10 мл 10%-го кальцію хлориду внутрішньовенно
- c. 1 мл 0,025%-го дигоксину внутрішньовенно
- d. 10 мл аспаркаму внутрішньовенно
- e. 5 мл 3%-го кордарону внутрішньовенно

Правильна відповідь: 10 мл 10%-го кальцію хлориду внутрішньовенно

Питання 121

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Першовагітна 22-х років, термін вагітності 8 тижнів, скаржиться на рясні кров'янисті виділення зі статевих шляхів та біль внизу живота передимоподібного характеру. При піхвовому дослідженні: матка збільшена відповідно до 8 тижнів вагітності, шийка матки вкорочена, цервікальний канал вільно пропускає 1 палець і в ньому визначається плодовий міхур та частини плодового яйця; виділення рясні кров'янисті. Яка тактика лікаря?

- a. Призначення препаратів, що пролонгують вагітність
- b. Спостереження за вагітною
- c. Ультразвукове дослідження
- d. Вишкрібання порожнини матки
- e. Кольпоскопія

Правильна відповідь: Вишкрібання порожнини матки

Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У 6-місячної дитини, яка отримувала терапію з приводу гострого ешерихіозного ентероколіту, з'явилися млявість, блідість шкірних покривів, набряклість обличчя, ін'екція склер, а через дві доби - олігурія, жовтяничність, петехіальний висип, одноразова носова кровотеча. Сеча іржаво-коричневого кольору. У загальному аналізі крові: тромбоцитопенія. У цьому випадку можна припустити:

- a. Гострий гломерулонефрит
- b. Гострий пієлонефрит
- c. Дисбіоз кишечника
- d. Гемолітико-уремічний синдром
- e. Спадкову гемолітичну анемію

Правильна відповідь: Гемолітико-уремічний синдром

Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Жінку віком 74 роки госпіталізовано до приймального відділення з діагнозом: повторне гостре порушення мозкового кровообігу в правій гемісфері, лівобічний геміпарез. Із анамнезу відомо, що пацієнка перенесла геморагічний інсульт. Пацієнта неконтактна, не розмовляє, очі розпллюють тільки коли відчуває біль, моторна реакція на біль - у вигляді флексії кінцівок. Оцініть стан свідомості у пацієнтки за шкалою ком Глазго.

- a. Смерть мозку (3 бали)
- b. Оглушення (13–14 балів)
- c. Сопор (9–12 балів)
- d. Кома (8 балів)
- e. Ясна свідомість (15 балів)

Правильна відповідь: Кома (8 балів)

Питання 124

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Новонароджений, який народився у стані важкої асфіксії, на 3-тю добу життя мають місце ністагм, опістотонус, часті напади судом, відсутні рефлекси смоктання та ковтання. Запідохрено внутрішньочерепний крововилив. Який метод дослідження слід призначити для підтвердження діагнозу?

- a. Люмбальна пункція
- b. Кислотно-лужний баланс крові
- c. УЗД головного мозку
- d. Електроенцефалографія
- e. Клінічний аналіз крові

Правильна відповідь: УЗД головного мозку

Питання 125

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 34 роки госпіталізований до стаціонару у тяжкому стані. У результаті клініко-лабораторних досліджень встановлено: фруктовий запах із рота, гіпотензія, дегідратація, електролітні порушення, гіперглікемія, кетонурія. Визначте ймовірний діагноз у пацієнта.

- a. Нецукровий діабет
- b. Діабетичний кетоацидоз
- c. Гостра надниркова недостатність
- d. Синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону
- e. Гіперосмолярний гіперглікемічний синдром

Правильна відповідь: Діабетичний кетоацидоз

Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У недоношеної новонародженої дитини протягом перших 6 годин після народження з'явилися почастішання дихання до 60/хв., асинхронність руху грудної клітки і черевної стінки, роздування крил носа, втягнення міжреберних проміжків та груднини, участь допоміжних м'язів в акті дихання. Яке діагностичне дослідження треба провести?

- a. Рентгенографію черепа
- b. Ультразвукове дослідження мозку
- c. Рентгенографію грудної клітки
- d. Рентгенографію черевної порожнини
- e. Діафаноскопію черепа

Правильна відповідь: Рентгенографію грудної клітки

Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хлопчика 5-ти років вночі стався напад ядухи, який характеризувався: сухим кашлем, експіраторною задишкою, відчуттям стиснення у грудях. В акті дихання бере участь допоміжна мускулатура. В анамнезі - напади ядухи 1-2 рази на місяць протягом 3-х років, атопічний дерматит з 2-х років. Препарatom вибору для надання першої допомоги на догоспітальному етапі є:

- a. Інгаляційні глюокортикостероїди
- b. Метилксантини
- c. Інгаляційні холінолітики
- d. Бета-2-агоністи короткої дії
- e. Пролонговані бета-2-агоністи

Правильна відповідь: Бета-2-агоністи короткої дії

Питання 128

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У чоловіка, який перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу гострого інфаркту міокарда і отримує гепарин у дозі 5000 Од підшкірно 4 рази на добу, з'явилися різка слабість, блідість, випорожнення чорного кольору. Гемоглобін --- 96 г/л. Що треба застосувати для нейтралізації дії гепарину?

- a. Кальцію хлорид
- b. Амінокапронову кислоту
- c. Свіжозаморожену плазму
- d. Протаміну сульфат
- e. Апротинін

Правильна відповідь: Протаміну сульфат

Питання 129

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 44-х років після вживання алкоголя з'явились нудота, багаторазове блювання, спочатку їжею, а потім згортками крові, слабкість. При огляді: шкіряні покриви та слизові оболонки бліді, пульс - 120/хв., при пальпації живіт м'який, безболісний у всіх відділах; в лівому підребер'ї визначається збільшена, тверда селезінка. У хворого підозрюється кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу. Яку тактику слід обрати?

- a. Ургентна лапаротомія, пластика стравоходу
- b. Ендоскопічна зупинка кровотечі
- c. Спостереження в умовах хірургічного стаціонару
- d. Введення холодної амінокапронової кислоти через зонд
- e. Застосування методики керованої гіпотензії

Правильна відповідь: Ендоскопічна зупинка кровотечі

Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 37 років 10 днів тому отримав тупу травму лівого стегна. Одразу ж виникли набряк та біль у ділянці травми. За 7 днів біль значно посилився, підвищилася температура тіла, з'явилися слабкість та нудота. Об'єктивно спостерігається: температура тіла -- 39 $^{\circ}\text{C}$, ЧД -- 28/хв, ЧСС -- 110/хв, набряк, гіперемія та різкий біль під час пальпації у ділянці лівого стегна, сукровичні виділення. У загальному аналізі крові виявлено лейкоцитоз зі зсувом лейкоцитарної формулі вліво. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

- a. Лімфангіт лівого стегна
- b. Бешихове запалення лівого стегна
- c. Флегмона лівого стегна
- d. Тромбофлебіт підшкірних вен лівого стегна
- e. Нагноєння гематоми лівого стегна

Правильна відповідь: Нагноєння гематоми лівого стегна

Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У пацієнта 72-х років три дні тому з'явився помірний біль в животі постійного характеру, який поступово став переймоподібним. Причину захворювання пов'язує з вживанням великої кількості мучної їжі. За останні 2 години блювання коричневого кольору з неприємним фекальним запахом. Стілець відсутній. Живіт здутий, м'який, болючий в нижній половині. Симптоми подразнення очеревини відсутні. Перистальтика посиlena, звучна. В правій здухвинній ділянці нечіткий інфільтрат. Позитивний симптом Склерова. Ректально - болючості, нависання немає, на рукавичці слиз. Ваш попередній діагноз:

- a. Гострий панкреатит
- b. Защемлена грижа
- c. Гостра обтураційна кишкова непрохідність
- d. Гострий гастроентерит
- e. Апендикулярний інфільтрат

Правильна відповідь: Гостра обтураційна кишкова непрохідність

Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Хворий 45-ти років страждає на хронічну надніркову недостатність внаслідок туберкульозу наднірників. Під час відпочинку після тривалого перебування на сонці у нього посилилася загальна слабкість, тахікардія досягла 150/хв., артеріальний тиск знизився до 70/20 мм рт.ст., з'явилися олігурія, адінамія, нудота, блювання, біль у животі, депресія. Який діагноз найбільш імовірний у даного хворого?

- a. Гостра наднірникова недостатність
- b. Гостра печінкова недостатність
- c. Гостра ниркова недостатність
- d. Сонячний удар
- e. Гостра серцева недостатність

Правильна відповідь: Гостра наднірникова недостатність

Питання 133

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У приймальному відділенні лікарні чоловік віком 30 років скаржиться на інтенсивний <<кинжалний>> біль в епігастрії, тошноту та загальну слабкість. Захворів раптово 2 години тому. З анамнезу відомо, що виразкового ураження ШКТ не було. Об'єктивно спостерігається: загальний стан відносно середнього ступеню тяжкості, температура тіла -- 37,0\$^\circ\text{C}\$, пульс -- 110/хв, АТ -- 100/70 мм рт. ст. Живіт в акті дихання участі не бере, напруженій. <<Печінкова тупість>> не визначається. Симптом подразнення брюшини позитивний у всіх відділах. Для якого патологічного стану характерні такі симптоми?

- a. Гострий апендицит. Локальний перитоніт
- b. Розрив аневризми аорти. Геморагічний шок
- c. Перфорація порожнистого органа. Болювий синдром
- d. Загострення виразкової хвороби шлунку
- e. Гострий панкреатит. Асцит

Правильна відповідь: Перфорація порожнистого органа. Болювий синдром

Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини з гострою кишковою інфекцією розвинулася клініка парезу кишечника - живіт здутий, гази відходять погано, кишкові шуми ледве прослуховуються. Введення якого препарату має першочергове значення?

- a. Глюкоза
- b. Цефазолін
- c. Альбумін
- d. Неогемодез
- e. Хлорид калію

Правильна відповідь: Хлорид калію

Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хлопчика 9-ти років впродовж останнього року спостерігаються повторні епізоди гострого пульсуючого однобічного головного болю в асоціації з нудотою, блюванням та болем у животі. Головний біль виникає після вживання шоколаду, сиру, горіхів та йому передують візуальні розлади та м'язова слабкість. Звичайно сон полегшує головний біль. Поза приступами дитина здорована. У матері в дитинстві були подібні напади. Ваш попередній діагноз:

- a. Пухлина мозку
- b. Мігрень
- c. Харчова алергія
- d. Епілепсія
- e. Головний біль напруги

Правильна відповідь: Мігрень

Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У дитини 3-х років, яка перебуває у стаціонарі, на тлі гострої респіраторної інфекції 3 рази було блювання, непокоїть гострий біль у животі. Температура тіла - 38,5оС. Шкіра бліда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор крові - 4,0 ммоль/л. Який з діагнозів найбільш імовірний?

- a. Цукровий діабет
- b. Ацетонемічний стан
- c. Гострий гастроентерит
- d. Діабетична кома
- e. Гострий апендицит

Правильна відповідь: Ацетонемічний стан

Питання 137

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого, який лікується у стаціонарі з приводу апендикулярного інфільтрату, на 5 добу посилився біль у правій здухвинній ділянці, з'явилася гарячка до 39оС з ознобом. Яка найбільш імовірна причина такого стану?

- a. Апендикулярний абсцес
- b. Флегмона заочеревинного простору
- c. Дифузний перитоніт
- d. Флегмона передньої черевної стінки
- e. Гостра кишкова непрохідність

Правильна відповідь: Апендикулярний абсцес

Питання 138

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт 74-х років протягом останніх 5-ти років страждає на добреjakісну гіперплазію простати. 4 доби тому, після вживання алкоголю, виникла гостра затримка сечовипускання. На догоспітальному етапі двічі на добу катетеризували сечовий міхур металевим катетером. Під час огляду: придаток правого яєчка збільшений, ущільнений, болючий, є гнійні виділення з уретри. Який вид невідкладної допомоги слід обрати?

- a. Трансуретральна резекція
- b. Встановлення інтраректального стенту
- c. Мікрохвильова термотерапія простати
- d. Епіцистостомія в ургентному порядку
- e. Встановлення постійного уретрального катетера

Правильна відповідь: Епіцистостомія в ургентному порядку

Питання 139

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Лікарю швидкої допомоги треба надати допомогу молодому чоловікові, який із метою суїциду прийняв 25 таблеток атропіну. Об'єктивно: збуджений, періодично маячня, шкіра червона, гаряча, суха, пульс частий, задишка, зінниці розширені. З чого треба розпочати лікування?

- a. Введення в шлунок розчину сульфату натрію та активованого вугілля
- b. Прозерин п/ш
- c. Зондове промивання шлунка
- d. Аміназин в/в
- e. Анальгін в/в

Правильна відповідь: Зондове промивання шлунка

Питання 140

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловіку віком 60 років із клінічними симптомами гемотампонади серця треба терміново провести пункцию перикарда. Визначте місце пункциї.

- a. Крізь грудину. Ззовні-всередину
- b. У четвертому міжребер'ї на 3 см ліворуч від грудини. Ззовні-всередину
- c. Зліва від основи мечоподібного відростка. Знизу-вгору-вправо по задній поверхні грудини
- d. Нижче мечоподібного відростка. Знизу-вгору по задній поверхні грудини
- e. Справа від основи мечоподібного відростка. Знизу-вгору-вліво по задній поверхні грудини

Правильна відповідь: Зліва від основи мечоподібного відростка. Знизу-вгору-вправо по задній поверхні грудини

Питання 141

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Військовослужбовець унаслідок вибухової хвили отримав сильний удар грудьми об кам'яну брилу. Об'єктивно спостерігається: у постраждалого ціаноз обличчя, акроцианоз, тахіпное до 40/хв., роздуті шийні вени, АТ - 65/40 мм рт. ст., тони серця глухі. Який попередній діагноз?

- a. Тампонада серця
- b. Тромбоемболія легеневої артерії
- c. Напружений пневмоторакс
- d. Гемоторакс
- e. Гострий респіраторний дистрес-синдром

Правильна відповідь: Тампонада серця

Питання 142

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт 32-х років звернувся до лікаря зі скаргами на нездужання, підвищення температури тіла до 38°C , періодичний біль у надчревній ділянці, нудоту й блювання. На другий день погіршився зір, неможливо стало читати газету, з'явився туман та сітка перед очима. Об'єктивно: двобічний птоз, анізокорія, ністагм, погіршення ковтання. За два дні до цього вживав рибні консерви. У хворого є підоозра на ботулізм.

Основним напрямком у лікуванні є призначення:

- a. Серцевих глікозитів
- b. Левоміцептину в дозі 0,5 г 4 рази на добу
- c. Сольових розчинів
- d. Церебральної пункції
- e. Протиботулінічної антитоксичної сироватки

Правильна відповідь: Протиботулінічної антитоксичної сироватки

Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Новонароджений дитині з важкою асфіксією під час народження проведено первинну реанімацію в пологовому залі. Після стабілізації стану дитину перевели до відділення інтенсивної терапії та розпочали моніторинг лабораторних досліджень. Які з наведених нижче лабораторних показників потребують корегування?

- a. Рівень загального кальцію 2,1 ммоль/л
- b. Рівень глюкози в крові 5,5 ммоль/л
- c. Рівень глюкози в крові 2,5 ммоль/л
- d. Рівень калію 5,0 мімоль/л
- e. Рівень натрію 140 мімоль/л

Правильна відповідь: Рівень глюкози в крові 2,5 ммоль/л

Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Рядовий надійшов у медичну роту через 1,5 години після поранення в живіт уламком снаряду. Об'єктивно: стан тяжкий, блідий, пульс - 132/хв., артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст. В ділянці правого підребер'я накладена пов'язка з ППІ, яка просякнута кров'ю. Живіт напружений. Перкуторно визначається тупість у відлогих місцях, що переміщується при зміні положення тіла. Визначаються симптоми подразнення очеревини. В якому функціональному підрозділі повинна бути надана допомога такому пораненому?

- a. В перев'язочній для тяжкопоранених і поранених середньої тяжкості
- b. В операційній
- c. В перев'язочній для легкопоранених
- d. В палаті інтенсивної терапії для нетранспортабельних поранених
- e. В сортувальній для тяжкопоранених і поранених середньої тяжкості

Правильна відповідь: В операційній

Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Пациєнт 64-х років, що перебуває у стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. При огляді діагностовані зупинка серцевої діяльності та дихання, розпочато серцево-легеневу реанімацію. На ЕКГ шлуночкова тахікардія. Який захід є необхідним далі?

- a. Дефібриляція
- b. Ввести внутрішньовенно магнію сульфат
- c. Ввести внутрішньосерцево атропін
- d. Ввести внутрішньосерцево адреналін
- e. Ввести внутрішньовенно кальцію хлорид

Правильна відповідь: Дефібриляція

Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 68 років госпіталізований за 2 години після появи раптового стискаючого болю за грудиною. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, акроціаноз, пульс ниткоподібний, 130/хв, АТ -- 70/50 мм рт. ст., діяльність серця ритмічна, тони приглушенні, частота дихання - 30/хв, у нижніх відділах легень прослуховуються вологі хрипи. На ЕКГ у відведеннях V1-V4 комплекс QRS типу QS, сегмент ST вище ізолінії, негативний зубець Т. Які лікарські засоби необхідно призначити пацієнту насамперед?

- a. Діуретики
- b. Тромболітики
- c. Реополіглюкін
- d. Серцеві глікозиди
- e. Інгібтори ангіотензинперетворювального ферменту

Правильна відповідь: Тромболітики

Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворої 69-ти років, яка страждає на гіпертонічну хворобу, на тлі підвищення артеріального тиску до 200/110 мм рт.ст. з'явилися слабкість у правих кінцівках і моторна афазія, що поступово регресували впродовж доби. За даними МРТ головного мозку: виявлено численні вогнища зниженої щільності до 10 мм у діаметрі у білій речовині мозку навколо бічних шлуночків та у субкортиkalьних відділах мозкових півкуль. Який діагноз найбільш імовірний?

- a. Транзиторна ішемічна атака
- b. Тромбоз кавернозного синусу
- c. Субарахноїдальний крововилив
- d. Ішемічний інсульт
- e. Гостра гіпертензивна енцефалопатія

Правильна відповідь: Транзиторна ішемічна атака

Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Чоловік віком 43 роки скаржиться на різкий біль у задньому проході під час акту дефекації, наявність слизу з домішками крові в калі, періодичні закрепи. Захворів 3 роки тому, коли вперше після вживання гострої їжі відчув біль та набряк в анальній ділянці. У зв'язку із загостренням сану 3 місяці тому лікувався в стаціонарі. Об'єктивно спостерігається: підвищення температури тіла до $37,3^{\circ}\text{C}$) Per rectum: біль під час пальпації в анальній ділянці, збільшено та набряклі гемороїдальні вузли темно-синього кольору. Встановіть найбільш імовірний діагноз.

- a. Хронічний парапроктит
- b. Гострий парапроктит
- c. Хронічна тріщина прямої кишки
- d. Тромбоз гемороїдальних вузлів
- e. Гостра тріщина прямої кишки

Правильна відповідь: Тромбоз гемороїдальних вузлів

Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

У хворого 33-х років після введення анальгіну з'явилась слабкість, шум у вухах, почуття страху, серцевиття. На шкірі обличчя - уртикарні висипання. Шкіра вкрита холодним, липким потом. Артеріальний тиск - 50/20 мм рт.ст. Пульс слабкий, ниткоподібний, його не можливо підрахувати. Через 15 хвилин з'явилися здуття живота, тиск у епігастральній області, нудота, блювання. Який найбільш імовірний діагноз у даного хворого?

- a. Гострий панкреатит
- b. Анафілактичний шок
- c. Прободна виразка шлунка
- d. Гостра кишкова непрохідність
- e. Геморагічний шок

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1

Під час лекції один зі студентів став збудженим, кричав, що за ним стежать незнайомці, хочуть його убити, благав про допомогу. Викладач зі студентами намагалися його заспокоїти, але на їх слова він не реагував. До якого відділення треба госпіталізувати пацієнта?

- a. Психіатричного відділення
- b. Терапевтичного відділення
- c. Психосоматичного відділення
- d. Реанімаційного відділення
- e. Неврологічного відділення

Правильна відповідь: Психіатричного відділення

← Крок 3 Фармація (вітчизняні UA)

Перейти до...

Крок 3 Стоматологія 2022 →