

[Перейти до головного вмісту](#)
Бокова панель
КРОК-123

(Інтерн БДМУ) Підручняк Оксана Богданівна

П

Особистий кабінетПрофіль користувачаОцінкиПовідомленняУподобанняВийтиПовідомлення
[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане
Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане
Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)


[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Секція 3](#)
- [2014_осінь](#)

Розпочато	Tuesday 14 February 2023 20:32 PM
Стан	Завершено
Завершено	Tuesday 14 February 2023 20:33 PM
Витрачено часу	49 сек
Балів	0,00/200,00
Оцінка	0,00 з 100,00 можливих
Питання 1	

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 22-х років після проходження курсу дезінтоксикаційної терапії вдома (в процесі якого був застосований один флакон розчину двічі на день впродовж 2-х діб) раптом відчула погіршення стану і була доставлена до приймального відділення. На момент огляду: відсутність свідомості, шкіра бліда, холодна, АТ-50/0 мм рт.ст., Рs132/хв. Яку невідкладну допомогу необхідно надати негайно?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Термінова інтубація трахеї
- ☐ b. Лікування респіраторного дистрессиндрому дорослих
- ☐ c. Корекція показників кислотно-лужного стану
- ☐ d. Корекція порушень розчином адреналіну
- ☐ e. Негайне введення антибіотиків


Коментар

Правильна відповідь: Корекція порушень розчином адреналіну

Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінці 72-х років з артеріальною гіпертонією лікарем призначено новий препарат - каптоприл у дозі 25 мг двічі на день. Вранці хвора вперше прийняла призначену дозу каптоприлу, відпочила, а коли встала - зненацька знепритомніла, впала. Об'єктивно: бліда, дихання поверхневе, часте, пульс слабкого наповнення, прискорений, артеріальний тиск низький. Яка найбільш імовірна патологія зумовила такий стан хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ортостатичний колапс
- ☐ b. Травма голови
- ☐ c. Гіперглікемія
- ☐ d. Інсульт
- ☐ e. Гіпоглікемія

Коментар

Правильна відповідь: Ортостатичний колапс

Питання 3

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчині 17-ти років після масивної маткової кровотечі почата гемотрансфузія. Після введення близько 70-80 мл крові у хворої з'явилися інтенсивні болі у попереку; виділила сечу червоно-лакового кольору. Яка причина стану, що розвився у хворої?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ниркова коліка
- ☐ b. Гострий гломерулонефрит
- ☐ c. Хворій перелито іншогрупну кров
- ☐ d. Остеохондроз
- ☐ e. Радикуліт

Коментар

Правильна відповідь: Хворій перелито іншогрупну кров

Питання 4

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 6-ти років, хворого на гемофілію А, після травми виник гострий біль у правому колінному суглобі. Яка невідкладна допомога на догоспітальному етапі?
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення антибіотиків
- ☐ b. Введення знеболюючих засобів
- ☐ c. Накладання стискаючої пов'язки
- ☐ d. Накладання іммобілізаційної шини
- ☐ e. Кріопреципітат 15-20 ОД АГГ на 1 кг маси тіла

Коментар

Правильна відповідь: Кріопреципітат 15-20 ОД АГГ на 1 кг маси тіла

Питання 5

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 42-х років доставили до лікарні після ДТП з відривом лівої гомілки. Об'єктивно: шкіра бліда, холодна на дотик, АТ-40/0 мм рт.ст., Рс-140/хв, ЧД-32/хв. На лівій нижній кінцівці артеріальний джгут. Знеболювання не проводилось. Яка причина тяжкого стану чоловіка? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Масивна крововтрата
- ☐ b. Жирова емболія
- ☐ c. Травматичний шок
- ☐ d. Гостра серцева недостатність
- ☐ e. Тромбоемболія легеневої артерії


Коментар

Правильна відповідь: Травматичний шок

Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікаря звернувся пацієнт 26-ти років, який працює конюхом. Хворіє 3-й день. $t_{\text{о}} - 40,0^{\circ}\text{C}$. На лівій долоні виразка, не болюча, з темно-коричневим дном, набряклими краями і кров'янистими виділеннями. Навколо неї дочірні везикули з прозорим вмістом, виражений драглистий набряк. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Сибірка
- ☐ b. Фурункульоз
- ☐ c. Еризипелоїд
- ☐ d. Бешиха
- ☐ e. Алергічний дерматит

Коментар

Правильна відповідь: Сибірка

Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта 48-ми років, який звернувся в лікарню, після пальпації живота виник сильний головний біль, почервоніння та тремтіння всього тіла. АТ-240/120 - 260/130 мм рт.ст. Який препарат є препаратом вибору для надання невідкладної допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Фенігидин
- ☐ б. Фентоламін
- ☐ в. Лазикс
- ☐ г. Клофелін
- ☐ д. Каптоприл


Коментар

Правильна відповідь: Фентоламін

Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При ДТП було травмовано пішохода. Свідомість відсутня, АТ-80/50 мм рт.ст. та прогресивно знижується, грудна клітка парадоксально здійсмається, права нижня кінцівка у стегні ротована назовні. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Закритий перелом правої стегнової кістки зі зміщенням. Флотуюча грудна клітка, гемопневмоторакс
- ☐ б. Поєднана скелетна-торакальна травма тяжкого ступеня. Закритий перелом правої стегнової кістки зі зміщенням. Флотуюча грудна клітка. Травматичний шок III ст.
- ☐ в. Флотуюча грудна клітка, гемопневмоторакс. Забій головного мозку. Травматичний шок III ст.
- ☐ г. Забій головного мозку. Травматичний шок III ст.
- ☐ д. Закритий перелом правої стегнової кістки зі зміщенням. Флотуюча грудна клітка, забій головного мозку

Коментар

Правильна відповідь: Поєднана скелетна-торакальна травма тяжкого ступеня. Закритий перелом правої стегнової кістки зі зміщенням. Флотуюча грудна клітка. Травматичний шок III ст.

Питання 9

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 32-х років зазнала тривалого впливу опромінення організму в малих дозах (0,1-0,3 Гр на добу) при сумарній дозі, що перевищує 0,7-1,0 Гр. Які наслідки даного опромінення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра променева хвороба
- ☐ б. Гостра променева хвороба з переходом у хронічну форму
- ☐ в. Хронічна променева хвороба
- ☐ г. Дана доза є летальною для людини
- ☐ д. Дана доза не є шкідливою для організму

Коментар

Правильна відповідь: Хронічна променева хвороба

Питання 10

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

66 -річний чоловік хворий на інсулінозалежний діабет, поступив зі скаргами на блювання, що тривало протягом 2-х днів, біль у животі та втрату свідомості. Газометричне дослідження крові вказувало на метаболічний ацидоз. Глюкоза крові 14,8 ммоль/л. Чим викликаний важкий стан пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпоглікемічна кома
- ☐ б. Інсульт
- ☐ в. Інфаркт міокарда
- ☐ г. Хвороба Аддісона
- ☐ д. Діабетичний кетоацидоз

Коментар

Правильна відповідь: Діабетичний кетоацидоз

Питання 11

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора звернулась зі скаргами на розширення вен правої нижньої кінцівки, наявність пігментації шкіри, набряку м'яких тканин правої гомілки. Права гомілка набрякла, шкіра гіперпігментована, багряносинюшного кольору, гаряча на дотик. Яка подальша тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Консультація дерматолога
- ☐ b. Призначення венорутону
- ☐ c. Призначення гепаринотерапії
- ☐ d. Консультація судинного хірурга
- ☐ e. Туге бинтування кінцівки


Коментар

Правильна відповідь: Консультація судинного хірурга

Питання 12

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 36-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на біль ниючого характеру, який виник гостро в клубовій ділянці і попереку з іррадіацією в пахову ділянку справа. Біль виник після переохолодження. Під час пальпації болісність у клубовій ділянці справа. Підвищення температури тіла до 37,8°C. У крові: ШЗЕ- 22 мм/год, лейкоц.- $9,3 \cdot 10^9/\text{л}$. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вагоінсулярна криза
- ☐ b. Злоякісна пухлина товстої кишки
- ☐ c. Люмбаго
- ☐ d. Правобічний деформуючий коксартроз
- ☐ e. Загострення хронічного аднекситу

Коментар

Правильна відповідь: Загострення хронічного аднекситу

Питання 13

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з зупинкою серця впродовж 40 хвилин проводиться закритий масаж серця та штучне дихання. Який показник найбільш імовірно свідчить про ефективність реанімаційних заходів? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Наявність пульсу на периферичних артеріях
- ☐ б. Звуження зіниць
- ☐ в. Поява самостійного дихання
- ☐ г. Аускультативно прослуховуються серцеві тони
- ☐ д. Артеріальний тиск


Коментар

Правильна відповідь: Звуження зіниць

Питання 14

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 28-ми років субфебрильна температура, біль у животі, рідкі випорожнення з домішками слизу до 3-4 разів на добу. Хворіє протягом 3-х діб. Язик вологий, обкладений білим нальотом. Живіт м'який, болючий в лівій здухвинній ділянці, сигмоподібна кишка спазмована, болюча. Який метод дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Копрокультура
- ☐ б. Копроцитограма
- ☐ в. РНГА
- ☐ г. Загальний аналіз крові
- ☐ д. Загальний аналіз сечі

Коментар

Правильна відповідь: Копрокультура

Питання 15

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 17-ти років у терміні 34-35 тижнів доставлена бригадою ШМД в пологовий будинок зі скаргами на головний біль, погіршення зору, посмикування м'язів, судом. АТ-190/100 мм рт.ст. на обох руках, набряки на ногах та животі. Стан плода не порушений, виділень із статевих органів немає. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Менінгоенцефаліт
- ☐ b. Епілепсія
- ☐ c. Гіпертонічна енцефалопатія
- ☐ d. Прееклампсія тяжкого ступеня
- ☐ e. Еклампсія


Коментар

Правильна відповідь: Еклампсія

Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 4 місяці. Мати скаржиться на блювання після нових видів їжі протягом декількох годин. Періодично у дитини з'являються напади хвилювання: різкий крик з підведенням ніг до черева. Об'єктивно: шкіра бліда, спостерігається тахікардія, живіт здутий, гази не відходять. Замість випорожнень - кров. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Поліп прямої кишки
- ☐ b. Коліт
- ☐ c. Інвагінація
- ☐ d. Виразкова хвороба
- ☐ e. Ентерит


Коментар

Правильна відповідь: Інвагінація

Питання 17

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 34-х років після зґвалтування висловлює суїцидальні думки, скаржиться на зниження настрою. В даному випадку необхідно:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ввести 2,0 сибазону
- ☐ б. Рекомендувати звернутися до судовомедичної експертизи
- ☐ в. Рекомендувати звернутися до терапевта
- ☐ г. Здійснити госпіталізацію до психіатричної клініки
- ☐ д. Рекомендувати звернутися до гінеколога


Коментар

Правильна відповідь: Здійснити госпіталізацію до психіатричної клініки

Питання 18

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення доставлено чоловіка 30-ти років після втоплення у прісній воді, яке відбулося близько 40 хвилин тому і супроводжувалося клінічною смертю та успішною реанімацією. Чоловік у свідомості, при аускультатії у легенях вислуховуються хрипи над всіма легеневиими полями. Основний напрямок подальшої терапії:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Введення глюкокортикоїдів
- ☐ б. Введення інгібіторів протеолізу
- ☐ в. Дегідратація
- ☐ г. Киснетерапія
- ☐ д. Відновлення ОЦК

Коментар

Правильна відповідь: Дегідратація

Питання 19

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 12-ти років з нервовоартритичним діатезом після вживання в їжу значної кількості м'яса із кетчупом раптово виник гострий переймоподібний біль у животі та попереку, який іррадіює у статеві органи. При сечовипусканні отримано каламутну сечу із домішками крові. Найбільш імовірна причина гематурії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ниркова колька
- ☐ b. Травматичне ушкодження сечовивідних шляхів
- ☐ c. Геморагічний цистит
- ☐ d. Нефритичний синдром
- ☐ e. Гострий гломерулонефрит


Коментар

Правильна відповідь: Ниркова колька

Питання 20

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 64-х років був притиснутий бампером автомобіля до стіни. Об'єктивно: відмічається патологічна рухливість в ділянці лонного зчленування, виражена болючість і припухлість над лоном, порушення сечопуску. Як слід транспортувати хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Лежачи на спині з випрямленими нижніми кінцівками
- ☐ b. Лежачи на лівому боці
- ☐ c. Лежачи на правому боці
- ☐ d. Лежачи на животі, підклавши під груди і голову подушку або одяг
- ☐ e. Лежачи на спині, ноги зігнути в колінних і кульшових суглобах, стегна трохи розвести в боки


Коментар

Правильна відповідь: Лежачи на спині, ноги зігнути в колінних і кульшових суглобах, стегна трохи розвести в боки

Питання 21

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 15-ти років під час кросу на уроці фізкультури раптово впав, знепритомнів, з'явилися тоніко-клонічні судоми. Шкіра бліда, зіниці розширені. Дихання відсутнє. Пульс на магістральних судинах визначити не вдається. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Біологічна смерть
- ☐ b. Колапс
- ☐ c. Напад епілепсії
- ☐ d. Клінічна смерть
- ☐ e. Зомління


Коментар

Правильна відповідь: Клінічна смерть

Питання 22

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 26-ти років вжалила бджола в ділянку рота. Через 15 хвилин виник набряк губ; язик значно збільшився у розмірах. Ще через 20 хвилин з'явився головний біль, температура тіла піднялася до 38,0°C. Об'єктивно: губи та язик значно набряклі. В ділянці повік спостерігається блідий інфільтрат, при натисканні на який не залишається ямки. Яка патологія найбільш імовірна у потерпілого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дерматоміозит
- ☐ b. Макрохейліт Мішера
- ☐ c. Токсична реакція на отруту бджоли
- ☐ d. Гострий набряк Квінке
- ☐ e. Бешиха

Коментар

Правильна відповідь: Гострий набряк Квінке

Питання 23

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На місці ДТП знайдений чоловік з ознаками черепно-мозкової травми. Свідомість порушена за типом глибокої коми. Дихання утруднене, "хропляче" з втягуванням податливих місць грудної клітки. Яка першочергова допомога необхідна?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів
- ☐ b. Ввести в/м розчин промедолу
- ☐ c. Ввести в/в розчин налоксону
- ☐ d. Ввести в/в 40% розчин глюкози
- ☐ e. Ввести в/в розчин кордіаміну


Коментар

Правильна відповідь: Забезпечити прохідність верхніх дихальних шляхів

Питання 24

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 23-х років звернулась до лікаря зі скаргами на незначні кров'янисті виділення з піхви протягом доби, болі в низу живота. Остання нормальна менструація 2 місяці тому. Об'єктивно загальний стан не порушений. Живіт при пальпації м'який, болючий в нижніх відділах. Виділення кров'янисті незначні. Яке додаткове обстеження є доцільним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рентгенологічне обстеження
- ☐ b. Ультразвукове обстеження
- ☐ c. Лапароскопічне обстеження
- ☐ d. Пункція заднього склепіння піхви
- ☐ e. Імунологічний тест на вагітність


Коментар

Правильна відповідь: Ультразвукове обстеження

Питання 25

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчина 26-ти років, з метою суїциду, прийняла 50 таблеток снодійного. Стан вкрай важкий: непритомна, зіниці широкі без реакції на світло. Дихання хрипле, 10/хв., за участю допоміжних м'язів, ціаноз. В легенях численні вологі хрипи. Рс124/хв., поверхневий, АТ-90/40 мм рт.ст. В чому буде полягати невідкладна допомога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інтубація трахеї
- ☐ б. Допоміжне дихання респіратором "Амбу"
- ☐ в. Туалет трахеобронхіального дерева
- ☐ г. Гіпербарична оксигенація
- ☐ д. Стимуляція діурезу і компенсація плазмозамінниками


Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї

Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий чоловік 20-ти років скаржиться на високу гарячку, біль у литкових м'язах, жовтяницю. Об'єктивно: збільшена печінка, позитивний симптом Пастернацького. У крові підвищений вміст білірубину, азотистих метаболітів. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Грип
- ☐ б. Геморагічна лихоманка
- ☐ в. Лептоспіроз
- ☐ г. Черевний тиф
- ☐ д. Вірусний гепатит


Коментар

Правильна відповідь: Лептоспіроз

Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У ВПВ поступила повторновагітна в 36 тижнів вагітності, яка скаржиться на відсутність рухів дитини протягом доби. Серцебиття плоду не вислуховується. З анамнезу: попередня вагітність завершилася мертвонародженням в 36-37 тижнів. Жінка страждає на цукровий діабет протягом 10-ти років. При надходженні рівень глюкози в крові натще 10,8 ммоль/л. При УЗД в 33-34 тижні виявлено подвійний контур голівки і тулуба, багатоводдя, передбачувана маса плоду 3800 г. Що першочергово слід було виконати після УЗД з метою запобігання ускладнень, що виникли? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Проведення тесту толерантності до глюкози
- ☐ б. Провести КТГ
- ☐ в. Повторне УЗД через 2 тижні
- ☐ г. Призначення консультації ендокринолога
- ☐ д. Госпіталізація в акушерський стаціонар


Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація в акушерський стаціонар

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 46-ти років з імплантованим електрокардіостимулятором під час ремонту настільної лампи отримав легку травму електрострумом, після чого він впродовж декількох хвилин був непритомний. Об'єктивно: ціаноз шкіри, АТ-60/0 мм рт.ст., ЧСС-25/хв. Найбільш імовірною причиною неефективності кровообігу є:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ішемічний інсульт
- ☐ б. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ в. Травматичний шок
- ☐ г. Електромеханічна дисоціація
- ☐ д. Атріовентрикулярна блокада

Коментар

Правильна відповідь: Атріовентрикулярна блокада

Питання 29

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвору 20-ти років доставлено у тяжкому стані до стаціонару з ознаками отруєння парацетамолом. Який антидот необхідно ввести хворій?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Атропіну сульфат
- ☐ b. Налоксон
- ☐ c. Натрію тіосульфат
- ☐ d. Ацетилцистеїн
- ☐ e. Метиленовий синій

Коментар

Правильна відповідь: Ацетилцистеїн

Питання 30

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 54-х років, що страждає на гіпотиреоз, скаржилась на підвищену втомлюваність, сонливість, загальне нездужання, погану пам'ять, неможливість виконувати нескладну роботу, задишку, запори, значне збільшення ваги. Впродовж декількох місяців не приймала гормональну терапію. Стан поступово погіршувався. Дільничний лікар знайшов хвору у непритомному стані, дихання рідке, поверхневе, тони серця глухі, ЧСС-45/хв., шкіра суха, холодна, живіт м'який. Які заходи потрібно було вжити раніше для недопущення розвитку коматозного стану?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Призначити 5% розчин глюкози
- ☐ b. Призначити сечогінні
- ☐ c. Призначити серцеві глікозиди
- ☐ d. Призначити замісну терапію тиреоїдними гормонами
- ☐ e. Призначити інсулін

Коментар

Правильна відповідь: Призначити замісну терапію тиреоїдними гормонами

Питання 31

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 9-ти місяців з тетрадою Фалло виник напад збудження, задишки, ціанозу з епізодичною втратою свідомості. Об'єктивно: спостерігається центральний ціаноз, над легеньми - пуерильне дихання, перкуторно - розміри серця в межах норми. Аускультативно - грубий систолічний шум у другому міжребір'ї зліва від груднини, печінка виступає з-під ребра на 2 см. Яким має бути першочерговий крок лікаря поряд з проведенням оксигенотерапії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Призначення дигоксину
- ☐ b. Призначення морфіну
- ☐ c. Призначення гідрокарбонату натрію
- ☐ d. Призначення сальбутамолу
- ☐ e. Призначення адреналіну

Коментар

Правильна відповідь: Призначення морфіну

Питання 32

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 15-ти років раптово підвищилася температура тіла до 39,5оС, виник біль у горлі під час ковтання. На другу добу на обличчі, шиї, верхній частині тулуба на тлі гіперемованої шкіри тулуба виник дрібнокрапковий розеолезний висип з блідим носо-губним трикутником. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Кір
- ☐ b. Інфекційний мононуклеоз
- ☐ c. Скарлатина
- ☐ d. Краснуха
- ☐ e. Вітряна віспа

Коментар

Правильна відповідь: Скарлатина

Питання 33

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Робітник 28-ми років лакофарбного виробництва при аварійній ситуації під час розвантаження фосгену відчув специфічний запах прілого сіна внаслідок несправності протигазу. Під наглядом 6 годин. Скарг, окрім відрази до тютюну, не пред'являє, тому від подальшого спостереження категорично відмовляється. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки рожевого кольору, ЧД-22/хв., ЧСС-60/хв. У крові: без патологічних змін. Вкажіть необхідний термін перебування постраждалого під наглядом лікаря:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 36 годин
- ☐ b. 24 години
- ☐ c. 4-6 годин
- ☐ d. 12-18 годин
- ☐ e. 6-12 годин

Коментар

Правильна відповідь: 24 години

Питання 34

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10 місяців на тлі легкого перебігу ГРВІ з'явилися повторні клонічні судоми. При огляді виявлено затримку психомоторного розвитку, краніотабес, деформацію грудної клітки, потовщення метафізів трубчатих кісток. Рівень кальцію крові - 1,6 ммоль/л, інтервал QT на ЕКГ подовжений - 0,33 сек. Даних про перинатальне ушкодження ЦНС немає. Спинномозкова рідина інтактна, витікала під тиском. Вигодування штучне, без овочевих страв. Про яке захворювання йдеться? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Спазмофілія
- ☐ b. Енцефалітична реакція
- ☐ c. Нейротоксикоз
- ☐ d. Менінгіт
- ☐ e. Енцефаліт

Коментар

Правильна відповідь: Спазмофілія

Питання 35

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На вулиці знайдена дитина 6-ти років без свідомості, яка тримає в руці обірваний електричний дріт. Об'єктивно: частота дихання 5/хв., скорочення серця аритмічні, тони глухі, пульс слабкого наповнення, ЧСС - 20/хв. Яку допомогу необхідно надати першочергово? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Відновити прохідність дихальних шляхів
- ☐ b. Закритий масаж серця
- ☐ c. Призупинити вплив електричного струму
- ☐ d. Внутрішньосерцеве введення адреналіну
- ☐ e. Штучне дихання

Коментар

Правильна відповідь: Призупинити вплив електричного струму

Питання 36

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Яка найбільш раціональна методика евакуації сечі з сечового міхура при гострій затримці сечовипускання внаслідок гострого паренхіматозного простатиту? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Троакарна цистостомія
- ☐ b. Катетеризація сечового міхура металевим катетером
- ☐ c. Надлонна капілярна пункція сечового міхура
- ☐ d. Епіцистостомія
- ☐ e. Катетеризація сечового міхура еластичним катетером

Коментар

Правильна відповідь: Надлонна капілярна пункція сечового міхура

Питання 37

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі 25-ти років із вродженою вадою серця в І періоді пологів з'явився кашель, задишка, харкотиння, болі за грудниною, тахікардія. АТ-90/60 мм рт.ст., t-36,8оС. Роділля займає вимушене сидяче положення. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інфаркт міокарда
- ☐ b. набряк легень
- ☐ c. Розрив матки
- ☐ d. Емболія навколоплідними водами
- ☐ e. Напад бронхіальної астми

Коментар

Правильна відповідь: набряк легень

Питання 38

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 3-х місяців, яка народилася від серопозитивної матері щодо ВІЛ-інфікування, оглянута дільничним педіатром. Стан дитини соматично та неврологічно відповідає віковому статусу. В зв'язку з необхідністю проведення календарного профілактичного щеплення дитина направлена на вакцинацію проти дифтерії, кашлюка та правця (АКДП). Як провести таке щеплення даній дитині?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Вакцинація АКДП не проводиться
- ☐ b. Вакцинація АКДП проводиться за стандартним календарем
- ☐ c. Вакцинація АКДП проводиться після уточнення ВІЛ-статусу
- ☐ d. Вакцинація АКДП проводиться за спеціальним календарем

Коментар

Правильна відповідь: Вакцинація АКДП проводиться за спеціальним календарем

Питання 39

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 19-ти років госпіталізований з приводу ЧМТ. Під час огляду у пацієнта розвинувся напад тонічних судом правої руки без втрати свідомості, який тривав 2 хвилини. На очному дні - прояви застою дисків зорових нервів. КТ головного мозку виявила субдуральну гематому в лівій тім'яній ділянці. Поясніть механізм розвитку епілептичного нападу:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гемодинамічні порушення
- ☐ б. Подразнення кори головного мозку гематомою
- ☐ в. Метаболічні порушення
- ☐ г. Підвищення внутрішньочерепного тиску
- ☐ д. Травматичне пошкодження (руйнування) головного мозку


Коментар

Правильна відповідь: Подразнення кори головного мозку гематомою

Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

З вогнища радіаційної катастрофи до медичного пункту полку доставлено 15 потерпілих. Через 20-25 хвилин після вибуху стали відчувати різку слабкість, запаморочення, нудоту, з'явилося невгамовне блювання. Стан хворих тяжкий. Кволі, апатичні, на запитання відповідають з великою затримкою. ЧСС-120/хв. з частими екстрасистолами, АТ-70/30 мм рт.ст., ЧД-28/хв. За даними індивідуального дозиметра доза отриманого випромінювання склала 8 Гр. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра променева хвороба I ст.
- ☐ б. Гостра променева хвороба II ст.
- ☐ в. Гостра променева хвороба IV ст.
- ☐ г. Гостра променева хвороба III ст.
- ☐ д. Гостра променева хвороба V ст.

Коментар

Правильна відповідь: Гостра променева хвороба IV ст.

Питання 41

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого доставлено після аварії. Спостерігається інтенсивна гематурія, прогресивне погіршення стану хворого, підозра на поєднане пошкодження нирок та органів черевної порожнини.

Враховуючи симптоми, хворому показано:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Артеріографія судин нирок
- ☐ b. Радіоізотопна ренографія
- ☐ c. Консервативна терапія
- ☐ d. Ретроградна пієлографія
- ☐ e. Негайне хірургічне втручання

Коментар

Правильна відповідь: Негайне хірургічне втручання

Питання 42

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Медсестра Центру профілактики і боротьби зі СНІДом під час маніпуляції травмувалася голкою інфузійної системи. Які препарати можуть бути призначені для постконтактної профілактики?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Антиретровірусні препарати
- ☐ b. Препарати інтерферону
- ☐ c. Імуноглобуліни
- ☐ d. Така профілактика не проводиться
- ☐ e. Антибактеріальні препарати

Коментар

Правильна відповідь: Антиретровірусні препарати

Питання 43

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 6-ти років знаходиться в реанімаційному відділенні з приводу олігоануричної стадії гострої ниркової недостатності. При ЕКГ-моніторингу зафіксовано шлуночкову фібриляцію. Які реанімаційні заходи слід провести першочергово?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Проведення оксигенотерапії
- ☐ b. Штучна вентиляція легень
- ☐ c. Електродефібриляція
- ☐ d. Введення кальцію хлориду
- ☐ e. Введення розчину адреналіну


Коментар

Правильна відповідь: Електродефібриляція

Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 12-ти років постраждала під час ДТП. Мають місце численні переломи кінцівок, забій органів грудної клітки, ознаки травматичного шоку III ступеня. Який препарат необхідно використати для знеболювання під час транспортування в стаціонар?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кетамін
- ☐ b. Пропрофол
- ☐ c. Тіопентал натрію
- ☐ d. Севофлюран
- ☐ e. Оксибутірат натрію

Коментар

Правильна відповідь: Кетамін

Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 38-ми років протягом тривалого часу відчував зубний біль. Згодом з'явилися біль голови і ока, загальна слабкість, підвищилася температура тіла. Об'єктивно: хемоз кон'юнктиви, застійна ін'єкція очного яблука, екзофтальм, обмеження рухів очного яблука. В крові: лейкоцитоз, ШОЕ- 24 мм/год. На рентгенограмі орбіт патології не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Целюліт орбіти
- ☐ б. Запальний псевдотумор орбіти
- ☐ в. Флегмона орбіти
- ☐ г. Теноніт
- ☐ д. Ретробульбарний крововилив


Коментар

Правильна відповідь: Флегмона орбіти

Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У госпіталізованої 13-річної дитини скарги на підвищення температури тіла до 37,6оС, прояви дрібноточкових та екхімозних висипань на шкірі, носової кровотечі. Скарги з'явилися через 6 днів після перенесеної вірусної інфекції. Об'єктивно: пальпуються підщелепні лімфовузли, безболісні, рухомі. У крові: лейкоц.- 11,6*10⁹/л, ер.4, 51*10¹²/л, Hb-123 г/л, КП- 0,81, тромб. -9*10⁹/л, п- 4% , с- 63% , м- 4% , л- 24% , е- 5% . ШЗЕ- 15 мм/год. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Реактивний лімфаденіт підщелепних лімфовузлів
- ☐ б. Геморагічний васкуліт
- ☐ в. Менінгококцемія
- ☐ г. Тромбоцитопенічна пурпура
- ☐ д. Гостра лейкемія


Коментар

Правильна відповідь: Тромбоцитопенічна пурпура

Питання 47

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт під час вставання з ліжка у реанімаційному відділенні миттєво посинів і втратив свідомість. Об'єктивно: свідомість відсутня, обличчя і шия ціанотичні, нерегулярні та непродуктивні рухи грудної клітки. На сонних артеріях - пульсація не визначається, при аускультатії - серцеві тони не вислуховуються. Які подальші дії лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Відкритий масаж серця
- ☐ b. Закритий масаж серця
- ☐ c. Дефібриляція
- ☐ d. Виклик реаніматолога
- ☐ e. Штучна вентиляція легенів


Коментар

Правильна відповідь: Дефібриляція

Питання 48

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 30-ти років слюсар контрольновимірjuвальних приладів, звернувся до лікаря зі скаргами на біль у животі, послаблення випорожнень, різку слабкість, набухання та біль ясен, відчуття металевого присмаку у роті. Об'єктивно: набухання ясен, наявність виразок на них. Живіт болючий під час пальпації тонкого та товстого кишечника, кров у калі. Пожвавленість сухожильних рефлексів. Яке захворювання найбільш імовірне у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Виразковий коліт
- ☐ b. СНІД
- ☐ c. Хронічне отруєння свинцем
- ☐ d. Гостре отруєння металевою ртуттю
- ☐ e. Хвороба Крона

Коментар

Правильна відповідь: Гостре отруєння металевою ртуттю

Питання 49

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 43-х років страждає на хронічний алкоголізм протягом 6-ти років. Останні 5 діб не приймає алкоголь. Скаржиться на головний біль, озноб, біль у ділянці серця. Тривожний, метушливий. Увечері посилюється неспокій, рухове збудження, поривається втекти, сховатися. Змітає з ковдри "комах, тарганів, павуків". Оберіть оптимальну схему лікування:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Внутрішньовенно пірацетам
- ☐ b. Внутрішньовенно анальгін
- ☐ c. Внутрішньовенно седуксен
- ☐ d. Внутрішньовенно лазикс
- ☐ e. Внутрішньовенно галоперідол

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенно седуксен

Питання 50

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 33-х років на роботі раптово відчув сильний головний біль, немов удар по голові. Знепритомнів, впав. Об'єктивно: АТ-160/100 рт.ст., свідомість сплутана. Виражена ригідність м'язів шиї, симптом Керніга з обох боків під кутом 140°. Спостерігався генералізований судомний напад. Зіниці рівні, косоокості немає. Парезів немає. Яке обстеження необхідно провести хворому для виключення субарахноїдального крововиливу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Люмбальна пункція
- ☐ b. Електрокардіограма
- ☐ c. Ангіографія
- ☐ d. Електроенцефалограма
- ☐ e. Рентгенографія кісток черепа

Коментар

Правильна відповідь: Люмбальна пункція

Питання 51

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 40-ка років захворів гостро, після повернення з Заїру. Скарги на високу температуру тіла, головний біль, блювання "кавовою гущею", біль у м'язах та попереку. Об'єктивно: $t_{\text{о тіла}}$ - 39,9°C, обличчя гіперемоване. Марить. Склери і шкіра жовті, петехіальний висип. Печінка +3 см, болюча. У крові: лейкоц.- $2 \cdot 10^9/\text{л}$, тромбоц.- $45 \cdot 10^9/\text{л}$. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Жовта лихоманка
- ☐ б. Малярія
- ☐ в. Грип
- ☐ г. Лептоспіроз
- ☐ д. Вірусний гепатит В

Коментар

Правильна відповідь: Жовта лихоманка

Питання 52

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 49-ти років потрапив у ДТП. Об'єктивно: стан важкий, міжреберні проміжки згладжені, ліва половина грудної клітки відстає при диханні. Над лівим легеневим полем тимпаніт. Аускультативно: дихання зліва не проводиться, ЧДР-32/хв. Інші пошкодження відсутні. Як транспортувати потерпілого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. В положенні Волковича на щиті
- ☐ б. Грудна клітина фіксується шинами Крамера до щита
- ☐ в. На лівому боці лежачи
- ☐ г. На правому боці лежачи
- ☐ д. В напівсидячому чи напівлежачому положенні

Коментар

Правильна відповідь: В напівсидячому чи напівлежачому положенні

Питання 53

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 42-х років скаржиться на головний біль, дратівливість, безсоння, зниження пам'яті і настрою. При неврологічному обстеженні виявлені слабопозитивні менінгеальні симптоми, анізокорія з млявою реакцією зіниць на світло. Ввечері раптово розвинувся стан потьмареної свідомості з зоровими галюцинаціями, страхом, психомоторним збудженням. При дослідженні ліквору виявлено велику кількість білку і клітинних елементів, позитивну реакцію Васермана. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Алкогольний делірій
- ☐ b. Реактивний параноїд
- ☐ c. Істеричний сутінковий стан
- ☐ d. Тривожно-депресивний розлад
- ☐ e. Деліріозна форма сифілісу мозку

Коментар

Правильна відповідь: Деліріозна форма сифілісу мозку

Питання 54

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 15-ти років після перенесеної щойно вітряної віспи з'явився різкий біль у лівій нозі. Нижня кінцівка збільшилась у об'ємі, підвищилась температура тіла до 37,8°C. На лівій нозі шкіра з внутрішньої поверхні червона, вздовж судин при пальпації відмічається різкий біль та ущільнення тканин. Обвід гомілки та стегна зліва більший на 2 см порівняно з аналогічними частинами тіла справа. Які потрібно зробити додаткові діагностичні інструментальні дослідження?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ангіографія
- ☐ b. Томографія
- ☐ c. Аускультация
- ☐ d. Рентгенографія
- ☐ e. Ультразвукова доплерографія

Коментар

Правильна відповідь: Ультразвукова доплерографія

Питання 55

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілого 36-ти років, що переніс закриту черепно-мозкову травму, в процесі проведення ехоенцефалоскопії виявлено зміщення серединного еха на 5 мм. Про що це свідчить? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ехо-ЕС патології не виявила
- ☐ б. Тріщина кісток склепіння черепа
- ☐ в. Травматичний субарахноїдальний крововилив
- ☐ г. Наявність підболонкової гематоми
- ☐ д. Перелом основи черепа

Коментар

Правильна відповідь: Наявність підболонкової гематоми

Питання 56

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Селективні α -адреноміметики недоцільно застосовувати для поновлення серцевої діяльності внаслідок:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Здатності підвищувати систолічний артеріальний тиск
- ☐ б. Значного підвищення потреби міокарда у кисні
- ☐ в. Нездатності підвищувати діастолічний артеріальний тиск
- ☐ г. Відсутності позитивного ефекту на міокард
- ☐ д. Вираженого аритмогенного ефекту


Коментар

Правильна відповідь: Нездатності підвищувати діастолічний артеріальний тиск

Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого під час операції на шлунку було ушкоджено селезінкову артерію, в результаті чого виникла масивна кровотеча, яка призвела до зупинки кровообігу. Найдоцільніше проводити: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Прямий масаж серця
- ☐ b. Електрокардіостимуляцію
- ☐ c. Абдомінальну компресію
- ☐ d. Введення гідрокортизону
- ☐ e. Непрямий масаж серця


Коментар

Правильна відповідь: Прямий масаж серця

Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 11-ти років протягом 30-ти хвилин на фоні відсутності свідомості відмічаються напади судом у вигляді тонічного напруження м'язів обличчя, розгиначів кінцівок, яке змінюється короткими посмикуваннями різних м'язових груп тулуба і кінцівок з відхиленням очних яблук вгору і в бік. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Генералізований епілептичний статус
- ☐ b. Епілептичний синдром
- ☐ c. Судомний напад не уточненого генезу
- ☐ d. Епілептична реакція
- ☐ e. Судомна реакція

Коментар

Правильна відповідь: Генералізований епілептичний статус

Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 11-ти років грала у футбол та під час падіння отримала травму. Встановлено попередній діагноз: закритий вивих правого передпліччя. Який обсяг допомоги повинен надати лікар на місці пригоди?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Косинкова пов'язка на праву верхню кінцівку
- ☐ б. Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною
- ☐ в. Восьмиподібна пов'язка на правий ліктьовий суглоб
- ☐ г. Знеболювання, спроба вправлення вивиху
- ☐ д. Знеболювання, транспортна іммобілізація косинкою


Коментар

Правильна відповідь: Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною

Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Молодій жінці 5 днів тому в умовах стаціонару був здійснений аборт. В теперішній час висловлює скарги на слабкість, нудоту, остуду. Об'єктивно: притомна, психомоторне збудження з деякою неадекватністю поведінки. Шкірні покриви сухі, гарячі, температура 38,5°C, тахіпное 30/хв, у легенях дихання жорстке. АТ-90/50 мм рт.ст., ЧСС-112/хв. Діурез за останню добу знижений. Найбільш вірним буде припустити:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ б. Харчова токсикоінфекція
- ☐ в. Гострий пієлонефрит
- ☐ г. Гостра пневмонія
- ☐ д. Гострий аднексит

Коментар

Правильна відповідь: Інфекційно-токсичний шок

Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 12-ти років хворіє на atopічну бронхіальну астму з важким перебігом. Під час останнього нападу 4 інгаляції сальбутамолу ефекту не дали. Наросли задишка, тахікардія, неспокій. Шкіра бліда з ціанотичним відтінком. У легенях різко ослаблене дихання, хрипи не вислуховуються. Який з перелічених заходів є першочерговим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інгаляція зволоженого кисню
- ☐ b. Внутрішньовенне введення амброксолу
- ☐ c. Внутрішньовенне введення кларитроміцину
- ☐ d. Внутрішньовенне введення еуфіліну
- ☐ e. Внутрішньовенне введення преднізолону


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне введення преднізолону

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Роділля 36-ти років знаходиться в третьому періоді шостих термінових пологів. За відсутності ознак відділення плаценти через 10 хвилин розпочалася маткова кровотеча, яка перевищує фізіологічну і продовжується; втрата свідомості. Яка тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гемотрансфузія
- ☐ b. Введення в вену метилергометрину
- ☐ c. Ручне відшарування плаценти та виділення посліду, лікування геморагічного шоку
- ☐ d. Клемування за Генкелем-Тіканадзе
- ☐ e. Масаж матки на кулаці


Коментар

Правильна відповідь: Ручне відшарування плаценти та виділення посліду, лікування геморагічного шоку

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 72-х років раптово розвинулось блювання кров'ю з крововтратою до 1,0 л. Об'єктивно: АТ-70/40 мм рт.ст., ЧСС112/хв. ЦВТ- 0. Які інфузійні середовища першочергово треба застосувати для лікування?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Жирові емульсії
- ☐ b. Кристалоїдні розчини
- ☐ с. Колоїдні розчини
- ☐ d. Свіжозаморожена плазма
- ☐ е. Розчини глюкози


Коментар

Правильна відповідь: Кристалоїдні розчини

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік доставлений у медичну роту через 2 години після ядерного вибуху. Скаржиться на головний біль, болі у животі, м'язах, суглобах, озноб, нудоту, блювання, рідкі випорожнення. Усі симптоми з'явилися через 5-7 хвилин після опромінення. Індивідуальний дозиметр відсутній. При огляді загальмований, адинамічний. Шкіра та слизові оболонки гіперемовані, склери іктеричні, язик сухий. Рс-100/хв., слабого наповнення, визначаються поодинокі екстрасистоли, тони серця глухі, АТ-100/50 мм рт.ст., дихання везикулярне, живіт болісний під час пальпації, температура тіла 39,2оС. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра променева хвороба, кістковомозкова форма, IV ступінь важкості
- ☐ b. Гостра променева хвороба, кишкова форма, IV ступінь важкості
- ☐ с. Гостра променева хвороба, кістковомозкова форма, III ступінь важкості
- ☐ d. Гостра променева хвороба, кишкова форма, III ступінь важкості
- ☐ е. Гостра променева хвороба, кишкова форма, II ступінь важкості

Коментар

Правильна відповідь: Гостра променева хвороба, кишкова форма, IV ступінь важкості

Питання 65

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої була проведена операція екстирпації матки без додатків. Через 4 години після операції з'явилася цегляного кольору сеча, болі внизу живота, хвора у свідомості. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий гломерулонефрит
- ☐ b. Кіста нирки
- ☐ c. Рак нирки
- ☐ d. Інтраопераційне пошкодження сечового міхура
- ☐ e. Нирковокам'яна хвороба, ниркова коліка

Коментар

Правильна відповідь: Інтраопераційне пошкодження сечового міхура

Питання 66

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчини 19-ти років після зґвалтування з'явилися постійна плаксивість, тривога, настрій став пригніченим, знизилася працездатність, рухи загальмовані, виникли думки про недоцільність життя. Визначте психопатологічний стан:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інволюційна депресія
- ☐ b. Судинна депресія
- ☐ c. Ендогенна депресія
- ☐ d. Тривожна депресія
- ☐ e. Реактивна депресія

Коментар

Правильна відповідь: Реактивна депресія

Питання 67

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 13-ти років доставлений до відділення у коматозному стані. Відзначається глибоке шумне дихання за типом Кусмауля, гіпотонія, сухість шкіри і слизових оболонок, зниження тонуусу очних яблук, олігурія, запах ацетону у видихуваному повітрі. Чим зумовлений даний стан?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіперосмолярна кома
- ☐ b. Печінкова кома
- ☐ c. Кетоацидотична кома
- ☐ d. Тиреотоксична кома
- ☐ e. Гіпоглікемічна кома


Коментар

Правильна відповідь: Кетоацидотична кома

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнтки 16-ти років при введенні в/в ферум-леку виник сильний головний біль, шум у вухах, болі за грудниною, відчуття жару, пітливість. Об'єктивно: стан хворої важкий, Рs-115/хв., ниткоподібний, АТ80/30 мм рт.ст. Який з препаратів необхідно ввести в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Преднізолон
- ☐ b. Адреналін
- ☐ c. Мезатон
- ☐ d. Допамін
- ☐ e. Атропін

Коментар

Правильна відповідь: Преднізолон

Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі 24-х років у пологах раптом погіршилося серцебиття плода, матка в постійному гіпертонусі, з'явилися значні кров'яністі виділення з піхви. Роділля зблідла, Рs-130/хв., АТ-80/50 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Передчасне відшарування плаценти
- ☐ б. Гострий апендицит
- ☐ в. Клінічно вузький таз
- ☐ г. Розрив матки
- ☐ д. Розрив шийки матки


Коментар

Правильна відповідь: Передчасне відшарування плаценти

Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 8-ми років протягом тижня скаржився на головний біль, втомлюваність. В анамнезі: бронхоаденіт у 4 роки. Стан погіршився, $t_{\text{о}} - 37,8^{\circ}\text{C}$. Об'єктивно: дитина лежить на боці з приведеними до тулуба ногами, голова закинута. Ригідність м'язів потилиці, симптом Керніга. Ліквор прозорий, через 12 годин на поверхні утворилася плівка. Найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Менінгококовий менінгіт
- ☐ б. Пневмококовий менінгіт
- ☐ в. Туберкульозний менінгіт
- ☐ г. Туберкульозний енцефаліт
- ☐ д. Стрептококовий менінгіт


Коментар

Правильна відповідь: Туберкульозний менінгіт

Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 46-ти років після емоціонального навантаження раптово відчула сильний біль за грудниною. Об'єктивно: шкіра бліда, акроціаноз, кінцівки холодні. АТ-100/60 мм рт.ст. На ЕКГ: підйом сегменту ST над ізолінією у відведеннях V L, V2-V6. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Синдром Дреслера
- ☐ b. Інфаркт міокарда
- ☐ c. Перикардит
- ☐ d. Невралгія
- ☐ e. ТЕЛА


Коментар

Правильна відповідь: Інфаркт міокарда

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На фоні гіпертермії та сильного головного болю в дитини 5-ти років виникли зорові галюцинації жахливого змісту, марення, дезорієнтація. Шкіра гіперемована, з дрібною висипкою, рожевого кольору. Шкіра носогубного трикутника бліда, ознаки напруження м'язів потилиці, симптоми Керніга, Брудзинського, поживавлення рефлексів без різниці між сторонами. Який діагноз можна припустити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Деліріозний синдром при алергічному захворюванні
- ☐ b. Менінгококовий менінгіт з деліріозним синдромом
- ☐ c. Коревий менінгіт із деліріозним синдромом
- ☐ d. Деліріозний синдром при черепномозковій травмі
- ☐ e. Деліріозний синдром при отруєнні їжею


Коментар

Правильна відповідь: Коревий менінгіт із деліріозним синдромом

Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пологи другі, вчасні. 3 години тому відійшли навколоплідні води. Пологова діяльність активна, загальнорівномірнорозвужений таз II ступеня. Передбачувана маса плоду 3900 г. Серцебиття плоду не вислуховується. При піхвовому дослідженні відкриття шийки матки повне, плідного міхура немає, передлежить голівка плоду, притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов у поперечному розмірі. Яка лікарська тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Накладання акушерських щипців
- ☐ б. Ведення пологів через природні статеві шляхи
- ☐ в. Кесарів розтин
- ☐ г. Стимуляція пологової діяльності окситоцином
- ☐ д. Краніотомія


Коментар

Правильна відповідь: Краніотомія

Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На борту літака, який прибув з центральноафриканської країни перебуває хворий з підозрою на карантинне захворювання. Які протиепідемічні заходи є першочерговими з боку санітарноепідеміологічної служби аеропорту?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ізоляція екіпажу та пасажирів літака на 23 дні
- ☐ б. Залишити усіх прибулих у літаку до встановлення діагнозу
- ☐ в. Лабораторне обстеження усіх прибулих літаком на попередньо діагностовану карантинну інфекцію
- ☐ г. Відведення літака на спеціальний санітарний майданчик та ізоляція хворого в мельцерівський бокс
- ☐ д. Пасажирам та екіпажу розпочати неспецифічну профілактику імовірного захворювання

Коментар

Правильна відповідь: Відведення літака на спеціальний санітарний майданчик та ізоляція хворого в мельцерівський бокс

Питання 75

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 58-ми років перебуває в інфекційному відділенні з приводу важкої форми вірусного гепатиту В. На 4-й день лікування стан різко погіршився, з'явились сонливість, дезорієнтація у просторі, нечітка мова, тонічні судоми. У крові:ШЗЕ- 50 мм/год, ер.- 2,7*10¹²/л, загальний білірубін - 300 мкмоль/л, АсАТ-2,9 ммоль/год•л, АлАТ-3,1 ммоль/год•л. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Уремична кома
- ☐ б. Геморагічний інсульт
- ☐ в. Синдром Бадда-Кіарі
- ☐ г. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ д. Гостра печінкова енцефалопатія

Коментар

Правильна відповідь: Гостра печінкова енцефалопатія

Питання 76

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 34-х років з приводу системного червоного вовчака отримує 30 мг преднізолону щоденно протягом 3-х років. Самостійно припинила прийом препарату. Під час огляду адинамічна. Шкіра бліда, з мармуровим відтінком, волога. Тони серця ритмічні, різко приглушені, ЧСС-140/хв., пульс ниткоподібний. АТ-80/20 мм рт.ст., температура тіла 38,8оС. Яку терапію слід призначити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Кардіотоніки
- ☐ б. Симпатоміметики
- ☐ в. Нестероїдні протизапальні препарати
- ☐ г. Преднізолон
- ☐ д. Цитостатики

Коментар

Правильна відповідь: Преднізолон

Питання 77

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 37-ми років після фізичного навантаження раптово виникає виражений біль у правому підребер'ї, нудота та блювання. Біль триває 5 хвилин та знов повторюється через 1 годину. Симптом Мерфі позитивний. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий гепатит
- ☐ b. Гострий апендицит
- ☐ c. Хронічний холецистит
- ☐ d. Гострий панкреатит
- ☐ e. Жовчна коліка

Коментар

Правильна відповідь: Жовчна коліка

Питання 78

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 48-ми років надійшов до стаціонару із клінікою печінкової недостатності. При огляді виявлено незначні неврологічні зрушення. Втрата ваги незначна. Наявний асцит легко піддається лікуванню. У крові: білірубін в сироватці крові 3,0 мг/% , рівень альбуміну - 3,2 мг/% , протромбіновий індекс - 75% . До якої групи печінково-клітинної недостатності можна віднести дані зрушення згідно з класифікацією печінкової дисфункції за Чайлд-П'ю?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 1
- ☐ b. 3
- ☐ c. 1б
- ☐ d. 2
- ☐ e. 1а

Коментар

Правильна відповідь: 2

Питання 79

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 38-ми років тривалий час хворіє на епілепсію. Вранці виникли часті великі судомні напади, в перервах між якими він залишався непритомним. На доторкання і больові подразники не реагує. Зіниці вузькі, реакція на світло квола. Тонус м'язів знижений. Наявні ознаки порушення дихання. З яких заходів необхідно розпочати надання невідкладної допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Проведення протисудомної терапії
- ☐ b. Проведення люмбальної пункції
- ☐ c. Проведення дегідратаційної терапії
- ☐ d. Відновлення прохідності дихальних шляхів
- ☐ e. Попередження травматизації голови

Коментар

Правильна відповідь: Відновлення прохідності дихальних шляхів

Питання 80

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10-ти років зупинена артеріальна кровотеча (плечова артерія) через 10 хвилин після травми. При надходженні АТ-90/50 мм рт.ст, еритроцити - $2,5 \cdot 10^{12}/л$, Hb-60 г/л. Раніше при переливанні цільної крові була анафілактоїдна реакція. Який препарат крові найбільш безпечний для корекції крововтрати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Еритроцитарна маса
- ☐ b. Лейкоконцентрат
- ☐ c. Свіжозаморожена плазма
- ☐ d. Відмиті еритроцити
- ☐ e. Цільна кров

Коментар

Правильна відповідь: Відмиті еритроцити

Питання 81

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У недоношеної новонародженої дитини, що народилася від матері з ознаками ендометриту, сірий відтінок шкіри, млявість, гіперестезія, менінгеальні знаки, блювання, гіпотермія. Запідозрений гнійний менінгіт. Яке дослідження допоможе підтвердити діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Дослідження калу
- ☐ б. Дослідження слини
- ☐ в. Дослідження сечі
- ☐ г. Дослідження крові
- ☐ д. Дослідження ліквору

Коментар

Правильна відповідь: Дослідження ліквору

Питання 82

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з підозрою на поширену дифтерію мигдаликів у приймальному відділенні раптово погіршився стан: виникли лихоманка, прогресуюча різка слабкість, похолодання кінцівок на фоні гіпертермії, мармуровість шкіри, тахікардія, зниження артеріального тиску. Які дії лікаря приймального відділення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Негайне переведення хворого у ВРІТ
- ☐ б. Транспортування хворого у ВРІТ інфекційної лікарні
- ☐ в. Ін'єкція антибіотиків широкого спектру дії
- ☐ г. Госпіталізація хворого в інфекційне відділення
- ☐ д. Інтубація


Коментар

Правильна відповідь: Негайне переведення хворого у ВРІТ

Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Мати викликала лікаря до дитини 1 рік 7 місяців зі скаргами на раптовий кашель, задишку, які з'явилися під час прийому їжі. При огляді: температура тіла у нормі, дитина активна. При аускультатії легень: зліва свистячі хрипи на видиху, перкуторно-коробковий звук. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Кашлюк
- ☐ b. Бронхіоліт
- ☐ c. Обструктивний бронхіт
- ☐ d. Стороннє тіло бронху
- ☐ e. Бронхіальна астма


Коментар

Правильна відповідь: Стороннє тіло бронху

Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 54-х років, що знаходиться в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. При огляді діагностовані зупинка серцевої діяльності і дихання, розпочато легенево-серцеву реанімацію. На ЕКГ асистолія. Далі необхідно:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ввести внутрішньосерцево адреналін
- ☐ b. Ввести внутрішньовенно строфантин
- ☐ c. Ввести внутрішньовенно лідокаїн
- ☐ d. Ввести внутрішньовенно новокаїнамід
- ☐ e. Дефібриляція

Коментар

Правильна відповідь: Ввести внутрішньосерцево адреналін

Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта 40-ка років через 3 дні лікування інфаркту міокарда, раптово пів години тому виникли болі у правій нозі та моторна афазія, втрата глибокої чутливості, рухової активності правої ноги нижче коліна. Визначте засіб невідкладної терапії:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення наркотичних анальгетиків
- ☐ b. Введення папаверину
- ☐ c. Введення гепарину 10 000 ОД внутрішньовенно
- ☐ d. Введення тромболітиків внутрішньовенно
- ☐ e. Введення дезагрегантів та інфузійна терапія


Коментар

Правильна відповідь: Введення тромболітиків внутрішньовенно

Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення лікарні госпіталізовано хворого 25-ти років із політравмою. Діагностовано ЗЧМТ. Забій головного мозку І ст. Перелом кісток тазу, лівої стегнової кістки. З метою проведення масивної інфузійно-трансфузійної терапії хворому проведено пункцію та катетеризацію v. subclavia dextra центральним венозним катетером. Центральний венозний тиск у хворого негативний. Яке ускладнення можна отримати під час пункції центральної вени при негативному центральному венозному тиску?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Повітряна емболія
- ☐ b. Інфекційні ускладнення
- ☐ c. Жирова емболія
- ☐ d. Венозна кровотеча
- ☐ e. Тромбоемболія


Коментар

Правильна відповідь: Повітряна емболія

Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

З перших годин життя у новонародженого відзначено задишку і ціаноз. Ліва половина грудної клітки відстає в акті дихання, міжреберні проміжки розширені. Живіт човноподібної форми, м'який. На рентгенограмі: множинні просвітлення у лівій плевральній порожнині у вигляді "коміркової сітки". Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ателектаз легені
- ☐ b. Спонтанний пневмоторакс
- ☐ c. Вроджена напружена кіста легені
- ☐ d. Вроджена лобарна емфізема
- ☐ e. Вроджена діафрагмальна грижа


Коментар

Правильна відповідь: Вроджена діафрагмальна грижа

Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікар надавав допомогу ураженим, що поступали з осередку хімічного зараження внаслідок аварії на хімічно небезпечному об'єкті. Індивідуальні засоби захисту не використовував. Незабаром погіршився зір, з'явились головний біль, запаморочення, задишка. Евакуйований в лікарню. Скаржиться на загальну слабкість, задишку. Об'єктивно: слизові ціанотичні, періодичні фібрилярні посіпування м'язів обличчя. Дихання утруднене, поверхневе. З боку серцево-судинної системи - виражена тахікардія, артеріальний тиск підвищений. Активність холінестерази крові пригнічена на 70% . Ураження отруйними речовинами (ОР) якої групи найімовірніше зумовлює таку клінічну картину?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. ОР задушливої дії
- ☐ b. ОР шкірно-резорбтивної дії
- ☐ c. ОР нервово-паралітичної дії
- ☐ d. ОР загальноотруйної дії
- ☐ e. ОР подразливої дії

Коментар

Правильна відповідь: ОР шкірно-резорбтивної дії

Питання 89

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До сімейного лікаря звернулася дівчинка 8-ми років зі скаргами на підвищену пітливість, серцебиття, схуднення. З анамнезу: хвороба розвинулася 1,5 роки тому, коли з'явилися серцебиття і поступова втрата ваги. Лікування не отримувала. Об'єктивно: шкіра волога, Рс-130/хв. АТ-135/60 мм рт.ст. Щитоподібна залоза III ст., рухома, безболісна. Який попередній діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Синдром мальабсорбції
- ☐ б. Надмірні фізичні навантаження
- ☐ в. Вроджена вада серця
- ☐ г. Дифузний токсичний зоб
- ☐ е. Гігантизм

Коментар

Правильна відповідь: Дифузний токсичний зоб

Питання 90

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий скаржиться на головний біль, біль у ділянці серця, нудоту, сухість у роті, безсоння. Об'єктивно: обличчя гіперемоване, тремор пальців рук і язика, хода некоординована, виражена пітливість, настрій різко знижений. Зловживає спиртними напоями, останню добу алкоголь не вживав. Визначте психопатологічний синдром: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Аментивний
- ☐ б. Астенічний
- ☐ в. Депресивний
- ☐ г. Абстинентний
- ☐ е. Деліріозний

Коментар

Правильна відповідь: Абстинентний

Питання 91

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 25-ти років перенесла тяжку форму фолікулярної ангіни. Поступово болі під час ковтання зменшились, температура нормалізувалась. Відчула себе здоровою. Але через 2 дні знову піднялася температура до 38,0оС, з'явились болі під час ковтання. Ліва частка щитоподібної залози збільшилась, стала щільною і різко болісною, шкіра над нею гіперемована. З'явились тахікардія, подразливість, пітливість. У крові: лейкоц.- 14,0*10⁹/л, ШЗЕ- 30 мм/год. Основний обмін +25% . Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Паратиреоз
- ☐ b. Гострий тиреоїдит
- ☐ c. Рак щитоподібної залози
- ☐ d. Дифузний токсичний зоб
- ☐ e. Мікседема

Коментар

Правильна відповідь: Гострий тиреоїдит

Питання 92

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 46-ти років скаржиться на появу протягом двох тижнів випорожнень кров'ю більш за 12 разів на добу, болю в животі, суглобах; болючі висипки у порожнині рота та нижніх кінцівках, набряк колінних та гомілковостопних суглобів, слабкість, підвищення температури тіла понад 39оС, втрату ваги тіла. Який метод обстеження є найбільш інформативним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рентгенологічне дослідження кишечника
- ☐ b. Біопсія кишечника та шкіри
- ☐ c. Рентгенографія суглобів
- ☐ d. Загальний аналіз крові
- ☐ e. Ендоскопічне дослідження


Коментар

Правильна відповідь: Ендоскопічне дослідження

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 44-х років через 7 діб після переливання крові з'явилися жовтяниця і гарячка, АТ-90/60 мм рт.ст., Рс-100/хв., добовий діурез 200 мл. Про яке ускладнення йдеться?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Пневмонія
- ☐ б. ГРВІ
- ☐ в. Пізня гемолітична трансфузійна реакція, гостра ниркова недостатність
- ☐ г. Гострий гепатит
- ☐ д. Гострий холецистит


Коментар

Правильна відповідь: Пізня гемолітична трансфузійна реакція, гостра ниркова недостатність

Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 66-ти років скаржиться на серцебиття, болі у серці, слабкість. Симптоми з'явилися зненацька, після фізичного навантаження. На ЕКГ: комплекси QRS поширені до 0,12 секунд, зубець Р перед шлуночковим комплексом відсутній, ЧСС 200/хв. Який препарат є препаратом вибору в цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Хінідин
- ☐ б. Верапаміл
- ☐ в. Дигоксин
- ☐ г. Обзидан
- ☐ д. Лідокаїн

Коментар

Правильна відповідь: Лідокаїн

Питання 95

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 65-ти років страждає на цукровий діабет I типу, раптом знепритомнів. Бригадою ШМД за допомогою глюкометра встановлено, що рівень глюкози крові становить 1,2 ммоль/л. При огляді хворий знаходиться в стані коми. Який препарат можливо застосувати окрім глюкози?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Адреналін
- ☐ b. Естрадіол
- ☐ c. Мікседол
- ☐ d. Глюкагон
- ☐ e. Тіопентал натрію

Коментар

Правильна відповідь: Глюкагон

Питання 96

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 54-х років з міомою матки і анемією (Hb-52 г/л, Ht-17%) скаржиться на головний біль, слабкість, запаморочення. Лікар призначив жінці трансфузію одногрупних відмитих еритроцитів. Яка основна мета гемотрансфузії в цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Замісна
- ☐ b. Стимулююча
- ☐ c. Детоксикаційна
- ☐ d. Поживна
- ☐ e. Гемодинамічна

Коментар

Правильна відповідь: Замісна

Питання 97

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 64-х років з нестабільною стенокардією, під час ходи раптово впала. Об'єктивно: відсутність свідомості, пульсації на магістральних артеріях та тонів серця; вузькі зіниці та поверхневе дихання. З чого в даному випадку доцільно розпочати реанімаційні заходи? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інтубація та проведення ШВЛ
- ☐ б. Застосування дефібрилятора
- ☐ в. Внутрішньовенне введення адреналіну
- ☐ г. Внутрішньовенне введення атропіну
- ☐ д. Удар кулаком по груднині

Коментар

Правильна відповідь: Удар кулаком по груднині

Питання 98

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 39-ти років доставлено до лікарні з ножовим пораненням у живіт. Об'єктивно: шкіра звичайного кольору, Ps 112/хв., ритмічний, АТ-120/90 мм рт.ст. На передній черевній стінці рана 1,5х2,5 см в правому підребер'ї. Живіт при пальпації помірно болючий в ділянці рани, перистальтика вислуховується, симптомів подразнення очеревини немає. Яка подальша тактика? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Лапароцентез
- ☐ б. Лапароскопія
- ☐ в. Діагностична лапаротомія
- ☐ г. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини
- ☐ д. Ревізія та первинна хірургічна обробка рани


Коментар

Правильна відповідь: Ревізія та первинна хірургічна обробка рани

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 66-ти років скаржиться на болі в животі, нудоту, блювання, болі в м'язах. Об'єктивно: різко виражені симптоми дегідратації, дихання Кусмауля, АТ-90/50 мм рт.ст., анурія, температура 35,9оС, глікемія - 12,9 ммоль/л, ацетонурія відсутня. рН крові 6,8, вміст молочної кислоти 1,7 ммоль/л (норма 0,62-1,3 ммоль/л). Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіперлактацидемічна кома
- ☐ b. Гіперосмолярна кома
- ☐ c. Мозкова кома
- ☐ d. Уремічна кома
- ☐ e. Кетоацидотична кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіперлактацидемічна кома

Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий доставлений з зони пожежі через 2 години після виходу з зони вогню. Скаржиться на головний біль, різь в очах і слюзотечу, відчуття дертя в горлі, кашель, шум у вухах, запаморочення. Було одноразове блювання, явища подразнення верхніх дихальних шляхів помітно зменшилися. При огляді збуджений, ейфоричний, шкіра обличчя набрякла, гіперемована, слизова оболонка глотки яскравочервоного забарвлення. Рс-82/хв., задовільненого наповнення, тони серця ослаблені, АТ-130/100 мм рт.ст., ЧД-28/хв., дихання ослаблене, температура тіла 37,2оС. Яка імовірна патологія у постраждалого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Отруєння ціаністими сполуками
- ☐ b. Отруєння чадним газом, опік верхніх дихальних шляхів
- ☐ c. Комбіноване отруєння СО₂і анідами з опіком дихальних шляхів
- ☐ d. Отруєння чадним газом

Коментар

Правильна відповідь: Комбіноване отруєння СО₂і анідами з опіком дихальних шляхів

Питання 101

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий на перитоніт 40-ка років звернувся по медичну допомогу на 5 день після початку больового синдрому, блювання. Об'єктивно: тургор шкіри знижений, АТ 70/40 мм рт.ст. Рс-124/хв., температура тіла 38,5°C. Діурез відсутній. З якого інфузійного розчину слід розпочати внутрішньовенну регідратацію?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 3% натрію хлориду
- ☐ b. 0,9% натрію хлориду
- ☐ c. 10% глюкози
- ☐ d. 1% калію хлориду
- ☐ e. 4% натрію гідрокарбонату

Коментар

Правильна відповідь: 0,9% натрію хлориду

Питання 102

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора на гіпертиреоз 32-х років самостійно відмінила прийом антитиреоїдних засобів. Скаржиться на серцебиття, лихоманку до 38,5°C, болі у животі, пронос, блювання. Об'єктивно: психомоторне збудження, ЧСС-140/хв., АТ-150/90 мм рт.ст. Який патологічний стан розвинувся у хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вегето-судинний криз
- ☐ b. Гостра надниркова недостатність
- ☐ c. Гіпертензивний криз
- ☐ d. Криз при феохромоцитомі
- ☐ e. Тиреотоксичний криз


Коментар

Правильна відповідь: Тиреотоксичний криз

Питання 103

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 74-х років на 3 добу гострого інфаркту міокарда стан погіршився. Раптово знепритомнів. Пульс відсутній, дихання немає. На ЕКГ: часті нерегулярні хвилі, різні за формою та амплітудою. Після проведення реанімаційних заходів серцева діяльність була відновлена. Які препарати треба додати до терапії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Дигоксин
- ☐ b. Атропін
- ☐ c. Адреналін
- ☐ d. Дексаметазон
- ☐ e. Кордарон


Коментар

Правильна відповідь: Кордарон

Питання 104

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 37-ми років скаржиться на сильні болі у лівому боці, що заважають дихати, субфебрилітет. Захворіла після перебування на холоді з протягом. На другий день на боці з'явилася висипка. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Абсцес легенів
- ☐ b. Ексудативний плеврит
- ☐ c. Сухий плеврит
- ☐ d. Вірусна інфекція Herpeszoster
- ☐ e. Пневмонія

Коментар

Правильна відповідь: Вірусна інфекція Herpeszoster

Питання 105

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 7-ми років у реанімаційному відділенні надаються реанімаційні заходи у зв'язку з зупинкою серця. Після проведення інтубації та ШВЛ почервоніли шкірні покриви, з'явився пульс на великих судинах, ЧСС-40/хв., АТ-50/30 мм рт.ст. Яка подальша тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Введення серцевих глікозидів
- ☐ б. Введення розчину допаміну
- ☐ в. Введення глюкокортикоїдів
- ☐ г. Введення 0,1% розчину атропіну
- ☐ д. Введення сольових розчинів


Коментар

Правильна відповідь: Введення 0,1% розчину атропіну

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий евакуйований з зони військових дій. Під час огляду: АТ-110/90 мм рт.ст., Рс-100/хв., індекс Альговера складає 1. Постраждалий дещо загальмований, але легко вступає в контакт, реагує на біль. Шкірні покриви бліді, дихання прискорене, втрата крові близько 800 мл. Який ступінь геморагічного шоку в хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. IV
- ☐ б. II
- ☐ в. III
- ☐ г. I


Коментар

Правильна відповідь: I

Питання 107

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вантажник 36-ти років був притиснутий бортом автомобіля до стіни у ділянці грудної клітки. Скарги на загальну слабкість, задишку, біль і відчуття тяжкості в грудній клітці на боці ураження. Об'єктивно: блідість шкіри, тахікардія, пульс слабкого наповнення, артеріальний тиск знижений, симптоми недостатності дихання. Вкажіть обсяг первинної лікарської допомоги:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Серцеві глікозиди, дихальні аналептики
- ☐ б. Негайна госпіталізація до травматологічного відділення
- ☐ в. Напівсидяче положення, анальгетики, інгаляція кисню
- ☐ г. Плевральна пункція у VII міжребір'ї
- ☐ д. Катетеризація центральної вени, інфузійна терапія


Коментар

Правильна відповідь: Напівсидяче положення, анальгетики, інгаляція кисню

Питання 108

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 36-ти років скаржиться на інтенсивний біль у епігастральній ділянці, багаторазове блювання, яке не приносить полегшення, виражену загальну слабкість. Об'єктивно: загальний стан важкий, шкіра та видимі слизові - бліді, з поодинокими фіолетовими плямами. Ps-100/хв., АТ100/60 мм рт.ст. Під час пальпації живота визначається ригідність черевної стінки та різка болючість у епігастральній ділянці на 6см вище пупка та у лівому ребернохребетному куті. Пульсація аорти у епігастральній ділянці не визначається. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Розшаровуюча аневризма аорти
- ☐ б. Перфоративна виразка
- ☐ в. Гострий холецистит
- ☐ г. Гострий апендицит
- ☐ д. Гострий панкреатит

Коментар

Правильна відповідь: Гострий панкреатит

Питання 109

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До клініки дитячої хірургії доставлений новонароджений 3-х тижнів життя. На фоні повного благополуччя відзначається блювання "фонтаном" впродовж останніх двох тижнів. Блювотні маси не містять жовчі. Запідозрений пілоростеноз. Який вид обстеження буде найінформативнішим? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Рентгенконтрастне дослідження шлунка
- ☐ b. Колоноскопія
- ☐ c. Лапароскопія
- ☐ d. УЗД органів черевної порожнини
- ☐ e. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини

Коментар

Правильна відповідь: Рентгенконтрастне дослідження шлунка

Питання 110

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В приймальне відділення лікарні доставлено хворого з гострою затримкою сечі. Яке інструментальне обстеження найбільш інформативне? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Хромоцистоскопія
- ☐ b. Сцинтиграфія
- ☐ c. УЗД органів малого тазу та заочеревинного простору
- ☐ d. Екскреторна урографія
- ☐ e. Цистоскопія

Коментар

Правильна відповідь: УЗД органів малого тазу та заочеревинного простору

Питання 111

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В лікарню доставлена жінка 22-х років зі скаргами на біль в нижніх відділах живота, рясні кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Рс-90/хв, АТ-100/70 мм рт.ст, живіт м'який. Остання менструація 6 тижнів тому. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий апендицит
- ☐ б. Тромбоз мезентеріальних судин
- ☐ в. Самовільний викидень
- ☐ г. Порушена позаматкова вагітність
- ☐ д. Апоплексія яєчника


Коментар

Правильна відповідь: Самовільний викидень

Питання 112

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі 35-ти років відбулися треті термінові нормальні пологи. Загальна крововтрата склала 400 мл, через 1 годину з піхви з'явилося 100 мл кров'янистих виділень із згустками. Які діагностичні заходи необхідно провести для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Кюретаж порожнини матки
- ☐ б. Визначення висоти стояння дна матки
- ☐ в. Загальний аналіз крові
- ☐ г. Огляд шийки матки в дзеркалах
- ☐ д. Зондування порожнини матки


Коментар

Правильна відповідь: Огляд шийки матки в дзеркалах

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 8-ми років підвищення температури до 39°C, нежить зі значними гнійними виділеннями, вологий кашель, кон'юнктивіт з гнійним виділенням, світлобоязливість. На слизовій оболонці щік білуваті ділянки висівкоподібно злушеного епітелію. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Скарлатина
- ☐ b. Грип
- ☐ c. Кореподібна краснуха
- ☐ d. Висипний тиф
- ☐ e. Кір


Коментар

Правильна відповідь: Кір

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 25-ти років внаслідок ДТП отримала важку черепно-мозкову травму, знаходиться в коматозному стані. Проведена М-Ехо-енцефалографія. Знайдено зміщення серединних структур мозку вправо на 12 мм. За допомогою комп'ютерної томографії в лобно-тім'яній ділянці зліва знайдена субдуральна гематома розміром 6x7x7 см. Яка тактика лікування?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Проведення дезінтоксикаційної терапії
- ☐ b. Нагляд за хворою у динаміці
- ☐ c. Застосування оксібаротерапії
- ☐ d. Проведення краніоцеребральної гіпотермії
- ☐ e. Хірургічне лікування

Коментар

Правильна відповідь: Хірургічне лікування

Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 40-ка років тиждень тому переніс "на ногах" ГРВІ. Стан поступово погіршувався. Об'єктивно: млявий, сонливий, шкіра сірувато-блідого кольору, суха. В легенях ослаблене дихання, місцями сухі хрипи. ЧД-26/хв. Тони серця глухі, аритмічні, ЧСС-104/хв., АТ-90/65 мм рт.ст. Живіт м'який, печінка +3-4 см. Діурез 120 мл за добу. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра серцево-судинна недостатність
- ☐ б. Бронхопневмонія
- ☐ в. Гострий міокардит
- ☐ г. Гостра ниркова недостатність
- ☐ д. Тромбоемболія легеневої артерії


Коментар

Правильна відповідь: Гостра ниркова недостатність

Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 49-ти років діагностовано ішемічний інсульт. Прийнято рішення про початок тромболітичної терапії. В які строки від початку захворювання терапія буде максимально ефективною?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. До 1-ї доби
- ☐ б. До 6-ти годин
- ☐ в. До 3-х годин
- ☐ г. В діапазоні 6-12 годин
- ☐ д. До 1-ї години

Коментар

Правильна відповідь: До 3-х годин

Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 58-ми років доставлений до приймального відділення з діагнозом гострий інфаркт міокарда. Раптово знепритомнів. Об'єктивно: пульс не визначається, дихання відсутнє, зіниці розширені. Яка тактика чергового лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Надання невідкладної медикаментозної допомоги
- ☐ b. Негайна реєстрація ЕКГ для визначення подальшої тактики
- ☐ c. Розпочати серцево-легеневу реанімацію
- ☐ d. Викликати чергову реанімаційну бригаду
- ☐ e. Негайне транспортування хворого до відділення реанімації


Коментар

Правильна відповідь: Розпочати серцево-легеневу реанімацію

Питання 118

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини на третю добу життя з'явилися ознаки шлунково-кишкової кровотечі (блювання з домішками крові, мелена), постгеморагічної анемії. З якого розчину слід розпочати парентеральне лікування геморагічного синдрому у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Свіжозаморожена плазма
- ☐ b. Тромбоцитарна маса
- ☐ c. Амінокапронова кислота
- ☐ d. Глюкозо-сольовий розчин
- ☐ e. Реополіглюкін

Коментар

Правильна відповідь: Свіжозаморожена плазма

Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець 20-ти років потрапив у осередок дії ОР. Евакуйований до МПБ, введено підшкірно 4 мл 0,1% розчину атропіну. Скарги на загальну слабкість, спрагу, сухість у горлі, охриплість голосу, збудження, дратівливість. Шкіра обличчя гіперемована, зіниці розширені. В легенях жорстке дихання. Рс-112/хв, АТ-140/90 мм рт.ст. Що стало причиною зазначеної картини? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Передозування реактиваторів холінестерази
- ☐ б. Ураження дифосгеном
- ☐ в. Ураження зоманом
- ☐ г. Атропінізація організму
- ☐ д. Ураження зарином


Коментар

Правильна відповідь: Атропінізація організму

Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 6-ти років, оперованій з приводу розлитого перитоніту, у процесі забезпечення анестезіологічного засобу, проводиться штучна вентиляція легень у режимі помірної гіпервентиляції. На яких цифрах необхідно підтримувати рівень рСО₂ у КЛС-грамі? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 30-35 мм рт.ст.
- ☐ б. 20-25 мм рт.ст.
- ☐ в. 40-45 мм рт.ст.
- ☐ г. 50-55 мм рт.ст.
- ☐ д. 35-40 мм рт.ст.

Коментар

Правильна відповідь: 30-35 мм рт.ст.

Питання 121

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Спостерігається значний викид радіонуклідів в атмосферу пошкодженим ядерний реактором. Очікувана доза опромінення всього тіла за перші 10 діб становить 50 мЗв. Яких захисних заходів треба вжити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Використовувати укриття та засоби захисту органів дихання та шкірного покриву
- ☐ б. Евакуація населення із зон радіоактивного забруднення
- ☐ в. Ніяких, тому що дози х-опромінення не перевищують допустимі рівні
- ☐ г. Провести йодну профілактику
- ☐ д. Обмежити вживання забруднених радіонуклідами харчових продуктів та питної води


Коментар

Правильна відповідь: Використовувати укриття та засоби захисту органів дихання та шкірного покриву

Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 36-ти років була проведена корекція анемії трансфузією 350 мл еритроцитарної маси. Через 25 хвилин після переливання з'явились скарги на задишку, нудоту, пропасницю, біль за грудниною та в поперековій ділянці. Об'єктивно: стан тяжкий, збуджений, задишка. АТ-90/70 мм рт.ст. ЧСС-112/хв. Тони приглушені, ритмічні. В сечі через 2 години виявлені жовчні пігменти. Яке ускладнення трансфузійної терапії виникло?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра гемолітична реакція
- ☐ б. Цитратна інтоксикація
- ☐ в. Інфекційні ускладнення
- ☐ г. Анафілактична реакція
- ☐ д. Пірогенна реакція


Коментар

Правильна відповідь: Гостра гемолітична реакція

Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілого 33-х років через 3 години після землетрусу доставлено до клініки. Об'єктивно: відірвана верхня права кінцівка, кукса під джгутом. АТ–60/30 мм рт.ст., ЧСС–140/хв. Який ступінь шоку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. II
- ☐ b. IV
- ☐ c. I
- ☐ d. V
- ☐ e. III


Коментар

Правильна відповідь: III

Питання 124

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 28-ми років доставлена до лікарні машиною швидкої допомоги без свідомості. Об'єктивно: запах ацетону у повітрі, що видихається, шкіра суха, язик обкладений коричневим нальотом, сухий, тонус очних яблук знижений, дихання за типом Кусмауля. Цукор крові - 25,2 ммоль/л, ацетон сечі ++, осмолярність крові - 280 мосмоль/л. Які невідкладні заходи потрібно вжити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози
- ☐ b. Внутрішньом'язове введення 1% розчину глюкагону
- ☐ c. Внутрішньовенне краплинне введення 2,5% розчину бікарбонату натрію
- ☐ d. Внутрішньовенне краплинне введення 5% розчину глюкози
- ☐ e. Проведення регідrataції, дробне введення інсуліну

Коментар

Правильна відповідь: Проведення регідrataції, дробне введення інсуліну

Питання 125

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина народилася від матері, яка хвора на цукровий діабет. Навколоплідні води були меконіальними. Дихання у дитини відсутнє, гіпотонія м'язів. Хлопчик поміщений під лампу променевого тепла, забезпечене правильне положення голови, проведено відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів, дитина заінтубована. Які подальші дії реаніматолога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Відсмоктування меконію трубкою, обсушування,ШВЛ
- ☐ b. Введення адреналіну ендотрахеально
- ☐ c. Непрямий масаж серця
- ☐ d. Оксигенотерапія вільним потоком
- ☐ e. ШВЛ через інтубаційну трубку


Коментар

Правильна відповідь: Відсмоктування меконію трубкою, обсушування,ШВЛ

Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 53-х років, хворого на цукровий діабет II типу, розвинулася кома. Глікемія - 36 ммоль/л, калій 4,4 ммоль/л, натрій - 160 ммоль/л, рН крові - 7,24, стандартний бікарбонат 20 ммоль/л, зсув буферних основ - 4 ммоль/л, сечовина - 16 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіперосмолярна кома
- ☐ b. Діабетичний кетоацидоз
- ☐ c. Гіперлактацидемічна кома
- ☐ d. Гіпоглікемічна кома
- ☐ e. Гостра серцева недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 40-ка років протягом тривалого часу хворіє на виразкову хворобу шлунка. Відмітив, що в останні 2 дні вираженість болю стала меншою, але з'явилися слабкість, запаморочення. Вранці, при вставанні з ліжка, він на кілька секунд знепритомнів. Об'єктивно: блідий. Пальпаторно в епігастральній ділянці незначна болісність. Симптоми подразнення очеревини відсутні. Які методи діагностики слід використати в першу чергу для верифікації даної патології?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Оглядова рентгенографія черевної порожнини
- ☐ b. Рентгеноскопія шлунка
- ☐ c. Комп'ютерна томографія черевної порожнини
- ☐ d. УЗД черевної порожнини
- ☐ e. ФГДС


Коментар

Правильна відповідь: ФГДС

Питання 128

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки в 37 тижнів вагітності виникла кровотеча із статевих шляхів, наступила втрата свідомості. Про що слід подумати в першу чергу, виходячи з цих даних?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рак шийки матки
- ☐ b. Геморагічний шок
- ☐ c. Відшарування плаценти
- ☐ d. Центральне передлежання плаценти
- ☐ e. Септичний шок


Коментар

Правильна відповідь: Геморагічний шок

Питання 129

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 38-ми років впродовж 23-х років страждає на часті, серійні генералізовані судомні напади. Прогресує зниження пам'яті, інертність мислення, гарячність. 12 годин тому розпочалися генералізовані тоніко-клонічні напади. Впродовж останніх двох годин між нападами свідомість не поновлюється. Який першочерговий захід надання допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Введення внутрішньом'язово гексеналу
- ☐ б. Введення внутрішньовенно натрію оксибутирату
- ☐ в. Введення внутрішньом'язово магнію сульфату
- ☐ г. Введення внутрішньовенно діазепаму
- ☐ ґ. Введення в клізмі хлоралгідрату


Коментар

Правильна відповідь: Введення внутрішньовенно діазепаму

Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 13-ти років, яка впродовж 3-х років хворіє на цукровий діабет, доставлена у відділення інтенсивної терапії. Після перенесеного грипу протягом 2-х тижнів з'явилися спрага, поліурія, втрата ваги. Поступово збільшувалася слабкість, з'явилася сонливість. Під час госпіталізації цукор крові – 20 ммоль/л, цукор сечі - 4% , кетонові тіла в сечі +++++. Діагностовано діабетичну (гіперглікемічну кетоацидотичну) прекому. Розпочата регідраційна терапія ізотонічним розчином хлориду натрію. Яка початкова доза інсуліну має бути призначена?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 0,5 ОД/кг/годину
- ☐ б. 1 ОД/кг/годину
- ☐ в. 0,05-0,1 ОД/кг/годину
- ☐ г. 0,5-1,0 ОД/годину
- ☐ ґ. 1-1,5 ОД/кг/добу

Коментар

Правильна відповідь: 0,05-0,1 ОД/кг/годину

Питання 131

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 30-ти років скаржиться на пронос з домішками слизу і крові, переймоподібний біль у животі. Хворіє 4 роки, впродовж яких схуд на 10 кг. Об'єктивно: Рс100/хв., АТ-100/60 мм рт.ст., температура – 38,0оС. Живіт м'який, болючий у лівій здухвинній ділянці. У крові: ер.- 3, 1*10¹²/л, Нb-85 г/л, лейкоц.- 11,2*10⁹/л, ШЗЕ- 32 мм/год. Реакція Грегерсена позитивна. Іригоскопія - товста кишка звужена, зернистість слизової оболонки, гаустри відсутні, контури нечіткі. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Неспецифічний виразковий коліт
- ☐ b. Хвороба Крона
- ☐ с. Синдром подразненої товстої кишки
- ☐ d. Туберкульоз кишечника
- ☐ е. Хронічний коліт

Коментар

Правильна відповідь: Неспецифічний виразковий коліт

Питання 132

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років впав з мотоцикла. Скаржиться на біль у лівому стегні і гомілці. Об'єктивно: відзначається патологічна рухомість і крепітація кісткових уламків у нижній третині лівого стегна і верхній третині гомілки. Яку транспортну іммобілізацію слід застосувати для профілактики травматичного шоку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Шину Крамера і прибинтувати хвору ногу до здорової
- ☐ b. Шину Крамера
- ☐ с. Прибинтувати одну кінцівку до іншої
- ☐ d. Дві шини Крамера
- ☐ е. Шину Дітерікса

Коментар

Правильна відповідь: Шину Дітерікса

Питання 133

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 5-ти років, що хвора на грип, спостерігається втрата свідомості. При люмбальній пункції спинномозкова рідина витікала частими краплями, цитоз - 5 клітин. Про що в першу чергу треба думати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Епілепсія
- ☐ b. Нейротоксикоз
- ☐ c. Менінгіт
- ☐ d. Непритомність
- ☐ e. Колапс

Коментар

Правильна відповідь: Нейротоксикоз

Питання 134

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 9-ти років на фоні отруєння грибами відмічається вкрай тяжкий загальний стан. Шкірні покриви різко бліді, свідомість затьмарена. Протягом останніх 2-х діб спостерігається анурія на фоні інтенсивної консервативної терапії. Яка подальша лікувальна тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Провести плазмаферез
- ☐ b. Продовжити призначену терапію
- ☐ c. Провести гемодіаліз
- ☐ d. Посилити консервативну терапію
- ☐ e. Провести гемосорбцію

Коментар

Правильна відповідь: Провести гемодіаліз

Питання 135

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 19-ти років захворів тиждень тому з появи слабкості, зниження апетиту, важкості в епігастрії; помітив темний колір сечі. Об'єктивно: стан задовільний, інтоксикація не виражена, активний, склери і шкіра субіктеричні, печінка еластичної консистенції, виступає на 2 см. У сироватці виявлений HBsAg, АлАТ-2,12 ммоль/л•год; білірубін 39,7 мкмоль/л. Де доцільно лікувати даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Соматичне відділення
- ☐ b. Боксове відділення
- ☐ c. Стаціонар на дому
- ☐ d. Амбулаторно
- ☐ e. Інфекційне відділення

Коментар

Правильна відповідь: Інфекційне відділення

Питання 136

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина від першої вагітності, термінових пологів, з дистocieєю плечиків, народилася з вагою 4620 г, довжина 54 см. Оцінка за шкалою Апгар 8-8 балів. При народженні закричав відразу, реакція на огляд помірно знижена. Крик гучний, роздратований. Через 30 хвилин після народження дитина стогне, з'явилися дихальні розлади, через годину тонічні судоми. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Сидром дихальних розладів
- ☐ b. Вроджена вада серця
- ☐ c. Вроджена пневмонія
- ☐ d. Пологова травма
- ☐ e. Асфіксія

Коментар

Правильна відповідь: Пологова травма

Питання 137

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому 39-ти років необхідне переливання еритроцитарної маси. При визначенні групової належності крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВ0 аглютинація спостерігалась в краплях з сироватками 0 (I) та B (III). Кров якої групи потрібно перелити пацієнту? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. A (II)
- ☐ b. B (III)
- ☐ c. 0 (I)
- ☐ d. AB (IV)

Коментар

Правильна відповідь: A (II)

Питання 138

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 40-ка років доставлено до приймального відділення. Відзначається запах алкоголю з рота, відкривання очей та мовні відповіді відсутні, нецілеспрямований рух на біль. Об'єктивно: дихання часте (>40/хв), поверхневе, АТ-90/40 мм рт.ст., Рс112/хв. Що треба зробити в першу чергу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Форсований діурез
- ☐ b. Позаниркові методи детоксикації (гемодіаліз, гемосорбція)
- ☐ c. Зондове промивання шлунку
- ☐ d. Внутрішньовенно бемеград
- ☐ e. Інтубація трахеї

Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї

Питання 139

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик у віці 6 місяців хворіє на тяжку форму кашлюка: число нападів кашлю становить 25, напади тяжкі, тривалістю до 10 хвилин, мають 6-8 репризів, закінчуються блюванням. Один з нападів кашлю призвів до апное. Які невідкладні дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Седуксен внутрішньом'язово
- ☐ b. Налагодити подачу кисню
- ☐ c. Лобелін внутрішньом'язово
- ☐ d. Штучне дихання (в ручному режимі)
- ☐ e. Преднізолон внутрішньом'язово


Коментар

Правильна відповідь: Штучне дихання (в ручному режимі)

Питання 140

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

З метою швидкого поповнення крововтрати хворому перелито 1000 мл однокрупної резус-сумісної донорської крові. Наприкінці гемотрансфузії у хворого з'явилися неспокій, блідість шкірних покривів, тахікардія, судоми м'язів. Яка причина появи даної симптоматики?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоемболія
- ☐ b. Цитратна інтоксикація
- ☐ c. Анафілактична реакція
- ☐ d. Гемотрансфузійний шок
- ☐ e. Пірогенна реакція

Коментар

Правильна відповідь: Цитратна інтоксикація

Питання 141

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального покою доставлений хворий 48-ми років, що знайдений на вулиці взимку. Об'єктивно: сонливий, рівень свідомості - оглушення, температура – 31,0оС, шкіра блідо-ціанотична, холодна, з мармуровим відтінком в ділянках ліктьових та колінних суглобів, Рs-54/хв., АТ-95/60 мм рт.ст., ЧД-8/хв., поверхневе. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Геморагічний інсульт
- ☐ b. Гіпертонічний криз
- ☐ с. Отруєння чадним газом
- ☐ d. Переохолодження середнього ступеня
- ☐ е. Ішемічний інсульт


Коментар

Правильна відповідь: Переохолодження середнього ступеня

Питання 142

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого після амбулаторного лікування пневмонії виникли лихоманка, гіпертермія, озноб та кашель з виділенням харкотиння з неприємним запахом та прожилками крові. При аускультатії легень справа в нижній частці амфоричне дихання, вологі хрипи. Рентгенологічно: справа в нижній частці порожнина до 4 см в діаметрі, з рівнем рідини. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інфільтративний туберкульоз
- ☐ b. Рак легень
- ☐ с. Крупозна пневмонія
- ☐ d. Гангрена легень
- ☐ е. Абсцес легень

Коментар

Правильна відповідь: Абсцес легень

Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У постраждалого у ДТП перелом кісток таза. Відмічається уретрорагія. Нестерпні тенезми, які підсилюють біль. Виділення сечі немає. Пальпаторно і перкуторно визначається розтягнутий сечовий міхур. Перша медична допомога буде полягати в наступному:
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Катетеризація сечового міхура металевим катетером
- ☐ b. Катетеризація сечового міхура еластичним катетером
- ☐ c. Катетеризація сечового міхура по провіднику
- ☐ d. Надлобкова пункція сечового міхура
- ☐ e. Консервативне лікування (знеболювання, гемостатична терапія)


Коментар

Правильна відповідь: Надлобкова пункція сечового міхура

Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 45-ти років грип з важким перебігом ускладнився віруснобактеріальною двобічною пневмонією та розвитком гострого дистрес-синдрому. Сатурація кисню 70% . Хвора переведена до реанімаційного відділення. Що необхідно провести хворій?
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Катетеризація підключичної вени
- ☐ b. Штучна вентиляція легень
- ☐ c. Трахеостомія з аспірацією
- ☐ d. Непрямий масаж серця
- ☐ e. Бронхоскопія з аспірацією


Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 20-ти років лікується з приводу гострого гепатиту мікст (B+D). На 8-й день захворювання у нього різко зросла жовтяниця, з'явилися дезорієнтація, психомоторне збудження, а через короткий час - втрата свідомості, патологічні рефлекси та мимовільне сечовиділення і дефекація, сумнівні менінгеальні знаки. Визначте прогноз стану хворого:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Сприятливий
- ☐ b. Неприятливий
- ☐ c. Хронізація хвороби
- ☐ d. Сумнівний
- ☐ e. Одужання


Коментар

Правильна відповідь: Неприятливий

Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 49-ти років, шофер, доставлений в клініку через 3 години після діагностованого інфаркту міокарда. Під час транспортування декілька разів втрачав свідомість, виникали судоми.

Об'єктивно: стан хворого важкий. АТ-100/50 мм рт.ст. ЧСС-35/хв. На ЕКГ: повна атріовентрикулярна блокада, елевация сегменту ST у V1-V4. З чого необхідно розпочати надання невідкладної допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Призначення допаміну
- ☐ b. Призначення серцевих глікозидів
- ☐ c. Призначення морфіну
- ☐ d. Дефібриляція
- ☐ e. Електрокардіостимуляція


Коментар

Правильна відповідь: Електрокардіостимуляція

Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 22-х років госпіталізована сімейним лікарем у відділення хірургії. Скарги на гострі болі у ділянці ануса, підвищення температури тіла до 37,8оС. Пальпаторно визначається пухлиноподібне утворення у ділянці 2-х годин умовного циферблату, розміром 2х3 см, різко болісне. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Рак прямої кишки
- ☐ b. Гострий парапроктит
- ☐ с. Тріщина прямої кишки
- ☐ d. Гострий сфінктерит
- ☐ е. Гострий геморой


Коментар

Правильна відповідь: Гострий парапроктит

Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 9-ти років скарги на загальну слабкість, підвищення температури до 37,8оС, висипання на шкірі. Об'єктивно: на шкірі еритема, набряк, множинні бульозні елементи. В анамнезі контакт з рослинами після дощу. Яке лікування необхідно призначити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ентеросорбенти
- ☐ b. Глюкокортикоїди
- ☐ с. Антибіотики
- ☐ d. Антигістамінні
- ☐ е. Сечогінні

Коментар

Правильна відповідь: Глюкокортикоїди

Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні бригадою ШМД доставлена жінка 32-х років. З анамнезу: протягом останніх 2-х років знаходилась на диспансерному обліку з приводу аутоімунної гемолітичної анемії. Об'єктивно: стан середньої важкості, температура 37,3оС, шкіра лимонно-жовтого кольору, Рс-98/хв. АТ80/55 мм рт.ст., збільшена селезінка. У крові: ер.- 2,6*10¹²/л, Нb-70 г/л, КП- 0,94, лейкоц.- 6,1*10⁹/л, ШЗЕ-19 мм/год, непрямий білірубін - 58 мкмоль/л. Що необхідно призначити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Преднізолон
- ☐ б. Трансфузія консервованої крові
- ☐ в. Еритроцитарна маса
- ☐ г. Інтерферон
- ☐ д. Ферум-лек


Коментар

Правильна відповідь: Преднізолон

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина народжена в терміні гестації 39 тижнів з масою 3500 г, довжиною 54 см. Загальний стан при народженні середньої тяжкості за рахунок гострої асфіксії. Після проведення заходів первинної реанімації новонароджених у дитини з'явилося самостійне дихання, ЧСС-110/хв., але зберігається ціаноз шкірних покривів. Яка подальша дія лікаря-неонатолога у даній ситуації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інтубація трахеї
- ☐ б. Відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів
- ☐ в. Штучний масаж серця
- ☐ г. Допоміжна вентиляція легенів
- ☐ д. Киснева підтримка


Коментар

Правильна відповідь: Киснева підтримка

Питання 151

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 2-х тижнів, що народилася з вагою 3 кг, маса тіла на момент огляду 2900 г, груди смочені, м'язова гіпотонія, рефлекс періоду новонародженості пригнічені, тім'ячко западає, губи сухі, клитор збільшений, гіперпігментація сосків молочних залоз та статевих губ. Зважаючи на ризик критичного стану насамперед у дитини слід динамічно оцінювати:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Артеріальний тиск
- ☐ б. Гідратацію і рівень електролітів
- ☐ в. Неврологічний статус
- ☐ г. Вагову криву
- ☐ ґ. Рівень кортизолу в крові


Коментар

Правильна відповідь: Гідратацію і рівень електролітів

Питання 152

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 11-ти років на фоні важкого перебігу ревматизму з включенням до терапії преднізолону раптово з'явилися болі в животі, диспептичні явища, кров у випорожненнях. Який додатковий метод найбільш доцільно провести для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. рН-метрія
- ☐ б. Фіброгастродуоденоскопія
- ☐ в. Шлункове фракційне зондування
- ☐ г. Рентгенологічне дослідження ШКТ
- ☐ ґ. Бактеріологічні дослідження

Коментар

Правильна відповідь: Фіброгастродуоденоскопія

Питання 153

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 65-ти років виник біль в тазу, що іррадіює в промежину при сечовипусканні. У хворого протягом тривалого часу в зв'язку з аденомою передміхурової залози був введений уретральний катетер. Біль посилюється під час сечовипускання, яке стало частим, періодично спостерігається раптове "перекриття" струменя сечі. Яке обстеження з метою диференційної діагностики слід виконати в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рентгенографія органів малого тазу
- ☐ b. Лапароскопія
- ☐ c. Цистоскопія
- ☐ d. КТ органів малого тазу
- ☐ e. УЗД органів малого тазу


Коментар

Правильна відповідь: Цистоскопія

Питання 154

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Упостраждалого з важкою комбінованою травмою констатовано зупинку дихання, розширення зіниць, відсутність пульсу на магістральних судинах. Які негайні заходи необхідно вжити при асистолії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення ?-адреноблокаторів
- ☐ b. Інфузія поліглюкіну
- ☐ c. Внутрішньовенне введення натрію гідрокарбонату
- ☐ d. Введення кортикостероїдів
- ☐ e. Штучне дихання, закритий масаж серця

Коментар

Правильна відповідь: Штучне дихання, закритий масаж серця

Питання 155

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 10-ти років яка страждає на хронічний гломерулонефрит, змішану форму, стан раптово погіршився: АТ145/95 мм рт.ст., ендogenous креатинін – 1,056 ммоль/л, сечовина – 18,8 ммоль/л, калій плазми – 7,5 ммоль/л, діурез – відсутній. Який препарат із діуретичних препаратів треба призначити першочергово?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпотіазид
- ☐ б. Лазикс
- ☐ в. Еуфілін
- ☐ г. Аріфон
- ☐ д. Спіронолактон


Коментар

Правильна відповідь: Лазикс

Питання 156

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 6-ти років скаржиться на загальну слабкість, генералізований свербіж та почервоніння шкіри, гостре підвищення температури тіла до 38,0оС. Із анамнезу: перший день хвороби.

Протягом кількох годин після обробки невеликого садна іхтіоловою маззю з'явилися поширені гіперемовані папульозно-уртикарні висипання, що виступають над поверхнею шкіри в ділянці передпліччя, живота, стегон, гомілок. Укажіть найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Алергічний контактний дерматит
- ☐ б. Атопічний дерматит - нейродерміт, період загострення
- ☐ в. Генералізована кропивниця
- ☐ г. Токсикодермія
- ☐ д. набряк Квінке


Коментар

Правильна відповідь: Генералізована кропивниця

Питання 157

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Першовагітна 18-ти років прийшла на прийом. Строк вагітності 28 тижнів. Жінка соматично здорова. Вагітність перебігає без ускладнень. Під час огляду на кушетці жінка зблідла, шкіра стала вологою, з'явилися різка слабкість, нудота, знепритомніла. АТ- 80/50 мм рт.ст., Рс-88/хв., слабого наповнення і напруження. Яка перша допомога в даній ситуації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Обкласти вагітну грілками, напоїти гарячим чаєм
- ☐ б. Ввести мезатон 1,0 мл п/ш
- ☐ в. Ввести розчин 5% глюкози 50,0 мл в/в
- ☐ г. Повернути жінку на лівий бік, потім її посадити
- ☐ е. Ввести 1,0 мл 0,2% розчину норадреналіну в 0,5 л 5% р-ну глюкози


Коментар

Правильна відповідь: Повернути жінку на лівий бік, потім її посадити

Питання 158

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні доставлена жінка 50-ти років, яку 2 години тому покусав собака. Який оптимальний обсяг первинної хірургічної обробки укушеної рани?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Висічення рани в межах здорової тканини
- ☐ б. Промивання рани розчинами антисептиків, що мають лужне середовище
- ☐ в. Дренування рани
- ☐ г. Розсічення рани по ходу ранового каналу
- ☐ е. Промивання рани розчинами антисептиків, що мають кисле середовище

Коментар

Правильна відповідь: Промивання рани розчинами антисептиків, що мають лужне середовище

Питання 159

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На стаціонарному лікуванні перебуває вагітна жінка 33-х років. Строк вагітності 34 тижні. Впродовж останніх 2-х діб висуває скарги на головний біль, запаморочення, відчуття тяжкості в ділянці потилиці, зорові розлади. Мають місце набряки. АТ160/120 мм рт.ст., ЧСС-88/хв. В сечі: протягом доби зростаюча протеїнурія до 3,2 г/л. Діурез знижений. Яка найбільш імовірна патологія, яка обумовила цю симптоматику?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпертонічний криз
- ☐ б. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ в. Еклампсія
- ☐ г. Тяжка прееклампсія
- ☐ д. Прееклампсія середньої тяжкості


Коментар

Правильна відповідь: Тяжка прееклампсія

Питання 160

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна на останньому триместрі, прийнявши горизонтальне положення, знепритомніла. Черговий лікар підняв хвору, надавши їй вертикальне положення. Хвора опритомніла. Тони серця чисті, ритмічні, 76/хв., дихання везикулярне, АТ-100/70 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ортостатичний колапс
- ☐ б. Істерія
- ☐ в. Вегето-судинна дистонія
- ☐ г. Стиснення нижньої порожнистої вени маткою
- ☐ д. Вазодепресивне зомління


Коментар

Правильна відповідь: Стиснення нижньої порожнистої вени маткою

Питання 161

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 40-ка років скаржиться на інтенсивні болі в горлі при ковтанні, виражену задишку, що посилюється у горизонтальному положенні і супроводжується нападами задухи. При непрямій ларингоскопії виявлений абсцес надгортанника. Нижче розташовані відділи гортані оглянути не вдається. Від трахеотомії хворий категорично відмовився. На висоті чергового нападу задухи з'явився ціаноз, судоми та наступила зупинка дихання. Яку першочергову допомогу слід надати? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Штучна вентиляція легенів методом рот в рот
- ☐ b. Інтубація трахеї
- ☐ c. Конікотомія
- ☐ d. Ендоларингеальне розкриття абсцесу під контролем прямої ларингоскопії
- ☐ e. Трахеотомія


Коментар

Правильна відповідь: Конікотомія

Питання 162

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 53-х років із оклюзією правої нирки каменем та загостренням хронічного пієлонефриту розвинувся інфекційнотоксичний шок. Призначена інфузійна терапія. Після підвищення артеріального тиску з метою профілактики повторного зниження його, які слід здійснити першочергові заходи?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Призначити гідрокарбонат натрію
- ☐ b. Відновити відтік сечі з нирки
- ☐ c. Призначити серцеві глікозиди
- ☐ d. Призначити сечогінні препарати
- ☐ e. Посилити антибактеріальну терапію


Коментар

Правильна відповідь: Відновити відтік сечі з нирки

Питання 163

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого скарги на гарячку, озноб, різкий біль у правій пахвинній ділянці, запаморочення, блювання. Об'єктивно: обличчя і кон'юнктиви яскраво-червоні, язик сухий вкритий білим нальотом. В правій пахвинній ділянці різко болючий бубон, шкіра над ним червона, блискуча. З анамнезу: 3 дні тому повернувся у складі геологічної партії з Монголії. Про яке захворювання можна думати? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Чума
- ☐ b. Туляремія
- ☐ c. Геморагічні гарячки
- ☐ d. Лімфаденіт
- ☐ e. Сибірка


Коментар

Правильна відповідь: Чума

Питання 164

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 4-тижневого віку через 2 тижні від початку захворювання, що проявляється блюванням "фонтаном", вираженою гіпотрофією і ексикозом, педіатр запідозрив вроджений пілоростеноз. При надходженні до дитячого відділення стан вкрай важкий: риси обличчя загострені, адинамія, сильна спрага, анурія, запах сечі з рота, сірість шкірних покривів. У сироватці крові: натрій - 135 моль/л, калій - 3,7 ммоль/л. Коматозний стан якого характеру розвинувся у дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Азотемічна кома
- ☐ b. Гіпохлоремічна кома
- ☐ c. Гіпоглікемічна кома
- ☐ d. Кетоацидотична кома
- ☐ e. Гіперосмолярна кома

Коментар

Правильна відповідь: Гіпохлоремічна кома

Питання 165

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 47-ми років госпіталізована зі скаргами на слабкість, жовтяницю, свербіж шкіри. Захворіла 2,5 місяці тому, гостро, з явищами ознобу та підвищенням температури до 39°C; через 2 тижні виникла наростаюча жовтяниця. Об'єктивно: значна жовтяниця, печінка не пальпується, жовчний міхур збільшений, не болючий. Білірубін крові - 190 мкмоль/л, за рахунок прямого. Кал ахолічний. Яка ймовірна причина жовтяниці у хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Механічна жовтяниця
- ☐ b. Синдром Каролі
- ☐ c. Гемолітична жовтяниця
- ☐ d. Хвороба Жильбера
- ☐ e. Паренхіматозна жовтяниця

Коментар

Правильна відповідь: Механічна жовтяниця

Питання 166

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При огляді дівчинка 7-ми років раптово знепритомніла. Шкіра та слизові блідоціанотичні. Екскурсій грудної клітини немає. Пульс на магістральних артеріях не визначається. Розпочато реанімаційні заходи. Яке дослідження необхідно використати для визначення серцевого ритму?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. УЗД
- ☐ b. ЕЕГ
- ☐ c. Ангіографія
- ☐ d. ЕКГ
- ☐ e. Пульсоксиметрія

Коментар

Правильна відповідь: ЕКГ

Питання 167

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні поступила дівчинка 14-ти років, яка 2 години тому із суїцидальними намірами випила 100 мл оцту. Дитина в свідомості, емоційно лабільна. Скарги на біль у роті та епігастрії, спрагу, слинотечу. При огляді - слизова оболонка рота гіперемована. Пальпаторно - напруження передньої черевної стінки. Для надання допомоги необхідно:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Промити шлунок розчином калію перманганату
- ☐ б. Викликати штучне блювання
- ☐ в. Промити шлунок холодною кип'яченою водою через зонд
- ☐ г. Не промивати шлунок, ввести активоване вугілля
- ☐ д. Промити шлунок розчином соди через зонд

Коментар

Правильна відповідь: Промити шлунок холодною кип'яченою водою через зонд

Питання 168

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 47-ми років страждає на туберкульоз легенів 10 років. Періодично знаходиться на лікуванні в відділенні хронічних форм туберкульозу. Викликав "швидку допомогу" в зв'язку з появою кровотечі. З ротової порожнини впродовж 1 години виділилось 0,5 літра пінистої яскраво-червоної крові. Куди треба госпіталізувати хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Пульмонологічне відділення багатoproфільної лікарні
- ☐ б. Хірургічне відділення багатoproфільної лікарні
- ☐ в. Торакальне відділення протитуберкульозного диспансеру
- ☐ г. Терапевтичне відділення загальносоматичної лікарні
- ☐ д. Терапевтичне відділення протитуберкульозного диспансеру

Коментар

Правильна відповідь: Торакальне відділення протитуберкульозного диспансеру

Питання 169

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 26-ти років збуджена, поведінка неадекватна, свідомість сплутана, розвинулося психомоторне збудження. В анамнезі - цукровий діабет I типу протягом 4-х років, добова доза інсуліну 54 ОД. Об'єктивно: шкіра волога, холодна, тургор нормальний, гіперрефлексія, зіниці розширені. АТ-140/90 мм рт.ст., Рс-88/хв. Глікемія 2,3 ммоль/л, аглюкозурия. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіпоглікемічна кома
- ☐ b. Вегетативний криз
- ☐ c. Тиреотоксична кома
- ☐ d. Кетоацидотична кома
- ☐ e. Адисонічний криз

Коментар

Правильна відповідь: Гіпоглікемічна кома

Питання 170

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитину 11-ти місяців на 3-й день хвороби госпіталізовано до інфекційного стаціонару з підвищенням температури тіла до 38,00С, багаторазовим блюванням і частими водянистими випороженнями. Маса тіла знижена на 6%. Який метод регідrataції треба призначити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Внутрішньовенний струминний
- ☐ b. Введення рідини ендогастральнo
- ☐ c. Внутрішньовенний крапельний
- ☐ d. Оральна регідrataція
- ☐ e. Введення рідини підшкірно крапельно

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенний крапельний

Питання 171

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пологовий будинок доставлена вагітна без свідомості після трьох нападів еклампсії у терміні 32 тижні. Об'єктивно: стан дуже тяжкий, АТ-180/120 мм рт.ст., анурія. Серцебиття плода глухе, 142/хв. Шийка матки сформована, канал шийки матки закритий. Тактика ведення вагітної? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інтенсивна терапія протягом декількох годин, потім кесарів розтин
- ☐ б. Передопераційна підготовка зШВЛ протягом декількох годин, потім оперативне розродження
- ☐ в. Створення глюкозо-вітамінгормонально-кальцієвого фону у сукупності з комплексною інтенсивною терапією
- ☐ г. Комплексна терапія гестозу протягом доби, потім розродження
- ☐ д. Розродження шляхом кесаревого розтину в екстреному порядку

Коментар

Правильна відповідь: Розродження шляхом кесаревого розтину в екстреному порядку

Питання 172

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий поступив зі скаргами на напад серцебиття, ядуху, перебої в роботі серця. Подібні стани спостерігались і раніше. На ЕКГ: миготлива аритмія, ЧСС-160/хв. ЕхоКГ: зниження фракції викиду до 45%. З якого препарату доцільно надавати невідкладну допомогу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Дигоксин
- ☐ б. Анаприлін
- ☐ в. Новокаїнамід
- ☐ г. Верапаміл
- ☐ д. Кордарон


Коментар

Правильна відповідь: Дигоксин

Питання 173

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого болі в грудній клітці, які виникли після травми, задишка, слабкість. Об'єктивно: тахіпное, відставання правої половини грудної клітки в диханні, розширені вени шиї. Прогресує дихальна недостатність. Рентгенологічно: відсутність легеневого малюнка правої легені, середостіння зміщене вліво, на вдиху зміщується вправо. Купол діафрагми зміщений донизу. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Напружений пневмоторакс
- ☐ b. Закритий пневмоторакс
- ☐ c. Емфізема середостіння
- ☐ d. Емболія легеневої артерії
- ☐ e. Гемопневмоторакс


Коментар

Правильна відповідь: Напружений пневмоторакс

Питання 174

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На другу добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зобу у хворої з'явилися тонічні судоми пальців ("рука акушера"), позитивні симптоми Хвостека, Вейса, Труссо. Яке ускладнення операції виникло?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Анафілактичний шок
- ☐ b. Тиреотоксичний криз
- ☐ c. Гіпопаратиреоз
- ☐ d. Асфіксія
- ☐ e. Інфаркт міокарда


Коментар

Правильна відповідь: Гіпопаратиреоз

Питання 175

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 38-ми років, що страждає на нирковий туберкульоз, привезений родичами до районної лікарні в непритомному стані. Об'єктивно: кома 1. Гіпотрофія 2 ст. Шкіра та слизові коричневого кольору з бронзовим відливом. На шкірі окремі осередки вітиліго. АТ-65/0 мм рт.ст., ЧСС-44/хв. Діагностована гостра надниркова недостатність. Який препарат треба ввести в першу чергу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Новодрін
- ☐ b. Адреналін
- ☐ c. Реополіглюкін
- ☐ d. Дексаметазон
- ☐ e. Мезатон


Коментар

Правильна відповідь: Дексаметазон

Питання 176

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На місці ДТП лікар ШМД оглядає дівчинку 12-ти років. Виявлено ознаки порушеної перфузії: мрамуровість шкірних покривів, уповільнена перфузія нігтьових лож, ціаноз носо-губного трикутника, ЧСС-140/хв, систолічний тиск 40 мм рт.ст. Який метод є оптимальним для корекції гемодинамічних розладів?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інфузія добутаміну
- ☐ b. Синхронізована кардіоверсія
- ☐ c. Інфузія сольових розчинів
- ☐ d. Призначення спазмолітичних препаратів
- ☐ e. Призначення атропіну


Коментар

Правильна відповідь: Інфузія сольових розчинів

Питання 177

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Молодого чоловіка вкусила гадюка у ділянку стопи. Який з нижченаведених невідкладних заходів слід виконувати саме при укусі гадюки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Імобілізація ураженої кінцівки
- ☐ b. Накладання тугого джгута на кінцівку вище ділянки укусу
- ☐ c. Обробка рани антисептиками
- ☐ d. Вичавлювання залишків отрути з рани
- ☐ e. Накладення стерильної пов'язки на рану


Коментар

Правильна відповідь: Імобілізація ураженої кінцівки

Питання 178

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 26-ти років, незаміжня, звернулась до лікаря жіночої консультації з скаргами на головний біль, який завжди супроводжує менструацію. З анамнезу з'ясовано, що головний біль виникає не тільки під час місячних, але й після перенапруження, а також при різкій зміні погодних умов. Ритм менструацій збережений: через 28-29 днів, по 3-4 дні, безболісні. При гінекологічному огляді патології не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ b. Мігрень
- ☐ c. Енцефаліт
- ☐ d. Передменструальний синдром
- ☐ e. Овуляторний синдром

Коментар

Правильна відповідь: Мігрень

Питання 179

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт під час ковтання цукерки захрипів, схопився за шию, посинів і через 3 хвилини знепритомнів. Об'єктивно: свідомість відсутня, обличчя і шия ціанотичні, нерегулярні та непродуктивні рухи грудної клітки. На сонних артеріях - слабка пульсація. При пальцевій ревізії ротоглотки визначається округле стороннє тіло, змістити яке не вдається. Спроба змістити його при перекиданні пацієнта через коліно - невдала. Які подальші дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Верхня трахеотомія
- ☐ b. Транспортування до стаціонару
- ☐ c. Нижня трахеотомія
- ☐ d. Крікотиреотомія
- ☐ e. Пункція трахеї


Коментар

Правильна відповідь: Крікотиреотомія

Питання 180

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 79-ти років знаходиться у ПІТ в ранньому післяопераційному періоді з приводу кишкової непрохідності. Хворому необхідно проводити інфузійну терапію, парентеральне харчування.

Поверхнева венозна сітка погано розвинута. Яка тактика в плані забезпечення венозного доступу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Відмінити інфузійну терапію та парентеральне харчування
- ☐ b. Вводити ліки підшкірно
- ☐ c. Відновити ентеральне харчування
- ☐ d. Катетеризація порожнини серця
- ☐ e. Пункція та катетеризація підключичної вени

Коментар

Правильна відповідь: Пункція та катетеризація підключичної вени

Питання 181

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Реанімаційна бригада швидкої медичної допомоги прибула на виклик до опіятного наркомана 23-х років. Об'єктивно: свідомість відсутня, ціаноз, брадикардное, брадикардия.Що терміново показано хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Форсований діурез
- ☐ b. Призначення налорфіну
- ☐ c. Інфузійна терапія
- ☐ d. Оксигенотерапія через маску
- ☐ e. Штучна вентиляція легень


Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 182

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого скарги на біль у правому підребер'ї, слабкість, блювання, пронос, які з'явилися 5 годин тому. В анамнезі 2 тижні назад тупа травма живота. Об'єктивно гіпотензія, тахікардія. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Двоетапний розрив печінки
- ☐ b. Розрив селезінки
- ☐ c. Гострий апендицит
- ☐ d. Перитоніт
- ☐ e. Розрив кишечника

Коментар

Правильна відповідь: Двоетапний розрив печінки

Питання 183

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 25-ти років госпіталізований у відділення інтенсивної терапії через 30 хвилин після ДТП у стані важкого травматичного шоку. Пацієнту виконано лапароцентез з діагностичним перитонеальним лаважем. Отримано зворотній тік злегка геморагічного каламутного ексудату. В ексудаті виявлені волокна клітковини з різким неприємним запахом. Про що це свідчить?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Пошкодження сечового міхура
- ☐ б. Пошкодження паренхіматозного органу
- ☐ в. Пошкодження підшлункової залози
- ☐ г. Пошкодження кишки
- ☐ д. Травматичних уражень внутрішніх органів нема


Коментар

Правильна відповідь: Пошкодження кишки

Питання 184

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На хімічному заводі в результаті аварії стався викид в повітря приміщення парів ціаністих сполук. У працівників, що знаходились в цеху, з'явилися почуття дряк в горлі, оніміння губ, язика, різкий головний біль, нудота, блювання, біль у животі, почервоніння шкіри. Які найважливіші невідкладні заходи потрібно здійснити для збереження життя уражених?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Забезпечити вдихання амілнітриту на місці аварії
- ☐ б. Ввести внутрішньовенно 10 мл 1% натрію нітриту
- ☐ в. Провести на місці аварії інфузію метиленового синього 50 мл 1% розчину на 5% розчині глюкози
- ☐ г. Оксигаротерапія у відділенні токсикології, антидотна терапія під час транспортування
- ☐ д. Інгаляція кисню через носові катетери

Коментар

Правильна відповідь: Оксигаротерапія у відділенні токсикології, антидотна терапія під час транспортування

Питання 185

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10-ти місяців, що постійно вигодовувалась коров'ячим молоком, відмічено виражений систолічний шум на верхівці серця та акроціаноз. Сонографічно вади серця не виявлено. У крові: Нb-38 г/л, КП- 0,7. Першочергова терапія:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Серцеві глікозиди по швидкій схемі насичення
- ☐ б. Введення рекормону
- ☐ в. Трансфузія еритроцитарної маси
- ☐ г. Ентеральне введення препаратів заліза
- ☐ д. Трансфузія цільної крові

Коментар

Правильна відповідь: Трансфузія еритроцитарної маси

Питання 186

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілого 35-ти років доставлено до приймального відділення без свідомості. Брав участь у ліквідації аварії на хімічному виробництві, пов'язаному з галогенованими вуглеводнями. Об'єктивно: зіниці розширені, на світло не реагують, дихання Кусмауля, ригідність м'язів потилиці та кінцівок, позитивні рефлекси Бабінського, Гордона, Жуковського. Різко виражена жовтяниця, петехіальна висипка. Температура тіла - 37,6оС. Що зумовило розвиток вказаного стану в хворого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра ниркова недостатність
- ☐ б. Геморагічна лихоманка
- ☐ в. Гостра надниркова недостатність
- ☐ г. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ д. Гостра печінкова недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

Питання 187

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитину 3-х років вжалила бджола у щок. Розвинувся набряк язика, шиї, обличчя. Різка інспіраторна задишка з частотою 60/хв. Р_с-144/хв. АТ-70/40 мм рт.ст. Аускультация легень: дихання різко ослаблене в нижніх відділах. Дитина різко збуджена. Який терапевтичний захід є першочерговим?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інгаляція кисню
- ☐ б. Преднізолон внутрішньовенно
- ☐ в. Лазикс внутрішньовенно
- ☐ г. Інтубація трахеї
- ☐ д. Обколоти постраждале місце адреналіном

Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї

Питання 188

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При аварії на ядерному реакторі відбувся викид в навколишнє середовище значної кількості радіоізотопів йоду. Яка добова доза йодиду калію показана для профілактики ураження щитоподібної залози?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 0,125 г
- ☐ б. 0,25 г
- ☐ в. 0,5 г
- ☐ г. 1 г
- ☐ д. 0,1 г


Коментар

Правильна відповідь: 0,125 г

Питання 189

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 18-ти років страждає на цукровий діабет I типу з 10-ти років. Отримує 60 ОД інсуліну на добу. Вранці поснідала недостатньо, через 2 години знепритомніла. Об'єктивно: свідомість відсутня. Дихання рівне, ритмічне. Шкіра волога, тонус м'язів кінцівок підвищений. АТ-110/70 мм рт.ст. Рс-80/хв. Прикушування язика немає. Менінгіальні симптоми відсутні. Що повинен виконати лікар швидкої допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Налаштувати в/в краплинне введення 5% р-ну глюкози та транспортувати до лікарні
- ☐ б. Налаштувати в/в краплинне введення 0,9% р-ну натрію хлориду та транспортувати до лікарні
- ☐ в. Ввести 20 ОД інсуліну п/ш та транспортувати до лікарні
- ☐ г. Доставити хвору у лікарню, де будуть виконані лікувальні заходи
- ☐ д. Ввести хворій 40% р-н глюкози в/в струминно та транспортувати до лікарні


Коментар

Правильна відповідь: Ввести хворій 40% р-н глюкози в/в струминно та транспортувати до лікарні

Питання 190

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 26-ти років, що лікується в гастроентерологічному відділенні з приводу пептичної виразки 12-палої кишки, годину тому з'явилися гострий біль у животі, блювання. Об'єктивно: живіт дошкоподібний, різко болючий у верхніх відділах. Яке дослідження доцільно провести хворому для встановлення причини ускладнення хвороби?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Іригоскопія
- ☐ б. Рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту з барієм
- ☐ в. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
- ☐ г. Оглядова рентгеноскопія живота в положенні стоячи
- ☐ д. Аналіз крові клінічний

Коментар

Правильна відповідь: Оглядова рентгеноскопія живота в положенні стоячи

Питання 191

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Особи, котрі брали участь у ліквідації наслідків ядерної аварії, отримали дозу опромінення 20 мЗв. Якої медичної допомоги вони потребують?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Обмежити вживання забруднених радіонуклідами харчових продуктів та питної води
- ☐ б. Потрібно провести йодну профілактику
- ☐ в. Переселення або евакуація населення
- ☐ г. Використовуються укриття та засоби захисту органів дихання та шкірного покриву
- ☐ д. Ніяку, тому що дози х-опромінення не перевищують допустимі рівні

Коментар

Правильна відповідь: Ніяку, тому що дози х-опромінення не перевищують допустимі рівні

Питання 192

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 62-х років хворіє на хронічне обструктивне захворювання легенів. Об'єктивно: ядуха, ЧД- 34/хв., ортопноє, акроціаноз, дихання клакочуче, чути на відстані, під час кашлю виділяється пінисте харкотиння рожевого кольору у великій кількості, Ps- 120/хв., слабкого наповнення, АТ- 80/50 мм рт.ст. Над легенями - маса різнокаліберних вологих хрипів. В яке відділення має бути госпіталізований хворий?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Хворий не потребує госпіталізації
- ☐ б. Пульмонологічне відділення
- ☐ в. Загальнотерапевтичне відділення
- ☐ г. Відділення реанімації та інтенсивної терапії
- ☐ д. Хірургічне відділення


Коментар

Правильна відповідь: Відділення реанімації та інтенсивної терапії

Питання 193

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У спекотну погоду юнак 14-ти років відпочивав на пляжі. Через 6 годин вдома поскаржився на загальну слабкість, головний біль, запаморочення, нудоту й блювання. Об'єктивно: гіперемія шкіри обличчя та голови, одутлість обличчя. Шкірні покриви вологі. ЧД-19/хв., АТ-125/80 мм рт.ст., ЧСС=Ps=104/хв. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Нейроциркуляторна дистонія
- ☐ b. Сонячний удар
- ☐ c. Тепловий удар легкого ступеня
- ☐ d. Тепловий удар важкого ступеня
- ☐ e. Тепловий удар середнього ступеня


Коментар

Правильна відповідь: Сонячний удар

Питання 194

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка 58-ми років, що знаходиться на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби, раптово знепритомніла. Черговий лікар діагностував зупинку серцевої діяльності та дихання. Після забезпечення прохідності дихальних шляхів необхідні наступні заходи:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести внутрішньосерцево адреналін
- ☐ b. Ввести внутрішньовенно лідокаїн
- ☐ c. Ввести внутрішньосерцево норадреналін
- ☐ d. Ввести внутрішньосерцево атропін
- ☐ e. Штучна вентиляція легень, зовнішній масаж серця


Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень, зовнішній масаж серця

Питання 195

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Сімейного лікаря, який іде у поїзді, запросили у сусіднє купе до пасажира, який, за словами оточуючих, поперхнувся шматком м'яса. Об'єктивно: ціаноз, при спробі вдихнути роздається різкий свист. Який з перерахованих заходів лікар має виконати перш за все?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Почати виконувати штучну вентиляцію легень
- ☐ b. Трахеотомія підручними засобами
- ☐ c. Прийом Геймліха
- ☐ d. Зупинити поїзд та викликати швидку


Коментар

Правильна відповідь: Прийом Геймліха

Питання 196

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 6-ти років госпіталізована до дитячого відділення з бронхопневмонією. Страждає на atopічний дерматит. Після внутрішньом'язового введення ампіциліну з'явилися відчуття стиснення у грудях, запаморочення, різка блідість, ціаноз, холодний піт, прискорене шумне дихання. Який із перелічених препаратів слід увести в маніпуляційній негайно?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Розчин преднізолону внутрішньовенно
- ☐ b. Розчин тавегілу внутрішньовенно
- ☐ c. Розчин строфантину внутрішньовенно
- ☐ d. Розчин еуфіліну внутрішньовенно
- ☐ e. Розчин адреналіну підшкірно

Коментар

Правильна відповідь: Розчин адреналіну підшкірно

Питання 197

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого зі стенозом пілоричного відділу шлунка з приводу виразкової хвороби останні 2 місяці спостерігаються безперервні блювання. Схуднув на 15 кг, зневоднений. Поступив у тяжкому стані, у приймальному відділенні з'явилися судоми. Яке обстеження необхідно провести для діагностики ускладнення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Рентгенографія шлунка
- ☐ б. УЗД органів черевної порожнини
- ☐ в. Визначення гематокриту
- ☐ г. УЗД, визначення рівня кальцію в крові
- ☐ д. Комп'ютерна томографія


Коментар

Правильна відповідь: УЗД, визначення рівня кальцію в крові

Питання 198

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна в терміні 32 тижні страждає на міастенію. З'явилися розлади дихання, тахікардія, психомоторне збудження, яке змінюється млявістю, апатією, парезом кишечника та сфінктерів. Першочергові засоби невідкладної допомоги:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. ШВЛ з застосуванням міорелаксантів курареподібної дії
- ☐ б. Термінове розродження
- ☐ в. Введення транквілізаторів
- ☐ г. Профілактика гіпоксії плоду
- ☐ д. Призначення прозерину

Коментар

Правильна відповідь: Призначення прозерину

Питання 199

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 29-ти лікар на шкірі передпліччя виявив різко болючий інфільтрат діаметром до 2 см, перифокальний набряк, лімфангоїт, лімфаденіт. У крові: лейкоц.- $13 \cdot 10^{12}/л$, п- 20% . Три дні тому хворий повернувся з Індії. З хворим контактувало 3 особи. Тактика лікаря відносно контактних: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Медичне спостереження в амбулаторних умовах
- ☐ б. Направити в госпіталь особливо небезпечних інфекцій
- ☐ в. За контактними не спостерігати
- ☐ г. Госпіталізувати в обсерваційне відділення
- ☐ д. Госпіталізувати в провізорний госпіталь


Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізувати в обсерваційне відділення

Питання 200

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини діагностовано клініку атрезії стравоходу. Назвіть найбільш вірне положення хворого з атрезією стравоходу з нижньою трахеостравохідною норицею під час транспортування:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. На правому боці
- ☐ б. Горизонтальне
- ☐ в. Положення не має значення
- ☐ г. Вертикальне
- ☐ д. З припіднятим тазовим кінцем

Коментар

Правильна відповідь: Вертикальне

[Завершити перегляд](#)

[Пропустити](#) Перехід по тесту

[Перехід по тесту](#)

[Питання 1](#) [На цій сторінці](#) [Питання 2](#) [На цій сторінці](#) [Питання 3](#) [На цій сторінці](#) [Питання 4](#) [На цій сторінці](#) [Питання 5](#) [На цій сторінці](#) [Питання 6](#) [На цій сторінці](#) [Питання 7](#) [На цій сторінці](#) [Питання 8](#)

Учасники

[Відзнаки](#)

[Компетентності](#)

[Журнал оцінок](#)

[Загальне](#)

[Секція 1](#)

[Секція 2](#)

[Секція 3](#)

[Секція 4](#)

[Контрольні тестування](#)

[Секція 6](#)

[Секція 7](#)

[Секція 8](#)

[Секція 9](#)

[Секція 10](#)

[Секція 11](#)

[Секція 12](#)

[Секція 13](#)

[Секція 14](#)

[Секція 15](#)

[Особистий кабінет](#)

[Домашня сторінка](#)

[Календар](#)

[Особисті файли](#)

[Мої курси](#)

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручняк Оксана Богданівна \(Вийти\)](#)
КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Українська \(uk\)](#)
-

- English (en)
- Русский (ru)
- Українська (uk)