

[Перейти до головного вмісту](#)
[Бокова панель](#)
[КРОК-123](#)

(Інтерн БДМУ) Підручняк Оксана Богданівна

П

Особистий кабінетПрофіль користувачаОцінкиПовідомленняУподобанняВийтиПовідомлення
[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане
Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане
Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)


[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Секція 3](#)
- [2016 осінь](#)

Розпочато	Tuesday 14 February 2023 20:37 PM
Стан	Завершено
Завершено	Tuesday 14 February 2023 20:37 PM
Витрачено часу	18 сек
Балів	0,00/200,00
Оцінка	0,00 з 100,00 можливих
Питання 1	

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 29-ти років захворів гостро 18 годин тому: після вживання заливної риби з'явилися нудота, повторне блювання, часті пінисті рідкі зеленуваті випорожнення, підвищення температури до 39°C. Об'єктивно: стан важкий. Блідий, млявий, тургор шкіри різко знижений, сухість слизової оболонки рота, АТ- 80/40 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, 112/хв., живіт болючий в епігастрії, біляпупковій та ілеоцекальній ділянках, зменшення виділення сечі. Які невідкладні терапевтичні заходи?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Внутрішньовенне введення реополіглюкіну
- ☐ б. Внутрішньовенне введення сольових розчинів
- ☐ в. Парентеральне введення антибіотиків
- ☐ г. Внутрішньовенне введення розчину глюкози
- ☐ д. Введення глюкокортикостероїдів


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне введення сольових розчинів

Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий вилучений з палаючої будівлі з опіками II-IIIА ступеня 30% поверхні тіла. Рівень свідомості - кома І. Найбільш імовірною причиною коматозного стану є:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Отруєння парами синільної кислоти
- ☐ б. Важкий опіковий шок
- ☐ в. Психоемоційний стрес
- ☐ г. Отруєння ціанідами
- ☐ д. Отруєння чадним газом

Коментар

Правильна відповідь: Отруєння чадним газом

Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Перша медична допомога (само- та взаємодопомога) при радіаційних ураженнях передбачає усунення або послаблення початкових ознак променевої хвороби. З цією метою особовий склад Збройних Сил безпосередньо після вибуху для профілактики первинної реакції бере з індивідуальної аптечки (одну таблетку):

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вібрацин
- ☐ b. Етаперазин
- ☐ c. Цистамін
- ☐ d. Будагсим
- ☐ e. Доксидикліну гідрохлорид


Коментар

Правильна відповідь: Етаперазин

Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт під час ковтання цукерки захрипів, схопився за шию, посинів і через 3 хвилини знепритомнів. Об'єктивно: свідомість відсутня, обличчя і шия ціанотичні, нерегулярні та непродуктивні рухи грудної клітки. На сонних артеріях - слабка пульсація. При пальцевій ревізії ротоглотки визначається округле стороннє тіло, змістити яке не вдається. Спроба змістити його при перекиданні пацієнта через коліно - невдала. Які подальші дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Верхня трахеотомія
- ☐ b. Нижня трахеотомія
- ☐ c. Транспортування до стаціонару
- ☐ d. Пункція трахеї
- ☐ e. Крікотиреотомія


Коментар

Правильна відповідь: Крікотиреотомія

Питання 5

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 25-ти років отримав відкритий перелом обох кісток правої гомілки при вибуху міни. На етапі кваліфікованої медичної допомоги проводиться первинна хірургічна обробка рани. Яка хірургічна маніпуляція категорично заборонена?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Глухий шов рани
- ☐ b. Видалення сторонніх тіл
- ☐ c. Проточне дренування рани
- ☐ d. Видалення зруйнованих тканин
- ☐ e. Широке розсічення рани


Коментар

Правильна відповідь: Глухий шов рани

Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Відразу після народження немовля нерухоме, синє і не дихає. Відповіді на тактильну стимуляцію немає, ЧСС становить 40/хв. Який із перерахованих заходів найімовірніше відновить нормальний спонтанний серцевий ритм?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Непрямий масаж серця
- ☐ b. Додаткова тактильна стимуляція
- ☐ c. Введення атропіну
- ☐ d. Введення адреналіну
- ☐ e. Штучна вентиляція легень

Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 47-ми років 3 дні тому з'явилися помірний біль у горлі, кашель, захриплість голосу, температура - 37, 8оС, поступово наросла інспіраторна задишка, кашель став афонічним. Об'єктивно: стан важкий, неспокійна, шкіра бліда з ціанотичним відтінком. В акті дихання бере участь допоміжна мускулатура. На мигдаликах, з розповсюдженням на піднебінні дужки, нальоти сірувато-білого кольору. Яку терапію слід призначити? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. ГБО, специфічна сироватка
- ☐ б. Специфічна сироватка, антибіотики
- ☐ в. Селективні $\beta 2$ -адреноміметики, специфічна сироватка
- ☐ г. ШВЛ, специфічна сироватка, антибіотики
- ☐ д. Глюкокортикостероїди, антибіотики


Коментар

Правильна відповідь: ШВЛ, специфічна сироватка, антибіотики

Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 46-ти років, що страждає на цукровий діабет II типу з загостренням ІХС, розвинулася гіперосмолярна діабетична кома. Особливості гіперосмолярної коми: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Дегідратація
- ☐ б. Відсутність кетоацидозу
- ☐ в. Наявність кетоацидозу
- ☐ г. Часта олігурія
- ☐ д. Часта азотемія

Коментар

Правильна відповідь: Відсутність кетоацидозу

Питання 9

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 9-ти років, яка хворіє на цукровий діабет, на тлі кишкової інфекції виникли і наростають неврологічні симптоми: порушення орієнтації, галюцинації, фокальні судоми. Наявні ознаки дегідратації III ступеня, дихальних порушень немає, запах ацетону відсутній. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпоглікемічна кома
- ☐ б. Гіперосмолярна кома
- ☐ в. Діабетична кетоацидотична кома
- ☐ г. Енцефаліт
- ☐ д. Пухлина головного мозку


Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До інфекційного відділення надійшов хворий 20-ти років з ознаками дегідратації III ступеня. Спостерігаються судоми, блювання фонтаном, різке зниження артеріального тиску, тахікардія, температура тіла - 35,5°C. З якою швидкістю треба проводити в/в інфузію для відновлення водноелектролітного балансу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 100-120 мл/хв.
- ☐ б. Швидкість не має значення
- ☐ в. 80-100 мл/хв.
- ☐ г. 50-80 мл/хв.
- ☐ д. 30-50 мл/хв.

Коментар

Правильна відповідь: 100-120 мл/хв.

Питання 11

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 60-ти років доставлена до приймального відділення непритомною, з гіпореклексією, зниженим артеріальним тиском, брадикардією, брадикардією. Рік тому перенесла субтотальну резекцію щитоподібної залози. Замісну терапію не проходила. Для якого стану характерні наведені ознаки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тиреотоксичний криз
- ☐ б. Отруєння невідомою отрутою
- ☐ в. Геморагічний шок
- ☐ г. Мікседематозна кома
- ☐ д. Гіпопаратиреоїдизм


Коментар

Правильна відповідь: Мікседематозна кома

Питання 12

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого після автомобільної аварії з'явилися скарги на різку задишку, кашель з кров'ю. Об'єктивно: шкіра бліда, ціанотична. Підшкірна емфізема в ділянці грудної клітки, живота, шиї справа. Аускультативно: справа дихання не вислуховується. Рс-130/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., Нt- 0,25, Нb- 88 г/л. Які першочергові заходи лікаря на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Негайна штучна вентиляція легень
- ☐ б. Трансфузія еритромаси відповідно до групової і резусної належності
- ☐ в. Активна аспірація повітря справа
- ☐ г. Дофамін 2-5 мкг/кг/хв., інфузія колоїдних розчинів
- ☐ д. Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди

Коментар

Правильна відповідь: Активна аспірація повітря справа

Питання 13

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення лікарні звернувся постраждалий у стані легкого алкогольного сп'яніння зі скаргами на порушення зору, що виникли після вживання спиртного. Найбільш імовірний діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Отруєння метанолом
- ☐ б. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ в. Гострий напад глаукоми
- ☐ г. Отруєння етиленгліколем
- ☐ д. Отруєння етанолом


Коментар

Правильна відповідь: Отруєння метанолом

Питання 14

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 40 тижнів з бурхливою пологовою діяльністю, клінічно вузьким тазом. Під час індукції наркозу виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів та ротової порожнини. В подальшому розвинувся ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, над легенями різнокаліберні вологі хрипи, підвищення тиску на вдиху. При контролі газів крові - значна гіпоксемія. Яка причина цього стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Синдром Мендельсона
- ☐ б. Набряк легенів
- ☐ в. Ендотоксичний шок
- ☐ г. Емболія навколоплідними водами
- ☐ д. Інфаркт міокарда

Коментар

Правильна відповідь: Синдром Мендельсона

Питання 15

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 66-ти років скаржиться на серцебиття, біль у серці, слабкість. Симптоми з'явилися раптово, після фізичного навантаження. На ЕКГ: комплекси QRS поширені до 0,12 секунд, зубець перед шлуночковим комплексом відсутній, ЧСС- 200/хв. Який лікарський засіб є препаратом вибору в цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Дигоксин
- ☐ b. Обзидан
- ☐ с. Хінідин
- ☐ d. Верапаміл
- ☐ е. Лідокаїн


Коментар

Правильна відповідь: Лідокаїн

Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На МПП доставлений сержант. Знаходився у групі солдат з ознаками променевої хвороби. Скарги на головний біль, нудоту. Боець збуджений, тривожний, вимагає повного обстеження для підтвердження ураження іонізуючим опроміненням, стан задовільний, у присутності лікаря з'являються гикавка та позиви на блювання, посилюється збудження, вираз страждання на обличчі, хитка хода. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Алкогольне сп'яніння
- ☐ b. Струс головного мозку
- ☐ с. Інтوكсикація наркотичними речовинами
- ☐ d. Гостра променева хвороба I ступеня
- ☐ е. Істерична реакція


Коментар

Правильна відповідь: Істерична реакція

Питання 17

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопець 20-ти років під час купання в річці раптово втратив свідомість та зник з поверхні води. Через 2 хвилини був доставлений до берега своїми однолітками. Об'єктивно: непритомний, шкіра вираженого фіолетово-синього кольору, велика кількість пінистих виділень з рота та з носа, дихання відсутнє, пульс на сонних артеріях не визначається. З чого потрібно починати комплекс СЛР?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Непрямий масаж серця
- ☐ b. Не проводити СЛР
- ☐ c. Прекардіальний удар
- ☐ d. ШВЛ
- ☐ e. Очистити верхні дихальні шляхи


Коментар

Правильна відповідь: Очистити верхні дихальні шляхи

Питання 18

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В приймальне відділення звернулися батьки з хлопчиком 8-ми років після укусу бджоли. Об'єктивно: виражений набряк у ділянці верхньої щелепи з обох боків, верхньої губи, гіперемія і свербіж. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Анафілактичний шок
- ☐ b. Атопічний дерматит
- ☐ c. Кропив'янка
- ☐ d. Стрептодермія
- ☐ e. Набряк Квінке


Коментар

Правильна відповідь: Набряк Квінке

Питання 19

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

З вогнища радіаційної катастрофи до медичного пункту полку доставлено 15 потерпілих. Через 20-25 хвилин після вибуху потерпілі стали відчувати різку слабкість, запаморочення, нудоту, з'явилося невпинне блювання. Об'єктивно: стан хворих важкий. Кволі, апатичні, на запитання відповідають з великою затримкою. ЧСС- 120/хв. з частими екстрасистолами, АТ- 70/30 мм рт.ст., ЧД- 28/хв. За даними індивідуального дозиметра доза отриманого випромінювання склала 8 Гр. Якій стадії гострої променевої хвороби відповідає наведена симптоматика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. I
- ☐ b. III
- ☐ c. V
- ☐ d. II
- ☐ e. IV


Коментар

Правильна відповідь: IV

Питання 20

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 4-тижневого віку через 2 тижні від початку захворювання, що проявляється блюванням "фонтаном", вираженою гіпотрофією і ексикозом, педіатр припустив вроджений пілоростеноз. При надходженні до дитячого відділення стан вкрай важкий: риси обличчя загострені, адинамія, сильна спрага, анурія, запах сечі з рота, сірість шкірних покривів. У сироватці крові: натрій - 135 моль/л, калій - 3,7 ммоль/л. Коматозний стан якого характеру розвинувся у дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіпоглікемічна кома
- ☐ b. Азотемічна кома
- ☐ c. Гіперосмолярна кома
- ☐ d. Гіпохлоремічна кома
- ☐ e. Кетоацидотична кома

Коментар

Правильна відповідь: Гіпохлоремічна кома

Питання 21

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт поступив в приймальне відділення психікарні. Зловживає алкоголем 15 років, неодноразово лікувався. Останній запій тривав 2 місяці. 3 дні не вживав алкоголю, став збудженим, вночі не спав. Об'єктивно: шкірні покриви вологі, гіперемія обличчя, виражений тремор. Оглядається, під ліжком бачить щурів та павуків, намагається їх спіймати. Дезорієнтований у місці, часі. Препаратом вибору є:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Аспірин
- ☐ b. Анальгін
- ☐ c. Седуксен
- ☐ d. Фінлепсин
- ☐ e. Вітамін С

Коментар

Правильна відповідь: Седуксен

Питання 22

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 27-ми років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу вірусного гепатиту А. На 7-й день лікування після вечері великою кількістю м'ясної їжі у хворого пропав апетит, з'явились блювання, гикавка, запаморочення. Хворий збуджений. Шкіра жовтяничного кольору, геморагії на шкірі, тремор м'язів, сповільнена мова. Розміри печінки зменшилися. Діагновано гостру печінкову недостатність. Введення якого препарату, що використовується в лікуванні печінкової недостатності, дозволить зменшити ендогенну інтоксикацію?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Небіволпол
- ☐ b. 100 мл ізотонічного розчину
- ☐ c. Орнідазол
- ☐ d. 20 мл 40% глюкози
- ☐ e. Лактулоза

Коментар

Правильна відповідь: Лактулоза

Питання 23

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після аварії на хімічному підприємстві рятувальники знайшли постраждалого, який скаржиться на головний біль, відчуття стиснення в грудній клітці, нудоту, часте блювання. На одязі й шкірі виявлено невідому хімічну речовину. Який об'єм медичної допомоги потрібно негайно надати постраждалому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Надіти протигаз, увести антидот, підготувати постраждалого до евакуації
- ☐ б. Надіти протигаз, винести постраждалого із осередку ураження, провести часткову санітарну обробку уражених ділянок шкіри
- ☐ в. Провести часткову санітарну обробку, увести антидот, підготувати постраждалого до евакуації
- ☐ г. Зняти забруднений одяг, провести повну санітарну обробку, накласти стерильні пов'язки
- ☐ д. Накласти стерильні пов'язки на уражені ділянки шкіри, увести антидот

Коментар

Правильна відповідь: Надіти протигаз, винести постраждалого із осередку ураження, провести часткову санітарну обробку уражених ділянок шкіри

Питання 24

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Зафіксовано клінічну смерть. Вкажіть цільові значення сатурації киснем артеріальної крові (SpO₂) постраждалого після відновлення спонтанного кровообігу:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 100%
- ☐ б. 85%
- ☐ в. 86-90%
- ☐ г. 96-98%

☐ е. 91-93%


Коментар

Правильна відповідь: 96-98%

Питання 25

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 15-ти років раптово підвищилася температура тіла до 39,5оС, виник біль у горлі під час ковтання. На другу добу на обличчі, шиї, верхній частині тулуба на тлі гіперемованої шкіри тулуба виник дрібнокрапковий розеолезний висип з блідим носо-губним трикутником. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інфекційний мононуклеоз
- ☐ б. Вітряна віспа
- ☐ с. Скарлатина
- ☐ d. Кір
- ☐ е. Краснуха


Коментар

Правильна відповідь: Скарлатина

Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Необхідно провести електричну дефібриляцію дитині з фібриляцією шлуночків. Маса тіла становить близько 10 кг. Оберіть вірну потужність розряду для першої дефібриляції:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 20 Дж
- ☐ б. 80 Дж
- ☐ с. 5Дж/кг
- ☐ d. 4Дж
- ☐ е. 40 Дж


Коментар

Правильна відповідь: 20 Дж

Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 74-х років протягом останніх 5-ти років страждає на доброякісну гіперплазію простати. 4 доби тому, після вживання алкоголю, виникла гостра затримка сечовипускання. На догоспітальному етапі двічі на добу катетеризували сечовий міхур металевим катетером. Під час огляду: придаток правого яєчка збільшений, ущільнений, болючий, є гнійні виділення з уретри. Який вид невідкладної допомоги слід обрати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Епіцистостомія в ургентному порядку
- ☐ b. Встановлення інтрапростатичного стента
- ☐ c. Встановлення постійного уретрального катетера
- ☐ d. Трансуретральна резекція
- ☐ e. Мікрохвильова термотерапія простати


Коментар

Правильна відповідь: Епіцистостомія в ургентному порядку

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До медичної роти доставлено постраждалого з тяжким вогнепальним пораненням нижньої третини правого стегна. Кістка роздроблена. Магістральні судини пошкоджені. Кінцівка висить на клапті м'яких тканин. До якого виду медичної допомоги відноситься проведення відсікання кінцівки, яка висить на клапті м'яких тканин?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Долікарської (фельдшерської) медичної допомоги
- ☐ b. Першої медичної допомоги
- ☐ c. Кваліфікованої медичної допомоги
- ☐ d. Спеціалізованої медичної допомоги

☐ е. Першої лікарської допомоги
Коментар

Правильна відповідь: Першої лікарської допомоги

Питання 29

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення військового госпіталю доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням в ділянку черевної порожнини. Шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рс- 100/хв. Симптоми подразнення очеревини сумнівні. Яке дослідження треба виконати для уточнення діагнозу?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Лапаротомія
- ☐ б. Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини
- ☐ в. Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини
- ☐ г. Фіброгастродуоденоскопія
- ☐ е. УЗД органів черевної порожнини

Коментар

Правильна відповідь: УЗД органів черевної порожнини

Питання 30

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На другу добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зобу у хворої з'явилися тонічні судоми пальців ("рука акушера"), позитивні симптоми Хвостека, Вейса, Труссо. Яке ускладнення операції виникло?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Анафілактичний шок
- ☐ б. Асфіксія
- ☐ в. Інфаркт міокарда
- ☐ г. Тиреотоксичний криз

☐ е. Гіпопаратиреоз
Коментар

Правильна відповідь: Гіпопаратиреоз

Питання 31

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 52-х років в кардіологічному відділенні на фоні підвищення добової дози дигоксину стала тривожною, збудженою, казала, що знаходиться вдома, "бачить" навколо себе багато мишей, намагалася їх повиганяти і вимагала від дочки, яка, начебто, була присутня, щоб та їй допомагала. Правильно називала своє ім'я та вік. В анамнезі психічних розладів не спостерігалось. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інтоксикаційний делірій
- ☐ б. Продуктивні сніжки
- ☐ в. Сенильний делірій
- ☐ г. Хвороба Альцгеймера
- ☐ е. Пізній дебют шизофренії

Коментар

Правильна відповідь: Інтоксикаційний делірій

Питання 32

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 78-ми років викликав швидку допомогу з приводу блювання, здуття живота, наявності болючого гризового випинання у паху, яке не вправляється у черевну порожнину зі вчорашнього дня. Під час огляду лікарем швидкої допомоги гризове випинання вправилось, біль пройшов. Які дії лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Протягом години спостерігати за динамікою клінічної картини
- ☐ б. Рекомендувати хірургічне лікування у плановому порядку
- ☐ в. Призначити амбулаторне обстеження

- ☐ d. Призначити дієту і холод на живіт
 - ☐ e. Доставити хворого до стаціонару
- Коментар

Правильна відповідь: Доставити хворого до стаціонару

Питання 33

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час діагностичної ендоскопії у хворого 45-ти років виникла асистолія, яка діагностована електрокардіографічно. З яких заходів слід негайно розпочати лікування?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Електрокардіостимуляція
- ☐ b. Введення атропіну
- ☐ c. Дефібриляція
- ☐ d. Масаж серця, ШВЛ, адреналін
- ☐ e. Інфузія гідрокарбонату натрію

Коментар

Правильна відповідь: Масаж серця, ШВЛ, адреналін

Питання 34

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При променевому ураженні шкіри у хворого 33-х років спостерігається вологий дерматит, пухирі малі, ненапружені, займають менш ніж 50% поля. Така клінічна картина виникає при дозі опромінення:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 20-30 Гр
- ☐ b. 10-15 Гр
- ☐ c. 5-8 Гр
- ☐ d. 7-13 Гр
- ☐ e. 15-20 Гр

Коментар

Правильна відповідь: 15-20 Гр

Питання 35

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 38-ми років, що страждає на нирковий туберкульоз, в непритомному стані привезений родичами до районної лікарні. Об'єктивно: кома 1. Гіпотрофія 2 ст. Шкіра та слизові оболонки коричневого кольору з бронзовим полиском. На шкірі спостерігаються окремі осередки вітиліго. АТ- 65/0 мм рт.ст., ЧСС- 44/хв. Діагностована гостра надниркова недостатність. Який препарат треба ввести в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Мезатон
- ☐ b. Новодрин
- ☐ c. Дексаметазон
- ☐ d. Адреналін
- ☐ e. Реополіглюкін

Коментар

Правильна відповідь: Дексаметазон

Питання 36

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 52-х років з наявним трансфузіологічним анамнезом одразу після початку внутрішньовенного введення свіжозамороженої плазми виникли непродуктивний кашель, бронхоспазм, задуха, нудота, болі у животі, гіпотонія, після чого наступила втрата свідомості. Які найбільш правильні лікувальні заходи?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. В/в введення еуфіліну, гідрокортизону, інфузійна терапія, інгаляція кисню
- ☐ b. Негайна зупинка інфузії, в/в введення адреналіну, преднізолону, еуфіліну, інгаляція кисню
- ☐ c. Продовження інфузії, введення адреностимуляторів, глюкокортикостероїдів
- ☐ d. Джгут вище місця введення, обколювання розчином адреналіну, гідрокортизон в/в

☐ е. Негайна зупинка інфузії, інтубація трахеї, ШВЛ
Коментар

Правильна відповідь: Негайна зупинка інфузії, в/в введення адреналіну, преднізолону, еуфіліну, інгаляція кисню

Питання 37

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Бригаду швидкої допомоги викликано на місце пожежі, де було виявлено дитину 5-ти років з ознаками опіків на обличчі. Об'єктивно: диспное, захриплість голосу, стрідор. Перелом великогомілкової кістки. Ознаки наростаючої гіпоксемії з метаболічним ацидозом. Яка лікарська тактика?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Звертання в травмпункт
- ☐ б. Лікування в опіковому відділенні
- ☐ в. Термінова госпіталізація до ВРІТ
- ☐ г. Спостереження дільничного педіатра
- ☐ е. Амбулаторне лікування

Коментар

Правильна відповідь: Термінова госпіталізація до ВРІТ

Питання 38

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Народилась недоношена дитина, гестаційний вік 32 тижні, з вагою 1700 г, рівень глюкози крові становить 2,1 ммоль/л. У дитини відмічається порушення стану, судомна готовність. Виберіть першочергову допомогу для дитини:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 25% розчин $MgSO_4$, 1мл/кг
- ☐ б. 5% розчин глюкози, 4 мл/кг
- ☐ в. 10% розчин глюкози, 2 мл/кг
- ☐ г. Фенобарбітал, 20 мг/кг

☐ е. 0,9% розчин натрію хлориду, 10 мл/кг
Коментар

Правильна відповідь: 10% розчин глюкози, 2 мл/кг

Питання 39

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 12-ти років з нервово-артритичним діатезом після вживання в їжу значної кількості м'яса з кетчупом раптово виник гострий переймоподібний біль у животі та попереку, який іррадіює у статеві органи. При сечовипусканні отримано каламутну сечу з домішками крові. Найбільш імовірна причина гематурії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ниркова колька
- ☐ б. Геморагічний цистит
- ☐ в. Нефритичний синдром
- ☐ г. Травматичне ушкодження сечовивідних шляхів
- ☐ е. Гострий гломерулонефрит

Коментар

Правильна відповідь: Ниркова колька

Питання 40

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик у віці 6 місяців хворіє на тяжку форму кашлюка: число нападів кашлю становить 25, напади тяжкі, тривалістю до 10 хвилин, мають 6-8 репризів, закінчуються блюванням. Один з нападів кашлю призвів до апное. Які невідкладні дії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Лобелін в/м
- ☐ б. Штучне дихання (в ручному режимі)
- ☐ в. Налагодити подачу кисню
- ☐ г. Седуксен в/м

☐ е. Преднізолон в/м
Коментар

Правильна відповідь: Штучне дихання (в ручному режимі)

Питання 41

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Травмований мотоцикліст лежить на проїжджій частині дороги. Ліве стегно його деформоване в нижній третині, через зовнішню рану фонтанує кров. Де і який кровоспинний джгут необхідно застосувати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Артеріальний джгут в верхній третині стегна
- ☐ б. Венозний джгут на верхню третину гомілки
- ☐ в. Венозний джгут безпосередньо над раною
- ☐ г. Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна
- ☐ е. Артеріальний джгут в середній третині стегна

Коментар

Правильна відповідь: Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна

Питання 42

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець отримав вогнепальне поранення стегна з пошкодженням стегнової кістки. На догоспітальному етапі проведено знеболювання, зупинена кровотеча, кінцівка іммобілізована. Під час транспортування з'явився біль у грудній клітці, задишка, тахікардія. Що стало причиною погіршення стану пораненого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інфаркт міокарда
- ☐ б. Напад бронхіальної астми
- ☐ в. Тромбоемболія гілок легеневої артерії
- ☐ г. Жирова емболія

☐ е. набряк легенів
Коментар

Правильна відповідь: Жирова емболія

Питання 43

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ встановлена асистолія. Першочерговим терапевтичним заходом має бути:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення атропіну
- ☐ б. Введення адреналіну
- ☐ в. Введення лідокаїну
- ☐ г. Електрична дефібриляція
- ☐ е. Введення хлориду кальцію

Коментар

Правильна відповідь: Введення адреналіну

Питання 44

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До сімейного лікаря звернулася хвора 54-х років, зі скаргами на "стартовий", "блокадний" біль в колінних та кульшових суглобах, рухи обмежені, болючі. Хвора працює кухарем, підвищеного живлення. З анамнезу відомо, що мати хворої теж мала подібні скарги. Який метод діагностики є визначальним для встановлення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Загальний аналіз крові
- ☐ б. Загальний аналіз сечі
- ☐ в. Біохімічне визначення рівня сечовини
- ☐ г. Рентгенографія
- ☐ е. Артроскопія


Коментар

Правильна відповідь: Рентгенографія

Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого під час операції на шлунку було ушкоджено селезінкову артерію, в результаті чого виникла масивна кровотеча, яка призвела до зупинки кровообігу. Найдодільніше проводити: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Непрямий масаж серця
- ☐ b. Введення гідрокортизону
- ☐ c. Абдомінальну компресію
- ☐ d. Електрокардіостимуляцію
- ☐ e. Прямий масаж серця


Коментар

Правильна відповідь: Прямий масаж серця

Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 19-ти років збуджена, поведінка неадекватна, свідомість сплутана. В анамнезі - цукровий діабет типу 1 впродовж 3-х років. Отримує інсулінотерапію 60 ОД/добу. Об'єктивно: шкіра волога, холодна на дотик, гіперрефлексія, зіниці розширені, менінгеальних симптомів немає. Рс- 88/хв., АТ- 140/90 мм рт.ст. Глікемія - 2,3 ммоль/л, аглюкозурія. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кетоацидотична кома
- ☐ b. Молочнокисла кома
- ☐ c. Гіпоглікемічна кома
- ☐ d. Гіперосмолярна кома
- ☐ e. Гостре порушення мозкового кровообігу


Коментар

Правильна відповідь: Гіпоглікемічна кома

Питання 47

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В клініку дитячої хірургії надійшов хлопчик 6-ти місяців у важкому стані через 36 годин після початку захворювання з клінікою інвагінації кишечника. В сім'ї у дитини дідусь та батько хворіють на гемофілію. Дитині показане негайне оперативне втручання. Яка передопераційна підготовка повинна проводитися хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Переливання препаратів крові та криопреципітату
- ☐ b. Інфузійна терапія сольовими розчинами
- ☐ c. Інфузійна терапія з використанням колоїдних розчинів
- ☐ d. Гемостатична терапія під час втручання
- ☐ e. Переливання плазми після оперативного втручання


Коментар

Правильна відповідь: Переливання препаратів крові та криопреципітату

Питання 48

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 42-х років гострий лівобічний пієлонефрит ускладнився бактеріальним шоком та гострою нирковою недостатністю. Дві доби тому настала поліурична стадія. Які зміни в організмі слід попередити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіперазотемія
- ☐ b. Гіпоальбумінемія
- ☐ c. Анемія
- ☐ d. Гіпокаліємія
- ☐ e. набряковий синдром

Коментар

Правильна відповідь: Гіпокаліємія

Питання 49

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної під час стрімких пологів з'явилися почуття задухи, ціаноз, падіння артеріального тиску. Через деякий час кров, що надходила з піхви, перестала згортатися. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Бронхіальна астма
- ☐ b. Анафілактичний шок
- ☐ c. Гіпотонічна маткова кровотеча
- ☐ d. Серцева недостатність
- ☐ e. Емболія навколоплідними водами

Коментар

Правильна відповідь: Емболія навколоплідними водами

Питання 50

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 11-ти років госпіталізований до реанімаційного відділення у зв'язку з непритомністю на спортивному майданчику. В анамнезі - епізоди непритомностей, болі у грудях при фізичному навантаженні. Об'єктивно: пульс двогорбий, посилення верхівкового поштовху серця, вислуховується третій тон порушення серцевого ритму. ЕКГ: поліморфні шлуночкові екстрасистולי. ЕхоКС - асиметрична гіпертрофія міжшлуночкової перегородки. Який шок має місце у дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Септичний шок
- ☐ b. Анафілактичний шок
- ☐ c. Кардіогенний шок
- ☐ d. Гіповолемічний шок
- ☐ e. Травматичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Кардіогенний шок

Питання 51

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Через 3 дні після чисельних укусів бліх у хворого різко підвищилась температура тіла до 39°C, з'явився сильний головний біль, біль у м'язах. Об'єктивно: гіперемія обличчя, ін'єкція судин склер, тремор язика, тахікардія, зниження АТ. Мова невиразна. На другу добу в пахвовій ділянці утворився різко болючий під час пальпації бубон, шкіра над ним гаряча, напружена, незначний набряк навколишніх тканин. Яке захворювання найімовірніше?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Бубонна форма чуми
- ☐ б. Ботулізм
- ☐ в. Лімфогранулематоз
- ☐ г. Бубонна форма туляремії
- ☐ д. Гострий лімфаденіт

Коментар

Правильна відповідь: Бубонна форма чуми

Питання 52

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 24-х років захворювання почалося гостро з появи нудоти, багаторазового блювання, ознобу, болю у верхніх відділах живота. Практично одночасно з'явилися рідкі водянисті випорожнення без патологічних домішок 2 рази. Об'єктивно: стан середньої важкості, температура - 37,6°C, Ps-86/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст., шкіра бліда, тургор збережений, язик незначно обкладений білим нальотом, живіт м'який, чутливий в епігастрії. Яку терапію слід провести у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Регідрон
- ☐ б. 5% розчин глюкози
- ☐ в. Призначення сольового послаблюючого
- ☐ г. Промивання шлунка
- ☐ д. Лоперамід


Коментар

Правильна відповідь: Промивання шлунка

Питання 53

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 28-ми років екстрено доставлено до операційної з приводу профузної шлунково-кишкової кровотечі. Загальний стан тяжкий, свідомість - оглушення, АТ-80/40 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., олігурія. Вкажіть об'єм крововтрати:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. >40% дефіциту ОЦК (>2000 мл)
- ☐ b. Крововтрати немає
- ☐ c. 15% дефіциту ОЦК (750-1250 мл)
- ☐ d. 30-40% дефіциту ОЦК (>1750 мл)
- ☐ e. 20-25% дефіциту ОЦК (1250-1750 мл)


Коментар

Правильна відповідь: 30-40% дефіциту ОЦК (>1750 мл)

Питання 54

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У військовослужбовця в зоні бойових дій має місце вивих великого пальця лівої руки. До якої сортувальної категорії з її візуальним позначенням буде віднесений потерпілий?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. III (зелений колір)
- ☐ b. IV (темно-фіолетовий колір)
- ☐ c. I (червоний колір)
- ☐ d. V (синій колір)
- ☐ e. II (жовтий колір)

Коментар

Правильна відповідь: III (зелений колір)

Питання 55

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка 49-ти років скаржиться на стискаючий біль в голові, відчуття "забитого цвяха", який посилюється наприкінці робочого дня. Об'єктивно: плаксива, знервована. Шкірні покриви бліді, гіпергідроз. Є тремор пальців рук, рівномірно підвищені сухожилкові рефлекси. Ps- 84/хв., АТ- 140/80 мм рт.ст. Серце і легені в нормі. Надайте невідкладну допомогу як лікар швидкої допомоги: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Анальгін
- ☐ b. Димедрол
- ☐ с. Сибазон
- ☐ d. Настоянка валеріани
- ☐ е. Спазган

Коментар

Правильна відповідь: Сибазон

Питання 56

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При проведенні закритого масажу серця людини 76-ти років, що знаходиться у стані клінічної смерті, необхідно здійснювати компресії з частотою: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Не менше 120 на 1 хвилину
- ☐ b. Не менше 40 на 1 хвилину
- ☐ с. Не менше 80 на 1 хвилину
- ☐ d. Не менше 60 на 1 хвилину
- ☐ е. Не менше 100 на 1 хвилину

Коментар

Правильна відповідь: Не менше 100 на 1 хвилину

Питання 57

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 54-х років з міомою матки й анемією (Hb- 52 г/л, Ht- 17%) скаржиться на головний біль, слабкість, запаморочення. Лікар призначив жінці трансфузію одногрупних відмитих еритроцитів. Яка основна мета гемотрансфузії в цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Стимулювальна
- ☐ b. Поживна
- ☐ c. Замісна
- ☐ d. Гемодинамічна
- ☐ e. Детоксикаційна

Коментар

Правильна відповідь: Замісна

Питання 58

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 69-ти років скаржиться на головний біль та різке погіршення зору на ліве око. Лікарем швидкої медичної допомоги при огляді визначено: у свідомості, АТ-170/100 мм рт.ст., ЧСС- 100/хв. Менінгеальні симптоми, парези, розлади чутливості та інші чіткі неврологічні розлади відсутні.

Визначте подальшу тактику ведення хворого:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Призначення консультації невролога
- ☐ b. Госпіталізація в офтальмологічне відділення
- ☐ c. Призначення консультації психіатра
- ☐ d. Призначення консультації окуліста
- ☐ e. Госпіталізація у неврологічне відділення


Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація у неврологічне відділення

Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 15-річного хлопчика діагностовано бубонну форму чуми. Які антибактеріальні препарати слід призначити дитині?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тетрациклін або доксициклін
- ☐ b. Стрептоміцин або хлорамфенікол
- ☐ c. Пеніцилін або цефотаксим
- ☐ d. Гентаміцин або нетроміцин
- ☐ e. Бісептол або сульфален


Коментар

Правильна відповідь: Стрептоміцин або хлорамфенікол

Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пологи у 36 тижнів. Вагітність перебігала на тлі загрози переривання у 28 тижнів, гострої респіраторної вірусної інфекції у 24 тижні. Навколоплідні води світлі. Новонароджена дівчинка з масою 2400 г, довжиною 45 см. При народженні самостійне дихання відсутнє, м'язовий тонус значно знижений. Після проведення штучної вентиляції легенів за допомогою маски та мішка 100% киснем впродовж 30-ти секунд самостійне дихання не відновилося, частота серцевих скорочень складає 50/хв., зберігається акроціаноз. Яка подальша тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Непрямий масаж серця
- ☐ b. Киснева допомога вільним потоком
- ☐ c. Санація верхніх дихальних шляхів
- ☐ d. Введення адреналіну
- ☐ e. Корекція гіповолемії


Коментар

Правильна відповідь: Непрямий масаж серця

Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий 42-х років, виявлений на місці ДТП, скаржиться на біль у ділянці таза та правого стегна. Об'єктивно: загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. ЧД- 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле, у верхній його третині патологічна рухливість, крепітація кісткових уламків. Великий крововилив, набряк та біль під час пальпації в правих пахвинній, здухвинній та сідничній ділянках. Рс- 112/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст. Якому ступеню травматичного шоку відповідає стан потерпілого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. IV
- ☐ b. I
- ☐ c. III
- ☐ d. II


Коментар

Правильна відповідь: II

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 47-ми років під час трансфузії еритроцитарної маси виникли занепокоєння, задишка, біль у попереку. Об'єктивно: почервоніння обличчя, ціаноз, Рс- 112/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст., сеча червонуватого кольору. Яка найбільш імовірна причина погіршення стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостра надниркова недостатність
- ☐ b. Надмірний обсяг інфузії
- ☐ c. Гостра дихальна недостатність
- ☐ d. Переливання несумісної еритромаси
- ☐ e. Гостра серцева недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Переливання несумісної еритромаси

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 3-х років з тетрадою Фалло раптово виник напад, дитина стала неспокійною, підсилилась задишка. Об'єктивно: різкий ціаноз, ослаблений II тон над легеневою артерією, грубий систолічний шум у третьому-четвертому міжребер'ї зліва, втрачає свідомість, з'являються судоми. Який стан виник у хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Задишково-ціанотичний криз
- ☐ b. Колапс
- ☐ c. набряк легень
- ☐ d. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ e. Пневмоторакс


Коментар

Правильна відповідь: Задишково-ціанотичний криз

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчини 19-ти років після зґвалтування виникли постійна плаксивість, тривога, настрій став пригніченим, знизилася працездатність, рухи загальмовані, з'явилися думки про недоцільність життя. Визначте психопатологічний стан:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тривожна депресія
- ☐ b. Інволюційна депресія
- ☐ c. Ендогенна депресія
- ☐ d. Судинна депресія
- ☐ e. Реактивна депресія


Коментар

Правильна відповідь: Реактивна депресія

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 50-ти років поступила в клініку зі скаргами на напади сильного головного болю, запаморочення, відчуття пульсації в голові, пітливість, м'язову слабкість. Під час нападу підвищується артеріальний тиск до 280/170 мм рт.ст. Напади тривають до 30 хвилин. Останнім часом частішали. За даними УЗД - визначається об'ємне утворення правого наднирника. Який препарат найбільш показаний хворій?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Дибазол в/в
- ☐ б. Пентамін в/в
- ☐ в. Фуросемід в/в
- ☐ г. Папаверин в/в
- ☐ д. Фентоламін в/в


Коментар

Правильна відповідь: Фентоламін в/в

Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта 40-ка років, котрий впродовж 17-ти років хворіє на неспецифічний виразковий коліт, при останньому ендоскопічному дослідженні виявлено множинні запальні псевдополіпи у всіх відділах товстої кишки. Результати біопсії показали наявність в поліпах дисплазії II-III ст. Яке лікування необхідно застосувати в даного хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Хіміотерапія
- ☐ б. Трансендоскопічне видалення поліпів
- ☐ в. Рентгенотерапія
- ☐ г. Хірургічне
- ☐ д. Медикаментозне


Коментар

Правильна відповідь: Хірургічне

Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 44-х років під час роботи на городі в спекотний день відчув головний біль, запаморочення, нудоту, шум у вухах, порушився зір. Об'єктивно: шкіра обличчя гіперемована, температура - 39°C, дихання часте, Рс- 110/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Колапс
- ☐ б. Гостре респіраторне захворювання
- ☐ в. Вегетативний криз
- ☐ г. Тепловий удар середньої важкості
- ☐ д. Мігрень


Коментар

Правильна відповідь: Тепловий удар середньої важкості

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора на варикозну хворобу нижніх кінцівок впала. Виникла сильна кровотеча із варикозно розширеного вузла в середній третині лівої гомілки. Як зупинити кровотечу на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Накласти джгут на місце ушкодження
- ☐ б. Накласти стискаючу пов'язку на місце ушкодження
- ☐ в. Накласти джгут нижче місця ушкодження
- ☐ г. Накласти джгут вище місця ушкодження
- ☐ д. Накласти стискаючу пов'язку вище місця ушкодження


Коментар

Правильна відповідь: Накласти стискаючу пов'язку на місце ушкодження

Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 25-ти років скаржиться на плаксивість, різкі зміни настрою, прискорене серцебиття, що зв'язує з втомою – місяць тому народила близнюків. З ранку відчула "зупинки" серцевої діяльності. При огляді з боку внутрішніх органів патології не встановлено. АТ- 130/70 мм рт.ст., ЧСС- 115/хв., часті екстрасистоли, ЧДР- 17/хв. Щитоподібна залоза збільшена до другого ступеня, безболісна. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий вірусний тиреоїдит, гіпотиреоз
- ☐ б. Підгострий вірусний тиреоїдит, гіпертиреоз
- ☐ в. Гострий вірусний тиреоїдит, гіпертиреоз
- ☐ г. Післяпологовий тиреоїдит, гіпертиреоз
- ☐ д. Післяпологовий тиреоїдит, гіпотиреоз


Коментар

Правильна відповідь: Післяпологовий тиреоїдит, гіпертиреоз

Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У відділення реанімації бригадою швидкої допомоги доставлена дитина 3-х років у непритомному стані. Під час проведення штучного дихання та непрямого масажу серця на ЕКГ реєструється шлуночкова брадикардія 50/хв. Якому із медикаментозних заходів необхідно надати перевагу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Внутрішньовенне введення атропіну
- ☐ б. Електрична дефібриляція серця
- ☐ в. Внутрішньовенне введення адреналіну
- ☐ г. Електрична дефібриляція серця + введення адреналіну
- ☐ д. Внутрішньовенне введення гідрокарбонату натрію


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне введення атропіну

Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 64-х років знаходиться 2 доби на стаціонарному лікуванні з приводу гострого інфаркту міокарда. Впродовж останніх 8 годин з'явилась гостра затримка сечі. Із анамнезу відомо, що хворий страждає на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. Залишковий об'єм сечі в сечовому міхурі 600 мл. Спроба проведення уретрального катетера в сечовий міхур невдала. Вкажіть найбільш раціональну тактику надання допомоги хворому:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Трансуретральна резекція передміхурової залози
- ☐ б. Консервативна гормональна терапія
- ☐ в. Відкрита простатектомія
- ☐ г. Дренування сечового міхура через надлобкову норицю
- ☐ д. Консервативна протизапальна терапія


Коментар

Правильна відповідь: Дренування сечового міхура через надлобкову норицю

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчику 12 років. Знаходиться в клініці з приводу цукрового діабету в фазі декомпенсації. Отримав перед сніданком 10 ОД і перед обідом 6 ОД простого інсуліну. Через 30 хвилин після обіду хлопчик втратив свідомість, з'явились судоми. Об'єктивно: шкіра волога, бліда, тризм щелеп. Тони серця приглушені, Рс- 100/хв., слабкого наповнення, АТ- 90/50 мм рт.ст., дихання поверхневе, 28/хв. Першочергова допомога в даній ситуації включає:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Оксигенотерапія
- ☐ б. Введення інсуліну
- ☐ в. Введення мезатону
- ☐ г. Введення глюкози
- ☐ д. Введення преднізолону

Коментар

Правильна відповідь: Введення глюкози

Питання 73

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія олігоанурії. У хворого спостерігаються м'язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ (розширення інтервалів PQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці T). Які біохімічні зміни викликають ці порушення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ацидоз
- ☐ б. Гіперкаліємія
- ☐ в. Гіпокальціємія
- ☐ г. Гіперкальціємія
- ☐ д. Гіпокаліємія

Коментар

Правильна відповідь: Гіперкаліємія

Питання 74

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 27-ми років, що страждає на цукровий діабет впродовж 9-ти років, доставлена в відділення інтенсивної терапії на 24 тижні вагітності непритомною. Із рота - різкий запах ацетону, дихання шумне, шкіра суха, тонус очних яблук і м'язів знижений. Рс- 142/хв., АТ- 60/25 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гіперосмолярна кома
- ☐ б. Лактацидемічна кома
- ☐ в. Гіпоглікемічна кома
- ☐ г. Кетонемічна кома
- ☐ д. Печінкова кома

Коментар

Правильна відповідь: Кетонемічна кома

Питання 75

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Реанімаційна бригада швидкої медичної допомоги прибула на виклик до опіятного наркомана 23-х років. Об'єктивно: свідомість відсутня, ціаноз, брадикардное, брадикардия. Що терміново показано хворому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Штучна вентиляція легень
- ☐ b. Інфузійна терапія
- ☐ c. Форсований діурез
- ☐ d. Оксигенотерапія через маску
- ☐ e. Призначення налорфіну

Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 76

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 54-х років, що перебуває в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. В ході огляду діагностовано зупинку серцевої діяльності та дихання, розпочато легенево-серцеву реанімацію. На ЕКГ спостерігається асистолія. Далі необхідно:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Дефібриляція
- ☐ b. Ввести внутрішньосерцево адреналін
- ☐ c. Ввести внутрішньовенно новокаїнамід
- ☐ d. Ввести внутрішньовенно строфантин
- ☐ e. Ввести внутрішньовенно лідокаїн

Коментар

Правильна відповідь: Ввести внутрішньосерцево адреналін

Питання 77

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дворічного хлопчика сплутана свідомість, невпинне блювання кров'ю, мелена, глибоке шумне дихання, печінка +6 см з-під краю реберної дуги. З'явились судоми. Стан погіршився декілька годин тому. В анамнезі - з приводу застуди впродовж трьох днів дитина отримувала по дві таблетки ліків на день. Який лікарський засіб міг викликати такі побічні явища?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Бісептол
- ☐ b. Ампіцилін
- ☐ c. Аспірин
- ☐ d. Парацетамол
- ☐ e. Анальгін


Коментар

Правильна відповідь: Аспірин

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілого 36-ти років, що переніс закриту черепно-мозкову травму, в процесі проведення ехо-енцефалоскопії виявлено зміщення серединного еха на 5 мм. Про що це свідчить?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ехо-ЕС патології не виявила
- ☐ b. Перелом основи черепа
- ☐ c. Тріщина кісток склепіння черепа
- ☐ d. Наявність підболонкової гематоми
- ☐ e. Травматичний субарахноїдальний крововилив

Коментар

Правильна відповідь: Наявність підболонкової гематоми

Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 47 років, працює рентгенологом впродовж 22-х років скаржиться на світлобоязнь, слезотечу, зниження гостроти зору обох очей. 10 місяців тому переніс кон'юнктивіт обох очей. Гострота зору обох очей 0,7. Об'єктивно: легка світлобоязнь. Рогівка фарбується флюоресцеїном у вигляді окремих крапок. Чутливість рогівки знижена. Інші відділи ока не змінені. Який діагноз відповідає описаній клінічній картині?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Променеве ураження рогівки
- ☐ b. Інфекційний кон'юнктивіт
- ☐ c. Вікова катаракта
- ☐ d. Помутніння склистого тіла
- ☐ e. Помутніння рогівки


Коментар

Правильна відповідь: Променеве ураження рогівки

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 43-х років викликав швидку медичну допомогу. Скаржиться на різкий біль у лівій половині живота з іррадіацією в ліву ногу. В анамнезі сечокам'яна хвороба. Об'єктивно: шкіра бліда, Рс-100/хв., АТ-160/90 мм рт.ст. Симптом Пастернацького різко позитивний зліва. Почати лікування найбільш доцільно із призначення:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Морфін в/в
- ☐ b. Баралгін в/в
- ☐ c. Уролесан перорально
- ☐ d. Спазмалгон перорально
- ☐ e. Анальгін в/м


Коментар

Правильна відповідь: Баралгін в/в

Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час дорожньо-транспортної пригоди постраждала дитина віком 10 років. Через 15 хвилин лікар швидкої допомоги поставив діагноз: відкритий перелом лівої стегнової кістки в нижній третині із зміщенням, артеріо-венозна кровотеча. Травматичний шок II ступеня. Яка невідкладна первинна допомога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Знеболювання
- ☐ б. Накладання асептичної пов'язки
- ☐ в. Транспортна іммобілізація
- ☐ г. Зупинка кровотечі
- ☐ д. Новокаїнова блокада


Коментар

Правильна відповідь: Зупинка кровотечі

Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з критичним станом контролюються показники газового складу артеріальної крові. Наявні ознаки дихального ацидозу. Які показники газового складу підтверджують дихальний ацидоз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Підвищення рН і pCO_2
- ☐ б. Підвищення pCO_2
- ☐ в. Ізольоване зниження pCO_2
- ☐ г. Зниження рН і pO_2
- ☐ д. Підвищення рН і pO_2


Коментар

Правильна відповідь: Підвищення pCO_2

Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На медичному пункті полку хворий 25-ти років зі скаргами на слабкість, нудоту, запаморочення. Близько 3 годин був ядерний вибух. Шкіра бліда, волога, ЧД- 28/хв., периферичні лімфовузли не збільшені, геморагій немає, дихання везикулярне, тони приглушені; Рс- 106/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Живіт болісний по ходу тонкого кишківника. Набряків немає. Показник індивідуального дозиметра 3,9 Гр. Чим обумовлені клінічні прояви захворювання?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра променева хвороба III ступеня
- ☐ б. Гостра променева хвороба IV ступеня
- ☐ в. Гостра токсикоінфекція
- ☐ г. Гостра променева хвороба II ступеня
- ☐ д. Гостра променева хвороба I ступеня


Коментар

Правильна відповідь: Гостра променева хвороба II ступеня

Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 22-х років впродовж 2-х тижнів турбують ниючі болі в епігастральній ділянці оперізуючого характеру, нудота, за останні 2 дні - неодноразове блювання, що не приносить полегшення. Відмічає затримку газів. Об'єктивно: Рс- 92/хв., шкірні покрови ціанотичні, живіт здутий. При пальпації напруження м'язів немає. Болі локалізуються у ямці під грудьми і лівому реберно-хребтовому куті. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий холецистит
- ☐ б. Гострий апендицит
- ☐ в. Гострий панкреатит
- ☐ г. Хронічний гастрит
- ☐ д. Перфоративна виразка шлунка

Коментар

Правильна відповідь: Гострий панкреатит

Питання 85

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У постраждалого з переламом стегнової кістки на 3-ю добу після травми раптово погіршився стан: втрата свідомості, збудження, задишка, ціаноз шкіри. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гангрена кінцівки
- ☐ b. Септичний шок
- ☐ c. Гостра крововтрата
- ☐ d. Напружений пневмоторакс
- ☐ e. Жирова емболія легеневої артерії

Коментар

Правильна відповідь: Жирова емболія легеневої артерії

Питання 86

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 28-ми років звернулась в інфекційний стаціонар на 3-й день захворювання зі скаргами на підвищення температури до 39°C, болі в горлі, набряк у ділянці шиї. Об'єктивно: загальний стан середньої тяжкості. Шкірні покриви бліді, чисті. Слизова ротоглотки гіперемійована з ціанотичним відтінком. Мигдалики збільшені до II ступеня, вкриті сіруватим нальотом, який важко знімається, переходить на м'яке піднебіння, язичок. Пальпуються підщелепні лімфовузли, набряк м'яких тканин до середини шиї. Для якого захворювання характерна така клінічна картина? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ангіна Сімановського-Венсана
- ☐ b. Епідемічний паротит
- ☐ c. Інфекційний мононуклеоз
- ☐ d. Дифтерія мигдаликів, поширена, плівчаста форма
- ☐ e. Гострий лакунарний тонзиліт

Коментар

Правильна відповідь: Дифтерія мигдаликів, поширена, плівчаста форма

Питання 87

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 2-х місяців з ознаками гіпотрофії знаходилася на грудному вигодовуванні матір'ю, що страждала на полінаркоманію. Після припинення вживання опіатів терміном на 3 місяці вона знову ввела собі звичну дозу внутрішньовенно. Після годування груддю дитина стала кволою, зблідла, дихання 10-12/хв. За медичною допомогою мати не зверталась. Через 40 хвилин у дитини виникло припинення кровообігу, яке призвело до біологічної смерті. Який тип дихальної недостатності спричинив смерть немовляти?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Констриктивний
- ☐ b. Центральний
- ☐ c. Рестриктивний
- ☐ d. Нервово-м'язовий
- ☐ e. Торакоабдомінальний

Коментар

Правильна відповідь: Центральний

Питання 88

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час обстрілу в зоні бойових дій, у солдата з'явилися наступні симптоми: став тривожним, надмірно метушливим, гіперактивним, не виконував накази командира, неадекватно реагував на навколишніх. Впродовж двох годин стан покращився, симптоми стали менш вираженими, пам'ять на події, що відбувались, частково втрачена. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гостра реакція на стрес
- ☐ b. Посттравматичний стресовий розлад
- ☐ c. Контузія
- ☐ d. Розлад адаптації
- ☐ e. Гострий поліморфний психотичний розлад

Коментар

Правильна відповідь: Гостра реакція на стрес

Питання 89

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 35-ти років, з чисельними абсцедуючими фурункулами. Через 2 години після введення цефтріаксону у хворого знизився артеріальний тиск до 70/40 мм рт.ст., тахікардія до 100/хв., ЧД-22/хв. Яке ускладнення виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Респіраторний дистрес-синдром
- ☐ b. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ с. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ d. Артеріальна гіпотонія
- ☐ е. Кровотеча з сальникової сумки

Коментар

Правильна відповідь: Інфекційно-токсичний шок

Питання 90

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 45-ти років виписано із ендокринологічного відділення після перенесеної гострої надниркової недостатності. Додаткові обстеження: рівень кортизону 80 мкг у 100 мл плазми, коефіцієнт Na^+/K^+ -32. На ЕКГ - ритм синусовий, дифузне зниження трофіки міокарду. Які профілактичні засоби необхідно рекомендувати хворому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Санаторно-курортне лікування
- ☐ b. Фізіотерапевтичне лікування
- ☐ с. Хірургічне лікування
- ☐ d. Диспансерний нагляд з подальшою корекцією терапії
- ☐ е. Бальнеотерапія

Коментар

Правильна відповідь: Диспансерний нагляд з подальшою корекцією терапії

Питання 91

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На 4-ту добу після переливання несумісної по групі крові, у хворого різко зменшився діурез, розвинулася анурія, різко погіршився загальний стан, підвищився артеріальний тиск. При лабораторних дослідженнях: креатинін плазми - 680 мкмоль/л, сечовина плазми - 24 мкмоль/л. Яке захворювання і яку його стадію можна припустити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Анафілактичний шок, гостра ниркова недостатність, анурія
- ☐ б. Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія
- ☐ в. Гострий інтерстиціальний нефрит, обтураційна анурія
- ☐ г. Гемотрансфузійний шок, постренальна гостра ниркова недостатність, анурія
- ☐ д. Постгеморагічна гостра ниркова недостатність, анурія

Коментар

Правильна відповідь: Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія

Питання 92

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До реанімаційного відділення доставлена хвора 48-ми років без свідомості. Шкіра холодна, бліда, суха, акроціаноз. Щільний набряк обличчя, тіла, гомілок, температу- ра тіла - 33,0°C. Сухожильні рефлекси мляві. Рс- 50/хв., малий, ритмічний. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Дихання рідке, глибоке. У крові: гіпохромна анемія, гіперхолестеринемія, високий рівень ТТГ крові. Який препарат необхідно призначити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Мерказоліл
- ☐ б. Трийодтиронін
- ☐ в. Преднізолон
- ☐ г. Анаприлін
- ☐ д. Глюкоза

Коментар

Правильна відповідь: Трийодтиронін

Питання 93

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Бригадою ЕМД оглянуто постраждалого в результаті ДТП 40-ка років: травматичне пошкодження верхньої щелепи, пульс на сонній артерії відсутній, екскурсії грудної клітки немає. Прийнято рішення про проведення СЛР. Який спосіб ШВЛ доцільно використати в даному випадку? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. ШВЛ за Холдером-Нільсеном
- ☐ b. ШВЛ за Сільвестром
- ☐ c. ШВЛ "одночасно і до рота, і до носа"
- ☐ d. ШВЛ "рот до рота"
- ☐ e. ШВЛ "рот до носа"

Коментар

Правильна відповідь: ШВЛ "рот до носа"

Питання 94

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 37-ми років, внаслідок тяжкої черепно-мозкової травми що була одержана у 20-річному віці страждає на великі судомні напади. Дві години тому розпочалися генералізовані судомні пароксизми, протягом двох хвилин. У міжсудомний період свідомість порушена. Хвора не відповідає на запитання, реакція зіниць на світло в'яла, на больові подразники реагує слабо, виражена тахікардія. Оберіть найбільш адекватну терапію: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Серцеві глікозиди та вітамінотерапія
- ☐ b. Протисудомні та антигістамінні засоби
- ☐ c. Протисудомна терапія та призначення анальгетиків
- ☐ d. Боротьба з набряком мозку та протисудомна терапія
- ☐ e. Боротьба з набряком мозку та призначення ноотропів

Коментар

Правильна відповідь: Боротьба з набряком мозку та протисудомна терапія

Питання 95

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 57-ми років після навантаження відчув різко виражену задиху, страх смерті. Об'єктивно: дихання клокочуче на відстані, кашель з рожевою піною. Шкіра холодна, волога, акроціаноз, над легеньми дрібнопухирчасті хрипи. АТ- 100/70 мм рт.ст., Рс- 100/хв., ниткоподібний. Яке ускладнення розвинулось?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Напад бронхіальної астми
- ☐ b. Гостра ниркова недостатність
- ☐ с. набряк легень
- ☐ d. Крупозна пневмонія
- ☐ е. Інфаркт мозку

Коментар

Правильна відповідь: набряк легень

Питання 96

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На стаціонарному лікуванні перебуває вагітна жінка 33-х років. Строк вагітності 34 тижні. Впродовж останніх 2-х діб скаржиться на головний біль, запаморочення, відчуття тяжкості в ділянці потилиці, зорові розлади. Мають місце набряки. АТ- 160/120 мм рт.ст., ЧСС- 88/хв. В сечі: протягом доби зростаюча протеїнурія до 3,2 г/л. Діурез знижений. Яка найбільш імовірна патологія зумовила цю симптоматику?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Еклампсія
- ☐ b. Прееклампсія середньої тяжкості
- ☐ с. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ d. Гіпертонічний криз
- ☐ е. Тяжка прееклампсія

Коментар

Правильна відповідь: Тяжка прееклампсія

Питання 97

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років після аварії на виробництві був госпіталізований із скаргами на металевий присмак та печіння у роті, нудоту, слинотечу, багаторазове блювання, пронос з домішками слизу та крові, біль у епігастральній та поперековій ділянках. Об'єктивно: стан важкий, виразковий стоматит, гінгівіт, некроз слизової оболонки носа, набряк гортані. АТ- 150/100 мм рт.ст., Рс- 48/хв., тони серця глухі. Поліурія, гіпостенурія, альбумінурія, гематурія. Який антидот слід ввести хворому? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Хромосмон
- ☐ б. Дієтиоксим
- ☐ в. Унітіол
- ☐ г. Антарсин
- ☐ д. Атропіну сульфат

Коментар

Правильна відповідь: Унітіол

Питання 98

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнтки 31-го року на 10-ту добу після пологів раптово з'явилися різкі болі в клубовій і пахвинній областях зліва, що поширюються на ліве стегно, відчуття розпирання, тягара в лівій нижній кінцівці. Температура тіла - 39,6°C, супроводжується ознобом. Об'єктивно: ціаноз і набряк передньої черевної стінки, статевих органів і поперекової області. Які антибактеріальні препарати є препаратами вибору при лікуванні цього стану? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Амоксицилін + клавуланова кислота 1,2 г внутрішньовенно 3 рази на добу
- ☐ б. Лінкоміцин 0,6 г внутрішньом'язово 3 рази на добу
- ☐ в. Нетілміцин 5-7,5 мг/кг на добу в 1-2 внутрішньом'язових введеннях
- ☐ г. Гентаміцин 3-5 мг/кг на добу в 1-2 внутрішньом'язових введеннях
- ☐ д. Кліндаміцин 0,6 г внутрішньом'язово 3 рази на добу


Коментар

Правильна відповідь: Амоксицилін + клавуланова кислота 1,2 г внутрішньовенно 3 рази на добу

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 42-х років захворів гостро: підвищення температури тіла до 39°C, головний та м'язовий біль. На 5-й день захворювання: обличчя гіперемоване, "кролячі очі", на бічних поверхнях грудної клітки рясний поліморфний розеолезно-петехіальний висип. Тони серця глухі, Рс- 120/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. Язик сухий, обкладений білим нальотом з відбитками зубів. Гепато-спленомегалія. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Лептоспіроз
- ☐ б. Черевний тиф
- ☐ в. Висипний тиф
- ☐ г. Менінгококцемія
- ☐ д. Грип


Коментар

Правильна відповідь: Висипний тиф

Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнту 70-ти років в зв'язку з недостатнім ефектом лікування артеріальної гіпертензії інгібітором АПФ у поєднанні із діуретиком, додатково призначений фізіотенс 0,4 мг/добу. Вночі, після швидкого підведення з ліжка, відчув запаморочення, нудоту, потемніння в очах, серцебиття, похолодання і оніміння кінцівок. АТ- 80/54 мм рт.ст. На ЕКГ ритм синусовий, ЧСС- 108/хв. Після введення мезатону стан пацієнта відносно швидко нормалізувався. Як розцінити цей епізод?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра серцева недостатність
- ☐ б. Кардіогенний шок
- ☐ в. Гіповолемічний колапс
- ☐ г. Ортостатичний колапс
- ☐ д. Пароксизм суправентрикулярної тахікардії


Коментар

Правильна відповідь: Ортостатичний колапс

Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Поранений з травматичною ампутацією правої верхньої кінцівки доставлений з поля бою в мобільний госпіталь у стані шоку. АТ- 50/0 мм рт.ст. На травмованій кінцівці - турнікет. Які першочергові заходи мають бути здійснені на цьому етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Розпочати внутрішньовенну інфузію мезатону і норадреналіну
- ☐ b. Внутрішньовенно ввести 1 мл адреналіну. Повторювати кожні 5 хвилин для підтримки адекватного АТ
- ☐ c. Швидке відновлення ОЦК, адекватне знеболювання
- ☐ d. Розпочати краплинну інфузію 0,9% розчину натрію хлориду у межах подвоєної добової потреби в рідині
- ☐ e. Послабити турнікет. Якщо відновилась кровотеча, то ввести гемостатичні препарати і розпочати інфузію кристалоїдів


Коментар

Правильна відповідь: Швидке відновлення ОЦК, адекватне знеболювання

Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 56-ти років, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні з приводу хронічного бронхіту, раптово з'явився різкий біль у лівій половині грудної клітки, задишка, біль у ділянці серця, серцебиття, сухий насадний кашель. Об'єктивно: виражений акроціаноз, розширення міжреберних проміжків та різке обмеження дихальної екскурсії. Перкуторно - зліва тимпаніт. Аускультативно – різке ослаблення дихання. Яку невідкладну допомогу слід надати хворій?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Забезпечити доступ кисню
- ☐ b. Пункція плевральної порожнини

- ☐ c. Введення еуфіліну
 - ☐ d. Введення анальгетиків
 - ☐ e. Терміново транспортувати до відділення торакальної хірургії
- Коментар

Правильна відповідь: Пункція плевральної порожнини

Питання 103

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У спортсмена після підйому штанги з'явились інтенсивний біль в грудній клітці, задишка у спокої. Об'єктивно: при перкусії над лівою половиною грудної клітки - тимпаніт, голосове тремтіння відсутнє; при аускультатії - різко ослаблене дихання. Над правою половиною - дихання везикулярне. Який попередній діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Лівобічний пневмоторакс
- ☐ b. Крупозна пневмонія
- ☐ c. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ d. Інфаркт міокарда
- ☐ e. Міжреберна невралгія

Коментар

Правильна відповідь: Лівобічний пневмоторакс

Питання 104

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта з виразковою хворобою дванадцятипалої кишки в анамнезі скарги на біль, нудоту, блювання, відчуття розпирання в лівому підребер'ї. При рентгенологічному дослідженні виявлена затримка контрастної рідини у шлунку до 24 годин. Для якого ускладнення виразкової хвороби характерні дані клінічні прояви і рентгенологічна картина? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кровотеча
- ☐ b. Стеноз воротаря

- ☐ c. Перфорація виразки
- ☐ d. Малігнізація виразки
- ☐ e. Пенетрація виразки


Коментар

Правильна відповідь: Стеноз воротаря

Питання 105

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 64-х років перебуває на лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби. На момент огляду АТ- 200/110 мм рт.ст., ЧСС- 96/хв. Застосування якого препарату ПРОТИПОКАЗАНО в даній ситуації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Фуросемід
- ☐ b. Клофелін
- ☐ c. Добутамін
- ☐ d. Рибоксин
- ☐ e. Каптоприл


Коментар

Правильна відповідь: Добутамін

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіку на ліву ногу впала балка. При обстеженні виявлені набряк, гематома, деформація і патологічна рухливість в середній третині лівого стегна. Яка шина забезпечить оптимальну транспортну іммобілізацію?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Шина Еланського
- ☐ b. Шина Крамера
- ☐ c. Шина Дітерікса


- ☐ d. Шина Дельбе
- ☐ e. Шина Чижова

Коментар

Правильна відповідь: Шина Дітеріхса

Питання 107

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого на епілепсію в стаціонарі виник статус генералізованих тоніко-клонічних судом. Який з немедикаментозних заходів може бути використаний для покращення стану хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Магнітотерапія
- ☐ b. Бальнеотерапія
- ☐ c. Краніо-церебральна гіпотермія
- ☐ d. Електрофорез комірцевої зони
- ☐ e. Су-джок терапія

Коментар

Правильна відповідь: Краніо-церебральна гіпотермія

Питання 108

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 59-ти років проходить курс реабілітаційного лікування після перенесеного інфаркту міокарда. Гемодинамічні показники стабільні. Фракція викиду 50%. Які засоби профілактики раптової серцевої смерті потрібно застосувати у даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Діуретики, іАПФ, статини
- ☐ b. β -адреноблокатори, іАПФ, статини
- ☐ c. Хірургічна корекція
- ☐ d. Антагоністи кальцію, іАПФ, статини
- ☐ e. Аміодарон, α -адреноблокатори


Коментар

Правильна відповідь: β -адреноблокатори, іАПФ, статини

Питання 109

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 19-ти років в терміні 30 тижнів поскаржилася на головний біль, порушення зору, блювання з домішками крові. Стан важкий, АТ- 160/100 мм рт.ст., склери жовтушні, підшкірні крововиливи, набряки нижніх кінцівок, сеча геморагічного кольору. В крові: тромбоцитопенія. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Еклампсія
- ☐ б. Хвороба Боткіна
- ☐ в. Гепатоз вагітних
- ☐ г. HELP синдром
- ☐ д. ДВЗ-синдром


Коментар

Правильна відповідь: HELP синдром

Питання 110

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 40-ка років скаржиться на інтенсивні болі в горлі при ковтанні, виражену задишку, що посилюється у горизонтальному положенні і супроводжується нападами задухи. При непрямій ларингоскопії виявлений абсцес надгортанника. Відділи гортані, розташовані нижче, оглянути не вдається. Від трахеотомії хворий категорично відмовився. На висоті чергового нападу задухи розвинулися ціаноз, судоми та наступила зупинка дихання. Яку першочергову допомогу слід надати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Трахеотомія
- ☐ б. Штучна вентиляція легенів методом з рота в рот
- ☐ в. Ендоларингеальне розкриття абсцесу під контролем прямої ларингоскопії

- ☐ d. Конікотомія
- ☐ e. Інтубація трахеї
- Коментар

Правильна відповідь: Конікотомія

Питання 111

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пішохід 62-х років під час ожеледиці послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є локалізований біль у ділянці верхньої третини лівого передпліччя. Спостерігаються тахікардія, підвищення артеріального тиску, припухлість, деформація, синець та крепітація в ділянці верхньої третини лівого передпліччя, рухи кінцівки неможливі. Можна припустити пошкодження верхньої третини лівого передпліччя. Як слід транспортувати хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Наклавши пов'язку Дезо з валиком в пахвовій ділянці
- ☐ b. В напівсидячому положенні з палкою в ліктьових згинах
- ☐ c. Прибинтувавши праву верхню кінцівку до грудної клітки та здорової кінцівки
- ☐ d. Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п'ястно-фалангових суглобів
- ☐ e. Наклавши шину Крамера з фіксацією плечового, ліктьового, променево-зап'ясткового суглобів

Коментар

Правильна відповідь: Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п'ястно-фалангових суглобів

Питання 112

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 53-х років скаржаться на біль у ділянці прямої кишки при дефекації, яскраво-червону кров на калових масах, яка з'являється на початку акту дефекації, закрепи. Загальний стан задовільний. Тони серця ритмічні, ЧСС- 74/хв. Живіт м'який, не болючий. Яке інструментальне дослідження найбільш інформативне для встановлення остаточного діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Копрограма

- ☐ b. Пальцеве дослідження прямої кишки
- ☐ c. Іригоскопія
- ☐ d. Фіброколоноскопія
- ☐ e. Ректоскопія


Коментар

Правильна відповідь: Ректоскопія

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Солдат доставлений у непритомному стані до медичної роти з казарми. Зі слів товаришів по службі, приблизно за 6 годин до цього він прав обмундирування в закритому приміщенні в розчині технічної рідини. Об'єктивно: непритомний, однак реакція на больові подразники збережена. Шкіра і видимі слизові оболонки бліді, у повітрі, що видихається, солодкий запах. Рс- 80/хв., ритмічний, тони серця звучні, АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧД- 18/хв., дихання везикулярне, живіт м'який, неболючий. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пероральне отруєння хлорованими вуглеводнями важкого ступеня
- ☐ b. Інгаляційне отруєнням хлорованими вуглеводнями
- ☐ c. Отруєння етиленгліколем важкого ступеня
- ☐ d. Отруєння ароматичними вуглеводнями середнього ступеня
- ☐ e. Інгаляційне отруєння тетраетилсвинцем важкого ступеня


Коментар

Правильна відповідь: Інгаляційне отруєнням хлорованими вуглеводнями

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 6-ти років, оперованій з приводу розлитого перитоніту, в процесі забезпечення анестезіологічного засобу, проводиться штучна вентиляція легень у режимі помірної гіпервентиляції. На яких цифрах необхідно підтримувати рівень рСО₂ у КЛС-грамі? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 50-55 мм рт.ст.
- ☐ b. 35-40 мм рт.ст.
- ☐ c. 40-45 мм рт.ст.
- ☐ d. 30-35 мм рт.ст.
- ☐ e. 20-25 мм рт.ст.


Коментар

Правильна відповідь: 30-35 мм рт.ст.

Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час проведення бойових дій містечко Н. піддалося масивному обстрілу установками "Град". При масовому поступленні з території обстрілу поранених і хворих до медичної роти бригади, у сортувально-евакуаційному відділенні було проведено евакуаційно-транспортне медичне сортування. Які ще види медичного сортування повинні бути проведені в медичній роті бригади? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вибіркове
- ☐ b. Спеціалізоване
- ☐ c. Внутрішньопунктове
- ☐ d. Кваліфіковане
- ☐ e. Діагностичне, прогностичне


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньопунктове

Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 20-ти років захворіла гостро, підвищилась температура до 39,5оС, сильний головний біль, спостерігалось кілька разів блювання. Об'єктивно: на шкірі геморагічний висип, ригідність потиличних м'язів, симптоми Керніга та Брудзинського позитивні. Якою повинна бути тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Зробити загальний аналіз крові
- ☐ b. Негайна госпіталізація в інфекційний стаціонар
- ☐ c. Призначити антибактеріальну терапію
- ☐ d. Залишити для спостереження вдома
- ☐ e. Викликати на консультацію невропатолога


Коментар

Правильна відповідь: Негайна госпіталізація в інфекційний стаціонар

Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого похилого віку діагностовано клінічну смерть. Почато реанімаційні заходи. Під час виконання непрямого масажу серця лікар відчув характерних хруст, резистентність грудної клітки істотно зменшилась. Яка подальша тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Перекладання хворого на м'яку поверхню
- ☐ b. Припинення реанімаційних заходів
- ☐ c. Поворот хворого на бік
- ☐ d. Продовження реанімації, непрямого масажу серця
- ☐ e. Продовження тільки штучного дихання


Коментар

Правильна відповідь: Продовження реанімації, непрямого масажу серця

Питання 118

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 37-ми років, що вживав напередодні копчену рибу власного виробництва, поступово розвинулись м'язова слабкість, неможливість читати газетний текст, на другий день - порушення ковтання. Об'єктивно: стан тяжкий, ціаноз шкіри, страбізм, ЧД- 50/хв., Рс- 120/хв. Голос гугнявий, парез зіниць, метеоризм 2 ступеня. Випорожнення відсутні 2 доби. Який лікувальний захід показаний у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Штучна вентиляція легень
- ☐ b. Призначення прозерину
- ☐ c. Штучне дихання "рот у рот"
- ☐ d. Трахеостомія
- ☐ e. Введення діуретиків


Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Громадянин іноземної держави доставлений в приймальне відділення інфекційної лікарні у вкрай важкому стані. Епідеміологічний анамнез: працює в вірусологічній лабораторії. Об'єктивно: температура тіла - 40,5°C. Свідомість спутана. АТ- 100/60 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв. На шкірі обличчя, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок множинні багатокamerні пустули з пупковидним вдавленням по центру пухирця. Шкіра обличчя та кінцівок різко набрякла. Гнійний кон'юнктивіт. При аускультції: в легенях жорстке дихання. Тони серця приглушені. Живіт м'який, болісний під час пальпації в нижніх відділах. Печінка +3 см. Пальпується край селезінки. Випорожнення 2 рази на добу з домішками крові. Сеча мутна, з червонуватим відтінком. На який термін встановлюється обов'язкове медичне спостереження за контактними особами?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. На 5 днів
- ☐ b. На 21 день
- ☐ c. На 10 днів
- ☐ d. Медичне спостереження не встановлюється
- ☐ e. На 14 днів


Коментар

Правильна відповідь: На 21 день

Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий у важкому стані. У хворого розвинувся пронос (рідкі випорожнення до 20 разів на добу кількістю 5-6 літрів), загальна слабкість, запаморочення. Останню добу приєдналось блювання "фонтаном", сечовипускання припинилось. Об'єктивно: пацієнт загальмований, на питання відповідає мляво. Риси обличчя загострені. Шкіра бліда, має мармуровий малюнок, тургор знижений. Язик сухий. Температура тіла - 35,9оС, АТ- 80/40 мм рт.ст. Серцеві тони ритмічні, приглушені, ЧСС- 110/хв., судоми м'язів кінцівок. Живіт м'який. Важкий стан пацієнта обумовлює: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоз мезентеріальних судин
- ☐ b. Гіповолемічний шок
- ☐ c. Гостра затримка сечі
- ☐ d. Гостре запалення очеревини
- ☐ e. Кардіогенний шок


Коментар

Правильна відповідь: Гіповолемічний шок

Питання 121

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Роділля у першому періоді своєчасних пологів під час проведення внутрішнього акушерського дослідження покаржилася на слабкість, шум в вухах, запаморочення, і раптово втратила свідомість. В першу чергу потрібно:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Підняти нижні кінцівки
- ☐ b. Посадити
- ☐ c. Піднести розчин аміаку на ватному тампоні
- ☐ d. Забезпечити доступ свіжого повітря
- ☐ e. Повернути жінку на лівий бік


Коментар

Правильна відповідь: Повернути жінку на лівий бік

Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 40-ка років в терміні 37 тижнів скаржиться на різкий головний біль, зниження зору, біль в епігастрії, нудоту. АТ на обох руках 190/120 мм рт.ст. В сечі білок 5 г/л. Раптово у вагітної з'явився акроціаноз, розлад дихання. Які реанімаційні заходи необхідно провести вагітній негайно? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Штучна вентиляція легень
- ☐ б. Призначити протисудомні препарати
- ☐ в. Седативна терапія
- ☐ г. Призначити сечогінні препарати
- ☐ д. Гіпотензивна терапія


Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У літньої людини 72-х років під час коронарографії та стентування вінцевих артерій з приводу ішемічної хвороби серця на кардіомоніторі відмічена фібриляція шлуночків. Що первинно необхідно провести хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Зондування шлунка
- ☐ б. Інтубація трахеї
- ☐ в. Катетеризація сечового міхура
- ☐ г. Дефібриляція
- ☐ д. Кава-катетеризація


Коментар

Правильна відповідь: Дефібриляція

Питання 124

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після опромінення до госпіталю доставлений молодий чоловік 26-ти років. Показник індивідуального дозиметра 5 Гр. Скарги на різку загальну слабкість, біль голови, нудоту, повторне

блювання. Об'єктивно: на шкірі обличчя еритема, Ps-100/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст., блювання продовжується. В якому клінічному періоді гострої променевої хвороби знаходиться хворий? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Період вторинної реакції
- ☐ b. Період запалення
- ☐ c. Період розпалу
- ☐ d. Період виражених клінічних проявів
- ☐ e. Період первинної реакції


Коментар

Правильна відповідь: Період первинної реакції

Питання 125

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 26-ти років після ДТП виявлено відкриті переломи обох гомілок в середній третині та закриту травму грудної клітки з пошкодженням легені й напруженим пневмотораксом. Яка першочергова тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Екстрена торакотомія
- ☐ b. Проведення штучної вентиляції легень
- ☐ c. Дренування плевральної порожнини
- ☐ d. Консервативне лікування, спостереження
- ☐ e. Інтубація трахеї


Коментар

Правильна відповідь: Екстрена торакотомія

Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До хірургічного відділення поступив потерпілий 37-ми років з великою розчавленою раною лівого стегна, через 4 години після травми. Що є першочерговою умовою успішної профілактики газової гангрен у потерпілого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Промивання рани розчином перекису водню 6%
- ☐ b. Інфільтрація м'яких тканин довкола рани розчином антибіотиків
- ☐ c. Введення специфічної сироватки 30 000 ОД
- ☐ d. Введення специфічної сироватки 3 000 ОД
- ☐ e. Видалення нежиттєздатних тканин та своєчасна хірургічна обробка рани


Коментар

Правильна відповідь: Видалення нежиттєздатних тканин та своєчасна хірургічна обробка рани

Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 28-ми років субфебрильна температура, біль у животі, рідкі випорожнення з домішками слизу до 3-4 разів на добу. Хворіє протягом 3-х діб. Язик вологий, обкладений білим нальотом. Живіт м'який, болючий в лівій здухвинній ділянці, сигмоподібна кишка спазмована, болюча. Який метод дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу?
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. РНГА
- ☐ b. Копрокультура
- ☐ c. Загальний аналіз крові
- ☐ d. Копроцитограма
- ☐ e. Загальний аналіз сечі


Коментар

Правильна відповідь: Копрокультура

Питання 128

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 34 тижні вагітності в жінки з хронічною артеріальною гіпертензією середнього ступеня тяжкості, плацентарною недостатністю, затримкою розвитку плоду III ступеня, з'явився раптовий біль у матці. Об'єктивно: Ps- 120/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. Матка в гіпертонусі. Серцебиття плоду - відсутнє. Із піхви помірні кров'янисті виділення. Яка причина антенатальної загибелі плоду?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Затримка внутрішньоутробного розвитку
- ☐ b. Гіпертонічна хвороба
- ☐ c. Передчасне відшарування плаценти, тяжка форма
- ☐ d. Передчасне відшарування плаценти, легка форма
- ☐ e. Плацентарна недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Передчасне відшарування плаценти, тяжка форма

Питання 129

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час робочої зміни на молочно-консервному комбінаті виникла аварія холодильної установки з потраплянням в атмосферу приміщення парів аміаку. 16 робітників скаржаться на захриплість голосу, за грудинний біль, кашель з кров'янистим харкотинням. Об'єктивно: ціаноз, субіктичність склер. У крові: метгемоглобінемія. Які правильні дії при наданні допомоги постраждалим на різних етапах?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Виведення постраждалих із зони ураження. Оксигенотерапія. Метиленовий синій в/в
- ☐ b. ШВЛ. Дипіроксим в/м
- ☐ c. Виведення постраждалих із зони ураження. Гаряче питво. Гіпербарична оксигенація
- ☐ d. Виведення постраждалих із зони ураження. Атропін п/ш. Промивання шлунка з активованим вугіллям
- ☐ e. Виведення постраждалих із зони ураження. Діцинон в/м


Коментар

Правильна відповідь: Виведення постраждалих із зони ураження. Оксигенотерапія. Метиленовий синій в/в

Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 46-ти років скаржиться на появу протягом двох тижнів випорожнень кров'ю більш за 12 разів на добу, болю в животі, суглобах; болючі висипки у порожнині рота та нижніх кінцівках, набряк колінних та гомілковостопних суглобів, слабкість, підвищення температури тіла понад 39°C, втрату ваги тіла. Який метод обстеження є найбільш інформативним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Біопсія кишечника та шкіри
- ☐ b. Ендоскопічне дослідження
- ☐ c. Рентгенологічне дослідження кишечника
- ☐ d. Загальний аналіз крові
- ☐ e. Рентгенографія суглобів


Коментар

Правильна відповідь: Ендоскопічне дослідження

Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Першовагітна 25-ти років з терміном гестації 26 тижнів звернулася до лікаря жіночої консультації зі скаргами на погіршення загального стану, спрагу, слабкість, блювання, сонливість, болі по всьому животу впродовж останніх 8-ми діб. Хворіє на цукровий діабет. Запах ацетону з рота. Р_с-100/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Рівень цукру в крові - 19,4 ммоль/л. Набряки ніжних кінцівок. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпоглікемічна кома
- ☐ b. Гіперосмолярна кома
- ☐ c. Кетонемічна кома
- ☐ d. Гіперлактацидемічна кома
- ☐ e. Прееклампсія, тяжка форма


Коментар

Правильна відповідь: Кетонемічна кома

Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікар викликаний додому до жінки 28-ми років. Вагітності не запобігає. В анамнезі: 2 самовільні викидня у малому терміні, пологів не було. Висловлює скарги на затримку місячних 12 днів і появу кров'янистих виділень із статевих шляхів, тягнучі болі внизу живота і попереку. Яка тактика ведення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Призначення гемостатичної і спазмолітичної терапії, контроль підкладної
- ☐ b. Проведення експрес-тесту для підтвердження вагітності
- ☐ c. Екстрена госпіталізація у гінекологічне відділення
- ☐ d. Направлення у жіночу консультацію
- ☐ e. Направлення на планову госпіталізацію


Коментар

Правильна відповідь: Екстрена госпіталізація у гінекологічне відділення

Питання 133

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 8-ми місяців раптово виникла обструкція верхніх дихальних шляхів, що спричинена стороннім тілом. Візуально стороннє тіло не видно. Назвіть порядок надання невідкладної допомоги в цьому випадку:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Натискання на живіт
- ☐ b. Очистка верхніх дихальних шляхів за допомогою зажима Келлі
- ☐ c. В позиції "вершника" з головою, що опущена нище тулуба, по спині між лопатками виконати 4 удари проксимальною частиною долоні
- ☐ d. Очистка пальцем верхніх дихальних шляхів
- ☐ e. Очистка верхніх дихальних шляхів за допомогою пінцета Меджилла


Коментар

Правильна відповідь: В позиції "вершника" з головою, що опущена нище тулуба, по спині між лопатками виконати 4 удари проксимальною частиною долоні

Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінку 77-ми років доставлено до лікарні непритомною. Неврологічний статус: лівобічна параплегія. Протромбін за Квіком становить 108%. На КТ-сканах відзначається: у правій півкулі головного мозку ділянка з нерівномірним зниженням оптичної щільності. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Геморагічний інсульт
- ☐ b. Ішемічний інсульт
- ☐ c. Метастази у головний мозок
- ☐ d. Менінгоенцефаліт
- ☐ e. Субарахноїдальний крововилив


Коментар

Правильна відповідь: Ішемічний інсульт

Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В медичну роту механізованої бригади поступили з поля бою 10 легкопоранених, 15 поранених середньої важкості і 20 тяжкопоранених. Якими принципами та вимогами керується медичний персонал, який виконує сортування поранених в приймально-сортувальному відділенні медичної роти?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. За потребою місця надання медичної допомоги пораненим
- ☐ b. За потребою якнайшвидшої евакуації поранених до наступного етапу медичної евакуації
- ☐ c. Сортування поранених за принципом "Пироговських рядів"
- ☐ d. За потребою розподілу та по важкості стану поранених
- ☐ e. Єдина класифікація хвороб і травм та єдині вимоги до методики сортування


Коментар

Правильна відповідь: Єдина класифікація хвороб і травм та єдині вимоги до методики сортування

Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 15-ти років доставлена непритомною до приймального відділення бригадою швидкої допомоги у супроводі батьків. Хворий потребує негайної допомоги і госпіталізації у ВРІТ. Чи потрібно лікарю отримати згоду на медичне втручання?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Батьки можуть відмовитись від надання допомоги
- ☐ b. Лікар зобов'язаний пояснити пацієнтові в доступній формі методи і об'єм медичного втручання
- ☐ c. Медичне втручання особам від 15 до 18 років проводиться за їх згодою
- ☐ d. Батьки мають право вибору методів медичного втручання
- ☐ e. В даному випадку згода не потрібна

Коментар

Правильна відповідь: В даному випадку згода не потрібна

Питання 137

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 8-ми років підвищення температури до 39оС, нежить зі значними гнійними виділеннями, вологий кашель, кон'юнктивіт з гнійними виділеннями, світлобоязнь. На слизовій оболонці щік білуваті ділянки висівкоподібно злушеного епітелію. Який найбільш імовірний діагноз?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Кір
- ☐ b. Корова краснуха
- ☐ c. Грип
- ☐ d. Висипний тиф
- ☐ e. Скарлатина

Коментар

Правильна відповідь: Кір

Питання 138

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого, який перебуває в гіперглікемічній комі, через 4 години після початку інсулінотерапії раптово розвинулися тахікардія, м'язова гіпотонія; АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: подовження інтервалу QT, зниження S – T, розширення і сплюснення Т. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіперкаліємія
- ☐ b. Гіперглікемія
- ☐ c. Гіповолемія
- ☐ d. Гіпокаліємія
- ☐ e. Гіпоглікемія

Коментар

Правильна відповідь: Гіпокаліємія

Питання 139

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В ході бойових дій боєць отримав вогнепальне поранення черевної стінки. На полі бою була надана домедична допомога. При надходженні пораненого до мобільного госпіталю виявлені ознаки внутрішньочеревної кровотечі. До якої сортувально-евакуаційної групи необхідно віднести цього постраждалого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Третьої
- ☐ b. Четвертої
- ☐ c. Першої
- ☐ d. Другої
- ☐ e. П'ятої

Коментар

Правильна відповідь: Першої

Питання 140

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років поступив у відділення зі скаргами на пекучий біль, сильне розпирання тканин пальців обох стоп. Об'єктивно: пухирі, наповнені геморагічною рідиною; після зняття пухирів видно некротизовану шкіру, котра нечутлива і неbolюча. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Термічний опік II ступеня
- ☐ b. Термічний опік III A ступеня
- ☐ c. Відмороження III ступеня
- ☐ d. Відмороження II ступеня
- ☐ e. Відмороження I ступеня


Коментар

Правильна відповідь: Відмороження III ступеня

Питання 141

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 65-ти років скаржиться на зміну кольору сечі. Сеча червона, з домішками кров'яних згустків, що нагадують "черв'яків", болю немає, непокоїть слабкість. У сечі: гематурія. У крові: Hb- 84 г/л, ШОЕ- 31 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий гломерулонефрит
- ☐ b. Гострий пієлонефрит
- ☐ c. Пухлина нирки
- ☐ d. Гострий цистит
- ☐ e. Сечокам'яна хвороба


Коментар

Правильна відповідь: Пухлина нирки

Питання 142

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час оборонного бою в медичну частину полку стали евакуювати поранених різних форм важкості та характеру уражень. Чим повинні користуватись медичні працівники для позначення характеру ізоляції, місця надання допомоги, етапності та черги евакуації потерпілих? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Усна домовленість
- ☐ b. Сортувальні марки
- ☐ c. Постраждалим надається повна допомога в порядку їх надходження
- ☐ d. Розміщення постраждалих біля місць надання допомоги
- ☐ e. Сорткування не проводиться

Коментар

Правильна відповідь: Сортувальні марки

Питання 143

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 62-х років раптово неспритомнів. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, дихання відсутнє, пульс та артеріальний тиск не визначаються. На ЕКГ – фібриляція шлуночків. Тричі була проведена дефібриляція, ефекту немає. Введення якого препарату необхідно розпочати для підвищення ефекту дефібриляції?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Урапідил
- ☐ b. Аміодарон
- ☐ c. Добутамін
- ☐ d. Атропін
- ☐ e. Дофамін

Коментар

Правильна відповідь: Аміодарон

Питання 144

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 5-ти років скаржиться на лихоманку, пронос, блювання та запаморочення. У крові: Ht- 0,55, Na+- 118 ммоль/л, +- 5,9 ммоль/л. Які розлади водно-електролітного балансу спостерігаються? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіперкаліємія
- ☐ b. Розладів водно-електролітного балансу немає
- ☐ c. Гіпотонічна дегідратація, гіпокаліємія
- ☐ d. Ізотонічна дегідратація, гіперкаліємія
- ☐ e. Гіпотонічна дегідратація, гіперкаліємія


Коментар

Правильна відповідь: Гіпотонічна дегідратація, гіперкаліємія

Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 54-х років, хворий на ХІХС, був на стаціонарному лікуванні. Раптово знепритомнів, пульсація магістральних артеріальних судин не визначається, дихання відсутнє, мідріаз. Лікар почав закритий масаж серця та ШВЛ. На електрокардіограмі ізолінія. Який варіант зупинки кровообігу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Фібриляція шлуночків
- ☐ b. Тріпотіння передсердь
- ☐ c. Електро механічна дисоціація
- ☐ d. Асистоія
- ☐ e. Пароксизмальна тахікардія


Коментар

Правильна відповідь: Асистоія

Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Ураженого госпіталізовано до мобільного госпіталю із радіаційно зараженої зони в тяжкому стані зі скаргами на безперервне блювання, пронос, болі в животі. Об'єктивно: гіперемія шкіри обличчя,

температура тіла - 38,7оС. ЧСС- 105/хв., АТ-90/65 мм рт.ст. Діагностовано гостру променеву хворобу. Яка форма гострої променевої хвороби найбільш імовірна?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Судинно-токсемічна
- ☐ b. Кістково-мозкова
- ☐ c. Кишкова
- ☐ d. Перехідна форма
- ☐ e. Церебральна


Коментар

Правильна відповідь: Кишкова

Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пологи п'яті. Пологова діяльність - перейми по 35-40 сек., через 3-4 хвилини. Положення плоду поздовжнє, передлежить голівка малим сегментом у вході в малий таз. Серцебиття плоду ясне, ритмічне, 132-140/хв. Вагінально: шийка матки згладжена, розкриття 8 см. Плідний міхур відсутній. Передлежить голівка на II площині малого тазу, справа допереду визначається перенісся і надбрівні дуги. Який імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Перший період пологів, лобне передлежання
- ☐ b. Другий період пологів, лобне передлежання
- ☐ c. Перший період пологів, лицеве передлежання
- ☐ d. Перший період пологів, передньоголовне передлежання
- ☐ e. Перший період пологів, сідничне передлежання


Коментар

Правильна відповідь: Перший період пологів, лобне передлежання

Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 38-ми років протягом тривалого часу відчував зубний біль. Згодом з'явилися біль голови і ока, загальна слабкість, підвищилася температура тіла. Об'єктивно: хемоз кон'юнктиви, застійна ін'єкція очного яблука, екзофтальм, обмеження рухів очного яблука. В крові: лейкоцитоз, ШОЕ-24 мм/год. На рентгенограмі орбіт патології не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Запальний псевдотумор орбіти
- ☐ b. Целюліт орбіти
- ☐ c. Теноніт
- ☐ d. Флегмона орбіти
- ☐ e. Ретробульбарний крововилив


Коментар

Правильна відповідь: Флегмона орбіти

Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 27-ми років впродовж року відмічаються постійні міоклонічні гіперкінези правої кінцівки, гіпертонус та гіпотрофічні порушення м'язів правої руки та шиї, періодичні загальні генералізовані судомні напади та фокальні сенсомоторні, тахікардія, пітливість, загальна слабкість, підвищена сонливість, коливання тиску. В анамнезі - зловживання алкоголем, часті легкі ЧМТ, робота в будівельному загоні у Сибіру минулим літом. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Епілептична хвороба
- ☐ b. Алкогольна епілепсія
- ☐ c. Кліщовий енцефаліт із проявами кожевніковської епілепсії
- ☐ d. Післятравматична епілепсія
- ☐ e. Судомний синдром при пухлині мозку


Коментар

Правильна відповідь: Кліщовий енцефаліт із проявами кожевніковської епілепсії

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В консультацію звернулась жінка зі скаргами на біль у нижній частині живота, який виник раптово на 17-й день менструального циклу. Біль супроводжувався відчуттям тиску на пряму кишку. Об'єктивно: температура тіла - 36, 9оС, Рs- 89/хв., АТ- 110/65 мм рт.ст. Вагінально: матка щільна, безболісна, рухома, нормальних розмірів. Додатки з лівої сторони помірно збільшені, болісні. При пункції черевної порожнини через заднє склепіння отримано 15 мл серозно-геморагічної рідини. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Позаматкова вагітність
- ☐ b. Апоплексія яєчника
- ☐ c. Розрив кісти яєчника
- ☐ d. Перекрут ніжки кісти яєчника
- ☐ e. Гострий апендицит


Коментар

Правильна відповідь: Апоплексія яєчника

Питання 151

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В медичну роту бригади надійшов поранений в тяжкому стані. Скарги на болі у животі, нудоту, сухість в роті. Об'єктивно: Рs- 130/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст., SaO2 -92%. Язик сухий, обкладений білим нальотом, живіт не бере участі у акті дихання, при пальпації напружений, болісний у всіх відділах, перистальтика поодинокими хвилями. Притуплення у пологих місцях черевної порожнини. Попередній діагноз: внутрішньочеревна кровотеча. В який підрозділ госпіталізувати постраждалого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. ВРІТ
- ☐ b. Госпітальне відділення
- ☐ c. Ізолятор
- ☐ d. Відділення спецобробки
- ☐ e. Операційна


Коментар

Правильна відповідь: Операційна

Питання 152

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 74-х років лікувався в хірургічному стаціонарі з приводу тромбофлебіту судин нижніх кінцівок. Одержував антикоагулянтну терапію. Одразу після лікування потрапив в ДТП. У хворого виникла масивна артеріальна кровотеча в ділянці правого стегна. Бригада швидкої медичної допомоги, яка прибула на місце події, діагностувала геморагічний шок. Раптово хворий втратив свідомість. На кардіомоніторі - асистолія. Які особливості проведення реанімаційних заходів в даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Розпочати комплекс серцево-легеневої реанімації
- ☐ б. Нанести прекардіальний удар
- ☐ в. Накласти асептичну пов'язку та розпочати комплекс серцево-легеневої реанімації
- ☐ г. Виконати електричну дефібриляцію
- ☐ д. Накласти джгут вище ділянки кровотечі та розпочати комплекс серцево-легеневої реанімації


Коментар

Правильна відповідь: Накласти джгут вище ділянки кровотечі та розпочати комплекс серцево-легеневої реанімації

Питання 153

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 6-ти років госпіталізована до дитячого відділення з бронхопневмонією. Страждає на atopічний дерматит. Після внутрішньом'язового введення ампіциліну з'явилися відчуття стиснення у грудях, запаморочення, різка блідість, ціаноз, холодний піт, прискорене шумне дихання. Який з перерахованих препаратів слід ввести в маніпуляційній негайно?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Розчин строфантину внутрішньовенно
- ☐ б. Розчин тавегілу внутрішньовенно
- ☐ в. Розчин адреналіну підшкірно
- ☐ г. Розчин преднізолону внутрішньовенно
- ☐ д. Розчин еуфіліну внутрішньовенно

Коментар

Правильна відповідь: Розчин адреналіну підшкірно

Питання 154

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У військовослужбовця кульове поранення середньої третини правого стегна з гнійно-септичними ускладненнями. При посіві крові виявлено золотистий стафілокок. Додались скарги на болі у серці, задиху, перебої у роботі серця. Стан важкий, шкіра бліда, акроціаноз, температура - 37,8°C, Ps-106/хв., АТ- 90/70 мм рт.ст. Тони серця ослаблені, екстрасистоли, систолічний шум на верхівці. Набряки нижніх кінцівок. Дихання везикулярне. З чим пов'язано погіршення стану?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Хронічна хвороба нирок
- ☐ b. Стафілококовий міокардит
- ☐ с. Набряк легень
- ☐ d. Ревматизм
- ☐ е. Перикардит

Коментар

Правильна відповідь: Стафілококовий міокардит

Питання 155

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 56-ти років при падінні у відкритий каналізаційний люк дістав закритий вивих правого плеча. Який вид транспортної іммобілізації слід використати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Фіксація верхньої кінцівки до тулуба
- ☐ b. Іммобілізація підручними засобами
- ☐ с. Косинкова іммобілізація
- ☐ d. Драбинчата шина від променевоzap'ясткового суглоба до кута здорової лопатки
- ☐ е. М'яка пов'язка Дезо і Вельпо

Коментар

Правильна відповідь: Драбинчата шина від променевоzap'ясткового суглоба до кута здорової лопатки

Питання 156

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 69-ти років раптово втратила свідомість, родичі хворої викликали швидку допомогу, яка прибула через 35 хвилин. При огляді: пульс відсутній на сонних артеріях, дихання відсутнє, зіниці розширені, на ЕКГ - асистолія. Які дії бригади?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Серцево-легенева реанімація не показана
- ☐ б. Проведення дефібриляції
- ☐ в. негайне проведення серцево-легеневої реанімації
- ☐ г. Внутрішньовенне введення лідокаїну
- ☐ д. Нанесення прекардіального удару

Коментар

Правильна відповідь: Серцево-легенева реанімація не показана

Питання 157

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 6-ти років скаржиться на загальну слабкість, генералізоване свербіння та почервоніння шкіри, гостре підвищення температури тіла до 38°C. З анамнезу: перший день хвороби. Протягом кількох годин після обробки невеликого садна іхтіоловою маззю з'явилися поширені гіперемовані папульозно-уртикарні висипання, що виступають над поверхнею шкіри в ділянці передпліччя, живота, стегон, гомілок. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Токсикодермія
- ☐ б. набряк Квінке
- ☐ в. Генералізована кропивниця
- ☐ г. Алергічний контактний дерматит
- ☐ д. Атопічний дерматит - нейродерміт, період загострення

Коментар

Правильна відповідь: Генералізована кропивниця

Питання 158

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 28-ми років, вагітність 30 тижнів, знаходилася вдома. Мала набряки гомілок 1 ступеня. Раптово поскаржилася на головний біль та втратила свідомість. На момент огляду констатовано опістотонус, голова закинута, зіниці розширені, дихання відсутнє, язика прикушено, пульс визначити важко. Яка стадія еклампсії у хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Позасудомний період
- ☐ b. Період розрешення нападу
- ☐ c. Прееклампсія
- ☐ d. Період тонічних судом
- ☐ e. Предсудомний період

Коментар

Правильна відповідь: Період тонічних судом

Питання 159

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні бригадою ШМД доставлено жінку 32-х років. З анамнезу: протягом останніх 2-х років перебувала на диспансерному обліку з приводу аутоімунної гемолітичної анемії. Об'єктивно: стан середньої важкості, температура - 37,3оС, шкіра лимонно-жовтого кольору, Рс- 98/хв., АТ-80/55 мм рт.ст., збільшена селезінка. У крові: ер.- 2, 6•10¹²/л, Нb- 70 г/л, КР- 0,94, лейкоц.- 6,1 • 10⁹/л, ШОЕ- 19 мм/год, непрямий білірубін - 58 мкмоль/л. Що необхідно призначити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Преднізолон
- ☐ b. Еритроцитарна маса
- ☐ c. Ферум-лек
- ☐ d. Інтерферон
- ☐ e. Трансфузія консервованої крові

Коментар

Правильна відповідь: Преднізолон

Питання 160

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 11-ти років грала у футбол та під час падіння отримала травму. Встановлено попередній діагноз: закритий вивих правого передпліччя. Який обсяг допомоги повинен надати лікар на місці пригоди?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною
- ☐ б. Знеболювання, спроба вправлення вивиху
- ☐ в. Косинкова пов'язка на праву верхню кінцівку
- ☐ г. Знеболювання, транспортна іммобілізація косинкою
- ☐ д. Восьмиподібна пов'язка на правий ліктьовий суглоб

Коментар

Правильна відповідь: Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною

Питання 161

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Загальний стан доношеної новонародженої дитини середньої тяжкості, що зумовлено асфіксією середнього ступеня важкості. Маса при народженні 3500 г, довжина 54 см. Оцінка за шкалою Апгар на 1 хвилині 4 бали. Після проведення первинної реанімаційної допомоги з'явилося самостійне дихання, ЧСС- 110/хв., акроціаноз. Яка подальша дія лікаря у даній ситуації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Допоміжна вентиляція легенів
- ☐ б. Інтубація трахеї
- ☐ в. Штучний масаж серця
- ☐ г. Відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів
- ☐ д. Додаткова оксигенація


Коментар

Правильна відповідь: Додаткова оксигенація

Питання 162

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий лікувався в гастроентерологічному відділенні з діагнозом: алкогольний цироз печінки. В останню добу став загальмованим, на запитання не відповідає. Об'єктивно: "печінковий запах" із рота, посилення жовтушності шкіри та склер. Відзначається зростання рівня трансаміназ, тимолової проби. Які заходи необхідно провести першочергово?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Призначення жовчогінних засобів
- ☐ б. Призначення інсуліну
- ☐ в. Призначення ферментних препаратів
- ☐ г. Проведення дезінтоксикаційної терапії
- ☐ д. Призначення антибіотиків


Коментар

Правильна відповідь: Проведення дезінтоксикаційної терапії

Питання 163

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лейтенант під час приземлення з парашутом відчув гострий біль в правому гомілково-ступневому суглобі. Через 2 години дійшов до медичного пункту батальйону. Об'єктивно: виражений набряк тканин правого гомілково-ступневого суглоба, особливо в ділянці зовнішньої кісточки. Активні рухи в правому гомілково-ступневому суглобі обмежені, пасивні - різко болючі. Під час пальпації гострий біль в ділянці зовнішньої кісточки. Який об'єм допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Імобілізація, транспортування на етап спеціалізованої медичної допомоги
- ☐ б. Транспортна імобілізація, транспортування в лікувальний заклад
- ☐ в. Імобілізація, транспортування в лікувальний заклад
- ☐ г. Знеболювання, транспортування в лікувальний заклад
- ☐ д. Знеболювання, транспортна імобілізація, транспортування на етап кваліфікованої допомоги

Коментар

Правильна відповідь: Знеболювання, транспортна імобілізація, транспортування на етап кваліфікованої допомоги

Питання 164

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 3-х років, яка знаходиться у стаціонарі, на фоні гострої респіраторної інфекції 3 рази було блювання, непокоїть гострий біль у животі. Температура тіла - 38,5°C. Шкіра бліда, суха. Дихання глибоке, ЧСС- 130/хв. Цукор крові - 4,0 ммоль/л. Який з діагнозів найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий гастроентерит
- ☐ б. Гострий апендицит
- ☐ в. Цукровий діабет
- ☐ г. Ацетонемічний стан
- ☐ д. Діабетична кома

Коментар

Правильна відповідь: Ацетонемічний стан

Питання 165

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Солдат був в осередку ураження отруйною речовиною. Уражений евакуйований, введено 5 мл 0,1% розчину атропіну протягом короткого часу. Скаржиться на: загальну слабкість, спрагу, сухість у роті, охриплість голосу. Збуджений, поведінка агресивна. Шкіра обличчя гіперемована, зіниці розширені, D=S=6 мм. В легенях жорстке дихання, хрипів немає. Рс- 120/хв., АТ-140/90 мм рт.ст., перистальтика ослаблена. Що могло б спричинити описану картину?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Атропінізація організму
- ☐ б. Ураження зарином
- ☐ в. Ураження дифосгеном
- ☐ г. Передозування реактиваторів холінестерази
- ☐ д. Ураження зоманом

Коментар

Правильна відповідь: Атропінізація організму

Питання 166

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовий під час мінометного обстрілу був засипаний землею до грудей на 6 годин. По латеральній поверхні правого стегна та в районі кульшового суглоба щільна припухлість, зниження чутливості шкіри. Діагностовано синдром тривалого стиснення. Яку інфузійну рідину доцільно призначити для профілактики ниркової недостатності?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 10% розчин кальцію хлориду
- ☐ b. 0,45% розчин натрію хлориду
- ☐ c. 10% розчин натрію хлориду
- ☐ d. 5% розчин глюкози
- ☐ e. 4% розчин натрію бікарбонату

Коментар

Правильна відповідь: 4% розчин натрію бікарбонату

Питання 167

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 4-х років скаржиться на загальну слабкість, кашель. Вночі раптовопідвищилася температура до 39,8оС, хвора стала неспокійною. Гавкаючий кашель, шумне свистяче дихання з втягуванням над- та підключичних западин, міжреберних проміжків, шкіра бліда. Контактувала з хворими на ГРВІ сестрами. Що необхідно призначити дитині в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Антибіотики, димедрол
- ☐ b. Папаверин, вітамін С
- ☐ c. Дибазол, еуфілін
- ☐ d. Астмопент, діазолін
- ☐ e. Преднізолон, гарячі ніжні ванни

Коментар

Правильна відповідь: Преднізолон, гарячі ніжні ванни

Питання 168

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 10-ти років знаходиться на лікуванні з приводу бронхіальної астми. Вранці хлопчик встав з ліжка і раптово з'явилися загальна слабкість, запаморочення, блідість шкіри, холодний піт, шум у вухах, хворий впав. Об'єктивно: зіниці розширені, тони серця різко ослаблені, пульс ниткоподібний, ЧСС- 65/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Бактеріальний шок
- ☐ b. Серцева недостатність
- ☐ c. Непритомність
- ☐ d. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ e. Кардіогенний шок

Коментар

Правильна відповідь: Непритомність

Питання 169

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 42-х років, оглянутий лікарем-психіатром, перебуває в стані оглушення, що періодично змінюється тривогою, відчаєм, афективними спалахами, гіперактивністю. На запитання не реагує. Відомо, що стан виник через декілька хвилин після бойових дій та триває 2 години. Який імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Тривожна реакція
- ☐ b. Іпохондричний невроз
- ☐ c. Параноїдна реакція
- ☐ d. Гостра реакція на стрес
- ☐ e. Конверсійна реакція

Коментар

Правильна відповідь: Гостра реакція на стрес

Питання 170

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пологовий будинок доставлена першовагітна 20-ти років з Rh(-) фактором у терміні вагітності 14 тижнів зі скаргами на ниючий біль у низу живота, значні кров'янисті виділення з статевих шляхів із згустками, що з'явилися після ДТП. При дообстеженні встановлено повний аборт. З метою профілактики Rh-імунізації в якій дозі слід ввести анти-Rh(D) імуноглобулін і за який час?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 300 мкг, до 48 годин
- ☐ b. 300 мкг, до 70 годин
- ☐ c. 120 мкг, до 70 годин
- ☐ d. 75 мкг, до 70 годин
- ☐ e. 150 мкг, до 48 годин

Коментар

Правильна відповідь: 300 мкг, до 48 годин

Питання 171

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини, яка народилась в асфіксії помірного ступеня, після тактильної стимуляції шкіри вздовж хребта спонтанне дихання не з'явилося. Які подальші дії у пологовому залі треба виконати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Похлопати по п'ятах
- ☐ b. Зрошування холодною водою
- ☐ c. Повторити погладжування вздовж хребта
- ☐ d. Почати штучну вентиляцію легень за допомогою мішка і маски
- ☐ e. Поплескування по підшві


Коментар

Правильна відповідь: Почати штучну вентиляцію легень за допомогою мішка і маски

Питання 172

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При наданні невідкладної допомоги дитині із крововтратою до 10% ОЦК лікарю необхідно відновити обсяг циркулюючої плазми. Оберіть оптимальний препарат:
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Реополіглюкін
- ☐ b. Розчин глюкози
- ☐ c. Ізотонічний сольовий розчин
- ☐ d. Цільна кров
- ☐ e. Свіжозаморожена плазма


Коментар

Правильна відповідь: Ізотонічний сольовий розчин

Питання 173

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнту 65-ти років, який хворіє на облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок, виконали операцію – ампутація ноги на рівні н/3 стегна. В зв'язку з вираженим больовим синдромом в післяопераційному періоді хворому тричі вводився омнопон. Які ускладнення можуть виникнути у хворого в зв'язку з використанням великих доз наркотичних анальгетиків?
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Фібриляція шлуночків серця
- ☐ b. Гостра ниркова недостатність
- ☐ c. Зупинка дихання
- ☐ d. Гостра печінкова недостатність
- ☐ e. Зупинка серця

Коментар

Правильна відповідь: Зупинка дихання

Питання 174

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Сержант отримав вогнепальне поранення грудей. Встановлено діагноз: кульове сліпе проникаюче поранення правої половини грудей з пошкодженням легені. Правобічний закритий гемопневмоторакс. Гостра крововтрата. Гостра дихальна недостатність II ступеня. Виконане дренивання плевральної порожнини за Бюлау. Назвіть критерії внутрішньоплевральної кровотечі, що продовжується:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Позитивна проба Квеккенштедта
- ☐ б. Негативна проба Квеккенштедта
- ☐ в. Негативна проба Рувілуа
- ☐ г. Позитивна проба Рувілуа-Грегуара
- ☐ д. Позитивна проба Стуккея


Коментар

Правильна відповідь: Позитивна проба Рувілуа-Грегуара

Питання 175

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У породіллі 16-ти років почалась гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Об'єм крововтрата 1,6% від маси тіла, Рс- 115/хв., систолічний АТ- 80 мм рт.ст., ЦВТ- 35 мм вод.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок I ступеня
- ☐ б. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок II ступеня
- ☐ в. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді без ознак геморагічного шоку
- ☐ г. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок III ступеня
- ☐ д. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок IV ступеня


Коментар

Правильна відповідь: Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок II ступеня

Питання 176

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 44-х років скарги на загальну слабкість, гіпертермію до 39°C, свербіння шкіри, висип, болісність і припухлість суглобів. Об'єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., папульозно-макульозний висип, генералізоване збільшення лімфовузлів, припухлість суглобів, збільшення селезінки. 7 днів тому у травмпункті провели первинну хірургічну обробку рани стопи та ввели протиправцеву сироватку. Вкажіть причину розвитку даного стану:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Анафілактична реакція
- ☐ b. Сироваткова хвороба
- ☐ c. Геморагічний васкуліт
- ☐ d. Сепсис
- ☐ e. Менінгіт


Коментар

Правильна відповідь: Сироваткова хвороба

Питання 177

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До терапевтичного відділення надійшов чоловік 30-ти років зі скаргами на зниження гостроти зору, неприємні відчуття в ділянці перенісся. Одночасно з'явилися нежить з рясними рідкими виділеннями, слинотеча, стиснення у грудній клітці, утруднення дихання, кашель. Об'єктивно: різке звуження зіниць, відсутність зіничних реакцій на світло. Рс- 100/хв. Діагностовано отруєння ФОС. Який лікувальний засіб першочерговий в цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Атропін
- ☐ b. Адреналін
- ☐ c. Супрастин
- ☐ d. Преднізолон
- ☐ e. Розчин левоміцетину

Коментар

Правильна відповідь: Атропін

Питання 178

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Роділля, 40 тижнів, в кінці 1-го періоду пологів переведена на стіл для пологів. Після того, як вона лягла в горизонтальне положення на спину, обличчя її зблідло, вона вкрилася холодним потом і втратила свідомість. АТ- 60/40 мм рт.ст., Рс- 132/хв. Яке ускладнення виникло?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Розрив матки
- ☐ b. Синдром стиснення нижньої порожнистої вени
- ☐ с. Внутрішня кровотеча
- ☐ d. Відшарування плаценти
- ☐ е. Тромбоемболія легеневої артерії

Коментар

Правильна відповідь: Синдром стиснення нижньої порожнистої вени

Питання 179

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікаря викликали до хворого з черепно-мозковою травмою. Свідомість втрачена. Ціаноз шкірних покривів. Пульс на сонних артеріях не пальпується. Який першочерговий захід слід виконати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Виклик на консультацію нейрохірурга
- ☐ b. Проведення комп'ютерної томографії голови
- ☐ с. Налагодження ЕКГ-контролю
- ☐ d. Вивільнення дихальних шляхів, масаж серця та ШВЛ
- ☐ е. Проведення електричної кардіоверсії

Коментар

Правильна відповідь: Вивільнення дихальних шляхів, масаж серця та ШВЛ

Питання 180

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини на третю добу життя з'явилися ознаки шлунково-кишкової кровотечі (блювання з домішками крові, мелена), постгеморагічної анемії. З якого розчину слід розпочати парентеральне лікування геморагічного синдрому у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Свіжозаморожена плазма
- ☐ б. Глюкозо-сольовий розчин
- ☐ в. Амінокапронова кислота
- ☐ г. Реополіглюкін
- ☐ д. Тромбоцитарна маса


Коментар

Правильна відповідь: Свіжозаморожена плазма

Питання 181

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 18-ти років, скаржиться на слабкість, мерехтіння в очах, запаморочення, випорожнення темного кольору. Виразкового анамнезу немає. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки бліді, Рс-112/хв., АТ-90/60 мм рт.ст. У крові: Нb- 86 г/л. Яка тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Спостереження за хворим в умовах поліклініки
- ☐ б. Госпіталізація в гастроентерологічне відділення
- ☐ в. Термінова госпіталізація в хірургічний стаціонар
- ☐ г. Призначення дієти Мейленграхта
- ☐ д. Консервативна терапія в амбулаторних умовах

Коментар

Правильна відповідь: Термінова госпіталізація в хірургічний стаціонар

Питання 182

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Породілля 23-х років, на другий день після пологів відчула наростаючий біль в правій нозі, важкість. Об'єктивно: стан хворої середньої важкості. Рс- 100/хв., температура - 37,3оС, тони серця приглушені, ритм синусовий, в легенях дихання везикулярне, 18-20/хв. Ліва нога на всьому протязі набрякла, синюшна, порівняно з правою температура знижена. Пульсація артерій лівої ноги на всьому протязі пальпується, ослаблена. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий клубово-стегновий флеботромбоз
- ☐ b. Тромбоемболія стегнової артерії
- ☐ с. Гострий тромбофлебіт вен правої нижньої кінцівки
- ☐ d. Тромбофлебіт глибоких вен правої нижньої кінцівки, післяпологовий сепсис
- ☐ e. Тромбоемболія клубової артерії


Коментар

Правильна відповідь: Гострий клубово-стегновий флеботромбоз

Питання 183

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 72-х років раптово розвинулось блювання кров'ю з крововтратою до 1,0 л. Об'єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС-112/хв. ЦВТ- 0. Які інфузійні середовища першочергово треба застосувати для лікування?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Свіжозаморожена плазма
- ☐ b. Розчини глюкози
- ☐ с. Кристалоїдні розчини
- ☐ d. Жирові емульсії
- ☐ e. Колоїдні розчини

Коментар

Правильна відповідь: Кристалоїдні розчини

Питання 184

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 51-го року доставлений до відділення кардіореанімації (інтенсивної терапії), скаржиться на тривалий пекучий за грудинний біль, який виник 40 хвилин тому, задишку. Об'єктивно: в легенях - дихання з жорстким відтінком, тони серця різко ослаблені, АТ- 110/70 мм рт.ст. На ЕКГ виявлено підйом сегменту ST на 5 мм над ізолінією у відведеннях I, V 1-V 4 та депресію сегмента ST у відведеннях III і aV F. Який препарат потрібно застосувати у даній ситуації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Альтеплаза
- ☐ b. Нітрогліцерин
- ☐ c. Метопролол
- ☐ d. Добутамін
- ☐ e. Аміодарон


Коментар

Правильна відповідь: Альтеплаза

Питання 185

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 25-ти років поступила в лікарню з ознаками ядухи, гавкаючим кашлем, ціанозом обличчя. При огляді порожнини рота встановлено набряк язика, м'якого піднебіння, мигдаликів. АТ- 85/60 мм рт.ст. За 30 хвилин до того вживала полуниці. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Колапс
- ☐ b. Набряк Квінке
- ☐ c. Анафілактичний шок
- ☐ d. Напад бронхіальної астми
- ☐ e. Набряк гортані

Коментар

Правильна відповідь: Набряк Квінке

Питання 186

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У доношеної дитини на 2 день життя діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого по Rh-фактору, жовтянична форма. Через 10 години після народження з'явилась субіктеричність шкірних покривів. Розпочато фототерапію, рівень білірубіну сироватки крові - 160 мкмоль/л, через 4 години - 200 мкмоль/л. Яку тактику слід обрати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Операція замінного переливання крові
- ☐ б. Спостереження
- ☐ в. Інфузійна терапія
- ☐ г. Медикаментозна терапія
- ☐ д. Продовжити фототерапію


Коментар

Правильна відповідь: Операція замінного переливання крові

Питання 187

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Ви надаєте допомогу постраждалій дитині з електротравмою. Постраждалий непритомний, тримається за електричний провід. З чого необхідно починати надавати допомогу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Звільнити постраждалого від дії електричного струму
- ☐ б. Провести непрямий масаж серця
- ☐ в. Дати понюхати нашатирний спирт
- ☐ г. Провести ШВЛ
- ☐ д. Викликати швидку допомогу

Коментар

Правильна відповідь: Звільнити постраждалого від дії електричного струму

Питання 188

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого із вкрай важким ступенем кістковомозкової форми гострої променевої хвороби у початковому періоді з'явилися: лихоманка, сильний головний біль, адинамія, біль у м'язах і суглобах. Який синдром гострої променевої хвороби у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гастроінтестинальний синдром
- ☐ б. Геморагічний синдром
- ☐ в. Синдром загальної токсемії
- ☐ г. Синдром ураження нервової системи
- ☐ д. Синдром інфекційних ускладнень


Коментар

Правильна відповідь: Синдром загальної токсемії

Питання 189

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з тяжким перебігом пневмонії за клініко-епідеміологічними даними можна припустити легеневу форму сибірки. Який з методів профілактики захворювання серед представників медичного персоналу, які контактували з цим хворим, слід вважати найбільш ефективним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Дезінсекція
- ☐ б. Вакцинація
- ☐ в. Методи поточної дезінфекції
- ☐ г. Дератизація
- ☐ д. Екстрена антибіотикопрофілактика

Коментар

Правильна відповідь: Екстрена антибіотикопрофілактика

Питання 190

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 52-х років після ДТП від медичної допомоги відмовився, а через деякий час відчув зростаючу слабкість, запаморочення, тупий біль у лівому підребер'ї. Об'єктивно: загальмований, ЧСС- 130/хв., АТ-80/50 мм рт.ст. В анамнезі ІХС, гіпертонічна хвороба. Який імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Колапс на фоні внутрішньої кровотечі
- ☐ б. Наслідки перенесеного стресу
- ☐ в. Напад стенокардії
- ☐ г. Загострення хронічного панкреатиту
- ☐ д. Інфаркт міокарда


Коментар

Правильна відповідь: Колапс на фоні внутрішньої кровотечі

Питання 191

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 42-х років, співробітник гаражу, доставлений у лікарню у стані коми III ступеня. Об'єктивно: клонічні судими, безконтрольне сечовиділення, дихання Чейн-Стокса, тахікардія, гіперемія обличчя та слизових оболонок. Який вид отруєння має місце?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Парами ртуті
- ☐ б. Аміаком
- ☐ в. Тетраетилсвинцем
- ☐ г. Випарами бензину
- ☐ д. Чадним газом


Коментар

Правильна відповідь: Чадним газом

Питання 192

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 27-ми років через 1 годину після ураження отруйною речовиною розвинулася наступна симптоматика: тривалий кашель з виділенням слизу, утруднене дихання внаслідок бронхоспазму. Яка отруйна речовина може викликати дану симптоматику?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дибензосазепін
- ☐ b. Оксид вуглецю
- ☐ c. Адамсит
- ☐ d. Фосген
- ☐ e. Зарин


Коментар

Правильна відповідь: Фосген

Питання 193

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 59-ти років раптово з'явився сильний біль у епігастрії, непритомність. Останні роки часті загострення виразкової хвороби. Яке ускладнення є найбільш імовірним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Прободіння, як ускладнення виразкової хвороби
- ☐ b. Гострий холецистит на тлі виразкової хвороби
- ☐ c. Гострий інфаркт міокарда
- ☐ d. Кровотеча, як ускладнення виразкової хвороби
- ☐ e. Розшаровуюча аневризма аорти

Коментар

Правильна відповідь: Прободіння, як ускладнення виразкової хвороби

Питання 194

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікар швидкої допомоги, приїхавши на місце ДТП, діагностував закритий перелом правого стегна в середній третині. Яким повинен бути обсяг допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Імобілізація трьома шинами Крамера до пахвинної ділянки
- ☐ b. Імобілізація трьома шинами Крамера до кульшового суглоба
- ☐ c. Знеболення, імобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія
- ☐ d. Знеболення введенням в місце перелому 1% р-ну новокаїну, імобілізація шиною Дітеріхса, внутрішньовенне введення розчинів
- ☐ e. Знеболення наркотичними препаратами, фіксація пошкодженої кінцівки до здорової


Коментар

Правильна відповідь: Знеболення, імобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія

Питання 195

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10-ти років зупинена артеріальна кровотеча (плечова артерія) через 10 хвилин після травми. При надходженні АТ- 90/50 мм рт.ст., еритроцити - $2,5 \cdot 10^{12}/л$, Hb- 60 г/л. Раніше при переливанні цільної крові була анафілактоїдна реакція. Який препарат крові найбільш безпечний для корекції крововтрати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Лейкоконцентрат
- ☐ b. Відмиті еритроцити
- ☐ c. Цільна кров
- ☐ d. Свіжозаморожена плазма
- ☐ e. Еритроцитарна маса

Коментар

Правильна відповідь: Відмиті еритроцити

Питання 196

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 70-ти років отримав травму на вулиці. Відчув різкий біль в проксимальному відділі лівого плеча. Вкажіть оптимальний метод транспортної іммобілізації:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Вкласти хворого на ноші
- ☐ b. Еластична пов'язка
- ☐ c. Іммобілізація плеча драбинчатою шиною
- ☐ d. Іммобілізація плеча шиною Дітерікса
- ☐ e. Фіксація руки до тулуба


Коментар

Правильна відповідь: Іммобілізація плеча драбинчатою шиною

Питання 197

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого періодично виникають напади клонічних судом у лівій руці, які іноді розповсюджуються на ліву половину обличчя. Напад триває 5 хвилин, після чого відмічається слабкість у лівій руці, яка поступово зникає впродовж 2-3 годин. Який варіант судомного синдрому наведено?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Малий епілептичний напад
- ☐ b. Напад скроневої епілепсії
- ☐ c. Генералізований епілептичний напад
- ☐ d. Напад Джексонівської епілепсії
- ☐ e. Напад Кожевниковської епілепсії

Коментар

Правильна відповідь: Напад Джексонівської епілепсії

Питання 198

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Розвідкою було докладено про імовірну загрозу застосування супротивником радіаційної зброї. Який засіб з аптечки індивідуальної необхідно використати для профілактики променевого ураження особового складу військових?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Афін
- ☐ b. Цистамін
- ☐ c. Тетрацикліну гідрохлорид
- ☐ d. Сульфодіметоксін
- ☐ e. Етаперазин


Коментар

Правильна відповідь: Цистамін

Питання 199

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 40-ка років доставлено до приймального відділення. Відзначається запах алкоголю з рота, відкривання очей та мовні відповіді відсутні, нецілеспрямований рух на біль. Об'єктивно: дихання часте (>40/хв.), поверхневе, АТ- 90/40 мм рт.ст., Рс- 112/хв. Що треба зробити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Позаниркові методи детоксикації (гемодіаліз, гемосорбція)
- ☐ b. Внутрішньовенно бемегрід
- ☐ c. Інтубація трахеї
- ☐ d. Зондове промивання шлунка
- ☐ e. Форсований діурез

Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї

Питання 200

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 37-ми років було поранено колючим предметом в плече. Об'єктивно: на медіальній поверхні у верхній третині правого плеча є глибока різана рана з пульсуючою струйною кровотечею. Пульсація на a. radialis відсутня. Визначте обсяг надання першої медичної допомоги: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Накладання стискаючої пов'язки
- ☐ b. Накладання джгута проксимальніше рівня кровотечі
- ☐ c. Введення гемостатичних препаратів
- ☐ d. Накладання джгута дистальніше рівня кровотечі
- ☐ e. Холод на місце кровотечі

Коментар

Правильна відповідь: Накладання джгута проксимальніше рівня кровотечі

[Завершити перегляд](#)

[Пропустити](#) Перехід по тесту

[Перехід по тесту](#)

[Питання 1 На цій сторінці](#) [Питання 2 На цій сторінці](#) [Питання 3 На цій сторінці](#) [Питання 4 На цій сторінці](#) [Питання 5 На цій сторінці](#) [Питання 6 На цій сторінці](#) [Питання 7 На цій сторінці](#) [Питання 8 На цій сторінці](#) [Питання 9 На цій сторінці](#) [Питання 10 На цій сторінці](#) [Питання 11 На цій сторінці](#) [Питання 12 На цій сторінці](#) [Питання 13 На цій сторінці](#) [Питання 14 На цій сторінці](#) [Питання 15 На цій сторінці](#) [Питання 16 На цій сторінці](#) [Питання 17 На цій сторінці](#) [Питання 18 На цій сторінці](#) [Питання 19 На цій сторінці](#) [Питання 20 На цій сторінці](#) [Питання 21 На цій сторінці](#) [Питання 22 На цій сторінці](#) [Питання 23 На цій сторінці](#) [Питання 24 На цій сторінці](#) [Питання 25 На цій сторінці](#) [Питання 26 На цій сторінці](#) [Питання 27 На цій сторінці](#) [Питання 28 На цій сторінці](#) [Питання 29 На цій сторінці](#) [Питання 30 На цій сторінці](#) [Питання 31 На цій сторінці](#) [Питання 32 На цій сторінці](#) [Питання 33 На цій сторінці](#) [Питання 34 На цій сторінці](#) [Питання 35 На цій сторінці](#) [Питання 36 На цій сторінці](#) [Питання 37 На цій сторінці](#) [Питання 38 На цій сторінці](#) [Питання 39 На цій сторінці](#) [Питання 40 На цій сторінці](#) [Питання 41 На цій сторінці](#) [Питання 42 На цій сторінці](#) [Питання 43 На цій сторінці](#) [Питання 44 На цій сторінці](#) [Питання 45 На цій сторінці](#) [Питання 46 На цій сторінці](#) [Питання 47 На цій сторінці](#) [Питання 48 На цій сторінці](#) [Питання 49 На цій сторінці](#) [Питання 50 На цій сторінці](#) [Питання 51 На цій сторінці](#) [Питання 52 На цій сторінці](#) [Питання 53 На цій сторінці](#) [Питання 54 На цій сторінці](#) [Питання 55 На цій сторінці](#) [Питання 56 На цій сторінці](#) [Питання 57 На цій сторінці](#) [Питання 58 На цій сторінці](#) [Питання 59 На цій сторінці](#) [Питання 60 На цій сторінці](#) [Питання 61 На цій сторінці](#) [Питання 62 На цій сторінці](#) [Питання 63 На цій сторінці](#) [Питання 64 На цій сторінці](#) [Питання 65 На цій сторінці](#) [Питання 66 На цій сторінці](#) [Питання 67 На цій сторінці](#) [Питання 68 На цій сторінці](#) [Питання 69 На цій сторінці](#) [Питання 70 На цій сторінці](#) [Питання 71 На цій сторінці](#) [Питання 72 На цій сторінці](#) [Питання 73 На цій сторінці](#) [Питання 74 На цій сторінці](#) [Питання 75 На цій сторінці](#) [Питання 76 На цій сторінці](#) [Питання 77 На цій сторінці](#) [Питання 78 На цій сторінці](#) [Питання 79 На цій сторінці](#) [Питання 80 На цій сторінці](#) [Питання 81 На цій сторінці](#) [Питання 82 На цій сторінці](#) [Питання 83 На цій сторінці](#) [Питання 84 На цій сторінці](#) [Питання 85 На цій сторінці](#) [Питання 86 На цій сторінці](#) [Питання 87 На цій сторінці](#) [Питання 88 На цій сторінці](#) [Питання 89 На цій сторінці](#) [Питання 90 На цій сторінці](#) [Питання 91 На цій сторінці](#) [Питання 92 На цій сторінці](#) [Питання 93 На цій сторінці](#) [Питання 94 На цій сторінці](#) [Питання 95 На цій сторінці](#) [Питання 96 На цій сторінці](#) [Питання 97 На цій сторінці](#) [Питання 98 На цій сторінці](#) [Питання 99 На цій сторінці](#) [Питання 100 На цій сторінці](#) [Питання 101 На цій сторінці](#) [Питання 102 На цій сторінці](#) [Питання 103 На цій сторінці](#) [Питання 104 На цій сторінці](#) [Питання 105 На цій сторінці](#) [Питання 106 На цій сторінці](#) [Питання 107 На цій сторінці](#) [Питання 108 На цій сторінці](#) [Питання 109 На цій сторінці](#) [Питання 110 На цій сторінці](#) [Питання 111 На цій сторінці](#) [Питання 112 На цій сторінці](#) [Питання 113 На цій сторінці](#)

[illegible]

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

Учасники

Відзнаки

Компетентності

Журнал оцінок

Загальне

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Контрольні тестування

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Секція 9

[Секція 10](#)

[Секція 11](#)

[Секція 12](#)

[Секція 13](#)

[Секція 14](#)

[Секція 15](#)

[Особистий кабінет](#)

[Домашня сторінка](#)

[Календар](#)

[Особисті файли](#)

Мої курси

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручняк Оксана Богданівна \(Вийти\)](#)
КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Українська \(uk\)](#)
 - - [English \(en\)](#)
 - [Русский \(ru\)](#)
 - [Українська \(uk\)](#)