

[Перейти до головного вмісту](#)
[Бокова панель](#)
[КРОК-123](#)

(Інтерн БДМУ) Підручняк Оксана Богданівна



[Особистий кабінет](#)[Профіль користувача](#)[Оцінки](#)[Повідомлення](#)[Уподобання](#)[Вийти](#)[Повідомлення](#)

[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане

Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане

Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)


[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Секція 3](#)
- [2019 весна](#)

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Розпочато | Tuesday 14 February 2023 20:40 PM |
| Стан | Завершено |
| Завершено | Tuesday 14 February 2023 20:40 PM |
| Витрачено часу | 12 сек |
| Балів | 0,00/200,00 |
| Оцінка | 0,00 з 100,00 можливих |
| Питання 1 | |

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У приймальне відділення лікарні ургентно доставлений хворий 19-ти років. Під час обстеження спостерігаються багаторазові повторні генералізовані тоніко-клонічні судомні напади, непритомний, піна з рота, шкіра сірувато-білого кольору, на лобі підшкірна гематома 1x2 см, частота серцевих скорочень - 120/хв., коливання артеріального тиску від 130/80 до 170/100 мм рт.ст. При неврологічному обстеженні: зіниці на світло не реагують, погляд не фокусує, патологічні рефлекси нижніх кінцівок. Який стан у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ b. Менінгіт
- ☐ c. Делірій
- ☐ d. Епілептичний статус
- ☐ e. Правець


Коментар

Правильна відповідь: Епілептичний статус

Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Поранений з мінно-вибуховою травмою доставлений з поля бою в мобільний госпіталь у стані шоку. Пульс на променевій артерії не визначається. Артеріальний тиск - 50/0 мм рт.ст. Які першочергові заходи необхідні на цьому етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Швидке внутрішньовенне введення колоїдно-кристалоїдних розчинів
- ☐ b. Крапельна інфузія 0,9% розчину NaCl у межах подвоєної добової потреби в рідині
- ☐ c. Внутрішньовенна інфузія мезатону до відновлення пульсу на променевій артерії
- ☐ d. Ультразвукове дослідження черевної та плевральної порожнин для виключення кровотечі
- ☐ e. Внутрішньом'язово ввести 1 мл адреналіну. Повторити через 5 хвилин в разі неефективності


Коментар

Правильна відповідь: Швидке внутрішньовенне введення колоїдно-кристалоїдних розчинів

Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 30-ти років відзначає кров'яністі виділення із статевих шляхів протягом 2-х тижнів. В анамнезі: 2 тижні тому жінці було виконано хірургічне переривання вагітності у терміні 8 тижнів. Огляд у дзеркалах: шийка матки чиста, з зовнішнього вічка помірні кров'яністі виділення. Вагінальне дослідження: матка в антефлексію, рухлива, безболісна, трохи збільшена. Додатки без особливостей. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Загроза аборт
- ☐ b. Післяабортний ендометрит
- ☐ c. Неповний аборт
- ☐ d. Гіперменорея
- ☐ e. Порушення менструального циклу


Коментар

Правильна відповідь: Неповний аборт

Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 62-х років під час операції з приводу видалення пухлини лівої легені під загальним комбінованим знеболенням з однолегеневою інтубацією раптово наступила зупинка роботи серця. Які дії лікаря є оптимальними?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Проведення дефібриляції
- ☐ b. Проведення закритого масажу серця
- ☐ c. Введення міорелаксантів
- ☐ d. Екстубація хворого
- ☐ e. Проведення відкритого масажу серця


Коментар

Правильна відповідь: Проведення відкритого масажу серця

Питання 5

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 11-ти місяців на тлі гострої респіраторної інфекції виник генералізований судомний напад тривалістю до 4 хвилини. При огляді шкіра гіперемована, гаряча, суха на дотик, температура тіла - 39,9°C. Вогнищевої неврологічної симптоматики не відмічається, ЕЕГ - варіант норми. В крові: Нb - 129 г/л, Са - 2,4 ммоль/л, глюкоза - 6,0 ммоль/л. Який найбільш ймовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Спазмофілія
- ☐ b. Гіпоглікемія
- ☐ c. Менінгіт
- ☐ d. Епілепсія
- ☐ e. Фебрильні судоми


Коментар

Правильна відповідь: Фебрильні судоми

Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 56-ти років, раптово втратив свідомість. Об'єктивно: пульс на сонних артеріях відсутній, екскурсії грудної клітки немає. Розпочата термінова реанімація: зовнішній масаж та штучне дихання. Яке має бути співвідношення між числом компресій до частоти дихання у даного хворого для забезпечення оптимального співвідношення між кровотоком і доставкою кисню?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 15:4
- ☐ b. 15:2
- ☐ c. 5:1
- ☐ d. 50:2
- ☐ e. 30:2


Коментар

Правильна відповідь: 30:2

Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 30-ти років після тряскої їзди з'явився інтенсивний нападopodobний біль у поперековій ділянці, що іррадіює в пахову ділянку, часті позиви до сечовипускання, кров у сечі. Об'єктивно: артеріальний тиск 145/85 мм рт.ст., позитивний симптом Пастернацького ліворуч. Аналіз сечі: білок - 0,066 г/л, L- 4-5 в п/зору, еритроцити - все поле зору, оксалати. Ваш попередній діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий цистит
- ☐ б. Кіста яєчника
- ☐ в. Позаматкова вагітність
- ☐ г. Гострий пієлонефрит
- ☐ д. Ниркова колька


Коментар

Правильна відповідь: Ниркова колька

Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У медичну роту 14 ОМБР, яка розгорнута в районі населеного пункту Широке з I механізованого батальйону та добровольчого батальйону "Айдар" надійшло 16 поранених вогнепальною зброєю та 8 хворих. Який вид медичної допомоги буде наданий пораненим та хворим в функціональних підрозділах медичної роти бригади?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Перша лікарська допомога та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги
- ☐ б. Перша медична та перша лікарська допомога
- ☐ в. Перша медична та перша лікарська медична допомога
- ☐ г. Всі види медичної допомоги
- ☐ д. Доликарська допомога та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги

Коментар

Правильна відповідь: Перша лікарська допомога та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги

Питання 9

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 25-ти років, скаржиться на загальну слабкість, головний біль, сухий кашель, наявність висипу на тулубі. Хворіє 5 днів. Висип на тулубі помітив 3 доби тому. Об'єктивно: збільшені шийні й підщелепні лімфовузли. Температура тіла - 39,0оС. Явища афтозного стоматиту. На шкірі тулуба, волосистій ділянці голови везикулярно-папульозний висип, місцями - кірочки. Тахікардія. В легенях сухі хрипи. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. ГРВІ
- ☐ b. Алергічний дерматит
- ☐ c. Інфекційний мононуклеоз
- ☐ d. Аденовірусна інфекція
- ☐ e. Вітряна віспа

Коментар

Правильна відповідь: Вітряна віспа

Питання 10

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчина 22-х років надійшла до лікарні на 3-й день від початку захворювання зі скаргами на нестерпний головний біль, світлобоязнь, біль в очних яблуках, блювання, підвищення температури тіла до 39,9оС. Об'єктивно: стан хворої середньої тяжкості. Визначається виражена ригідність м'язів потилиці, позитивний симптом Керніга. Запідозрено менінгіт. Виникнення якого ускладнення можна прогнозувати у хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. набряк-набухання головного мозку
- ☐ b. Гіповолемічний шок
- ☐ c. Пневмонія
- ☐ d. Гемоглобінурійна гарячка
- ☐ e. Гостра ниркова недостатність

Коментар

Правильна відповідь: набряк-набухання головного мозку

Питання 11

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 34-х років через 2 тижні після пологів з'явився біль у лівій нижній кінцівці. Ліве стегно і гомілка різко збільшилися в об'ємі за рахунок набряку. Спостерігається синюшність шкірних покривів. Пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ілеофemorальний тромбоз
- ☐ b. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен
- ☐ c. Облітеруючий ендартеріт
- ☐ d. Гострий артеріальний тромбоз
- ☐ e. Попереково-крижовий радикуліт

Коментар

Правильна відповідь: Ілеофemorальний тромбоз

Питання 12

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 5 місяців. Під час лікування кишкової інфекції зменшується кількість сечі (останні 6 годин сечовиділення не було). Спостерігаються блювання, потьмарена свідомість, порушення ритму серця. Лабораторні дослідження крові: сечовина 26 ммоль/л, рівень К - 7,0 ммоль/л. Яке лікування потрібне?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інфузійна терапія з режимом форсованого діурезу
- ☐ b. Гемодіаліз
- ☐ c. Інфузійна терапія з режимом дегідратації
- ☐ d. Інфузійна терапія з режимом регідратації
- ☐ e. Заміна антибактеріального препарату

Коментар

Правильна відповідь: Гемодіаліз

Питання 13

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки після укусу оси в обличчя розвинулось тахіпное до 38/хв., пульс - 120/хв., артеріальний тиск знизився до 60/40 мм рт.ст. З чого треба почати невідкладну допомогу?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Димедрол
- ☐ б. Допоміжна вентиляція легенів
- ☐ в. Преднізолон
- ☐ г. Адреналін
- ☐ д. Оксигенотерапія

Коментар

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 14

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 30-ти років щорічно у весняний період відмічає появу нежитю, чхання, сльозотечі. Симптоми тривають близько місяця, пізніше зникають. Після проведення шкірно-алергологічних проб був поставлений діагноз: поліноз, алергія на амброзію. Хворій рекомендовано для досягнення максимального ефекту:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Таблетовані глюкокортикоїди коротким курсом
- ☐ б. Фітотерапію
- ☐ в. Передсезонне призначення антигістамінних препаратів
- ☐ г. Пролонговані ін'єкційні глюкокортикоїди в осінній період
- ☐ д. Специфічну імунотерапію

Коментар

Правильна відповідь: Специфічну імунотерапію

Питання 15

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 55-ти років впродовж 2-х місяців спостерігалася сеча червоного кольору, схуд на 5 кг. В загальному аналізі крові: еритроцити - $3,7 \cdot 10^{12}/л$, Hb- 100 г/л, кольоровий показник - 0,9, лейкоцити - $4,5 \cdot 10^9 /л$, швидкість осідання еритроцитів - 45 мм/год. В загальному аналізі сечі: білок 0,165 г/л, лейкоцити - 3-4 в п/з, еритроцити 10-15 в п/з. На УЗД нирок: розміри правої нирки - 150x80 мм, в паренхімі спостерігається гіпоехогенна зона 20 мм в діаметрі, без чітких контурів. Яке обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Оглядова урографія
- ☐ б. Проба Реберга-Тареева
- ☐ в. Проба з водним навантаженням
- ☐ г. Комп'ютерна томографія
- ☐ е. Хромоцистоскопія

Коментар

Правильна відповідь: Комп'ютерна томографія

Питання 16

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 25-ти років госпіталізовано після дорожньо-транспортної пригоди з діагнозом "закрита травма живота". Скаржиться на біль у верхніх відділах живота з іррадіацією в ліве надпліччя. Об'єктивно: блідий, артеріальний тиск-90/50 мм рт.ст., пульс- 116/хв. Притуплення перкуторного звуку в пологих відділах живота, слабкопозитивний симптом Щоткіна-Блумберга. Попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Заочеревинна гематома
- ☐ б. Розрив селезінки
- ☐ в. Розрив кишечника
- ☐ г. Розрив сечового міхура
- ☐ е. Розрив шлунка

Коментар

Правильна відповідь: Розрив селезінки

Питання 17

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка, 25-ти років, була зґвалтована та побита невідомим, після чого рідними госпіталізована в стані мовного та рухового збудження. При огляді: дезорієнтована, на запитання не відповідає. Раптово стає метушливою, рве на собі одяг, намагається кудись бігти, відчуває страх, тривогу. Для невідкладної допомоги слід застосувати:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Амітриптилін
- ☐ b. Дифенгідраміну гідрохлорид
- ☐ c. Діазепам
- ☐ d. Пірацетам
- ☐ e. Галоперидол

Коментар

Правильна відповідь: Діазепам

Питання 18

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У лікаря, який оглянув хворих з високою температурою на півдні Судану, виникли лихоманка, головний біль, біль у м'язах і суглобах, загальна слабкість, пронос. На 4-й день хвороби на тілі з'явився макуло- папульозний висип, 5-й день - криваве блювання, мелена, гіпотонія. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Лептоспіроз
- ☐ b. Псевдотуберкульоз
- ☐ c. Висипний тиф
- ☐ d. Малярія
- ☐ e. Лихоманка Ебола

Коментар

Правильна відповідь: Лихоманка Ебола

Питання 19

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На сортувальному майданчику медичної роти бригади пораненому встановлено попередній діагноз: мінно-вибухова травма. Травматичний шок. В ролі лікаря сортувальної бригади зробіть сортувальний висновок (черговість направлення та функціональний підрозділ):

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Перша черга, перев'язочна для поранених середньої тяжкості
- ☐ б. Друга черга, операційна для тяжкопоранених
- ☐ в. Перша черга, протишокова для поранених
- ☐ г. Перша черга, госпітальне відділення
- ☐ д. Перша черга, перев'язочна для легкопоранених

Коментар

Правильна відповідь: Перша черга, протишокова для поранених

Питання 20

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 70-ти років впав на бетонну плиту з висоти 4 м, після чого з'явився сильний біль в правому стегні, втрата свідомості. Під час огляду збуджений, відмічено розвертання назовні правого стегна та підшкірний крововилив 5х6 см. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Пульс - 120/хв. Який попередній діагноз можна поставити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Закритий перелом правої стегнової кістки, геморагічний шок
- ☐ б. Закритий перелом правої стегнової кістки, травматичний шок
- ☐ в. Забій правого стегна, геморагічний шок
- ☐ г. Забій правого стегна, травматичний шок
- ☐ д. Закритий перелом кісток тазу, травматичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Закритий перелом правої стегнової кістки, травматичний шок

Питання 21

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Породілля 21 рік. Знаходиться у післяпологовому відділенні на сумісному перебуванні з дитиною. 3 доба після пологів. Під час огляду лікаря збуджена, відмовляється від огляду, збирається додому. На запитання відповідає, що не розуміє, що вона знаходиться у лікарні, що ще незаміжня та дітей не народжувала. Пологи I, перебіг вагітності без ускладнень, психосоматичний анамнез не ускладнений. Температура тіла нормальна. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Післяпологовий психоз
- ☐ b. Інтоксикаційний психоз
- ☐ c. Органічний психосиндром
- ☐ d. Шизофренія
- ☐ e. Післяпологова депресія

Коментар

Правильна відповідь: Післяпологовий психоз

Питання 22

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 48-ми років скаржиться на наявність пульсуючого болю в ділянці інфільтрату промежини, температура тіла - 38,9°C. При огляді виявлено округлий інфільтрат зліва від ануса, шкіра над ним гіперемована. Per rectum: верхня межа інфільтрату вище гребінцевої лінії, пальпація його різко болісна. Ваш діагноз: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Туберкульозний наплив в періанальній ділянці
- ☐ b. Нагноєння епітеліальних куприкових ходів
- ☐ c. Гострий гнійний парапроктит
- ☐ d. Фурункул періанальної ділянки
- ☐ e. Кіста параректальної ділянки

Коментар

Правильна відповідь: Гострий гнійний парапроктит

Питання 23

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 70-ти років раптово з'явилися слабкість, запаморочення. Виникло багаторазове випорожнення прямої кишки калом з рідиною темно-вишневого кольору, згортками крові. З анамнезу: за останні 5 місяців схуд на 17 кг, останні 3 місяці - закрепи. Об'єктивно: блідий, у лівій здухвинній ділянці пальпується нерухомий болісний інфільтрат. Роздуті поперечний та низхідний відділи ободової кишки. Які інструментальні дослідження на першому етапі будуть найбільш доцільними?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, оглядова рентгенографія грудної клітки
- ☐ б. Сцинтиграфія печінки, фракційне дуоденальне зондування
- ☐ в. Рентгенконтрастне дослідження шлунка, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
- ☐ г. Фіброезофагогастродуоденоскопія, екскреторна урографія
- ☐ д. Ректороманоскопія, іригоскопія, фіброколоноскопія

Коментар

Правильна відповідь: Ректороманоскопія, іригоскопія, фіброколоноскопія

Питання 24

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Який прийом необхідно використати для видалення стороннього тіла дихальних шляхів у дитини 6 місяців?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Використати прийом Геймліха
- ☐ б. Розташувати дитину на передпліччі лицем додолу, з головою, що опущена нижче тулуба та нанести по спині удари проксимальною частиною долоні
- ☐ в. Завести дитині пальця до ротогортала та намагатись зачепити стороннє тіло
- ☐ г. Ритмічно натискати на живіт у момент видиху
- ☐ д. Взяти дитину за ноги та потрусити

Коментар

Правильна відповідь: Розташувати дитину на передпліччі лицем додолу, з головою, що опущена нижче тулуба та нанести по спині удари проксимальною частиною долоні

Питання 25

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 14-річного хлопчика під час тривалого стояння раптово з'явилися запаморочення, потемніння в очах, хлопчик знепритомнів. Об'єктивно: дитина без свідомості, блідість шкірних покривів, холодний піт. Відзначаються тахікардія, ниткоподібний пульс, зниження артеріального тиску. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра серцева недостатність
- ☐ б. Тампонада серця
- ☐ с. Гостра коронарна недостатність
- ☐ d. Кома
- ☐ е. Колапс

Коментар

Правильна відповідь: Колапс

Питання 26

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10-ти років після дорожньо-транспортної пригоди спостерігається тривала кровотеча, відкритий перелом плеча, тупа травма живота, перелом стегна. Частота серцевих скорочень - 120/хв., артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст. У крові: Hb- 96 г/л, еритроцити - 3,8 10¹²/л, Ht- 0,37. З яких кровозамінників необхідно розпочинати терапію?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Цільна кров
- ☐ б. Альбумін
- ☐ с. Свіжозаморожена плазма
- ☐ d. Еритроцитарна маса
- ☐ е. Кристалоїди


Коментар

Правильна відповідь: Кристалоїди

Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пораненого в стегно на 4-й день перебування у лікарні з'явилися скарги на біль у грудях в ділянці груднини, що підсилюється при зміні положення тіла і глибокому диханні, задишку в горизонтальному положенні, серцебиття. При обстеженні: температура фебрильна, межі серця розширені, тони серця глухі, грубий шум тертя біля лівого краю груднини, що посилюється в горизонтальному положенні. Яке ускладнення поранення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий перикардит
- ☐ b. Гострий плеврит
- ☐ c. Гострий ендокардит
- ☐ d. Гострий міокардит
- ☐ e. Інтоксикаційна міокардіопатія


Коментар

Правильна відповідь: Гострий перикардит

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 40-ка років захворів гостро, коли з'явилися часті рідкі випорожнення без патологічних домішок, повторне блювання. Об'єктивно: шкіра бліда, риси обличчя загострені, ціаноз губ. Судомні скорочення м'язів верхніх та нижніх кінцівок. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст., пульс - 110/хв. Який діагноз найбільш ймовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кардіогенний шок
- ☐ b. Геморагічний шок
- ☐ c. Гіповолемічний шок
- ☐ d. Анафілактичний шок
- ☐ e. Інфекційно-токсичний шок


Коментар

Правильна відповідь: Гіповолемічний шок

Питання 29

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 45-ти років п'ятнадцятирічний анамнез виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Протягом 7-ми днів спостерігалось багаторазове блювання вмістом шлунка, загальна слабкість. Пульс-100/хв., артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст., тургор шкіри знижений, пальпаторно живіт дещо болючий в епігастрії. На рентгенограмі велика кількість рідини у шлунку. Поставте діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Пілоростеноз
- ☐ б. Шлунково-кишкова кровотеча
- ☐ в. Гостра кишкова непрохідність
- ☐ г. Гостре розширення шлунка
- ☐ д. Загострення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки


Коментар

Правильна відповідь: Пілоростеноз

Питання 30

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До ВППГ доставлено лейтенанта зі сліпим кульовим пораненням м'яких тканин лівого стегна у задовільному стані. Артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст., пульс 78/хв. Асептична пов'язка помірно просякнута кров'ю. Яких заходів профілактики інфекційних ускладнень потрібно вжити? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Знеболення, антибіотикотерапія
- ☐ б. Введення тампону в рану з накладанням шкірних швів
- ☐ в. Первинна хірургічна обробка рани, антибіотикотерапія
- ☐ г. Первинна хірургічна обробка рани з накладанням первинного шва, антибіотикотерапія
- ☐ д. Введення фізіологічного розчину внутрішньовенно, іммобілізація лівої нижньої кінцівки шинами Крамера


Коментар

Правильна відповідь: Первинна хірургічна обробка рани, антибіотикотерапія

Питання 31

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 48-ми років було витягнуто з-під уламків будівлі. Об'єктивно: слабкість, тахікардія, різкий біль при пальпації кісток тазу, неможливість відірвати кінцівки від полу. Попередній діагноз: перелом кісток таза. Який вид транспортування потрібний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. В сидячому положенні
- ☐ b. На ношах на животі
- ☐ c. Лежачи на ношах
- ☐ d. На щиті в положенні Волковича
- ☐ e. На щиті з приведеними ногами


Коментар

Правильна відповідь: На щиті в положенні Волковича

Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий пред'являє скарги на раптову появу загальної слабкості, що прогресує, на м'язову слабкість, стомлюваність, відсутність апетиту, гіпотонію, була одноразова втрата свідомості, часті запаморочення, біль у животі, апатію, погіршення пам'яті, неможливість зосередитися. З анамнезу протягом 3-х років приймав метилпреднізолон 16 мг на добу з приводу ревматоїдного артриту, але в останні 5 днів гормони не приймав. Погіршення стану відмічає протягом 2 діб. Об'єктивно: артеріальний тиск - 65/30 мм рт.ст., пульс - 56/хв. Яку невідкладну допомогу необхідно надати у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Мезатон
- ☐ b. Адреналін
- ☐ c. Преднізолон
- ☐ d. Дофамін
- ☐ e. Норадреналін

Коментар

Правильна відповідь: Преднізолон

Питання 33

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 9 місяців. Госпіталізована з діагнозом ГРВІ. Загальний стан тяжкий, температура тіла - 39,7°C, неспокійна, наявні судороги. Захворювання розпочалося гостро, 3-4 години тому з гострих катаральних явищ. Тони серця ритмічні, ослаблені, пульс - 176/хв. Дихання пуерильне, 64/хв. Живіт м'який. Через 2,5 години після госпіталізації у дитини з'явився щільний на дотик, зірчастого характеру геморагічний висип на сідницях, задній поверхні стегон, гомілках. Дитина втратила свідомість, знаходиться у комі. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Геморагічний васкуліт
- ☐ б. Гострий лейкоз
- ☐ в. Тромбоцитопенічна пурпура
- ☐ г. Менінгококцемія
- ☐ д. Анафілактичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Менінгококцемія

Питання 34

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В приймальне відділення районної лікарні поступив хлопчик 3-х років із різким збільшенням правого колінного суглоба та гематомою 10x12 см м'яких тканин правого стегна після падіння. Із анамнезу відомо, що дитина хворіє на гемофілію А. Яке трансфузійне забезпечення буде оптимальним для надання невідкладної допомоги в даному випадку за умови відсутності препарату VIII фактору?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Цільна кров
- ☐ б. Розчин альбуміну
- ☐ в. Свіжозаморожена плазма

- ☐ d. Кріопреципітат
- ☐ e. Відмиті еритроцити
- Коментар

Правильна відповідь: Кріопреципітат

Питання 35

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До медичного пункту окремої військової частини доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням живота та явними ознаками внутрішньої крово- течі. Загальний стан важкий. Блідість шкіри та слизових оболонок. Пульс - 130/хв., артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Язик сухий. Біль при пальпації живота, симптоми подразнення очеревини позитивні. Притуплення перкуторного звуку в пологих місцях черевної порожнини. В якому положенні необхідно евакуювати пораненого на наступний етап медичної евакуації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. У напівсидячому положенні
- ☐ b. У положенні навпочіпки
- ☐ c. У положенні сидячи
- ☐ d. У положенні лежачи
- ☐ e. У положенні стоячи

Коментар

Правильна відповідь: У положенні лежачи

Питання 36

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 14-ти років з гострим інфекційним ендокардитом під час перебування у лікарні виник інтенсивний біль в поперековій ділянці зліва, слабкість, нудота, здуття живота, кров'яниста сеча. Больовий синдром був з труднощами знятий спазмолітиками та наркотичними анальгетиками. Яка причина гострої гематурії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий пієлонефрит

- ☐ b. Гострий гломерулонефрит
- ☐ c. Ниркова колька
- ☐ d. Інфаркт лівої нирки
- ☐ e. Кровотеча з сечового міхура


Коментар

Правильна відповідь: Інфаркт лівої нирки

Питання 37

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 48-ми років, працівник хімічної лабораторії, доставлений в лікарню зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, головний біль, заплітання язика при розмові, блювання, кашель, дертя в горлі, кровотечу з носа, часте болюче сечовипускання. Об'єктивно: шкіра сіро-синього кольору, судоми м'язів. Кров шоколадно-бура, вміст МtHb у крові - 60%, еритроцити з тільцями Гейнца-Ерліха - 25%. В сечі: протеїнурія, макрогематурія. Ваш попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інтоксикація марганцем
- ☐ b. Інтоксикація аміносполуками бензолу
- ☐ c. Інтоксикація сірковуглецем
- ☐ d. Інтоксикація тетраетилсвинцем
- ☐ e. Інтоксикація ртуттю


Коментар

Правильна відповідь: Інтоксикація аміносполуками бензолу

Питання 38

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик, який страждає на хронічний гломерулонефрит, нефротичну форму, отримує курс преднізолонотерапії. Стан дитини раптово погіршився: з'явився біль в епігастральній ділянці, темне забарвлення випорожнень, Hb- 75 г/л. Яке обстеження слід призначити першочергово? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Реносцинтиграфія

- ☐ b. Рентгенографія нирок
- ☐ c. Езофагогастродуоденоскопія
- ☐ d. Сонографія нирок
- ☐ e. Біохімія крові


Коментар

Правильна відповідь: Езофагогастродуоденоскопія

Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 46-ти років надійшов зі скаргами на сухий кашель, задишку, яка посилюється в положенні лежачи, вкритий холодним потом. Об'єктивно: частота дихання - 30/хв., артеріальний тиск - 180/100 мм рт.ст., Сog - тони глухі, акцент II тону над легеневою артерією, ритм галопу, над легеньми - жорстке дихання, в н/відділах сухі та вологі дрібнопухирцеві хрипи. Який попередній діагноз більш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпертензивний криз
- ☐ b. набряк легень
- ☐ c. Астматичний статус
- ☐ d. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ e. Ішемічна кардіоміопатія


Коментар

Правильна відповідь: набряк легень

Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженого у перші дні життя з'явилася прогресивна дихальна недостатність, задишка, напади ціанозу доходять до задишково-ціанотичного кризу, тахікардія. Органи середостіння зміщені в правий бік, перкуторно зліва тимпаніт, аускультативно дихання відсутнє. На рентгенограмі: посилення прозорості легеневого малюнка зліва. Яка вада розвитку у новонародженого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вроджена лівостороння часткова емфізема легень
- ☐ b. Аплазія легені
- ☐ c. Лівостороння діафрагмова грижа
- ☐ d. Напружена кіста лівоїлегені
- ☐ e. Напружений пневмоторакс


Коментар

Правильна відповідь: Вроджена лівостороння часткова емфізема легень

Питання 41

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

29-річна жінка з терміном вагітності 37-38 тижні доставлена до операційної пологового будинку для проведення родорозрішення шляхом кесаревого розтину. Метод знеболення під час операції: спінальна анестезія. Після народження здорової дитини, у породіллі розвинулись наступні симптоми: різко виникла задишка, SpO2 прогресивно знижується, ціаноз, підвищується центральний венозний тиск, виникає зупинка серця. Результати транsezофагальної кардіоехографії: гостра легенева гіпертензія, порожній лівий шлуночок, надмірно розтягнений правий шлуночок. Яка найбільш імовірна причина такої клінічної ситуації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Емболія навколоплідними водами
- ☐ b. Септичний шок
- ☐ c. Спонтанний пневмоторакс
- ☐ d. Аспірація шлунковим вмістом
- ☐ e. Гострий коронарний синдром


Коментар

Правильна відповідь: Емболія навколоплідними водами

Питання 42

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 21-го року надійшла в ургентному порядку після удару тупим предметом у живіт. Стан важкий, свідомість порушена. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. Пульс 110/хв., слабкого наповнення. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. Якою буде тактика лікування? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Протишокові заходи і термінова лапаротомія
- ☐ б. Переливання крові й оглядова рентгеноскопія черевної порожнини
- ☐ в. Інфузійна терапія і лапароцентез
- ☐ г. Реанімаційні заходи і динамічне спостереження
- ☐ д. КТ черевної порожнини і таза з контрастом


Коментар

Правильна відповідь: Протишокові заходи і термінова лапаротомія

Питання 43

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 58-ми років протягом 30 хвилин відчуває сильний за грудинний біль з іррадіацією в ліву лопатку. Сублінгвальний прийом 3 таблеток нітрогліцерину виявився неефективним. Бригадою швидкої медичної допомоги на ЕКГ виявлено елевацію сегмента ST у відведеннях V1-V6. Що слід призначити хворому для усунення больового синдрому до початку патогенетичного лікування? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гепарин
- ☐ б. Анальгін
- ☐ в. Морфін
- ☐ г. Аспірин
- ☐ д. Варфарин


Коментар

Правильна відповідь: Морфін

Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий упав на вулиці в каналізаційний люк та отримав закритий перелом верхньої третини гомілки. Якій шині слід надати перевагу під час транспортної іммобілізації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Шина Крамера
- ☐ b. Фанерна шина
- ☐ c. Шина Томаса
- ☐ d. Картонна шина
- ☐ e. Шина Дітерікса


Коментар

Правильна відповідь: Шина Крамера

Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 31-го року отримав травму внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Скаржиться на біль у шиї, різке обмеження рухів головою. При огляді: перебуває у вимушеному положенні на спині, м'язи шиї напружені, виступає остистий відросток VI шийного хребця. При натискуванні на нього і голову (навантаження по осі) відзначається посилення болю. Неврологічних порушень немає. Яка перша допомога необхідна потерпілому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Транспортування на щиті у положенні "жабки"
- ☐ b. Введення знеболювальних та транспортування на боку
- ☐ c. Введення знеболювальних та накладання шини Дітерікса
- ☐ d. Знеболення і транспортна іммобілізація комірцем типу Шанца
- ☐ e. Транспортування у напівлежачому положенні


Коментар

Правильна відповідь: Знеболення і транспортна іммобілізація комірцем типу Шанца

Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Першовагітна 22-х років, термін вагітності 8 тижнів, скаржиться на рясні кров'яністі виділення зі статевих шляхів та біль внизу живота переймоподібного характеру. При піхвовому дослідженні: матка збільшена відповідно до 8 тижнів вагітності, шийка матки вкорочена, цервікальний канал вільно пропускає 1 палець і в ньому визначається плодовий міхур та частини плодового яйця; виділення рясні кров'яністі. Яка тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Спостереження за вагітною
- ☐ b. Ультразвукове дослідження
- ☐ c. Призначення препаратів, що пролонгують вагітність
- ☐ d. Вишкрібання порожнини матки
- ☐ e. Кольпоскопія


Коментар

Правильна відповідь: Вишкрібання порожнини матки

Питання 47

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 6-ти років захворіла гостро: підвищилась температура тіла до 38,5°C, з'явилися сухий кашель, кон'юнктивіт, набряк повік. На 2 добу на слизовій оболонці щік в області молярів з'явилися дрібні білуваті плями, що підвищуються над слизовою оболонкою та оточені вузькою червоною облямівкою. На 5-ту добу на шкірі обличчя, шиї, за вухами з'явився висип плямисто-папульозного характеру, що наступної доби поширився на тулуб. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вітряна віспа
- ☐ b. Скарлатина
- ☐ c. Кір
- ☐ d. Аденовірусна інфекція
- ☐ e. Краснуха


Коментар

Правильна відповідь: Кір

Питання 48

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На фармацевтичному підприємстві сталась пожежа. Декілька працівників виявились заблокованими без можливості самостійної евакуації. Засоби індивідуального захисту на випадок пожежі також виявились недоступними. Коли рятувальники евакуювали їх до безпечного місця постраждалі мали наступні симптоми: запаморочення, порушення зору, нудота, часте дихання, задишка, вишневий колір обличчя. Який вид гіпоксії розвивається при таких умовах?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тканинна
- ☐ б. Циркуляторна
- ☐ с. Гіпоксична
- ☐ d. Гемічна
- ☐ е. Токсична


Коментар

Правильна відповідь: Гемічна

Питання 49

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 75-ти років доставлено до приймального відділення лікарні зі скаргами на інтенсивний біль у попереку, відсутність сечі протягом доби. Об'єктивно: артеріальний тиск-170/90 мм рт.ст., притуплення перкуторного звуку у надлобковій ділянці. Металевим катетером виведено 750 мл сечі. Лабораторне дослідження сечі: сліди білку, лейкоцити - 10-12 екз. у полі зору, еритроцити - 3-5 у препараті. Вміст сечовини у крові - 7,8 ммоль/л, креатиніну 0,11 ммоль/л. Назвіть причину відсутності сечі:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра ниркова недостатність
- ☐ б. Сечокам'яна хвороба
- ☐ с. Гострий гломерулонефрит
- ☐ d. Гостра затримка сечі внаслідок обструкції сечовипускника
- ☐ е. Хронічна ниркова недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Гостра затримка сечі внаслідок обструкції сечовипускника

Питання 50

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікар бригади швидкої допомоги надає невідкладну допомогу дівчинці 10-ти років, яку збила машина. У зв'язку з неадекватністю самостійного дихання проведена інтубація трахеї. При проведенні пробних вдихів за допомогою мішка Амбу виявлено, що дихальні шуми зліва проводяться слабше. Що треба зробити щоб виправити ситуацію?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Переінтубувати трахею
- ☐ б. Підтягнути інтубаційну трубку вгору
- ☐ в. Просунути інтубаційну трубку вниз
- ☐ г. Підвищити тиск в дихальних шляхах
- ☐ д. Підвищити об'єм дихання


Коментар

Правильна відповідь: Підтягнути інтубаційну трубку вгору

Питання 51

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 46-ти років доставлений в приймальне відділення після автоаварії в тяжкому стані. При огляді міжреберні проміжки згладжені, ліва половина грудної клітки відстає при диханні. Над лівим легенеvim полем тимпаніт, аускультативно: дихання зліва не проводиться. Частота дихання - 32/хв. Інші пошкодження відсутні. Яку найпершу маніпуляцію необхідно виконати в екстреному порядку після рентгенологічного дослідження?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Пункція плевральної порожнини
- ☐ б. Дренування плевральної порожнини
- ☐ в. Оклюзійна пов'язка
- ☐ г. Торакотомія
- ☐ д. Лаваж плевральної порожнини


Коментар

Правильна відповідь: Пункція плевральної порожнини

Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

32-х річна вагітна жінка з терміном гестації 36-37 тижні була знайдена без свідомості у власній квартирі її чоловіком. На момент прибуття до відділення інтенсивної терапії, вона мала 3 бали за шкалою ком Глазго та розширені зіниці, що не реагують на світло. Дихання та серцебиття відсутні. негайно виконано інтубацію трахеї та розпочато реанімаційні заходи. Для більшої ефективності непрямого масажу серця, покращення венозного повернення та зменшення аорто-кавальної компресії лікар попросив асистента виконати певну маніпуляцію. Що зробив асистент?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Виконав підкладання валика під лівий бік
- ☐ б. Ввів міорелаксанти довенно
- ☐ в. Перевів пацієнтку у положення Тренделенбурга
- ☐ г. Виконав ручне зміщення вагітної матки вліво
- ☐ д. Виконав ручні компресії дна вагітної матки


Коментар

Правильна відповідь: Виконав ручне зміщення вагітної матки вліво

Питання 53

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 20-ти років, який надійшов до інфекційного відділення на 3-й день захворювання, діагностовано дифтерію ротоглотки. На 5-й день стан погіршився: температура досягла 39,7оС, підсилювся біль у горлі, поширився плівчастий наліт, покаржився на прогресуючу слабкість, біль у епігастрії, повторне блювання. Блідий. Ціаноз губ. Частота дихання - 28/хв. Межі серця розширені. Ритм галопу. Артеріальний тиск - 70/50 мм рт.ст. Чим обумовлена тяжкість стану хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Медіастиніт
- ☐ б. Гостра дихальна недостатність
- ☐ в. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ г. Кардіогенний шок
- ☐ д. Токсичний міокардит

Коментар

Правильна відповідь: Токсичний міокардит

Питання 54

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пораненому, який надійшов до медичної роти бригади встановлено попередній діагноз: кульове поранення черевної порожнини, стан середнього ступеня тяжкості та рекомендована евакуація на наступний етап. Який документ у цьому випадку необхідно заповнити на пораненого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Медичну книжку
- ☐ b. Історію хвороби
- ☐ c. Первинну медичну карту
- ☐ d. Сортувальну марку
- ☐ e. Евакуаційний конверт

Коментар

Правильна відповідь: Первинну медичну карту

Питання 55

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Які трансфузійні середовища виявляють оптимальний гемостатичний ефект при гіпокоагуляційній кровотечі у потерпілих в аваріях і катастрофах?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Нативна плазма
- ☐ b. Кріопреципітат
- ☐ c. Еритроцитарна маса
- ☐ d. Фібриноген
- ☐ e. Свіжозаморожена плазма

Коментар

Правильна відповідь: Свіжозаморожена плазма

Питання 56

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 34-х років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, відсутність апетиту. Захворів гостро 2 дні тому на тлі лікування туберкульозу легень. Об'єктивно: на питання відповідає з затримкою, визначається тремор рук, жовтяниця, гепатомегалія. В крові: загальний білірубін - 170 мкмоль/л, непрямий - 90 мкмоль/л, АЛТ- 3,4 ммоль/г л. Який препарат НЕ СЛІД призначати хворому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Преднізолон
- ☐ b. L-орнітину-L-аспартат
- ☐ c. Лактулоза
- ☐ d. Ізоніазид
- ☐ e. Глутамінова кислота

Коментар

Правильна відповідь: Ізоніазид

Питання 57

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До терапевтичного відділення надійшов чоловік 27-ми років зі скаргами на задуху, "туман" перед очима, головний біль, нудоту, які з'явилися після отруєння фосфорорганічними сполуками. Об'єктивно: хворий емоційно лабільний, зіниці різко звужені, гіперемія кон'юнктиви. Який лікувальний засіб рекомендовано для введення потерпілому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Оксигенотерапія
- ☐ b. Антибіотики
- ☐ c. Поліглюкін
- ☐ d. Атропіну сульфат
- ☐ e. Активоване вугілля

Коментар

Правильна відповідь: Атропіну сульфат

Питання 58

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 38-ми років через 8 днів після поранення ступні з'явилися тягучий біль, тонічне напруження й судомні скорочення жувальних м'язів та кінцівок, печіння в ділянці рани. На 4-й день відзначено напруження м'язів кінцівок. На 9-й день хвороби на тлі підвищеного тону м'язів з'явилися загальні клоніко-тонічні судоми, тривалістю від кількох секунд до хвилини. Пульс напружений, 110/хв., артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., тони серця глухі. Обстеження на яку хворобу треба провести?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Туляремія
- ☐ b. Бешиха
- ☐ c. Правець
- ☐ d. Сказ
- ☐ e. Бактеріальний менінгіт

Коментар

Правильна відповідь: Правець

Питання 59

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчика 7-ми років доставлено з політравмою в стаціонар з місця дорожньо-транспортної пригоди. Свідомість відсутня, шкіра бліда, множинні гематоми. Пульс ниткоподібний, 130/хв., частота дихання - 42/хв., артеріальний тиск - 60/20 мм рт.ст., макрогематурія. Які лабораторні обстеження необхідно призначити для уточнення причини геморагічного синдрому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Вміст тромбоцитів, еритроцитів в периферичній крові, гемоглобіну, ліпідограма, протеїнограма
- ☐ b. Вміст еритроцитів в периферичній крові, гемоглобіну, активність лужної фосфатази гранулоцитів, аналіз сечі клінічний
- ☐ c. Вміст білірубину, трансаміназ крові, гемоглобіну, фібриногену, АТ III
- ☐ d. Вміст тромбоцитів в периферичній крові, продуктів деградації фібриногену/фібрину, АТ III, тромбіновий час, концентрація фібриногену
- ☐ e. Вміст карбоксигемоглобіну, креатиніну крові, продуктів деградації фібриногену/фібрину

Коментар

Правильна відповідь: Вміст тромбоцитів в периферичній крові, продуктів деградації фібриногену/фібрину, АТ III, тромбіновий час, концентрація фібриногену

Питання 60

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 42-х років упродовж 8-ми років непокоїть поступово наростаючий біль в суглобах кистей та в поперековому відділі хребта з порушенням в ньому рухів. Спостерігаються ригідність м'язів та їх атрофія. Лікувався з приводу остеохондрозу, ревматоїдного артриту з короточасним ефектом. Спостерігався у офтальмолога з приводу іридоцикліту. Яке дослідження в умовах ЦРЛ дозволить встановити діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ультразвукове дослідження суглобів
- ☐ b. Рентгенологічне дослідження суглобів, хребта
- ☐ c. Радіонуклідне дослідження
- ☐ d. Термографія відділів хребта
- ☐ e. МРТ-дослідження хребта

Коментар

Правильна відповідь: Рентгенологічне дослідження суглобів, хребта

Питання 61

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 32-х років тривожний, напружений, періодично до чогось прислухається, придивляється. Інструкції персоналу не виконує, збуджений. Зі слів родичів, зловживає спиртними напоями протягом 10-ти років. Захворів на 3-й день після останнього прийому алкоголю. Який вид порушення свідомості у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Істеричний делірій
- ☐ b. Алкогольний делірій
- ☐ c. Шизофренічний делірій
- ☐ d. Органічний делірій
- ☐ e. Епілептичний делірій


Коментар

Правильна відповідь: Алкогольний делірій

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Ліквідатор, який отримав радіаційне опромінення сумарною дозою 8 Гр., скаржиться на слабкість, часті носові кровотечі, появу синців на тілі, серцебиття, задишку. В крові: еритроцити - $1,2 \cdot 10^{12}/л$, Hb-54 г/л, лейкоцити - $1,7 \cdot 10^9/л$, е.- 0%, п.- 0%, с.- 32%, л.- 62%, м.- 6%; ШОЕ- 52 мм/год; тромбоцити - $30 \cdot 10^9/л$. В стернальному пункті - тотальне спустошення кісткового мозку. Яке лікування найбільш доцільне в даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Переливання еритроцитарної маси
- ☐ б. Пересадка кісткового мозку
- ☐ с. Переливання тромбоцитарної маси
- ☐ д. Антілімфоцитарний імуноглобулін
- ☐ е. Переливання цільної крові


Коментар

Правильна відповідь: Пересадка кісткового мозку

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 65-ти років, який страждає на цукровий діабет II типу, перебуває у непритомному стані. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки сухі, тургор шкіри знижений, очні яблука м'які, запалі, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст., пульс - частий, ниткоподібний. Дихання - часте, поверхневе. Температура тіла підвищена. Визначаються патологічні сухожильні рефлекси. Глюкоза плазми крові - 45 ммоль/л, концентрація натрію в плазмі - 160 ммоль/л. Сечовиділення порушене - олігоурія. Ваш попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Мозкова кома
- ☐ б. Кетоацидотична кома
- ☐ с. Гіперосмолярна кома

- ☐ d. Лактацидемична кома
- ☐ e. Уремична кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 49-ти років під час тривалої роботи на присадибній ділянці втратив свідомість. Зі слів родичів хворіє на цукровий діабет близько 2-х років, отримує глібенкламід 20 мг на добу. Об'єктивно: шкіра волога, тонус м'язів кінцівок підвищений. Пульс - 98/хв., ритмічний. Артеріальний тиск-90/60 мм рт.ст. Дихання- 20/хв., ритмічне. Вогнищевої симптоматики не виявлено. Яке ускладнення розвинулось у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Лактацидоз
- ☐ b. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ c. Синкопе
- ☐ d. Кетоацидоз
- ☐ e. Гіпоглікемія


Коментар

Правильна відповідь: Гіпоглікемія

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Зафіксовано клінічну смерть. Яка послідовність реанімаційних заходів?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Заходи реанімації за послідовністю А-В- С
- ☐ b. Покликати спеціаліста з реанімації та почати штучне дихання
- ☐ c. Заходи реанімації за послідовністю С-А-В

- ☐ d. Заходи реанімації за послідовністю В-А- С
- ☐ e. Заходи реанімації за послідовністю А-В-С та дефібриляція
- Коментар

Правильна відповідь: Заходи реанімації за послідовністю С-А-В

Питання 66

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 2-х років захворіла гостро, коли вдень піднялася температура до 38оС, з'явилися катаральні явища. Ввечері температура тіла підвищилася до 39,8оС, дитина стала кволою, раптово почалися клоніко- тонічні судоми. Годину тому батьки давали дитині парацетамол, однак температура тіла не знизилася. Ваші наступні дії:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Фізичні методи охолодження
- ☐ b. Прийом ацетилсаліциловоїкислоти
- ☐ c. Повторний прийом парацетамолу
- ☐ d. Введення діазепаму
- ☐ e. Прийом німесулідіу

Коментар

Правильна відповідь: Введення діазепаму

Питання 67

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчина 15-ти років, скарги на кров'янисті виділення із статевих шляхів протягом 10-ти днів після 3 місячної затримки, загальну слабкість. З анамнезу: менструації з 14-ти років, встановились через 6 місяців, помірні, болісні, статевим життям не живе. Астенічної тілобудови. Із статевих шляхів значні кров'янисті виділення. При ректальному дослідженні патології не виявлено. Який діагноз найбільш ймовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гормонопродукуюча пухлина яєчника
- ☐ b. Аномальна маткова кровотеча

- ☐ c. Поліпоз ендометрія
- ☐ d. Гемофілія
- ☐ e. Рак ендометрія


Коментар

Правильна відповідь: Аномальна маткова кровотеча

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час проведення профілактичних заходів на одному з блоків АЕС один із співробітників з необережності порушив техніку безпеки, внаслідок чого він 35 хвилин перебував у зоні радіоактивного опромінення. Показники індивідуального дозиметра- 1,0 Гр. Скарг не пред'являє. Шкірні покриви та видимі слизові оболонки зберігають свій звичайний колір. Пульс - 84/хв., артеріальний тиск - 138/82 мм рт.ст. Живіт при пальпації м'який, неболючий. Яких лікувально-профілактичних заходів слід вжити стосовно цього співробітника?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Призначити антибактеріальну терапію
- ☐ b. Профілактичного лікування не потребує
- ☐ c. Призначити препарати йоду
- ☐ d. Призначити унітіол
- ☐ e. Призначити цистамін


Коментар

Правильна відповідь: Призначити цистамін

Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 30-ти років. До хвороби була замкнена, образлива, тривожна. Три місяці тому з'явилася туга, важкість у грудях. Через два тижні цей стан змінився підвищеним настроєм з екзальтацією. Два місяці тому стала помічати спостереження за нею на вулиці. Через місяць стала відчувати, що її думки читають та їй вкладають чужі думки в голову. Три тижні тому з'явилася загальмованість, застигала в одній позі. Підсилилася діяльність уяви, в мареннях бачила "удар астероїда в земну кулю". Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Параноїдна шизофренія
- ☐ b. Біполярний афективний розлад
- ☐ c. Шизоафективний розлад
- ☐ d. Кататонічна шизофренія
- ☐ e. Недиференційована шизофренія


Коментар

Правильна відповідь: Шизоафективний розлад

Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 25-ти років захворіла гостро. Підвищилася температура тіла до 40,0оС, з'явилися різкий головний біль, багаторазове блювання. Об'єктивно: стан важкий, позитивні менінгеальні симптоми. Яке дослідження слід призначити у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Комп'ютерна томографія головного мозку
- ☐ b. Люмбальна пункція та дослідження ліквору
- ☐ c. Доплерографія судин головного мозку
- ☐ d. Загальне дослідження крові
- ☐ e. Енцефалографія


Коментар

Правильна відповідь: Люмбальна пункція та дослідження ліквору

Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 25-ти років через 40 хвилин після прийому оксациліну з'явились захриплість голосу, "гавкаючий" кашель, утрудненість дихання із задишкою інспіраторного характеру, задуха. Об'єктивно: хвора неспокійна, метушлива. Дихання шумне, стридорозне. Обличчя ціанотичне. Аускультативно: розсіяні сухі свистячі хрипи. Ваш діагноз:
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Стороннєтіло трахеї
- ☐ b. Гострий набряк Квінке
- ☐ c. Приступ бронхіальної астми
- ☐ d. Паратонзиллярний абсцес
- ☐ e. Гострий фарингіт


Коментар

Правильна відповідь: Гострий набряк Квінке

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 64-х років, що перебуває у стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. При огляді діагностовані зупинка серцевої діяльності та дихання, розпочато серцево-легеневу реанімацію. На ЕКГ шлуночкова тахікардія. Який захід є необхідним далі? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести внутрішньовенно магнію сульфат
- ☐ b. Дефібриляція
- ☐ c. Ввести внутрішньовенно кальцію хлорид
- ☐ d. Ввести внутрішньосерцево атропін
- ☐ e. Ввести внутрішньосерцево адреналін


Коментар

Правильна відповідь: Дефібриляція

Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після повернення із зони АТО військовослужбовець звернувся до лікаря зі скаргами на постійне безсоння, відчуття немотивованої пильності, епізоди "напливу жахливих спогадів", "відчуття провини за те, що вижив". Зазначені порушення є:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Великим депресивним розладом

- ☐ b. Нейроциркуляторною астенією
- ☐ c. Бойовою психічною травмою
- ☐ d. Неврозом нав'язливих станів
- ☐ e. Біполярним розладом


Коментар

Правильна відповідь: Бойовою психічною травмою

Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 9-ти років впродовж останнього року спостерігаються повторні епізоди гострого пульсуючого одностороннього головного болю в асоціації з нудотою, блюванням та болем у животі. Головний біль виникає після вживання шоколаду, сиру, горіхів та йому передують візуальні розлади та м'язова слабкість. Звичайно сон полегшує головний біль. Поза приступами дитина здорова. У матері в дитинстві були подібні напади. Ваш попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Харчова алергія
- ☐ b. Мігрень
- ☐ c. Епілепсія
- ☐ d. Пухлина мозку
- ☐ e. Головний біль напруги


Коментар

Правильна відповідь: Мігрень

Питання 75

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 28-ми років, оператор системи енергозабезпечення, під час аварії на АЕС був на своєму робочому місці. В результаті вибуху в повітря було викинуто близько 30 кг радіоактивного йоду. Який з радіопротекторів доцільно використовувати у даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Йодид калію

- ☐ b. Тіосечовину
- ☐ c. Лейцин
- ☐ d. Валін
- ☐ e. Цистамін


Коментар

Правильна відповідь: Йодид калію

Питання 76

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 48-ми років відчула біль в литкових м'язах. Спостерігається незначний набряк в ділянці щиколоток, гіперемія шкіри. Позитивний симптом Хоманса. Запідозрено тромбоз глибоких вен гомілки. Які діа методи потрібно застосувати для підтвердження діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Визначити надлишковий вміст фібрину-мономеру; продуктів деградації фібрину та фібриногену в плазмі
- ☐ b. Дослідити коагулограму або орієнтуватися на показники тромбоеластограми
- ☐ c. Дуплексне ультразвукове сканування венозних судин кінцівок
- ☐ d. Радіонуклідне дослідження міченим фібриногеном
- ☐ e. Провести венографію


Коментар

Правильна відповідь: Дуплексне ультразвукове сканування венозних судин кінцівок

Питання 77

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 58-ми років, що переніс Q-інфаркт міокарда, з'явилися напади серцебиття, що супроводжуються задишкою, болем за грудниною, загальною слабкістю. Об'єктивно: акроціаноз, пульс - 160/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 105/65 мм рт.ст., тони серця ослаблені. На ЕКГ: зубці Р відсутні, QRS - деформовані, розширені 0,14 с, зубці Т направлені в протилежну сторону від QRS. Яке порушення ритму розвинулося в хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія
- ☐ b. Пароксизмальна форма фібриляції передсердь
- ☐ c. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія
- ☐ d. Синусова тахікардія
- ☐ e. Фібриляція шлуночків


Коментар

Правильна відповідь: Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У повторновагітної 28-ми років, з прееклампсією середнього ступеня важкості, при вагітності 32 тижні, з'явилась жовтяниця та ознаки загальної інтоксикації. Лабораторно: гіпокоагуляція - тромбоцити - 80 109/л, ПДФ+++ , загальний білірубін - 90 ммоль/л (прямий - 25 ммоль/л, непрямий 65 ммоль/л), АлАТ- 3,5 ммоль/л кг год, АсАТ- 2,6 ммоль/л кг год. Яке ускладнення виникло у вагітної?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Синдром Жильбера
- ☐ b. Синдром Бадда-Кіарі
- ☐ c. Гостра жирова дистрофія печінки
- ☐ d. HELLP-синдром
- ☐ e. Вірусний гепатит


Коментар

Правильна відповідь: HELLP-синдром

Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 16-ти років скаржиться на біль у правій здухвинній ділянці з іррадіацією в калитку, збільшення її розмірів. Температура - 37,8оС. Три дні тому, граючи у футбол, хлопчик отримав удар в пах м'ячем. Об'єктивно: шкіра бліда. При пальпації живота змін не виявлено. При огляді

калитки спостерігається незначна гіперемія шкіри. При пальпації придатка відзначається його потовщення та болючість. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кіста придатка
- ☐ b. Перекрут яєчка
- ☐ c. Гостре гідроцеле
- ☐ d. Гострий епідидимоорхіт справа
- ☐ e. Гострий інфекційний орхіт


Коментар

Правильна відповідь: Гострий епідидимоорхіт справа

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки, яка хворіє на дифузну форму токсичного зоба, після психоемоційного стресу погіршився стан. З'явилися скарги на сильний головний біль, серцебиття. Об'єктивно: психічне та моторне збудження, профузний піт, шкірні покриви гіперемовані, фебрильна температура, частота серцевих скорочень - 150/хв., артеріальний тиск - 150/50 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулося у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тиреотоксичний криз
- ☐ b. Гострий гіперпаратиреоз
- ☐ c. Адреналовий криз
- ☐ d. Пароксизм миготливої тахіаритмії
- ☐ e. Мікседематозна кома


Коментар

Правильна відповідь: Тиреотоксичний криз

Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 30-ти років. Після приїзду з Туреччини захворів гостро. Надійшов зі скаргами на профузний пронос у вигляді рисового відвару. Шкіра суха, тургор знижений, $t_{\text{о}} - 36,4^{\circ}\text{C}$, артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. За добу втратив 3 кг ваги. Діурез знижений. Діагноз - холера. Яка екстрена допомога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести великі дози антибіотиків
- ☐ b. Інфузійна терапія кристалоїдними розчинами
- ☐ c. Провести пероральну регідrataцію
- ☐ d. Ввести препарати, які викликають закрепи
- ☐ e. Зробити сифонну клізму


Коментар

Правильна відповідь: Інфузійна терапія кристалоїдними розчинами

Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років страждає на хронічну надниркову недостатність внаслідок туберкульозу наднирників. Під час відпочинку після тривалого перебування на сонці у нього посилилася загальна слабкість, тахікардія досягла 150/хв., артеріальний тиск знизився до 70/20 мм рт.ст., з'явилися олігурія, адинамія, нудота, блювання, біль у животі, депресія. Який діагноз найбільш імовірний у даного хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостра печінкова недостатність
- ☐ b. Сонячний удар
- ☐ c. Гостра ниркова недостатність
- ☐ d. Гостра серцева недостатність
- ☐ e. Гостра надниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гостра надниркова недостатність

Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 25-ти років, вагітність 32 тижні. Надійшла в коматозному стані із запахом ацетону. В анамнезі цукровий діабет впродовж 8-ми років. Серцебиття плода 160/хв., пологової діяльності немає. Артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст., пульс - 72/хв. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпоглікемічна кома
- ☐ b. Прееклампсія
- ☐ c. Сепсис
- ☐ d. Екламптична кома
- ☐ e. Гіперглікемічна кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіперглікемічна кома

Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпіла 28-ми років впала на вулиці з опорою на руку. При огляді виявляється деформація на рівні середньої третини передпліччя, біль при навантаженні уздовж вісі та пальпації, патологічна рухомість. Розладів магістрального кровообігу не виявлено, але скаржиться на парестезію у ділянці кисті. Яке положення передпліччя при транспортній іммобілізації є оптимальним? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Супінація 45 градусів від максимальної
- ☐ b. Пронація 45 градусів від максимальної
- ☐ c. Середнє між пронацією та супінацією
- ☐ d. Максимальна супінація
- ☐ e. Максимальна пронація


Коментар

Правильна відповідь: Середнє між пронацією та супінацією

Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 8-ми років захворювання мало поступовий початок з підвищення температури до 37,5-38оС, нежитю, сухого "гавкаючого" кашлю, осиплості голосу. На третю добу хвороби стан дитини погіршився, з'явилося шумне дихання з втягінням міжреберних проміжків. Яке захворювання з числа ГРВІ найбільш імовірно має місце у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Грип
- ☐ b. Парагрип
- ☐ c. РС-інфекція
- ☐ d. Риновірусна інфекція
- ☐ e. Аденовірусна інфекція


Коментар

Правильна відповідь: Парагрип

Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого після проведеного оперативного втручання раптово розвинулися тетанічні судоми дистальних відділів кінцівок ("рука акушера"), спостерігаються явища бронхоспазму. Яка невідкладна терапія необхідна?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення розчину сульфату магнію
- ☐ b. Введення розчину фуросеміду
- ☐ c. Введення сибазону
- ☐ d. Введення розчину кальцію хлориду
- ☐ e. Введення розчину калію хлориду


Коментар

Правильна відповідь: Введення розчину кальцію хлориду

Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікарю швидкої допомоги треба надати допомогу молодому чоловікові, який із метою суїциду прийняв 25 таблеток атропіну. Об'єктивно: збуджений, періодично маячня, шкіра червона, гаряча, суха, пульс частий, задишка, зіниці розширені. З чого треба розпочати лікування?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення в шлунок розчину сульфату натрію та активованого вугілля
- ☐ b. Анальгін в/в
- ☐ c. Аміназин в/в
- ☐ d. Прозерин п/ш
- ☐ e. Зондове промивання шлунка


Коментар

Правильна відповідь: Зондове промивання шлунка

Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець 30-ти років одержав одноразову дозу випромінювання 15 Гр. на радіоактивно забрудненій території. З'явилися скарги на стискаючий головний біль, підвищення температури тіла, нудота, дворазове блювання. Клініка якої форми гострої променевої хвороби розвивається у цієї людини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кістково-мозкової, дуже тяжкого ступеня
- ☐ b. Токсемічної
- ☐ c. Кишкової
- ☐ d. Кістково-мозкової, середнього ступеня тяжкості
- ☐ e. Церебральної


Коментар

Правильна відповідь: Кишкової

Питання 89

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини з гострою нирковою недостатністю при біохімічному моніторингу визначено: фібриноген - 4,5 г/л, натрій плазми - 145 мМ/л, креатинін плазми - 380 мкМ/л. В сечі: білок - 0,67 г/л, лейкоцити - 3-5 в п/з, еритроцити - 6-8 в п/з. Який показник з наведених є найбільш інформативним для визначення ступеня гострого ураження нирок?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Креатинін плазми
- ☐ b. Протеїнурія
- ☐ c. Натрій плазми крові
- ☐ d. Формені елементи крові в осаді сечі
- ☐ e. Фібриноген плазми крові


Коментар

Правильна відповідь: Креатинін плазми

Питання 90

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

68-річний пацієнт знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу важкої позагоспітальної пневмонії з ХОЗЛ в анамнезі у відділенні інтенсивної терапії. Самостійне дихання неефективне, у зв'язку з чим проводиться постійна респіраторна підтримка апаратом штучної вентиляції легень. У хворого раптово виникла зупинка кровообігу. Черговим персоналом розпочато реанімаційні заходи. Однак через ригідність грудної клітки достатньої глибини компресій досягти не вдається і небезпека переламу ребер. Яка має бути тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Збільшити силу натискань для досягнення необхідної глибини
- ☐ b. Використовувати лише медикаментозні способи стимуляції серцевої діяльності
- ☐ c. Змінити місце компресій на більш піддатливу ділянку
- ☐ d. Використовувати лише електричну дефібриляцію
- ☐ e. Силу натискань не змінювати, але збільшити частоту


Коментар

Правильна відповідь: Збільшити силу натискань для досягнення необхідної глибини

Питання 91

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина від III вагітності, через 12 годин після народження загальний стан погіршився, з'явилося іктеричне забарвлення шкірних покривів та склер. Печінка +3,5 см, селезінка +3 см. В крові: Hb- 96 г/л, загальний білірубін - 96 мкмоль/л, прямий - 17 мкмоль/л, непрямий - 79 мкмоль/л. Через 4 години вміст загального білірубіну - 132 мкмоль/л, прямого - 24 мкмоль/л, непрямого - 108 мкмоль/л. Які Ваші подальші дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Призначення глюкокортикоїдів
- ☐ б. Дезінтоксикаційна терапія
- ☐ с. Призначення ентеросорбентів
- ☐ d. Замінне переливання крові
- ☐ е. Противірусні препарати


Коментар

Правильна відповідь: Замінне переливання крові

Питання 92

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Юнак надійшов до стаціонару на 7- й день хвороби, що розпочалася гостро з остуди, підвищення температури тіла до 39,5оС, болю у м'язах, головного болю. Тиждень тому повернувся з Південної Америки. Свідомість на рівні сопору, шкіра та склери жовтяничні. На тулубі та кінцівках рясний геморагічний висип. Температура тіла - 38,8оС. Пульс - 110/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Гепатоспленомегалія. Олігурія. В крові: протромбіновий індекс - 45%, сечовина - 24,8 ммоль/л. Діагностовано жовту гарячку. Чим зумовлена тяжкість стану хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інфекційно-токсичним шоком
- ☐ б. Гострою печінковою і нирковою недостатністю
- ☐ с. Гострою затримкою сечі
- ☐ d. Гіповолемічним шоком
- ☐ е. Гострою асфіксією

Коментар

Правильна відповідь: Гострою печінковою і нирковою недостатністю

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Рядовий 20-ти років поранений осколком міни в шию. На передній поверхні шиї кровоточива рана 1х1 см, з виділенням бульбашок повітря, підшкірна емфізема. Дихання утруднене. Кашель. Пульс - 100/хв. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Які невідкладні дії треба застосувати для припинення розвитку асфіксії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Трахеостомія через рану
- ☐ б. Призначення протикашльових препаратів
- ☐ в. Киснева терапія
- ☐ г. Введення дихальних аналептиків
- ☐ д. Штучна вентиляція легенів методом "рот в рот"


Коментар

Правильна відповідь: Трахеостомія через рану

Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 54-х років, перебуваючи на стаціонарному лікуванні в онкодиспансері з приводу раку тіла матки, раптово відчула виражену задишку, біль в грудній клітці, відзначає кровохаркання.

Об'єктивно: загальний стан важкий, шкірні покриви ціанотичні, чисті. Над легеньми жорстке дихання. Частота дихання - 45/хв. Пульс 115/хв., задовільних властивостей. Нормальний рівень якого біохімічного маркера з великою ймовірністю допомагає ви- ключити діагноз ТЕЛА:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. МВ-димер
- ☐ б. D-димер
- ☐ в. Тромбопластин
- ☐ г. С-, S-протеїни
- ☐ д. Тропоніни


Коментар

Правильна відповідь: D-димер

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина народилася від матері з групою крові АВ (IV) Rh (-), в дитини група крові А (II), Rh (+), рівень білірубіну пуповинної крові - 94,6 ммоль/л, діагностовано гемолітичну хворобу новонародженого, показане замінне переливання крові. Які трансфузати необхідно взяти для замінного переливання крові?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кров А (II) Rh (+)
- ☐ b. Кров А (II) Rh (-)
- ☐ c. Еритромасу О (I) Rh (-), плазму АВ (IV)
- ☐ d. Еритромасу А (II) Rh (+), плазму АВ (IV)
- ☐ e. Кров АВ (IV) Rh (-)


Коментар

Правильна відповідь: Еритромасу О (I) Rh (-), плазму АВ (IV)

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У недоношеної новонародженої дитини протягом перших 6 годин після народження з'явилися почастішання дихання до 60/хв., асинхронність руху грудної клітки і черевної стінки, роздування крил носа, втягнення міжреберних проміжків та груднини, участь допоміжних м'язів в акті дихання. Яке діагностичне дослідження треба провести?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рентгенографію черевної порожнини
- ☐ b. Рентгенографію грудної клітки
- ☐ c. Рентгенографію черепа
- ☐ d. Діафаноскопію черепа
- ☐ e. Ультразвукове дослідження мозку


Коментар

Правильна відповідь: Рентгенографію грудної клітки

Питання 97

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 25 із 80 відпочивальників у санаторії протягом доби виникло гостре кишкове захворювання, нез'ясованої етіології. Па- цієнти харчувалися у різні зміни, страви обирали згідно з меню. Водопостачання у санаторії централізоване. Який шлях пере- дачі найбільш імовірний при даному спала- ху?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ґрунтовий
- ☐ b. Водний
- ☐ c. Артифіціальний
- ☐ d. Харчовий
- ☐ e. Контактно-побутовий


Коментар

Правильна відповідь: Харчовий

Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В квартирі з несправним пічним опаленням сусідами була знайдена непритомна самотня людина похилого віку. При огляді: шкірні покриви яскраво-червоного кольору, свідомість відсутня, судоми, гіпертермія до 38оС, інспіраторна задишка, тахікардія, артеріальний тиск - 170/80 мм рт.ст. Який стан найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Отруєння чадним газом
- ☐ b. Гостра серцева недостатність
- ☐ c. Геморагічний інсульт
- ☐ d. Епілептичний напад
- ☐ e. Тепловий удар


Коментар

Правильна відповідь: Отруєння чадним газом

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 15-ти років доставлений зі скаргами на головний біль, запаморочення, блювання, а також появу множинних синців на шкірі, асиметрію очних щілин, згладженість лівої носової складки, девіацію язика вправо. Спостерігається позитивний симптом Керніга зліва. В аналізі крові на cito: тромбоцити - 55, 5 10⁹/л. Яке ускладнення тромбоцитопенічної пурпури має місце?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Геморагічний шок
- ☐ b. Мікроангіотромбоз
- ☐ c. Тромбоемболія
- ☐ d. Геморагічний інсульт
- ☐ e. Ішемічний інсульт


Коментар

Правильна відповідь: Геморагічний інсульт

Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Першовагітна жінка з терміном гестації 34 тижні надійшла у пологовий стаціонар зі скаргами на блювання, носову кровотечу, слабкість. Шкірні покриви та склери жовтушні, температура тіла підвищена до 37,4оС, артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., білірубін - 70,4 мкмоль/л; лейкоцитів 14 10⁹/л, тромбоцитів - 95 10⁹/л; АЛТ і АСТ підвищені у 6 разів, фібриноген не визначається, рівень факторів згортання знижений, білка в сечі немає. Яку терапію необхідно обрати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Спостереження, терапія гепатопротекторами
- ☐ b. Магнію сульфат, ліжковий режим
- ☐ c. Розродження з інфузією свіжозамороженої плазми
- ☐ d. Лапароскопічна холецистектомія
- ☐ e. Призначення ацикловіру

Коментар

Правильна відповідь: Розродження з інфузією свіжозамороженої плазми

Питання 101

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення надійшов хлопчик 7-ми років зі скаргами на утруднення дихання, біль в животі, нудоту, почервоніння шкіри верхніх кінцівок і живота, слабкість, температура тіла - 35,8°C. Артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. Дві години тому дитина бавилася у морі, ловила медуз. Чим найбільш імовірно обумовлений стан дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострим інфекційним захворюванням
- ☐ б. Сонячним ударом
- ☐ в. Переохолодженням
- ☐ г. Анафілактичною реакцією
- ☐ д. Отруєнням

Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичною реакцією

Питання 102

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Новонароджена дівчинка масою 3500 г, довжиною 52 см від першої вагітності, що перебігала на тлі анемії II ступеня важкості, народилася із серцебиттям 140/хв., закричала одразу, крик голосний, рефлекс живі, м'язовий тонус дещо знижений, є акроціаноз. Яка оцінка новонародженої за шкалою Апгар?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 9-10 балів
- ☐ б. 5-6 балів
- ☐ в. 3-4 балів
- ☐ г. 1-2 балів
- ☐ д. 7-8 балів

Коментар

Правильна відповідь: 7-8 балів

Питання 103

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 37-ми років на вулиці раптово втратила свідомість. Розвинулися судоми, відбулося неконтрольоване сечовиділення. Об'єктивно: хвора без ознак свідомості, позитивні менінгеальні симптоми, спонтанна рухова активність лівих кінцівок. В яке відділення слід госпіталізувати хвору? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Неврологічне
- ☐ b. Кардіологічне
- ☐ c. Інфекційне
- ☐ d. Ендокринологічне
- ☐ e. Нейрохірургічне

Коментар

Правильна відповідь: Неврологічне

Питання 104

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 1,5 років із септичним шоком виникла кровотеча з місць ін'єкцій, по шлунковому зонду надходить "кавова гуща". При визначенні показників гемостазу збільшено МНВ, АЧТЧ, рівень D-димеру, знижений фібриноген, тромбоцити 30 109/л. Яку патологію запідозрив лікар-куратор? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура
- ☐ b. Тромботична тромбоцитопенічна пурпура
- ☐ c. Дефіцит вітаміну К
- ☐ d. Хвороба Віллебранда
- ☐ e. Синдром ДВЗ

Коментар

Правильна відповідь: Синдром ДВЗ

Питання 105

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 68-ми років виникла зупинка серця. Після інтубації і зовнішнього масажу серця у хворого з'явився пульс, артеріальний тиск - 40/0 мм рт.ст. Яке лікування буде оптимальним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інфузія допаміну
- ☐ b. Інфузія сольових розчинів
- ☐ c. Серцеві глікозиди
- ☐ d. Призначення альбуміну
- ☐ e. Призначення еуфіліну


Коментар

Правильна відповідь: Інфузія допаміну

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

28-ми річну жінку з терміном вагітності 23-24 тижні було доставлено у відділення інтенсивної терапії пологового будинку. Пацієнтка в стані геморагічного шоку через вагінальну кровотечу, зумовлену передчасним відшаруванням плаценти. Анамнез зібрати не вдається через важкість стану. Зі слів родичів вагітність перша, до цього моменту протікала без особливостей. Однак вагітна страждає на артеріальну гіпертензію II ст. Об'єктивно: свідомість відсутня, пульс ниткоподібний, артеріальний тиск виміряти не вдається. Через 2 хвилини після поступлення на кардіомоніторі зафіксовано фібриляцію шлуночків. Негайно розпочато компресії грудної клітки. Подальші першочергові дії лікаря:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення адреналіну, дефібриляція протипоказана
- ☐ b. Проведення електричної дефібриляції
- ☐ c. Введення окситоцину, електрична дефібриляція
- ☐ d. Проведення медикаментозної кардіоверсії
- ☐ e. Переливання резус-сумісної крові

Коментар

Правильна відповідь: Проведення електричної дефібриляції

Питання 107

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта на 5-ту добу після операції розвинулася клінічна картина тромбоемболії легеневої артерії, настала раптова коронарна смерть. Який препарат необхідно було призначити для профілактики цього ускладнення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ацетилсаліцилова кислота
- ☐ b. Декстран та хлорид натрію
- ☐ c. Пентоксифілін
- ☐ d. Дипіридамомл
- ☐ e. Еноксапарин

Коментар

Правильна відповідь: Еноксапарин

Питання 108

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 59-ти років більше 2-х років тому діагностована гіпертензія. Систематично не лікувався. Впродовж тижня відзначає погіршення самопочуття: з'явився сильний головний біль, який супроводжувався нудотою, серцебиттям, болем колючого характеру в ділянці серця. Вночі гостро виникла важка задишка інспіраторного характеру, що супроводжувалась кашлем з виділенням великої кількості вологого харкотиння, серцебиття. При огляді: акроціаноз. Частота серцевих скорочень - 120/хв. Тони серця - глухі, тахікардія. Артеріальний тиск - 240/105 мм рт.ст. В легенях на тлі ослабленого везикулярного дихання вислуховується велика кількість вологих різнокаліберних хрипів. Ваш попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіпертензивний криз, ускладнений гострою серцевою недостатністю
- ☐ b. Гіпертензивний криз, ускладнений гострою гіпертензивною енцефалопатією
- ☐ c. Симптоадrenalовий криз
- ☐ d. Неускладнений кардіальний криз
- ☐ e. Вагоінсулярний криз

Коментар

Правильна відповідь: Гіпертензивний криз, ускладнений гострою серцевою недостатністю

Питання 109

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 86-ти років знаходиться в стаціонарі хірургічного відділення після ампутації нижньої кінцівки на рівні стегна з приводу діабетичної стопи. Через добу після оперативного втручання стан хворого почав раптово прогресивно погіршуватись. Порушилась свідомість: помірне оглушення, виникло часте поверхнєве дихання, хворий став блідим, з'явився холодний піт. На ЕКГ: синусова тахікардія з ЧСС- 148/хв., блокада правої ніжки пучка Гісса, високий загострений зубець Р, ознаки гіпертрофії правого шлуночка. Хірург запідозрив ТЕЛА і викликав реаніматолога. На момент огляду реаніматологом на ЕКГ: картина попередня, свідомість на рівні коми, пульс на магістральних судинах відсутній, дихання відсутнє. Які першочергові дії має застосувати реаніматолог?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Оксигенотерапія
- ☐ б. Електрична дефібриляція
- ☐ в. В/в введення гепарину
- ☐ г. Непрямий масаж серця
- ☐ д. В/в введення метопрололу

Коментар

Правильна відповідь: Непрямий масаж серця

Питання 110

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 47-ми років, який перебуває в стаціонарі з приводу шлунково-кишкової кровотечі виразкового генезу, виконали переливання крові. За 5 хвилин з'явились біль у попереку, потемніння в очах, холодний піт. Пульс - 110/хв., ниткоподібний, артеріальний тиск - 90/40 мм рт.ст. Який стан виник у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ б. Гемотрансфузійний шок
- ☐ в. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ г. Рецидив шлунково-кишкової кровотечі
- ☐ д. Пірогенна реакція на переливання крові


Коментар

Правильна відповідь: Гемотрансфузійний шок

Питання 111

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 1,5 років з діагнозом "сепсис" спостерігаються: потьмарення свідомості, контактний сопор, фоторефлекси збережені, акроціаноз, пульс слабкого наповнення, артеріальний тиск - 60/15 мм рт.ст. Якій стадії термінального стану відповідає дана клінічна картина?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Клінічна смерть
- ☐ b. Передагонія
- ☐ с. Агонія
- ☐ d. Соціальна смерть
- ☐ е. Біологічна смерть


Коментар

Правильна відповідь: Передагонія

Питання 112

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 19-ти років у непритомному стані доставлено швидкою допомогою з місця автоаварії. Об'єктивно: свідомість відсутня, у відповідь на больові подразники мимовільно з'являється тонічне напруження м'язів з випростовуванням рук і ніг та закиданням голови дозад, двосторонні стопні патологічні рефлекси. Дихання "машинне", пульс - 110/хв., артеріальний тиск - 160/100 мм рт.ст., температура тіла - 37,9оС. Який імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ b. Аневризма судин головного мозку
- ☐ с. Внутрішньочерепна гематома
- ☐ d. Забій головного мозку важкого ступеня
- ☐ е. Менінгіт


Коментар

Правильна відповідь: Забій головного мозку важкого ступеня

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Бригада швидкої допомоги викликана до хлопчика 7-ми років. Свідомість та дихання відсутні, пульс на сонній артерії та артеріальний тиск не визначається, зіниці широкі, на світло не реагують. Після відновлення прохідності дихальних шляхів, при проведенні штучного дихання і непрямого масажу серця першочерговою медикаментозною терапією є:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кальцію хлорид
- ☐ b. Натрію гідрокарбонат
- ☐ c. Адреналіну гідрохлорид
- ☐ d. Атропіну сульфат
- ☐ e. Розчин глюкози


Коментар

Правильна відповідь: Адреналіну гідрохлорид

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У приймальне відділення МедР доставлено пацієнта, що лежав на снігу при температурі повітря - 10оС. Об'єктивно: свідомість сплутана, міміка відсутня, шкіра бліда, синюшна, холодна на дотик. Пульс-50/хв., артеріальний тиск- 80/40 мм рт.ст., частота дихальних рухів - 8-10/хв., поверхневе; різкий запах алкоголю, температура тіла-30оС. Який попередній діагноз найбільш вірогідний у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Закрита черепно-мозкова травма з забоєм головного мозку
- ☐ b. Печінкова енцефалопатія
- ☐ c. Тяжка ступінь алкогольного сп'яніння
- ☐ d. Загальне переохолодження, алкогольне сп'яніння
- ☐ e. Отруєння сурогатами алкоголю


Коментар

Правильна відповідь: Загальне переохолодження, алкогольне сп'яніння

Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Зі слів матері у 8-місячної дівчинки з'явилися задуха, ціаноз, що супроводжуються втратою свідомості. Раніше прояви ціанозу спостерігалися при годуванні. Напади почастишали після 6-ти місяців. При аускультії: в легенях пуерильне дихання, грубий систолічний шум в 3-4 міжребер'ї зліва, II тон над легеневою артерією послаблений. Який стан розвивається у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Задишково-ціанотичний криз
- ☐ b. Напад епілепсії
- ☐ c. Гостра ниркова недостатність
- ☐ d. Стенозуючий ларингіт
- ☐ e. Гостра печінкова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Задишково-ціанотичний криз

Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У приймальне відділення батько доставив дитину 2-х років у термінальному стані. З його слів з'ясувалося, що на тлі повного здоров'я дитина почала кашляти, задихатися. При огляді: шкіра ціанотична, м'язова гіпотонія, тони серця не прослуховуються. Що з перерахованого нижче є невідкладною та першочерговою дією?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Очищення дихальних шляхів та забезпечення їх прохідності
- ☐ b. Вентиляція 100% кисню за допомогою мішка Амбу
- ☐ c. В/в введення 4% розчину NaHCO_3
- ☐ d. Штучна вентиляція "рот в рот"
- ☐ e. Введення адреналіну 0,1% 0,01 мг/кг

Коментар

Правильна відповідь: Очищення дихальних шляхів та забезпечення їх прохідності

Питання 117

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У сержанта 30-ти років після вибуху авіабомби ліва гомілка була притиснута бетонною стіною до землі. Звільнення від стиснення гомілки відбулося через 3 години, потерпілого доставлено у госпіталь. Шкіра гомілки блідо-ціанотична, холодна на дотик, набрякла. Тони серця приглушені, артеріальний тиск- 80/50 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, 120/хв. У сечі: міоглобін, протеїнурія та циліндрурія, колір - бурий. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Синдром хронічної втоми
- ☐ б. Гострий гломерулонефрит
- ☐ в. Гостра печінкова недостатність
- ☐ г. Синдром тривалого стиснення
- ☐ д. Гострий венозний тромбоз

Коментар

Правильна відповідь: Синдром тривалого стиснення

Питання 118

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 10-ти років надійшов у відділення інтенсивної терапії і реанімації з діагнозом "політравма, геморагічний шок 3-го ступеня". Який із судинних доступів є найбільш показаним для здійснення наступних задач: 1) Масивна інфузійна та гемотрансфузійна терапія; 2) Тривале парентеральне харчування; 3) Вимірювання центрального венозного тиску (ЦВТ)?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Венепункція
- ☐ б. Черезшкірна катетеризація центральної вени
- ☐ в. Пункція і катетеризація периферичної вени
- ☐ г. Пункція променевої артерії
- ☐ д. Пункція стегнової артерії


Коментар

Правильна відповідь: Черезшкірна катетеризація центральної вени

Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілого під час медичного сортування встановлено частоту дихання - 6/хв., свідомість за шкалою ком Глазго - 8 балів, пульс на периферійних судинах не пальпується. До якої сортувальної групи належить потерпілий?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. "Чорної"
- ☐ b. "Жовтої"
- ☐ с. "Фіолетової"
- ☐ d. "Червоної"
- ☐ е. "Зеленої"


Коментар

Правильна відповідь: "Червоної"

Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На виробництві по виготовленню пластмасових контейнерів відбулась аварія. Через 1 годину після цього працівник звернувся до медичного пункту зі скаргами на шум у вухах, головний біль, запаморочення, загальну слабкість, підвищення температури тіла до фебрильної, слинотечу та пронос, сірий відтінок шкірних покривів. Через півтори години звернулись ще 6 працівників зі схожою клінікою. У всіх постраждалих крові було виявлено метгемоглобінемію. Яка речовина найбільш ймовірно викликала таке отруєння?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Монооксид вуглецю
- ☐ b. Синильна кислота
- ☐ с. Аміак
- ☐ d. Сірководень
- ☐ е. Похідні фенолу

Коментар

Правильна відповідь: Похідні фенолу

Питання 121

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікаря звернувся хворий 52-х років зі скаргами на підвищення температури тіла до 38,5°C, озноб, відчуття розпирання, жару лівої гомілки. Об'єктивно: на шкірі лівої гомілки ділянка еритеми з чіткими контурами у вигляді "язиків полум'я", гаряча та болюча на дотик. Який препарат з наведених можна призначити хворому в амбулаторних умовах?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Амоксицилін
- ☐ b. Аміксин
- ☐ c. Ацикловір
- ☐ d. Тинідазол
- ☐ e. Левамизол

Коментар

Правильна відповідь: Амоксицилін

Питання 122

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 29-ти років впав з висоти 4,0 м на випрямлені ноги. Скаржиться на біль в лівому колінному суглобі, більше з зовнішньої сторони. Відзначається вальгусне відхилення гомілки, рухи неможливі. Надколінок балотує. Позитивний симптом вісьового навантаження. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Перелом гомілки у середній третині
- ☐ b. Розрив малогомілкової колатеральної зв'язки
- ☐ c. Перелом зовнішнього виростка великогомілкової кістки
- ☐ d. Пошкодження латерального меніска
- ☐ e. Перелом надколінка

Коментар

Правильна відповідь: Перелом зовнішнього виростка великогомілкової кістки

Питання 123

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 72-х років звернувся до лікаря поліклініки зі скаргами на відсутність виділення сечі протягом 8 годин. Страждає на аденому передміхурової залози. При пальцевому ректальному дослідженні встановлено: передміхурова залоза до 7 см в діаметрі, неbolюча, тугоеластична, міжчасткова борозенка згладжена, слизова оболонка прямої кишки над нею рухома. Який метод діагностики буде найбільш інформативним для визначення розмірів передміхурової залози та об'єму залишкової сечі?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Низхідна цистографія
- ☐ b. Екскреторна урографія
- ☐ c. Ультразвукова сонографія
- ☐ d. Урофлоуметрія
- ☐ e. Уретроцистоскопія

Коментар

Правильна відповідь: Ультразвукова сонографія

Питання 124

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 5-ти місяців на тлі гострого респіраторного захворювання, лихоманки 39,5°C та багаторазового блювання погіршився стан. Дитина стала млявою, блідою. Відзначається акроціаноз, сухі яскраві слизові оболонки. Зниження тургору м'яких тканин. Тім'ячко втягнуте. Шкірна складка важко розправляється. Тахікардія. Діурез знижено. Яку терапію слід призначити? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Антибіотикотерапія та ферментотерапія
- ☐ b. Дегідратаційна терапія колоїдними розчинами
- ☐ c. Антибіотикотерапія та преднізолон
- ☐ d. Антибіотикотерапія та ентеросорбенти
- ☐ e. Регідратаційна терапія глюкозо-сольовими розчинами


Коментар

Правильна відповідь: Регідратаційна терапія глюкозо-сольовими розчинами

Питання 125

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В практично здорової людини під час вживання їжі виникла симптоматика механічної асфіксії. Виконання прийому Геймліха не допомогло, наростають явища дихальної недостатності. Яка подальша тактика ведення пацієнта на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інтубація трахеї
- ☐ b. Трахеостомія
- ☐ c. Інгаляція сальбутамолу
- ☐ d. Конікотомія
- ☐ e. Штучне дихання "з рота в рот"


Коментар

Правильна відповідь: Конікотомія

Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 76-ти років поступила зі скаргами на сильні різкі болі у черевній порожнині, що виникли раптово, здуття живота, затримку відходження газів та калу. Відомо, що страждає на миготливу аритмію. Живіт дещо піддутий, м'який та різко болісний при пальпації. Перистальтика відсутня. Перкуторно у всіх відділах тимпаніт. Per rectum: ампула порожня, на рукавиці - залишки калу малинового кольору. Лейкоцитоз: 28 109/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий панкреатит
- ☐ b. Обтураційна кишкова непрохідність
- ☐ c. Інфаркт міокарда, абдомінальна форма
- ☐ d. Перфоративна виразка
- ☐ e. Мезентеріальний тромбоз


Коментар

Правильна відповідь: Мезентеріальний тромбоз

Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після опромінення у госпіталь доставлений юнак 26-ти років. Показник індивідуального дозиметра 5 Гр. Скарги на різку загальну слабкість, головний біль, нудоту, повторне блювання. Об'єктивно: на шкірі обличчя еритема, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., блювання продовжується. В якому клінічному періоді гострої променевої хвороби перебуває хворий? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Період первинної реакції
- ☐ b. Період вторинної реакції
- ☐ c. Період запалення
- ☐ d. Період виражених клінічних проявів
- ☐ e. Період розпаду


Коментар

Правильна відповідь: Період первинної реакції

Питання 128

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий житель Полісся госпіталізований в інфекційний стаціонар із підозрою на кліщовий енцефаліт. Відзначає підвищену температуру тіла до 39°C, наростаючий головний і м'язовий біль. Об'єктивно: шкіра обличчя та шиї гіперемована. Склері ін'єковані. Спостерігається в'ялий парез м'язів шиї, плечового пояса, спини. Який матеріал необхідно взяти для вірусологічного дослідження, щоб підтвердити діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Жовч, ліквор
- ☐ b. Сечу, кал
- ☐ c. Кров, сечу
- ☐ d. Кров, жовч
- ☐ e. Кров, ліквор


Коментар

Правильна відповідь: Кров, ліквор

Питання 129

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У медичну роту з місця літніх польових навчань з гарматної стрільби доставлено екіпаж танка у складі чотирьох танкістів з однотипними скаргами та схожою клінічною картиною: запаморочення, головний біль у скронях, нудота. В одного з танкістів спостерігалось одноразове блювання. Об'єктивно: рясний піт, підвищення температури тіла до 38оС, тахікардія. В одного потерпілого відзначаються порушення координації рухів. Якою має бути тактика ведення потерпілих? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Госпіталізація у відділення інтенсивної терапії
- ☐ b. Проведення реанімаційних заходів
- ☐ c. Потерпілі не потребують допомоги
- ☐ d. Госпіталізація в опікове відділення
- ☐ e. Розміщення потерпілих в прохолодному місці


Коментар

Правильна відповідь: Розміщення потерпілих в прохолодному місці

Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 60-ти років тривалий час страждав на гіпертонічну хворобу. З метою зниження артеріального тиску випив надмірну кількість амлодипіну, через декілька годин з'явилися задишка, почервоніння обличчя, виражена тахікардія, загальмованість, слабкість, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. Бригадою швидкої медичної допомоги доставлений в приймальне відділення терапевтичного стаціонару. Що потрібно призначити в першу чергу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Промивання шлунка, введення вазопресорних засобів
- ☐ b. Призначення інгібіторів ангіотензинперетворювального ферменту
- ☐ c. Призначення статинів
- ☐ d. Переливання крові
- ☐ e. Призначення β -блокаторів


Коментар

Правильна відповідь: Промивання шлунка, введення вазопресорних засобів

Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після падіння з опорою на праве плече потерпілий скаржиться на біль, обмеження рухів, деформацію в ділянці плечового суглоба. Яких заходів на цьому етапі надання допомоги необхідно вжити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Транспортна іммобілізація, знеболення
- ☐ b. Блокада місця перелому
- ☐ c. Накладення шини Дітеріхса
- ☐ d. Накладення гіпсової пов'язки
- ☐ e. Накладення шини Белера


Коментар

Правильна відповідь: Транспортна іммобілізація, знеболення

Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 13-ти років страждає на тяжку форму неспецифічного виразкового коліту. Внаслідок порушення дієти стан погіршився, впродовж тижня турбує інтенсивний біль в животі, поява крові та слизу у випорожненнях. За останню добу приєдналися виражена загальна слабкість, запаморочення, сонливість, нудота. Частота серцевих скорочень - 130/хв., артеріальний тиск - 85/55 мм рт.ст. Який стан розвинувся у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий ентероколіт
- ☐ b. Анальна тріщина
- ☐ c. Токсичний мегаколон
- ☐ d. Кишкова кровотеча
- ☐ e. Гнійний парапроктит


Коментар

Правильна відповідь: Кишкова кровотеча

Питання 133

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час пожежі чоловік 28-ми років вистрибнув із вікна 3-го поверху. При огляді лікарем швидкої медичної допомоги (ШМД) запідозрено компресійний перелом хребта. У якому положенні необхідно транспортувати потерпілого у лікарню?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Горизонтальне положення на спині на вакуумному матраці або твердій поверхні
- ☐ б. Положення на лівому боці із згинанням правої ноги
- ☐ в. Положення з підведеним головним кінцем
- ☐ г. Положення на животі з підкладанням валика під живіт
- ☐ д. Положення на правому боці із згинанням лівої ноги


Коментар

Правильна відповідь: Горизонтальне положення на спині на вакуумному матраці або твердій поверхні

Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина від другої ускладненої вагітності (загроза переривання), других пологів, термін гестації 37 тижнів, маса тіла - 2400 г, довжина - 50 см. Оцінка за шкалою Апгар 7-9 балів. Після першого прикладання до грудей у дитини виникло блювання та з'явилися пінисті виділення з рота. Шлунковий зонд поставити не вдалося. Який попередній діагноз у дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Вроджена пневмонія
- ☐ б. Вроджена кишкова непрохідність
- ☐ в. Ахалазія стравоходу
- ☐ г. Вроджена атрезія стравоходу
- ☐ д. Синдром аспіраціїамніотичної рідини

Коментар

Правильна відповідь: Вроджена атрезія стравоходу

Питання 135

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Вкажіть максимальну тривалість визначення наявності пульсу:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 20 секунд
- ☐ b. 15 секунд
- ☐ c. 5 секунд
- ☐ d. 10 секунд
- ☐ e. 1 хвилина

Коментар

Правильна відповідь: 10 секунд

Питання 136

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час проведення закритого масажу серця з'явився специфічний хрускіт, який свідчить про перелом ребер. Яка тактика лікаря стосовно продовження заходів серцево-легеневої реанімації? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Продовжувати масаж, нічого не змінюючи
- ☐ b. Виконати новокаїнову блокаду місць переломів і продовжити масаж серця
- ☐ c. Продовжити масаж, встановивши основи долонь на груднину
- ☐ d. Припинити масаж серця і ввести адреналіну гідрохлорид внутрішньовенно
- ☐ e. Припинити масаж внаслідок небезпеки розвитку кардіо-пульмонального шоку

Коментар

Правильна відповідь: Продовжити масаж, встановивши основи долонь на груднину

Питання 137

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В пологовій залі лікарем-неонатологом проведена оцінка новонародженого: дихання спонтанне, частота серцевих скорочень -120/хв., шкірні покриви ціанотичні. Тактика лікаря: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Дати кисень через маску
- ☐ б. Почати проводити медикаментозну терапію
- ☐ в. Провести тактильну стимуляцію
- ☐ г. Проводити подальший нагляд
- ☐ д. Почати виконувати непрямий масаж серця

Коментар

Правильна відповідь: Дати кисень через маску

Питання 138

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 15-ти років. На цукровий діабет хворіє 10 років. Протягом останнього тижня хворіла на ентероколіт, скаржилася на слабкість, поліурію. Сьогодні з'явилися галюцинації, олігурія, втрата свідомості. Відзначаються судоми. Шкіра і слизові оболонки сухі, бліді, тургор знижений. Язик сухий. Гіпертонус м'язів, визначаються менингеальні знаки. Очні яблука м'які. З роти запаху ацетону немає. Дихання - часте, поверхнєве. Тони серця - глухі до 110/хв. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. Живіт м'який. З якого розрахунку Ви призначите початкову дозу інсуліну? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 0,1 ОД/кг маси тіла в/в струминно
- ☐ б. 0,5 ОД/кг маси тіла в/в струминно
- ☐ в. 0,5 ОД/кг маси тіла в/в крапельно
- ☐ г. 0,1 ОД/кг маси тіла п/ш
- ☐ д. 0,1 ОД/кг/год маси тіла в/в крапельно

Коментар

Правильна відповідь: 0,1 ОД/кг маси тіла в/в струминно

Питання 139

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 27-ми років скаржиться на появу сверблячих висипів, загальне нездужання, підвищення температури тіла до 37,8°C. Висипи з'явилися в період захворювання ангіною, з приводу якої приймала антибіотик, полоскала горло розчином перманганату калію. Об'єктивно: на шкірі тулуба, обличчя, верхніх і нижніх кінцівок спостерігається рясний розеольозно-папульозний висип рожево-червоного кольору, схильний до злиття. Місцями є нечисленні петехії. Поставте діагноз: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Синдром Лаелла
- ☐ б. Гостра кропив'янка
- ☐ в. Токсикодермія
- ☐ г. Алергічний дерматит
- ☐ е. Гостра екзема

Коментар

Правильна відповідь: Токсикодермія

Питання 140

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждалий отримав опіки в області нижніх кінцівок, перелом кісток правої гомілки в середній третині, ЧМТ. Визначте вид травми: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Комбінована
- ☐ б. Поєднана
- ☐ в. Множинна
- ☐ г. Загальна
- ☐ е. Ізольована

Коментар

Правильна відповідь: Комбінована

Питання 141

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 79-ти років раптово виник біль в нижній частині живота. Хворий страждає на атеросклеротичну енцефалопатію II-III ступеня, контакт з ним утруднений. Об'єктивно: артеріальний тиск - 160/90 мм рт.ст., пульс - 78/хв. Язик вологий. Живіт м'який, болючий у нижніх відділах, де пальпується об'ємне еластичне утворення. Діурез відсутній. Яких заходів необхідно вжити на етапі приймального відділення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Виведення сечі м'яким катетером
- ☐ b. Комп'ютерна томографія
- ☐ c. Консультація невропатолога, ЕКГ, ЕЕГ
- ☐ d. Пункція сечового міхура
- ☐ e. Цистоскопія

Коментар

Правильна відповідь: Виведення сечі м'яким катетером

Питання 142

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 45-ти років через 2 дні після повернення з Непалу, де він вивчав популяції диких гризунів, раптово підвищилася температура тіла до 40°C, виник озноб, головний біль, блювання, біль у грудній клітці, кашель з харкотинням кривавого характеру. Об'єктивно: гіперемія шкірних покривів, ін'єкція судин склер, поверхнєве дихання, збудження, язик густо обкладений білим нальотом, мова нечітка, порушена координація рухів, вологі хрипи над легенями. Ваш попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Крупозна пневмонія
- ☐ b. Пташиний грип
- ☐ c. Туберкульоз
- ☐ d. Чума, легенева форма
- ☐ e. Сибірка, легенева форма


Коментар

Правильна відповідь: Чума, легенева форма

Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Працівник фабрики шкіряних виробів захворів гостро: протягом 3-х днів температура тіла - 38,5-39,5°C, слабкість, зниження апетиту, свербіння і печіння в ділянці правої кисті. Об'єктивно: на кисті правої руки на щільній основі розташована безболісна, вкрита темною кіркою, виразка діаметром 1,5 см, яка оточена гіперемією, везикулами і набряком драглистої консистенції. Пальпуються регіонарні лімфовузли діаметром 0,5 см, помірно болючі, рухомі. Тони серця приглушені, ритмічні, артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. Яке захворювання є найбільш імовірним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Чума
- ☐ б. Сибірка
- ☐ в. Токсоплазмоз
- ☐ г. Туляремія
- ☐ д. Лімфогранулематоз


Коментар

Правильна відповідь: Сибірка

Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 58-ми років раптово відчув задишку, різкий біль в грудній клітці, кровохаркання, запаморочення. В анамнезі тромбофлебіт. Об'єктивно: дифузний ціаноз, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., акцент II тону на легеневій артерії, сухі розсіяні хрипи в нижніх відділах легень. На ЕКГ: високий Р у II та III, глибокий S в I, патологічний Q в III, негативний T в II та III, елевация сегмента ST. На Ro спостерігається клиноподібне затемнення в середніх відділах справа. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Кардіогенний шок
- ☐ б. Спонтанний пневмоторакс
- ☐ в. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ г. Інфаркт легені

☐ е. Q-інфаркт міокарда по задній стінці лівого шлуночка
Коментар

Правильна відповідь: Тромбоемболія легеневої артерії

Питання 145

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 49-ти років скаржиться на тотальну макрогематурію зі згортками крові хробакоподібної форми, тупий біль у правій поперековій області. При ультразвуковому дослідженні (УЗД) - права нирка збільшена, контур верхнього полюсу горбистий. Про яке захворювання, в першу чергу, слід думати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Пухлина сечоводу
- ☐ б. Гострий гломерулонефрит
- ☐ в. Пухлина нирки
- ☐ г. Аномалія розвитку нирок
- ☐ е. Обструктивний пієлонефрит

Коментар

Правильна відповідь: Пухлина нирки

Питання 146

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 42-х років, на другу добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зобу, з'явилися серцебиття, задишка, пітливість, пронос, відчуття страху. При огляді: хвора збуджена, шкіра волога, гаряча на дотик. Температура тіла - 39,2°C. Тони серця приглушені, тахікардія. Пульс - 160/хв., артеріальний тиск - 85/40 мм рт.ст. Живіт м'який, безболісний. Які дослідження потрібно провести для установлення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Вміст цукру в крові
- ☐ б. Вміст 17-КС, 17-ОКС в сечі
- ☐ в. Вміст тиреоїдних гормонів

- ☐ d. Вміст трансаміназ в сироватці крові
- ☐ e. Вміст адреналіну та норадреналіну в крові
- Коментар

Правильна відповідь: Вміст тиреоїдних гормонів

Питання 147

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

72-х річний чоловік був оглянутий лікарем у приймальному відділенні. Зі слів родичів він раптово втратив свідомість. З медичної документації, що була при пацієнтці стало відомо, що нещодавно він переніс операцію аорто-коронарного шунтування та у задовільному стані був виписаний додому. Після операції хворому була призначена подвійна антитромбоцитарна терапія, зі слів родичів всі ліки приймав вчасно. Об'єктивно: свідомість порушена, шкірні покриви бліді, дихання часте, глибоке. Аускультативно дихання везикулярне, проводиться в усі відділи легень, тони серця приглушені, аритмічні. На ЕКГ: широкі комплекси QRS (0,18 с), частота скорочень передсердь - 105/хв., частота скорочень шлуночків - 176/хв. Яка оптимальна тактика купування даного стану? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Непрямий масаж серця
- ☐ b. В/в введення атропіну 0,1%
- ☐ c. Електроімпульсна терапія
- ☐ d. В/в введення верапамілу 0,25%
- ☐ e. Масаж каротидних синусів

Коментар

Правильна відповідь: Електроімпульсна терапія

Питання 148

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 27-ми років, отримав во-гнепальне поранення хребта. Клінічно спостерігається нижня параплегія за периферичним типом, анестезія нижніх кінцівок, порушення функції тазових органів за центральним типом. Визначте в якому відділі хребта пошкоджений спинний мозок: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Куприковому

- ☐ b. Грудному
- ☐ c. Шийному
- ☐ d. Поперековому
- ☐ e. Крижовому


Коментар

Правильна відповідь: Поперековому

Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина впала на приведену руку. Скарги на сильний біль в середній третині плеча, неможливість рухів. При огляді виявляються деформація та крепітація. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вивих кісток передпліччя
- ☐ b. Перелом плеча
- ☐ c. Перелом кісток передпліччя
- ☐ d. Вивих плеча
- ☐ e. Вивих пальців кисті


Коментар

Правильна відповідь: Перелом плеча

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При надзвичайних ситуаціях, таких, як масові промислові отруєння, для максимально ефективного надання допомоги найбільш можливій кількості постраждалих потрібно визначитись з необхідністю, черговістю та об'ємом надання медичної допомоги рятувальними службами. З цією метою використовується система медичного сортування "START". Який перший крок передбачає ця система?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Оцінка рівня свідомості і психічного стану

- ☐ b. Оцінка самостійного дихання і спонтанного кровообігу
- ☐ c. Оцінка можливості самостійно пересуватись
- ☐ d. Зупинка кровотечі, потерпілим, які цього потребують
- ☐ e. Заповнення реєстраційних форм про НС


Коментар

Правильна відповідь: Оцінка можливості самостійно пересуватись

Питання 151

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 42-х років, електромонтер, під час ремонту контактного дроту на трамвайній лінії зазнав ураження електричним струмом високої напруги - 550 В. Струм вимкнули, потерпілого віднесли у безпечне місце. Під час огляду: свідомість відсутня, шкіра бліда, дихання відсутнє, пульс-аритмічний ниткоподібний, ротова порожнина вільна. Ваші дії:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Термінове транспортування у стаціонар
- ☐ b. Спостереження за станом протягом 5 хвилин
- ☐ c. Почати реанімаційні заходи
- ☐ d. Постановка повітроводу, початок ШВЛ
- ☐ e. Виконати прекардіальний удар


Коментар

Правильна відповідь: Почати реанімаційні заходи

Питання 152

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 3-х років, що страждає на тетраду Фалло, раптово збільшилась інтенсивність ціанозу, з'явилась задишка, вона присіла навпочіпки. Ваші дії:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Призначити серцеві глікозиди
- ☐ b. Призначити сечогінні

- ☐ c. Призначити антибіотики
- ☐ d. Призначити оксигенотерапію
- ☐ e. Призначити бронходилататори


Коментар

Правильна відповідь: Призначити оксигенотерапію

Питання 153

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На полі бою оглядається військовослужбовець 18-ти років, що скаржиться на різкий біль в правій половині грудної клітки, задишку. Відомо, що потерпілий зазнав колото-різаного поранення грудної клітки. При огляді в 4 міжребер'ї по передній аксиллярній лінії справа визначається рана 3x4 см, через яку з плевральної порожнини надходить повітря. Що повинен зробити санітарний інструктор на полі бою?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести антибактеріальні препарати
- ☐ b. Обробити рану антисептиком
- ☐ c. Виконати пункцію плевральної порожнини
- ☐ d. Виконати дренажування плевральної порожнини
- ☐ e. Накласти оклюзійну пов'язку з клапаном на рану


Коментар

Правильна відповідь: Накласти оклюзійну пов'язку з клапаном на рану

Питання 154

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час ремонту в квартирі жінці в праве око потрапив розчин гашеного вапна. В оці з'явилися сильний біль, світлобоязнь, слюзотеча, знизився зір. Гострота зору правого ока 0,2 н/к. В правому оці очна щілина рефлекторно звужена, світлобоязнь, слюзотеча. Кон'юнктива повік гіперемована, місцями бліда, набрякла. Змішана ін'єкція кон'юнктиви очного яблука. Рогівка сірого кольору, набрякла. Зіниця звужена, глибокі середовища ока дослідити неможливо у зв'язку з вираженою світлобоязню. Яку допомогу необхідно надати першочергово?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Закласти гормональну мазь
- ☐ b. Закапати дезінфікуючі розчини (0,25% розчин левоміцетину чи 20% розчин сульфацил натрію)
- ☐ c. Промити кон'юнктивальний мішок фізіологічним розчином
- ☐ d. Рясно промити кон'юнктивальну порожнину водою протягом 15-20 хвилин
- ☐ e. Закласти 1% тетрациклінову мазь


Коментар

Правильна відповідь: Рясно промити кон'юнктивальну порожнину водою протягом 15-20 хвилин

Питання 155

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінці 34-х років, яка потрапила до лікарні з тяжкою кровотечею, призначено переливання свіжозамороженої плазми. Можна використати плазму групи АВ (IV), якщо хвора має: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Групу крові А (II)
- ☐ b. Групу крові В (III)
- ☐ c. Групу крові О (I)
- ☐ d. Групу крові АВ (IV)
- ☐ e. Будь-яку групу крові


Коментар

Правильна відповідь: Групу крові АВ (IV)

Питання 156

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 48-ми років звернулася зі скаргами на постійний тупий біль внизу живота, більше зліва, підвищення температури тіла до 38°C. Протягом останніх 5-ти років спостерігається з приводу фіброміоми матки. При бімануальному дослідженні: матка збільшена до 10 тижнів вагітності, щільна, горбиста. Зліва від матки визначається утворення, яке виходить з матки, розмірами 6х8 см, щільне, різко болюче при пальпації. Додатки з обох сторін - без особливостей. Який імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Некроз субсерозного фіброматозного вузла
- ☐ b. Позаматкова вагітність
- ☐ c. Субмукозний фіброматозний вузол, що народжується
- ☐ d. Аборт в ході
- ☐ e. Саркома матки


Коментар

Правильна відповідь: Некроз субсерозного фіброматозного вузла

Питання 157

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 10-ти років довго пірнав у домашньому басейні, раптом почав борсатися, ковтати воду. Його було витягнуто з води та доставлено у приймальний pokій лікарні. Притомний, дещо загальмований, дихання та кровообіг адекватні. Тактика лікаря:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Спостереження в стаціонарі
- ☐ b. Спостереження не потребує
- ☐ c. Амбулаторне спостереження
- ☐ d. Спостереження у приймальному покої протягом 1 години
- ☐ e. Термінова госпіталізація у відділення реанімації


Коментар

Правильна відповідь: Спостереження в стаціонарі

Питання 158

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час бою солдат отримав кульове поранення лівої половини грудної клітини. Турбує біль, задишка. Пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 90/70 мм рт.ст., частота дихання - 22/хв. Періодично спльовує кров. По середньо-ключичній лінії зліва, на рівні II ребра - рана 1x1 см, з якої при диханні виділяється піниста кров. Встановіть діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Проникаюче поранення грудної клітки
- ☐ b. Тампонада серця
- ☐ c. Перелом II ребра зліва
- ☐ d. Закрита травма органів грудної клітки
- ☐ e. Клапанний пневмоторакс


Коментар

Правильна відповідь: Проникаюче поранення грудної клітки

Питання 159

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі 18-ти років з крупним плодом через 12 годин від початку пологової діяльності виникли ознаки клінічно вузького тазу, у зв'язку з чим прийнято рішення про розродження шляхом кесаревого розтину. При укладанні жінки на операційний стіл у положенні лежачи на спині раптово стан її погіршився: з'явилися скарги на задишку, нудоту, шкіра стала блідою з мармуровим малюнком. Артеріальний тиск - 70/50 мм рт.ст. При повертанні жінки на лівий бік стан її покращився. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Емболія навколоплідними водами
- ☐ b. Синдром нижньої порожнистої вени
- ☐ c. Передчасне відшарування плаценти
- ☐ d. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ e. Розрив матки


Коментар

Правильна відповідь: Синдром нижньої порожнистої вени

Питання 160

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 55-ти років з інсулінозалежним цукровим діабетом госпіталізовано із скаргами на загальну слабкість, поліурію, гіпотонію, тахікардію. В газовому складі крові виявлено: pH - 7,32; PaCO₂ - 35 мм рт.ст., PaO₂ - 80 мм рт.ст.; стандартний бікарбонат - 18 ммоль/л; істинний бікарбонат - 15 мм рт.ст.;

дефіцит основ - 1,5 ммоль/л; натрій - 132 ммоль/л; глюкоза - 25 ммоль/л; хлориди - 122 ммоль/л; кетонів тіла. Визначте кислотно-основний стан у хворого:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Компенсований метаболічний ацидоз
- ☐ b. Декомпенсований метаболічний ацидоз
- ☐ c. Компенсований респіраторний алкалоз
- ☐ d. Декомпенсований респіраторний ацидоз
- ☐ e. Компенсований метаболічний алкалоз


Коментар

Правильна відповідь: Компенсований метаболічний ацидоз

Питання 161

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 22-х років через 30 хвилин після нанесення мазі на руку з'явилося шкірне свербіння, гіперемія, потім численні уртикарні висипи. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Атопічний дерматит
- ☐ b. Короста
- ☐ c. Нейродерміт
- ☐ d. Токсикодермія
- ☐ e. Гостра кропивниця


Коментар

Правильна відповідь: Гостра кропивниця

Питання 162

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікарем на полі бою оглядається хворий 22-х років, що скаржиться на різкий біль в лівій нижній кінцівці. В нижній третині внутрішньої поверхні лівого стегна відзначається рвана рана 3,5х4,5 см з активною артеріальною кровотечею. Які заходи домедичної допомоги необхідно провести?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Виконати пальцеве притискання судини, що кровоточить
- ☐ b. Ввести гемостатичні препарати
- ☐ c. Виконати туге бинтування рани
- ☐ d. Накласти джгут на ліву нижню кінцівку
- ☐ e. Обробити рану перекисом водню


Коментар

Правильна відповідь: Накласти джгут на ліву нижню кінцівку

Питання 163

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 56-ти років втратив свідомість на вулиці. Пульс на сонних артеріях відсутній, шкірні покрови ціанотичні, зіниці розширені. Бригада швидкої допомоги, що прибула, успішно провела реанімаційні заходи: відновлено серцеву діяльність, проте самостійне дихання відсутнє. Необхідно в першу чергу:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести строфантин
- ☐ b. Ввести дигоксин
- ☐ c. Продовжити ШВЛ
- ☐ d. Накласти трахеостому
- ☐ e. Ввести еуфілін


Коментар

Правильна відповідь: Продовжити ШВЛ

Питання 164

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

26-річна жінка з терміном вагітності 36-37 тижні була знайдена у палаті чергового персоналом пологового відділення без ознак свідомості. Пульс на магістральних судинах відсутній, дихання відсутнє. негайно розпочато реанімаційні заходи. Через 4 хвилини після початку СЛР відновлення спонтанного кровообігу та дихання не відбулось. Лікар має прийняти рішення щодо подальших дій реанімаційної бригади. Які подальші дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Проведення кардіотокографії плода
- ☐ b. Констатація біологічної смерті
- ☐ c. Стимуляція пологової діяльності
- ☐ d. Накладення акушерських щипців
- ☐ e. Виконання кесаревого розтину


Коментар

Правильна відповідь: Виконання кесаревого розтину

Питання 165

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 5-ти місяців планується встановлення периферійного венозного катетеру для проведення інфузійної терапії. Які підшкірні вени можуть бути використані для цього?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Будь-які вени
- ☐ b. Лише вени ліктьового згину
- ☐ c. Лише вени кисті
- ☐ d. Лише вени гомілки
- ☐ e. Лише вени голови


Коментар

Правильна відповідь: Будь-які вени

Питання 166

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 48-ми років оперована з приводу багатовузлового еутиреоїдного зоба IV ступеня. Операція на погляд хірурга пройшла без суттєвих ускладнень. Але у хворой з'явилася захриплість голосу, яка не зникла і при подальшому спостереженні під час перебування її в стаціонарі. Яке післяопераційне ускладнення настало у хворой?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пошкодження одного зворотного нерва
- ☐ b. Гематома загрудинного простору
- ☐ c. Пошкодження трахеї
- ☐ d. Пошкодження обох зворотних нервів
- ☐ e. Пошкодження блукаючого нерву


Коментар

Правильна відповідь: Пошкодження одного зворотного нерва

Питання 167

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 4-х років після відпочинку на морі розвинулося багаторазове блювання. Випорожнення ахолічне. Сеча світла. Доставлена у стаціонар з ознаками токсико-ексикозу на 3 день захворювання. З рота запах прілих фруктів. Які лабораторні дані першочергово потрібні для призначення терапії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Загальний аналіз і печінкові проби крові, бак. посів блювотних мас
- ☐ b. Цукор крові, сеча на ацетон
- ☐ c. Кров на білірубін, АЛТ, цукор
- ☐ d. Загальний аналіз і печінкові проби крові, цукор крові
- ☐ e. Кров на кетонові тіла, протеїнограма крові, ліпіди крові


Коментар

Правильна відповідь: Цукор крові, сеча на ацетон

Питання 168

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років тривалий час працював вантажником при вантаженні уранових руд. Впродовж останнього року став відмічати виражену загальну слабкість, постійний головний біль, що супроводжувався нудотою або блюванням. Погіршився сон, знизилась пам'ять. Іноді турбували задишка, біль в ділянці серця, напади серцебиття. Пізніше приєдналися часті носові кровотечі, на шкірі з'явилися множинні геморагії, виразково-некротичні зміни на слизових оболонках. Різко

знизився апетит. Які зміни з боку крові та кісткового мозку спостерігаються при такій клініці променевої хвороби?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпохромна анемія
- ☐ b. Регенерація еритроїдного ростка кісткового мозку збільшена
- ☐ c. Гіперхромна анемія
- ☐ d. Нормохромна анемія
- ☐ e. Збільшення клітин мієлоїдного ряду кісткового мозку


Коментар

Правильна відповідь: Гіперхромна анемія

Питання 169

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна у 41 тиждень вагітності готується до екстреного оперативного втручання під загальним знеболенням. При інтубації трахеї виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів, але в подальшому виник ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, з'явилися вологі хрипи. Яка причина такого стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Шок
- ☐ b. набряк легенів
- ☐ c. Інфаркт міокарду
- ☐ d. Аспірація кислого шлункового вмісту
- ☐ e. Емболія навколоплідними водами


Коментар

Правильна відповідь: Аспірація кислого шлункового вмісту

Питання 170

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 35-ти років, термін вагітності 40 тижнів, надійшла в коматозному стані після нападу судом, в першому періоді пологів. Набряки кінцівок та обличчя. Білок сечі - 3 г/л. Артеріальний тиск - 170/100 мм рт.ст., пульс - 90/хв. Серцебиття плода - 155/хв. Яким буде найімовірніший діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Прееклампсія тяжкого ступеня
- ☐ б. Екламптична кома
- ☐ в. Гостра ниркова недостатність
- ☐ г. Гіпоглікемічна кома
- ☐ д. Сепсис


Коментар

Правильна відповідь: Екламптична кома

Питання 171

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 73-х років 10 років тому переніс інфаркт міокарда. Під час роботи на городі впав. Пульсація на магістральних судинах та дихання відсутні. Вкажіть імовірний діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпертонічний криз
- ☐ б. Кардіогенний шок
- ☐ в. Набряк легень
- ☐ г. Раптова коронарна смерть
- ☐ д. Колапс


Коментар

Правильна відповідь: Раптова коронарна смерть

Питання 172

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 25-ти років, яка надійшла до приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги з приводу гострої ниркової недостатності, виникла зупинка роботи серця. Яка найбільш ймовірна причина зумовила такий стан?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіперфосфатемія
- ☐ b. Гіперкаліємія
- ☐ c. Гіпокаліємія
- ☐ d. Уремія
- ☐ e. Ацидоз


Коментар

Правильна відповідь: Гіперкаліємія

Питання 173

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 29-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на кров'янисті виділення з піхви та біль у правій здухвинній ділянці. Остання менструація була 11 тижнів тому. Вміст ХГ у сироватці крові нижче за нормативні показники для передбачуваного терміну вагітності. За даними ультразвукового дослідження (УЗД) плідне яйце в порожнині матки не визначається. В Дугласовому просторі виявлено вільну рідину з гіперехогенними включеннями. При піхвовому дослідженні: нависання склепінь, "крик Дугласа". При пункції заднього склепіння отримана кров, що не згортається.

Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Перекрут кісти яєчника
- ☐ b. Міхурцевий занесок
- ☐ c. Аборт, що розпочався
- ☐ d. Кровотеча з жовтого тіла яєчника
- ☐ e. Порушена позаматкова вагітність


Коментар

Правильна відповідь: Порушена позаматкова вагітність

Питання 174

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілого з множинною поєднаною травмою трубчастих кісток на догоспітальному етапі розвинувся гіповолемічний шок, лікарям вдалося поповнити дефіцит ОЦК та коригувати показники гемодинаміки. На початку другої доби у хворого ейфорія, в легенях вислуховується жорстке дихання, частота дихання - 30/хв., пульс 116/хв., на рентгенограмі - посилення легеневого малюнка, дрібновогнищеві тіні. Яка найбільш імовірна причина ускладнення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Плевропульмональний шок
- ☐ б. ТЕЛА
- ☐ в. ХОЗЛ
- ☐ г. Гостра позагоспітальна пневмонія
- ☐ д. Жирова емболія


Коментар

Правильна відповідь: Жирова емболія

Питання 175

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинку 12-ти років госпіталізовано у відділення реанімації з діагнозом "синдром Лаєлла". Температура - 39,1оС, пульс - 130/хв., частота дихання - 30/хв. Яку допомогу в першу чергу необхідно надати дитині?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Седативні препарати
- ☐ б. Системні кортикостероїди
- ☐ в. Гіпосенсибілізуючі препарати
- ☐ г. Вазодилататори
- ☐ д. Сечогінні препарати


Коментар

Правильна відповідь: Системні кортикостероїди

Питання 176

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 50-річного чоловіка протягом 2-х днів відзначаються рідкі випорожнення чорного кольору. Болю у епігастральній ділянці немає. При огляді: блідість шкірних покривів і кон'юнктиви, "судинні зірочки" на шкірі грудей, розширення вен передньої стінки живота, гепатомегалія. Артеріальний тиск - 105/60 мм рт.ст. Промивні води шлунка типу "кавової гущі". Лікар визначив кровотечу з вен стравоходу. Які препарати разом з трансфузією та гемостатичною терапією слід призначити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Алюмінію гідроокис
- ☐ b. Метоклопрамід
- ☐ c. Аргініну глутамат
- ☐ d. Тіотриазолін
- ☐ e. Вазопресин


Коментар

Правильна відповідь: Вазопресин

Питання 177

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого, який лікується у стаціонарі з приводу апендикулярного інфільтрату, на 5 добу посилився біль у правій здухвинній ділянці, з'явилася гарячка до 39°C з ознобом. Яка найбільш імовірна причина такого стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостра кишкова непрохідність
- ☐ b. Флегмона передньої черевної стінки
- ☐ c. Дифузний перитоніт
- ☐ d. Флегмона заочеревинного простору
- ☐ e. Апендикулярний абсцес


Коментар

Правильна відповідь: Апендикулярний абсцес

Питання 178

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У МедР надходять отруєні військово-службовці з осередку хімічного ураження сполуками хлору. На профілактику та лікування якого ускладнення повинні бути спрямовані лікувальні заходи?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ураження печінки
- ☐ b. Токсичний набряк легень
- ☐ c. Гострий психоз
- ☐ d. Судомний синдром
- ☐ e. Токсичне ураження нирок


Коментар

Правильна відповідь: Токсичний набряк легень

Питання 179

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 17-ти років була вжалена комахою в ділянку лівого передпліччя 5 днів тому. Через дві доби в ділянці вжалення з'явилася інфільтрація, гіперемія, набряк, посилився біль. Температура тіла - 37,8°C. В середній третині лівого передпліччя в підшкірній клітковині інфільтрат 4x4 см, з нечіткими контурами з флуктуацією в центрі. Шкіра над інфільтратом гіперемована, локальне підвищення температури тіла. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Алергічна реакція на вжалення комахою
- ☐ b. Тромбофлебіт вен передпліччя
- ☐ c. Бешиха
- ☐ d. Абсцес
- ☐ e. Запальний інфільтрат


Коментар

Правильна відповідь: Абсцес

Питання 180

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 43-х років, якого було госпіталізовано у гастроентерологічне відділення з діагнозом "цироз печінки з портальною гіпертензією III ступеня", після проведеного форсованого діурезу з'явилися ознаки печінкової енцефалопатії III ступеня. Призначення яких препаратів повинно бути першочерговим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інгібітори протеаз
- ☐ b. Гепатопротектори
- ☐ c. Діуретики
- ☐ d. Інсулін
- ☐ e. Лактулоза


Коментар

Правильна відповідь: Лактулоза

Питання 181

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення доставлений хворий 50-ти років, скаржиться на гострий біль в верхній половині живота, слабкість, перебої в серці. Занедужав гостро після нервово-психічного напруження. Об'єктивно: шкіра бліда, тони серця глухі, ритм неправильний. Пульс - 105/хв. Артеріальний тиск - 95/60 мм рт.ст. Язик чистий, сухий. Живіт м'який, безболісний. На ЕКГ - елевація сегменту ST у II, III, aVF відведеннях. Яка найбільш можлива причина гострого болю у даного хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Діафрагмальна кила
- ☐ b. Виразкова хвороба шлунка
- ☐ c. Тромбоз мезентеріальних судин
- ☐ d. Гострий інфаркт міокарда
- ☐ e. Гострий панкреатит


Коментар

Правильна відповідь: Гострий інфаркт міокарда

Питання 182

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Сімейний лікар на виклику у пацієнтки 72-х років з артеріальною гіпертензією. Хвора скаржиться на головний біль, запаморочення. Стан погіршився раптово, у зв'язку з різким погіршенням погоди. Лікується еналаприлом. Об'єктивно: артеріальний тиск - 180/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 86/хв. Тони серця приглушені, ритм правильний. В неврологічному стані без вогнищевої симптоматики. Який темп зниження артеріального тиску є оптимальним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Протягом 30 хвилин
- ☐ б. Протягом години
- ☐ в. Значення не має
- ☐ г. Протягом 6-8 годин
- ☐ д. Протягом 48 годин


Коментар

Правильна відповідь: Протягом 6-8 годин

Питання 183

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Новонароджений, який народився у стані важкої асфіксії, на 3-тю добу життя мають місце ністагм, опістотонус, часті напади судом, відсутні рефлексі смоктання та ковтання. Запідозрено внутрішньочерепний крововилив. Який метод дослідження слід призначити для підтвердження діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Люмбальна пункція
- ☐ б. Клінічний аналіз крові
- ☐ в. Кисотно-лужний баланс крові
- ☐ г. УЗД головного мозку
- ☐ д. Електроенцефалографія

Коментар

Правильна відповідь: УЗД головного мозку

Питання 184

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Породілля 2 доби після ускладнених хо- ріоамніонітом пологів отримує антибактеріальну терапію (цефазолін 3 г на добу). Раптом загальний стан стрімко погіршився, з'явилися лихоманка з підвищенням температури до 39,0оС, частота серцевих скорочень до 120/хв., частота дихальних рухів до 26/хв. та зниженням артеріального тиску до 80/40 мм рт.ст. Встановіть діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Септичний шок
- ☐ b. Напад бронхіальної астми
- ☐ c. Ортостатичний колапс
- ☐ d. Анафілактичний шок
- ☐ e. Гіпотонія


Коментар

Правильна відповідь: Септичний шок

Питання 185

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 52-х років госпіталізований у відділення інтенсивної терапії зі скаргами на інтенсивний біль за грудниною, виражену задишку, загальну слабкість, серцебиття. Свідомість потьмарена. Шкірні покриви бліді, вологі, холодні. Артеріальний тиск 60/40 мм рт.ст., пульс - 116/хв. Олігурія. ЕКГ: елевація сегменту ST I, II, avL, V2-V5, QS V2-V5. Який медикаментозний препарат при даному ускладненні найбільш доцільно ввести хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ніфедипін
- ☐ b. Фуросемід
- ☐ c. Аміодарон
- ☐ d. Бісопролол
- ☐ e. Добутамін


Коментар

Правильна відповідь: Добутамін

Питання 186

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 70-ти років скаржиться на гострий біль у правій гомілці та стопі. Захворів гостро, явної причини не відзначає. Під час огляду: шкіра гомілки та стопи бліда, холодна на дотик, тактильна та больова чутливість збережені. Пульсація на стегновій артерії правої кінцівки збережена, на підколінній та на судинах стоп - не спостерігається. Яким буде діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Бешихове запалення
- ☐ b. Артрит гомілковостопного суглоба
- ☐ c. Гострий тромбофлебіт
- ☐ d. Глибокий флеботромбоз
- ☐ e. Тромбоз правої підшкірної артерії


Коментар

Правильна відповідь: Тромбоз правої підшкірної артерії

Питання 187

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лаборант 40-ка років, який в портовому місті при дослідженні матеріалу від померлих внаслідок епізоотії щурів виявив короткі палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, поступив до інфекційної лікарні зі скаргами на різучий біль у грудях, підвищення температури тіла до 40°C, ядуху, кашель з виділенням спочатку слизового, а потім кров'янистого харкотиння. При огляді стан хворого дуже тяжкий. Виражена блідість шкірних покривів. Акроціаноз. Аускультативно: ослаблення дихання в легенях з обох сторін. Сатурація 65%. Яка найбільш ймовірна етіологія гострої дихальної недостатності у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. *Bacillus anthraci*
- ☐ b. *Yersinia pesti*
- ☐ c. *Francisella tularensi*
- ☐ d. *Yersinia pseudotuberculosis*
- ☐ e. *Streptococcus pneumoniae*

Коментар

Правильна відповідь: *Yersinia pesti*

Питання 188

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Немовля віком 1 місяць. Протягом 10-ти діб має місце блювання, що виникає не після кожного прийому їжі, однак об'єм блювотних мас перевищує об'єм одноразового годування. Блювотні маси являють собою згорнуте материнське молоко з кислим запахом. Апетит не порушений, але вага тіла прогресивно зменшується. Найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гастроентерит
- ☐ b. Інвагінація
- ☐ c. Пухлина мозку
- ☐ d. Кишкова непрохідність
- ☐ e. Пілоростеноз

Коментар

Правильна відповідь: Пілоростеноз

Питання 189

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 49-ти років, що знаходиться в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово виникла зупинка серцевої діяльності та дихання. Почато серцево-легеневу реанімацію. Наступним необхідним кроком є:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Визначення рН крові
- ☐ b. Визначення рівня глюкози крові
- ☐ c. Реєстрація електроенцефалограми
- ☐ d. Оцінка ЕКГ-ритму
- ☐ e. Визначення рівня калію крові

Коментар

Правильна відповідь: Оцінка ЕКГ-ритму

Питання 190

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної в терміні 36 тижнів з'явилися скарги на локальний біль у матці, який надалі поширився на всю матку; спостерігаються кров'янисті виділення зі статевих шляхів. При пальпації матка напружена, асиметрична, не розслабляється. Дрібні частини плоду не визначаються. Серцебиття плоду не вислуховується. Яка найбільш імовірна причина загибелі плоду?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Пізній гестоз
- ☐ б. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
- ☐ в. Розрив матки
- ☐ г. Загроза передчасних пологів
- ☐ д. Передлежання плаценти

Коментар

Правильна відповідь: Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти

Питання 191

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У приймальне відділення доставлений потерпілий з опіком полум'ям III Б-IV ст. обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Волосся у ніздрях обгоріло, слизова губ, язик сіро-білого кольору. Голос хриплий, дихання часте, поверхнєве; "трубний кашель", що супроводжується виділенням харкотиння з домішками кіптяви. Під час транспортування у відділення інтенсивної терапії почали наростати явища дихальної недостатності. Який необхідний об'єм допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інгаляція зволоженого кисню
- ☐ б. Введення муколітиків
- ☐ в. Інгаляції β 2-агоністів короткої дії
- ☐ г. Введення дихальних аналептиків
- ☐ д. Інтубація трахеї та ШВЛ

Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї та ШВЛ

Питання 192

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 9-ти років після перенесеної ГРВІ з'явилися полідипсія, поліурія, слабкість, нудота. При обстеженні: свідомість потьмарена, шкіра суха, очні яблука м'які, дихання Куссмауля, запах ацетону з рота, серцеві тони глухі, живіт м'який, неболючий. Глюкоза крові - 19 ммоль/л. Які цукрознижувальні препарати слід призначити в комплексній терапії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інсулін короткої дії
- ☐ b. Препарати сульфонілсечовини
- ☐ c. Інгібітор α -глюкозидази
- ☐ d. Інсулін пролонгований
- ☐ e. Бігуаніди

Коментар

Правильна відповідь: Інсулін короткої дії

Питання 193

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина від третьої вагітності, перших стрімких пологів в терміні гестації 34 тижні, масою тіла 2250 г, довжиною 48 см. При огляді тахіпное, періодичне апное, центральний ціаноз, втягнення податливих місць грудної клітки. Запідозрено синдром дихальних розладів (СДР). За якою шкалою оцінити важкість СДР?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. SNAPS
- ☐ b. Сільвермана
- ☐ c. Глазго
- ☐ d. Апгар
- ☐ e. SCORAD

Коментар

Правильна відповідь: Сільвермана

Питання 194

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 25-ти років доставлений в приймальне відділення в несвідомому стані. Зі слів родичів, під час фізичного навантаження раптово з'явилося тремтіння, виражена пітливість, а потім втрата свідомості. З 13-ти років страждаєна цукровий діабет, використовує інсулінотерапію. З чого слід почати лікування даного стану?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Глюкоза 40% 20 мл в/в
- ☐ b. Інсулін пролонгованої дії п/ш
- ☐ c. Глюкоза 5% 200 мл в/в
- ☐ d. Преднізолон 30 мг в/в
- ☐ e. Інсулін короткої дії п/ш

Коментар

Правильна відповідь: Глюкоза 40% 20 мл в/в

Питання 195

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженого за шкалою Апгар визначається 3 бали: центральний ціаноз, дихання типу "гаспінг", м'язова гіпотонія, арефлексія, частота серцевих скорочень - 58/хв. Пологи термінові, маса тіла - 3850 г, спостерігалось дворазове туге обвиття пуповиною довкола шиї. Першочергово треба: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Почати штучну вентиляцію легень (ШВЛ) мішком Амбу і маскою та непрямий масаж серця
- ☐ b. Ввести адреналін
- ☐ c. Почати непрямий масаж серця
- ☐ d. Почати штучну вентиляцію легень (ШВЛ) за методом спонтанного дихання з постійним позитивним тиском (СДППТ)
- ☐ e. Почати оксигенотерапію

Коментар

Правильна відповідь: Почати штучну вентиляцію легень (ШВЛ) мішком Амбу і маскою та непрямий масаж серця

Питання 196

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До амбулаторії сімейного лікаря доставлений хворий зі скаргами на нудоту, блювання, пронос, біль у животі, миготіння метеликів та наявність сітки перед очима, подвоєння перед очима оточуючих предметів. З анамнезу відомо, що 3 години тому вживав алкогольні напої. При огляді: хворий загальмований, не реагує на больові подразники, шкірні покриви та видимі слизові оболонки сухі, тотальний ціаноз, мідріаз, пригнічення фотореакції, частота серцевих скорочень - 120/хв., артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст. Чим отруївся хворий?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Етиловий спирт
- ☐ б. Метиловий спирт
- ☐ в. Оцтова кислота
- ☐ г. Ацетон
- ☐ д. Етиленгліколь

Коментар

Правильна відповідь: Метиловий спирт

Питання 197

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 36-ти років близько 3-х годин тому отримав проникаюче ножове поранення лівої половини грудної клітки. Доставлений в тяжкому стані: ейфорія, шкірні покриви бліді, тони серця глухі, тахікардія-130/хв., артеріальний тиск - 80/70 мм рт.ст. Пульс на зап'ястку ледь визначається. Рана грудної клітки 2 см, розташована зліва по парастернальній лінії на рівні III міжреберного проміжку. Дихання над лівою легенею ослаблене, в задньо-нижніх відділах вкорочений перкуторний звук. Які лікувальні заходи найбільш доцільні?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Переливання крові
- ☐ б. Комплекс реанімаційних заходів
- ☐ в. Пункція перикарду
- ☐ г. Невідкладна торакотомія
- ☐ д. Плевральна пункція


Коментар

Правильна відповідь: Невідкладна торакотомія

Питання 198

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 11-ти місяців спостерігаються адинамія, фебрильна температура, кашель, ціаноз, дистантні хрипи. Частота дихання - 90/хв. Фізикальні дані: перкуторно - коробковий звук, аускультативно - жорстке дихання, тотальні дрібноміхурцеві хрипи. 20 хвилин проводилась інсуфляція 100% кисню через маску. Рентгенологічно – ознаки емфіземи. В артеріальній крові: РаО₂ - 55 мм рт.ст., рН- 7,2. З чого доцільно розпочати терапію?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпербарична оксигенація
- ☐ b. Штучна вентиляція легень
- ☐ c. Інгаляція й інфузія глюкокортикоїдів і амброксолу
- ☐ d. Киснева палатка з інгаляцією амброксолу
- ☐ e. Киснева маска з інфузією глюкокортикоїдів


Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 199

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У військовий польовий шпиталь надійшло 8 солдат з місця події. У потерпілих відзначається слабкість, нудота, гіркота у роті, слинотеча. В одного бійця шкіра та слизові оболонки яскраво-червоного кольору, брадикардное, брадикардія, судоми. Зі слів потерпілих, на місці події відзначався різкий запах гіркого мигдалю. Найімовірніше, отруйною речовиною є:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Зарин
- ☐ b. Синильна кислота
- ☐ c. Іприт
- ☐ d. Зоман
- ☐ e. Фосген


Коментар

Правильна відповідь: Синильна кислота

Питання 200

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Повторновагітна 28-ми років в терміні 36 тижнів госпіталізована у відділення патології вагітності зі скаргами на головний біль, підвищення тиску до 160/110 мм рт.ст. та значні набряки кінцівок, живота, обличчя. В сечі: білок - 1,3 г/л та циліндри. В анамнезі: гіпертонічна хвороба та хронічний пієлонефрит. На тлі інтенсивної терапії стан вагітної погіршився, з'явилися порушення зору та утруднене носове дихання. Білок зріс до 2,6 г/л, а тиск піднявся до 170/120 мм рт.ст. Яка тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Індукувати пологи та провести розродження через природні пологові шляхи
- ☐ b. Термінове розродження - кесарів розтин
- ☐ c. Інтенсивна гіпотензивна, діуретична та седативна терапія
- ☐ d. Індукувати пологи і 2-й період виключити акушерськими щипцями
- ☐ e. Проведення інтенсивної терапії та пролонгування вагітності

Коментар

Правильна відповідь: Термінове розродження - кесарів розтин

[Завершити перегляд](#)

[Пропустити Перехід по тесту](#)

[Перехід по тесту](#)

[Питання 1](#) [На цій сторінці](#) [Питання 2](#) [На цій сторінці](#) [Питання 3](#) [На цій сторінці](#) [Питання 4](#) [На цій сторінці](#) [Питання 5](#) [На цій сторінці](#) [Питання 6](#) [На цій сторінці](#) [Питання 7](#) [На цій сторінці](#) [Питання 8](#) [На цій сторінці](#) [Питання 9](#) [На цій сторінці](#) [Питання 10](#) [На цій сторінці](#) [Питання 11](#) [На цій сторінці](#) [Питання 12](#) [На цій сторінці](#) [Питання 13](#) [На цій сторінці](#) [Питання 14](#) [На цій сторінці](#) [Питання 15](#) [На цій сторінці](#) [Питання 16](#) [На цій сторінці](#) [Питання 17](#) [На цій сторінці](#) [Питання 18](#) [На цій сторінці](#) [Питання 19](#) [На цій сторінці](#) [Питання 20](#) [На цій сторінці](#) [Питання 21](#) [На цій сторінці](#) [Питання 22](#) [На цій сторінці](#) [Питання 23](#) [На цій сторінці](#) [Питання 24](#) [На цій сторінці](#) [Питання 25](#) [На цій сторінці](#) [Питання 26](#) [На цій сторінці](#) [Питання 27](#) [На цій сторінці](#) [Питання 28](#) [На цій сторінці](#) [Питання 29](#) [На цій сторінці](#) [Питання 30](#) [На цій сторінці](#) [Питання 31](#) [На цій сторінці](#) [Питання 32](#) [На цій сторінці](#) [Питання 33](#) [На цій сторінці](#) [Питання 34](#) [На цій сторінці](#) [Питання 35](#) [На цій сторінці](#) [Питання 36](#) [На цій сторінці](#) [Питання 37](#) [На цій сторінці](#) [Питання 38](#) [На цій сторінці](#) [Питання 39](#) [На цій сторінці](#) [Питання 40](#) [На цій сторінці](#) [Питання 41](#) [На цій сторінці](#) [Питання 42](#) [На цій сторінці](#) [Питання 43](#) [На цій сторінці](#) [Питання 44](#) [На цій сторінці](#) [Питання 45](#) [На цій сторінці](#) [Питання 46](#) [На цій сторінці](#) [Питання 47](#) [На цій сторінці](#) [Питання 48](#) [На цій сторінці](#) [Питання 49](#) [На цій сторінці](#) [Питання 50](#) [На цій сторінці](#) [Питання 51](#) [На цій сторінці](#) [Питання 52](#) [На цій сторінці](#) [Питання 53](#) [На цій сторінці](#) [Питання 54](#) [На цій сторінці](#) [Питання 55](#) [На цій сторінці](#) [Питання 56](#) [На цій сторінці](#) [Питання 57](#) [На цій сторінці](#) [Питання 58](#) [На цій сторінці](#) [Питання 59](#) [На цій сторінці](#) [Питання 60](#) [На цій сторінці](#) [Питання 61](#) [На цій сторінці](#) [Питання 62](#) [На цій сторінці](#) [Питання 63](#) [На цій сторінці](#) [Питання 64](#) [На цій сторінці](#) [Питання 65](#) [На цій сторінці](#) [Питання 66](#) [На цій сторінці](#) [Питання 67](#) [На цій сторінці](#) [Питання 68](#) [На цій сторінці](#) [Питання 69](#) [На цій сторінці](#) [Питання 70](#) [На цій сторінці](#) [Питання 71](#) [На цій сторінці](#) [Питання 72](#) [На цій сторінці](#) [Питання 73](#) [На цій сторінці](#) [Питання 74](#) [На цій сторінці](#) [Питання 75](#) [На цій сторінці](#) [Питання 76](#) [На цій сторінці](#) [Питання 77](#) [На цій сторінці](#)

[illegible]

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

Учасники

Відзнаки

Компетентності

Журнал оцінок

Загальне

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

[Контрольні тестування](#)

[Секція 6](#)

[Секція 7](#)

[Секція 8](#)

[Секція 9](#)

[Секція 10](#)

[Секція 11](#)

[Секція 12](#)

[Секція 13](#)

[Секція 14](#)

[Секція 15](#)

[Особистий кабінет](#)

[Домашня сторінка](#)

[Календар](#)

[Особисті файли](#)

Мої курси

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручняк Оксана Богданівна \(Вийти\)](#)
[КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)

- [Українська \(uk\)](#)
 - - [English \(en\)](#)
 - [Русский \(ru\)](#)
 - [Українська \(uk\)](#)