

[Перейти до головного вмісту](#)  
[Бокова панель](#)  
[КРОК-123](#)

(Інтерн БДМУ) Підручник Оксана Богданівна

П

Особистий кабінетПрофіль користувачаОцінкиПовідомленняУподобанняВийтиПовідомлення  
[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане  
Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане  
Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)


[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

## КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Секція 3](#)
- [2017 весна](#)

Розпочато	Tuesday 14 February 2023 18:05 PM
Стан	Завершено
Завершено	Tuesday 14 February 2023 20:37 PM
Витрачено часу	2 години 32 хв
Балів	0,00/200,00
Оцінка	0,00 з 100,00 можливих
Питання 1	

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий з опіками обох гомілок 10% поверхні тіла, стадія 2-А, опіковий шок середньої важкості. Яку невідкладну допомогу необхідно надати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Знеболювання та введення кортизону
- ☐ б. Знеболювання та введення розчину Рінгер-лактату
- ☐ в. Введення діуретиків та асептична пов'язка на раневу поверхню
- ☐ г. Введення колоїдних розчинів
- ☐ д. Введення антибіотиків та охолодження гомілок


Коментар

Правильна відповідь: Знеболювання та введення розчину Рінгер-лактату

## Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 66-ти років знаходиться на землі під багатоповерхівкою. Випав з балкона. Скаржиться на сильний біль у правій нозі. Об'єктивно: блідий, праве стегно і гомілка деформовані, патологічна рухомість і крепітація кісткових уламків у верхній третині правого стегна і гомілки. Яку транспортну іммобілізацію застосуєте?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Дві шини Крамера на праву ногу
- ☐ б. Шину Дітерікса на праву ногу
- ☐ в. Шину Крамера на праву ногу
- ☐ г. Прибинтувати ліву і праву ноги разом
- ☐ д. Підручну дерев'яну планку на праву ногу

Коментар

Правильна відповідь: Шину Дітерікса на праву ногу

## Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

24-річна жінка з першим типом цукрового діабету народила дитину масою 3856 г в 38 тижнів гестації. Вагітність була ускладнена поганим контролем за перебігом діабету. Пологи тривали 4 години. Оцінка дитини по шкалі Апгар на 1 хв. - 5 балів, на 5 хв. - 6 балів. Яке найбільш доцільне дослідження крові плода через 30 хвилин після народження?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Визначення гематокриту
- ☐ b. Визначення рН крові плода
- ☐ c. Дослідження рівня глюкози в сироватці крові
- ☐ d. Дослідження рівня білірубіну в сироватці крові
- ☐ e. Визначення групи крові та резус-фактору


Коментар

Правильна відповідь: Дослідження рівня глюкози в сироватці крові

#### Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшла 70-річна жінка в зв'язку з раптовим виникненням задишки. Раніше в неї подібних симптомів не спостерігалось. Хрипів під час дихання, болю в грудях, набряку ніг, пришвидшеного серцебиття чи втрати свідомості у пацієнтки не спостерігається. До її інших медичних проблем належать гіпертонія, цукровий діабет 2 типу, гіперхолестеринемія та бронхіальна астма, набута в дитячому віці. Наразі пацієнтка приймає лізиноприл, метформін та симвастатин. Її було госпіталізовано лише один раз, 2 місяці тому, коли їй було здійснено артродез хребців через проблеми з попереком. Вона не палить та не вживає алкоголь чи наркотики. Сімейний анамнез не містить важливої інформації. Температура тіла становить 36,1°C, АТ- 210/105 мм рт.ст., Рс- 92/хв., ЧД- 34/хв. Пульсова оксиметрія - 81% при диханні кімнатним повітрям. Фізикальне обстеження виявило дифузні хрипи над легеневими полями. Результати лабораторного дослідження: гемоглобін - 114 г/л (норма: для чоловіків - 135-175 г/л, для жінок - 120-160 г/л), тромбоцити - 180 • 10<sup>9</sup>/л (норма - 150-400 • 10<sup>9</sup>/л), лейкоцити - 8•10<sup>9</sup>/л (норма - 4,5-11, 0•10<sup>9</sup>/л). Пацієнтці дають кисень. Що є найдоцільнішим наступним кроком у веденні даної пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Фуросемід внутрішньовенно
- ☐ b. Морфін внутрішньовенно
- ☐ c. Альбутерол за допомогою небулайзера
- ☐ d. Метопролол внутрішньовенно

☐ е. Гепарин внутрішньовенно  
Коментар

Правильна відповідь: Фуросемід внутрішньовенно

## Питання 5

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Рядовий під час вибуху відкинутий вибуховою хвилею і при падінні вдарився головою об землю. Встановлено діагноз: вибухова травма. Закрита черепно-мозкова травма. Забій головного мозку важкого ступеня. Перелом кісток склепіння черепа. Підшкірна гематома лівої скроневої ділянки. Стиснення головного мозку внутрішньочерепною гематомою. Травматична кома. Після надання першої лікарської допомоги евакуація буде здійснена:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. У другу чергу лежачи в фіксованому положенні на боку
- ☐ б. У першу чергу лежачи в фіксованому положенні на спині
- ☐ в. Не буде здійснюватись
- ☐ г. У першу чергу лежачи в фіксованому положенні на животі
- ☐ е. У першу чергу лежачи в фіксованому положенні на боку

Коментар

Правильна відповідь: У першу чергу лежачи в фіксованому положенні на боку

## Питання 6

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На місці дорожньо-транспортної пригоди знайдено дитину в напівнепритомному стані з кровотечею із лівого стегна. Периферичний пульс слабкий. АТ знижений, ЧСС- 120/хв. В якому положенні слід транспортувати потерпілого до спеціалізованого стаціонару?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Положення Тренделенбурга
- ☐ б. Укласти потерпілого на дошку і зафіксувати на ній
- ☐ в. Напівсидяче положення
- ☐ г. Положення на правому боці

☐ е. Накласти комір Шанца  
Коментар

Правильна відповідь: Положення Тренделенбурга

## Питання 7

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка 30-ти років тривалий час страждає на епілепсію. Випила 100 г вина, через день з'явилися постійні великі судомні напади з тонічними та клонічними судомами, між якими хвора залишається непритомною. Об'єктивно: на дотик та больові подразники не реагує, зіниці вузькі, реакція на світло квола. Тонус м'язів знижений. Яка тактика лікаря?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Направити хвору в відділення інтенсивної терапії
- ☐ б. Направити хвору у психіатричне відділення
- ☐ в. Призначити консультацію лікаря-епілептолога
- ☐ г. Проводити амбулаторне лікування
- ☐ е. Направити хвору в неврологічне відділення

Коментар

Правильна відповідь: Направити хвору в відділення інтенсивної терапії

## Питання 8

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікар швидкої допомоги, приїхавши на місце ДТП, діагностував закритий перелом правого стегна в середній третині. Яким повинен бути обсяг допомоги?  
Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Іммобілізація трьома шинами Крамера до пахвинної ділянки
- ☐ б. Іммобілізація трьома шинами Крамера до кульшового суглоба
- ☐ в. Знеболення введенням в місце перелому 1% р-ну новокаїну, іммобілізація шиною Дітерікса, внутрішньовенне введення розчинів
- ☐ г. Знеболення, іммобілізація шиною Дітерікса, інфузійна терапія


☐ е. Знеболення наркотичними препаратами, фіксація пошкодженої кінцівки до здорової

Коментар

Правильна відповідь: Знеболення, іммобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія

## Питання 9

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

68-річного чоловіка зі скаргами на потьмарений стан свідомості та сонливість дочка доставила у лікарню невідкладної медичної допомоги. Вона стверджує, що її батько живе сам і хворіє на цукровий діабет 2 типу та гіпертонію. Він приймає аспірин, еналаприл та гліпізид. Гарячки не має. АТ- 95/60 мм рт.ст., Рс- 132/хв., ЧД- 22/хв. Пацієнт має сонний вигляд та ледве здатен спілкуватися. Обстеження виявило сухі слизові оболонки, відсутність розширення яремної вени, чисті легеневі поля та нормальні тони серця. Живіт м'який, неболючий, без здуття. Неврологічне обстеження виявило дезорієнтацію у часі та просторі. Пацієнт може рухати всіма кінцівками, менингеальних симптомів не спостерігається. Результати лабораторних досліджень: Клінічний аналіз крові: гемоглобін - 160 г/л (норма: для чоловіків - 135-175 г/л, для жінок - 120-160 г/л), середній об'єм еритроцитів - 90 фл (норма - 80-100 фл), тромбоцити -  $300 \cdot 10^9$ /л (норма -  $150 \cdot 10^9$  -  $400 \cdot 10^9$ /л), лейкоцити -  $10 \cdot 10^9$ /л (норма - 4,5-11, 0  $10^9$ /л), нейтрофіли - 70% (норма - 54-62%), лімфоцити - 22% (норма - 25-33%), моноцити - 8% (норма - 3-7%). Біохімічний аналіз: натрій сироватки крові - 151 ммоль/л (норма - 136-145 ммоль/л), калій сироватки крові - 6,1 ммоль/л (норма - 3,5-5,0 ммоль/л), хлорид - 121 ммоль/л (норма - 95-105 ммоль/л), бікарбонат - 18 ммоль/л (норма - 22-28 ммоль/л), азот сечовини крові - 15 ммоль/л (норма - 2,5-6,4 ммоль/л), креатинін сироватки крові - 141 мкмоль/л (норма - 53-106 мкмоль/л), кальцій - 2,5 ммоль/л (норма - 2,1-2,55 ммоль/л), глюкоза крові - 43,9 ммоль/л (норма - 3,8-6,1 ммоль/л). Кетони сироватки - результат негативний. На електрокардіограмі помітна фібриляція передсердь, тахісistolічна форма. Наявні неспецифічні зміни Т-хвилі. Що з наведеного слід зробити в першу чергу під час ведення даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Регулювання швидкості фібриляції передсердь
- ☐ б. Корекція гіперкалемії
- ☐ в. Регулювання ритму фібриляції передсердь
- ☐ г. Відновлення обсягу рідини
- ☐ е. Терапія інсуліном у великій дозировці

Коментар

Правильна відповідь: Відновлення обсягу рідини

## Питання 10

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 15-ти років госпіталізована зі скаргами на блювання "кавовою гущею", жовтушність шкіри, носові кровотечі, лихоманку. Об'єктивно: дихання уповільнене, шкіра іктерична, ЧСС- 110/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. В біохімічному аналізі крові: АлАт-2,2 мкмоль/год•л; АсАт- 3,0 мкмоль/год•л; загальний білірубін - 160 мкмоль/л, протромбіновий індекс - 30%, фібриноген - 1,1 г/л. Із анамнезу: дитина страждає на хворобу Вільсона-Коновалова. Яке ускладнення виникло у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра наднирникова недостатність
- ☐ б. Гостра печінкова недостатність
- ☐ в. Гемолітичний криз
- ☐ г. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ д. Гостра ниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

## Питання 11

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У першовагітної 27-ми років вагітність 39-40 тижнів положення плода поздовжнє, голівка притиснута до площини входу в малий таз. Розміри тазу 23-26-29-18. Перейми болючі, тривалість 10 годин, навколоплідні води відійшли 2 години тому, роділля неспокійна. Серцебиття плода ритмічне 160/хв. При зовнішньому акушерському обстеженні встановлено: контракційне кільце розташоване косо, знаходиться вище пупа, ознака Вастена позитивна, матка в нижньому сегменті різко болюча, круглі зв'язки матки напружені. Про яку патологію слід думати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Слабкість пологової діяльності
- ☐ б. Дискоординована пологова діяльність
- ☐ в. Передчасне відшарування плаценти
- ☐ г. Розрив матки, що відбувся
- ☐ д. Загроза розриву матки

Коментар

Правильна відповідь: Загроза розриву матки

## Питання 12

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 6-ти років доставлена в лікарню у зв'язку з гострим розвитком поширених висипань на шкірі обличчя, тулуба, кінцівок, що супроводжуються сильним свербіжем. З слів мами напередодні вона приймала в їжу багато шоколадних цукерок, даний стан розвинувся вперше. Об'єктивно: патологічний процес носить поширений характер. Висипання представлені гострозапальними набряклими яскраво-червоними елементами овальної і поліциклічної форми, що підвищуються над поверхнею шкіри. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Хронічна кропив'янка
- ☐ b. Мастоцитоз
- ☐ c. Гостра кропив'янка
- ☐ d. Набряк Квінке
- ☐ e. Токсико-алергічний дерматит

Коментар

Правильна відповідь: Гостра кропив'янка

### Питання 13

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 34-х років через 2 тижні після пологів з'явився біль в лівій нижній кінцівці. Ліве стегно і гомілка різко збільшилися в об'ємі за рахунок набряку. Відмічена синюшність шкірних покривів. Пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ілеофemorальний тромбоз
- ☐ b. Попереково-крижовий радикуліт
- ☐ c. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен
- ☐ d. Облітеруючий ендартеріїт
- ☐ e. Гострий артеріальний тромбоз


Коментар

Правильна відповідь: Ілеофemorальний тромбоз

### Питання 14



Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

24-річний італієць у супроводі своєї дівчини звернувся до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на утруднене дихання. Протягом останніх двох місяців перебуває з дівчиною в Україні. Задишка у пацієнта розпочалася 4 дні тому і поступово погіршується. Під час бесіди з лікарем йому кілька разів доводилося замовкати, щоб звести дух. Дівчина каже, що 2 тижні тому він переніс гастроентерит, який супроводжувався домішками крові у випорожненнях. Діарея припинилася раптово, але після цього він почувався дуже втомленим і виснаженим. Через тиждень по тому пацієнт почав відчувати поколювання у ступнях та пальцях ніг. Ще через три дні він почувався настільки слабким, що не міг підвестися з ліжка, його дихання стало утрудненим. Цього ранку проблеми з диханням стали ще серйознішими, і він вирішив звернутися до відділення невідкладної медичної допомоги. Анамнез життя та сімейний анамнез не фіксують значних захворювань. Пацієнт стверджує, що ніколи не вживав наркотики внутрішньовенно, не палить, не вживає алкоголь та не наражається на інші ризики ВІЛ-захворювання. Температура тіла становить 37,6°C, АТ- 140/60 мм рт.ст., ЧД-28/хв., Рс- 96/хв. Результати обстеження легень та серцево-судинної системи в нормі. Неврологічне обстеження виявило атонічний параліч обох нижніх кінцівок. Глибокі сухожилкові рефлекс також відсутні з обох боків. Інші результати неврологічного обстеження, в тому числі ретельне обстеження черепних нервів, перебувають в межах норми. Якою буде наступна дія у веденні даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Почати давати антибіотики внутрішньовенно
- ☐ б. Надіслати культури крові на аналіз
- ☐ в. Забезпечити допоміжну штучну вентиляцію легень
- ☐ г. Провести негайний хімічний аналіз сироватки крові та виміряти рівень електроліту
- ☐ д. Дати ботулінічний антитоксин

Коментар

Правильна відповідь: Забезпечити допоміжну штучну вентиляцію легень

## Питання 15

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 10-ти років страждає на бронхіальну астму впродовж 5-ти років. Під час прийому сімейним лікарем у поліклініці у хворого розвився приступ ядухи. Який препарат слід використовувати для надання невідкладної допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Атровент Н

- ☐ b. Сальбутамол
- ☐ c. Фликсотид
- ☐ d. Но-шпа
- ☐ e. Кеналог-40


Коментар

Правильна відповідь: Сальбутамол

## Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 2-х років з тетрадою Фалло на фоні плачу почався задишечно-ціанотичний напад. Об'єктивно: шкірні покриви і видимі слизові ціанотичні, тахіпное - 60/хв., ЧСС- 140/хв. Який першочерговий захід при купіруванні нападу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Застосування адреноміметиків
- ☐ b. Накладання шунта між легеневою і підключичною артеріями
- ☐ c. Застосування  $\beta$ -адреноблокаторів
- ☐ d. Застосування серцевих глікозидів
- ☐ e. Положення з притиснутими до грудей колінами


Коментар

Правильна відповідь: Положення з притиснутими до грудей колінами

## Питання 17

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На стаціонарному лікуванні перебуває вагітна жінка 33-х років. Строк вагітності 34 тижні. Впродовж останніх 2-х діб скаржиться на головний біль, запаморочення, відчуття тяжкості в ділянці потилиці, зорові розлади. Мають місце набряки. АТ- 160/120 мм рт.ст., ЧСС- 88/хв. В сечі: протягом доби зростаюча протеїнурія до 3,2 г/л. Діурез знижений. Яка найбільш імовірна патологія зумовила цю симптоматику?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Преєклампсія середньої тяжкості

- ☐ b. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ c. Гіпертонічний криз
- ☐ d. Тяжка прееклампсія
- ☐ e. Еклампсія


Коментар

Правильна відповідь: Тяжка прееклампсія

## Питання 18

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

20-річний юнак надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на підвищену температуру, дисфагію, слинотечу та погану координацію рухів. Симптоми з'явилися протягом останнього тижня й супроводжуються невеликим підвищенням температури, болем у горлі та загалом поганим самопочуттям. Він може вживати їжу, але пити боїться, оскільки відчуває, як у нього "перехоплює горло". Пацієнт є студентом-антропологом, 2 місяці тому він їздив в експедицію, під час якої обстежував декілька печер. Він вжив кілька знеболювальних засобів з тих, що відпускаються без рецепту, але полегшення не настало. Пацієнт не пригадує, щоб він контактував із тваринами, зазнавав укусів чи подряпин. У нього є всі належні щеплення, жодних ліків він не приймає. Стан фебрильний, тахікардія. Обстеження виявляє дегідрацію, летаргічний стан, атаксію. В роті накопичується надлишок слини. Фарингеальної еритеми чи ексудату не спостерігається. Який діагноз є найімовірнішим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Коклюш
- ☐ b. Сказ
- ☐ c. Правець
- ☐ d. Епіглотит
- ☐ e. Гістоплазмоз


Коментар

Правильна відповідь: Сказ

## Питання 19

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 42-х років надійшла в урологічне відділення зі скаргами на часті приступи гострих болів у правій поперековій області, домішка крові в сечі. Уперше занедужала 3 місяці тому, коли після фізичного навантаження вперше з'явилися вищеописані скарги. З анамнезу відомо, що вже впродовж 2-х років із сечею періодично відходить велика кількість піску. На момент огляду симптом Пастернацького негативний із двох сторін. Який метод дослідження варто застосувати в першу чергу з метою уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Цистоскопія
- ☐ b. Комп'ютерна томографія
- ☐ c. Антеградна пієлографія
- ☐ d. УЗД нирок, сечоводів, сечового міхура
- ☐ e. Екскреторна урографія


Коментар

Правильна відповідь: УЗД нирок, сечоводів, сечового міхура

## Питання 20

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнтки 8 місяців назад відбулися II термінові пологи, без ускладнень. З метою контрацепції використовує метод лактаційної аменореї. Менструацій після пологів не було. Останні дні зауважила збільшення об'єму живота, відчуття "переливів" у череві. Який імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Позаматкова вагітність
- ☐ b. Повторна маткова вагітність
- ☐ c. Пухлина черевної порожнини
- ☐ d. Пухлина молочної залози з метастазами у черевну порожнину
- ☐ e. Асцит нез'ясованої етіології


Коментар

Правильна відповідь: Повторна маткова вагітність

## Питання 21

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Породілля 23-х років, на другий день після пологів відчула наростаючий біль в правій нозі, важкість. Об'єктивно: стан хворої середньої важкості. Рс- 100/хв., температура - 37,3оС, тони серця приглушені, ритм синусовий, в легенях дихання везикулярне, 18-20/хв. Ліва нога на всьому протязі набрякла, синюшна, порівняно з правою температура знижена. Пульсація артерій лівої ноги на всьому протязі пальпується, ослаблена. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тромбоемболія стегнової артерії
- ☐ b. Тромбоемболія клубової артерії
- ☐ c. Гострий клубово-стегновий флеботромбоз
- ☐ d. Гострий тромбофлебіт вен правої нижньої кінцівки
- ☐ e. Тромбофлебіт глибоких вен правої нижньої кінцівки, післяпологовий сепсис


Коментар

Правильна відповідь: Гострий клубово-стегновий флеботромбоз

## Питання 22

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В приймальне відділення поступила жінка з доношеною вагітністю з переймами, недавно звільнена з місць позбавлення волі, з активною формою туберкульозу. Куди належить госпіталізувати пацієнтку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Фізіологічне пологове відділення
- ☐ b. Інфекційна лікарня
- ☐ c. Обсерваційне пологове відділення
- ☐ d. Боксована палата обсерваційного відділення
- ☐ e. Протитуберкульозний диспансер


Коментар

Правильна відповідь: Боксована палата обсерваційного відділення

## Питання 23

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

17-річного юнака доставили до відділення невідкладної медичної допомоги з генералізованим висипом, що з'явився один день тому. Протягом останнього тижня пацієнт мав невисоку температуру та був надзвичайно виснаженим. Батько пацієнта нещодавно переніс респіраторне захворювання, й у нього залишився антибіотик, декілька таблеток якого він дав синові, щоб полегшити симптоми. Висип з'явився через день після того, як пацієнт прийняв антибіотик. Значних захворювань в анамнезі немає, інших ліків пацієнт не приймає. Він не палить та не вживає алкоголь чи наркотики. Живе статевим життям з однією дівчиною, для захисту використовує презервативи. Температура тіла становить 37,8°C, АТ- 110/75 мм рт.ст., Рс- 88/хв., ЧД- 16/хв. Фізикальне обстеження виявило безболісний еритематозний плямисто-пухирчастий висип на тулубі, грудях, животі та кінцівках. Мигдалики набряклі, вкриті ексудатом. Задні шийні лімфовузли збільшені та болючі. Під час пальпації помітна невелика спленомегалія. Який найімовірніший механізм виникнення висипу у даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Циркуляція імунних комплексів
- ☐ б. Гіперчутливість негайного типу
- ☐ с. Спадкова схильність
- ☐ d. Вірусна екзантема
- ☐ е. Гіперчутливість сповільненого типу


Коментар

Правильна відповідь: Циркуляція імунних комплексів

## Питання 24

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У приймальне відділення через 2 години після травми грудей доставили потерпілого віком 37 років. Діагноз чергового лікаря: субтотальний лівобічний гемоторакс. Розпочато комплекс протишокових заходів. У зв'язку з затримкою хірургів, за невідкладними показаннями лікарем виконано пункцію плевральної порожнини в VII міжребер'ї і констатовано, що отримана кров формується у згусток. Свідченням чого є дана проба?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Кровотеча, що триває
- ☐ б. Початок дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
- ☐ с. Наявність гнійного процесу в плевральній порожнині
- ☐ d. Загроза набряку легень
- ☐ е. Тампонада серця


Коментар

Правильна відповідь: Кровотеча, що триває

## Питання 25

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час бойових дій супротивником була застосована хімічна зброя. У постраждалих військових ейфорія або дисфорія, зорові та тактильні галюцинації, позитивні та негативні емоційні реакції. Уражені не виконують наказів, дивно поведуться. Виникла паніка. В потерпілих визначаються тахікардія та гіпертермія. Яка група бойових хімічних речовин була використана супротивником? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Пульмотоксичної дії
- ☐ б. Психотодіслептичної дії
- ☐ в. Нервово-паралітичної дії
- ☐ г. Подразнюючої дії
- ☐ д. Загальноотруйної дії


Коментар

Правильна відповідь: Психотодіслептичної дії

## Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної на операційному столі виникла задуха. Стан поліпшився після того, як роділлю повернули на бік. Який невідкладний стан виник у жінки? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ортостатичний колапс
- ☐ б. Емболія навколоплідними водами
- ☐ в. ТЕЛА
- ☐ г. Синдром нижньої порожнистої вени
- ☐ д. Розрив матки

Коментар

Правильна відповідь: Синдром нижньої порожнистої вени

## Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшов 32-річний чоловік в зв'язку з появою за грудниною дискомфорту, який не іррадіює, триває 6 годин та виник через 2 години після вечері. Біль в грудній клітці то наростає, то вщухає, але її інтенсивність не змінюється. Про інші медичні проблеми пацієнта невідомо. Батько пацієнта помер від інфаркту міокарда у віці 59-ти років. Температура тіла становить 37,2°C, АТ- 130/85 мм рт.ст., Рс- 110/хв., ЧД- 16/хв. Аускультация грудної клітки виявила везикулярне дихання, без шумів. На електрокардіограмі спостерігається синусова тахікардія. Рентгенограма грудної клітки в нормі. Додатково до аспіріну пацієнту дали 2 таблетки нітрогліцерину сублінгвально з інтервалом у 5 хвилин, що допомогло зменшити дискомфорт. Що є оптимальним наступним кроком у веденні даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ковтання барію
- ☐ б. Заспокоєння пацієнта та амбулаторне лікування
- ☐ в. Комп'ютерна томографічна ангіограма грудної клітки
- ☐ г. Вимірювання серцевих біомаркерів
- ☐ д. Проба з дозованим фізичним навантаженням (бігова доріжка)


Коментар

Правильна відповідь: Вимірювання серцевих біомаркерів

## Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 28-ми років екстрено доставлено до операційної з приводу профузної шлунково-кишкової кровотечі. Загальний стан тяжкий, свідомість - оглушення, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., олігурія. Вкажіть об'єм крововтрати:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 20-25% дефіциту ОЦК (1250-1750 мл)
- ☐ б. Крововтрати немає
- ☐ в. 30-40% дефіциту ОЦК (>1750 мл)
- ☐ г. 15% дефіциту ОЦК (750-1250 мл)
- ☐ д. >40% дефіциту ОЦК (>2000 мл)


Коментар

Правильна відповідь: 30-40% дефіциту ОЦК (>1750 мл)



## Питання 29

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 54-х років через 30 хвилин після правобічної пульмонектомії з'явилась тахікардія - 140/хв. Пульс слабкого наповнення. АТ зменшився до 60/20 мм рт.ст. При перкусії правої половини грудної клітки визначалось притуплення в пологих місцях грудної клітки справа. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Правобічний гемопневмоторакс
- ☐ b. Кардіопульмональний шок
- ☐ с. Правобічний гемоторакс
- ☐ d. Правобічний гідроторакс
- ☐ е. Інфаркт міокарда

Коментар

Правильна відповідь: Правобічний гемоторакс

## Питання 30

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При променевому ураженні шкіри у хворого 33-х років спостерігається вологий дерматит, пухирі малі, ненапружені, займають менш ніж 50% поля. Така клінічна картина виникає при дозі опромінення:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 5-8 Гр
- ☐ b. 20-30 Гр
- ☐ с. 10-15 Гр
- ☐ d. 7-13 Гр
- ☐ е. 15-20 Гр

Коментар

Правильна відповідь: 15-20 Гр

## Питання 31

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 30-ти років в ході огляду в поліклініці терапевтом виявлено ножове поранення правої половини живота. Живіт м'який, біль відсутній. В крові: Нb- 140 г/л, лейкоц.- 6, 8 • 10<sup>9</sup>/л. Яку тактику слід обрати лікарю?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Призначити УЗД органів черевної порожнини
- ☐ b. Направити на планове лікування до хірургічного відділення
- ☐ c. Амбулаторне лікування
- ☐ d. Направити постраждалого до хірургічного стаціонару
- ☐ e. Призначити рентгенографію органів черевної порожнини

Коментар

Правильна відповідь: Направити постраждалого до хірургічного стаціонару

## Питання 32

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 44-х років звернувся зі скаргами на зниження гостроти зору, нежить з рясним рідким виділенням, слинотечу, утруднення дихання, самовільні посмикування м'язів, тахікардію, підвищення АТ. Об'єктивно: хворий збуджений, температура тіла - 37,5оС. Рс- 126/хв., АТ- 180/90 мм рт.ст., зіниці різко звужені. При аускультії в легенях поодинокі хрипи. Отруєння речовиною якої дії найбільш імовірно у даному випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Сльозогінної
- ☐ b. Шкірно-наривної
- ☐ c. Загальноотруйної
- ☐ d. Задущливої
- ☐ e. Нервово-паралітичної

Коментар

Правильна відповідь: Нервово-паралітичної

### Питання 33

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 66-ти років скаржиться на серцебиття, біль у серці, слабкість. Симптоми з'явилися раптово, після фізичного навантаження. На ЕКГ: комплекси QRS поширені до 0,12 секунд, зубець Р перед шлуночковим комплексом відсутній, ЧСС- 200/хв. Який препарат є препаратом вибору в цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Верапаміл
- ☐ b. Хінідин
- ☐ c. Обзидан
- ☐ d. Лідокаїн
- ☐ e. Дигоксин

Коментар

Правильна відповідь: Лідокаїн

### Питання 34

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна з терміном 32 тижні страждає на міастенію. З'явилися розлади дихання, тахікардія, психомоторне збудження, яке чергується з млявістю, апатією, парезом кишечника та сфінктерів. Першочергові заходи невідкладної допомоги:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Термінове розродження
- ☐ b. Призначення прозерину
- ☐ c. Профілактика гіпоксії плоду
- ☐ d. Введення транквілізаторів
- ☐ e. ШВЛ с застосуванням міорелаксантів курареподібної дії

Коментар

Правильна відповідь: Призначення прозерину

## Питання 35

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Футболіст 22-х років звернувся до лікаря через 15 хвилин після футбольного матчу зі скаргами на погіршення самопочуття, запаморочення, прискорене серцебиття, болі в лівому плечі. Під час огляду чоловік раптово знепритомнів, дихання аритмічне поверхнєве. Пульс на сонних артеріях відсутній. На ЕКГ - фібриляція шлуночків. Що зумовлює таку картину?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Раптова коронарна смерть
- ☐ b. Інфаркт нирки
- ☐ c. Колапс
- ☐ d. Кома
- ☐ e. Шок інфекційно-токсичний

Коментар

Правильна відповідь: Раптова коронарна смерть

## Питання 36

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки 35-ти років шляхом вживання забруднених харчових продуктів в організм потрапила значна кількість радіоактивного йоду-131. Які заходи необхідно провести в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Провести антибіотикотерапію для профілактики вторинної інфекції на фоні пригнічення імунітету
- ☐ b. Негайно провести евакуацію жінки
- ☐ c. Ретельно зібрати харчові продукти в закриту тару для подальшого аналізу
- ☐ d. Негайно промити шлунок
- ☐ e. Якнайшвидше розпочати йодну профілактику

Коментар

Правильна відповідь: Якнайшвидше розпочати йодну профілактику

## Питання 37

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років після аварії на виробництві був госпіталізований зі скаргами на металевий присмак та печіння у роті, нудоту, слинотечу, багаторазове блювання, пронос з домішками слизу та крові, біль у епігастральній та поперековій ділянках. Об'єктивно: стан важкий, виразковий стоматит, гінгівіт, некроз слизової оболонки носа, набряк гортані. АТ- 150/100 мм рт.ст., Рс- 48/хв., тони серця глухі. Поліурія, гіпостенурія, альбумінурія, гематурія. Який антидот слід ввести хворому? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Унітіол
- ☐ б. Атропіну сульфат
- ☐ в. Антарсин
- ☐ г. Дієтиоксим
- ☐ д. Хромосмон

Коментар

Правильна відповідь: Унітіол

## Питання 38

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення доставлено двох підлітків у важкому стані. Скарги на інтенсивний біль голови, кількарізне блювання, порушення зору. Дані скарги виникли після вживання сумнівного алкоголю. Діагностоване отруєння метанолом. Який антидот необхідно використати в даному випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Атропіну сульфат
- ☐ б. Метиленовий синій
- ☐ в. Етиловий спирт
- ☐ г. Унітіол
- ☐ д. Тіосульфат натрію

Коментар

Правильна відповідь: Етиловий спирт

## Питання 39

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після транспортної аварії парамедики доставили до відділення невідкладної медичної допомоги 40-річну жінку, білу. Пацієнтка - водій, була пристебнута ременем безпеки. В її автомобіль врізався інший, з протилежного від неї боку, після чого машина потерпілої злетіла з дороги та врізалася в дерево на узбіччі. Коли медики прибули на місце аварії, жінка була притомною, в ясній свідомості, скаржилася на невеликий біль у грудях та задишку. У відділенні невідкладної медичної допомоги вона сказала, що протягом останнього тижня в неї спостерігався сухий кашель, проте заперечує наявність будь-яких супутніх симптомів: лихоманку, остуду, утруднене дихання чи відхаркування мокротиння. Не палить та не вживає алкогольних напоїв. Температура тіла - 36,7°C, АТ- 125/80 мм рт.ст., ЧД-22/хв., Рс- 106/хв. Фізикальне обстеження виявило болючу ділянку над лівою стінкою грудної клітки, там де був розташований ремінь безпеки. Обстеження легень виявило зменшення дихальних шумів зліва. На початковій ЕКГ помітна синусова тахікардія. Рентгенограма грудної клітки показала двосторонню гомогенну тінь у верхніх зонах легень, більш виражену зліва. Який діагноз найімовірніший, виходячи з симптомів?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. набряк легень
- ☐ b. Пневмонія
- ☐ c. Інфаркт легень
- ☐ d. Випіт у плевральній порожнині
- ☐ e. Контузія легень

Коментар

Правильна відповідь: Контузія легень

## Питання 40

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка 32-х років скаржиться на гострі болі внизу живота, що виникли раптово після coitus на 14-й день менструального циклу. Турбує слабкість, запаморочення, сухість у роті. У наступну годину стан погіршився, жінка знепритомніла. Який можливий діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Аднексит
- ☐ b. Апендицит
- ☐ c. Коліт

- ☐ d. Апоплексія яєчника
- ☐ e. Параметрит


Коментар

Правильна відповідь: Апоплексія яєчника

## Питання 41

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 42-х років, оглянутий лікарем-психіатром, перебуває в стані оглушення, що періодично змінюється тривогою, відчаєм, афективними спалахами, гіперактивністю. На запитання не реагує. Відомо, що стан виник через декілька хвилин після бойових дій та триває 2 години. Який імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тривожна реакція
- ☐ b. Конверсійна реакція
- ☐ c. Гостра реакція на стрес
- ☐ d. Іпохондричний невроз
- ☐ e. Параноїдна реакція


Коментар

Правильна відповідь: Гостра реакція на стрес

## Питання 42

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 43-х років висловлює скарги наболі у суглобах, які знімаються прийомом однієї таблетки еритроміцину впродовж 10 хвилин. Цей стан зв'язує з тим, що жінка добавляє в їжу білий порошок. Цей стан можливо кваліфікувати як:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Алергічна реакція
- ☐ b. Ревматоїдний артрит
- ☐ c. Аномальна поведінка

- ☐ d. Кримінальна акція
- ☐ e. Психотичний розлад


Коментар

Правильна відповідь: Психотичний розлад

### Питання 43

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 46-ти років, який тривалий час перебував у шахті, скарги на подразливий кашель, головний біль, нудоту, печіння в очах, світлобоязнь. Об'єктивно: шкіра ціанотична, склери гіперемовані. Діагностовано отруєння сірководнем. Які першочергові заходи слід провести у даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення кордіаміну
- ☐ b. Вдихання амлінітриту
- ☐ c. Інгаляція кисню
- ☐ d. Введення антибіотиків
- ☐ e. Промивання очей водою, закапування дикаїну


Коментар

Правильна відповідь: Інгаляція кисню

### Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

28-річний чоловік у супроводі своєї дівчини прийшов до лікаря зі скаргами на повторювані головні болі, запаморочення та втомлюваність, які тривають вже кілька тижнів. Він також страждає від безсоння та має проблеми із зосередженням уваги. Дівчина стверджує, що він дратівливий, сперечається, є надто чутливим до шуму. 6 тижнів тому пацієнт під час бійки зазнав удару по голові та на кілька хвилин втратив свідомість. За словами дівчини, на вихідних він вживає міцні напої, але рідко випиває "надміру". АТ- 130/80 мм рт.ст., Ps-76/хв. Результати серцево-легеневого обстеження в нормі. М'язова сила - збережена з обох сторін у верхніх та нижніх кінцівках, чутливість неушкоджена, рефлексії повсюди 2+. Пацієнт нормально орієнтується, розладів пам'яті не має, але перебуває у стривоженому стані. Рівень гемоглобіну - 142 г/л, (норма: для чоловіків -



135-175 г/л, для жінок - 120-160 г/л), креатинін – 70 мкмоль/л, (норма - 53-106 мкмоль/л), дослідження функції печінки - в межах норми. Магнітно-резонансна томографія голови в нормі. Хіміко-токсикологічний аналіз сечі на канабіноїди - позитивний, на кокаїн та опіоїди - негативний. Який діагноз є найімовірнішим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Алкоголізм
- ☐ b. Постконтузійний синдром
- ☐ c. Посттравматичний стрес
- ☐ d. Генералізований тривожний розлад
- ☐ e. Абстинентний синдром після вживання канабісу


Коментар

Правильна відповідь: Постконтузійний синдром

## Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої доношеної дитини віком 2 дні розвинулося багаторазове блювання з домішками жовчі, наростає здуття живота. Меконіальний стілець відсутній від народження, гази не відходять. Об'єктивно: живіт різко здутий, виражена венозна сітка на передній черевній стінці, контуруються роздуті петлі кишечника, після очисної клізми стул та гази не відходять. Рентгенологічно виявляються розширені та заповнені газом петлі товстої кишки. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вроджена висока непрохідність кишок
- ☐ b. Адрено-генітальний синдром
- ☐ c. Вроджена низька непрохідність кишок
- ☐ d. Виразково-некротичний ентероколіт новонародженого
- ☐ e. Перитоніт новонароджених


Коментар

Правильна відповідь: Вроджена низька непрохідність кишок

## Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 48-ми років багато років зловживає алкоголем. Скарги на безсоння, нудоту, блювання, страх. Дезорієнтований в місці і часі. Неспокійний, зривається з місця, ховається під ліжку, бачить навколо чорних жуків, топче їх ногами. Яке лікування є найбільш доцільне?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Анксіолітики + психотерапія
- ☐ b. Седуксен + детоксикація
- ☐ c. Галоперідол + коректори
- ☐ d. Антидепресанти + препарати літію
- ☐ e. Електро-конвульсивна терапія


Коментар

Правильна відповідь: Седуксен + детоксикація

### Питання 47

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

3 місця ураження радіоактивними речовинами після виконання бойової задачі повернувся особистий склад розвідної роти, загальне зараження якої зафіксували до 1 Гр. Яка спеціальна обробка військових повинна бути проведена в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Часткова спеціальна обробка
- ☐ b. Дегазація
- ☐ c. Дезінфекція
- ☐ d. Повна спеціальна обробка
- ☐ e. Дезактивація


Коментар

Правильна відповідь: Дезактивація

### Питання 48

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 63-х років впала в відкритий люк глибиною 5 м. Під час огляду лікарем збуджена, праве стегно збільшене в розмірах, деформоване, шкіра напружена, з синцями. Ступня ротована зовні.

Навантаження на кістки тазу безболісне. АТ- 90/60 мм рт.ст., Рs- 120/хв. Який попередній діагноз можна поставити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Закритий перелом правої стегнової кістки, травматичний шок
- ☐ b. Закритий перелом кісток тазу, травматичний шок
- ☐ c. Забій правого стегна, травматичний шок
- ☐ d. Закритий перелом лівої стегнової кістки, геморагічний шок
- ☐ e. Забій правого стегна, геморагічний шок


Коментар

Правильна відповідь: Закритий перелом правої стегнової кістки, травматичний шок

## Питання 49

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 30-ти років доставлена до лікарні без свідомості. Відомо, що хворіє на цукровий діабет впродовж 6-ти років. Інсулін вводила регулярно. Не снідала. О 10 годині раптово знепритомніла. Об'єктивно: шкіра волога, тонус м'язів підвищений, клонічні та тонічні судоми, зіниці розширені, менінгеальних симптомів немає, запаху ацетону з рота немає. Рs- 86/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст.

Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпоглікемічна кома
- ☐ b. Гіперосмолярна кома
- ☐ c. Молочнокисла кома
- ☐ d. Кетоацидотична кома
- ☐ e. Гостра ниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гіпоглікемічна кома

## Питання 50

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинку 7-ми років доставлено до відділення дитячої та підліткової гінекології зі скаргами на біль у ділянці статевих органів і кров'янисті виділення. Зі слів матері дівчинку знайшли в городі без свідомості. Лікарі швидкої допомоги надали первинну допомогу та доставили пацієнтку у лікарню. Зі слів дівчинки "її бив дядя та зняв труси" далі вона нічого не пам'ятає. Ваш діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ранній початок менструації
- ☐ b. Пухлина промежини
- ☐ c. Сексуальне зґвалтування
- ☐ d. Невротичні розлади
- ☐ e. Психічні розлади


Коментар

Правильна відповідь: Сексуальне зґвалтування

## Питання 51

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 64-х років доставлений до інфарктного відділення зі скаргами на інтенсивний біль за грудниною стискаючого характеру з іррадіацією в ліву руку, лопатку. Виражене відчуття страху смерті. Шкіра вкрита липким потом із ціанотичним відтінком. АТ- 60/20 мм рт.ст., Рs- 130/хв. Діурез менше 20 мл/год. Яке із обстежень необхідно провести для встановлення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Електрокардіограма
- ☐ b. Клінічний аналіз крові
- ☐ c. Ультразвукове дослідження серця
- ☐ d. Коагулограма
- ☐ e. Рентгенологічне дослідження органів грудної клітки


Коментар

Правильна відповідь: Електрокардіограма

## Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Педіатр виставив діагноз "менінгококцемія" хлопчику 2-х років, який не відвідував дитячий дошкільний заклад. У сім'ї ще троє осіб: мати вчитель, батько - військовослужбовець, брат - школяр. Вкажіть обмежувально-ізоляційні заходи щодо джерела інфекції:  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Госпіталізація обов'язкова
- ☐ б. Ізоляція вдома та встановлення медичного нагляду
- ☐ в. Ізоляція вдома
- ☐ г. Встановлення медичного нагляду
- ☐ д. Госпіталізація не обов'язкова

Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація обов'язкова

### Питання 53

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 24-х років захворювання почалося гостро з появи нудоти, багаторазового блювання, ознобу, болю у верхніх відділах живота. Практично одночасно з'явилися рідкі водянисті випорожнення без патологічних домішок 2 рази. Об'єктивно: стан середньої важкості, температура - 37,6оС, Рs- 86/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст., шкіра бліда, тургор збережений, язик незначно обкладений білим нальотом, живіт м'який, чутливий в епігастрії. Яку терапію слід провести у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Лоперамід
- ☐ б. 5% розчин глюкози
- ☐ в. Регідрон
- ☐ г. Промивання шлунка
- ☐ д. Призначення сольового послаблюючого

Коментар

Правильна відповідь: Промивання шлунка

### Питання 54

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 32-х років постраждала в ДТП. Об'єктивно: шкірні покриви та видимі слизові різко бліді, зупинка ефективного дихання та кровообігу. Що потрібно зробити у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Негайне транспортування у найближчу лікарню
- ☐ b. Серцево-легенева реанімація
- ☐ c. Зняття ЕКГ
- ☐ d. Введення наркотичних анальгетиків
- ☐ e. Введення преднізолону


Коментар

Правильна відповідь: Серцево-легенева реанімація

## Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Зафіксовано клінічну смерть. Вкажіть цільові значення сатурації киснем артеріальної крові (SpO2) постраждалого після повернення спонтанного кровообігу:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 85%
- ☐ b. 96-98%
- ☐ c. 100%
- ☐ d. 91-93%
- ☐ e. 86-90%


Коментар

Правильна відповідь: 96-98%

## Питання 56

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий 42-х років, виявлений на місці ДТП, скаржиться на біль у ділянці таза та правого стегна. Об'єктивно: загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. ЧДР- 28/хв. Праве стегно

деформоване, набрякле, у верхній його третині патологічна рухливість, крепітація кісткових уламків. Великий крововилив, набряк та біль під час пальпації в правих пахвинній, здухвинній та сідничній ділянках. Рс- 112/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст. Якому ступеню травматичного шоку відповідає стан потерпілого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. III
- ☐ b. IV
- ☐ c. I
- ☐ d. II


Коментар

Правильна відповідь: II

### Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 50-ти років, що перебуває у інфарктному відділенні з трансмуральним інфарктом, раптово знепритомнів. Об'єктивно: зупинка серцевої діяльності та дихання, електромеханічна дисоціація. Розпочато серцево-легеневу реанімацію. Які наступні дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Внутрішньовенне введення строфантину
- ☐ b. Дефібриляція
- ☐ c. Внутрішньовенне введення новокаїнамідів
- ☐ d. Внутрішньовенне введення лідокаїну
- ☐ e. Внутрішньосерцеве введення адреналіну


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньосерцеве введення адреналіну

### Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У раніше здорової дитини 6 місяців на грудному вигодовуванні на 2-й день після вживання молочної каші температура тіла - 39оС, випорожнення щогодини, розріджені, зі слизом, зеленого кольору з домішкою свіжої крові. В цьому випадку перш за все слід запідозрити:  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Синдром подразненої кишки
- ☐ b. Сальмонельоз
- ☐ c. Лямбліоз кишковий
- ☐ d. Харчову алергію
- ☐ e. Ротавірусну інфекцію

Коментар

Правильна відповідь: Сальмонельоз

## Питання 59

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 37-ми років звернулася за медичною допомогою зі скаргами на наявність ділянки почервоніння шкіри овальної форми в ділянці лівого стегна, субфебрилітет. Хворіє 3 тижні. В анамнезі - укуси кліща. Об'єктивно: на внутрішній поверхні стегна - пляма розміром 10х15 см з чіткими контурами, не болюча. Центральна частина - вишневого кольору, середня - блідо-рожевого, по периферії - яскраво-червона. Який найбільш імовірний діагноз?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Багатоформна ексудативна еритема
- ☐ b. Вузлова еритема
- ☐ c. Алергічний дерматит
- ☐ d. Бешиха стегна
- ☐ e. Лайм-бореліоз

Коментар

Правильна відповідь: Лайм-бореліоз

## Питання 60

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання



27-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на раптове виникнення задишки. 10 днів тому в нього скінчилися ліки від астми. Протягом останніх 6 місяців його доводилося інтубувати двічі через сильні загострення астми. Дані фізикального обстеження: температура тіла становить 37,2°C, АТ- 140/65 мм рт.ст., Рс- 110/хв., ЧД- 28/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 84% при диханні кімнатним повітрям, поліпшується до 94% при диханні крізь кисневу маску з клапаном видиху. Пацієнт притомний, але має дихальну недостатність, задіяні допоміжні дихальні м'язи. При обстеженні легень спостерігається рівномірний двосторонній вхід повітря у легені та дифузний свист в обох полях. Максимальна швидкість видиху, яку він демонстрував, під час попередніх госпіталізацій, становить 60%. Який наступний захід буде найдоцільнішим у веденні даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести одиничну дозу магнію сульфату -2 г внутрішньовенно
- ☐ b. Призначити пацієнтові альбутерол в інгаляторі та стероїди перорально і виписати його
- ☐ c. Почати давати кортикостероїди внутрішньовенно та перевести до відділення загальнотерапевтичного профілю
- ☐ d. Розпочати агресивну терапію інгаляціями бета-2-адреноміметиків
- ☐ e. Почати давати теофілін внутрішньовенно у відділенні невідкладної медичної допомоги


Коментар

Правильна відповідь: Розпочати агресивну терапію інгаляціями бета-2-адреноміметиків

## Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінку 77-ми років доставлено до лікарні непритомною. Неврологічний статус: лівобічна параплегія. Протромбін за Квіком становить 108%. На КТ-сканах відзначається: у правій півкулі головного мозку ділянка з нерівномірним зниженням оптичної щільності. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Менінгоенцефаліт
- ☐ b. Метастази у головний мозок
- ☐ c. Субарахноїдальний крововилив
- ☐ d. Ішемічний інсульт
- ☐ e. Геморагічний інсульт


Коментар

Правильна відповідь: Ішемічний інсульт

## Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія олігоанурії. У хворого спостерігаються м'язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ (розширення інтервалів PQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці T). Які біохімічні зміни викликають ці порушення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіперкаліємія
- ☐ б. Гіпокаліємія
- ☐ с. Ацидоз
- ☐ d. Гіперкальціємія
- ☐ е. Гіпокальціємія


Коментар

Правильна відповідь: Гіперкаліємія

### Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При проведенні закритого масажу серця людини 76-ти років, що знаходиться у стані клінічної смерті, необхідно здійснювати компресії з частотою:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Не менше 60 на 1 хвилину
- ☐ б. Не менше 100 на 1 хвилину
- ☐ с. Не менше 80 на 1 хвилину
- ☐ d. Не менше 40 на 1 хвилину
- ☐ е. Не менше 120 на 1 хвилину

Коментар

Правильна відповідь: Не менше 100 на 1 хвилину

### Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час хуліганської бійки постраждалий отримав ножове поранення у епігастральну область. Зовнішніх ознак кровотечі з рани немає. Постраждалий збуджений, більш якісно оглянути себе не дозволяє. Наполягає на тому, щоб йти додому. Яка тактика ведення постраждалого найбільш вірна?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Відпустити додому
- ☐ b. Направити до поліклініки
- ☐ c. Рекомендувати звернутися до стаціонару
- ☐ d. Госпіталізувати у хірургічний стаціонар
- ☐ e. З хворого взяти розписку про відмову


Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізувати у хірургічний стаціонар

## Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

60-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на сильний біль у животі та нездатність до сечовипускання, яка виникла у нього напередодні. Анамнез не містить значних захворювань, пацієнт наразі ліків не приймає. Ані травм, ані лихоманки останнім часом не спостерігалось. Пацієнт схвильований, помірний ступінь виснаження. Фізикальне обстеження виявило помірну болючість при пальпації надлобкової ділянки, в ході ректального обстеження простата збільшена у розмірах, гладенька. Лабораторні дослідження: креатинін - 256 мкмоль/л (норма - 53-106 мкмоль/л), азот сечовини крові - 20,4 ммоль/л (норма - 2,5-6,4 ммоль/л), гематокрит - 51% (норма: для чоловіків - 41-53%, для жінок - 36-46%), гемоглобін - 138 г/л (норма: для чоловіків - 135-175 г/л, для жінок - 120-160 г/л). Яким буде наступний крок у веденні даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Негайна консультація у відділі урології та нефрології
- ☐ b. Негайна уретральна катетеризація
- ☐ c. Негайна надлобкова катетеризація
- ☐ d. Негайне вимірювання рівня простатспецифічного антигену
- ☐ e. Надлобкова катетеризація після випорожнення сечового міхура

Коментар

Правильна відповідь: Негайна уретральна катетеризація

## Питання 66

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 10-ти місяців бригадою швидкої допомоги доставлений у реанімаційне відділення. Під час проведення серцево-легеневої реанімації на електрокардіограмі реєструється шлуночкова брадикардія. Якому з наведених медикаментозних заходів необхідно надати перевагу? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньовенне введення мезатону
- ☐ б. Електрична дефібриляція серця + введення адреналіну
- ☐ в. Електрична дефібриляція серця
- ☐ г. Внутрішньовенне введення атропіну 0,01мг/кг
- ☐ д. Внутрішньовенне введення 4% NaHCO<sub>3</sub> - 2 мг/кг

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне введення атропіну 0,01мг/кг

## Питання 67

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні невідкладної медичної допомоги доставили 47-річного чоловіка, якого вдарило блискавкою. Він грав у теніс, коли раптом знялася гроза. Чоловіка вдарив грозовий розряд між хмарою та землею, силою удару його відкинуло на 1,5-2 м. Свідки цього випадку розпочали масаж грудної клітки потерпілого. Коли через 5 хвилин прибула бригада невідкладної медичної допомоги, у пацієнта спостерігалася зупинка серця. В ході обстеження: зіниці розширені та не реагують на світло. Електричний ритм асистолічний. Що є найдоцільнішим наступним кроком? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Продовжити масаж грудної клітки
- ☐ б. Припинити реанімаційні заходи
- ☐ в. Дати пацієнтові атропін
- ☐ г. Дати пацієнтові аміодарон
- ☐ д. Спробувати виконати дефібриляцію

Коментар

Правильна відповідь: Продовжити масаж грудної клітки

## Питання 68

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 25-ти років оперована з приводу кортикостероми. Через 2 дні у хворої з'явилися нудота, блювання, холодний липкий піт, тахікардія, АТ знизився до 50/0 мм рт.ст. Який найімовірніший діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра серцева недостатність
- ☐ б. Гостра недостатність кори наднирників
- ☐ в. Інфаркт міокарда
- ☐ г. Післяопераційна кровотеча
- ☐ д. Тромбоемболія

Коментар

Правильна відповідь: Гостра недостатність кори наднирників

## Питання 69

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 59-ти років проходить курс реабілітаційного лікування після перенесеного інфаркту міокарда. Гемодинамічні показники стабільні. Фракція викиду 50%. Які засоби профілактики раптової серцевої смерті потрібно застосувати у даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а.  $\beta$ -адреноблокатори, іАПФ, статини
- ☐ б. Діуретики, іАПФ, статини
- ☐ в. Аміодарон,  $\alpha$ -адреноблокатори
- ☐ г. Хірургічна корекція
- ☐ д. Антагоністи кальцію, іАПФ, статини

Коментар

Правильна відповідь:  $\beta$ -адреноблокатори, іАПФ, статини

## Питання 70

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 29-ти років захворів гостро 18 годин тому: після вживання заливної риби з'явилися нудота, повторне блювання, часті пінисті рідкі зеленуваті випорожнення, підвищення температури до 39,0°C. Об'єктивно: стан важкий, блідий, млявий, тургор шкіри різко знижений, сухість слизової оболонки рота, АТ- 80/40 мм рт.ст., пульс слабого наповнення, Рс- 112/хв., живіт болючий в епігастрії, біляпупковій та ілеоцекальній ділянках, зменшення виділення сечі. Які невідкладні терапевтичні заходи?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньовенне введення сольових розчинів
- ☐ б. Внутрішньовенне введення реополіглюкіну
- ☐ в. Введення глюкокортикостероїдів
- ☐ г. Парентеральне введення антибіотиків
- ☐ д. Внутрішньовенне введення розчину глюкози

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне введення сольових розчинів

## Питання 71

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У рядового 24-х років після вибуху в машині БМП нижні кінцівки були притиснуті. Звільнення від стиснення кінцівок через три доби. Доставлений у госпіталь, скаржиться на слабкість, блювання. Шкіра кінцівок набрякла, синюшна, некротична, холодна на дотик, трофічні виразки. Підвищення температури до 39,5°C. Тони серця приглушені, АТ- 70/45 мм рт.ст., пульс слабого наповнення 130/хв. Азотемія, гіперкаліємія. У сечі: колір - бурий, мікрогематурія, міоглобінурія, протеїнурія, циліндрурія. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий венозний тромбоз
- ☐ б. Посттромбофлебітичний синдром
- ☐ в. Синдром тривалого стиснення, пізній період
- ☐ г. Гострий гломерулонефрит
- ☐ д. Анафілактичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Синдром тривалого стиснення, пізній період

## Питання 72

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До медичної роти доставлений постраждалий з тупою травмою живота та ознаками внутрішньої кровотечі. Систолічний АТ- 70 мм рт.ст., Рs- 140/хв. Який вид медичної допомоги передбачає кінцеву зупинку внутрішньої кровотечі?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Перша медична допомога
- ☐ b. Перша лікарська допомога
- ☐ c. Спеціалізована медична допомога
- ☐ d. Долікарська (фельдшерська) допомога
- ☐ e. Кваліфікована медична допомога

Коментар

Правильна відповідь: Кваліфікована медична допомога

## Питання 73

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Госпіталізовано чоловіка 33-х років зі скаргами на біль в порожнині рота та стравоході, нудоту, блювання, відчуття спраги. З анамнезу - має місце пероральний прийом оцтової кислоти. Який першочерговий захід є найбільш ефективним для запобігання ускладнень?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Промивання шлунка товстим зондом
- ☐ b. Введення нітратів
- ☐ c. Введення поліглюкіну
- ☐ d. Промивання очей проточною водою
- ☐ e. Оксигенотерапія

Коментар

Правильна відповідь: Промивання шлунка товстим зондом

## Питання 74

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

8-річний хлопчик з гемофілією А надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги після того, як уся родина потрапила в автомобільну аварію. Дитину було пристебнуто ременями безпеки на задньому сидінні зі сторони пасажира, в той час як машина зазнала удару зі сторони водія. Спрацювала повітряна подушка і хлопчик втратив свідомість приблизно на 15 секунд. Пацієнт потерпає від головного болю, але нудоти чи блювання не спостерігається. Температура тіла становить 36,7°C, АТ- 115/65 мм рт.ст., Ps- 88/хв., ЧД- 16/хв. Фізикальне обстеження виявило гематому розміром 2 см на лобі з правого боку. Інших ознак травми не видно. Результати неврологічного обстеження в межах норми. Що слід зробити далі в ході лікування даного пацієнта? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Спостереження за дитиною протягом 4-6 годин
- ☐ б. Відпустити додому, відвідати лікаря первинної ланки на наступний день
- ☐ в. Безконтрастна комп'ютерна томографія голови
- ☐ г. Контрастна комп'ютерна томографія голови
- ☐ д. Оглядова рентгенограма черепа

Коментар

Правильна відповідь: Безконтрастна комп'ютерна томографія голови

## Питання 75

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

64-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на нудоту, блювання та здуття живота, які тривають протягом 2-х днів. Болю у животі немає. Пацієнт хворіє на гіпертонію, гіперхолестеринемію, захворювання коронарної артерії та застійну серцеву недостатність. Також він страждає від хронічного болю у спині, який розвинувся внаслідок компресійного перелому 6 місяців тому. Пацієнт приймає аспірин, оксикодон, фуросемід, лозартан, вітамін D, кальція глюконат та симвастатин. Температура тіла - 36,7°C, АТ- 130/70 мм рт.ст., Ps- 92/хв. Живіт здутий, але м'який та безболісний. Напруженості м'язів живота чи симптому Блюмберга не спостерігається. Кишкові шуми приглушені. Периферійний набряк +1. Результати лабораторних досліджень наступні: гемоглобін - 130 г/л (норма: для чоловіків - 135-175 г/л, для жінок - 120-160 г/л), тромбоцити - 300 • 10<sup>9</sup>/л (норма - 150-400 • 10<sup>9</sup>/л), лейкоцити - 9 • 10<sup>9</sup>/л (норма - 4,5-11, 0 • 10<sup>9</sup>/л), натрій сироватки крові - 132 ммоль/л (норма - 136-145 ммоль/л), калій сироватки крові - 2,7 ммоль/л (норма - 3,5-5,0 ммоль/л), хлорид - 104 ммоль/л (норма - 95-105 ммоль/л), бікарбонат - 24 ммоль/л (норма - 22-28 ммоль/л), азот сечовини крові - 11,4 ммоль/л (норма - 2,5-6,4 ммоль/л), креатинін сироватки крові - 97 мкмоль/л (норма - 53-106 мкмоль/л). На ЕКГ



спостерігається нормальний синусовий ритм. Рентгенограма органів черевної порожнини показує здуття кишківника, газ в ободовій та прямій кишках. Найдоцільнішим наступним кроком є:  
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Калій внутрішньовенно
- ☐ b. Спіронолактон
- ☐ c. Антибіотики внутрішньовенно
- ☐ d. Негайна комп'ютерна томографія черевної порожнини
- ☐ e. Метилналтрексон


Коментар

Правильна відповідь: Калій внутрішньовенно

## Питання 76

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 72-х років раптово розвинулось блювання кров'ю з крововтратою до 1,0 л. Об'єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС- 112/хв. ЦВТ- 0. Які інфузійні середовища першочергово треба застосувати для лікування?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. івові емульсії
- ☐ b. Колоїдні розчини
- ☐ c. Розчини глюкози
- ☐ d. Кристалоїдні розчини
- ☐ e. Свіжозаморожена плазма


Коментар

Правильна відповідь: Кристалоїдні розчини

## Питання 77

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ встановлена асистолія. Першочерговим терапевтичним заходом має бути:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Електрична дефібриляція
- ☐ b. Введення хлориду кальцію
- ☐ c. Введення адреналіну
- ☐ d. Введення лідокаїну
- ☐ e. Введення атропіну


Коментар

Правильна відповідь: Введення адреналіну

## Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Інженер 25-ти років звернувся за медичною допомогою зі скаргами на загальну слабкість, підвищення температури тіла до 38,2оС, переймоподібні болі внизу живота, часті позиви, не кожен з яких завершувався дефекацією. Виникнення захворювання пов'язує із вживанням домашнього сиру, придбаного на стихійному ринку. Об'єктивно: шкіра бліда, язик вологий, обкладений білим нальотом. Живіт при пальпації болючий в лівій здухвинній та надлобковій ділянках. Випорожнення 8-10 разів на добу в незначній кількості з домішками слизу та крові. Встановіть попередній діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Сальмонельоз
- ☐ b. Холера
- ☐ c. Реактивний панкреатит
- ☐ d. Шигельоз
- ☐ e. Вірусний гепатит А


Коментар

Правильна відповідь: Шигельоз

## Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждала 25-ти років, доставлена в хірургічне відділення через 2 години після ДТП з закритою травмою живота з ознаками внутрішньоочеревинної кровотечі. Взята в операційну. Під час ревізії в

черевній порожнині знайдено до 1,5 л рідкої крові. Селезінка пошкоджена в декількох місцях. Інших пошкоджень не виявлено. Який вид трансфузії слід застосувати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Реінфузія крові
- ☐ b. Трансфузія замороженої плазми
- ☐ c. Трансфузія еритроцитарної маси
- ☐ d. Замінне переливання
- ☐ e. Пряма гемотрансфузія


Коментар

Правильна відповідь: Реінфузія крові

## Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Через три дні після травми правої стопи (автомобільна аварія) у хворого на цукровий діабет II тип, середньої важкості, виникли болі та потемніння пальців стопи. Цукор крові - 10 ммоль/л, лейкоцитоз -  $10 \cdot 10^9/\text{л}$ , температура тіла - 37,1°C. Права стопа незначно набрякла, болісна під час пальпації, 1 та 3 пальці різко набрякли з ціанотичними плямами по передній поверхні, рухи в повному об'ємі. Пульсація на периферичних артеріях правої стопи незначно ослаблена, на підколінній задовільна. Які додаткові обстеження необхідно провести для вирішення тактики лікування?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. УЗД судин правої кінцівки та рентгенографія правої стопи в 2-х проекціях
- ☐ b. Реовазографія 1-3 пальців правої стопи
- ☐ c. Рентгенографія правої стопи в 2-х проекціях
- ☐ d. Біохімічні обстеження крові
- ☐ e. УЗД судин правої нижньої кінцівки


Коментар

Правильна відповідь: УЗД судин правої кінцівки та рентгенографія правої стопи в 2-х проекціях

## Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До медичного пункту батальйону доставлений солдат 19-ти років. Доза опромінення 2,5 Гр. 15 годин тому під час ядерного вибуху знаходився в самохідній установці, продовжував виконувати свої обов'язки. Через 12 годин відчув нездужання, розбитість, сонливість, спрагу, сухість у роті. Було одноразове блювання. Діагностовано гостру променеву хворобу середнього ступеня важкості. Який основний лікувально-евакуаційний захід на даному етапі медичної допомоги? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Направити на сортувальний майданчик
- ☐ b. Направити до медичної роти
- ☐ c. Залишити на МПБ
- ☐ d. Провести санітарну обробку
- ☐ e. Направити в ізолятор


Коментар

Правильна відповідь: Направити до медичної роти

## Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років поступив до приймального відділення лікарні зі скаргами на різкий головний біль, запаморочення, миготіння "мушок" перед очима, відчуття жару та тремтіння в усьому тілі, слабкість правих руки та ноги. Об'єктивно: Ps- 92/хв., АТ- 180/100 мм рт.ст., акцент II тону над аортою. У сечі під час кризу: білок - 0,033 г/л, ер.- 4-8 в полі зору. Який патологічний стан розвинувся у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тиреотоксичний криз
- ☐ b. Неускладнений гіпертонічний криз
- ☐ c. Адісонічний криз
- ☐ d. Ускладнений гіпертонічний криз
- ☐ e. Епілептиформний криз


Коментар

Правильна відповідь: Ускладнений гіпертонічний криз

## Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

20-місячний хлопчик надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги після того, як у нього відбулася одинична генералізована тоніко-клонічна судома, яка тривала 3 хвилини. Раніше у нього судом не було. Останні два дні спостерігалися підвищена температура, кашель та нежить. В анамнезі життя немає захворювань, які можуть бути з цим пов'язані; ліків не приймає. Розвиток дитини: добре ходить, незграбно бігає, може їсти виделкою, вимовляє вісім слів. Температура тіла становить 38,7°C, АТ- 100/65 мм рт.ст., Рс- 116/хв., ЧД-28/хв. На вигляд хлопчик здоровий, спокійно грається іграшками. Результати неврологічного обстеження в нормі. Який наступний захід, на вашу думку, буде найкращим для даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Госпіталізувати та почати вводити антибіотики внутрішньовенно
- ☐ б. Зробити люмбальну пункцію
- ☐ с. Зробити електроенцефалограму
- ☐ d. Заспокоїти
- ☐ е. Ввести протисудомні препарати


Коментар

Правильна відповідь: Заспокоїти

## Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після вуличної бійки друзі принесли 24-річного чоловіка до лікарні невідкладної медичної допомоги. Під час бійки пацієнта вдарили ножом у голову, після чого ніж міцно застряг у черепі. АТ- 106/70 мм рт.ст., Рс- 118/хв., ЧД- 14/хв. Пульсова оксиметрія - 96% при диханні кімнатним повітрям. Важкість коми за шкалою Глазго дорівнює 8. Від больових відчуттів пацієнт розплющує очі, говорить нерозбірливо. Пацієнт відсмикує руку, якщо натиснути на нігтьове ложе. Приблизна довжина ножа - 14 см, у череп проникли 3 см. Інших травм на тілі немає. Що необхідно зробити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Доставити пацієнта у радіологічне відділення для комп'ютерної томограми голови
- ☐ б. Провести іригацію черепної рани фізіологічним розчином
- ☐ с. Здійснити інтубацію пацієнта
- ☐ d. Вийняти ніж з черепа під місцевою анестезією

Коментар

Правильна відповідь: Здійснити інтубацію пацієнта

## Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки 44-х років після переохолодження з'явилася млявість, сонливість, важкість у лівій половині грудної клітки. Брадикардія - 44/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст.,  $t_{\text{о тіла}}$  - 35°C. Яким заходам треба віддати перевагу для боротьби з гіпотермією?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Помістити в гарячу ванну
- ☐ б. Дати гарячий чай
- ☐ в. Помістити хвору в палату з  $t_{\text{о повітря}}$  25°C
- ☐ г. Загальне зігрівання за допомогою джерела тепла
- ☐ д. Призначити пірогенал


Коментар

Правильна відповідь: Помістити хвору в палату з  $t_{\text{о повітря}}$  25°C

## Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 4-річної дитини на 5-ту добу після прийому парацетамолу, що перевищував максимально допустиму дозу в 4 рази, з'явилися порушення свідомості, збудження змінювалось сонливістю, втрата свідомості, носові кровотечі, тремор та гіперкінези верхніх кінцівок. Об'єктивно:  $t_{\text{о}}$  - 38,2°C, Рс- 110/хв., ЧД- 32/хв., з рота "печінковий запах". Склеры та шкіра жовтушні, зірчасті ангіоми на верхній половині тулубу. Печін-ка - не збільшена, селезінка +1 см. В крові: К - 2,8 ммоль/л, Na - 100 ммоль/л, підвищення аміаку. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Вірусний енцефаліт
- ☐ б. Менінгококцемія
- ☐ в. ДВЗ-синдром
- ☐ г. Гостра печінкова недостатність
- ☐ д. Гостра ниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

## Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 74-х років знаходиться в терапевтичному відділенні з приводу гострої пневмонії. В анамнезі: перенесена тотальна резекція щитоподібної залози. На 2-й тиждень перебування стан хворої різко погіршився, наросли симптоми сонливості, адинамії загальмованості, затьмарення свідомості. Об'єктивно: свідомість затьмарена, шкіра суха, холодна, набрякла, з ділянками лущення, лице набрякле, амімічне. Зниження сухожилкових рефлексів, дихання поверхневе, тони серця глухі, ритмічні, АТ- 115/95 мм рт.ст., Ps- 50/хв. Глікемія - 5,6 ммоль/л. Температура тіла - 35,6°C. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіперосмолярна кома
- ☐ b. Гіпотиреодна кома
- ☐ c. Уремична кома
- ☐ d. Ішемічний інсульт
- ☐ e. Мозкова кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіпотиреодна кома

## Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини на другу добу життя з'явились блювання кавовою гущею, мелена. Мати відмовилась від введення вітаміну К в перші години життя дитини. Імовірно розвинулась геморагічна хвороба. Які дії лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Переливання тромбоцитарної маси
- ☐ b. Переливання еритроцитарної маси
- ☐ c. Переливання тромбоцитарної маси і відмитих еритроцитів
- ☐ d. Введення вітаміну К і переливання свіжозамороженої плазми
- ☐ e. Переливання свіжозамороженої плазми і відмитих еритроцитів

Коментар

Правильна відповідь: Введення вітаміну К і переливання свіжозамороженої плазми

## Питання 89

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 10-ти років під час шкільної лінійки знепритомніла. При огляді шкіра бліда, кінцівки холодні. Тони серця послаблені. ЧСС- 62/хв., АТ- 90/50 мм рт.ст. З чого необхідно розпочати надання допомоги на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Забезпечити доступ свіжого повітря
- ☐ b. Покласти теплу грілку до ніг
- ☐ c. Дати теплий чай
- ☐ d. Звільнити від стискаючого одягу
- ☐ e. Покласти дитину на спину з припіднятими ногами

Коментар

Правильна відповідь: Покласти дитину на спину з припіднятими ногами

## Питання 90

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До стаціонару надійшов хворий на неспецифічний виразковий коліт із скаргами на гострий біль у животі, здуття, криваву діарею, підвищення температури тіла до 39оС. На другу добу перебування у стаціонарі на тлі зростання симптомів інтоксикації частота випорожнень значно зменшилась. На оглядовій рентгенограмі: збільшення товстої кишки понад 6 см, переміжні островці виразок слизової оболонки. Яке ускладнення зумовило погіршення стану хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Токсична дилатація товстої кишки
- ☐ b. Стриктура товстої кишки
- ☐ c. Тромбоз мезентеріальних артерій
- ☐ d. Рак кишечника
- ☐ e. Перфорація товстої кишки


Коментар

Правильна відповідь: Токсична дилатація товстої кишки

## Питання 91



Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 3-х місяців, яка знаходиться вдома ввечері, мати помітила, що шкіра має червоний колір, волога. При вимірюванні температури тіла зафіксовано 39оС. З якого препарату потрібно розпочати надання невідкладної допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Німесулід
- ☐ b. Папаверин
- ☐ c. Аспірин
- ☐ d. Анальгін
- ☐ e. Парацетамол

Коментар

Правильна відповідь: Парацетамол

## Питання 92

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 21-го року під час дорожньо-транспортної пригоди отримав переломи кісток тазу. Яким чином необхідно хворого транспортувати в лікарню?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. На твердій поверхні в положенні "жабки"
- ☐ b. На ношах
- ☐ c. На боці на твердій поверхні
- ☐ d. На твердій поверхні на шині
- ☐ e. На твердій поверхні на животі

Коментар

Правильна відповідь: На твердій поверхні в положенні "жабки"

## Питання 93

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 20-ти років скаржиться на охриплість голосу, експіраторну задишку, різку слабкість, головний біль. Стан погіршився через 30 хв. після в/м введення диклофенаку. Об'єктивно: стан важкий, шкіра бліда, акроціаноз, Рс- 100/хв., слабого наповнення, АТ- 75/30 мм рт.ст. Який препарат слід призначити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гідрокортизон
- ☐ б. Сальбутамол
- ☐ в. Допамін
- ☐ г. Димедрол
- ☐ д. Адреналін


Коментар

Правильна відповідь: Адреналін

## Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 30 років. Після приїзду з Туреччини захворів гостро. Поступив зі скаргами на профузний пронос у вигляді рисового відвару. Шкіра суха, тургор знижений,  $t_{\text{о}} -36,4^{\circ}\text{C}$ , АТ- 70/40 мм рт.ст. За добу втратив 3 кг ваги. Діурез знижений. Діагноз - холера. Яка екстрена допомога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ввести великі дози антибіотиків
- ☐ б. Ввести препарати, які викликають закрепи
- ☐ в. Зробити сифонну клізму
- ☐ г. Ввести велику кількість колоїдних розчинів
- ☐ д. Інфузійна терапія

Коментар

Правильна відповідь: Інфузійна терапія

## Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У сортувально-евакуаційному відділенні медичної роти лікар проводить медичне сортування поранених, що прибули з медичного пункту батальйону. Які організаційні питання вирішує лікар при внутрішньопунктовому медичному сортуванні?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Оформлення первинної медичної документації та евакуаційного конверту
- ☐ б. В яке відділення медичної роти направити пораненого, в яку чергу та в якому положенні
- ☐ в. В яке відділення медичної роти та в якому положенні проводити евакуацію пораненого
- ☐ г. В яке відділення медичної роти та з яким діагнозом направити пораненого
- ☐ д. Заповнення евакуаційної відомості та введення знеболюючих


Коментар

Правильна відповідь: В яке відділення медичної роти направити пораненого, в яку чергу та в якому положенні

## Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пішохід 62-х років під час ожеледиці послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є локалізований біль у ділянці верхньої третини лівого передпліччя. Спостерігаються тахікардія, підвищення артеріального тиску, припухлість, деформація, синець та крепітація в ділянці верхньої третини лівого передпліччя, рухи кінцівки неможливі. Можна припустити пошкодження верхньої третини лівого передпліччя. Як ви будете транспортувати хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Наклавши пов'язку Дезо з валиком в пахвовій ділянці
- ☐ б. В напівсидячому положенні з палкою в ліктьових згинах
- ☐ в. Прибинтувавши праву верхню кінцівку до грудної клітини та здорової кінцівки
- ☐ г. Наклавши шину Крамера з фіксацією плечового, ліктьового, променевоzap'ясткового суглобів
- ☐ д. Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п'ястно-фалангових суглобів

Коментар

Правильна відповідь: Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п'ястно-фалангових суглобів

## Питання 97

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 34-х років, після укусу бджоли виник різкий свербіж, почервоніння шкіри в місці укусу. Через 20 хвилин з'явився різкий біль у животі, блювання, позиви до дефекації. Об'єктивно: шкіра бліда, АТ- 60/20 мм рт.ст., Рс- 100/хв. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Кетоацидотична кома, абдомінальна форма
- ☐ б. Гострий апендицит
- ☐ в. Анафілактичний шок, абдомінальна форма
- ☐ г. Інфаркт міокарда, абдомінальна форма
- ☐ д. Гіповолемічний шок

Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичний шок, абдомінальна форма

## Питання 98

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий виявлений через 10 хвилин після артобстрілу. Об'єктивно: положення лежачи на лівому боці, свідомість сплутана, дихання спонтанне, Рс- 82/хв., мають місце ознаки осколкового поранення в області правої нижньої частини живота. Яке положення тіла потерпілого є адекватним для надання першої допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. На спині із зігнутими в колінах ногами
- ☐ б. На спині з піднятим головним кінцем
- ☐ в. На правому боці з прямими ногами
- ☐ г. На лівому боці з прямими ногами
- ☐ д. На животі з прямими ногами


Коментар

Правильна відповідь: На спині із зігнутими в колінах ногами

## Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 45-ти років після конфліктної ситуації на роботі відчула інтенсивний головний біль, була нудота та неодноразові блювання. До цього вважала себе здоровою. Об'єктивно: свідомість ясна, АТ-160/100 мм рт.ст., ЧСС- 70/хв., серцева діяльність ритмічна, загальна гіперестезія, фотофонофобія, ригідність м'язів потилиці. Парезів та інших неврологічних розладів не виявлено. Найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Субарахноїдальний крововилив
- ☐ б. Ішемічний інсульт
- ☐ в. Гостра гіпертонічна енцефалопатія
- ☐ г. Істеричний невроз
- ☐ д. Менінгіт


Коментар

Правильна відповідь: Субарахноїдальний крововилив

## Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Новонароджена дитина народилась в стані асфіксії. За шкалою Апгар 4-5 балів. ЧСС- 110/хв. Яка частота серцевих скорочень є показанням для штучної вентиляції легенів у новонароджених?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 140 скорочень за 1 хвилину
- ☐ б. 110 скорочень за 1 хвилину
- ☐ в. 130 скорочень за 1 хвилину
- ☐ г. 120 скорочень за 1 хвилину
- ☐ д. Менше 100 скорочень за 1 хвилину

Коментар

Правильна відповідь: Менше 100 скорочень за 1 хвилину

## Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На АЕС сталася аварія з пожежею та радіаційним рівномірним гама-опромінюванням. Постраждало 12 працівників (комбіноване ураження). Діагностична та перша лікарська допомога надана персоналом МСЧ радіаційно небезпечного об'єкта. У потерпілих діагностовані множинні опіки, визначена доза зовнішнього рівномірного опромінювання від 8 Гр до 12 Гр. Де у подальшому повинні лікуватися хворі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Спеціальному відділенні Центру радіаційної медицини
- ☐ б. Комбустіологічному відділенні обласної лікарні
- ☐ в. Терапевтичному відділенні місцевої ЦРЛ
- ☐ г. Кардіологічному відділенні ЦРЛ
- ☐ д. Дерматологічному відділенні шкірно-венерологічного диспансеру


Коментар

Правильна відповідь: Спеціальному відділенні Центру радіаційної медицини

## Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 30-ти років після перенесеної ангіни відмітив зниження сечовиділення до 50 мл на добу, появу нудоти, блювання, різку слабкість, сонливість. З'явилися набряки обличчя. В анамнезі хронічний гломерулонефрит. Об'єктивно: шкіра суха із слідами розчухів. Креатинін крові - 820 мкм/л, клубочкова фільтрація - 10 мл/хв. Яким заходам слід віддати перевагу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Плазмаферез
- ☐ б. Лімфоцитозферез
- ☐ в. Гемосорбція
- ☐ г. Гемотрансфузія
- ☐ д. Гемодіаліз


Коментар

Правильна відповідь: Гемодіаліз

## Питання 103

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення військового госпіталю доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням в ділянку черевної порожнини. Шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рs- 100/хв. Симптоми подразнення очеревини сумнівні. Яке дослідження треба виконати для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Лапаротомія
- ☐ б. УЗД органів черевної порожнини
- ☐ в. Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини
- ☐ г. Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини
- ☐ д. Фіброгастродуоденоскопія


Коментар

Правильна відповідь: УЗД органів черевної порожнини

## Питання 104

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Машина швидкої допомоги доставила до відділення невідкладної медичної допомоги 55-річного чоловіка, після того, як він у спекотний літній день втратив свідомість на полі для гри в гольф. Він вже кілька годин грав у гольф зі своїми друзями, коли відчув запаморочення та дезорієнтацію. Температура тіла становить 41,2°C, АТ- 110/68 мм рт.ст., Рs- 104/хв., ЧД- 25/хв. Наразі пацієнт непритомний. Його шкіра гаряча, суха та почервоніла. Що слід зробити в першу чергу, якщо пацієнт у такому стані?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Дати ацетамінофен
- ☐ б. Посприяти охолодженню шляхом випаровування
- ☐ в. Виконати промивання шлунку та прямої кишки крижаною водою
- ☐ г. Дати фенілефрин
- ☐ д. Обтерти губкою, просякнутою спиртом

Коментар

Правильна відповідь: Посприяти охолодженню шляхом випаровування

## Питання 105

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До військового пересувного хірургічного госпіталю пересувної госпітальної бази доставлений солдат 29-ти років. Скаржиться на болі в правій половині грудної клітки, що посилюються при диханні та кашлі. Шкіра грудної клітки не пошкоджена, при пальпації визначається болючість та крепітація в проекції 7 та 8 ребер праворуч. Які інструментальні дослідження необхідно виконати для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. УЗД внутрішніх органів
- ☐ б. УЗД органів черевної порожнини, КТ головного мозку
- ☐ в. КТ головного мозку
- ☐ г. КТ органів грудної клітки та черевної порожнини
- ☐ д. Рентгенографія органів грудної клітки

Коментар

Правильна відповідь: Рентгенографія органів грудної клітки

## Питання 106

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При аварії на військових сховищах виник викид отруйного газу. Під його впливом у постраждалих упродовж декількох хвилин з'явилися задуха, бронхорея, гіперсалівація, клоніко-тонічні судоми. Який препарат необхідно використати у якості антидота?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Адреналін внутрішньовенно
- ☐ б. Лідокаїн внутрішньовенно
- ☐ в. Аскорбінова кислота внутрішньовенно
- ☐ г. Глюконат кальцію повільно внутрішньовенно
- ☐ д. Атропін внутрішньовенно


Коментар

Правильна відповідь: Атропін внутрішньовенно

## Питання 107



Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 63-х років, який зловживав алкоголем впродовж останніх 20-ти років, на фоні хронічної печінкової недостатності у вигляді цирозу печінки та асцити розвинулась масивна кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу. На фоні геморагічного шоку у хворого виникла зупинка серцевої діяльності (асистолія) та дихання. Які особливості лікувальної тактики в цьому випадку? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ендоскопічна зупинка кровотечі
- ☐ б. Проведення комплексу серцево-легеневої реанімації та встановлення шлункового зонду
- ☐ в. Проведення комплексу серцево-легеневої реанімації та гемостатичної терапії
- ☐ г. Електрична дефібриляція
- ☐ д. Проведення комплексу серцево-легеневої реанімації та встановлення зонда Блекмора

Коментар

Правильна відповідь: Проведення комплексу серцево-легеневої реанімації та встановлення зонда Блекмора

## Питання 108

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка 33-х років, яка хворіє на червоний вовчак, одержувала великі дози стероїдів, помітила ознаки гірсутизму, самочинно різко припинила їх вживання. З клінікою адісонічного кризу доставлена в лікарню. АТ- 50/20 мм рт.ст., Ps- 56/хв. Для збереження життя та стабілізації стану хворої показане невідкладне в/в введення:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Рибоксину
- ☐ б. Атропіну
- ☐ в. Глюкокортикоїдів
- ☐ г. Еритроцитарної маси
- ☐ д. Кріоплазми

Коментар

Правильна відповідь: Глюкокортикоїдів

## Питання 109

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 70-ти років скаржиться на стискаючі болі в гомілкових м'язах, що з'являються після ходьби на відстань до 100 м. Після короточасного відпочинку біль проходить, продовження ходьби знову дає ті ж болі. Працював малярем, палить впродовж останніх 40 років. Хворіє на гіпертонічну хворобу останні 15 років. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Деформуючий поліартрит
- ☐ б. Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок
- ☐ в. Плоскостопість
- ☐ г. Ішіорадикуліт
- ☐ ґ. Хвороба Рейно

Коментар

Правильна відповідь: Облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок

## Питання 110

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В гінекологічне відділення поступила хвора із значною кровотечею із статевих шляхів, болями внизу живота. В анамнезі: стоїть на обліку в ж/к з вагітністю 12 тижнів. Об'єктивно: хвора бліда, АТ-100/60 мм рт.ст., Рс- 90-100/хв. Із статевих шляхів значні кров'яністі виділення. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Спонтанний аборт. Геморагічний шок I ступеня
- ☐ б. Кровотеча із вагіни
- ☐ в. Неповний аборт
- ☐ г. Самовільний аборт, що починається
- ☐ ґ. Загроза переривання вагітності

Коментар

Правильна відповідь: Спонтанний аборт. Геморагічний шок I ступеня

## Питання 111

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 38-ми років. Прооперована з приводу дифузного токсичного зобу. Після операції стан хворої погіршився, підвищилась температура тіла, з'явилося серцебиття, задишка, пітливість, пронос, почуття страху. Об'єктивно: хвора збуджена. Шкіра волога, гаряча на дотик. Температура тіла - 38,6оС. Рс- 160/хв., ритмічний. АТ- 85/40 мм рт.ст. Тони серця ритмічні, послаблені. Дихання везикулярне, в нижніх відділах вологі, незвучні середньо- і дрібноміхурчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Тиреотоксична криза
- ☐ б. Гостра надниркова недостатність
- ☐ в. Двобічна нижньочасткова пневмонія
- ☐ г. Інфаркт міокарда
- ☐ д. Гостра лівошлуночкова недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Тиреотоксична криза

## Питання 112

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 28-ми років скаржиться на сильний постійний біль у животі, більше навколо пупка, метеоризм, затримку стула, блювання. Біль спочатку мав переймистий характер. Об'єктивно: температура тіла - 38,2оС. Живіт під час пальпації болючий, петлі кишечника роздуті, при аускультатії ослаблені звуки кишкової перистальтики. В крові нейтрофільний лейкоцитоз. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий апендицит
- ☐ б. Гострий панкреатит
- ☐ в. Напад ниркової кольки
- ☐ г. Кишкова непрохідність
- ☐ д. Гострий холецистит

Коментар

Правильна відповідь: Кишкова непрохідність

### Питання 113

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт під час ковтання цукерки захрипів, схопився за шию, посинів і через 3 хвилини знепритомнів. Об'єктивно: свідомість відсутня, обличчя і шия ціанотичні, нерегулярні та непродуктивні рухи грудної клітки. На сонних артеріях - слабка пульсація. При пальцевій ревізії ротоглотки визначається округле стороннє тіло, змістити яке не вдається. Спроба змістити його при перекиданні пацієнта через коліно - невдала. Які подальші дії?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Транспортування до стаціонару
- ☐ b. Верхня трахеотомія
- ☐ c. Нижня трахеотомія
- ☐ d. Крікотиреотомія
- ☐ e. Пункція трахеї

Коментар

Правильна відповідь: Крікотиреотомія

### Питання 114

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Мати привела свого 4-річного сина до відділення невідкладної медичної допомоги. Вона розповідає: "Він деякий час грався надворі, коли він повернувся додому, то виглядав дуже хворим . Він сказав, що у нього болить живіт, болять м'язи, він сильно спітнів, у нього текла слина та сльозилися очі. Він здавався дуже дезорієнтованим. Я ніколи його таким не бачила." Одразу після повернення у хлопчика була сильна діарея. Дитина спітніла та виглядає дуже хворою. Зіниці звужені, спостерігається сильна слинотеча. Дихає зі свистом; тахіпное помірного ступеню. М'язова сила обмежена в усіх кінцівках, наявні ознаки фасцикуляції. Що слід застосувати проти таких симптомів?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Піридоксин
- ☐ b. Налоксон
- ☐ c. N-ацетилцистеїн
- ☐ d. Атропін та пралідоксим
- ☐ e. Флумазеніл


Коментар

Правильна відповідь: Атропін та пралідоксим

### Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілого 36-ти років, що переніс закриту черепно-мозкову травму, в процесі проведення ехо-енцефалоскопії виявлено зміщення серединного еха на 5 мм. Про що це свідчить?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Перелом основи черепа
- ☐ б. Тріщина кісток склепіння черепа
- ☐ в. Наявність підболонкової гематоми
- ☐ г. Ехо-ЕСпа тології не виявила
- ☐ д. Травматичний субарахноїдальний крововилив


Коментар

Правильна відповідь: Наявність підболонкової гематоми

### Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 47-ми років доставлено в токсикологічне відділення в тяжкому стані. Об'єктивно: свідомість за типом оглушення, АТ- 75/40 мм рт.ст., ЧСС- 40/хв. З анамнезу: 1 годину тому прийняв 3 таблетки клофеліну з суїцидальною метою. Діагноз: отруєння клофеліном. Яка тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Кордіамін в/в, інфузійна терапія
- ☐ б. Преднізолон в/в, інфузійна терапія, промивання шлунка
- ☐ в. Промивання шлунка, спостереження
- ☐ г. Інфузійна терапія, промивання шлунка
- ☐ д. Інфузійна терапія, атропіну сульфат в/в, промивання шлунка

Коментар

Правильна відповідь: Інфузійна терапія, атропіну сульфат в/в, промивання шлунка

## Питання 117

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

35-річного чоловіка знайшли непритомним на місці автомобільної аварії. Бригада швидкої провела на місці інтубацію потерпілого та доставила його до відділення невідкладної медичної допомоги. На вербальні та тактильні подразники не реагує. З роти відчутно запах алкоголю. Основні показники стану організму: температура тіла -36,7°C, АТ- 95/55 мм рт.ст., Рс- 110/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 88% при диханні 80%-м киснем. При фізикальному обстеженні виявлено недостатнє розширення грудної клітки зліва, звуки дихання з лівого боку значно послаблені. Серцеві тони в нормі, без шумів. Глибина ендотрахеальної трубки - 28 см. Якими будуть наступні дії в процесі ведення даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Виконати голкову декомпресію з лівого боку грудної клітки
- ☐ b. Виконати комп'ютерну томографію грудної клітки
- ☐ c. Ввести плевральну дренажну трубку справа
- ☐ d. Розпочати механічну вентиляцію легень з великим дихальним об'ємом
- ☐ e. Перевірити розміщення ендотрахеальної трубки

Коментар

Правильна відповідь: Перевірити розміщення ендотрахеальної трубки

## Питання 118

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 62-х років з діагнозом холедохолітиаз, механічна жовтяниця, що попередньо тривалий час приймала препарати з групи блокаторів кальцієвих каналів, наступила зупинка кровообігу внаслідок асистолії. Які медикаментозні засоби, крім адреналіну, необхідно використовувати для медикаментозного забезпечення реанімаційних заходів?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Еуфілін
- ☐ b. Кальцію хлорид
- ☐ c. Строфантин
- ☐ d. Дофамін
- ☐ e. Кордарон


Коментар

Правильна відповідь: Кальцію хлорид

### Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При обстеженні населення, мешканців району, що постраждали внаслідок радіонуклідного забруднення, виявлено підвищений вміст в організмі радіонукліду стронцію-90. Який препарат можна рекомендувати пацієнтам для зменшення накопичення та прискорення видалення цього радіонукліду?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Калію йодид
- ☐ b. Унітіол
- ☐ c. Пентацин
- ☐ d. Фероцин
- ☐ e. Адсобар


Коментар

Правильна відповідь: Адсобар

### Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовцю в зоні бойових дій поставлений діагноз: закрыта черепно-мозкова травма. Забій мозку. Кома II. До якої сортувальної категорії буде віднесений постраждалий?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. III (зелений колір)
- ☐ b. V (синій)
- ☐ c. IV (темно-фіолетовий колір)
- ☐ d. II (жовтий колір)
- ☐ e. I (червоний колір)

Коментар

Правильна відповідь: I (червоний колір)

## Питання 121

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець 20-ти років скаржиться на різкий біль в правій половині грудної клітки, задишку. З анамнезу відомо, що дві години тому отримав закриту травму грудної клітки. При рентгенологічному дослідженні визначається наявність рідини, що займає до 1/2 плевральної порожнини. При пункції плевральної порожнини отримано кров. При проведенні проби Рувілуа-Грегуара кров у пробірці згортається. Про що свідчать результати проведеної проби? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Пневмоторакс
- ☐ б. Хілоторакс
- ☐ в. Гемоторакс, кровотеча, що триває
- ☐ г. Гемоторакс, зупинена кровотеча
- ☐ д. Серозно-геморагічний плеврит

Коментар

Правильна відповідь: Гемоторакс, кровотеча, що триває

## Питання 122

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий 30-ти років одержав травму в автомобілі, що перевернувся і зайнявся. Об'єктивно: психомоторне збудження, контакту недоступний. Анізокорія. АТ-60/20 мм рт.ст. Пульс тільки на магістральних артеріях, 60/хв., ритмічний, ниткоподібний. Тахіпное до 30/хв. При пальпації грудної клітки: крепітація VI-IX ребер зліва по передній пахвовій лінії. Деформація правого передпліччя в нижній третині типу "багнета". Опік полум'ям грудної клітки, живота і стегон 2 ступеня площею 36% поверхні тіла. З чого треба почати протишокові заходи? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Транспортна іммобілізація передпліччя
- ☐ б. Футлярна анестезія ушкодженого передпліччя
- ☐ в. Введення наркотичних анальгетиків
- ☐ г. Інтубація трахеї
- ☐ д. Інтенсивна інфузійна терапія

Коментар




Правильна відповідь: Інтенсивна інфузійна терапія

### Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 1-річного віку госпіталізована до інфекційного відділення зі скаргами на багаторазове нестримне блювання, профузні рідкі випорожнення. Об'єктивно: риси обличчя загострені, очі запавші, тургор тканин різко знижений, спостерігається акроціаноз, адинамія. АТ- 55/35 мм рт.ст. Анурія. Який невідкладний стан виник у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра надниркова недостатність
- ☐ б. Гостра печінкова недостатність
- ☐ с. Гіповолемічний шок
- ☐ d. Гостра серцева недостатність
- ☐ е. Гостра судинна недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гіповолемічний шок

### Питання 124

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 38-ми років протягом тривалого часу відчував зубний біль. Згодом з'явилися біль голови і ока, загальна слабкість, підвищилася температура тіла. Об'єктивно: хемоз кон'юнктиви, застійна ін'єкція очного яблука, екзофтальм, обмеження рухів очного яблука. В крові: лейкоцитоз, ШОЕ-24 мм/год. На рентгенограмі орбіт патології не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ретробульбарний крововилив
- ☐ б. Целюліт орбіти
- ☐ с. Теноніт
- ☐ d. Флегмона орбіти
- ☐ е. Запальний псевдотумор орбіти


Коментар

Правильна відповідь: Флегмона орбіти

## Питання 125

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У військовослужбовця 45-ти років після вибуху виникла кровотеча із розірваного варикозно розширеного вузла на лівій гомілці. В чому заключається домедична допомога? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Стискаюча пов'язка, підвищене положення пораненої кінцівки
- ☐ б. Ушивання судини в рані, стискаюча пов'язка
- ☐ в. Тампонада судини в рані, знеболювання
- ☐ г. Накладання джгута, ушивання судини в рані
- ☐ д. Підвищене положення пораненої кінцівки, знеболювання


Коментар

Правильна відповідь: Стискаюча пов'язка, підвищене положення пораненої кінцівки

## Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В приймальному відділенні пологового будинку вагітна в терміні гестації 35 тижнів поскаржилась на сильний головний біль, порушення зору. Об'єктивно: шкіра бліда, набряки кінцівок та обличчя. АТ-180/110 мм рт.ст. та 200/120 мм рт.ст. Під час вимірювання артеріального тиску з'явилися фібрилярні посмикування м'язів. Яку терапію слід застосувати першочергово? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Допегіт
- ☐ б. Ніфедипін
- ☐ в. Клофелін
- ☐ г. Введення заспокійливих
- ☐ д. Магnezіальна терапія

Коментар

Правильна відповідь: Магnezіальна терапія

## Питання 127

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка народилася від 2 вагітності, перебіг якої ускладнювався хронічною фето-плацентарною недостатністю, II пологів в терміні 34-35 тижнів, з оцінкою за шкалою Апгар 1/3 бали. На другу добу життя спостерігається зригування кров'янистим вмістом, мелена. Hb- 165 г/л, еритроцити -  $4,8 \cdot 10^{12}/л$ , тромбоцити -  $192 \cdot 10^9/л$ . Який патологічний стан найбільш імовірний в дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гемофілія А
- ☐ б. Гемофілія В
- ☐ с. Гемолітична хвороба новонародженого
- ☐ d. Геморагічна хвороба новонародженого
- ☐ е. Тромбоцитопенія

Коментар

Правильна відповідь: Геморагічна хвороба новонародженого

## Питання 128

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У загальноосвітній школі № 10 міста К. зареєстровано спалах кору. Які дії щодо створення несприйнятливості у осіб, які спілкувалися з хворими, не хворіли і не щеплені проти кору? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Вакцинація не пізніше 72 годин з моменту виявлення першого хворого на кір
- ☐ б. Щоденний медичний огляд
- ☐ с. Введення імуноглобуліну через 72 години
- ☐ d. Введення інтерферону негайно
- ☐ е. Негайна вакцинація незалежно від імунного статусу

Коментар

Правильна відповідь: Вакцинація не пізніше 72 годин з моменту виявлення першого хворого на кір

## Питання 129

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини, яка впродовж 5-ти років хворіє на цукровий діабет 1 типу, після виснажливого тренування у спортзалі виникли різке почуття голоду, неспокій, тремтіння кінцівок, з'явився холодний піт, серцебиття. Через 10 хвилин дитина знепритомніла. Було викликано КШД. Визначений цукор крові становить 1,7 ммоль/л. Кетонові тіла у сечі відсутні. Яка тактика лікаря у наданні невідкладної допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Внутрішньовенне струминне введення 20% розчину глюкози
- ☐ b. Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози
- ☐ c. Введення інсуліну швидкої дії 0,1 Од/кг ваги тіла
- ☐ d. Внутрішньовенне крапельне введення 40% розчину глюкози

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози

### Питання 130

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 71-го року, що страждає близько 30-ти років на виразкову хворобу 12-палої кишки, звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на часте блювання, що не приносить полегшення, гикавку тухлим, прогресуюче схуднення. Діагностований декомпенсований органічний пілоробульбарний стеноз. Якою повинна бути тактика ведення хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Призначення променевої терапії
- ☐ b. Призначення антибактеріальних засобів
- ☐ c. Направити хворого в хірургічне відділення
- ☐ d. Направити хворого в гастроентерологічне відділення
- ☐ e. Парентеральне введення квамателу

Коментар

Правильна відповідь: Направити хворого в хірургічне відділення

### Питання 131

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 1,5 років доставлена до стаціонару на 4-й день захворювання. В'яла, адинамічна, відмовляється від пиття. Тургор тканин знижений, шкірна складка розправляється поволі. Шкіра холодна, бліда, мармурова, акроціаноз. Нав'язливе блювання, випорожнення 2-3 рази на добу, олігурія. Очікувані лабораторні дані, КРІМ:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Підвищення гематокриту, кількості еритроцитів та лейкоцитів крові
- ☐ b. Гіпернатріємія
- ☐ c. Гіпонатріємія
- ☐ d. Метаболічний ацидоз
- ☐ e. Гіпокаліємія

Коментар

Правильна відповідь: Гіпернатріємія

## Питання 132

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 29-ти років звернувся до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на численні рвані рани, отримані внаслідок нападу собаки. Він стверджує, що бігав підтюпцем через поле, коли до нього підбігла тварина та почала його дряпати та кусати за нижні кінцівки, поваливши на землю. За словами власника собаки, тварину нещодавно було щеплено від сказу, але вона стала агресивною після народження щенят минулого тижня. Собаку забрала служба нагляду за тваринами для обстеження. В ході фізикального обстеження потерпілого були виявлені чотири рани від укусів на лівій литці та численні рвані рани на обох литках. Рани від укусів становлять приблизно 2 см завдовжки, кровоточиві, до них потрапила земля та фрагменти рослин. Чоловік не пам'ятає точно, які щеплення він отримав у дитинстві, каже: "Пройшло щонайменше 15 років, відколи я востаннє робив щеплення." Що слід зробити, після того, як рани будуть очищені? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ввести правцевий анатоксин
- ☐ b. Ввести правцевий анатоксин та призначити амоксицилін/клавуланат
- ☐ c. Ввести правцевий анатоксин і протиправцевий імуноглобулін та призначити амоксицилін/клавуланат
- ☐ d. Ввести правцевий анатоксин і протиправцевий імуноглобулін
- ☐ e. Ввести протиправцевий імуноглобулін

Коментар

Правильна відповідь: Ввести правцевий анатоксин і протиправцевий імуноглобулін та призначити амоксицилін/клавуланат

### Питання 133

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 5-ти років через 8-10 хвилин після укусу бджоли з'явилися занепокоєння, гіперемія і свербіж шкіри обличчя, нудота, захриплість голосу, свистяче дихання, сплутаність свідомості, блідість, пітливість. АТ- 55/30 мм рт.ст. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ б. Анафілактичний шок
- ☐ в. Кропив'янка
- ☐ г. Гострий стенозуючий ларингіт
- ☐ д. набряк Квінке

Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

### Питання 134

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час артилерійського обстрілу підрозділу ППО виникло розливання окислювача ракетного палива. У військових з'явилися сильний кашель, тахіпное, брадикардія. Шийні вени набрякли, ціаноз обличчя, виділення пінистого харкотиння рожевого кольору, вислуховуються численні вологі та сухі хрипи. Який препарат доцільно використати у якості антидоту?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Адреналіну гідрохлорид
- ☐ б. Калію аспарагінат
- ☐ в. Піридоксину гідрохлорид
- ☐ г. Тіаміну бромід
- ☐ д. Атропіну сульфат


Коментар

Правильна відповідь: Піридоксину гідрохлорид

### Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При падінні з дерева отриманий відкритий, забруднений землею, перелом стегна. Через три дні загальний стан різко погіршився. ЧСС- 120/хв., температура тіла - 37,5оС. Скарги на розпирючий, сильний біль, наростання набряку стегна, з рани випинають м'язи сірого кольору без запаху та гною, під час пальпації визначається підшкірна крепітація, тимпаніт під час перкусії стегна, при натисканні з країв рани виділяються дрібні бульбашки газу. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Сказ
- ☐ b. Повець
- ☐ с. Газова гангрена
- ☐ d. Сепсис
- ☐ е. Гнилісна інфекція


Коментар

Правильна відповідь: Газова гангрена

### Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час бойових дій була застосована хімічна рідина, олійної консистенції, із запахом, що нагадує часник або гірчицю. У бійців, що постраждали, відмічається безболісна еритема, яка зудить. Через деякий час з'явилися пухирці на межі почервоніння, що нагадували намисто. Яка речовина найімовірніше була застосована?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Синильна кислота
- ☐ b. Азотна кислота
- ☐ с. Хлор
- ☐ d. Іприт

☐ е. Аміак  
Коментар

Правильна відповідь: Іприт

### Питання 137

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Через годину після аварії на підприємстві з виробництва пластмас співробітник скаржиться на головний біль, шум у вухах, слинотечу, пронос, підвищення температури тіла до 38°C. Діагностовано отруєння похідними фенолу. Вміст якої речовини у крові підвищується при отруєнні фенолом?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Карбгемоглобін
- ☐ b. Метгемоглобін
- ☐ c. Карбоксигемоглобін
- ☐ d. Калій
- ☐ е. Креатинін та сечовина

Коментар

Правильна відповідь: Метгемоглобін

### Питання 138

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Попутнім транспортом в лікарню доставлена людина. Її тіло дорівнює тілу навколишнього середовища, трупні плями на плечах, спині, сідницях, трупне задубіння, склери підсохлі, фотореакція відсутня. На ЕКГ асистолія. За свідченням супроводжуючих 90 хвилин тому людина знепритомніла і перестала подавати ознаки життя. Чи потрібно проводити реанімаційні заходи? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Не проводити
- ☐ b. Проводити до відновлення серцевої діяльності
- ☐ c. Проводити 40 хвилин
- ☐ d. Проводити із дотриманням всіх правил реанімації




☐ е. Проводити тільки 5-10 хвилин  
Коментар

Правильна відповідь: Не проводити

### Питання 139

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки у 38 тижнів вагітності, різко підвищився АТ, з'явилися болі в животі, потім кров'янисті виділення з піхви, рухів плоду не відчуває. Хворіє на гіпертонічну хворобу. Об'єктивно: матка в гіпертонусі, в ділянці дна пальпується болісне випинання. Серцебиття плоду не вислуховується. На УЗД визначається ретроплацентарна гематома, відсутність серцебиття плоду. Яка причина кровотечі у вагітної?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Розрив матки
- ☐ b. Розрив піхви
- ☐ c. Відшарування плаценти
- ☐ d. Розрив судин пуповини
- ☐ e. Передлежання плаценти

Коментар

Правильна відповідь: Відшарування плаценти

### Питання 140

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 52-х років через 20 хвилин після гемотрансфузії однокрупної крові з'явилися загальний дискомфорт, біль в м'язах кінцівок, біль у попереку, головний біль, підвищення температури тіла до 37,0°C. Які лікарські засоби необхідно ввести в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Нестероїдні протизапальні препарати
- ☐ b. Анальгін
- ☐ c. Сульфаніламід
- ☐ d. Внутрішньовенне введення ізотонічного розчину натрію хлориду

☐ е. Антибіотики  
Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне введення ізотонічного розчину натрію хлориду

### Питання 141

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 20-ти років, поступила в приймальне відділення з болем в правій здухвинній ділянці постійного характеру. З анамнезу відомо, що спочатку біль виник в епігастральній ділянці, потім змістився в праву здухвинну ділянку. У крові: Нb- 120 г/л, ер.- 3, 5•10<sup>12</sup> г/л, лейкоц.- 15•10<sup>9</sup> г/л.

Сформулюйте попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Виразкова хвороба шлунка
- ☐ б. Гострий панкреатит
- ☐ в. Гострий холецистит
- ☐ г. Гострий апендицит
- ☐ е. Гострий гастрит

Коментар

Правильна відповідь: Гострий апендицит

### Питання 142

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 19-ти років у терміні вагітності 8-9 тижнів. 2 тижні тому з'явилися нудота та блювання до 25 разів на добу. Жінка схудла на 10 кг, з'явилась різка слабкість. Стан тяжкий, Рс- 120/хв., АТ- 100/50 мм рт.ст., у сечі реакція на ацетон позитивна (++++). Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий гастрит
- ☐ б. Блювання вагітних важкого ступеня
- ☐ в. Харчова токсикоінфекція
- ☐ г. Гострий панкреатит

☐ е. Гострий холецистит  
Коментар

Правильна відповідь: Блювання вагітних важкого ступеня

### Питання 143

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 47-ми років після захворювання ангіною став скаржитись на набряки обличчя, грудної клітки, кінцівок, зростання артеріального тиску до 170/100 мм рт.ст., зменшення кількості сечі, зміну її кольору (червоний). В сечі: протеїнурія - 1,2 г/л, гематурія - 30-40 екз. в полі зору. В крові: лейкоцитоз -  $9,7 \cdot 10^9/\text{л}$ , ШОЕ- 30 мм/год. Якому захворюванню найбільш властиві ці симптоми? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Амілоїдоз нирок
- ☐ б. Гострий пієлонефрит
- ☐ в. Пухлина нирок
- ☐ г. Гострий гломерулонефрит
- ☐ е. Гострий цистит

Коментар

Правильна відповідь: Гострий гломерулонефрит

### Питання 144

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В пологовий будинок звернулась вагітна 37-ми років, зі скаргами на відсутність відчуття рухів плоду впродовж 2-х діб. Вагітність 2, 2 пологи. Термін вагітності 40 тижнів. Пологової діяльності немає. При вислуховуванні серцебиття плоду - відсутнє. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Сумнівний стан плода
- ☐ б. Нормальний перебіг вагітності
- ☐ в. Антенатальна асфіксія плода
- ☐ г. Інтранатальна асфіксія плода


☐ е. Муміфікований плід

Коментар

Правильна відповідь: Антенатальна асфіксія плода

## Питання 145

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На сортувальну площадку медичної роти бригади доставлено військовослужбовця з проникаючим пораненням грудної клітки справа з ознаками відкритого пневмотораксу. АТ- 90/50 мм рт.ст., Рс- 140/хв., ниткоподібний. До якого підрозділу медичної роти потрібно направити пораненого для надання кваліфікованої хірургічної допомоги?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Операційно-перев'язувальне відділення
- ☐ b. Госпітальне відділення
- ☐ c. Ізолятор
- ☐ d. Евакуаційна палатка
- ☐ е. Відділення спеціальної обробки

Коментар

Правильна відповідь: Операційно-перев'язувальне відділення

## Питання 146

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної в 35 тижнів після падіння на льоду з'явився біль в животі. При об'єктивному обстеженні лікарем швидкої допомоги виявлено: матка в гіпертонусі, вагітна занепокоєна і вказує на локальний біль біля пупка, шкіра бліда, АТ- 85/50 мм рт.ст., Рс- 110/хв., частота дихання 22/хв. В якому положенні слід проводити інфузійну терапію під час транспортування до стаціонару?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 3 припіднятим головним кінцем
- ☐ b. 3 опущеним головним кінцем
- ☐ c. На спині з припіднятими ногами
- ☐ d. Положення не має значення

☐ е. Положення на лівому боці з припіднятими ногами  
Коментар

Правильна відповідь: Положення на лівому боці з припіднятими ногами

### Питання 147

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 1-го року 4 доби спостерігається підвищення температури тіла до 39°C. Дитина відмовляється від їжі, стала вередлива. Останні 2 доби на фоні лікування погіршилось спочатку дихання носом, а потім ротом. У горизонтальному положенні дитина дихає особливо важко. При пальцевому дослідженні в ділянці випинання визначається флюктуація. Яке ускладнення виникло? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Тонзиліт
- ☐ b. Етмоїдит
- ☐ c. Фарингіт
- ☐ d. Абсцес глотки
- ☐ е. Гайморит

Коментар

Правильна відповідь: Абсцес глотки

### Питання 148

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У підлітка 15-ти років під час забору крові відзначалася раптова короточасна втрата свідомості зі спонтанним відновленням стану. При огляді помірна блідість шкірних покривів, виражений гіпергідроз кінцівок, ЧД- 20/хв., тони серця звучні, ритмічні, ЧСС- 100/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Який невідкладний стан розвився у дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Синкопе
- ☐ b. Психогенна атака
- ☐ c. Епілептичний напад
- ☐ d. Колаптоїдний стан

☐ е. Гіпоглікемічний стан  
Коментар

Правильна відповідь: Синкопе

### Питання 149

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

55-річна жінка з ожирінням надійшла до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на раптове виникнення болю у грудній клітці зліва та задишку. В анамнезі у неї жовчнокам'яна хвороба, гіпертонія, гіпотиреоз та гіперліпідемія. Вона приймає гідрохлортіазид, амлодипін, аспірин та левотироксин. За рік вона палила 35 пачок цигарок і зараз продовжує палити по пачці в день. Попередній огляд у відділенні невідкладної медичної допомоги виявив у неї обширну емболію легеневих судин зліва, інфаркт нижньої частки лівої легені та тромбоз правої підколінної вени. Жінку госпіталізовано, їй почали вводити еноксапарин та варфарин підшкірно. На третій день перебування в лікарні у пацієнтки розвинулися слабкість та запаморочення, її знудило - 500 мл блювотиння у вигляді "кавових зерен". Дані фізикального обстеження: температура тіла - 36,7°C, Рс- 110/хв., АТ- 98/54 мм рт.ст., ЧД- 26/хв. Рівень гемоглобіну – 98 г/л [при надходженні - 126 г/л], (норма: для чоловіків - 135-175 г/л, для жінок - 120-160 г/л), тромбоцити - 320 • 109/л [при надходженні - 210•109/л], (норма - 150-400•109/л). Ендоскопія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту виявила численні виразки шлунку та ерозії. Їй почали давати пантопразол у великій дозирівці. Що слід зробити далі?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Продовжити давати обидва препарати
- ☐ б. Продовжити вводити варфарин, припинити давати еноксапарин
- ☐ в. Продовжити вводити еноксапарин, припинити давати варфарин
- ☐ г. Припинити давати обидва препарати та почати давати аспірин
- ☐ е. Припинити давати обидва препарати та поставити кава-фільтр в нижню порожнисту вену

Коментар

Правильна відповідь: Припинити давати обидва препарати та поставити кава-фільтр в нижню порожнисту вену

### Питання 150

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік змушений тимчасово залишатися на забрудненій радіоактивними речовинами місцевості. Які заходи необхідно йому вжити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Провести герметизацію приміщення та дезактивацію внутрішніх поверхонь
- ☐ b. Негайно одягнути респіратор та провітрити приміщення
- ☐ c. Не виконувати жодних дій до проведення масової евакуації
- ☐ d. Одягнути чоботи, рукавички та комбінезон
- ☐ e. Самостійно виконати евакуацію


Коментар

Правильна відповідь: Провести герметизацію приміщення та дезактивацію внутрішніх поверхонь

## Питання 151

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 44-х років скарги на загальну слабкість, гіпертермію до 39°C, свербіння шкіри, висип, болісність і припухлість суглобів. Об'єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., папульозно-макульозний висип, генералізоване збільшення лімфовузлів, припухлість суглобів, збільшення селезінки. 7 днів тому у травмпункті провели первинну хірургічну обробку рани стопи та ввели протиправцеву сироватку. Вкажіть причину розвитку даного стану:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Геморагічний васкуліт
- ☐ b. Сироваткова хвороба
- ☐ c. Анафілактична реакція
- ☐ d. Сепсис
- ☐ e. Менінгіт


Коментар

Правильна відповідь: Сироваткова хвороба

## Питання 152

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Роділля народила дитину вагою 4 кг. Пологи пройшли без ускладнень. Пологи перші. Дитяче місце відшарувалось самостійно, через 15 хвилин. Одразу після відділення посліду почалась кровотеча одночасно 400 мл і продовжується, яскраво-червоною кров'ю. При зовнішньому масажі матки - матка періодично розслаблюється. При огляді посліду всі часточки в наявності. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дефект оболонок посліду
- ☐ b. Гіпотонічна кровотеча
- ☐ c. Розрив шийки матки
- ☐ d. ДВЗ-синдром
- ☐ e. Травма пологових шляхів


Коментар

Правильна відповідь: Гіпотонічна кровотеча

### Питання 153

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого, який перебуває в гіперглікемічній комі, через 4 години після початку інсулінотерапії раптово розвинулися тахікардія, м'язова гіпотонія; АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: подовження інтервалу QT, зниження S – T, розширення і сплюснення Т. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпоглікемія
- ☐ b. Гіперглікемія
- ☐ c. Гіповолемія
- ☐ d. Гіперкаліємія
- ☐ e. Гіпокаліємія


Коментар

Правильна відповідь: Гіпокаліємія

### Питання 154

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання



75-річний чоловік поступив в клініку з порушенням сечовипускання. Добовий діурез - 160 мл. АТ-180/90 мм рт.ст. Сечовина - 22 ммоль/л, креатинін - 364 мкмоль/л. Відносна щільність сечі - 1020, білок, кетонів тіла, еритроцити, лейкоцити не виявлені. На екскреторній урограмі – розширення ЧМС, множинні конкременти обох нирок. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий тубулярний некроз
- ☐ b. Гострий гломерулонефрит
- ☐ c. Обструктивна уропатія. Гостра затримка сечі
- ☐ d. Хронічна неспецифічна ниркова недостатність
- ☐ e. Інтерстиційний нефрит


Коментар

Правильна відповідь: Обструктивна уропатія. Гостра затримка сечі

## Питання 155

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Демобілізований 34-х років звернувся до психотерапевта через 6 місяців після того, як він брав участь у тривалій бойовій операції. Скаржиться на появу нав'язливих спогадів та уявлень пережитого жаху під час бомбування. Спостерігається емоційна відчуженість, періодично погані настрої, частота флеш-беків до 2-3 на добу в денний час, уникання хворим стимулів, що могли б викликати спогади про психотравму. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Депресивний синдром
- ☐ b. Дисоціативний розлад особистості
- ☐ c. Тривожний синдром
- ☐ d. Розлад свідомості
- ☐ e. Посттравматичний стресовий розлад


Коментар

Правильна відповідь: Посттравматичний стресовий розлад

## Питання 156

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого після автомобільної аварії з'явилися скарги на різку задишку, кашель з кров'ю. Об'єктивно: шкіра бліда, ціанотична. Підшкірна емфізема в ділянці грудної клітки, живота, шиї справа. Аускультативно: справа дихання не вислуховується. Рс- 130/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., Нt- 0,25, Нb- 88 г/л. Які першочергові заходи лікаря на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дофамін 2-5 мкг/кг/хв., інфузія колоїдних розчинів
- ☐ b. Трансфузія еритромаси відповідно до групової і резусної належності
- ☐ c. Негайна штучна вентиляція легень
- ☐ d. Активна аспірація повітря справа
- ☐ e. Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди


Коментар

Правильна відповідь: Активна аспірація повітря справа

## Питання 157

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До відділення невідкладної медичної допомоги надійшов 35-річний чоловік, який порізав палець іржавим ножом під час роботи на присадибній ділянці. Поріз глибокий, але дружина потерпілого одразу наклала тугу пов'язку, щоб зупинити кровотечу. Стан імунізації невідомий. Востаннє пацієнт звертався до лікаря близько 10 років тому; пригадати, чи були йому зроблені у дитинстві всі щеплення, не може. На долонній стороні середнього пальця на правій руці спостерігається глибока рвана рана. Розпочато очищення рани та інші необхідні заходи для її обробки. Що буде оптимальним наступним кроком у догляді за цим пацієнтом?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести протиправцевий імуноглобулін та правцевий анатоксин
- ☐ b. Відправити пацієнта додому; імунізація не потрібна
- ☐ c. Ввести лише правцевий анатоксин
- ☐ d. Ввести лише протиправцевий імуноглобулін


Коментар

Правильна відповідь: Ввести протиправцевий імуноглобулін та правцевий анатоксин

## Питання 158

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В мобільному госпіталі знаходиться пацієнт із зони АТО, якого прооперовано з приводу кульового поранення стегна і якому призначена антибіотикотерапія - цефалоспорин 2 г на добу внутрішньовенно. Через 12 годин після уведення препарату у пацієнта з'явилась висипка по всьому тілу, більше на тулубі і кінцівках, у вигляді рожевих пухирів, місцями зливного характеру, які супроводжуються нестерпним свербіжем. АТ- 110/70 мм рт.ст. Який стан розвинувся у хворого? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Анафілактичний шок
- ☐ b. Сепсис
- ☐ c. Сироваткова хвороба
- ☐ d. Медикаментозна алергія
- ☐ e. Бешихове запалення


Коментар

Правильна відповідь: Медикаментозна алергія

### Питання 159

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 10-ти років годину тому отримав травму носа під час занять з фізичного виховання. Свідомості не втрачав. Об'єктивно: виражений набряк м'яких тканин носа. Носове дихання утруднене. Риноскопично: рясна носова кровотеча з передніх відділів носа, виявляється значний набряк слизової оболонки. На рентгенограмах в прямій та бічних проекціях перелому кісток носа не виявлено. Які першочергові заходи слід провести?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Задня і передня тампонада
- ☐ b. Передня тампонада носа
- ☐ c. Перев'язка загальної сонної артерії
- ☐ d. Задня тампонада
- ☐ e. Призначення гемостатичної терапії та антибіотиків


Коментар

Правильна відповідь: Передня тампонада носа

### Питання 160

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з сальмонельозом розвинулась клініка преренальної ниркової недостатності. Що в лікуванні є найбільш важливим на першому етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Корекція гіперкаліємії
- ☐ б. Антибактеріальна терапія
- ☐ в. Серцево-судинні препарати
- ☐ г. Стабілізація гемодинаміки і об'єму циркулюючої крові
- ☐ д. Фуросемід


Коментар

Правильна відповідь: Стабілізація гемодинаміки і об'єму циркулюючої крові

## Питання 161

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

55-річна жінка надійшла до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на сильний біль у спині, який поступово наростає, та утруднену ходу протягом останніх 2-х тижнів. Біль відчувається в середній частині грудного відділу та має оперізувальний характер на рівні верхньої частини живота. Пацієнтка також скаржиться на слабкість, втрату чутливості та поколювання в обох нижніх кінцівках. Порушень в роботі кишечника чи сечового міхура не спостерігала. 8 місяців тому пройшла лікування неходжкінської лімфоми хіміо- та радіотерапією. Фізикальне обстеження: температура тіла становить 36,7°C, АТ- 110/80 мм рт.ст., Рс- 94/хв. Неврологічне обстеження: м'язова сила - 3/5 в обох нижніх кінцівках. Колінний та ахіллів рефлeksi швидкі, рефлекс Бабинського спостерігається з обох боків. Що слід зробити далі?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Магнітно-резонансна томографія хребта, консультація хірурга
- ☐ б. Кортикостероїди у великій дозі, магнітнорезонансна томографія хребта
- ☐ в. Антибіотики внутрішньовенно, магнітнорезонансна томографія хребта
- ☐ г. Кортикостероїди у великій дозі, люмбальна пункція для аналізу спинномозкової рідини
- ☐ д. Антибіотики внутрішньовенно, консультація хірурга

Коментар

Правильна відповідь: Кортикостероїди у великій дозі, магнітнорезонансна томографія хребта

## Питання 162

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У військовослужбовця 19-ти років після падіння внаслідок вибухової хвилі виник забій передньої черевної стінки, після чого хворий не може помочитися. Стан середньої тяжкості. Скарги на біль в гіпогастрії, неможливість сечовипускання. Сечовий міхур пальпаторно не визначається. Зовнішні статеві органи без змін. При введенні еластичного катетера в сечовий міхур сеча кривава.

Проведення проби Зельдовича - позитивна. Який діагноз має місце?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Травма промежинного відділу уретри
- ☐ б. Позачеревне ушкодження сечового міхура
- ☐ в. Гостра ниркова недостатність
- ☐ г. Гостра затримка сечі
- ☐ д. Внутрішньочеревне ушкодження сечового міхура

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньочеревне ушкодження сечового міхура

## Питання 163

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До дільничного гінеколога звернулась жінка зі скаргами на незначні кров'яністі виділення з піхви, болі внизу живота. Остання нормальна менструація 2 місяці тому. Імунологічний тест на вагітність позитивний. Об'єктивно: живіт під час пальпації м'який, болючий в нижніх відділах. Виділення кров'яністі незначні. Яке додаткове обстеження необхідне для підтвердження діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ультразвукове обстеження
- ☐ б. Рентгенологічне обстеження
- ☐ в. Лапароскопічне обстеження
- ☐ г. Загальний аналіз крові
- ☐ д. Пункція заднього склепіння піхви

Коментар

Правильна відповідь: Ультразвукове обстеження

## Питання 164

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчикові 9 років. Із анамнезу відомо, що у старшого брата, дідуся по материнській лінії підвищена кровоточивість. Масивні гематоми у хлопчика вперше з'явилися у віці 1,5 років. У 3 роки вперше стався крововилив у правий колінний суглоб. При госпіталізації в стаціонарі - правий колінний суглоб збільшений, функція його порушена, шкіра над суглобом гаряча на дотик.

Встановіть попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ідіопатична тромбоцитарна пурпура
- ☐ б. ЮРА
- ☐ в. Поліомієліт
- ☐ г. Гемофілія
- ☐ д. Геморагічний васкуліт

Коментар

Правильна відповідь: Гемофілія

## Питання 165

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 40 років. Поступив вранці у стаціонар з діагнозом цирозу печінки змішаної етіології (вірусний гепатит Ста алкоголь), ст. декомпенсації. Вчора вживав алкоголь. Ввечері з'явилось психомоторне збудження, збільшився у розмірах живіт. Об'єктивно: зіниці розширені, симетричні, реакція на світло збережена. Даних за шлунково-кишкову кровотечу немає. Причини погіршення стану:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Алкогольна інтоксикація
- ☐ б. Енцефалопатія складного ґенезу, вестибулоатаксичний синдром, епієквіваленти з порушенням свідомості
- ☐ в. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ г. Прогресування печінкової енцефалопатії
- ☐ д. Шизоафективний розлад на тлі основного захворювання (ЦП)

Коментар

Правильна відповідь: Прогресування печінкової енцефалопатії

## Питання 166

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 58-ми років, що перебував одну добу в палаті інтенсивної терапії з приводу інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. Об'єктивно: шкіра бліда, пульс на а. carotis відсутній, на ЕКГ - фібриляція шлуночків. Які заходи найбільш доцільно провести?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення внутрішньовенно лідокаїну
- ☐ b. Електроімпульсну терапію
- ☐ c. Введення внутрішньосерцево адреналіну
- ☐ d. Вагусні проби
- ☐ e. Черезстравохідну кардіостимуляцію

Коментар

Правильна відповідь: Електроімпульсну терапію

## Питання 167

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 11-ти років поступив зі скаргами на гострий біль в животі, нудоту, багаторазове блювання з домішкою жовчі. З анамнезу: два дні тому дитина отримала удар в живіт під час бійки з однолітками. Об'єктивно: шкіра та слизові бліді, Рс- 86/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Пальпаторно - біль та напруження передньої черевної стінки в епігастрії. Кишкова перистальтика ослаблена. Жовчний міхур не пальпується. Позитивні симптоми Воскресенського та Мейо-Робсона. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий холецистит
- ☐ b. Гостра кишкова непрохідність
- ☐ c. Гострий панкреатит
- ☐ d. Гостра токсикоінфекція
- ☐ e. Перитоніт

Коментар

Правильна відповідь: Гострий панкреатит

## Питання 168

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення доставлено потерпілого внаслідок ДТП. Стан важкий, без свідомості, наявна анізокорія. АТ-110/70 мм рт.ст., Ps- 96/хв., ритмічний. Під час транспортування у відділення реанімації з'явився акроціаноз, брадіпное із включенням допоміжної мускулатури, падіння показників сатурації до 84 об.%. Який першочерговий захід слід провести в палаті інтенсивної терапії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Уведення повітроводу
- ☐ б. Проведення оксигенотерапії за допомогою носових канюль
- ☐ с. Внутрішньовенне введення розчину соди
- ☐ д. Інтубація трахеї та апаратна ШВЛ
- ☐ е. В/в введення дихальних аналептиків

Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї та апаратна ШВЛ

## Питання 169

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні невідкладної медичної допомоги доставили 8-річного хлопчика. Було повідомлено, що приблизно 4 години тому він випадково випив "антифриз" у гаражі, переплутавши його з прохолоджувальним напоєм. Який фізичний симптом підтвердить, що пацієнт випив "антифриз"? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Розширені зіниці
- ☐ б. Надмірне слиновиділення
- ☐ с. Пришвидшене глибоке дихання
- ☐ д. Сухість шкіри та слизових оболонок
- ☐ е. Нерегулярний пульс


Коментар

Правильна відповідь: Пришвидшене глибоке дихання



## Питання 170

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після ДТП стан чоловіка важкий, скарги на розлитий біль по всьому животі. Шкіра бліда. АТ- 80/60 мм рт.ст., Рс- 98/хв. Участь живота у диханні обмежена більше зліва. Живіт напружений, болісний, позитивні симптоми подразнення очеревини. Сечовипускання мізерне. Сеча світла. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Тупа травма живота, розрив печінки, кровотеча
- ☐ b. Закрита черепно-мозкова травма
- ☐ с. Закрита травма грудної клітки, розрив легенів, гемоторакс
- ☐ d. Тупа травма живота, розрив селезінки, кровотеча
- ☐ е. Тупа травма живота, розрив сечового міхура

Коментар

Правильна відповідь: Тупа травма живота, розрив селезінки, кровотеча

## Питання 171

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Мати залишила здорового сина 2,5 років із старшою дочкою, хворою на ГРВІ. Через 3 години повернення додому, вона помітила у сина частий кашель. На другий день стан його погіршився, температура тіла - 38,0С, ЧД- 42/хв., ЧСС- 132/хв., ціаноз шкіри. Перкуторно справа нижче кута лопатки вкорочення звуку, аускультативно - в цьому місці різке ослаблення дихання. На Ro ОГК ателектаз правих сегментів S4 і S5, тень органів середостіння зміщена вправо. Яка імовірна причина такого стану дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Напружений пневмоторакс
- ☐ b. Гостра пневмонія
- ☐ с. ГРВІ
- ☐ d. Гострий обструктивний бронхіт
- ☐ е. Стороннє тіло бронхів


Коментар

Правильна відповідь: Стороннє тіло бронхів

### Питання 172

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 6-ти років госпіталізована до дитячого відділення з бронхопневмонією. Страждає на atopічний дерматит. Після внутрішньом'язового введення ампіциліну з'явилися відчуття стиснення у грудях, запаморочення, різка блідість, ціаноз, холодний піт, прискорене шумне дихання. Який з перерахованих препаратів слід ввести в маніпуляційній негайно?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Розчин адреналіну підшкірно
- ☐ b. Розчин строфантину внутрішньовенно
- ☐ c. Розчин преднізолону внутрішньовенно
- ☐ d. Розчин еуфіліну внутрішньовенно
- ☐ e. Розчин тавегілу внутрішньовенно


Коментар

Правильна відповідь: Розчин адреналіну підшкірно

### Питання 173

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий на цукровий діабет у коматозному стані поступив у лікарню швидкої медичної допомоги. При лабораторному обстеженні виявлено: глюкоза - 68 ммоль/л, рН крові - 7,35, осмолярність крові - 395 мосм/кг, К<sup>+</sup> - 2,2 ммоль/л, ацетон - 12 ммоль/л. Яке найбільш імовірне метаболічне порушення є причиною коми хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпокаліємія
- ☐ b. Гіперосмолярність
- ☐ c. Кетонемія
- ☐ d. Ацидоз
- ☐ e. Гіперкаліємія


Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярність

### Питання 174

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 2-х місяців спостерігаються жовтушність шкіри, склер, лихоманка. Дитина загальмована, задишка, тахікардія. Печінка +2,5 см. Сеча темна, кал світлий. З анамнезу: дитина у ранньому неонатальному віці перенесла гемолітичну хворобу новонароджених, операцію замінного переливання крові. Яка найбільш імовірна причина, що обумовила стан дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гемолітична хвороба
- ☐ б. Гепатит
- ☐ в. Синдром "жовчної пробки"
- ☐ г. Тирозинемія
- ☐ д. Атрезія жовчних ходів


Коментар

Правильна відповідь: Гепатит

### Питання 175

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Медична рота бригади прибула на нове місце розміщення. Вкажіть, які функціональні підрозділи розгортаються в першу чергу:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Операційно-перев'язочне та госпітальне відділення
- ☐ б. Сортиувально-евакуаційне та операційно-перев'язочне відділення
- ☐ в. Сортиувально-евакуаційне відділення та відділення спеціальної обробки
- ☐ г. Сортиувально-евакуаційне та госпітальне відділення
- ☐ д. Сортиувально-евакуаційне відділення та аптека

Коментар

Правильна відповідь: Сортиувально-евакуаційне та операційно-перев'язочне відділення

## Питання 176

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчини 19-ти років після зґвалтування виникли постійна плаксивість, тривога, настрій став пригніченим, знизилася працездатність, рухи загальмовані, з'явилися думки про недоцільність життя. Визначте психопатологічний стан:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Тривожна депресія
- ☐ b. Ендогенна депресія
- ☐ c. Судинна депресія
- ☐ d. Реактивна депресія
- ☐ e. Інволюційна депресія

Коментар

Правильна відповідь: Реактивна депресія

## Питання 177

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 9-ти місяців з менінгококцемією, що проявилася генералізованою геморагічною висипкою на шкірі з некрозом її елементів, різко погіршився стан: дифузний ціаноз, холодні кінцівки, виражені тахікардія та тахіпное, тони серця гучні, ритмічні, АТ- 40/0 мм рт.ст., олігурія, температура - 36,2оС. Яке ускладнення менінгококової інфекції виникло у дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ексикоз
- ☐ b. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ c. Кардіогенний шок
- ☐ d. Гостра ниркова недостатність
- ☐ e. набряк головного мозку

Коментар

Правильна відповідь: Інфекційно-токсичний шок

## Питання 178

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У поліклініці під час прийому у кабінеті лікаря-терапевта раптово знепритомнів чоловік 62-х років. Лікар діагностував клінічну смерть. Розпочато реанімаційні заходи. Співвідношення компресій грудної клітини та вдихів в даному випадку має дорівнювати:  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 15:2
- ☐ b. 30:2
- ☐ c. 20:1
- ☐ d. 15:1
- ☐ e. 5:1

Коментар

Правильна відповідь: 30:2

## Питання 179

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 30-ти років, працівник акумуляторного заводу, скаржиться на інтенсивні колькоподібні болі у животі, відсутність випорожнення та відходження газів впродовж тижня, слабкість. Стан задовільний. Шкіра бліда. Живіт втягнутий. Симптоми подразнення очеревини негативні. Анемія. При оглядовій рентгенографії черевної порожнини дрібні "чаші Клойбера" в проекції брижі тонкої кишки. Який діагноз найбільш імовірний?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Рак сигмоподібної кишки
- ☐ b. Странгуляційна кишкова непрохідність
- ☐ c. Обтураційна кишкова непрохідність
- ☐ d. Паралітична кишкова непрохідність
- ☐ e. Спастична кишкова непрохідність, свинцева колька

Коментар

Правильна відповідь: Спастична кишкова непрохідність, свинцева колька

## Питання 180

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На другу добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зобу у хворої з'явилися тонічні судоми пальців ("рука акушера"), позитивні симптоми Хвостека, Вейса, Труссо. Яке ускладнення операції виникло?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Анафілактичний шок
- ☐ b. Гіпопаратиреоз
- ☐ c. Інфаркт міокарда
- ☐ d. Тиреотоксичний криз
- ☐ e. Асфіксія

Коментар

Правильна відповідь: Гіпопаратиреоз

## Питання 181

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий надійшов у лікарню на третій день захворювання з  $t_{\text{о}} - 39^{\circ}\text{C}$ , головним болем, ознобом. Захворювання почалося з появи папули у пахвинній області. Наступного дня з'явився пухирець із темним вмістом, що потім розкрився з утворенням болючої ранки з жовтуватим дном й болючим синьо-червоним інфільтратом в пахвинній області розміром 4x4 см. Які заходи необхідно провести в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ізоляція хворого з протиепідемічними заходами
- ☐ b. Введення жарознижуючих препаратів
- ☐ c. Накласти пов'язку на рану
- ☐ d. Введення протиправцевої сироватки
- ☐ e. Первинна хірургічна обробка рани

Коментар

Правильна відповідь: Ізоляція хворого з протиепідемічними заходами

## Питання 182

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого через 4 дні після повернення з сільської місцевості Північного Казахстану підвищилась температура тіла до 39°C, з'явився біль у паху зліва. На 3-й день хвороби  $t_{\text{о}} = 39,5^{\circ}\text{C}$ , хворий лежить із напівзігнутою лівою ногою. В лівій пахвинній ділянці спостерігається болючий конгломерат 3x5 см, шкіра над ним синюшно-червона. Рс- 120/хв., АТ- 100/50 мм рт.ст. Який антибактеріальний препарат слід призначити хворому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ампіокс
- ☐ б. Стрептоміцин
- ☐ в. Кларитроміцин
- ☐ г. Триметоприм-сульфаметаксазол
- ☐ д. Пеніцилін

Коментар

Правильна відповідь: Стрептоміцин

## Питання 183

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пішохід 34-х років збитий автомашиною, впав на спину та вдарився шиєю при падінні об бордюр тротуару. Стан середньої важкості. Є загальна загальмованість при збереженій свідомості та орієнтуванні, гіперемія обличчя, локалізований біль у шиї на боці удару. Відмічається тахікардія, підвищення артеріального тиску. Утруднення дихання не відмічається. Можна думати про пошкодження шийного відділу хребта. Який засіб транспортної іммобілізації слід використати? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Шина Дезо
- ☐ б. Шина Пирогова
- ☐ в. Комір Еланського
- ☐ г. Комір Крамера
- ☐ д. Комір Шанца


Коментар

Правильна відповідь: Комір Шанца

## Питання 184

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

25-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на сильну лихоманку, остуду, міалгію та висип на шкірі, які виникли в той самий день, коли пацієнта було госпіталізовано. У нього також спостерігалися нудота та три випадки діареї з великою кількістю водянистих випорожнень, наразі пацієнт відчуває запаморочення. Два дні тому він переніс операцію з корекції неправильно сформованої носової перегородки; інших захворювань в анамнезі немає. Останнім часом пацієнт не подорожував та не контактував з хворими. Наркотики не вживає. Температура тіла становить 39,4°C, АТ- 85/50 мм рт.ст., Рс- 116/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 98% при диханні кімнатним повітрям. Перебуває у апатичному стані, але вогнещевої слабкості та напруженості шиї не спостерігається. При обстеженні виявлено чисті легеневі поля, тахікардію, нормальні перший та другий тони серця. Живіт м'який та безболісний. Тампонада носа в обох ніздрях. При огляді шкіри виявлено розлитий, червоний, плямистий висип, який поширюється на долоні та підшви. Результати лабораторних досліджень: Клінічний аналіз крові: тромбоцити - 105 • 109/л (норма - 150-400 • 109/л), лейкоцити - 13 • 109/л (норма - 4,5-11, 0 109/л), нейтрофіли - 90% (норма - 54-62%), паличкоядерні - 5%(норма - 3-5%). Біохімічний аналіз сироватки крові: азот сечовини крові - 13,6 ммоль/л (норма - 2,5-6,4 ммоль/л), креатинін - 167,8 мкмоль/л (норма - 53-106 мкмоль/л). Дослідження функції печінки: аспартат-амінотрансфераза (глутамат-оксалоацетат-трансаміназа сироватки крові) - 87 Од/л (норма - 8-20 Од/л), аланін-амінотрансфераза (глутамат-піруват-трансаміназа сироватки крові) – 99 Од/л (норма - 8-20 Од/л). Зроблено посів крові. Що є першочерговим заходом у лікуванні цього пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ін'єкція адреналіну та антигістаміни
- ☐ b. Ін'єкцію поліклонального імуноглобуліну людини
- ☐ c. Внутрішньовенна інфузія рідини та кортикостероїди у великих дозах
- ☐ d. Інфузія добутаміну
- ☐ e. Внутрішньовенна інфузія рідини та антибіотикотерапія


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенна інфузія рідини та антибіотикотерапія

## Питання 185

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання



Хвора 24-х років страждає на розсіяний склероз з демієлінізуючим процесом у спинному мозку. Виникла гостра затримка сечі. Який найбільш імовірний рівень локалізації ураження? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Церебральний
- ☐ b. Крижовий
- ☐ c. Шийний
- ☐ d. Надкрижовий
- ☐ e. Грудний

Коментар

Правильна відповідь: Надкрижовий

## Питання 186

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

7-річний хлопчик надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на нудоту, блювання та біль у животі. Протягом останнього місяця він відчував все сильнішу втому, нудота та біль у животі тривають останні 2 дні. Температура тіла становить 36,7°C, АТ- 90/55 мм рт.ст., Рс- 134/хв., ЧД- 24/хв. Під час фізикального обстеження пацієнт втомлений, але іде на контакт, слизові оболонки сухі. На аускультатії легені чисті. Живіт м'який, без здуття, дещо болісний в усіх квадрантах. Кишкові шуми нормальні. Напруженості м'язів чи симптому Блюмберга не спостерігається. Результати лабораторних досліджень наступні: Клінічний аналіз крові: гемоглобін - 130 г/л (норма: для чоловіків - 135-175 г/л, для жінок - 120-160 г/л), гематокрит - 39% (норма: для чоловіків - 41-53%, для жінок - 36-46%), тромбоцити - 240 109/л (норма - 150-400 109/л), лейкоцити - 9,0 109/л (норма - 4,5-11,0 109/л). Біохімічний аналіз сироватки крові: натрій - 140 ммоль/л (норма - 136-145 ммоль/л), калій - 5,8 ммоль/л (норма - 3,5-5,0 ммоль/л), хлорид - 90 ммоль/л (норма - 95-105 ммоль/л), азот сечовини крові - 9 ммоль/л (норма - 2,5-6,4 ммоль/л), креатинін - 70 мкмоль/л (норма - 53-106 мкмоль/л). Дослідження газового складу венозної крові: рН - 7 (норма - 7,35-7,45), бікарбонат - 4 ммоль/л (норма - 22-28 ммоль/л). Аналіз сечі: питома вага - 1030, кетонурія, глюкозурія. Боліус фізіологічного розчину обсягом 10 мл/кг було введено внутрішньовенно протягом години. Після цього була поставлена нсулінова крапельниця. Що є найдоцільнішим наступним кроком у веденні даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Визначення сироваткової ліпази та комп'ютерна томографія органів черевної порожнини
- ☐ b. Госпіталізація до реанімаційного відділення
- ☐ c. Додавання бікарбонату до рідин, що вводяться внутрішньовенно
- ☐ d. Виділення культури крові та сечі
- ☐ e. Терапія антибіотиками

Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація до реанімаційного відділення

## Питання 187

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 8 місяців захворіла гостро, 6 годин тому стала різко неспокійною. Періоди неспокою (3-5 хв.) супроводжувалися блюванням та раптово припинялися на 20-30 хв. Спочатку випорожнення мали каловий характер, пізніше - вигляд "малинового желе". При поступленні: стан хворої важкий. Рс- 120/хв. Живіт під час пальпації болючий, напруження м'язів черевної стінки немає. В черевній порожнині пальпується пухлиноподібний утвір у вигляді м'якого, еластичного, помірно рухомого валика. Діагноз: інвагінація кишечника. Яка тактика?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Термінове оперативне втручання
- ☐ b. Планове оперативне втручання
- ☐ c. Передопераційна підготовка, оперативне втручання
- ☐ d. Динамічне спостереження
- ☐ e. Консервативна дезінвагінація

Коментар

Правильна відповідь: Консервативна дезінвагінація

## Питання 188

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Напередодні Нового року до лікарні невідкладної медичної допомоги доставили літнього чоловіка, вік якого точно невідомий. Коли його знайшли, він лежав на вулиці і майже ні на що не реагував. У відділенні виміряли його життєві показники: внутрішня температура тіла становить 29°C, АТ-70/30 мм рт.ст., Рс- 40/хв., ЧД- 6/хв., дихання поверхневе. Насичення гемоглобіну киснем - 90% при подачі кисню 5 л/хв. В ході обстеження: пацієнт не реагує на вербальні подразники, у диханні відчутно запах алкоголю. Зіниці в нормі, симетричні, але уповільнено реагують на світло. Обстеження легень виявило хрипи з обох сторін. Обстеження серцево-судинної системи виявило брадикардію та нерегулярний пульс. Неврологічне обстеження було складно провести, але в процесі спостерігалася явна гіпорексія. Початкова ЕКГ показала синусову брадикардію, часто спостерігаються передчасні шлуночкові комплекси. Рівень глюкози в капілярній крові - 17,1 ммоль/л, (норма - 3,8-6,1 ммоль/л). У швидкій розпочали інфузію підігрітого фізіологічного розчину крізь периферичний катетер розміру 16G. Пацієнт також отримав одну дозу тіаміну внутрішньовенно. Якими будуть наступні дії в процесі ведення даного пацієнта?  
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Фуросемід внутрішньовенно
- ☐ b. Ін'єкція атропіну

- ☐ c. Введення центрального катетеру до підключичної вени
- ☐ d. Інфузія інсуліну
- ☐ e. Ендотрахеальна інтубація


Коментар

Правильна відповідь: Ендотрахеальна інтубація

### Питання 189

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

54-річна жінка надійшла до лікарні невідкладної медичної допомоги із серцебиттям. Пароксизмальна фібриляція передсердь спостерігалася протягом останніх 6 місяців. Вона пройшла численні дослідження, покликані з'ясувати першопричину, в тому числі ехокардіографію та вимірювання функції щитоподібної залози, результати яких були нормальними. 6 тижнів тому кардіолог призначив пацієнтці аміодарон, і донині вона почувала себе добре. Зміна ваги або непереносимість холоду чи тепла не спостерігалися. Пацієнтка також приймає аспірин у невеликій дозировці та атенолол. Під час фізикального обстеження пацієнтка не виказує дискомфорту. АТ - 130/80 мм рт.ст., Ps - 112/хв., нерівномірний. Лабораторні дослідження показують нормальний клінічний аналіз крові та обмін речовин. На ЕКГ фібриляція передсердь, тахісistolічна форма. Маркери функції щитоподібної залози є наступними: тиреотропін - 4,5 мОд/л (норма - 0,35-5,0 мОд/л), загальний Т4 - 15,6 мкг/дл (норма - 4-11 мкг/дл), загальний Т3 - 75 нг/дл (норма - 80-180 нг/дл). Чим найімовірніше пояснюються такі результати вимірювання функції щитоподібної залози? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Хвороба Грейвса
- ☐ b. Синдром еутиреоїдної слабкості
- ☐ c. Вплив атенололу на метаболізм гормону щитовидної залози
- ☐ d. Вплив аспірину на метаболізм гормону щитовидної залози
- ☐ e. Вплив аміодарону на метаболізм гормону щитовидної залози


Коментар

Правильна відповідь: Вплив аміодарону на метаболізм гормону щитовидної залози

### Питання 190

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

50-річний чоловік надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на біль в грудній клітці та запаморочення. Холодним зимовим днем він чистив сніг, як раптом відчув стискання за грудниною. Біль був постійним, іррадіював до лівої щелепи, не вщух після відпочинку та застосування нітрогліцеринового спрею, який пацієнтові дали у машині швидкої допомоги. В анамнезі у пацієнта гіпертонія, яка коригується ліками. Час від часу пацієнт палить, особливо у вихідні, але алкоголь не вживає. Температура тіла становить 36,2°C, АТ- 85/50 мм рт.ст., Рс- 34/хв., ЧД- 16/хв. Венозний тиск на яремній вені в нормі. Обстеження виявило хрипи в основах обох легень та нормальні перший та другий тони серця. Електрокардіограма показує синусову брадикардію з підвищенням сегменту ST на 3 мм у відведеннях II, III та AVF. Який захід слід вжити у першу чергу в процесі ведення даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Імплантація постійного кардіостимулятора
- ☐ b. Добутамін внутрішньовенно
- ☐ c. Атропіну сульфат внутрішньовенно
- ☐ d. Фізіологічний розчин внутрішньовенно
- ☐ e. Синхронізована кардіоверсія


Коментар

Правильна відповідь: Атропіну сульфат внутрішньовенно

## Питання 191

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 12-ти років з нервово-артритичним діатезом після вживання в їжу значної кількості м'яса з кетчупом раптово виник гострий переймоподібний біль у животі та попереку, який іррадіює у статеві органи. При сечовипусканні отримано каламутну сечу з домішками крові. Найбільш імовірна причина гематурії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Нефритичний синдром
- ☐ b. Ниркова колька
- ☐ c. Гострий гломерулонефрит
- ☐ d. Геморагічний цистит
- ☐ e. Травматичне ушкодження сечовивідних шляхів

Коментар

Правильна відповідь: Ниркова колька

## Питання 192

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10-ти років зупинена артеріальна кровотеча (плечова артерія) через 10 хвилин після травми. При надходженні АТ- 90/50 мм рт.ст., еритроцити -  $2,5 \cdot 10^{12}/л$ , Hb- 60 г/л. Раніше при переливанні цільної крові була анафілактоїдна реакція. Який препарат крові найбільш безпечний для корекції крововтрати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Відмиті еритроцити
- ☐ b. Лейкоконцентрат
- ☐ c. Цільна кров
- ☐ d. Еритроцитарна маса
- ☐ e. Свіжозаморожена плазма


Коментар

Правильна відповідь: Відмиті еритроцити

## Питання 193

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після автомобільної аварії до відділення невідкладної медичної допомоги надійшла 18-річна дівчина. Після прибуття її реакція на подразники мінімальна, наявні ознаки кровотечі на голові з правого боку. Основні показники стану організму: температура тіла - 37,6°C, АТ- 180/100 мм рт.ст., Рс- 52/хв., ЧД- 6/хв. Насичення гемоглобіну киснем 96% при подачі кисню 2 л/хв. У її диханні відчувається запах алкоголю. В ході фізикального обстеження виявлено, що права зіниця має 7 мм в діаметрі, реакція на світло мінімальна. Ліва зіниця - 3 мм, реакція на світло нормальна. Праве око зміщене назовні та вниз. Офтальмоскопія виявила двосторонній набряк диску зорового нерва. Під час перебування у відділенні невідкладної медичної допомоги з пацієнткою відбувся напад, що характеризувався генералізованим витяганням всього тіла, з притисканням верхніх кінцівок вздовж тіла, долонями донизу. Ознак ушкодження грудної клітки чи органів черевної порожнини немає.

Якими будуть наступні дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпервентиляція, щоб парціальний тиск  $CO_2$  ( $PaCO_2$ ) досяг 25-30 мм рт.ст.
- ☐ b. Комп'ютерна томографія мозку
- ☐ c. Манітол внутрішньовенно
- ☐ d. Тіамін внутрішньовенно
- ☐ e. Ендотрахеальна інтубація


Коментар

Правильна відповідь: Ендотрахеальна інтубація

### Питання 194

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 5-ти років страждає на закрепи. Останнє випорожнення кишечника 4 дні тому. Скаржиться на біль у животі і тазовій ділянці. При огляді дитина бліда, живіт здутий, напружений, шкіра над промежиною не змінена. Яку допомогу необхідно надати дитині?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Послаблюючі ліки
- ☐ b. Сифонна клізма
- ☐ c. Газовідвідна трубка
- ☐ d. Лікувальна клізма
- ☐ e. Послаблююча свічка


Коментар

Правильна відповідь: Сифонна клізма

### Питання 195

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 42-х років звернувся до лікаря зі скаргами на біль в ділянці серця, що віддає у ліву руку та ліву лопатку, біль виник 1,5 години тому, інтенсивність болю прогресивно збільшується. ЕКГ: ознаки повної блокади лівої ніжки пучка Гіса. ЕКГ для порівняння в динаміці відсутня. Яке із додаткових обстежень слід застосувати для підтвердження основного діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Визначення серцевого тропоніну
- ☐ b. Визначення аланінамінотрансфери
- ☐ c. Визначення аспартатамінотрансфери
- ☐ d. Визначення ревмопроб
- ☐ e. Визначення лактатдегідрогенази

Коментар

Правильна відповідь: Визначення серцевого тропоніну

## Питання 196

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий на алкоголізм другої стадії вночі після виникнення гострого інфаркту міокарда заявив, що знаходиться "в міському зоопарку, в клітці у тигра, який зараз його проковтне". Блідий, тривожний, підозрілий. Температура тіла - 39,9°C, АТ - 90/60 мм рт.ст. Визначте вид делірію:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інфекційний
- ☐ b. Реактивний
- ☐ c. Алкогольний
- ☐ d. Судинний
- ☐ e. Травматичний

Коментар

Правильна відповідь: Алкогольний

## Питання 197

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 22-х років поступила в гінекологічне відділення зі скаргами на біль внизу живота з іррадіацією у пряму кишку. В анамнезі затримка менструації на 3 місяці. Об'єктивно: живіт напружений, різко болючий під час пальпації. Позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. При бімануальному обстеженні відмічається пухлина у місці лівих придатків матки з різким болем під час пальпації. Заднє склепіння матки різко болісне та напружене. Виділення темно-кров'яністі.

Встановіть діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Позалікарняний аборт
- ☐ b. Порушена позаматкова вагітність
- ☐ c. Аднексит
- ☐ d. Апоплексія яєчника
- ☐ e. Перекрут ніжки кісти яєчника

Коментар

Правильна відповідь: Порушена позаматкова вагітність

## Питання 198

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 15-ти років доставлена непритомною до приймального відділення бригадою швидкої допомоги у супроводі батьків. Хворий потребує негайної допомоги і госпіталізації у ВРІТ. Чи потрібно лікарю отримати згоду на медичне втручання?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. В даному випадку згода не потрібна
- ☐ б. Медичне втручання особам від 15 до 18 років проводиться за їх згодою
- ☐ с. Лікар зобов'язаний пояснити пацієнтові в доступній формі методи і об'єм медичного втручання
- ☐ d. Батьки мають право вибору методів медичного втручання
- ☐ е. Батьки можуть відмовитись від надання допомоги

Коментар

Правильна відповідь: В даному випадку згода не потрібна

## Питання 199

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвору 21-го року, доставлено до лікарні машиною швидкої медичної допомоги без свідомості. Об'єктивно: запах ацетону у повітрі, що видихається, шкіра суха. Язик обкладений коричневим нальотом, сухий. Тонус очних яблук знижений. Дихання типу Куссмауля. У додаткових дослідженнях: цукор крові - 27,4 ммоль/л, ацетон сечі ++, осмолярність крові - 280 мосмоль/л. Які невідкладні заходи потрібно вжити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Внутрішньовенне краплинне введення 5% розчину глюкози
- ☐ б. Проведення регідrataції, дробне введення малих доз інсуліну
- ☐ с. Внутрішньом'язове уведення 1% розчину глюкагону
- ☐ d. Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози
- ☐ е. Внутрішньовенне краплинне введення 2,5% розчину бікарбонату натрію


Коментар

Правильна відповідь: Проведення регідrataції, дробне введення малих доз інсуліну



## Питання 200

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

25-річний чоловік надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на головний біль, прищвиджене серцебиття та дратівливість. Його доставили зі спортивного клубу, який він розпочав відвідувати кілька тижнів тому. Пацієнт стверджує, що після кожної вечірньої сесії тренування, перед прийомом їжі, у нього з'являються подібні симптоми, які пом'якшуються, якщо він вживає сухий сніданок "Гранола" у батончиках. Вісім років тому у пацієнта був діагностований цукровий діабет 1 типу. Перед сніданком та вечерею він вводить НПХ-інсулін та регулярний інсулін. Пацієнт стверджує, що він суворо дотримується режиму харчування та вчасно вживає інсулін. Інших симптомів чи хронічних ускладнень, пов'язаних з діабетом, він не має. АТ- 110/80 мм рт.ст., Рs- 100/хв., температура тіла становить 36,7оС, ЧД- 14/хв. Пацієнт дещо спітнілий, але не сонний та у ясній свідомості. При неврологічному обстеженні вогнищеві симптоми не виявлені. Результати інших обстежень - в межах норми. Що з перерахованого є найдоцільнішим заходом для запобігання подальшому розвитку нападів гіпоглікемії у даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Розпочати вживати перорально гіпоглікемічний препарат, оскільки для цього пацієнта інсулін неефективний
- ☐ b. Припинити приймати НПХ-інсулін вранці
- ☐ c. Зменшити дозу регулярного інсуліну вранці
- ☐ d. Зменшити дозу регулярного інсуліну перед вечерею
- ☐ e. Зменшити дозу НПХ-інсуліну вранці

Коментар

Правильна відповідь: Зменшити дозу НПХ-інсуліну вранці

[Завершити перегляд](#)

[Пропустити](#) Перехід по тесту

[Перехід по тесту](#)

[Питання 1](#) [На цій сторінці](#) [Питання 2](#) [На цій сторінці](#) [Питання 3](#) [На цій сторінці](#) [Питання 4](#) [На цій сторінці](#) [Питання 5](#) [На цій сторінці](#) [Питання 6](#) [На цій сторінці](#) [Питання 7](#) [На цій сторінці](#) [Питання 8](#) [На цій сторінці](#) [Питання 9](#) [На цій сторінці](#) [Питання 10](#) [На цій сторінці](#) [Питання 11](#) [На цій сторінці](#) [Питання 12](#) [На цій сторінці](#) [Питання 13](#) [На цій сторінці](#) [Питання 14](#) [На цій сторінці](#) [Питання 15](#) [На цій сторінці](#) [Питання 16](#) [На цій сторінці](#) [Питання 17](#) [На цій сторінці](#) [Питання 18](#) [На цій сторінці](#) [Питання 19](#) [На цій сторінці](#) [Питання 20](#) [На цій сторінці](#) [Питання 21](#) [На цій сторінці](#) [Питання 22](#) [На цій сторінці](#) [Питання 23](#) [На цій сторінці](#) [Питання 24](#) [На цій сторінці](#) [Питання 25](#) [На цій сторінці](#) [Питання 26](#) [На цій сторінці](#) [Питання 27](#) [На цій сторінці](#) [Питання 28](#) [На цій сторінці](#) [Питання 29](#) [На цій сторінці](#) [Питання 30](#) [На цій сторінці](#) [Питання 31](#) [На цій сторінці](#) [Питання 32](#) [На цій сторінці](#) [Питання 33](#) [На цій сторінці](#) [Питання 34](#) [На цій сторінці](#) [Питання 35](#) [На цій сторінці](#) [Питання 36](#) [На цій сторінці](#) [Питання 37](#) [На цій сторінці](#) [Питання 38](#) [На цій сторінці](#) [Питання 39](#) [На цій сторінці](#) [Питання 40](#) [На цій сторінці](#) [Питання 41](#) [На цій сторінці](#) [Питання 42](#) [На цій сторінці](#) [Питання 43](#) [На цій сторінці](#) [Питання 44](#) [На цій сторінці](#) [Питання 45](#) [На цій сторінці](#) [Питання 46](#) [На цій сторінці](#) [Питання 47](#) [На цій сторінці](#) [Питання 48](#) [На цій сторінці](#) [Питання 49](#) [На цій сторінці](#) [Питання 50](#) [На цій сторінці](#) [Питання 51](#) [На цій сторінці](#) [Питання 52](#) [На цій сторінці](#) [Питання 53](#) [На цій сторінці](#) [Питання 54](#) [На цій сторінці](#) [Питання 55](#) [На цій сторінці](#) [Питання 56](#) [На цій сторінці](#) [Питання 57](#) [На цій сторінці](#) [Питання 58](#) [На цій сторінці](#) [Питання 59](#) [На цій сторінці](#)

## Секція 2

[Секція 3](#)

[Секція 4](#)

[Контрольні тестування](#)

[Секція 6](#)

[Секція 7](#)

[Секція 8](#)

[Секція 9](#)

[Секція 10](#)

[Секція 11](#)

[Секція 12](#)

[Секція 13](#)

[Секція 14](#)

[Секція 15](#)

[Особистий кабінет](#)

[Домашня сторінка](#)

[Календар](#)

[Особисті файли](#)

Мої курси

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручняк Оксана Богданівна \(Вийти\)](#)  
**КРОК 3. Загальна лікарська підготовка**

- [Українська \(uk\)](#)
  - - [English \(en\)](#)
    - [Русский \(ru\)](#)
    - [Українська \(uk\)](#)