

[Перейти до головного вмісту](#)  
Бокова панель  
КРОК-123

(Інтерн БДМУ) Підручняк Оксана Богданівна

П

Особистий кабінетПрофіль користувачаОцінкиПовідомленняУподобанняВийтиПовідомлення  
[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане  
Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане  
Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)


[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

## КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Секція 3](#)
- [2017 осінь](#)

Розпочато	Tuesday 14 February 2023 20:38 PM
Стан	Завершено
Завершено	Tuesday 14 February 2023 20:38 PM
Витрачено часу	10 сек
Балів	0,00/200,00
Оцінка	0,00 з 100,00 можливих
Питання 1	

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної під час стрімких пологів з'явилися почуття задухи, ціаноз, падіння артеріального тиску. Через деякий час кров, що надходила з піхви, перестала згортатися. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпотонічна маткова кровотеча
- ☐ b. Серцева недостатність
- ☐ c. Емболія навколоплідними водами
- ☐ d. Бронхіальна астма
- ☐ e. Анафілактичний шок


Коментар

Правильна відповідь: Емболія навколоплідними водами

## Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При проведенні реанімаційних заходів дитині 2-х років із зупинкою кровообігу, яка два місяці тому перенесла кардіохірургічне втручання, лікарем швидко було інтубовано трахею, але венозний доступ відсутній. Проводять серцево-легеневу реанімацію. Який лікарський засіб може бути введено ендотрахеально?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Атропін
- ☐ b. Хлорид кальцію
- ☐ c. Адреналін
- ☐ d. Гідрокарбонат натрію
- ☐ e. Мезатон


Коментар

Правильна відповідь: Адреналін

## Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

26-річний чоловік, надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги. Пацієнт - алкоголік, пив горілку протягом останніх 48 годин. Каже, що не може ходити через сильний біль у м'язах, особливо м'язах стегон. Останні 12 років палив по пачці цигарок на день, час від часу вживав марихуану та кокаїн. Сімейний анамнез не обтяжений. Температура тіла - 37,8°C, артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс - 116/хв., частота дихання - 20/хв. Під час обстеження у молодого чоловіка спостерігається сухість шкіри та слизових оболонок. Легені чисті. Спостерігається генералізований біль у м'язах, особливо у м'язах стегон та плечей. Загальне зниження м'язової сили. Інших неврологічних розладів немає. Результати лабораторних досліджень наступні: Біохімічний аналіз: натрій сироватки крові - 147 ммоль/л, калій сироватки крові - 5,2 ммоль/л, хлорид - 107 ммоль/л, бікарбонат - 20 ммоль/л, азот сечовини крові - 9,65 ммоль/л, креатинін сироватки крові - 203 мкмоль/л, кальцій - 2,05 ммоль/л, глюкоза сироватки крові - 4,0 ммоль/л, креатинкіназа - 60 000 Од/л (норма 10-90 Од/л). Результати аналізу сечі ще не надійшли. Що слід зробити далі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Почати вводити рідину внутрішньовенно
- ☐ б. Направити на консультацію до нефролога
- ☐ в. Почати давати фуросемід внутрішньовенно
- ☐ г. Почати давати бікарбонат внутрішньовенно
- ☐ д. Почати давати полістиролсульфонат натрію (Кайексалат)


Коментар

Правильна відповідь: Почати вводити рідину внутрішньовенно

#### Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 25-ти років, вагітність 23 тижні, з підтіканням навколоплідної води зеленуватого відтінку. Перейми регулярні. Серцебиття плоду не визначається. Рухової активності плоду не було протягом 2 днів. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Прееклампсія
- ☐ б. Антенатальна загибель плода
- ☐ в. Передчасне вилиття навколоплідної води
- ☐ г. Гестоз
- ☐ д. Плацентарна дисфункція


Коментар

Правильна відповідь: Антенатальна загибель плода

## Питання 5

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий вилучений з палаючої будівлі з опіками II-IIIА ступеня 30% поверхні тіла. Рівень свідомості - кома I. Найбільш імовірною причиною коматозного стану є:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Отруєння ціанідами
- ☐ б. Психоемоційний стрес
- ☐ в. Важкий опіковий шок
- ☐ г. Отруєння парами синильної кислоти
- ☐ д. Отруєння чадним газом


Коментар

Правильна відповідь: Отруєння чадним газом

## Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До відділення невідкладної медичної допомоги надійшов 41-річний чоловік, якого дві години тому вжалила в руку оса. Він скаржиться на генералізоване свербіння та помірну болючість ураженого місця. Температура тіла - 36,7°C, артеріальний тиск - 122/81 мм рт.ст., пульс - 96/хв., частота дихання - 14/хв. Пульсова оксиметрія - 96% при диханні кімнатним повітрям. Об'єктивно: уражена ділянка 2х2 см на правій руці - набрякла, виступає над шкірою, тепла, дещо болюча. На тулубі та кінцівках спостерігаються численні пухирі. Ані набряку язика, ані стридору немає. На аускультатії легень: свистячі звуки з обох боків. Тони серця та решта даних обстеження – в нормі. Що буде найдоцільнішим наступним кроком у веденні цього пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інгаляція альбутеролу
- ☐ б. Гідроксизин перорально
- ☐ в. Дифенгідрамін внутрішньовенно
- ☐ г. Адреналін внутрішньом'язово
- ☐ д. Метилпреднізолон внутрішньовенно

Коментар

Правильна відповідь: Адреналін внутрішньом'язово

### Питання 7

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта 56-ти років, який хворіє на гіпертонічну хворобу, внаслідок порушення режиму прийому антигіпертензивних засобів при артеріальному тиску - 200/120 мм рт.ст. розвинувся набряк легень. Які фармакологічні середники показані в даному випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Метопролол
- ☐ b. Верошпірон
- ☐ c. Верапаміл
- ☐ d. Нітрогліцерин
- ☐ e. Еналаприл

Коментар

Правильна відповідь: Нітрогліцерин

### Питання 8

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У палату інтенсивної терапії доставлений пацієнт з термічним опіком III ступеня обличчя, шиї, верхніх кінцівок, надпліч і грудної клітки загальною площею 45% у вкрай важкому стані. Який венозний доступ показаний для інтенсивної терапії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Зовнішня яремна вена
- ☐ b. Поверхневі вени ступні
- ☐ c. Стегнова вена
- ☐ d. Права підключична вена
- ☐ e. Поверхневі вени кисті


Коментар

Правильна відповідь: Стегнова вена

## Питання 9

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час вибуху, офіцер отримав удар твердим предметом по голові. Короткочасно втрачав свідомість. Відчуває помірну нудоту. У лобно-тім'яній області справа - обширний синець, садна. Загальмований, млявий. Скарги на сильний головний біль; пульс - 60/хв., напружений. Повторне блювання. Анізокорія, права зіниця ширше. Сухожилльні рефлекси справа знижені. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Струс головного мозку
- ☐ б. Перелом кісток черепа. Субарахноїдальний крововилив зліва
- ☐ в. Забій головного мозку II ступеня важкості
- ☐ г. ЗТМ. Наростаюча внутрішньочерепна гематома
- ☐ д. Відкрита черепно-мозкова травма


Коментар

Правильна відповідь: ЗТМ. Наростаюча внутрішньочерепна гематома

## Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія олігоанурії. У хворого спостерігаються м'язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ (розширення інтервалів PQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці Т). Які біохімічні зміни викликають ці порушення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гіперкальціємія
- ☐ б. Гіпокальціємія
- ☐ в. Гіперкаліємія
- ☐ г. Ацидоз
- ☐ д. Гіпокаліємія

Коментар

Правильна відповідь: Гіперкаліємія

## Питання 11

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 25-ти років, 1-й день хвороби: температура тіла - 39,5°C, різкий головний біль, нудота, блювання, менінгеальний синдром, на кінцівках геморагічний висип, частота серцевих скорочень - 120/хв., артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. Який діагноз найбільш ймовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Менінгококова хвороба
- ☐ б. Туберкульозний менінгіт
- ☐ в. Субарахноїдальний крововилив
- ☐ г. Стафілококовий сепсис
- ☐ д. Легіонельоз

Коментар

Правильна відповідь: Менінгококова хвороба

## Питання 12

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка народилася від 2 вагітності, перебіг якої ускладнювався хронічною фето-плацентарною недостатністю, II пологів в терміні 34-35 тижнів, з оцінкою за шкалою Апгар 1/3 бали. На другу добу життя спостерігається зригування кров'янистим вмістом, мелена. Hb- 165 г/л, еритроцити - 4,8 • 10<sup>12</sup>/л, тромбоцити - 192 • 10<sup>9</sup>/л. Який патологічний стан найбільш ймовірний в дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Геморагічна хвороба новонародженого
- ☐ б. Тромбоцитопенія
- ☐ в. Гемолітична хвороба новонародженого
- ☐ г. Гемофілія А
- ☐ д. Гемофілія В

Коментар

Правильна відповідь: Геморагічна хвороба новонародженого

### Питання 13

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В медичну роту бригади надійшов поранений в тяжкому стані. Скарги на болі у животі, нудоту, сухість в роті. Об'єктивно: пульс - 130/хв., артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст., SaO<sub>2</sub> - 92%. Язик сухий, обкладений білим нальотом, живіт не бере участі у акті дихання, під час пальпації напружений, болісний у всіх відділах, перистальтика поодинокими хвилями. Притуплення у пологих місцях черевної порожнини. Попередній діагноз: внутрішньочеревна кровотеча. В який підрозділ госпіталізувати постраждалого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Відділення спецобробки
- ☐ b. Госпітальне відділення
- ☐ c. Ізолятор
- ☐ d. Операційна
- ☐ e. Відділення реанімації та інтенсивної терапії

Коментар

Правильна відповідь: Операційна

### Питання 14

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 62-х років раптово знепритомнів. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, дихання відсутнє, пульс та артеріальний тиск не визначаються. На ЕКГ: фібриляція шлуночків. Тричі була проведена дефібриляція, ефекту немає. Введення якого препарату необхідно розпочати для підвищення ефекту дефібриляції?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Урапідил
- ☐ b. Добутамін
- ☐ c. Дофамін
- ☐ d. Аміодарон
- ☐ e. Атропін

Коментар




Правильна відповідь: Амідарон

## Питання 15

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

17-річного юнака доставили до відділення невідкладної медичної допомоги з генералізованим висипом, що з'явився один день тому. Протягом останнього тижня пацієнт мав невисоку температуру та був надзвичайно виснаженим. Батько пацієнта нещодавно переніс респіраторне захворювання, й у нього залишилися антибіотик, декілька таблеток якого він дав синові, щоб полегшити симптоми. Висип з'явився через день після того, як пацієнт прийняв антибіотик. Значних захворювань в анамнезі немає, інших ліків пацієнт не приймає. Не палить та не вживає алкоголь чи наркотики. Живе статевим життям з однією дівчиною, для захисту використовує презервативи. Температура тіла - 37,8°C, артеріальний тиск - 110/75 мм рт.ст., пульс - 88/хв., частота дихання - 16/хв. Об'єктивно: безболісний еритематозний плямисто-пухирчастий висип на тулубі, грудях, животі та кінцівках. Мигдалики набряклі, вкриті ексудатом. Задньошийні лімфовузли збільшені та болючі. Під час пальпації помітна невелика спленомегалія. Який підхід до терапії буде найкращим у даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Заспокоїти пацієнта та продовжити лікування антибіотиком
- ☐ б. Призначити інший антибіотик
- ☐ в. Припинити прийом антибіотику та призначити ацикловір
- ☐ г. Припинити прийом антибіотику та призначити кортикостероїди
- ☐ д. Припинити прийом антибіотику та спостерігати


Коментар

Правильна відповідь: Припинити прийом антибіотику та спостерігати

## Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У сержанта 30-ти років після вибуху авіабомби ліва гомілка була притиснута бетонною стіною до землі. Звільнення від стиснення гомілки через 3 години, доставлений у госпіталь. Шкіра гомілки блідо-ціанотична, холодна на дотик, набрякла. Тони серця приглушені, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс слабого наповнення, 120/хв. У сечі: міоглобін, протеїнурія та циліндрурія, колір - бурий. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостра печінкова недостатність
- ☐ b. Синдром тривалого стиснення, проміжний період
- ☐ c. Гострий венозний тромбоз
- ☐ d. Гострий гломерулонефрит
- ☐ e. Синдром тривалого стиснення, ранній період


Коментар

Правильна відповідь: Синдром тривалого стиснення, ранній період

## Питання 17

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 26-ти років, звернувся до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на ниючий біль у спині, прогресуюче утруднення ходи та затримку сечовипускання, які спостерігаються протягом трьох днів. Тиждень тому пацієнт переніс легке захворювання верхніх дихальних шляхів, але загалом анамнез не обтяжений. Наразі не приймає жодних ліків, вживання наркотиків заперечує. Температура тіла - 36,7оС, артеріальний тиск - 120/76 мм, рт.ст., пульс - 80/хв., частота дихання - 16/хв. Неврологічне обстеження виявило втрату м'язової сили (2/5) в обох нижніх кінцівках, зниження колінних та ахілових рефлексів, знижену больову чутливість до рівня пупка. Який діагноз є найімовірнішим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий субдуральний крововилив
- ☐ b. Грижа міжхребцевого диска
- ☐ c. Злоякісне новоутворення
- ☐ d. Поперечний мієліт
- ☐ e. Епідуральний абсцес


Коментар

Правильна відповідь: Поперечний мієліт

## Питання 18

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 35-ти років страждає на цукровий діабет тип 1. Після значного фізичного навантаження знепритомнів. Об'єктивно: непритомний, дихання - 28/хв., рівне, ритмічне. Шкіра волога, тонус м'язів кінцівок підвищений. Тонус очних яблук нормальний, язик вологий. Пульс - 80/хв., ритмічний. Артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. Печінка виступає з-під реберної дуги на 2 см, край гострий рівний. Менінгіальні симптоми відсутні. Яка кома у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Печінкова кома
- ☐ b. Кетоацидотична кома
- ☐ c. Гіперосмолярна кома
- ☐ d. Гіпоглікемічна кома
- ☐ e. Лактацидемічна кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіпоглікемічна кома

## Питання 19

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років, скаржиться на стискальний біль за грудиною, який не вщухає після прийому 2-х таблеток нітрогліцерину, перебої в роботі серця, слабкість, головний біль, задишку в стані спокою. Артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст. На ЕКГ: ритм синусовий, нерегулярний, шлуночкові екстрасистолі, частота серцевих скорочень - 86/хв., елевация сегменту ST на 3 мм у II та III відведеннях, ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Який невідкладний стан розвинувся?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Міжреберна невралгія
- ☐ b. Ішемічна хвороба серця (ІХС): гострий коронарний синдром
- ☐ c. Міокардит
- ☐ d. Гіпертонічний криз
- ☐ e. Плеврит


Коментар

Правильна відповідь: Ішемічна хвороба серця (ІХС): гострий коронарний синдром

## Питання 20

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 17-ти років переніс ангіну. Через 2 тижні з'явилися набряки на обличчі, слабкість, головний біль. Артеріальний тиск підвищився до 140/110 мм рт.ст. Сеча бурого кольору, мутна. Добовий діурез - 650 мл. В сечі: білок - 1,48 г/л, еритроцити на все поле зору, циліндри гіалінові - 7-8 в препараті. Яка найбільш імовірна причина гематурії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий пієлонефрит
- ☐ б. Пухлина сечового міхура
- ☐ в. Сечокам'яна хвороба
- ☐ г. Гострий гломерулонефрит
- ☐ д. Травма уретри


Коментар

Правильна відповідь: Гострий гломерулонефрит

## Питання 21

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 6-ти років скаржиться на загальне нездужання, слабкість, біль у горлі. Не щеплений проти дифтерії. Загальний стан важкий: шкіра бліда, адинамічний, температура тіла - 38,6оС, пульс - 118/хв. Набряклі мигдалики, язичок, м'яке піднебіння. Мигдалики вкриті сірою плівкою, яка розповсюджується на дужки, язичок. При знятті плівки поверхня кровить. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Дифтерія мигдаликів, розповсюджена форма
- ☐ б. Паратонзиллярний абсцес
- ☐ в. Гострий фарингіт
- ☐ г. Заглотковий абсцес
- ☐ д. Плівчаста агніна Симановського-Венсана


Коментар

Правильна відповідь: Дифтерія мигдаликів, розповсюджена форма

## Питання 22

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

64-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на нудоту, блювання та здуття живота, які тривають протягом 2-х днів. Болю у животі немає. Пацієнт хворіє на гіпертонію, гіперхолестеринемію, захворювання коронарної артерії та застійну серцеву недостатність. Також він страждає від хронічного болю у спині, який розвинувся внаслідок компресійного перелому 6 місяців тому. Пацієнт приймає аспірин, оксикодон, фуросемід, лозартан, вітамін D, кальція глюконат та симвастатин. Температура тіла - 36,7°C, артеріальний тиск - 130/70 мм рт.ст., пульс - 92/хв. Живіт здутий, але м'який та безболісний. Напруженості м'язів живота чи симптому Блюмберга не спостерігається. Кишкові шуми приглушені. Периферійний набряк +1. Результати лабораторних досліджень наступні: гемоглобін - 130 г/л, тромбоцити -  $300 \cdot 10^9$ /л, лейкоцити -  $9 \cdot 10^9$ /л, натрій сироватки крові - 132 ммоль/л, калій сироватки крові - 2,7 ммоль/л, хлорид - 104 ммоль/л, бікарбонат - 24 ммоль/л, азот сечовини крові - 11,4 ммоль/л, креатинін сироватки крові - 97 мкмоль/л. На ЕКГ спостерігається нормальний синусовий ритм. Рентгенограма органів черевної порожнини показує здуття кишківника, газ в ободовій та прямій кишках.

Найдоцільнішим наступним кроком є:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Антибіотики внутрішньовенно
- ☐ b. Спіронолактон
- ☐ c. Калій внутрішньовенно
- ☐ d. Метилналтрексон
- ☐ e. Негайна комп'ютерна томографія черевної порожнини


Коментар

Правильна відповідь: Калій внутрішньовенно

## Питання 23

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнту 65-ти років, який хворіє облітеруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок, виконали операцію – ампутації ноги на рівні н/3 стегна. В зв'язку з вираженим больовим синдромом в післяопераційному періоді хворому тричі вводився омнопон. Які ускладнення можуть виникнути у хворого в зв'язку з використанням великих доз наркотичних анальгетиків?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гостра ниркова недостатність
- ☐ b. Зупинка серця
- ☐ c. Гостра печінкова недостатність
- ☐ d. Фібриляція шлуночків серця

☐ е. Зупинка дихання  
Коментар

Правильна відповідь: Зупинка дихання

## Питання 24

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

164. Новонароджена дитина, маса тіла 3400 г, навколоплідні води забруднені меконієм. Дитина кричить, поза - флексорна, виявляє задовільну рухову активність, частота серцевих скорочень - 140/хв. Яка тактика лікаря в пологовій кімнаті?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Дитину викладають на живіт матері і спостерігають за її станом протягом 15 хвилин
- ☐ б. Розпочинають профілактичну вентиляцію легень під позитивним тиском
- ☐ в. Проводять відсмоктування із трахеї для профілактики
- ☐ г. Дитина не потребує подальшого спеціального спостереження
- ☐ е. Дитину транспортують до палати інтенсивної терапії дитячого відділення для ретельного спостереження та обстеження

Коментар

Правильна відповідь: Дитину викладають на живіт матері і спостерігають за її станом протягом 15 хвилин

## Питання 25

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Рядовий отримав поранення осколком снаряда в ділянку лівого підребер'я. На полі бою, в порядку взаємодопомоги, була накладена пов'язка індивідуальним пакетом. Доставлений на медичний пункт батальйону. Скаржиться на запаморочення, слабкість, спрагу, біль у животі. Загальний стан тяжкий, пульс - 120/хв. Живіт м'який, болючий під час пальпації. Пов'язка добре фіксована, але трохи просякнута кров'ю. Яким видом транспорту, та в яку чергу потрібно евакуювати потерпілого до медичної роти?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Транспорт загального призначення, в 1-шу чергу
- ☐ б. Санітарним автотранспортом, в 2-гу чергу

- ☐ c. Транспортom загального призначення, в 2-гу чергу
- ☐ d. Санітарним автотранспортом, в 1-шу чергу
- ☐ e. Санітарним автотранспортом, в 3-тю чергу


Коментар

Правильна відповідь: Санітарним автотранспортом, в 1-шу чергу

## Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 14-ти років, що протягом декількох днів скаржилась на світлобоязнь, кашель, осиплість голосу, нежить та страждала від значної лихоманки, раптово з'явилась рожева макуло-папульозна висипка на шкірі обличчя (лоб, шкіра за вухами), шиї. На слизовій щік, на рівні других молярів червона енантема з білими крапками у центрі. Загальний стан залишається важким. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інфекційний мононуклеоз
- ☐ b. Ентеровірусна екзантема
- ☐ c. Скарлатина
- ☐ d. Синдром Джанотті-Крості
- ☐ e. Кір


Коментар

Правильна відповідь: Кір

## Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікарем швидкої медичної допомоги у хворого констатовані ознаки клінічної смерті, розпочаті реанімаційні заходи. Для введення лікарських засобів обрана пункція крікотиреоїдної зв'язки та ендотрахеальне введення. Як змінюється доза препаратів при цьому шляху введення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Збільшується в 2 рази
- ☐ b. Залишається незмінною

- ☐ c. Збільшується в 4 рази
- ☐ d. Зменшується в 2 рази
- ☐ e. Збільшується в 6 разів


Коментар

Правильна відповідь: Збільшується в 2 рази

## Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка витягли з машини, яка перекинулася в результаті аварії. У постраждалого скарги на біль в поперековому відділі хребта. При огляді визначається відсутність рухів і чутливості в нижніх кінцівках. Як необхідно транспортувати хворого в лікувальну установу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. В положенні лежачи на спині на жорстких ношах
- ☐ b. Лежачи на животі
- ☐ c. На ношах з фіксацією шийного відділу хребта
- ☐ d. В положенні на спині, поза Волковича
- ☐ e. В положенні лежачи на боці


Коментар

Правильна відповідь: В положенні лежачи на спині на жорстких ношах

## Питання 29

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час ведення бою солдат, який вів бій попереду, впав. При огляді боєць без свідомості, відмічається кровотеча з правого плеча, важке дихання. Які заходи взаємодопомоги необхідно провести пораненому в умовах обстрілу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Повернути бійця в безпечне відновлююче положення тіла
- ☐ b. Накласти кровоспинний джгут
- ☐ c. Виконати декомпресію грудної клітини



- ☐ d. Ввести пораненому медикаменти з польової аптечки
- ☐ e. Виконати серцево-легеневу реанімацію


Коментар

Правильна відповідь: Накласти кровоспинний джгут

### Питання 30

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 43-х років доставлений швидкою медичною допомогою у приймальний покій ЦРЛ зі скаргами на слабкість, що раптово виникла, запаморочення, мерехтіння "мушок" перед очима, одноразовий рясний рідкий стул дьогтеподібної консистенції. Об'єктивно: блідий, пульс - 100/хв., пальпація черевної порожнини безболісна, симптоми подразнення очеревини негативні. Який метод діагностики необхідно провести хворому у першочерговому порядку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Фіброгастродуоденоскопія
- ☐ b. Рентгенографія шлунка і дванадцятипалої кишки
- ☐ c. Спостереження хірурга у палаті невідкладної терапії
- ☐ d. Аналіз калу на приховану кров
- ☐ e. УЗД органів черевної порожнини


Коментар

Правильна відповідь: Фіброгастродуоденоскопія

### Питання 31

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

62-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на задишку, біль у грудях та серцебиття. В анамнезі: гіпертонія, ожиріння, хронічне обструктивне захворювання легень, інфаркт міокарда, що вимагає судинного шунта в обхід коронарної артерії, та стеноз сонної артерії. Приймає метопролол, аспірин, тіотропіум та лізиноприл. На електрокардіограмі помітна фібриляція передсердь, яка супроводжується швидкою реакцією шлуночків (140-150/хв.). Пацієнта під'єднано до кардіомонітору. Пацієнт перестав реагувати на подразники в той час, як команда медиків створювала доступ до вени. Пульс на головних артеріях не пальпується. Кардіомонітор

продовжує демонструвати фібриляцію передсердь зі швидкістю 145/хв. Що є найдоцільнішим наступним кроком у веденні даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Дефібриляція
- ☐ б. Бікарбонат та дигоксин внутрішньовенно
- ☐ в. Зовнішній масаж грудної клітки
- ☐ г. Дослідження газового складу артеріальної крові
- ☐ д. Синхронізована кардіостимуляція електрошоком


Коментар

Правильна відповідь: Зовнішній масаж грудної клітки

## Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з сальмонельозом розвинулась клініка преренальної ниркової недостатності. Що в лікуванні є найбільш важливим на першому етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Корекція гіперкаліємії
- ☐ б. Антибактеріальна терапія
- ☐ в. Фуросемід
- ☐ г. Стабілізація гемодинаміки і об'єму циркулюючої крові
- ☐ д. Серцево-судинні препарати


Коментар

Правильна відповідь: Стабілізація гемодинаміки і об'єму циркулюючої крові

## Питання 33

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На момент прибуття машини швидкої допомоги чоловік 64-х років був непритомним, без пульсу, спостерігалася асистолія. Було виконано інтубацію та вжито реанімаційних заходів, після чого пацієнта доставили до лікарні. Попереднє обстеження вказало на субарахноїдальну кровотечу. В анамнезі: коронарне захворювання серця, численні перкутанні коронарні втручання та застійна

серцева недостатність із низькою фракцією викиду лівого шлуночка. Під час повторного обстеження через 24 години хворий перебуває у стані коми, на вербальні стимули не реагує. Температура тіла - 36,7оС, артеріальний тиск - 123/82 мм рт.ст., пульс - 78/хв. Зіниці розширені, на світло не реагують та становлять 8 мм в діаметрі. Який симптом найімовірніше вказує на смерть мозку в даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Згинання коліна у відповідь на подразнення стопи
- ☐ b. Згинання пальців ніг у відповідь на постукування по стопі
- ☐ c. Рефлекс Бабинського наявний з обох боків
- ☐ d. Відсутній кашльовий рефлекс у відповідь на потрапляння сторонніх тіл в трахею
- ☐ e. Збереження поверхневих черевних рефлексів


Коментар

Правильна відповідь: Відсутній кашльовий рефлекс у відповідь на потрапляння сторонніх тіл в трахею

### Питання 34

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У матері із важким маловоддям на 36 тижні гестації народилася дитина із масою 1700 г. При народженні оцінка за Апгар 3-5 балів. Проведена інтубація трахеї немовля, розпочата штучна вентиляція легень (ШВЛ). Через годину відмічено різке погіршення стану, ціаноз, брадикардія, артеріальна гіпотензія. Яка найбільш імовірна причина цього стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпоглікемія
- ☐ b. Пневмоторакс
- ☐ c. Респіраторний дистрес-синдром
- ☐ d. Внутрішньошлуночковий крововилив
- ☐ e. Відкрита артеріальна протока


Коментар

Правильна відповідь: Пневмоторакс

### Питання 35

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

#### Текст питання

72-річна хвора на цукровий діабет 2-го типу скаржиться на значну слабкість, головний біль, тривожність, дискомфорт у серцевій ділянці, порушення зору, які виникли після самостійного збільшення добової дози манінілу до 20 мг. Об'єктивно: порушення концентрації уваги, шкіра бліда, підвищеної вологості, тремор кінцівок. Аускультативно: тони серця приглушені, серцева діяльність ритмічна. Частота серцевих скорочень дорівнює пульсу і становить 92/хв. Глікемія - 2,8 ммоль/л. ЕКГ – без динаміки. Ваші першочергові призначення:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення 400 мл фізіологічного розчину натрію хлориду
- ☐ b. Введення інсуліну подовженої дії
- ☐ c. Прийом простих харчових вуглеводів
- ☐ d. Призначення антиангінальних медикаментів
- ☐ e. Введення інсуліну короткої дії


Коментар

Правильна відповідь: Прийом простих харчових вуглеводів

#### Питання 36

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

#### Текст питання

Студентка 19-ти років, після зґвалтування доставлена в лікарню у стані мовного та рухового збудження, голосить, рве на собі одягу. Який препарат потрібно призначити в даному випадку? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Розчин амітриптиліну
- ☐ b. Розчин магнію сульфату
- ☐ c. Розчин пірацетаму
- ☐ d. Розчин діазепаму
- ☐ e. Розчин димедролу


Коментар

Правильна відповідь: Розчин діазепаму

#### Питання 37

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому 22-х років з політравмою в реанімаційній залі проводиться серцево- легенево-мозкова реанімація. Який критерій ефективності закритого масажу серця має найбільшу прогностичну цінність?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Відновлення самостійного дихання
- ☐ b. Аускультативно вислуховуються тони серця
- ☐ c. Наявність пульсу на променевій артерії
- ☐ d. Звуження зіниць
- ☐ e. Наявність пульсації на сонній артерії


Коментар

Правильна відповідь: Наявність пульсації на сонній артерії

### Питання 38

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 33-х років надійшла до відділення невідкладної медичної допомоги після того, як вона знепритомніла, перебуваючи у банку. Після тривалого очікування в черзі, раптом на кілька секунд втратила свідомість. Жодних травм пацієнтка не зазнала. До втрати свідомості та після того вона була блідою, спітнілою, її нудило. Жодних аномальних різких рухів кінцівок, нетримання вмісту кишечника чи сечового міхура не спостерігалось. Пацієнтка стверджує, що пришвидшення серцебиття перед втратою свідомості не було. Анамнез не обтяжений, за винятком нападів мігрені, для полегшення яких пацієнтка приймає ібупрофен. Результати фізикального обстеження в межах норми. Артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. у положенні лежачи горілиць та 108/70 мм рт.ст. у положенні стоячи. На ЕКГ синусовий ритм в нормі. Яка причина втрати свідомості найімовірніша в даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Судоми
- ☐ b. Автономна нейропатія
- ☐ c. Серцево-судинна
- ☐ d. Неврологічна
- ☐ e. Нейрокардіогенна


Коментар

Правильна відповідь: Нейрокардіогенна

### Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки 35-ти років шляхом вживання забруднених харчових продуктів в потрапила значна кількість радіоактивного йоду-131. Які заходи необхідно провести в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Негайно провести евакуацію жінки
- ☐ b. Негайно промити шлунок
- ☐ c. Якнайшвидше розпочати йодну профілактику
- ☐ d. Провести антибіотикотерапію для профілактики вторинної інфекції на фоні пригнічення імунітету
- ☐ e. Ретельно зібрати харчові продукти в закриту тару для подальшого аналізу


Коментар

Правильна відповідь: Якнайшвидше розпочати йодну профілактику

## Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 57-ми років госпіталізували в невідкладному порядку. При огляді спостерігається надто піднесений настрій, не відчуває дистанції, зачіпається до медичного персоналу, намагається "нагороджувати" сусідів по палаті "Нобелівською премією". Стверджує, що він професор, дійсний член всіх академій світу, один із найбагатших людей на світі, має чисельні рахунки в багатьох банках різних країн. Судження примітивні, мова змазана, інтелектуальні і мнестичні функції значно знижені. Спостерігається хитка хода, позитивний симптом Аргайль-Робертсона. Які лабораторно-інструментальні дослідження слід провести в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Електроенцефалографія
- ☐ b. Біохімічні аналізи крові, сечі
- ☐ c. Реакцію Васермана в крові і лікворі
- ☐ d. Комп'ютерна томографія головного мозку
- ☐ e. Rtg-графія ділянки турецького сідла

Коментар

Правильна відповідь: Реакцію Васермана в крові і лікворі

## Питання 41

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час бойових дій супротивником була застосована хімічна зброя. У постраждалих військових ейфорія або дисфорія, зорові та тактильні галюцинації, позитивні та негативні емоційні реакції. Уражені не виконують наказів, дивно поведуться. Виникла паніка. В потерпілих визначаються тахікардія та гіпертермія. Яка група бойових хімічних речовин була використана супротивником? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Пульмотоксичної дії
- ☐ b. Подразнюючої дії
- ☐ c. Психотодислептичної дії
- ☐ d. Нервово-паралітичної дії
- ☐ e. Загальноотруйної дії

Коментар

Правильна відповідь: Психотодислептичної дії

## Питання 42

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 11-ти років поступив зі скаргами на гострий біль в животі, нудоту, багаторазове блювання з домішкою жовчі. З анамнезу: два дні тому дитина отримала удар в живіт під час бійки з однолітками. Об'єктивно: шкіра та слизові бліді, пульс - 86/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Пальпаторно: біль та напруження передньої черевної стінки в епігастрії. Кишкова перистальтика ослаблена. Жовчний міхур не пальпується. Позитивні симптоми Воскресенського та Мейо-Робсона. Який попередній діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гостра токсикоінфекція
- ☐ b. Перитоніт
- ☐ c. Гостра кишкова непрохідність
- ☐ d. Гострий панкреатит
- ☐ e. Гострий холецистит

Коментар

Правильна відповідь: Гострий панкреатит

### Питання 43

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дворічній дитині, у якої було підвищення температури до 39°C, катаральні явища, батьки використовували для зниження температури аспірин. На 5-ту добу на фоні нормальної температури з'явилося блювання, дитина стала збудженою. При обстеженні печінка м'яка, помірно збільшена. Якою повинна бути тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Негайна госпіталізація
- ☐ b. Призначення протиблювотних засобів
- ☐ c. Спостереження впродовж доби
- ☐ d. Оральна регідратація
- ☐ e. Призначення заспокійливих засобів

Коментар

Правильна відповідь: Негайна госпіталізація

### Питання 44

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшов 32-річний чоловік в зв'язку з появою за грудниною дискомфорту, який не іррадіює, триває 6 годин та виник через 2 години після вечері. Біль в грудній клітці то наростає, то вщухає, але її інтенсивність не змінюється. Про інші медичні проблеми пацієнта невідомо. Батько пацієнта помер від інфаркту міокарда у віці 59-ти років. Температура тіла становить 37,2°C, артеріальний тиск - 130/85 мм рт.ст., пульс - 110/хв., частота дихання - 16/хв. Аускультация грудної клітки виявила везикулярне дихання, без шумів. На електрокардіограмі спостерігається синусова тахікардія. Рентгенограма грудної клітки в нормі. Додатково до аспірину пацієнту дали 2 таблетки нітрогліцерину сублінгвально з інтервалом у 5 хвилин, що допомогло зменшити дискомфорт. Що є оптимальним наступним кроком у веденні даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Комп'ютерна томографічна ангіограма грудної клітки
- ☐ b. Вимірювання серцевих біомаркерів
- ☐ c. Проба з дозованим фізичним навантаженням (бігова доріжка)
- ☐ d. Ковтання барію




☐ е. Заспокоєння пацієнта та амбулаторне лікування  
Коментар

Правильна відповідь: Вимірювання серцевих біомаркерів

## Питання 45

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждала 25-ти років, доставлена в хірургічне відділення через 2 години після дорожньо-транспортної пригоди з закритою травмою живота з ознаками внутрішньоочеревинної кровотечі. Взята в операційну. Під час ревізії в черевній порожнині знайдено до 1,5 л рідкої крові. Селезінка пошкоджена в декількох місцях. Інших пошкоджень не виявлено. Який вид трансфузії слід застосувати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Пряма гемотрансфузія
- ☐ b. Замінне переливання
- ☐ c. Реінфузія крові
- ☐ d. Трансфузія еритроцитарної маси
- ☐ е. Трансфузія замороженої плазми

Коментар

Правильна відповідь: Реінфузія крові

## Питання 46

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 5-ти років скаржиться на інтенсивний головний біль протягом декількох годин. Біль двосторонньої локалізації, не пульсуючий, не супроводжується нудотою, блюванням. Контакт з інфекційними хворими, травми заперечує. Температура тіла - 36,3оС, останніми днями не підвищувалась. Менінгеальні знаки відсутні. Оберіть анальгетик для лікування цефалгії:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Мелоксікам
- ☐ b. Німесулід
- ☐ c. Ібупрофен

- ☐ d. Кетопрофен  
☐ e. Ацетилсаліцилова кислота
- Коментар

Правильна відповідь: Ібупрофен

#### Питання 47

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 52-х років через 20 хвилин після трансфузії еритроцитарної маси виникли загальне нездужання, озноб, головний біль. Температура тіла - 37,5°C. Гемодинаміка стабільна. Порушень сечовиділення немає. Яку невідкладну допомогу слід надати хворому?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Трансфузія замороженої плазми  
☐ b. Введення промедолу  
☐ c. Введення глюкокортикоїдів  
☐ d. Лікування не вимагає, спостереження  
☐ e. Консультація реаніматолога

Коментар

Правильна відповідь: Лікування не вимагає, спостереження

#### Питання 48

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 48-ми років скаржиться на задишку, що раптово посилилася, слабкість. Знаходиться у кардіологічному відділенні впродовж 12-ти годин, отримує: гепарин, аспірин, стрептокіназу. Збуджений, шкіра холодна, волога, ціаноз. Пульс слабкого наповнення, ритмічний, 135/хв., артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст. У нижніх відділах легень вологі хрипи. На ЕКГ у відведеннях V 3 - V 6 комплекс QRS типу QS, підйом сегменту ST вище ізолінії, позитивний зубець T. З якого препарату необхідно починати невідкладну терапію?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дигоксин  
☐ b. Альбумін


- ☐ c. Фуросемід
- ☐ d. Дофамін
- ☐ e. Верапаміл

Коментар

Правильна відповідь: Дофамін

#### Питання 49

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 40-ка років, інженер, скарги на пароксизми гострих болів в лівій половині обличчя, тривалістю 1-2 хвилини. Частота нападів до 10 разів на добу. Провокуються напади болів умиванням, прийманням їжі, розмовами, дотиком до лівої щоки ("куркова зона"). Хворобливість при пальпації супраорбітальної точки зліва. Сформулюйте клінічний діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Невралгія великого потиличного нерву
- ☐ b. Пухлина головного мозку
- ☐ c. Невралгія трійчастого нерва
- ☐ d. Неврит лицьового нерву
- ☐ e. Облична симпаталгія

Коментар

Правильна відповідь: Невралгія трійчастого нерва

#### Питання 50

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Травмований чоловік лежить на проїжджій частині дороги. Ліве стегно його деформоване в нижній третині, через зовнішню рану фонтанує кров. Де і який необхідно застосувати кровоспинний джгут?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Артеріальний джгут в верхній третині стегна
- ☐ b. Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна
- ☐ c. Венозний джгут безпосередньо над раною

- ☐ d. Венозний джгут на верхню третину гомілки
- ☐ e. Артеріальний джгут в середній третині стегна


Коментар

Правильна відповідь: Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна

## Питання 51

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після опромінення до госпіталю доставлений молодий чоловік 26-ти років. Показник індивідуального дозиметра 5 Гр. Скарги на різку загальну слабкість, біль голови, нудоту, повторне блювання. Об'єктивно: на шкірі обличчя еритема, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., блювання продовжується. В якому клінічному періоді гострої променевої хвороби знаходиться хворий?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Період вторинної реакції
- ☐ b. Період запалення
- ☐ c. Період розпалу
- ☐ d. Період первинної реакції
- ☐ e. Період виражених клінічних проявів


Коментар

Правильна відповідь: Період первинної реакції

## Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 33-х років, надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги після двох випадків блювання масами кольору кавових зерен. Пацієнт стверджує, що раніше подібних симптомів у нього ніколи не спостерігалось. Також заперечує наявність у нього будь-якого болю в животі, запаморочення, втрати свідомості або випорожнень чорного кольору. Анамнез не обтяжений. Не палить та не вживає алкоголь. Артеріальний тиск - 120/72 мм рт.ст. у положенні лежачи горілиць та 122/70 мм рт.ст. у положенні стоячи. Пульс - 90/хв. Результати фізикального обстеження в межах норми. Ендоскопія виявила одиничний невеликий поздовжній розрив у ділянці

гастроезофагеального з'єднання, який явно не кровоточить. Який підхід до ведення пацієнта буде найкращим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Склерозувальна терапія
- ☐ b. Внутрішньовенна інфузія вазопресину
- ☐ c. Спостереження та підтримувальна терапія
- ☐ d. Накладання кільцевої лігатури
- ☐ e. Тепловакоагуляція


Коментар

Правильна відповідь: Спостереження та підтримувальна терапія

### Питання 53

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У доношеної дитини 6-ти днів з третьої доби спостерігали жовтяницю. Рівень непрямого білірубіна - 100 мкмоль/л, прямого - 10 мкмоль/л. Визначте подальшу тактику:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. УЗД печінки та жовчовивідних шляхів
- ☐ b. Визначення погодинного прибутку білірубіну
- ☐ c. Провести операцію замінного переливання крові
- ☐ d. Спостереження
- ☐ e. Дослідження маркерів гепатиту


Коментар

Правильна відповідь: Спостереження

### Питання 54

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік, ниряючи у річку, захлинувся водою. Його було вчасно винесено на берег. Об'єктивно: загальний стан важкий, відмічається помірний ціаноз обличчя, пульс і дихання відсутні. Який комплекс заходів треба вжити терміново для врятування хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Проведення гемодинамічних протишокових заходів
- ☐ b. Внутрішньовенне введення кардіотонічних препаратів
- ☐ c. Внутрішньом'язове введення антигістамінних препаратів
- ☐ d. Стимулятори дихання
- ☐ e. Проведення першого етапу серцево-легеневої реанімації


Коментар

Правильна відповідь: Проведення першого етапу серцево-легеневої реанімації

## Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До терапевтичного відділення надійшов чоловік 29-ти років зі скаргами на задуху, кашель, відчуття подрапування в горлі. Об'єктивно: екскурсія грудної клітки обмежена, перкуторний звук над легень має коробковий відтінок. Відомо, що хворий перебував в радіусі дії фосгену. Який захід профілактики отруєння фосгеном є найбільш ефективним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення атропіну
- ☐ b. Проведення форсованого діурезу
- ☐ c. Оксигенотерапія
- ☐ d. Одягання протигазу
- ☐ e. Прийом антибіотиків


Коментар

Правильна відповідь: Одягання протигазу

## Питання 56

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

74-річна жінка надійшла до відділення невідкладної медичної допомоги з приводу втрати свідомості. У неї спостерігаються загальна слабкість, лихоманка, нудота, дизурія та часті сечовипускання. Протягом трьох днів вона споживала меншу кількість їжі, ніж звичайно. Живе сама. Приймає аспірин, лізиноприл, ібупрофен. Артеріальний тиск - 102/45 мм рт.ст., пульс - 48/хв. Сухість слизових оболонок. Живіт дещо болючий, м'який, без здуття. Серце і легені - без патології.

Результати лабораторних досліджень: Клінічний аналіз крові: гемоглобін - 12,8 г/дл, лейкоцити - 13 • 10<sup>9</sup>/л, нейтрофіли - 90%, лімфоцити - 10%, Біохімічний аналіз: натрій сироватки крові - 148 мекв/л, калій сироватки крові - 7,1 ммоль/л, хлорид - 112 ммоль/л, бікарбонат - 12 ммоль/л, азот сечовини крові - 78 мг/л, креатинін сироватки крові - 248 мкмоль/л, глюкоза сироватки крові - 8,1 ммоль/л, Аналіз сечі: питома вага – 1020, кров – сліди, естераза – позитивний, нітроти – позитивний, лейкоцити - 20-30 у полі зору, еритроцити - 1-2 у полі зору, На ЕКГ спостерігається частота серцевих скорочень - 48/хв., з регулярним ритмом, широкі комплекси QRS, хвиль Р немає. Який захід повинен бути наступним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Натрія бікарбонат внутрішньовенно
- ☐ b. Трансвенозний пейсмейкер
- ☐ c. Кальція глюконат внутрішньовенно
- ☐ d. Аміодарон внутрішньовенно
- ☐ e. Добутамін внутрішньовенно


Коментар

Правильна відповідь: Кальція глюконат внутрішньовенно

### Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Виконання електричної дефібриляції при проведенні заходів серцево-легеневої реанімації:  
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ефективне при відсутності електричної активності серця
- ☐ b. Не ефективне при фібриляції шлуночків
- ☐ c. Ефективне лише при наявності фібриляції шлуночків, що найчастіше спостерігається в перші хвилини після раптової зупинки серця
- ☐ d. Ефективне у будь-який термін від розвитку раптової зупинки серця, навіть за відсутності фібриляції шлуночків
- ☐ e. Слід проводити лише після виконання інтубації трахеї


Коментар

Правильна відповідь: Ефективне лише при наявності фібриляції шлуночків, що найчастіше спостерігається в перші хвилини після раптової зупинки серця

### Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При огляді кардіологом хворий 11-ти років, який страждає на вроджену ваду серця, раптово знепритомнів. Шкіра та слизові блідо-ціанотичні. Дихання агональне. Пульс на магістральних артеріях не визначається. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Простий синкопальний стан
- ☐ b. Кома
- ☐ c. Зупинка серцевої діяльності
- ☐ d. Колапс
- ☐ e. Запаморочення


Коментар

Правильна відповідь: Зупинка серцевої діяльності

## Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої упродовж двох годин спостерігаються дуже часті великі судомні напади, між якими свідомість не відновлюється. На доторкання і больові подразники хвора не реагує, реакція зіниць на світло відсутня. Визначте психопатологічний стан:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпоглікемічна кома
- ☐ b. Гіперглікемічна кома
- ☐ c. Істеричний напад
- ☐ d. Епілептичний статус
- ☐ e. Алкогольне сп'яніння

Коментар

Правильна відповідь: Епілептичний статус

## Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00





Відмітити питання

Текст питання

У військовослужбовця в зоні бойових дій має місце вивих великого пальця лівої руки. До якої сортувальної категорії з її візуальним позначенням буде віднесений потерпілий?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. V (синій колір)
- ☐ б. II (жовтий колір)
- ☐ в. IV (темно-фіолетовий колір)
- ☐ г. I (червоний колір)
- ☐ д. III (зелений колір)


Коментар

Правильна відповідь: III (зелений колір)

## Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Бригада швидкої медичної допомоги прибула на місце дорожньо-транспортної пригоди. Постраждалий 43-х років, притомний. Визначається патологічна рухливість в ділянці правого плеча, правої гоілки, лівого передпліччя. Живіт м'який, безболісний в усіх відділах. Грудна клітка резистентна, безболісна під час пальпації. Частота дихальних рухів - 22/хв., частота серцевих скорочень - 106/хв., артеріальний тиск - 150/95 мм рт.ст. При огляді кінцівок даних за відкриті переломи відсутні. Який обсяг невідкладної допомоги треба надати на місці пригоди?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Аналгезія, інфузійна терапія, вазопресори
- ☐ б. Анальгетики, транспортна іммобілізація, катетеризація вени та інфузійна терапія
- ☐ в. Введення дихальних аналептиків, інфузійна терапія, анальгетики, транспортна іммобілізація
- ☐ г. Анальгетики, іммобілізація, катетеризація сечового міхура
- ☐ д. Накладання джгутів на уражені кінцівки, транспортна іммобілізація, конікокрикотомія


Коментар

Правильна відповідь: Анальгетики, транспортна іммобілізація, катетеризація вени та інфузійна терапія

## Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий доставлений у МедР з вогнища через 8 годин після застосування хімічної зброї. Скаржиться на слабкість, головний біль, задишку при найменшому фізичному навантаженні. Зі слів постраждалого, відразу після вибуху з'явилася різь в очах, сльозотеча, почуття дертя за грудниною, дертя у носоквітці, кашель. Після надягання протигазу і виходу із зараженої зони стан покращився, зберігалися лише нежить і сльозотеча. Через 1,5-2 години самопочуття стало погіршуватися. При огляді збуджений, неспокійний. Шкірні покриви вологі, ціанотичні, кон'юктива гіперемована. Зіниці до 6 мм у діаметрі, в'яло реагують на світло. Пульс - 62/хв., ритмічний, тони серця ослаблені, акцент II тону над легеневою артерією. Артеріальний тиск - 100/85 мм рт.ст., частота дихальних рухів - 30/хв. Рухливість нижнього легеневого краю 2 см, дихання жорстке, ослаблене в задньо-нижніх відділах, вислухуються вологі хрипи. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інгаляційне отруєння хлорованими вуглеводнями
- ☐ б. Початкові прояви токсичного набряку легень
- ☐ в. Інгаляційне ураження ОР нервово-паралітичної дії важкого ступеня
- ☐ г. Початковий період типової форми отруєння чадним газом
- ☐ д. Паралітична стадія ураження ціанідами важкого ступеня


Коментар

Правильна відповідь: Початкові прояви токсичного набряку легень

## Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Мати залишила здорового сина 2,5 років із старшою дочкою, хворою на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Через 3 години після повернення додому, вона помітила у сина частий кашель. На другий день стан його погіршився, температура тіла - 38,0°C, частота дихання - 42/хв., частота серцевих скорочень - 132/хв., ціаноз шкіри. Перкуторно справа нижче кута лопатки вкорочення звуку, аускультативно - в цьому місці різке ослаблення дихання. На Ro ОГК ателектаз правих сегментів S4 і S5, тінь органів середостіння зміщена вправо. Яка імовірна причина такого стану дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра пневмонія
- ☐ б. Гострий обструктивний бронхіт
- ☐ в. Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ)
- ☐ г. Стороннє тіло бронхів

☐ е. Напружений пневмоторакс  
Коментар

Правильна відповідь: Стороннє тіло бронхів

#### Питання 64

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Поранений з травматичною ампутацією правої верхньої кінцівки доставлений з поля бою в мобільний госпіталь у стані шоку. Артеріальний тиск - 50/0 мм рт.ст. На травмованій кінцівці - турнікет. Які першочергові заходи мають бути здійснені на цьому етапі?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньовенно ввести 1 мл адреналіну. Повторювати кожні 5 хвилин для підтримки адекватного артеріального тиску
- ☐ б. Швидке відновлення об'єму циркулюючої крові (ОЦК), адекватне знеболювання
- ☐ в. Розпочати краплинну інфузію 0,9% розчину натрію хлориду у межах подвоєної добової потреби в рідині
- ☐ г. Послабити турнікет. Якщо відновилась кровотеча, то ввести гемостатичні препарати і розпочати інфузію кристалоїдів
- ☐ е. Розпочати внутрішньовенну інфузію мезатону і норадреналіну

Коментар

Правильна відповідь: Швидке відновлення об'єму циркулюючої крові (ОЦК), адекватне знеболювання

#### Питання 65

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час I періоду нормальних фізіологічних пологів жінка знепритомніла. Зафіксовано стан клінічної смерті. Розпочато комплекс реанімаційних заходів згідно алгоритму ACLS. На кардіомоніторі зафіксовано фібриляцію шлуночків. Потужність першого розряду біфазного дефібрилятора повинна становити:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Проведення дефібриляції у вагітних протипоказано
- ☐ б. 50 Дж

- ☐ с. 360 Дж
- ☐ d. 75 Дж
- ☐ е. 150 Дж


Коментар

Правильна відповідь: 150 Дж

## Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після падіння з опором на праве плече, постраждалий скаржиться на біль, обмеження рухів, деформацію в області плечового суглоба. Які заходи на даному етапі надання допомоги необхідно провести?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Блокада місця перелому
- ☐ b. Накладення шини Дітеріхса
- ☐ с. Транспортна іммобілізація, знеболювання
- ☐ d. Накладення шини Крамера від пальців до плечового суглоба
- ☐ е. Накладення гіпсової пов'язки


Коментар

Правильна відповідь: Транспортна іммобілізація, знеболювання

## Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На приймальне відділення лікарні доставлений хворий 28-ми років зі скаргами на загальну слабкість, втому, головний біль, тошноту, блювання. Об'єктивно: температура - 39,4°C, сонливий, шкіра гіперемована, суха. Частота дихання - 28/хв., пульс - 110/хв., артеріальний тиск - 140/100 мм рт.ст. З анамнезу відомо, що хворий засмагав на галявині. Що сталося з хворим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тепловий удар
- ☐ b. Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ)

- ☐ c. Гіперглікемічна кома
- ☐ d. Отруєння ФОС
- ☐ e. Гіпертонічний криз


Коментар

Правильна відповідь: Тепловий удар

## Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років надійшов до приймально-діагностичного відділення з попереднім діагнозом: защемлена пупкова кіла. Під час обстеження раптово зблід, втратив свідомість. Дихання відсутнє. Пульсація на магістральних артеріях припинилася 30 секунд тому. Зіниці розширені, на світло не реагують. З чого треба розпочати реанімаційні заходи?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Електродефібриляція
- ☐ b. Штучне дихання
- ☐ c. Закритий масаж серця
- ☐ d. Прекардіальний удар
- ☐ e. Медикаментозна терапія


Коментар

Правильна відповідь: Закритий масаж серця

## Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 19-ти років, яка страждає на шизофренію, без зовнішньої причини виник стан психомоторного збудження із великою кількістю слухових галюцинацій, агресивними тенденціями на адресу оточуючих. Який невідкладний стан виник у хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кататонічне збудження
- ☐ b. Маніакальне збудження


- ☐ c. Гебефренічне збудження
- ☐ d. Галюцинаторне збудження
- ☐ e. Істеричне збудження

Коментар

Правильна відповідь: Галюцинаторне збудження

## Питання 70

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 35-ти років скаржиться на біль в епігастрії, що посилюється після прийому їжі, відрижку "тухлим", блювання фонтаном. Виразковий анамнез - 15 років. Вага тіла знижена, нижня межа шлунка - на рівні пупка, визначається "шум плескоту". Тургор шкіри знижений. Назвіть ускладнення, що розвинулося у хворого:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Стеноз пілоричного каналу
- ☐ b. Перфорація
- ☐ c. Малігнізація
- ☐ d. Кровотеча
- ☐ e. Пенетрація

Коментар

Правильна відповідь: Стеноз пілоричного каналу

## Питання 71

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 54-х років з приводу відсутності пульсу на сонних артеріях і дихання вже протягом 10 хвилин бригадою екстреної медичної допомоги (ЕМД) проводяться реанімаційні заходи: зовнішній масаж серця, штучне дихання мішком Амбу, введення адреналіну, дефібриляція. Стан залишається без змін. З якою частотою і на яку глибину має здійснюватися компресія грудної клітки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 100-120/хв. та 5-6 см

- ☐ b. 60-80/хв. та 4-5 см
- ☐ c. 90-100/хв. та 4-5 см
- ☐ d. 100-120/хв. та 3-4 см
- ☐ e. 140/хв. та 4-5 см


Коментар

Правильна відповідь: 100-120/хв. та 5-6 см

## Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 54-х років, який протягом 2-х тижнів страждає від задишки під час фізичного навантаження та непродуктивного кашлю, надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги. Хворий тривалий час зловживав алкоголем та наразі щодня вживає близько 300 г горілки, хоча він "намагається випивати менше". Палить одну пачку цигарок на день. Артеріальний тиск - 123/78 мм рт.ст., пульс - 114/хв., регулярний, насичення гемоглобіну киснем - 96% при диханні кімнатним повітрям. У легенях - послаблене дихання справа та перкуторна тупість. Живіт здутий, з перкуторною тупістю на боках та ознаками накопичення рідини. Наявний набряк +1 нижніх кінцівок, при натисканні на який залишається ямка. Результати лабораторних досліджень: креатинін - 80 мкмоль/л, загальний білок - 52 г/л, альбумін - 26 г/л, загальний білірубін - 27,36 мкмоль/л, протромбіновий час - 17 секунд, міжнародне нормалізоване відношення - 1,6, лактатдегідрогеназа сироватки - 512 Од/л. Рентгенографія органів грудної порожнини показує значне накопичення плеврального випоту справа. Було виконано торакоцентез та видалено 1,2 л рідини солом'яно-жовтого кольору. У рідині концентрація білка - 12 г/л, а концентрація лактатдегідрогенази - 60 Од/л. Через тиждень пацієнт звернувся до лікарні знову і з такими самими скаргами. Рентгенографія органів грудної порожнини показала повторне накопичення плеврального випоту справа. Що буде найдоцільнішим наступним кроком для тривалого ведення даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Плевродез
- ☐ b. Серійний парацентез та торакоцентез
- ☐ c. Фуросемід та спіронолактон з обмеженим вживанням натрію до 2 грам на день
- ☐ d. Транссяремний внутрішньопечінковий портосистемний шунт
- ☐ e. Дослідження можливості хірургічного виправлення дефекту діафрагми


Коментар

Правильна відповідь: Фуросемід та спіронолактон з обмеженим вживанням натрію до 2 грам на день

## Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час проведення трансфузії еритроцитарної маси хворому з постгеморагічною анемією стан його стрімко погіршився. З'явилися скарги на біль у попереку, грудях, головний біль, ядуху. Температура тіла підвищилась до 39°C. При об'єктивному обстеженні: обличчя ціанотичне, значна тахікардія, артеріальний тиск - 75/40 мм рт.ст. По сечовому катетеру відтікає сеча майже чорного кольору. Чим зумовлено погіршення стану хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Об'ємним перевантаженням кровообігу, набряком легень
- ☐ б. Гемолітичною реакцією внаслідок трансфузії несумісної еритроцитарної маси
- ☐ в. Пірогенною реакцією
- ☐ г. Гіперкаліємією внаслідок надлишку калію в донорських еритроцитах
- ☐ д. Алергічною реакцією


Коментар

Правильна відповідь: Гемолітичною реакцією внаслідок трансфузії несумісної еритроцитарної маси

## Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 58-ми років, скаржиться на безсоння, неспокій, кровоточивість ясен, збільшення живота. Хворіє 10 років на цироз печінки. Об'єктивно: хворий збуджений, шкіра жовтушна, множинні петехії та судинні зірочки, "печінковий" запах з рота. Рівень сечовини крові - 138 мкмоль/л, загальний білок - 54 г/л, альбуміни - 22 г/л, холестерин - 2,3 ммоль/л, білірубін - 48,5 мкмоль/л, протромб. індекс - 61%, фібриноген - 1,7 г/л. Чим ускладнилося захворювання?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Портальною гіпертензією
- ☐ б. Кровотечею з варикозно розширених вен стравоходу
- ☐ в. Гепатоцелюлярною недостатністю
- ☐ г. Гострою нирковою недостатністю
- ☐ д. Астено-невротичним синдромом


Коментар

Правильна відповідь: Гепатоцелюлярною недостатністю

## Питання 75



Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В гематологічному відділенні лікарні знаходиться хворий 34-х років, який скаржиться на відчуття тривоги, страху, погане загальне самопочуття, біль у животі та грудній клітці, серцебиття, задишку. При огляді: гіперемія шкіри, температура тіла - 38,2оС, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., тахікардія, у легенях вологі хрипи, живіт під час пальпації чутливий, особливо в ділянці правого підребер'я. Відомо, що 6 годин тому, хворому було проведене переливання еритроцитарної маси. Що є причиною погіршення стану пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Алкогольний гепатит
- ☐ b. Синдром Жильбера
- ☐ c. Трансфузійна гемолітична реакція
- ☐ d. Грип
- ☐ e. Вірусний гепатит С

Коментар

Правильна відповідь: Трансфузійна гемолітична реакція

## Питання 76

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після використання ворогом хімічної зброї військовослужбовці відчули запах гіркого мигдалю, гіркоту в роті, запаморочення, головний біль, ядуху, серцебиття. Шкіра та слизові оболонки інтенсивнорожевого кольору. У більшості уражених психомоторне збудження, судоми, втрата свідомості. Який антидот треба використати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Антиціан
- ☐ b. Будаксим
- ☐ c. Атропін
- ☐ d. Тарен
- ☐ e. Афін

Коментар

Правильна відповідь: Антиціан

## Питання 77

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілого 37-ми років, через 24 години після вдалої реанімації, внаслідок утоплення у морській воді, погіршився загальний стан: з'явилася виражена задишка, дифузний ціаноз, тахіпное, тахікардія, гіпотонія, при аускультатії визначалося послаблене жорстке дихання та розсіяні сухі хрипи, перкуторно - притуплення звуку у задньонижніх відділах. Рентгенологічно: посилення судинного малюнка, переважно у периферичних відділах, двобічні інфільтративні дрібновогнищеві тіні неправильної хмароподібної форми. Хворого переведено у відділення інтенсивної терапії. Незважаючи на інгаляцію кисню, парціальний тиск кисню був менше 50 мм рт.ст. Яке ускладнення розвилось у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра печінкова недостатність
- ☐ б. Гострий респіраторний дистрес-синдром
- ☐ в. Внутрігоспітальна пневмонія
- ☐ г. Астматичний статус
- ☐ д. ДВЗ-синдром

Коментар

Правильна відповідь: Гострий респіраторний дистрес-синдром

## Питання 78

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 58-ми років зимою був на рибалці. Коли прийшов додому через деякий час відчув біль в стопах. Звернувся до лікаря. При огляді стоп шкіра була блідою, а після зігрівання стала червоною, теплою на дотик. Набряк - незначний, обмежується пальцями. Всі види чутливості збережені. Пухирів немає. Який ступінь обмороження?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. IV ступінь
- ☐ б. I ступінь
- ☐ в. II ступінь
- ☐ г. V ступінь
- ☐ д. III ступінь


Коментар

Правильна відповідь: I ступінь

### Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика трьох років на 4-ту добу гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ) на тлі температури 38,9оС з'явилося психомоторне збудження, ціаноз перорального трикутника, інспіраторна задишка, тахікардія. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Дифтерія
- ☐ b. Ревматизм
- ☐ c. Пневмонія
- ☐ d. Вроджена вада серця
- ☐ e. набряк гортані


Коментар

Правильна відповідь: набряк гортані

### Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопець 16-ти років, що стояв на зупинці поряд із лікарнею, раптом зблід, знепритомнів. Зіниці розширились. Пульс на магістральних артеріях відсутній. Доставлений до приймального відділення. Черговим терапевтом розпочато реанімаційні заходи. При підключенні кардіомонітору - пряма лінія. Дайте оцінку результату:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Електрична активність без пульсу
- ☐ b. Шлуночкова аритмія
- ☐ c. Асистоія
- ☐ d. Фібриляція шлуночків

Коментар

Правильна відповідь: Асистоія

## Питання 81

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 42-х років раптово виникли судоми в пальцях кистей, зведення міжреберних м'язів, головний біль. В анамнезі: видалення великого вузла щитоподібної залози. Який лікарський засіб треба ввести в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньовенно 10% розчин хлориду натрію
- ☐ б. Папаверину гідрохлориду 2% - 4,0 внутрішньовенно
- ☐ в. 30 мг 3% розчину хлориду калія в 500 мг ізотонічного розчину хлориду натрію
- ☐ г. 10% розчин кальцію хлориду 10-20 мг внутрішньовенно повільно
- ☐ д. 10% розчин кальцію хлориду 10-20 мг внутрішньовенно болюсно

Коментар

Правильна відповідь: 10% розчин кальцію хлориду 10-20 мг внутрішньовенно повільно

## Питання 82

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий з цирозом печінки, портальною гіпертензією III ступеню скаржиться на виражену слабкість, запаморочення, знепритомнення, серцебиття, нудоту, блювання кров'ю, чорний рідкий кал. Означені симптоми нарастають протягом доби. Шкіра і слизові бліді, іктеричні, холодні, липкі. Пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Живіт м'який, безболісний. Аналіз крові: еритроцити -  $1,8 \cdot 10^{12}/л$ , гемоглобін - 60 г/л, КП - 1,0, лейкоцити -  $8 \cdot 10^9/л$ . Яке ускладнення виникло у хворого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гемолітична криза
- ☐ б. Гостра кровотеча
- ☐ в. Перфорація виразки
- ☐ г. Інфаркт кишки
- ☐ д. Печінкова кома

Коментар

Правильна відповідь: Гостра кровотеча

### Питання 83

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 2-х місяців з ознаками гіпотрофії знаходилася на грудному вигодовуванні матір'ю, що страждала на полінаркоманію. Після припинення вживання опіатів терміном на 3 місяці вона знову ввела собі звичну дозу внутрішньовенно. Після годування груддю дитина стала кволою, зблідла, дихання - 10-12/хв. За медичною допомогою мати не зверталась. Через 40 хвилин у дитини виникло припинення кровообігу, яке призвело до біологічної смерті. Який тип дихальної недостатності спричинив смерть немовляти?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Констриктивний
- ☐ b. Нервово-м'язовий
- ☐ c. Рестриктивний
- ☐ d. Торакоабдомінальний
- ☐ e. Центральний

Коментар

Правильна відповідь: Центральний

### Питання 84

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Народилась недоношена дитина, гестаційний вік 32 тижні, з вагою 1700 г, рівень глюкози крові становить 2,1 ммоль/л. У дитини відмічається порушення стану, судомна готовність. Виберіть першочергову допомогу для дитини:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 25% розчин  $MgSO_4$ , 1 мл/кг
- ☐ b. 10% розчин глюкози, 2 мл/кг
- ☐ c. 0,9% розчин натрію хлориду, 10 мл/кг
- ☐ d. 10% розчин натрію хлориду, 4 мл/кг
- ☐ e. Фенобарбітал, 20 мг/кг

Коментар

Правильна відповідь: 10% розчин глюкози, 2 мл/кг

## Питання 85

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 72-х років збитий машиною при дорожньо-транспортній пригоді. Іти не може. Скаржиться на сильний біль у ділянці правої половини таза. Об'єктивно: блідий; гематома, набряк правої половини таза, сильний біль при натискуванні на крила клубових кісток. Встановлено діагноз: перелом кісток таза. Яку транспортну іммобілізацію слід застосувати? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. М'які носилки в положенні хворого на спині з випрямленими ногами
- ☐ б. Шину Крамера в положенні хворого на спині
- ☐ в. Шину Дітерікса в положенні хворого на спині
- ☐ г. М'які носилки в положенні хворого на спині з великим окремим валиком під кожне зігнуте оліно
- ☐ д. Жорсткі носилки в положенні хворого на спині з одним великим валиком під зігнуті коліна

Коментар

Правильна відповідь: Жорсткі носилки в положенні хворого на спині з одним великим валиком під зігнуті коліна

## Питання 86

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У породіллі 25-ти років через 5 хвилин після народження дитячого місця з'явився озноб, задишка, тахікардія. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст., температура - 37,8оС. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Емболія навколоплідними водами
- ☐ б. Гострий апендицит
- ☐ в. Респіраторна вірусна інфекція
- ☐ г. Розрив матки
- ☐ д. Набряк легень

Коментар

Правильна відповідь: Емболія навколоплідними водами

## Питання 87

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 42-х років захворів гостро: підвищення температури тіла до 39°C, головний та м'язовий біль. На 5-й день захворювання: обличчя гіперемоване, "кролячі очі", на бічних поверхнях грудної клітки рясний поліморфний розеолезно-петехіальний висип. Тони серця глухі, пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. Язик сухий, обкладений білим нальотом з відбитками зубів. Гепатоспленомегалія. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Черевний тиф
- ☐ б. Грип
- ☐ с. Менінгококцемія
- ☐ d. Висипний тиф
- ☐ е. Лептоспіроз

Коментар

Правильна відповідь: Висипний тиф

## Питання 88

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого через тиждень після осколкового поранення гомілки, з'явилися скарги на сіпаючі болі в рані, біль в горлі, труднощі при відкриванні рота, погіршення зору. Підвищилася температура тіла до 38°C. Про яке ускладнення необхідно подумати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Сепсис
- ☐ б. Правець
- ☐ с. Дифтерія
- ☐ d. Ангіна
- ☐ е. Нагноєння рани

Коментар

Правильна відповідь: Правець

## Питання 89

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

65-річну жінку з нерозбірливою мовою та у стані часткового потьмарення свідомості привів до відділення невідкладної медичної допомоги її син. Симптоми виникли кілька днів тому і поступово погіршувалися. В анамнезі: цукровий діабет, стан пацієнтки контролюється прийомом метформіну. Син стверджує, що для їх родини характерні "розлади настрою", і його мати вже кілька років приймає літій та рисперидон. Місяць назад у пацієнтки було діагностовано гіпертонію та артрит, призначено хлорталідон та ацетамінофен. Об'єктивно: повільний тремор рук та нестійку ходу. Пацієнтка усвідомлює, хто вона, але не орієнтується в часі та просторі. Температура тіла - 36,1°C, артеріальний тиск - 150/90 мм рт.ст., пульс - 52/хв., частота дихання - 16/хв. Що найімовірніше спричинило появу таких симптомів у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Взаємодія препаратів з хлорталідоном
- ☐ б. Взаємодія препаратів з ацетамінофеном (парацетамол)
- ☐ в. Гіпоглікемія
- ☐ г. Злоякісний нейролептичний синдром
- ☐ д. Інсульт

Коментар

Правильна відповідь: Взаємодія препаратів з хлорталідоном

## Питання 90

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В приймальний покій доставлений чоловік 30-ти років. Рівень свідомості - кома І. Анамнез невідомий. Наявні незначні пошкодження шкірних покривів тіла. Дихання глибоке. Частота дихальних рухів - 12/хв., артеріальний тиск - 190/110 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 60/хв. Зліва відмічається мідріаз. Яку патологію можна запідозрити у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ішемічний інсульт
- ☐ б. Геморагічний інсульт
- ☐ в. Черепно-мозкова травма
- ☐ г. Гостре отруєння
- ☐ д. Гіпоглікемічна кома




Коментар

Правильна відповідь: Черепно-мозкова травма

## Питання 91

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При обстеженні військовослужбовця у мобільному госпіталі має місце закрыта травма грудної клітки зліва. Шкіра бліда, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 110/65 мм рт.ст. Дихання поверхневе, частота дихальних рухів - 24/хв. Болючість та крепітація кісткових уламків в проекції VII X ребер зліва по середньо-пахвовій лінії. Перкуторно зліва в нижніх відділах відзначається тупий звук, дихання не прослуховується. Діагноз і тактика:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Закритий перелом VII-X ребер зліва, ускладнений гемотораксом. Гемотрансфузія
- ☐ б. Закритий перелом I-IV ребер зліва ускладнений гемотораксом. Термінова операція
- ☐ в. Закритий перелом I-IV ребер зліва, ускладнений пневмотораксом. Дренування плевральної порожнини
- ☐ г. Закритий перелом VII-X ребер зліва, ускладнений пневмотораксом. Дренування плевральної порожнини
- ☐ д. Закритий перелом VII-X ребер зліва, ускладнений гемотораксом. Лікувально-діагностична пункція плевральної порожнини


Коментар

Правильна відповідь: Закритий перелом VII-X ребер зліва, ускладнений гемотораксом. Лікувально-діагностична пункція плевральної порожнини

## Питання 92

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 46-ти років, який тривалий час перебував у шахті, скарги на подразливий кашель, головний біль, нудоту, печіння в очах, світлобоязнь. Об'єктивно: шкіра ціанотична, склери гіперемовані. Діагностовано отруєння сірководнем. Які першочергові заходи слід провести у даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інгаляція кисню

- ☐ b. Введення антибіотиків
- ☐ c. Вдихання амілнітриту
- ☐ d. Введення кордіаміну
- ☐ e. Промивання очей водою, закапування дикаїну


Коментар

Правильна відповідь: Інгаляція кисню

### Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 35-ти років, звернувся до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на лихоманку, слабкість, генералізований біль у животі та випорожнення з домішками крові. Блювання не було, але спостерігалася втрата апетиту. Шість місяців тому у нього було діагностовано виразковий коліт, періодично проходив терапію сульфасалазином. Раптове загострення стану відбулося чотири дні тому і швидко прогресувало: у хворого з'явилися часті випорожнення з кров'ю та сильний біль у животі. Палить, але раніше намагався кинути. Останнім часом не приймав ніяких антибіотиків, не подорожував. Температура тіла - 37,8оС, пульс - 124/хв., артеріальний тиск - 106/72 мм рт.ст. Слизові оболонки виглядають пересохлими. Кишкові шуми гіпоактивні. Наявні генералізована болючість живота та здуття; захисної фіксації м'язів живота чи симптому Блюмберга не спостерігається. Перкуторний звук тимпанічний. Яке дослідження найдоцільніше буде провести у першу чергу для цього пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рентгенографія органів черевної порожнини
- ☐ b. Колоноскопія
- ☐ c. Бактеріологічний посів калу на гельмінтів та їх яйця
- ☐ d. УЗД органів черевної порожнини


Коментар

Правильна відповідь: Рентгенографія органів черевної порожнини

### Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При наданні невідкладної допомоги дитині із крововтратою до 10% об'єму циркулюючої крові (ОЦК) лікарю необхідно відновити обсяг циркулюючої плазми. Оберіть оптимальний препарат:  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ізотонічний сольовий розчин
- ☐ b. Цільна кров
- ☐ c. Реополіглюкін
- ☐ d. Розчин глюкози
- ☐ e. Розчин калію хлориду

Коментар

Правильна відповідь: Ізотонічний сольовий розчин

## Питання 95

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженого з оцінкою за шкалою Апгар 2 бали, після проведення реанімаційних заходів стабілізувалась частота серцевих скорочень в межах 130-140/хв. Самостійне дихання неадекватне, в зв'язку з чим продовжується керована вентиляція легень 100% киснем. Яке ускладнення може виникнути у новонародженого при тривалому застосуванні високих концентрацій кисню?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ретролентальна фіброплазія (ретинопатія недоношених)
- ☐ b. Можлива депресія дихання
- ☐ c. Зменшення клубочкової фільтрації
- ☐ d. Ателектаз легень
- ☐ e. Істотне скорочення мозкового кровотоку

Коментар

Правильна відповідь: Ретролентальна фіброплазія (ретинопатія недоношених)

## Питання 96

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При наданні невідкладної допомоги дитині 7-ми років із гострою крововтратою внаслідок травматичного ушкодження стегнової артерії визначено, що об'єм крововтрати становить до 20%

об'єму циркулюючої крові (ОЦК). Оберіть оптимальні препарати для відновлення об'єму циркулюючої крові (ОЦК):

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тільки колоїди
- ☐ b. Свіжозаморожена плазма
- ☐ c. Розчин глюкози
- ☐ d. Кристалоїди
- ☐ e. Цільна кров


Коментар

Правильна відповідь: Кристалоїди

### Питання 97

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 42-х років. Раптово на фоні повного здоров'я відчув біль по типу "удару по голові", після чого розвинулось блювання, втратив свідомість, генералізовані судоми. Об'єктивно: кома 1 ступеню, ригідність потиличних м'язів, ліва зіниця більше у розмірі ніж права, праві кінцівки ротовані, м'язовий тонус значно зменшений. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Менінгіт
- ☐ b. Епілепсія
- ☐ c. Інфаркт мозку
- ☐ d. Крововилив головного мозку
- ☐ e. Гостра гіпертонічна енцефалопатія


Коментар

Правильна відповідь: Крововилив головного мозку

### Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 57-ми років після швидкого підйому з ліжка раптово знепритомніла. Шкіра бліда, артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 65/хв. Свідомість відновилась через декілька секунд. Який стан розвинувся у жінки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ортостатична артеріальна гіпотензія
- ☐ b. Кардіогенний шок
- ☐ c. Напад Морганьї-Адамс-Стокса
- ☐ d. Напад епілепсії
- ☐ e. Серцева астма


Коментар

Правильна відповідь: Ортостатична артеріальна гіпотензія

## Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 1,5 року, захворіла гостро. Нудота, блювання, через 4 години з'явилися рідкі водянисті випорожнення білуватого кольору без патологічних домішок, до 8 разів на добу. Незначна гіперемія піднебінних дужок, гіпертрофія фолікулів задньої стінки глотки. Дефіцит маси тіла - 4%. Встановіть попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий апендицит
- ☐ b. Функціональне порушення травлення
- ☐ c. Холера
- ☐ d. Сальмонельоз
- ☐ e. Гостра кишкова інфекція


Коментар

Правильна відповідь: Гостра кишкова інфекція

## Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В інфекційне відділення поступив хворий у край тяжкому стані. Риси обличчя загострені, очі глибоко запалі, темні кола навколо них. Шкіра легко збирається в складки, які не розправляються. Періодично виникають загальні судоми. Голос відсутній. Температура тіла - 35,3оС. Пульс на периферичних судинах, артеріальний тиск не визначаються. З чого слід починати невідкладну допомогу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Протисудомна терапія
- ☐ b. Антибактеріальна терапія
- ☐ c. Регідратаційна терапія
- ☐ d. Десенсибілізуюча терапія
- ☐ e. Дезінтоксикаційна терапія


Коментар

Правильна відповідь: Регідратаційна терапія

## Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 20-ти років скаржиться на біль у правому підребер'ї з іррадіацією у праве плече, надпліччя, нудоту, блювання з жовчю, гіркоту, сухість в роті. Об'єктивно: шкіра, склери субіктеричні; язик підсушений. Живіт звичайної форми, права половина відстає у акті дихання. Пальпаторно визначається напруження м'язів живота правої підреберної ділянки. Симптоми Мерфі, Кера, Ортнера, Мюссі-Георгієвського позитивні. Температура тіла - 38оС. Лейкоцитоз - 12 • 10<sup>9</sup>/л. Швидкість зсідання еритроцитів - 20 мм/год. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий холецистит
- ☐ b. Гострий гастрит
- ☐ c. Гострий панкреатит
- ☐ d. Гострий гепатит
- ☐ e. Гострий апендицит

Коментар

Правильна відповідь: Гострий холецистит

## Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Рядовий доставлений у МедР через 2 години після отруєння. Свідомість відсутня. Зі слів товаришів по службі відомо, що з метою сп'яніння випив близько 100 мл рідини із запахом алкоголю. Майже відразу розвилася картина сп'яніння, потім з'явилися слабкість, нудота, кількаразова блювота. Скаржився на болі в животі, зниження гостроти зору, потім знепритомнів. При огляді - кома. Шкіра бліда, гучне дихання, запах алкоголю з рота. Пульс - 116/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., частота дихальних рухів - 26/хв., живіт м'який. Отруєння якою речовиною можна запідозрити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Етиленгліколь
- ☐ b. Метанол
- ☐ c. Етанол
- ☐ d. Хлорорганічні
- ☐ e. Фосфорорганічні


Коментар

Правильна відповідь: Метанол

### Питання 103

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагоні метро злочинцем було розпилено невідомий газ, після чого у потерпілих виникли слезотеча, слинотеча, ринорея, пітливість, біль у животі, нудота, блювання, тенезми, м'язова слабкість, збудження, головний біль, атаксія, у декого - судоми. Який отруйний засіб застосовано? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Фосфорорганічний
- ☐ b. Чадний
- ☐ c. Хлоровмісний
- ☐ d. Сльозогінний
- ☐ e. Фторацетатний

Коментар

Правильна відповідь: Фосфорорганічний

### Питання 104

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 1,5 років, яка їла горіхи "на тлі повного здоров'я", несподівано розпочався нападopodobний спазматичний кашель з короткотривалим апное, з'явилися ціаноз, інспіраторна задишка, осиплість голосу. Про яке захворювання у дитини можна думати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Стороннє тіло гортані
- ☐ b. Спазмофілія (ларингоспазм)
- ☐ c. Напад бронхіальної астми
- ☐ d. Психогенний кашель
- ☐ e. Стенозуючий ларинготрахеїт

Коментар

Правильна відповідь: Стороннє тіло гортані

## Питання 105

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнта 52-х років доставлено у відділення реанімації в перші години гострого інфаркту міокарда. Стан вкрай важкий: свідомість відсутня, шкірні покриви бліді, слизові оболонки ціанотичні, м'язова атонія, поодинокі поверхневі вдихи, пульс на променевих та сонних артеріях не визначається. На ЕКГ виявлено великохвильову фібриляцію шлуночків. Який терапевтичний захід слід здійснити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Електрична дефібриляція
- ☐ b. Введення аміодарону
- ☐ c. Введення кальцію хлориду
- ☐ d. Введення лідокаїну
- ☐ e. Введення адреналіну гідрохлориду


Коментар

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

## Питання 106



Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У породіллі 16-ти років почалась гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Об'єм крововтрати 1,6% від маси тіла, пульс - 115/хв., систолічний артеріальний тиск - 80 мм рт.ст., центральний венозний тиск - 35 мм вод.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді без ознак геморагічного шоку
- ☐ б. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок I ступеня
- ☐ в. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок IV ступеня
- ☐ г. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок III ступеня
- ☐ д. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок II ступеня

Коментар

Правильна відповідь: Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок II ступеня

## Питання 107

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 52-х років з наявним трансфузіологічним анамнезом одразу після початку внутрішньовенного введення свіжозамороженої плазми виникли непродуктивний кашель, бронхоспазм, задуха, нудота, болі у животі, гіпотонія, після чого наступила втрата свідомості. Які найбільш правильні лікувальні заходи?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Негайна зупинка інфузії, в/в введення адреналіну, преднізолону, еуфіліну, інгаляція кисню
- ☐ б. Продовження інфузії, введення адреностимуляторів, глюкокортикостероїдів
- ☐ в. Негайна зупинка інфузії, інтубація трахеї, штучна вентиляція легень (ШВЛ)
- ☐ г. В/в введення еуфіліну, гідрокортизону, інфузійна терапія, інгаляція кисню
- ☐ д. Джгут вище місця введення, обколювання розчином адреналіну, гідрокортизон в/в

Коментар

Правильна відповідь: Негайна зупинка інфузії, в/в введення адреналіну, преднізолону, еуфіліну, інгаляція кисню

## Питання 108

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікар загальної практики був викликаний до жінки в терміні вагітності 35 тижнів, яка скаржиться на головні болі, набряки, утруднене дихання через ніс, "мерехтіння мушок" перед очима. Об'єктивно: генералізовані набряки. Артеріальний тиск - 190/110 мм рт.ст., білок в сечі - 5,0 г/л. Який діагноз у вагітної?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гіпертензія вагітних
- ☐ б. Прееклампсія важкого ступеня
- ☐ в. Прееклампсія середнього ступеня
- ☐ г. Прееклампсія легкого ступеня
- ☐ е. Еклампсія

Коментар

Правильна відповідь: Прееклампсія важкого ступеня

## Питання 109

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 48-ми років, стан важкий, виражена легенево-серцева недостатність. Пульс - 110/хв., аритмічний, слабого наповнення. Артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Тони серця приглушені. У легенях справа перкуторно коробковий звук, дихання не прослуховується, межі серця зміщені в протилежний бік. Який об'єм допомоги при тотальному клапанному пневмотораксі на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Увести кордіамін, госпіталізувати
- ☐ б. Туго бинтувати грудну клітку, госпіталізувати
- ☐ в. Пункція плевральної порожнини
- ☐ г. Госпіталізувати до спеціалізованої лікарні
- ☐ е. Перевести пневмоторакс у відкритий, госпіталізувати

Коментар

Правильна відповідь: Перевести пневмоторакс у відкритий, госпіталізувати

## Питання 110

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 77-ми років раптово виникла задишка, що перейшла в ядуху, з'явилося клокотливе дихання, виділення піни із рота. Об'єктивно: положення - сидяче, шкіра волога, бліда. Пульс - 80/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. В легенях з обох боків безліч вологих хрипів. В анамнезі - ішемічна хвороба серця (ІХС), гіпертонічна хвороба, обструктивний бронхіт. Який препарат необхідно призначити першочергово при наданні допомоги цьому хворому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Дофамін
- ☐ b. Морфін
- ☐ c. Строфантин
- ☐ d. Нітрогліцерин
- ☐ e. Фуросемід

Коментар

Правильна відповідь: Дофамін

## Питання 111

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В пологове відділення поступила вагітна 43 роки - II пологи, поперечне положення плода. Супутнє ускладнення - глибокий венозний тромбоз вен нижніх кінцівок. Тактика ведення пологів – визначено кесарський розтин. Яку передопераційну профілактику потрібно провести?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Тугебинтування стегон
- ☐ b. Фібринолітична терапія
- ☐ c. Гепаринопрофілактика
- ☐ d. Аспірин
- ☐ e. Клопідогрель

Коментар

Правильна відповідь: Гепаринопрофілактика

## Питання 112

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Загін солдат-миротворців у одній з африканських країн зазнав нападу з використанням хімічної зброї. Скарги на нудоту, слинотечу, пекучий гіркий присмак у роті, першіння горла, задишка. Об'єктивно: запах гіркого мигдалю з рота, шкіра рожевого забарвлення, у окремих бійців судоми. Засіб антидотної терапії в даному випадку:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Унітіол
- ☐ b. Амілнітрит
- ☐ c. Цистамін
- ☐ d. Пентацин
- ☐ e. Десферал

Коментар

Правильна відповідь: Амілнітрит

## Питання 113

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 65-ти років, який страждає від миготіння передсердь у постійній формі, звернувся до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на відчуття холоду у правій стопі. Пацієнт не дотримувався призначеної йому антикоагуляційної терапії. В анамнезі: цукровий діабет 2-го типу, гіпертонія та хронічна нефропатія, що супроводжується протеїнурією низького ступеню. Артеріальний тиск - 122/70 мм рт.ст., пульс - 112/хв., аритмічний. Об'єктивно: похолодіння правої ноги та відсутність пульсу над дорсальною артерією стопи та задньою великогомілковою артерією. Екстрена артеріограма виявила закупорку підколінної артерії; було виконано аспірацію тромбу, успіх процедури був підтверджений ангіографічно. Через дві години пацієнт відчув сильний біль у правій нозі, що супроводжувався відчуттями "мурашок" та печіння. Який діагноз найімовірніший? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інфекційне ураження глибоких тканин
- ☐ b. Компартмент-синдром
- ☐ c. Фантомний біль
- ☐ d. Діабетична нейропатія
- ☐ e. Ішемічний 'Е0внсульт


Коментар

Правильна відповідь: Компартмент-синдром

### Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 3-х років, яка знаходиться у стаціонарі, на фоні гострої респіраторної інфекції 3 рази було блювання, непокоїть гострий біль у животі. Температура тіла - 38,5°C. Шкіра бліда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор крові - 4,0 ммоль/л. Який з діагнозів найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Цукровий діабет
- ☐ б. Гострий апендицит
- ☐ в. Гострий гастроентерит
- ☐ г. Діабетична кома
- ☐ д. Ацетонемічний стан


Коментар

Правильна відповідь: Ацетонемічний стан

### Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До хірурга звернувся чоловік 40-ка років, працівник молочної ферми. Скаржиться на наявність зони запалення на правому передпліччі. Об'єктивно: на тильній поверхні передпліччя визначається темна папула, навколо якої виражений набряк, пальпація безболісна. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Абсцес передпліччя
- ☐ б. Бешиха
- ☐ в. Карбункул передпліччя
- ☐ г. Абсцедуючий фурункул передпліччя
- ☐ д. Шкірна форма сибірки


Коментар

Правильна відповідь: Шкірна форма сибірки

### Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий з опіками обох гомілок 10% поверхні тіла, стадія 2-А, опіковий шок середньої важкості. Яку невідкладну допомогу необхідно надати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення колоїдних розчинів
- ☐ b. Знеболювання та введення кортизону
- ☐ c. Введення антибіотиків та охолодження гомілок
- ☐ d. Введення діуретиків та асептична пов'язка на раневу поверхню
- ☐ e. Знеболювання та введення розчину Рінгер-лактату


Коментар

Правильна відповідь: Знеболювання та введення розчину Рінгер-лактату

### Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До інфекційної лікарні лікарем сільської амбулаторії направлений хворий 17-ти років, який три дні тому був укушений короною за кисть руки. При огляді на місці укусу визначається пухирець з кратероподібним поглибленням. Навколо пустули - круглий вінчик з пухирців із серозно-кров'янистим вмістом та регіональний лімфаденіт. Що необхідно зробити для уточнення діагнозу? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Загальний аналіз крові
- ☐ b. Рентгенологічне дослідження кисті
- ☐ c. Мікроскопія виділень з рани
- ☐ d. Бактеріологічне дослідження крові хворого
- ☐ e. Бактеріологічне дослідження вмісту рани

Коментар

Правильна відповідь: Бактеріологічне дослідження вмісту рани

## Питання 118

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 34-х лет скаржиться на гострі болі у ділянці ануса, підвищення температури тіла до 37,8оС. Пальпаторно визначається пухлиноподібне утворення у ділянці 2-х годин умовного циферблату, розмірами 2х3 см, різко болісне, у центрі - флуктуація. Діагностований гострий парапроктит.

Визначте лікувальну тактику:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Фізіотерапія
- ☐ b. Хірургічне лікування
- ☐ c. Консервативне лікування
- ☐ d. Симптоматичне лікування
- ☐ e. Паліативне лікування

Коментар

Правильна відповідь: Хірургічне лікування

## Питання 119

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 60-ти років доставили у відділення невідкладної медичної допомоги із задишкою, що виникла раптово. Анамнез пацієнта обтяжений гіпертонією, коронарною хворобою серця та цукровим діабетом 2-го типу. Наразі хворий приймає гідрохлоротіазид, інсулін гларгін, аторвастатин, аспірин, та мультивітамінний комплекс щоденно. Температура тіла - 36,7оС, артеріальний тиск - 128/72 мм рт.ст., пульс - 116/хв., частота дихання - 28/хв. Фізикальне обстеження виявило підвищену пітливість та високий рівень тривожності. Пульсація яремної вени спостерігається до кута нижньої щелепи. Серцеві тони регулярні, вислуховуються 3-й тон серця (ритм галопу) та слабкий голосистолічний шум над верхівкою серця. У легенях: хрипи з обох боків до середини легенів. Наявний набряк нижніх кінцівок, при натисканні на який залишається ямка. Що слід зробити в першу чергу, щоб полегшити симптоми захворювання?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Зменшити преднавантаження на серце
- ☐ b. Підвищити тиск коронарної перфузії
- ☐ c. Знизити пульс
- ☐ d. Підвищити скоротливу здатність міокарду

☐ е. Блокувати активність симпатичної нервової системи  
Коментар

Правильна відповідь: Зменшити преднавантаження на серце

## Питання 120

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора на атеросклероз 63-х років, вранці не змогла піднятися з ліжка, відмічався глибокий парез в правій половині тіла (переважно в руці), порушення мови у вигляді моторної афазії. При обстеженні виявлені підвищенні сухожильні та патологічні рефлексі праворуч, артеріальний тиск - 130/70 мм рт.ст. Який з допоміжних методів діагностики є найбільш інформативним в даному випадку? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Пневмоенцефалографія
- ☐ б. Огляд очного дна
- ☐ в. Доплерографія судин головного мозку
- ☐ г. Комп'ютерна електроенцефалографія
- ☐ е. ЕХО-енцефалографія

Коментар

Правильна відповідь: Доплерографія судин головного мозку

## Питання 121

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після автомобільної аварії до відділення невідкладної медичної допомоги надійшла 18-річна дівчина. Після прибуття її реакція на подразники мінімальна, наявні ознаки кровотечі на голові з правого боку. Основні показники стану організму: температура тіла - 37,6°C, артеріальний тиск - 180/100 мм рт.ст., пульс - 52/хв., частота дихання - 6/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 96% при подачі кисню 2 л/хв. У її диханні відчувається запах алкоголю. В ході фізикального обстеження виявлено, що права зіниця має 7 мм в діаметрі, реакція на світло мінімальна. Ліва зіниця - 3 мм, реакція на світло нормальна. Праве око зміщене назовні та вниз. Офтальмоскопія виявила двосторонній набряк диску зорового нерва. Під час перебування у відділенні невідкладної медичної допомоги з пацієнткою відбувся напад, що характеризувався генералізованим витяганням всього тіла, з притисканням верхніх кінцівок вздовж тіла, долонями донизу. Ознак ушкодження грудної клітки чи органів черевної порожнини немає. Якими будуть наступні дії?



Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпервентиляція, щоб парціальний тиск CO<sub>2</sub> (PaCO<sub>2</sub>) досяг 25-30 мм рт.ст.
- ☐ b. Тіамін внутрішньовенно
- ☐ c. Манітол внутрішньовенно
- ☐ d. Ендотрахеальна інтубація
- ☐ e. Комп'ютерна томографія мозку


Коментар

Правильна відповідь: Ендотрахеальна інтубація

## Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

25-річний пацієнт, що тривалий час вживає алкогольні напої, доставлений у хірургічну клініку з приводу багаторазового блювання спочатку рештками їжі, потім - малозміненою кров'ю та її згортками, що виникло внаслідок вживання горілки. При ендоскопічному дослідженні виявлений лінійний розрив слизової оболонки в ділянці переходу стравоходу в шлунок. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кровотеча з варикозних вен стравоходу
- ☐ b. Хімічний опік стравоходу
- ☐ c. Гострі ерозії стравоходу та шлунка
- ☐ d. Гострий геморагічний гастрит
- ☐ e. Синдром Мелорі-Вейса


Коментар

Правильна відповідь: Синдром Мелорі-Вейса

## Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 56-ти років, що знаходився в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної астми, під час обіду поперхнувся, з'явилися кашель, блювання, утруднене дихання. При огляді виражений ціаноз шкіри, слизових оболонок. Дихання поверхневе за участю допоміжних м'язів 36/хв. Пульс -

160/хв., аритмічний. Артеріальний тиск - 200/110 мм рт.ст. Перкуторно над легеньми коробковий звук, дихання різко послаблене, сухі свистячі хрипи. Надання невідкладної допомоги хворому необхідно розпочати з:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Фармадипін 3-5 кап. під язик
- ☐ б. Подача кисню через маску
- ☐ в. Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- ☐ г. Кордарон 150 мг в/в на глюкозі
- ☐ д. Інгаляція сальбутамолу ч/з небулайзер


Коментар

Правильна відповідь: Забезпечення прохідності дихальних шляхів

## Питання 124

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Солдат перебуває у військовому польовому пересувному госпіталі з кульовим пораненням середньої третини правого стегна. Стан важкий, шкіра бліда, температура тіла - 37,8оС, пульс - 106/хв., артеріальний тиск - 90/70 мм рт.ст. Останні 3 дні турбує кашель з харкотинням. При аускультції у нижній частці лівої легені вологі хрипи. З чим пов'язано погіршення стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Плеврит
- ☐ б. Пневмоторакс
- ☐ в. набряк легень
- ☐ г. Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ)
- ☐ д. Приєднання пневмонії


Коментар

Правильна відповідь: Приєднання пневмонії

## Питання 125

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До сімейного лікаря звернулася хвора 54-х років, зі скаргами на "стартовий", "- блокадний" біль в колінних та кульшових суглобах, рухи обмежені, болючі. Хвора працює кухарем, підвищеного живлення. З анамнезу відомо, що мати хворої теж мала подібні скарги. Який метод діагностики є визначальним для встановлення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рентгенографія
- ☐ b. Артроскопія
- ☐ c. Загальний аналіз крові
- ☐ d. Біохімічне визначення рівня сечовини
- ☐ e. Загальний аналіз сечі


Коментар

Правильна відповідь: Рентгенографія

## Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

24-річний італієць у супроводі своєї дівчини звернувся до лікарні невідкладної медичної допомоги зі скаргами на утруднене дихання. Протягом останніх двох місяців перебуває з дівчиною в Україні. Задишка у пацієнта розпочалася 4 дні тому і поступово погіршується. Під час бесіди з лікарем йому кілька разів доводилося замовкати, щоб звести дух. Дівчина каже, що 2 тижні тому він переніс гастроентерит, який супроводжувався домішками крові у випорожненнях. Діарея припинилася раптово, але після цього він почувався дуже втомленим і виснаженим. Через тиждень по тому пацієнт почав відчувати поколювання у ступнях та пальцях ніг. Ще через три дні він почувався настільки слабким, що не міг підвестися з ліжка, його дихання стало утрудненим. Цього ранку проблеми з диханням стали ще серйознішими, і він вирішив звернутися до відділення невідкладної медичної допомоги. Анамнез життя та сімейний анамнез не фіксують значних захворювань. Пацієнт стверджує, що ніколи не вживав наркотики внутрішньовенно, не палить, не вживає алкоголь та не наражається на інші ризики ВІЛ-захворювання. Температура тіла становить 37,6°C, артеріальний тиск - 140/60 мм рт.ст., частота дихання - 28/хв., пульс - 96/хв. Результати обстеження легень та серцево-судинної системи в нормі. Неврологічне обстеження виявило атонічний параліч обох нижніх кінцівок. Глибокі сухожилкові рефлекс також відсутні з обох боків. Інші результати неврологічного обстеження, в тому числі ретельне обстеження черепних нервів, перебувають в межах норми. Якою буде наступна дія у веденні даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Забезпечити допоміжну штучну вентиляцію легень
- ☐ b. Надіслати культури крові на аналіз
- ☐ c. Дати ботулінічний антитоксин
- ☐ d. Провести негайний хімічний аналіз сироватки крові та виміряти рівень електроліту
- ☐ e. Почати давати антибіотики внутрішньовенно

Коментар

Правильна відповідь: Забезпечити допоміжну штучну вентиляцію легень

## Питання 127

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після транспортної аварії парамедики доставили до відділення невідкладної медичної допомоги 40-річну жінку, білу. Пацієнтка - водій, була пристебнута ременем безпеки. В її автомобіль врізався інший, з протилежного від неї боку, після чого машина потерпілої злетіла з дороги та врізалася в дерево на узбіччі. Коли медики прибули на місце аварії, жінка була притомною, в ясній свідомості, скаржилася на невеликий біль у грудях та задишку. У відділенні невідкладної медичної допомоги вона сказала, що протягом останнього тижня в неї спостерігався сухий кашель, проте заперечує наявність будь-яких супутніх симптомів: лихоманку, остуду, утруднене дихання чи відхаркування мокротиння. Не палить та не вживає алкогольних напоїв. Температура тіла - 36,7°C, артеріальний тиск - 125/80 мм рт.ст., частота дихання - 22/хв., пульс - 106/хв. Фізикальне обстеження виявило болючу ділянку над лівою стінкою грудної клітки, там де був розташований ремінь безпеки. Обстеження легень виявило зменшення дихальних шумів зліва. На початковій ЕКГ помітна синусова тахікардія. Рентгенограма грудної клітки показала двосторонню гомогенну тінь у верхніх зонах легень, більш виражену зліва. Який діагноз найімовірніший, виходячи з симптомів?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Контузія легень
- ☐ b. Випіт у плевральній порожнині
- ☐ c. Інфаркт легень
- ☐ d. набряк легень
- ☐ e. Пневмонія

Коментар

Правильна відповідь: Контузія легень

## Питання 128

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 22-х років, на 30 тижні вагітності доставлена в приймальне відділення зі скаргами на головний біль, нудоту, запаморочення з мерехтінням мушок перед очима, загальну слабкість. Загальний стан середньої важкості. Артеріальний тиск - 180/120 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Оберіть препарат для невідкладної допомоги:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Магnezії сульфат
- ☐ b. Еналаприл


- ☐ c. Верапаміл
- ☐ d. Фуросемід
- ☐ e. Допегіт

Коментар

Правильна відповідь: Магnezії сульфат

## Питання 129

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

76-річний чоловік поступив в клініку з порушенням сечовипускання. Добовий діурез - 200 мл. Артеріальний тиск - 180/90 мм рт.ст. Сечовина - 20 ммоль/л, креатинін - 360 мкмоль/л. Відносна щільність сечі - 1010, білок, кетонів тіла, еритроцити, лейкоцити не виявлені. На екскреторній урограмі - розширення ЧМС, множинні конкременти обох нирок. Який попередній діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інтерстиційний нефрит
- ☐ b. Обструктивна уропатія. Гостра затримка сечі
- ☐ c. Хронічна неспецифічна ниркова недостатність
- ☐ d. Гострий тубулярний некроз
- ☐ e. Гострий гломерулонефрит

Коментар

Правильна відповідь: Обструктивна уропатія. Гостра затримка сечі

## Питання 130

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 48-ми років скаржиться на переймоподібний біль унизу живота з рясними виділеннями із статевих шляхів. Хворою себе почуває протягом 5 років, коли почались рясні місячні зі згортками крові, біль унизу живота. Вірогідні причини КРІМ: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вагітність, що переривається
- ☐ b. Поліп порожнини матки

- ☐ c. Дисфункціональна маткова кровотеча
- ☐ d. Міома матки
- ☐ e. Поліпоз ендометрію


Коментар

Правильна відповідь: Вагітність, що переривається

### Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 70-ти років отримав травму на вулиці. Відчув різкий біль в проксимальному відділі лівого плеча. Вкажіть оптимальний метод транспортної іммобілізації:  
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вкласти хворого на носі
- ☐ b. Еластична пов'язка
- ☐ c. Іммобілізація плеча драбинчатою шиною
- ☐ d. Іммобілізація плеча шиною Дітеріхса
- ☐ e. Фіксація руки до тулуба


Коментар

Правильна відповідь: Іммобілізація плеча драбинчатою шиною

### Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Мати привела до відділення невідкладної медичної допомоги 5-річного хлопчика зі скаргами на дещо підвищену температуру та кашель, що тривають вже 3 дні. Протягом останнього тижня її син був менш активним, у нього одразу виникала задишка, щойно він починав ходити чи бігати. Дитина має ВІЛ та проходить антиретровірусну терапію. 4 місяці тому кількість лімфоцитів CD4 становила 300 клітин на мм3. Фізикальне обстеження: температура тіла - 38,3oC, пульс - 120/хв., частота дихання - 28/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 94% у 2-х літрах кисню. Обстеження легенів виявило двосторонні розсіяні хрипи та свист. На оглядовій рентгенограмі органів грудної клітки з обох боків помітні дифузні тіні, що нагадують матове скло. Що є найдоцільнішим підходом до лікування даного пацієнта?  
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пентамідин внутрішньовенно
- ☐ b. Атовакуон перорально
- ☐ c. Пентамідин в аерозолі
- ☐ d. Триметрексат внутрішньовенно
- ☐ e. Триметоприм-сульфаметоксазол внутрішньовенно


Коментар

Правильна відповідь: Триметоприм-сульфаметоксазол внутрішньовенно

### Питання 133

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 28-ми років доставлена до лікарні в непритомному стані. Зі слів супроводжуючих, у хворої в анамнезі двобічна адреналектомія з приводу хвороби Іценко-Кушинга. Об'єктивно: ціаноз слизових, гіперпігментація, клонічні судоми, загальмованість, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., температура тіла - 34,5°C, тони серця глухі, при пальпації живота напруження передньої черевної стінки. Які невідкладні засоби лікарської допомоги слід використати першочергово? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення інсуліну
- ☐ b. Призначення панангіну
- ☐ c. Внутрішньовенне введення електролітів
- ☐ d. Введення гідрокортизону сукцинату
- ☐ e. Введення 40% розчину глюкози


Коментар

Правильна відповідь: Введення гідрокортизону сукцинату

### Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 35-ти років після частого проносу протягом доби відзначається сухість язика та слизових, зниження тургору шкіри, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/55 мм рт.ст., частота дихання - 26/хв. Що потрібно зробити першочергово? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести фізіологічний розчин натрію хлориду разом з електролітами
- ☐ b. Ввести 5% розчин глюкози внутрішньовенно
- ☐ c. Ввести розчин натрію хлориду 0,9% внутрішньовенно
- ☐ d. Дати ентеросорбенти
- ☐ e. Промити шлунок


Коментар

Правильна відповідь: Ввести фізіологічний розчин натрію хлориду разом з електролітами

### Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Мати привела до відділення невідкладної медичної допомоги 7-річного хлопчика, тому що його ліве око "почервоніло та розпухло". Хлопчик скаржився на біль у оці протягом останніх двох днів; цього дня біль посилювався. У правому оці симптомів не спостерігається. В анамнезі: хронічний синусит. У матері хлопчика було діагностовано тромбоз глибоких вен на лівій нозі після нещодавнього трансатлантичного перельоту. Температура тіла дитини - 39,2°C, артеріальний тиск - 102/70 мм рт.ст., пульс - 94/хв., частота дихання - 18/хв. Об'єктивно: невеликий проптоз та офтальмоплегія лівого ока. Повіки еритематозні, болючі та набряклі; кон'юнктива гіперемована. Хлопчик скаржиться на біль під час рухів ока. Гострота зору та реакція зіниць в нормі з обох боків. З носа виділяється слиз із гноєм; носова раковина набрякла та еритематозна. Чутливість обличчя неушкоджена. Результати лабораторних досліджень наступні: гемоглобін - 154 г/л, лейкоцити - 15 • 10<sup>9</sup>/л, тромбоцити - 246 • 10<sup>9</sup>/л. Комп'ютерна томографія виявила запалення зовнішніх очних м'язів, жирові відкладення, невелике переднє зміщення очного яблука. Який захід є найдоцільнішим у веденні даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Антибіотики внутрішньовенно у відділенні стаціонару
- ☐ b. Венографія мозку за допомогою магнітно-резонансної томографії
- ☐ c. Гістопатологія з культурою тканин синусу
- ☐ d. Антибіотики перорально в ході амбулаторного лікування, через 2 дні обстеження
- ☐ e. Негайна аспіраційна біопсія очної ямки

Коментар


Правильна відповідь: Антибіотики внутрішньовенно у відділенні стаціонару

### Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00





Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 15-ти років госпіталізована зі скаргами на блювання "кавовою гущею", жовтушність шкіри, носові кровотечі, лихоманку. Об'єктивно: дихання уповільнене, шкіра іктерична, частота серцевих скорочень - 110/хв., артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. В біохімічному аналізі крові: АлАТ- 2,2 мкмоль/год•л (132 Од/л); АсАТ-3,0 мкмоль/год•л (180 Од/л); загальний білірубін - 160 мкмоль/л, протромбіновий індекс - 30%, фібриноген - 1,1 г/л. Із анамнезу: дитина страждає на хворобу Вільсона-Коновалова. Яке ускладнення виникло у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ б. Гостра ниркова недостатність
- ☐ в. Гостра наднирникова недостатність
- ☐ г. Гемолітичний криз
- ☐ д. Гостра печінкова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

### Питання 137

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 5-ти місяців, що хворіє впродовж тижня, за останню добу різко погіршився стан. Об'єктивно: загальмований, пастозність шкірних покривів рівномірно розповсюджена, набряки на обличчі та нижніх кінцівках, шкіра та видимі слизові оболонки сухі, велике тім'ячко запале, температура тіла - 37,5оС, частота серцевих скорочень - 154/хв., тони серця глухі, живіт збільшений, добовий діурез - 45 мл. Найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гемолітико-уремічний синдром
- ☐ б. Спадковий фосфат-діабет
- ☐ в. Хронічна ниркова недостатність
- ☐ г. Гостра ниркова недостатність
- ☐ д. Гостра наднирникова недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Гостра ниркова недостатність

### Питання 138

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 25-ти років відчула себе погано в приміщенні аптеки. Стоїть, спираючись на підвіконня з фіксованим плечовим поясом. Об'єктивно: обличчя одутловате, вдих короткий, видих подовжений, частота дихання - 12/хв., частота серцевих скорочень - 100/хв., артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст., над легеньми при перкусії коробковий відтінок перкуторного звуку. При аускультатії - дихання везикулярне, жорстке, сухі, свистячі хрипи, більше на видиху. С<sub>ор</sub> - акцент II тону над легеневою артерією. Живіт без особливостей. Попередній діагноз:  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ б. ХОЗЛ
- ☐ в. Бронхіальна астма
- ☐ г. Гострий ларинготрахеїт
- ☐ е. Трахеобронхіальна дискінезія

Коментар

Правильна відповідь: Бронхіальна астма

### Питання 139

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловікові близько 60-ти років. Стрибав у воду з причалу. Стан після втоплення. На березі йому розпочинають серцево-легеневу реанімацію. Які особливості техніки реанімації у даному випадку?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Штучна вентиляція легень проводиться подвійним дихальним об'ємом
- ☐ б. Непрямий масаж серця розпочинають раніше, ніж штучну вентиляцію легень
- ☐ в. Завжди виконують прийом Геймліха
- ☐ г. Не виконують виведення нижньої щелепи
- ☐ е. Не виконують закидання голови

Коментар

Правильна відповідь: Не виконують закидання голови

### Питання 140

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Підлітку 16-ти років з приводу загострення хронічного риносинуситу було призначено хлорофіліпт. Через 5 годин після першого прийому препарату пацієнт помітив сверблячі червоні плями на шкірі бокових поверхонь шиї. Із анамнезу відомо, що рік тому у пацієнта були такі ж висипання з тією ж самою локалізацією, і вони також були пов'язані з прийомом хлорофіліпту. Які препарати слід призначити хворому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Саліцилати
- ☐ b. Глюкокортикостероїди
- ☐ c. Імуномодулятори
- ☐ d. Антибіотики
- ☐ e. Антипіретики

Коментар

Правильна відповідь: Глюкокортикостероїди

#### Питання 141

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В новонародженого за шкалою Апгар визначається 3 бали: центральний ціаноз, дихання типу "гаспінг", м'язова гіпотонія, арефлексія, частота серцевих скорочень - 58/хв. Пологи термінові, маса тіла 3850 г, відмічалось дворазове туге обвиття пуповиною довкола шиї. Першочергово треба: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Почати непрямий масаж серця
- ☐ b. Почати штучну вентиляцію легень (ШВЛ) мішком Амбу і маскою та непрямий масаж серця
- ☐ c. Ввести адреналін
- ☐ d. Почати штучна вентиляція легень (ШВЛ) за методом спонтанного дихання з постійним позитивним тиском (СДППТ)
- ☐ e. Почати оксигенотерапію

Коментар

Правильна відповідь: Почати штучну вентиляцію легень (ШВЛ) мішком Амбу і маскою та непрямий масаж серця

## Питання 142

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 5-ти років на п'ятий день гострої кишкової інфекції доставлена в стаціонар у зв'язку з погіршенням загального стану. При надходженні свідомість відсутня, виражений ексікоз, гіпертермія, напади судом, афазія. Виявлені гіперглікемія - 50 ммоль/л, осмолярність плазми (360 мОсм/л), нормальний рівень кетонових тіл в крові, відсутність ацетону в сечі. Відомо, що з трьох років хворіє на цукровий діабет 1-го типу. З якого препарату треба починати невідкладну інфузійну терапію?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 0,45% розчин натрію хлориду
- ☐ b. 10% розчин натрію гідрокарбонату
- ☐ c. 4% розчин натрію гідрокарбонату
- ☐ d. 10% розчин глюкози
- ☐ e. 5% розчин глюкози

Коментар

Правильна відповідь: 0,45% розчин натрію хлориду

## Питання 143

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

45-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на раптове виникнення сильного головного болю, блювання та болю у ший. Він, плачучи, скрикує: "Здається моя голова ось-ось лусне!" Симптоми виникли вранці цього ж дня, коли він був у спортзалі. Пацієнт тривалий час вживав героїн і нещодавно завершив амбулаторну програму реабілітації від наркотиків, в ході якої він отримував метадон. В анамнезі життя гіпертонія. У сімейному анамнезі гіпертонія та ішемічна хвороба серця. Живе сам. Приймає амлодипін та еналаприл. Артеріальний тиск - 200/100 мм рт.ст., пульс - 110/хв., температура тіла - 37,8°C, частота дихання - 18/хв. Перебуває у збудженому стані, підвищене потовиділення. Ані травми голови, ані здуття шийних вен не спостерігається. Легені чисті, пульс регулярний, живіт м'який та безболісний, з гіперактивними кишковими шумами, але без ознак органомегалії. Що є оптимальним наступним кроком у веденні даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ангіографія мозку
- ☐ b. Хіміко-токсикологічний аналіз сечі

- ☐ c. Магнітно-резонансна томографія мозку
- ☐ d. Люмбальна пункція
- ☐ e. Комп'ютерна томографія голови


Коментар

Правильна відповідь: Комп'ютерна томографія голови

#### Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 30-ти років доставлена до лікарні машиною швидкої допомоги без свідомості. Зі слів рідних відомо, що більш ніж 5 років страждає на гіпотиреоз, лікувалася L-тироксिन, але останні 2 місяці ліків не приймала. Об'єктивно: обличчя одутле, шкіра суха, бліда, температура тіла знижена до 34,5°C, дихання рідке, тони серця глухі, частота серцевих скорочень - 40/хв., гіпотонія, анурія, позитивний симптом Бабінського. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпертиреоїдна кома
- ☐ b. Гіперосмолярна кома
- ☐ c. Гіпотиреоїдна кома
- ☐ d. Гіперлактацидемічна кома
- ☐ e. Гіпоглікемічна кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіпотиреоїдна кома

#### Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий доставлений у МедР з вогнища застосування хімічної зброї в засобах захисту. Відомо, що протигаз надяг через кілька хвилин після початку хімічної атаки. Ввести антидот не зумів. При огляді встановлено, що уражений знаходиться у комі, періодично спостерігаються загальні клоніко-тонічні судоми, через скло видно вкрите потом обличчя, міофібриляції м'язів обличчя і закритих повік. Частота дихальних рухів - 34/хв., на відстані чути свистячі хрипи. У ході проведення часткової санітарної обробки спостерігався черговий напад судом, при якому сталася зупинка дихання. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ураження ОР задушливої дії
- ☐ b. Початковий період типової форми отруєння чадним газом
- ☐ c. Інгаляційне ураження ОР нервово-паралітичної дії важкого ступеня
- ☐ d. Ураження ОР нервово-паралітичної дії, бронхоспастична форма
- ☐ e. Ураження ціанідами важкого ступеня


Коментар

Правильна відповідь: Інгаляційне ураження ОР нервово-паралітичної дії важкого ступеня

## Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 45-ти років, водій, в дорожньотранспортній пригоді відбулось лобове зіткнення. Свідомість ясна, амнезія, підшкірна емфізема на грудній клітці, клінічні ознаки перелому лівого стегна, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст., пульс - 132/хв., рентгенографія ОГК - множинні переломи ребер, розширення тіні середостіння, структури середостіння не диференціюються, гомогенне затінення лівого гемітораку. Вкажіть імовірне провідне пошкодження:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Поєднана травма. Розрив дуги аорти
- ☐ b. Поєднана травма. Крововтрата в тканини стегна
- ☐ c. Поєднана травма. Перелом стегна, жирова емболія
- ☐ d. Поєднана травма. Лівобічний тотальний пневмоторакс
- ☐ e. Поєднана травма. Посттравматична пневмонія


Коментар

Правильна відповідь: Поєднана травма. Перелом стегна, жирова емболія

## Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До Вас звернулись батьки з дитиною 8-ми років, покусаною вуличним собакою, який після нападу зник. Рани розташовані у ділянці передпліччя та кисті. Оберіть оптимальний комплекс лікувальних заходів?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком
- ☐ b. Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком, призначити антибіотики та якнайшвидше провести антирабічне щеплення
- ☐ c. Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком, та якнайшвидше провести антирабічне щеплення
- ☐ d. Якнайшвидше провести антирабічне щеплення
- ☐ e. Призначити антибіотики та якнайшвидше провести антирабічне щеплення


Коментар

Правильна відповідь: Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком, призначити антибіотики та якнайшвидше провести антирабічне щеплення

## Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 54-х років хворіє на цукровий діабет впродовж 8-ми років. Стан погіршився після харчового отруєння, що впродовж кількох діб супроводжувалося діареєю та блюванням. Без свідомості, шкіра суха, язик обкладений білим нашаруванням, сухий. Запах ацетону відсутній. Дихання поверхневе, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст. Глікемія - 44,5 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кетоацидотична кома
- ☐ b. Гіпоглікемічна кома
- ☐ c. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ d. Молочнокисла кома
- ☐ e. Гіперосмолярна кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

## Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час роботи в шахті чоловік 37-ми років пошкодив кабель високої напруги, та був уражений струменем. Об'єктивно: стан вкрай тяжкий, дихання - 9/хв., частота серцевих скорочень - 56/хв. Які лікувальні заходи треба негайно провести?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Штучна вентиляція легенів
- ☐ b. Введення дихальних аналептиків
- ☐ c. Електродефібриляція
- ☐ d. Введення атропіну сульфату
- ☐ e. Введення адреналіну гідрохлориду


Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легенів

## Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалого 36-ти років переведено до хірургічного відділення військового госпіталю через 4 доби лікування в районній лікарні. Діагноз: осколкове сліпе множинне поранення лівої кінцівки. У пацієнта підвищилась температура тіла, рана почервоніла, набрякла. Який вид хірургічної допомоги слід надати потерпілому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Відстрочена первинна хірургічна обробка рани
- ☐ b. Ампутація кінцівки
- ☐ c. Вторинна хірургічна обробка рани
- ☐ d. Пізня первинна хірургічна обробка рани
- ☐ e. Рання первинна хірургічна обробка рани


Коментар

Правильна відповідь: Вторинна хірургічна обробка рани

## Питання 151

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання



В приймальне відділення батьки доставили дитину 4-х років з раптовою втратою свідомості, з різкою блідістю шкіри та слизових оболонок. Реєструються окремі судомні вдихи, зіниці розширені. Пульс на променевій та сонній артерії не визначається. Вкажіть першочергові заходи:  
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Терміново запросити досвідченого лікаря для консультації
- ☐ b. Забезпечити доступ до центральної вени
- ☐ c. Реанімація за системою CAB (Circulation-Airways-Breathing)
- ☐ d. Опустити голову та підняти ноги хворого
- ☐ e. Терміново провести ЕКГ-дослідження


Коментар

Правильна відповідь: Реанімація за системою CAB (Circulation-Airways-Breathing)

## Питання 152

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 30-ти років доставлений до приймального покою після дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп'яніння. Наявна забійна рана у лобній ділянці. Артеріальний тиск - 60/20 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 120/хв., гемоглобін - 60 г/л. Яка найбільш імовірна причина анемії і гіпотензії у даного хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Черепно-мозкова травма
- ☐ b. Отруєння невідомою речовиною
- ☐ c. Наявність прихованого онкологічного захворювання
- ☐ d. Внутрішня кровотеча
- ☐ e. Алкогольне сп'яніння


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішня кровотеча

## Питання 153

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 3-х років з тетрадою Фалло раптово виник напад, дитина стала неспокійною, підсилилась задишка. Об'єктивно: різкий ціаноз, ослаблений II тон над легеневою артерією, грубий систолічний шум у третьому-четвертому міжребер'ї зліва, втрачає свідомість, з'являються судоми. Який стан виник у хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Колапс
- ☐ b. Пневмоторакс
- ☐ c. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ d. Задишково-ціанотичний криз
- ☐ e. набряк легень


Коментар

Правильна відповідь: Задишково-ціанотичний криз

## Питання 154

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 25-ти років, вагітність 32 тижні. Доставлена в коматозному стані з запахом ацетону. В анамнезі цукровий діабет впродовж 8-ми років. Серцебиття плода - 160/хв., пологової діяльності немає. Артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст., пульс - 72/хв. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Прееклампсія
- ☐ b. Гіперглікемічна кома
- ☐ c. Екламптична кома
- ☐ d. Гіпоглікемічна кома
- ☐ e. Сепсис


Коментар

Правильна відповідь: Гіперглікемічна кома

## Питання 155

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець 34-х років скаржиться на водянистий пронос до 10-13 разів на добу, багаторазове блювання, сухість у роті, загальну слабкість. Захворів гостро. Шкіра суха, акроціаноз, тургор шкіри знижений, очні яблука запалі, периферичні вени не контуруються, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 80/55 мм рт.ст. У крові: еритроцити - 4, 54 • 10<sup>12</sup>/л, Hb- 152 г/л, лейкоцити - 10, 7•10<sup>9</sup>/л, швидкість зсідання еритроцитів - 18 мм/год, Ht- 64%; глюкоза - 4,1 ммоль/л, К - 2,8 ммоль/л, Сl - 80 ммоль/л. Який невідкладний стан розвинувся у пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра ниркова недостатність
- ☐ б. Геморагічний шок
- ☐ в. Гіповолемічний шок
- ☐ г. Гіпоглікемічна кома
- ☐ д. Ортостатичний колапс


Коментар

Правильна відповідь: Гіповолемічний шок

## Питання 156

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 31-го року, госпіталізований з приводу кетоацидотичної коми. Проведені невідкладні заходи. Однак, незважаючи на покращення лабораторних показників (глікемія - 8,6 ммоль/л, при надходженні - 32,0 ммоль/л, К<sup>+</sup> - 3,6 ммоль/л, при надходженні - 2,8 ммоль/л), хворий перебуває в стані глибокої коми. Яка найбільш імовірна причина непритомного стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоз мозкових судин
- ☐ б. Крововилив у головний мозок
- ☐ в. Гіпоглікемічний стан
- ☐ г. Гіпокаліємія
- ☐ д. набряк мозку


Коментар

Правильна відповідь: набряк мозку

## Питання 157

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 34-х років 10 років тому перенесла захворювання, яке супроводжувалось набряками обличчя, змінами в сечі, підвищенням тиску. Скарги на затримку сечі, різкі болі в попереку, виражену загальну слабкість, сухість у роті. Артеріальний тиск - 180/110 мм рт.ст. Добовий діурез - 560 мл, добова протеїнурія > 5 г. У сечі: еритроцити - 5-7 в п/з, гіалінові циліндри - 8-10 в п/з. Альбумін плазми - 20 г/л, глобуліни - 65 г/л, ліпіди - 9,5 г/л, креатинін - 98 мкмоль/л. Яке ускладнення виникло у хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий пієлонефрит
- ☐ б. Ниркова недостатність
- ☐ в. Нефротична криза
- ☐ г. Гіпертензивна криза
- ☐ е. Гостра серцева недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Нефротична криза

## Питання 158

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 10-ти місяців з лімфатико-гіпопластичною аномалією конституції госпіталізована у клініку з приводу гострої двобічної вогнищевої пневмонії. Стан дитини раптово погіршився: з'явилася різка слабкість, млявість, загальмованість. Об'єктивно: "мармуровий" малюнок шкірних покривів, гіпергідроз, м'язова гіпотонія, пульс слабкого наповнення, тахікардія, зниження артеріального тиску. Олігурія. Який невідкладний стан розвинувся у хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпоглікемічна кома
- ☐ б. Гостра дихальна недостатність
- ☐ в. Кетоацидотична кома
- ☐ г. Гостра ниркова недостатність
- ☐ е. Гостра надниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гостра надниркова недостатність

## Питання 159

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Водій, якого доставлено у приймальне відділення після автодорожньої катастрофи, у рентгенологічному кабінеті знепритомнів. Шкіра обличчя та шиї ціанотична, серцеві тони не вислуховуються, артеріальний тиск не визначається, підшкірні вени шиї розширені. На оглядовій рентгенограмі ОГК легеневі поля не змінені, серцева тінь має кулясту форму. Вкажіть найбільш імовірну причину зупинки кровообігу:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гемомедіастинум
- ☐ b. Тампонадасерця
- ☐ c. Напружена емфізема середостіння
- ☐ d. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ e. Геморагічний шок


Коментар

Правильна відповідь: Тампонадасерця

## Питання 160

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини з масою тіла 4200 г, довжиною 58 см, яка народилася від III вагітності, II пологів в терміні гестації 42 тижні, відсутня функція зовнішнього дихання. При народженні в амніотичній рідині відмічені частки мезонію. Не виключена аспірація новонародженим меконіальних навколоплідних вод. Вкажіть першу дію у послідовності заходів первинної реанімації новонародженого:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. тучний масаж серця
- ☐ b. Киснева допомога
- ☐ c. Санація верхніх дихальних шляхів
- ☐ d. Тактильна стимуляція
- ☐ e. Корекція гіповолемії


Коментар

Правильна відповідь: Санація верхніх дихальних шляхів

## Питання 161

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До інфекційного стаціонару надійшов хворий 33-х років в перший день хвороби зі скаргами на загальну слабкість, бурчання в животі, сухість у роті. Відпочивав на одному з відкритих водоймищ. Захворів гостро: діарея з імперативними позивами без болю в животі. Випорожнення мають вигляд "рисового відвару" 8 разів на добу, блювання відсутнє. Стан хворого задовільний. Температура тіла - 35,8оС, частота серцевих скорочень - 88/хв., артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст. Виникнення якого невідкладного стану на сам перед можна прогнозувати у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ b. Гостра печінкова недостатність
- ☐ c. Анафілактичний шок
- ☐ d. набряк легень
- ☐ e. Гіповолемічний шок


Коментар

Правильна відповідь: Гіповолемічний шок

## Питання 162

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 10-ти років впала на катку. Скаржиться на болі у середній третині правого передпліччя у спокої і посилення при намаганні руху. Об'єктивно: кутова деформація передпліччя з кутом, відкритим до тилу. Який об'єм першої медичної допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Фіксація імпровізованою шиною променевозап'ясткового і ліктьового суглобів
- ☐ b. Відкрита репозиція, фіксація, транспортування
- ☐ c. Закрита репозиція, фіксація стрижневим апаратом
- ☐ d. Фіксація гіпсовою пов'язкою, транспортування
- ☐ e. Фіксація косинковою пов'язкою

Коментар

Правильна відповідь: Фіксація імпровізованою шиною променевозап'ясткового і ліктьового суглобів

## Питання 163

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

14-річний хлопчик надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги через півгодини після того, як він зазнав удару ногою в пах під час гри в футбол. Скаржиться на сильний біль. Гематурії чи інших симптомів, пов'язаних з сечовидільною системою, не спостерігається. Об'єктивно: помірний набряк та гематома мошонки справа. Немає відкритих ран чи здертої шкіри. Обстеження живота, пенісу, стегна та прямої кишки без змін. Вимірювальний зонд показує відсутність крові у сечі. Пацієнту вводять внутрішньовенно морфін, щоб втамувати біль. Що слід зробити далі в процесі ведення даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Хірургічне дослідження
- ☐ b. Ультразвукове дослідження
- ☐ c. Аспіраційна біопсія
- ☐ d. Ретроградна уретрографія
- ☐ e. Анальгетики перорально та амбулаторне спостереження

Коментар

Правильна відповідь: Ультразвукове дослідження

## Питання 164

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 10-ти років знаходиться на лікуванні з приводу бронхіальної астми. Вранці хлопчик встав з ліжка і раптово з'явилися загальна слабкість, запаморочення, блідість шкіри, холодний піт, шум у вухах, хворий вправ. Об'єктивно: зіниці розширені, тони серця різко ослаблені, пульс ниткоподібний, частота серцевих скорочень - 65/хв., артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ b. Бактеріальний шок
- ☐ c. Серцева недостатність
- ☐ d. Непритомність
- ☐ e. Кардіогенний шок

Коментар

Правильна відповідь: Непритомність

## Питання 165

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років скаржиться на погіршення зору, головний біль, загальну слабкість, відчуття нестачі повітря. Ці явища виникли через 1,5-2 години після роботи на городі з інсектицидними препаратами. Об'єктивно: ціаноз слизових, фібрилярні посмикування окремих м'язів обличчя. В легенях - жорстке дихання, незвучні сухі свистячі хрипи. Відмічається брадикардія, зниження артеріального тиску до 90/60 мм рт.ст. З метою антидотної терапії даному хворому рекомендується призначити:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 5% розчину унітіолу дом'язово
- ☐ б. 10% розчину етилового спирту на 5% розчині глюкози довенно
- ☐ в. 0,1% розчину атропіну підшкірно
- ☐ г. 30% розчину етилового спирту всередину
- ☐ д. 3% розчину нітриту натрію довенно

Коментар

Правильна відповідь: 0,1% розчину атропіну підшкірно

## Питання 166

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 28-ми років, з Анголи, госпіталізований в лікарню із скаргами на сильний кашель та задуху, проноси, кровохаркання. Протягом року відмічав переміжну гарячку, значну пітливість з профузними нічними потами, різку загальну слабкість. Місяць тому появився тривалий пронос, у калі є домішки слизу і крові. Об'єктивно: стан тяжкий, температура тіла - 40°C, кахексія. На лівому оці виявлена пухлина на рогівці. Шкіра та слизові оболонки бліді. Який діагноз найбільш імовірний у цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Криптоспоридіоз
- ☐ б. СНІД, генералізована форма
- ☐ в. Пре-СНІД
- ☐ г. Сепсис
- ☐ д. ВІЛ-інфекція

Коментар




Правильна відповідь: СНІД, генералізована форма

### Питання 167

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 33-х років звернувся до лікаря зі скаргами на біль у попереку. В анамнезі: сечокам'яна хвороба. При проведенні екскреторної урографії розвинувся анафілактичний шок. Об'єктивно: шкіра бліда, пульс - 55/хв., артеріальний тиск - 100/50 мм рт.ст. Перші дії лікаря: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Введення адреналіну
- ☐ б. Лікування в сімейній амбулаторії
- ☐ с. Введення сорбентів
- ☐ d. Припинити дослідження
- ☐ е. Введення глюкокортикоїдів


Коментар

Правильна відповідь: Введення адреналіну

### Питання 168

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Поліція доставила чоловіка 46-ти років до відділення невідкладної медичної допомоги. Хворого було знайдено у непритомному стані на лавці у парку поблизу. На його губах та одязі знайдено сліди блювотних мас. У диханні відчутний запах алкоголю. Температура тіла - 36,0°C, артеріальний тиск - 106/75 мм рт.ст., пульс - 110/хв., частота дихання - 12/хв. Відчуває надзвичайну сонливість, дезорієнтований, на запитання не реагує. Виглядає неохайно, кінцівки холодні. Детальніше обстеження виявило у пацієнта павукоподібні ангіоми та пальмарну еритему. Звуки дихання послаблені біля основи правої легені. Результати обстеження серцево-судинної системи в межах норми. Живіт здутий через накопичення в ньому рідини. Під час перебування у відділенні невідкладної допомоги у пацієнта відбулося одноразове блювання з великою кількістю блювотних мас, які мали помітні домішки яскраво-червоної крові. Що буде найдоцільнішим наступним кроком під час ведення даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ввести антибіотики та бета-блокатор внутрішньовенно
- ☐ б. Негайна ендоскопія верхнього відділу шлунково-кишкового тракту

- ☐ c. Ендотрахеальна інтубація
- ☐ d. Діагностичний парацентез
- ☐ e. Ввести назогастральний зонд та виконати промивання


Коментар

Правильна відповідь: Ендотрахеальна інтубація

## Питання 169

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Наркоман, який зловживає "ширкою", не зміг "дістати чергову дозу". Скаржиться на болі в серці, сильні болі в суглобах рук і ніг - "ломку", сухість в роті, "кошмари", "тремтіння всього тіла". Агресивний, злий, напружений. Настрій пригнічений - заявляє, що "покінчить з собою". Визначте психопатологічний синдром:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дисфоричний
- ☐ b. Депресивний
- ☐ c. Абстинентний
- ☐ d. Психопатичний
- ☐ e. Іпохондричний


Коментар

Правильна відповідь: Абстинентний

## Питання 170

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

28-річна жінка скаржиться на переймоподібні болі в нижніх відділах живота, кров'яністі виділення з піхви. Хвора бліда, пульс - 78/хв., артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст., температура - 36,6°C. При бімануальному дослідженні: матка збільшена до 6-7 тижнів вагітності, болюча, плідне яйце в цервікальному каналі, виділення з піхви кров'яністі. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Загроза викидня
- ☐ b. Неповний аборт

- ☐ c. Апоплексія яєчника
- ☐ d. Аборт в ходу
- ☐ e. Позаматкова вагітність


Коментар

Правильна відповідь: Аборт в ходу

### Питання 171

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 64-х років, що знаходиться в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. При огляді діагностовані зупинка серцевої діяльності і подиху, почато легенево-серцеву реанімацію. На ЕКГ шлуночкова тахікардія. Далі необхідно:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Увести внутрішньосерцево атропін
- ☐ b. Увести внутрішньовенно магнія сульфат
- ☐ c. Дефібриляція
- ☐ d. Увести внутрішньосерцево адреналін
- ☐ e. Увести внутрішньовенно кальція хлорид


Коментар

Правильна відповідь: Дефібриляція

### Питання 172

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна жінка (40 тижнів) в кінці 1-го періоду пологів переведена на стіл для пологів. Після того, як вона лягла в горизонтальне положення на спину, обличчя її зблідло, вона вкрилася холодним потом і знепритомніла. Артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст., пульс - 132/хв. Запідозрено синдром стиснення нижньої порожнистої вени. Яка першочергова допомога повинна бути надана для стабілізації стану жінки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Призначити серцеві глікозиди
- ☐ b. Налагодити довенну інфузійну терапію

- ☐ c. Обернути жінку на правий бік
- ☐ d. Застосувати симпатоміметики
- ☐ e. Обернути жінку на лівий бік


Коментар

Правильна відповідь: Обернути жінку на лівий бік

### Питання 173

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 20-ти років після вакцинації виникли були серозно-геморагічного та гнійного змісту, тривала лихоманка, відторгнення нігтів, головний біль, тахікардія, низький вольтаж зубців на ЕКГ. Симптом Нікольського позитивний. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостра кропивниця
- ☐ b. Пемфігойд
- ☐ c. Алергічний дерматит
- ☐ d. Сироваткова хвороба
- ☐ e. Синдром Стівенса-Джонсона (токсичний епідермальний некроліз)


Коментар

Правильна відповідь: Синдром Стівенса-Джонсона (токсичний епідермальний некроліз)

### Питання 174

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 45-ти років, постраждалого під час дорожньо-транспортної пригоди, лікар швидкої медичної допомоги діагностував відкритий перелом кісток правої гомілки з розчавлюванням м'яких тканин і кровотечею. Які дії лікаря в плані надання першої медичної допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Виконати ПХО рани, накласти апарат зовнішньої фіксації
- ☐ b. Накласти джгут, асептичну пов'язку, іммобілізувати кінцівку
- ☐ c. Іммобілізувати кінцівку, виконати репозицію

- ☐ d. Накласти джгут, виконати ПХО рани
- ☐ e. Іммобілізувати кінцівку, обробити рану, зіставити кісткові уламки


Коментар

Правильна відповідь: Накласти джгут, асептичну пов'язку, іммобілізувати кінцівку

## Питання 175

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 45-ти років, на 1 добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зоба виникло психомоторне збудження, профузна пітливість, тремор рук, гіперемія обличчя, гіпертермія - 40°C, частота серцевих скорочень - 140/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпотиреоз
- ☐ b. Тиреотоксичний криз тяжкого ступеня
- ☐ c. Пневмоторакс
- ☐ d. Гострий гіпаратиреоз
- ☐ e. Гострий інфаркт міокарда


Коментар

Правильна відповідь: Тиреотоксичний криз тяжкого ступеня

## Питання 176

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 2-х років, госпіталізованої до інфекційного відділення з гострим ентероколітом, розвинулося збудження, неспокій, частота серцевих скорочень - 120/хв., частота дихання - 34/хв., посилились загальна слабкість, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., діурез знизився до 15 мл/год. Чим ускладнився перебіг захворювання?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кардіогенний шок
- ☐ b. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ c. Нейротоксикоз

- ☐ d. Гостра наднирникова недостатність
- ☐ e. Гостра ниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Інфекційно-токсичний шок

### Питання 177

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 39-ти років викликав швидку медичну допомогу на 2-й день хвороби. Хворий скаржився на озноб, підвищення температури тіла до 40°C, міалгію, головний біль, біль у правій пахвинній ділянці, спрагу. Три дні назад повернувся з Азії. Об'єктивно: стан важкий, температура тіла - 40°C, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс - 134/хв. У свідомості, але на запитання відповідає мляво. Обличчя гіперемоване. Тони серця ослаблені, перкуторно - розширення меж серця. Печінка, селезінка не збільшені. У пахвинній ділянці справа виявлено вузол діаметром до 5 см, різко болючий під час пальпації, без чітких меж, шкіра над ним гіперемована з ціанотичним відтінком, гаряча на дотик. Яка тактика лікаря швидкої допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Госпіталізація в хірургічне відділення
- ☐ b. Госпіталізація в інфекційне відділення
- ☐ c. Госпіталізація в кардіологічне відділення
- ☐ d. Амбулаторне лікування під наглядом сімейного лікаря
- ☐ e. Госпіталізація в терапевтичне відділення


Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація в інфекційне відділення

### Питання 178

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого констатовано клінічну смерть за наступними ознаками: відсутність пульсу на центральних артеріях та самостійного дихання, максимальне розширення зіниць, відсутність свідомості, блідістьшкірних покривів, атонія, арефлексія, адинамія. Негайно розпочато реанімаційні заходи: відновлення прохідності дихальних шляхів, штучна вентиляція легень (ШВЛ), непрямий

масаж серця (НМС). Під час проведення непрямого масажу серця (НМС) отримано ускладнення: перелом ребер. Які подальші дії реаніматора?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести преднізолон
- ☐ b. Ввести наркотичні анальгетики
- ☐ c. Забезпечити іммобілізацію
- ☐ d. Припинити реанімаційні заходи
- ☐ e. Продовжити реанімаційні заходи


Коментар

Правильна відповідь: Продовжити реанімаційні заходи

### Питання 179

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 24-х років лікується в відділенні інтенсивної терапії з приводу синдрому тривалого стиснення, гострої ниркової недостатності. При лабораторному обстеженні: сечовина - 28,4 ммоль/л; креатинін - 820 мкмоль/л; К - 8,4 ммоль/л; гемоглобін - 76 г/л; гематокрит - 0,26 л/л; еритроцити -  $2,4 \cdot 10^{12}$ /л. Яке ускладнення може безпосередньо загрожувати життю хворого? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Анемія
- ☐ b. Гемічна гіпоксія
- ☐ c. ДВЗ-синдром
- ☐ d. Гіперкаліємічна зупинка серця
- ☐ e. Респіраторний дистрес-синдром


Коментар

Правильна відповідь: Гіперкаліємічна зупинка серця

### Питання 180

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнтки 8 місяців тому відбулися II термінові пологи, без ускладнень. З метою контрацепції використовує метод лактаційної аменореї. Менструацій після пологів не було. Останні дні зауважила збільшення об'єму живота, відчуття "переливів" у череві. Який імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Пухлина молочної залози з метастазами у черевну порожнину
- ☐ б. Повторна маткова вагітність
- ☐ в. Пухлина черевної порожнини
- ☐ г. Асцит нез'ясованої етіології
- ☐ д. Позаматкова вагітність


Коментар

Правильна відповідь: Повторна маткова вагітність

## Питання 181

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 53-х років скаржаться на біль у ділянці прямої кишки при дефекації, яскраво-червону кров на калових масах, яка з'являється на початку акту дефекації, закрепи. Загальний стан задовільний. Тони серця ритмічні, частота серцевих скорочень - 74/хв. Живіт м'який, не болючий. Яке інструментальне дослідження найбільш інформативне для встановлення остаточного діагнозу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ректоманоскопія
- ☐ б. Копрограма
- ☐ в. Загальний аналіз крові
- ☐ г. Комп'ютерна томографія органів малого тазу
- ☐ д. Пальцеве дослідження прямої кишки


Коментар

Правильна відповідь: Ректоманоскопія

## Питання 182

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання



Хворий після отримання електротравми доставлений до приймального відділення. У свідомості, шкірні покриви бліді, дихання адекватне самостійне. Артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст., тахікардія, пульс слабого наповнення. Яке дослідження у першу чергу необхідно провести такому хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Загальний аналіз сечі
- ☐ b. Визначити рівень вільного міоглобіну у сироватці крові
- ☐ c. Електрокардіографія
- ☐ d. Визначити рівень калію у сироватці крові
- ☐ e. Рентгенографія легень


Коментар

Правильна відповідь: Електрокардіографія

### Питання 183

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому 44-х років після падіння з висоти 3-х поверхового будинку надається перша лікарняна допомога лікарем швидкої медичної допомоги. Для попередження розвитку шоку проводиться знеболювання пацієнта. Яким доступом слід вводити знеболюючий препарат?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Внутрішньовенно
- ☐ b. Ендотрахеально
- ☐ c. Внутрішньом'язово
- ☐ d. Внутрішньоартеріально
- ☐ e. Підшкірно


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенно

### Питання 184

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 54-х років через 30 хвилин після правобічної пульмонектомії з'явилась тахікардія - 140/хв. Пульс слабкого наповнення. Артеріальний тиск зменшився до 60/20 мм рт.ст. При перкусії правої половини грудної клітки визначалось притуплення в пологих місцях грудної клітки справа. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Правобічний гемоторакс
- ☐ b. Правобічний гідроторакс
- ☐ c. Кардіопульмональний шок
- ☐ d. Правобічний гемопневмоторакс
- ☐ e. Інфаркт міокарда


Коментар

Правильна відповідь: Правобічний гемоторакс

### Питання 185

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До стаціонару доставлено хворого 42-х років, зшлунковою кровотечею. З анамнезу відомо, що страждає на виразкову хворобу шлунка протягом 10 років. У крові: гемоглобін - 56 г/л. Вирішено провести гемотрансфузію. При визначенні групи крові відбулася аглютинація еритроцитів зі стандартною сироваткою I(0), II(A), III(B) груп крові. Яку контрольну пробу слід провести для підтвердження наявності у хворого 1-ої групи крові?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. З антирезусною сироваткою
- ☐ b. З цоліклонами
- ☐ c. З 0,9%NaCl
- ☐ d. Індивідуальна проба із плазмою реципієнта
- ☐ e. З сироваткою IV (AB) групи крові


Коментар

Правильна відповідь: З сироваткою IV (AB) групи крові

### Питання 186

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий, якого ургентно доставлено до приймального відділення, раптово зблід і втратив свідомість. Пульс на магістральних артеріях відсутній. На екрані кардіомонітора зареєстрована пряма лінія. Яка найбільш вірогідна причина патологічного стану, що розвинувся у хворого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Тріпотіння передсердь
- ☐ b. Фібриляція шлуночків
- ☐ c. Миготлива аритмія
- ☐ d. Електро механічна дисоціація
- ☐ e. Асистолія

Коментар

Правильна відповідь: Асистолія

### Питання 187

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 20-ти років впав з велосипеда. Під час огляду хворого виявлено припухлість, деформацію, патологічну рухомість, крепітацію кісткових уламків в середній третині правої ключиці. Хворий відчуває сильні болі по ходу правої руки, не може активно рухати пальцями правої кисті. Яку тактику слід використати лікарю в даному випадку? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Зробити спробу вправлення перелому
- ☐ b. Викликати травматолога додому
- ☐ c. Терміново відправити хворого до травматологічного відділення
- ☐ d. На місце перелому накласти пов'язку з гелем "Олфен"
- ☐ e. Терміново направити в поліклініку за місцем проживання

Коментар

Правильна відповідь: Терміново відправити хворого до травматологічного відділення

### Питання 188

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 53-х років, звернувся до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на нудоту, що виникла раптово, блювання та сильний біль у черевній порожнині в ділянці епігастрію, який іррадіює у спину. Пацієнт заперечує наявність у нього закрепу, діареї чи випорожнень чорного кольору. Стан пацієнта обтяжений гіпертонією, гіперхолестеринемією та гастроезофагеальною рефлюксною хворобою. Хворий стверджує, що не палить та не вживає алкоголю чи наркотичних речовин. Температура тіла - 37,8оС, артеріальний тиск - 130/80 мм рт.ст., пульс - 118/хв., частота дихання - 20/хв. Результати досліджень крові: гемоглобін - 135 г/л, тромбоцити - 180 • 109/л, лейкоцити - 12, 5 • 109/л, сегментоядерні нейтрофіли - 79%, паличкоядерні нейтрофіли - 1%, лімфоцити - 20%, лужна фосфатаза - 150 Од/л, амілаза - 355 Од/л, ліпаза - 523 Од/л (норма в межах 1-160, Од/л), Який препарат найімовірніше спричинив появу таких симптомів у пацієнта? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Раміприл
- ☐ b. Амлодипін
- ☐ c. Тіазид
- ☐ d. Празозин
- ☐ e. Метопролол


Коментар

Правильна відповідь: Тіазид

## Питання 189

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 37-ми років було поранено колючим предметом в плече. Об'єктивно: на медіальній поверхні у верхній третині правого плеча є глибока різана рана з пульсуючою струйною кровотечею. Пульсація на a. radialis відсутня. Визначте обсяг надання першої медичної допомоги: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Накладання стискаючої пов'язки
- ☐ b. Накладання джгута дистальніше рівня кровотечі
- ☐ c. Введення гемостатичних препаратів
- ☐ d. Холод на місце кровотечі
- ☐ e. Накладання джгута проксимальніше рівня кровотечі


Коментар

Правильна відповідь: Накладання джгута проксимальніше рівня кровотечі

## Питання 190

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 65-ти років доставили у кардіологічне відділення у тяжкому стані зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, задишку спокою, періодичні епізоди непритомності, що протікають із судомним синдромом. Об'єктивно: частота дихання - 23/хв., у легенях везикулярне дихання, у нижніх відділах вологі дрібнопухирчасті хрипи, серцева діяльність ритмічна, акцент II тону в другому міжребер'ї справа, частота серцевих скорочень - 30/хв., артеріальний тиск - 170/72 мм рт.ст. Під час обстеження на ЕКГ: атріовентрикулярна дисоціація. Яка невідкладна допомога показана пацієнтові?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Електрична зовнішня кардіоверсія
- ☐ б. імчасова електрокардіостимуляція
- ☐ в. Внутрішньовенне введення дигоксину
- ☐ г. Внутрішньовенне введення лазиксу
- ☐ д. Внутрішньовенна інфузія нітрогліцерину


Коментар

Правильна відповідь: імчасова електрокардіостимуляція

## Питання 191

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого протягом декількох годин спостерігаються часті судомні напади, впродовж яких він знаходиться в одному положенні, погляд спрямований в одну точку, свідомість весь час порушена. Яка тактика?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Госпіталізація до психіатричного відділення
- ☐ б. Госпіталізація до неврологічного відділення
- ☐ в. Госпіталізація до реанімаційного відділення
- ☐ г. Призначення консультації епілептолога
- ☐ д. Призначення амбулаторного лікування

Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація до реанімаційного відділення

## Питання 192

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Напередодні Нового року до лікарні невідкладної медичної допомоги доставили літнього чоловіка, вік якого точно невідомий. Коли його знайшли, він лежав на вулиці і майже ні на що не реагував. У відділенні виміряли його життєві показники: внутрішня температура тіла становить 29°C, артеріальний тиск - 70/30 мм рт.ст., пульс - 40/хв., частота дихання - 6/хв., дихання поверхневе. Насичення гемоглобіну киснем - 90% при подачі кисню 5 л/хв. В ході обстеження: пацієнт не реагує на вербальні подразники, у диханні відчутно запах алкоголю. Зіниці в нормі, симетричні, але уповільнено реагують на світло. Обстеження легень виявило хрипи з обох сторін. Обстеження серцево-судинної системи виявило брадикардію та нерегулярний пульс. Неврологічне обстеження було складно провести, але в процесі спостерігалася явна гіпорексія. Початкова ЕКГ показала синусову брадикардію, часто спостерігаються передчасні шлуночкові комплекси. Рівень глюкози в капілярній крові - 17,1 ммоль/л. У швидкій розпочали інфузію підігрітого фізіологічного розчину крізь периферичний катетер розміру 16G. Пацієнт також отримав одну дозу тіаміну внутрішньовенно. Якими будуть наступні дії в процесі ведення даного пацієнта? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення центрального катетеру до підключичної вени
- ☐ b. Ін'єкція атропіну
- ☐ c. Інфузія інсуліну
- ☐ d. Фуросемід внутрішньовенно
- ☐ e. Ендотрахеальна інтубація

Коментар

Правильна відповідь: Ендотрахеальна інтубація

## Питання 193

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До медичної роти доставлено пораненого з вогнепальним переломом правого стегна та значною артеріальною кровотечею. Загальний стан тяжкий. Свідомість відсутня. Пульс - 150/хв., ниткоподібний. Систолічний артеріальний тиск - 70 мм рт.ст. Які заходи першої лікарської допомоги слід провести в першу чергу? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Призначення симптоматичних медикаментозних засобів
- ☐ b. Ампутація при відриві, розчавленні та ішемічному некрозі кінцівки
- ☐ c. Уведення знеболюючих засобів за допомогою шприц-тюбика
- ☐ d. Переливання крові, кровозамінників при тяжкому шоці та значній крововтраті

☐ е. Покращання транспортної іммобілізації за допомогою табельних і підручних засобів  
Коментар

Правильна відповідь: Переливання крові, кровозамінників при тяжкому шоці та значній крововтраті

#### Питання 194

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

8-річний хлопчик з гемофілією А надійшов до лікарні невідкладної медичної допомоги після того, як уся родина потрапила в автомобільну аварію. Дитину було пристебнуто ременями безпеки на задньому сидінні зі сторони пасажирів, в той час як машина зазнала удару зі сторони водія. Спрацювала повітряна подушка і хлопчик втратив свідомість приблизно на 15 секунд. Пацієнт потерпає від головного болю, але нудоти чи блювання не спостерігається. Температура тіла становить 36,7°C, артеріальний тиск - 115/65 мм рт.ст., пульс - 88/хв., частота дихання - 16/хв. Фізикальне обстеження виявило гематому розміром 2 см на лобі з правого боку. Інших ознак травми не видно. Результати неврологічного обстеження в межах норми. Що слід зробити далі в ході лікування даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Відпустити додому, відвідати лікаря первинної ланки на наступний день
- ☐ б. Контрастна комп'ютерна томографія голови
- ☐ в. Оглядова рентгенограма черепа
- ☐ г. Спостереження за дитиною протягом 4-6 годин
- ☐ е. Безконтрастна комп'ютерна томографія голови

Коментар

Правильна відповідь: Безконтрастна комп'ютерна томографія голови

#### Питання 195

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 65-ти років із сильним болем у верхній частині живота надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги у супроводі своєї дружини. Біль виник раптово 4 години тому, під час перегляду телепередач, іррадіює у спину та підсилюється під час будь-яких рухів. Пацієнт вже багато років страждає на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу та приймає антацидний засіб, що відпускається без рецепту, для лікування симптомів. Також хворіє на гіпертонію та приймає тіазидний діуретик для контролю над перебігом захворювання. Щодня пацієнт проходить близько 5

км. Споживав велику кількість молока та інших молочних продуктів, щоб послабити "відчуття печіння" у шлунку. Температура тіла - 37,8оС, артеріальний тиск - 110/62 мм рт.ст., пульс - 110/хв., частота дихання - 22/хв. Пацієнт лежить у ліжку пластом, нерухомий. Слизові оболонки сухі. Обстеження органів черевної порожнини виявило явну болючість під час поверхневої пальпації. Подальшу пальпацію живота пацієнт не дозволяє. На ЕКГ спостерігається синусова тахікардія. Яке дослідження найдоцільніше буде провести у першу чергу для цього пацієнта? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рентгенографія органів грудної та черевної порожнин
- ☐ b. Безконтрастна комп'ютерна томографія органів черевної та тазової порожнин
- ☐ c. Вимірювання рівня сироваткової ліпази та молочної кислоти
- ☐ d. УЗД органів черевної порожнини
- ☐ e. Промивання очеревини


Коментар

Правильна відповідь: Рентгенографія органів грудної та черевної порожнин

## Питання 196

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 15-ти років, яка хворіє на системний червоний вовчак з ураженням міокарду, суглобів, нирок, розвинулася клініка гострого коронариту (гострий за груди́нний біль, задишка, серцева аритмія, зниження артеріального тиску). Яке ускладнення найімовірніше загрожує хворій в найближчі години?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інфаркт міокарда
- ☐ b. ДВЗ-синдром
- ☐ c. набряк мозку
- ☐ d. Аневризма судини
- ☐ e. Гостра ниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Інфаркт міокарда

## Питання 197

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання



Текст питання

У дитини з гострою кишковою інфекцією розвинулася клініка парезу кишечника - живіт здутий, гази відходять погано, кишкові шуми ледве прослуховуються. Введення якого препарату має першочергове значення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Альбумін
- ☐ б. Хлорид калію
- ☐ в. Глюкоза
- ☐ г. Цефазолін
- ☐ д. Неогемодез


Коментар

Правильна відповідь: Хлорид калію

### Питання 198

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років, що перебуває на санаторному лікуванні, на прогулянці раптом втратив свідомість. Викликаний черговий лікар констатував клінічну смерть. Вкажіть першу дію лікаря по підтриманню життєдіяльності хворого:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Прекардіальний удар
- ☐ б. Покликати на допомогу
- ☐ в. Закритий масаж серця
- ☐ г. Звільнити верхні дихальні шляхи
- ☐ д. тучне дихання


Коментар

Правильна відповідь: Закритий масаж серця

### Питання 199

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

25-річний чоловік надійшов до відділення невідкладної медичної допомоги зі скаргами на сильну лихоманку, остуду, міальгію та висип на шкірі, які виникли в той самий день, коли пацієнта було госпіталізовано. У нього також спостерігалися нудота та три випадки діареї з великою кількістю водянистих випорожнень, наразі пацієнт відчуває запаморочення. Два дні тому він переніс операцію з корекції неправильно сформованої носової перегородки; інших захворювань в анамнезі немає. Останнім часом пацієнт не подорожував та не контактував з хворими. Наркотики не вживає. Температура тіла - 39,4°C, артеріальний тиск - 85/50 мм рт.ст., пульс - 116/хв. Насичення гемоглобіну киснем - 98% при диханні кімнатним повітрям. Перебуває у летаргічному стані, але осередків слабкості та напруженості шиї не спостерігається. Об'єктивно: чисті легеневі поля та тахікардія з нормальними першим та другим тонами серця. Живіт м'який та безболісний. Тампонада носа в обох ніздрях. Обстеження шкіри виявляє розлитий, червоний, плямистий висип, який поширюється на долоні та підшви. Результати лабораторних досліджень: Клінічний аналіз крові: тромбоцити -  $105 \cdot 10^9/\text{л}$ , лейкоцити -  $13 \cdot 10^9/\text{л}$ , нейтрофіли - 90% паличкоядерні - 5%. Біохімічний аналіз сироватки крові: азот сечовини крові - 6,32 мкмоль/л, креатинін - 168 мкмоль/л, Дослідження функції печінки: аспартат-амінотрансфераза - 87 Од/л, аланін-амінотрансфераза - 99 Од/л. Надіслано культури крові. Що найімовірніше призвело до таких симптомів? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Клітинно-опосередкована алергічна реакція
- ☐ b. Вироблення екзотоксину бактеріями
- ☐ c. Розростання та поширення бактерій
- ☐ d. Масивний лізис бактерій та циркуляція ендотоксину
- ☐ e. Реакція гіперчутливості негайного типу


Коментар

Правильна відповідь: Вироблення екзотоксину бактеріями

## Питання 200

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні невідкладної медичної допомоги надійшла 70-річна жінка в зв'язку з раптовим виникненням задишки. Раніше в неї подібних симптомів не спостерігалось. Хрипів під час дихання, болю в грудях, набряку ніг, пришвидшеного серцебиття чи втрати свідомості у пацієнтки не спостерігається. До її інших медичних проблем належать гіпертонія, цукровий діабет 2 типу, гіперхолестеринемія та бронхіальна астма, набута в дитячому віці. Наразі пацієнтка приймає лізиноприл, метформін та симвастатин. Її було госпіталізовано лише один раз, 2 місяці тому, коли їй було здійснено артродез хребців через проблеми з попереком. Вона не палить та не вживає алкоголь чи наркотики. Сімейний анамнез не містить важливої інформації. Температура тіла становить 36,1°C, артеріальний тиск - 210/105 мм рт.ст., пульс - 92/хв., частота дихання - 34/хв. Пульсова оксиметрія - 81% при диханні кімнатним повітрям. Фізикальне обстеження виявило дифузні хрипи над легеневими полями. Результати лабораторного дослідження: гемоглобін - 114 г/л, тромбоцити -  $180 \cdot 10^9/\text{л}$ , лейкоцити -  $8 \cdot 10^9/\text{л}$ . Пацієнтці дають кисень. Що є найдоцільнішим наступним кроком у веденні даної пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Метопролол внутрішньовенно
- ☐ b. Гепарин внутрішньовенно

- ## Коментар

□

III

[illegible]

На цій сторінці Питання 167 На цій сторінці Питання 168 На цій сторінці Питання 169 На цій сторінці  
Питання 170 На цій сторінці Питання 171 На цій сторінці Питання 172 На цій сторінці Питання 173  
На цій сторінці Питання 174 На цій сторінці Питання 175 На цій сторінці Питання 176 На цій сторінці  
Питання 177 На цій сторінці Питання 178 На цій сторінці Питання 179 На цій сторінці Питання 180  
На цій сторінці Питання 181 На цій сторінці Питання 182 На цій сторінці Питання 183 На цій сторінці  
Питання 184 На цій сторінці Питання 185 На цій сторінці Питання 186 На цій сторінці Питання 187  
На цій сторінці Питання 188 На цій сторінці Питання 189 На цій сторінці Питання 190 На цій сторінці  
Питання 191 На цій сторінці Питання 192 На цій сторінці Питання 193 На цій сторінці Питання 194  
На цій сторінці Питання 195 На цій сторінці Питання 196 На цій сторінці Питання 197 На цій сторінці  
Питання 198 На цій сторінці Питання 199 На цій сторінці Питання 200 На цій сторінці  
Показати одну сторінку за разЗавершити перегляд

### КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

Учасники

Відзнаки

Компетентності

Журнал оцінок

Загальне

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Контрольні тестування

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Секція 9

Секція 10

Секція 11

Секція 12

Секція 13

Секція 14

Секція 15

[Особистий кабінет](#)

[Домашня сторінка](#)

[Календар](#)

[Особисті файли](#)

Мої курси

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручняк Оксана Богданівна](#) ([Вийти](#))

[КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)

- [Українська \(uk\)](#)
  - - [English \(en\)](#)
    - [Русский \(ru\)](#)
    - [Українська \(uk\)](#)