

[Перейти до головного вмісту](#)
[Бокова панель](#)
[КРОК-123](#)

(Інтерн БДМУ) Підручник Оксана Богданівна

П

Особистий кабінетПрофіль користувачаОцінкиПовідомленняУподобанняВийтиПовідомлення
[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане
Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане
Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)

[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Секція 3](#)
- [2019 осінь](#)

Розпочато

Monday 14 February 2022 17:17 PM

Стан

Завершено

Завершено

Tuesday 14 February 2023 20:41 PM

Витрачено часу

1 рік

Балів

0,00/200,00


Оцінка

0,00 з 100,00 можливих

Питання 1

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В приймальне відділення госпіталю доставлений військовослужбовець з ушкодженням щелепно-лицевої ділянки голови внаслідок вибуху міни близько 3-х годин тому. Була блювота. Стан хворого тяжкий. Допоміжні м'язи беруть участь в акті дихання. Дихання - 36/хв. Пульс - 120/хв., ритмічний. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Перкуторно над легеньми притуплено-тимпанічний звук. При аускультатії над легеньми сухі свистячі хрипи. Над нижніми ділянками легень - крепітуючі хрипи. На рентгенограмі зниження повітряності легеневої тканини у вигляді "лапатоного снігу". Яке найбільш імовірне ушкодження легень у потерпілого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Первинна посттравматична пневмонія
- ☐ b. Забій легень
- ☐ c. Травматичний ателектаз легень
- ☐ d. Гостра емфізема легень
- ☐ e. Аспіраційний пневмоніт


Коментар

Правильна відповідь: Аспіраційний пневмоніт

Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 50-річного чоловіка протягом 2-х днів відзначаються рідкі випорожнення чорного кольору. Болю у епігастральній ділянці немає. При огляді: блідість шкірних покривів і кон'юнктиви, "судинні зірочки" на шкірі грудей, розширення вен передньої стінки живота, гепатомегалія. Артеріальний тиск - 105/60 мм рт.ст. Промивні води шлунка типу "кавової гущі". Лікар визначив кровотечу з вен стравоходу. Які препарати разом з трансфузійною та гемостатичною терапією слід призначити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Метоклопрамід
- ☐ b. Тіотриазолін
- ☐ c. Аргініну глутамат
- ☐ d. Вазопресин
- ☐ e. Алюмінію гідроокис

Коментар

Правильна відповідь: Вазопресин

Питання 3

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 38-ми років надійшла у відділення у тяжкому стані. Скаржиться на дифузний біль в животі, нудоту, часте блювання, різку загальну слабкість, запаморочення. Об'єктивно: свідомість потьмарена. Виражене схуднення. Шкіра темного кольору (інтенсивного засмагу), більше на обличчі, шиї, тильній поверхні кисті. На слизовій порожнини рота - аспідно-сірі плями. Пульс - 60/хв., малий ниткоподібний. Артеріальний тиск - 70/30 мм рт.ст. Живіт бере участь в акті дихання, м'який, при пальпації помірно болючий, більше в епігастральній ділянці. Набряки відсутні. Лабораторно: глюкоза крові - 3,0 ммоль/л, натрій крові - 128 ммоль/л, калій крові - 6,1 ммоль/л. Який патологічний стан виник у хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий панкреатит
- ☐ б. Гострий холецистит
- ☐ в. Аддісонічний криз
- ☐ г. Тромбоз мезентеріальних судин
- ☐ д. Інфаркт міокарда

Коментар

Правильна відповідь: Аддісонічний криз

Питання 4

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 19-ти років під час їзди в переповненому автобусі відчула мерехтіння перед очима, шум в голові, запаморочення, втратила свідомість. Через 1,5-2 хвилини, прийшовши до тями, відчувала виражену загальну слабкість, головний біль. Об'єктивно: блідість шкірних покривів, артеріальний тиск - 85/60 мм рт.ст., на електроенцефалограмі переважання альфа-ритму, патологічної активності не виявлено. Визначте прогноз щодо життя та працездатності хворої:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Несприятливий щодо працездатності, несприятливий щодо відновлення функції
- ☐ б. Несприятливий щодо працездатності, сприятливий щодо відновлення функції
- ☐ в. Сприятливий щодо працездатності та життя
- ☐ г. Несприятливий щодо працездатності, сприятливий щодо життя
- ☐ д. Несприятливий щодо життя та працездатності

Коментар

Правильна відповідь: Сприятливий щодо працездатності та життя

Питання 5

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В клініку дитячої хірургії доставлено дитину зі скаргами на різкий біль внизу живота з іррадіацією в промежину, безперервним потягом до сечовипускання і неможливістю помочитися. Було запідозрено пошкодження сечового міхура. Який основний метод діагностики?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Цистографія
- ☐ b. Хромоцистоскопія
- ☐ c. В/в урографія
- ☐ d. Цистоскопія
- ☐ e. Лапароскопія

Коментар

Правильна відповідь: Цистографія

Питання 6

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 17-ти років була вжалена комахою в ділянку лівого передпліччя 5 днів тому. Через дві доби в ділянці вжалення з'явилася інфільтрація, гіперемія, набряк, посилився біль. Температура тіла - 37,8о С. В середній третині лівого передпліччя в підшкірній клітковині інфільтрат 4х4 см, з нечіткими контурами з флуктуацією в центрі. Шкіра над інфільтратом гіперемована, локальне підвищення температури тіла. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Абсцес
- ☐ b. Бешиха
- ☐ c. Запальний інфільтрат
- ☐ d. Алергічна реакція на вжалення комахою
- ☐ e. Тромбофлебіт вен передпліччя


Коментар

Правильна відповідь: Абсцес

Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий 35-ти років був збитий мотоциклом на вулиці. При огляді: деформація на рівні нижньої третини правого стегна, де виявляється також патологічна рухомість. При пальпації також вказує на біль у ділянці верхньої третини правої гомілки, де є садна та значний набряк. Пульсація на магістральних артеріях збережена, неврологічних розладів не виявляється. Який варіант транспортної іммобілізації слід обрати у даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Одна драбинна шина по задній поверхні
- ☐ б. Дистракційна милицева шина
- ☐ в. Жорсткі ноші, положення на спині
- ☐ г. Пневматична шина до верхньої третини стегна
- ☐ д. Три драбинні шини по задній та бічним поверхням


Коментар

Правильна відповідь: Дистракційна милицева шина

Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Водій 48-ми років скаржиться на біль за грудиною пекучого характеру, тривалістю більше 30 хвилин. Напади загрудинного болю при навантаженні відзначає протягом кількох років, до цього моменту вони знімались прийомом нітрогліцерину. При огляді: стан середньої важкості, тони серця приглушені. Артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст. Пульс - 80/хв., ритмічний. Який препарат з наведених є обов'язковим для лікування на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ацетилсаліцилова кислота
- ☐ б. Діуретик фуросемід
- ☐ в. Серцевий глікозид дигоксин

- ☐ d. Антагоніст кальцію ніфедипін
☐ e. Триметазидин


Коментар

Правильна відповідь: Ацетилсаліцилова кислота

Питання 9

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнта 19-ти років доставлено з місця ДТП, ліва нижня кінцівка іммобілізована шиною Дітеріхса. Свідомість потьмарена, шкірні покриви бліді, з синюшним відтінком. Пульс - 130/хв., артеріальний тиск - 70/0 мм рт.ст. Дихання поверхневе, часте. Спостерігаються гіпорефлексія, м'язова гіпотонія. Який патофізіологічний стан супроводжує дане пошкодження?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Травматичний шок II ступеня
☐ b. Кома помірна
☐ c. Травматичний шок I ступеня
☐ d. Кома глибока
☐ e. Травматичний шок III ступеня


Коментар

Правильна відповідь: Травматичний шок III ступеня

Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 66-ти років випив близько 200 мл етиленгліколю. На 5-й день перебування у токсикологічному відділенні з'явилися нудота, блювання, головний біль, спрага, анорексія, шкірна сверблячка. Кількість сечі на добу становила 100 мл. Який діагноз найбільш імовірний у даного хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий гастрит
☐ b. Гострий холецистит
☐ c. Гостре пошкодження нирок

- ☐ d. Гостра печінкова недостатність
- ☐ e. Гострий панкреатит
- Коментар

Правильна відповідь: Гостре пошкодження нирок

Питання 11

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час індукції в анестезію внутрішньовенним введенням діазепаму у хворого 35-ти років раптово з'явилась задишка 30/хв., шкіра обличчя з ціанозом, сухі свистячі дистанційні хрипи, артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 138/хв. Який невідкладний стан у хворого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гостра дихальна недостатність
- ☐ b. Напад бронхіальної астми
- ☐ c. Гостра надниркова недостатність
- ☐ d. Гостра серцево-судинна недостатність
- ☐ e. Анафілактичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

Питання 12

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 58-ми років з ІХС на прийомі у дільничного лікаря розвинувся пароксизм надшлуночкової тахікардії, зареєстрований на ЕКГ. Які першочергові заходи доцільно провести? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Внутрішньовенне введення адреналіну
- ☐ b. Вагусні проби
- ☐ c. Черезстравохідна електрокардіостимуляція
- ☐ d. Електроімпульсна терапія
- ☐ e. Ввести кордарон


Коментар

Правильна відповідь: Вагусні проби

Питання 13

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 75-ти років отруїлася невідомою речовиною, надійшла до приймального відділення в агональному стані. Хвора переведена на штучну вентиляцію легень. На які особливості дихальних параметрів в похилому віці слід звернути увагу при переводі пацієнтки на ШВЛ?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Проба Штанге
- ☐ б. Число дихальних рухів за дві хвилини
- ☐ в. Індекс Тифно
- ☐ г. Проба Генча
- ☐ д. Залишковий об'єм легень, ригідність грудної клітки


Коментар

Правильна відповідь: Залишковий об'єм легень, ригідність грудної клітки

Питання 14

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 14-ти років з гострим інфекційним ендокардитом під час перебування у лікарні виник інтенсивний біль в поперековій ділянці зліва, слабкість, нудота, здуття живота, кров'яниста сеча. Больовий синдром був з труднощами знятий спазмолітиками та наркотичними анальгетиками. Яка причина гострої гематурії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий пієлонефрит
- ☐ б. Кровотеча з сечового міхура
- ☐ в. Гострий гломерулонефрит
- ☐ г. Інфаркт лівої нирки
- ☐ д. Ниркова колька


Коментар

Правильна відповідь: Інфаркт лівої нирки

Питання 15

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого, що перебував в інфекційному відділенні з діагнозом гострий гепатит В, на 10-й день хвороби посилилася жовтяниця, з'явилося збудження, ейфорія, "печінковий" запах з рота, сухожилкові рефлекси підвищені, температура субфебрильна. У зв'язку з яким ускладненням погіршився стан хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Панкреатит
- ☐ b. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ c. Холангіт
- ☐ d. Печінкова енцефалопатія
- ☐ e. Менінгіт


Коментар

Правильна відповідь: Печінкова енцефалопатія

Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий 64-х років був вилучений із під уламків зруйнованої будівлі через 8 годин. При об'єктивному обстеженні виявлено синдром тривалого розчавлювання лівої кінцівки, ішемія III ступеню. Який об'єм першої медичної допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Невідкладна госпіталізація
- ☐ b. Бинтування кінцівок, охолодження, іммобілізація
- ☐ c. Накладання джгута, знеболювання, іммобілізація
- ☐ d. Звільнення кінцівок, охолодження, іммобілізація
- ☐ e. Знеболювання, іммобілізація, введення антибіотиків

Коментар

Правильна відповідь: Накладання джгута, знеболювання, іммобілізація

Питання 17

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

10 годин тому у хворого з'явився біль в паховій западині, підвищилась температура до 39°C. Об'єктивно: язик сухий, обкладений білим нальотом, хитка хода. В паховій западині виявляється болісний, погано контурований лімфовузол, шкіра над ним гіперемована. Які лабораторні методи необхідно використати для постановки діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Паразитологічні
- ☐ b. Вірусологічні та біохімічні
- ☐ c. Бактеріологічні
- ☐ d. Імунологічні
- ☐ e. Радіонуклідні

Коментар

Правильна відповідь: Бактеріологічні

Питання 18

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 21-го року впав з велосипеда на відведену праву руку. Скарги: на біль в ділянці надпліччя. При огляді: лівою рукою підтримує праву, праве надпліччя опущене. Голова нахилена вправо. В ділянці надпліччя: виражена деформація (гострий кінець центрального уламка пальпується під шкірою), крововилив. Пасивні рухи в плечовому суглобі можливі, але болісні, активні - різко обмежені перед посилення болю. Яка транспортна іммобілізація найбільш доцільна?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Шина Крамера
- ☐ b. Восьмиподібна пов'язка
- ☐ c. Косинкова пов'язка
- ☐ d. Іммобілізація не потрібна
- ☐ e. Шина Дітерікса

Коментар

Правильна відповідь: Восьмиподібна пов'язка

Питання 19

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина народилася у термін 39 тижнів гестації, з масою 3700 г, у стані важкої асфіксії у зв'язку з тугим обвиттям пуповини. Який стан дитини буде показанням для проведення ШВЛ?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Періоральний ціаноз
- ☐ b. Частота дихання більше 60 за 1 хвилину
- ☐ c. Тахікардія більше 180 серцевих скорочень за 1 хвилину
- ☐ d. Брадикардія менше 100 серцевих скорочень за 1 хвилину
- ☐ e. Наявність судом відразу після народження

Коментар

Правильна відповідь: Брадикардія менше 100 серцевих скорочень за 1 хвилину

Питання 20

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 6,5 місяців при госпіталізації кволий, шкіра та слизові оболонки сухі, тургор тканин збережений, температура тіла - 37,5о С, частота серцевих скорочень - 140/хв., тони серця приглушені, живіт здутий, випорожнення рідкі, водянисті, жовтого кольору, діурез знижений, дефіцит маси тіла від початкової - 4%. Гематокрит - 44%; К⁺ - 3,7 ммоль/л; N a⁺ - 142 ммоль/л. Який першочерговий етап лікування?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Регідратаційна терапія
- ☐ b. Корекція харчування
- ☐ c. Призначення ентеросорбентів
- ☐ d. Антибактеріальна терапія
- ☐ e. Жарознижувальна терапія

Коментар

Правильна відповідь: Регідратаційна терапія

Питання 21

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У військовий польовий шпиталь надійшло 8 солдат з місця події. У потерпілих відзначається слабкість, нудота, гіркота у роті, слинотеча. В одного бійця шкіра та слизові оболонки яскраво-червоного кольору, брадипное, брадикардія, судоми. Зі слів потерпілих, на місці події відзначався різкий запах гіркої мигдалю. Найімовірніше, отруйною речовиною є:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Іприт
- ☐ b. Фосген
- ☐ c. Зарин
- ☐ d. Зоман
- ☐ e. Синильна кислота

Коментар

Правильна відповідь: Синильна кислота

Питання 22

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 48-ми років оперована з приводу багатовузлового еутиреоїдного зоба IV ступеня. Операція на погляд хірурга пройшла без суттєвих ускладнень. Але у хворої з'явилася захриплість голосу, яка не зникла і при подальшому спостереженні під час перебування її в стаціонарі. Яке післяопераційне ускладнення найбільш імовірно виникло у хворої?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Пошкодження обох зворотних нервів
- ☐ b. Пошкодження блукаючого нерву
- ☐ c. Гематома загрудинного простору
- ☐ d. Пошкодження одного зворотного нерва
- ☐ e. Пошкодження трахеї

Коментар

Правильна відповідь: Пошкодження одного зворотного нерва

Питання 23

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Рядовий надійшов у медичну роту через 1,5 години після поранення в живіт уламком снаряду. Об'єктивно: стан тяжкий, блідий, пульс - 132/хв., артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст. В ділянці правого підребер'я накладена пов'язка з ППІ, яка просякнута кров'ю. Живіт напружений. Перкуторно визначається тупість у відлогих місцях, що переміщується при зміні положення тіла. Визначаються симптоми подразнення очеревини. В якому функціональному підрозділі повинна бути надана допомога такому пораненому? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. В палаті інтенсивної терапії для нетранспортабельних поранених
- ☐ б. В сортувальній для тяжкопоранених і поранених середньої тяжкості
- ☐ в. В операційній
- ☐ г. В перев'язочній для легкопоранених
- ☐ д. В перев'язочній для тяжкопоранених і поранених середньої тяжкості

Коментар

Правильна відповідь: В операційній

Питання 24

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина віком 12 років потребує проведення гемотрансфузії з кровозамісною метою. Діагноз: апластична анемія. В останній час трансфузії супроводжувалися алергічними реакціями. Яка тактика подальшого ведення хворого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гемотрансфузія кровозамінників
- ☐ б. Гемотрансфузія рентген-опроміненої крові
- ☐ в. Гемотрансфузія відмитих еритроцитів
- ☐ г. Премедикація наркотичними засобами перед гемотрансфузією
- ☐ д. Премедикація атропіном перед гемотрансфузією

Коментар

Правильна відповідь: Гемотрансфузія відмитих еритроцитів

Питання 25

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 43-х років скаржиться на різкий біль у задньому проході під час дефекації, наявність слизу з домішками крові в калі, періодичні закрепи. Хворіє протягом 3-х років, коли після гострої їжі відзначив біль та набряк в анальній ділянці. 3 місяці тому лікувався в стаціонарі в зв'язку з відновленням болю. Зараз відзначає підвищення температури тіла до 37,8о С. Об'єктивно: збільшені, набряклі гемороїдальні вузли темно-синього кольору. При пальцевому обстеженні прямої кишки хворий відзначає болючість в анальній ділянці. Поставте найбільш імовірний діагноз: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Хронічний парапроктит
- ☐ б. Тромбоз гемороїдальних вузлів
- ☐ в. Гостра тріщина прямої кишки
- ☐ г. Гострий парапроктит
- ☐ д. Хронічна тріщина прямої кишки

Коментар

Правильна відповідь: Тромбоз гемороїдальних вузлів

Питання 26

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Народився живий доношений хлопчик, масою 3300 г, довжиною 52 см, з тугим обвиттям пуповини навколо шиї. Навколоплідні води без домішок меконію. Нормальне дихання протягом першої хвилини після народження не встановлюється, частота серцевих скорочень - 110/хв., тонус м'язів помірно знижений, незначна відповідь на подразнення. Якою має бути тактика лікаря? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Вдарити по сідницях
- ☐ б. Дати струмінь кисню на обличчя
- ☐ в. Облити дитину холодною водою
- ☐ г. Стиснути грудну клітку
- ☐ д. Санація дихальних шляхів


Коментар

Правильна відповідь: Санація дихальних шляхів

Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Бригада швидкої медичної допомоги розпочала серцево-легеневу реанімацію дорослому хворому, який перебуває в стані клінічної смерті. Яким повинно бути співвідношення числа компресій до числа вдихів у дорослого з зупинкою серця?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 30:2 при проведенні реанімації як однією, так і двома особами
- ☐ б. 15:2 при проведенні реанімації однією особою і 5:1 - двома особами
- ☐ в. 30:2 при проведенні реанімації однією особою і 15:2 - двома особами
- ☐ г. Співвідношення не регламентоване і може бути визначеним реаніматором особисто
- ☐ д. 15:2 при проведенні реанімації як однією, так і двома особами


Коментар

Правильна відповідь: 30:2 при проведенні реанімації як однією, так і двома особами

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Які трансфузійні середовища виявляють оптимальний гемостатичний ефект при гіпокоагуляційній кровотечі у потерпілих в аваріях і катастрофах?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Еритроцитарна маса
- ☐ б. Нативна плазма
- ☐ в. Кріопреципітат
- ☐ г. Фібриноген
- ☐ д. Свіжозаморожена плазма

Коментар

Правильна відповідь: Свіжозаморожена плазма

Питання 29

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 75-ти років доставлено до приймального відділення лікарні зі скаргами на інтенсивний біль у попереку, відсутність сечі протягом доби. Об'єктивно: артеріальний тиск - 170/90 мм рт.ст., притуплення перкуторного звуку у надлобковій ділянці. Металевим катетером виведено 750 мл сечі. Лабораторне дослідження сечі: сліди білку, лейкоцити - 10-12 екз. у полі зору, еритроцити - 3-5 у препараті. Вміст сечовини у крові - 7,8 ммоль/л, креатиніну 0,11 ммоль/л. Назвіть причину відсутності сечі:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Хронічна ниркова недостатність
- ☐ б. Сечокам'яна хвороба
- ☐ в. Гостра затримка сечі внаслідок обструкції сечовипускника
- ☐ г. Гострий гломерулонефрит
- ☐ д. Гостра ниркова недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Гостра затримка сечі внаслідок обструкції сечовипускника

Питання 30

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лаборант 40-ка років, який в портовому місті при дослідженні матеріалу від померлих внаслідок епізоотії щурів виявив короткі палички овоїдної форми з біполярним забарвленням, надійшов до інфекційної лікарні зі скаргами на різучий біль у грудях, підвищення температури тіла до 40°C, ядуху, кашель з виділенням спочатку слизового, а потім кров'янистого харкотиння. При огляді стан хворого дуже тяжкий. Виражена блідість шкірних покривів. Акроціаноз. Аускультативно: ослаблення дихання в легенях з обох сторін. Сатурація 65%. Яка найбільш імовірна етіологія гострої дихальної недостатності у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. *Streptococcus pneumoniae*
- ☐ б. *Bacillus anthraci*
- ☐ в. *Francisella tularensi*
- ☐ г. *Yersinia pesti*
- ☐ д. *Yersinia pseudotuberculosis*

Коментар

Правильна відповідь: Yersinia pesti

Питання 31

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 10-ти років надійшла до педіатричного відділення в стані крайнього психомоторного збудження з безладними руховими розладами, бажанням кудись бігти. З анамнезу відомо, що дівчинку під час прогулянки в парку раптово налякав великий пес. Визначте діагноз:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Шизофренія
- ☐ б. Епілесія
- ☐ с. Неврозоподібний стан
- ☐ d. Маніакально-депресивний психоз
- ☐ е. Гострий реактивний психоз

Коментар

Правильна відповідь: Гострий реактивний психоз

Питання 32

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Ви стали випадковим свідком опіку полум'ям чоловіка. При огляді обидві верхні кінцівки, передня поверхня тулуба гіперемовані, вкриті множинними пухирями з прозорою рідиною. На правому стегні циркулярне обвуглювання епідермісу, просвічуються тромбовані вени. Який вид шоку насамперед загрожує хворому?
Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Больовий
- ☐ б. Інфекційно-токсичний
- ☐ с. Гіповолемічний
- ☐ d. Геморагічний
- ☐ е. Кардіогенний


Коментар

Правильна відповідь: Гіповолемічний

Питання 33

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В палаті інтенсивної терапії перебуває новонароджена дитина з респіраторним дистрес-синдромом І типу, ІІІ ступеня та інтранатальною асфіксією важкого ступеня; недоношеність 30 тижнів. Вона отримує штучну вентиляцію легень у примусовому режимі. Відзначається порушення гемодинаміки, середній артеріальний тиск - 20 мм рт.ст. Призначте першочерговий препарат у цій ситуації:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Фенобарбітал 20 мг/кг
- ☐ б. 5% розчин глюкози 4 мл/кг
- ☐ в. 25% розчин MgSO₄, 1 мл/кг
- ☐ г. 10% розчин глюкози 2 мл/кг
- ☐ д. Допамін 10 мкг/кг/хв


Коментар

Правильна відповідь: Допамін 10 мкг/кг/хв

Питання 34

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час проведення профілактичних заходів на одному з блоків АЕС один із співробітників з необережності порушив техніку безпеки, внаслідок чого він 35 хвилин перебував у зоні радіоактивного опромінення. Показники індивідуального дозиметра - 1,0 Гр. Скарг не пред'являє. Шкірні покриви та видимі слизові оболонки зберігають свій звичайний колір. Пульс - 84/хв., артеріальний тиск - 138/82 мм рт.ст. Живіт при пальпації м'який, неболючий. Яких лікувально-профілактичних заходів слід вжити стосовно цього співробітника?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Призначити антибактеріальну терапію
- ☐ б. Призначити цистамін
- ☐ в. Призначити унітіол
- ☐ г. Призначити препарати йоду

☐ е. Профілактичного лікування не потребує
Коментар

Правильна відповідь: Призначити цистамін

Питання 35

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В опіковий центр доставлено дитину 5-ти років з термічним опіком III ст., 12% поверхні тіла. Стан тяжкий, шкіра блідо-сірого кольору, тахікардія, тахіпное, артеріальний тиск - 60/30 мм рт.ст., знижений діурез. Які показники треба контролювати під час транспортування дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Печінкові проби, ЧСС, ЧД, АТ, діурез
- ☐ б. Імунограма, ЧСС, ЧД, АТ, діурез
- ☐ в. ЧСС, ЧД, АТ, діурез, електроліти крові
- ☐ г. Коагулограма, ЧСС, ЧД, АТ, діурез
- ☐ е. SpO2, ЧСС, ЧД, АТ, діурез

Коментар

Правильна відповідь: SpO2, ЧСС, ЧД, АТ, діурез

Питання 36

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 35-ти років, що страждає на діабет і отримує інсулін, захворів на грип у важкій формі. На 4-й день захворювання доставлений родичами в приймальний покій в коматозному стані.

Відзначається сухість шкіри та слизових, глибоке і шумне дихання, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 98/хв., діурез відсутній протягом останньої доби. У цій ситуації інфузійну терапію необхідно розпочати з введення:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Розчинів колоїдів
- ☐ б. Полярizuючої суміші
- ☐ в. Фізіологічного розчину
- ☐ г. Розчинів глюкози

☐ е. Розчину соди
Коментар

Правильна відповідь: Фізіологічного розчину

Питання 37

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В сім'ї з трьох осіб захворіла на кір дитина, що відвідує дитячий садок, підготовчу групу. Батьки дитини на кір не хворіли та не були вакциновані проти кору. Якою буде тактика сімейного лікаря щодо профілактики кору в батьків хворої дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ввести одноразово імуноглобулін
- ☐ б. Призначити курс антибіотикотерапії
- ☐ с. Призначити протівірусні препарати
- ☐ d. Призначити антигістамінні препарати
- ☐ е. Призначити полівітаміни

Коментар

Правильна відповідь: Ввести одноразово імуноглобулін

Питання 38

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При огляді роділлі встановлено: пологова діяльність активна, положення плода поперечне, перша позиція. При піхвовому обстеженні: відкриття шийки матки 8-9 см, випадіння ручки плода, плід у матці нерухомий. Серцебиття плода відсутнє. Який метод пологорозрішення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Накладання акушерських лещат
- ☐ б. Кесарів розтин
- ☐ с. Через природні пологові шляхи
- ☐ d. Плродоруйнівна операція
- ☐ е. Вакуум-екстракція


Коментар

Правильна відповідь: Плодоруйнівна операція

Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років під час ДТП відчув різкий біль в шийному відділі хребта. Вкажіть найбільш оптимальний метод транспортної іммобілізації:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вкласти хворого в позу Волковича
- ☐ b. Іммобілізація хребта шиною Дітерікса
- ☐ c. Іммобілізація сидячим положенням
- ☐ d. Іммобілізація шийного відділу комірцем Шанца
- ☐ e. Вкласти хворого на живіт


Коментар

Правильна відповідь: Іммобілізація шийного відділу комірцем Шанца

Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 50-ти років з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок після фізичного навантаження з'явилась виражена задишка, біль в грудній клітці з правого боку, серцебиття, запаморочення, мінущі порушення свідомості. Об'єктивно: шкіра блідо-ціанотична. Тахіпное - 40/хв., сухі свистячі хрипи. Тахікардія - 130/хв. Артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. На ЕКГ - відхилення електричної осі праворуч, блокада правої ніжки пучка Гіса. Який діагноз найбільш імовірний у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостра інтерстиціальна пневмонія
- ☐ b. Спонтанний пневмоторакс
- ☐ c. Плеврит
- ☐ d. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ e. Інфаркт міокарду


Коментар

Правильна відповідь: Тромбоемболія легеневої артерії

Питання 41

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікар бригади швидкої допомоги надає невідкладну допомоги дівчинці 10-ти років, яку збила машина. У зв'язку з неадекватністю самостійного дихання проведена інтубація трахеї. При проведенні пробних вдихів за допомогою мішка Амбу виявлено, що дихальні шуми зліва проводяться слабше. Що треба зробити, щоб виправити ситуацію?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Просунути інтубаційну трубку нижче
- ☐ б. Підвищити об'єм дихання
- ☐ с. Підтягнути інтубаційну трубку вище
- ☐ d. Підвищити тиск в дихальних шляхах
- ☐ е. Переінтубувати трахею


Коментар

Правильна відповідь: Підтягнути інтубаційну трубку вище

Питання 42

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 86-ти років перебуває в стаціонарі хірургічного відділення після ампутації нижньої кінцівки на рівні стегна з приводу діабетичної стопи. Через добу після оперативного втручання стан хворого почав раптово прогресивно погіршуватись. Порушилась свідомість: помірне оглушення, виникло часте поверхнєве дихання, хворий став блідим, з'явився холодний піт. На ЕКГ: синусова тахікардія з ЧСС- 148/хв., блокада правої ніжки пучка Гіса, високий загострений зубець Р, ознаки гіпертрофії правого шлуночка. Хірург запідозрив ТЕЛА і викликав реаніматолога. На момент огляду реаніматологом свідомість на рівні коми, пульс на магістральних судинах відсутній, дихання відсутнє. Які першочергові дії має застосувати реаніматолог?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Непрямий масаж серця
- ☐ б. В/в введення метопрололу
- ☐ с. Електрична дефібриляція

- ☐ d. Оксигенотерапія
- ☐ e. В/в введення гепарину
- Коментар

Правильна відповідь: Непрямий масаж серця

Питання 43

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До чергового лікаря районної лікарні звернулася жінка 75-ти років зі скаргами на сильний головний біль, більше в правій половині, нудоту, блювання, зниження гостроти зору на ліве око. Гострота зору лівого ока - 0,06, правого - 1,0. Ліве очне яблуко тверде, як камінь, застійна ін'єкція, рогівка набрякла, зіниця розширена, овальна. Праве око: спокійне, зіниця вузька, очний тиск пальпаторно в нормі. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий напад глаукоми
- ☐ b. Гіпертонічний криз
- ☐ c. Гострий іридоцикліт
- ☐ d. Харчове отруєння
- ☐ e. Відкритокутова глаукома

Коментар

Правильна відповідь: Гострий напад глаукоми

Питання 44

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Першовагітна у терміні 39 тижнів скаржиться на регулярний переймоподібний біль протягом 3-х годин, тривалістю по 20-25 секунд через 3-4 хвилини. При акушерському дослідженні: шийка матки центрована, згладжена, відкриття цервікального каналу - 5 см, плодовий міхур цілий, передлежить головка плоду, стріловидний шов у лівому косому розмірі. Визначте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 1-й період перших термінових пологів, активна фаза
- ☐ b. 2-й період перших термінових пологів

- ☐ с. 1-й період других термінових пологів, активна фаза
- ☐ d. 1-й період перших термінових пологів, латентна фаза
- ☐ е. Патологічний прелімінарний період


Коментар

Правильна відповідь: 1-й період перших термінових пологів, активна фаза

Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Відбулося руйнування конструкції ядерного енергоблоку. Дозиметрист-розвідник виїхав у зону радіоактивного забруднення. Він був у загальновійськовому захисному костюмі і протигазі. Яким компонентом екіпіровки повинен бути дооснащений дозиметрист для підвищення особистої безпеки від негативного впливу радіоактивного випромінювання?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Таблетками аквасепту
- ☐ b. Слабоалкогольним напоєм
- ☐ с. Індивідуальним протихімічним пакетом
- ☐ d. Індивідуальним дозиметром
- ☐ е. Індивідуальним перев'язувальним пакетом


Коментар

Правильна відповідь: Індивідуальним дозиметром

Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Населення, яке одержало радіаційне ураження внаслідок бойових дій іонізуючим випромінюванням в районі ядерного вибуху та в зонах радіаційного зараження, відносять до:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Радіаційних втрат
- ☐ b. Санітарних втрат
- ☐ с. Масових втрат

☐ d. Бойових втрат
Коментар

Правильна відповідь: Радіаційних втрат

Питання 47

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого гостре отруєння блідою поганкою. На фоні проведеної інтенсивної терапії добовий діурез становить 350 мл, сечовина крові - 55 ммоль/л з добовим приростом більше 5 ммоль/л, калій плазми 7,3 ммоль/л, рівень стандартного бікарбонату плазми - 8 ммоль/л. Ваша лікувальна тактика:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Форсований діурез
- ☐ b. Петльові діуретики
- ☐ c. Гемодіаліз
- ☐ d. Гемосорбція
- ☐ e. Декстрини

Коментар

Правильна відповідь: Гемодіаліз

Питання 48

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 12-річної дівчинки після вживання двох таблеток аспірину температура тіла підвищилася до 39-40,0°C. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподівану появу червоних плям на шкірі з утворенням пухирів та відшаровуванням епідермісу з ерозуванням поверхні. Ураження на шкірі нагадують опіки другого ступеню. Симптом Нікольського - позитивний. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий епідермальний некроліз
- ☐ b. Вульгарна пухирчатка
- ☐ c. Еритродермія

- ☐ d. Токсикодермія
- ☐ e. Багатоформна ексудативна еритема
- Коментар

Правильна відповідь: Гострий епідермальний некроліз

Питання 49

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У п'ятимісячного хлопчика після першого введення прикорму з'явився гострий переймоподібний біль у животі, блювота, затримка випорожнень. При ректальному дослідженні - кров "стигла вишня". Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Глистна інвазія
- ☐ b. Гострий холецистит
- ☐ c. Внутрішня грижа
- ☐ d. Кишкова інвагінація
- ☐ e. Пухлина черевної порожнини

Коментар

Правильна відповідь: Кишкова інвагінація

Питання 50

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 47-ми років хворіє на ІХС: післяінфарктний кардіосклероз, систолічна дисфункція лівого шлуночка, СН І ст. Інфаркт міокарда був півроку тому. Працює у конструкторському бюро. На роботі раптово виникло запаморочення, через 3 хвилини втратив свідомість. Відзначались поодинокі м'язові судоми. Один зі співробітників проводив непрямий масаж серця. Швидка медична допомога на місці була через 15 хвилин. Лікар констатував біологічну смерть. У даному випадку довідку про смерть видає:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Поліклініка за місцем проживання померлого
- ☐ b. Судовий медичний експерт (після розтину)

- ☐ с. Патологоанатомічне відділення лікарні де лікувався хворий з приводу інфаркту міокарда (після розтину)
- ☐ d. Патологоанатомічне відділення лікарні за місцем проживання померлого (після розтину)
- ☐ e. Поліклініка за місцем роботи померлого


Коментар

Правильна відповідь: Судовий медичний експерт (після розтину)

Питання 51

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 36-ти років звернувся зі скаргами на біль в нижній кінцівці та її набряк, який наростає. Добу тому отримав вогнепальне поранення м'яких тканин правої гомілки. Була накладена тиснуча пов'язка, за допомогою не звертався. Об'єктивно: загальний стан хворого важкий, пульс 120/хв., слабкого наповнення, ритмічний. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. Права нижня кінцівка різко набрякла, при пальпації болюча, відзначається крепітація. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Флегмона правої нижньої кінцівки
- ☐ b. Абсцес правої нижньої кінцівки
- ☐ c. Міозит правої нижньої кінцівки
- ☐ d. Бешиха правої нижньої кінцівки
- ☐ e. Газова гангрена правої нижньої кінцівки


Коментар

Правильна відповідь: Газова гангрена правої нижньої кінцівки

Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пораненого, доставленого до медичної роти, є вогнепальні уламкові поранення кінцівок і тазу з пошкодженням уретри. Яке невідкладне втручання необхідно провести на цьому етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення постійного катетера
- ☐ b. Первинна хірургічна обробка вогнепальної рани

- ☐ c. Надлобкова пункція сечового міхура
- ☐ d. Епіцистостомія
- ☐ e. Ушивання уретри


Коментар

Правильна відповідь: Надлобкова пункція сечового міхура

Питання 53

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У доношеної здорової дитини через 8 годин після пологів з'явилась субіктичність шкірних покривів. Дитина від третьої вагітності, других термінових пологів. Перша вагітність закінчилась абортom. Група крові матері II(A), резус"-", дитини A (II), резус"+". Пуповинний білірубін 56 мкмоль/л. Через 4 годин - 84 мкмоль/л. Дитина на грудному вигодовуванні. Який імовірний Ваш діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Атрезія жовчних протоків
- ☐ b. Жовтяниця, пов'язана з грудним молоком
- ☐ c. Гемолітична хвороба новонародженого
- ☐ d. Фізіологічна жовтяниця
- ☐ e. Гепатит


Коментар

Правильна відповідь: Гемолітична хвороба новонародженого

Питання 54

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 48-ми років було витягнуто з-під уламків будівлі. Об'єктивно: слабкість, тахікардія, різкий біль при пальпації кісток таза, неможливість відірвати кінцівки від полу. Попередній діагноз: перелом кісток таза. Який вид транспортування потрібний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. На ношах на животі
- ☐ b. В сидячому положенні

- ☐ c. Лежачи на ношах
- ☐ d. На щиті з приведеними ногами
- ☐ e. На щиті в положенні Волковича


Коментар

Правильна відповідь: На щиті в положенні Волковича

Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 73-х років впала на вулиці. Свідомість та серцева діяльність відсутні. Реанімацію почали з непрямого масажу серця. Яка ознака свідчить про його ефективність?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Розширення зіниць
- ☐ b. Роздування живота
- ☐ c. Підняття грудної клітки
- ☐ d. Поява пульсації на сонних артеріях
- ☐ e. Посмикування кінцівок


Коментар

Правильна відповідь: Поява пульсації на сонних артеріях

Питання 56

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 32-х років, яка страждає на бронхіальну астму, при вдиханні запаху одеколону розвинувся приступ ядухи. Приступ не купувався інгаляційним введенням сальбутамолу через кожні 15 хвилин протягом години та в/в введенням еуфіліну. Загальний стан хворої середньої важкості, незначний ціаноз обличчя, частота дихання - 30-34/хв., частота серцевих скорочень - 92-100/хв., артеріальний тиск - 145/80 мм рт.ст. Першочерговим лікувальним заходом при наданні невідкладної допомоги буде:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. В/в введення преднізолону
- ☐ b. В/в введення атропіну

- ☐ c. В/в введення амброксолу
- ☐ d. Продовжити інгаляцію сальбутамолу
- ☐ e. Повторне в/в введення еуфіліну


Коментар

Правильна відповідь: В/в введення преднізолону

Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При наданні першої медичної допомоги хворому 20-ти років фельдшер виявив, що з глибини рани, нанесеної ножом, на лівому плечі виділяється кров пульсуючим струменем яскраво-червоного кольору. Яка це кровотеча та які методи її тимчасової зупинки повинен використати медпрацівник? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кровотеча венозна, стискаюча асептична пов'язка на рану з метою зупинки кровотечі
- ☐ b. Артеріальна кровотеча, пальцеве натискання плечової артерії проксимальніше рани
- ☐ c. Артеріальна кровотеча, накладання джгута проксимальніше рани
- ☐ d. Кровотеча артеріальна, стискаюча асептична пов'язка на рану
- ☐ e. Венозна кровотеча, накладання джгута проксимальніше рани


Коментар

Правильна відповідь: Артеріальна кровотеча, накладання джгута проксимальніше рани

Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 11-ти років після падіння з висоти доставлена в стаціонар. На огляд не реагує. Шкірні покриви мармурові з землистим відтінком, вкриті холодним потом. Зіниці розширені, слабо реагують на світло. Пульс - 140/хв., ниткоподібний. Артеріальна гіпотонія. Анурія. Який стан виник у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостре отруєння
- ☐ b. Травматичний шок

- ☐ с. Гіпоглікемічна кома
- ☐ d. Гіпотонічний криз
- ☐ е. Анафілактичний шок


Коментар

Правильна відповідь: Травматичний шок

Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 23-х років скаржиться на інтенсивний біль у правому колінному суглобі. Об'єктивно: лівий колінний суглоб збільшений у об'ємі, шкіра над ним гіперемована, при пальпації болючий. Загальний аналіз крові: еритроцити - 3,8 Т/л, Hb- 122 г/л, лейкоцити - 7,4 Г/л: е- 3, б- 1, п/я- 4, с/я- 64, л- 26, м- 2, тромбоцити - 183 Г/л. Час кровотечі за Дюке - 4 хв., час згортання крові за Лі-Уайтом - 128 хв. АЧТЧ- 89 с. Імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоцитопатія
- ☐ b. Ангіогемофілія
- ☐ с. Хвороба Верльгофа
- ☐ d. Гемофілія
- ☐ е. Геморагічний васкуліт, суглобова форма


Коментар

Правильна відповідь: Гемофілія

Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Прапорщик 38-ми років звернувся в медичний пункт з приводу колотої рани стопи, в минулому двічі вакцинований і ревакцинований у плановому порядку проти правцю 8 років тому. Вкажіть тактику щодо специфічної профілактики правцю:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ввести протидифтерійний анатоксин
- ☐ b. Ввести АКДП вакцину

- ☐ c. Ввести АДП-м анатоксин
- ☐ d. Ввести протиправцевий імуноглобулін
- ☐ e. Ввести АП-анатоксин


Коментар

Правильна відповідь: Ввести АП-анатоксин

Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної 40 тижнів під час запису ЕКГ раптово виникло відчуття задухи, головокружіння, блідість, миготіння "мушок" перед очима, артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. На ЕКГ - синусова брадикардія. Ваші першочергові дії:
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Катетеризувати вену та ввести 1 мг атропіну сульфату
- ☐ b. Повернути на лівий бік
- ☐ c. Катетеризувати вену та почати інфузію дофаміну з швидкістю 10 мкг/хв
- ☐ d. Забезпечити інгаляцію 100% кисню через носо-лицеву маску
- ☐ e. Дати вдихати пари аміачного спирту


Коментар

Правильна відповідь: Повернути на лівий бік

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 40-ка років звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на частий рідкий рясний стілець, сильну слабкість, спрагу. Постійно виникає бажання з'їсти солоного. При огляді відзначається сповільнення мовлення, суха та бліда шкіра з пігментацією в ділянці складок, артеріальний тиск 90/50 мм рт.ст., підвищення калію та зниження натрію плазми крові. В анамнезі: туберкульоз легень. Імовірний діагноз:
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостра надниркова недостатність
- ☐ b. Гострий гастроентерит

- ☐ с. Холера
- ☐ d. Туберкульозний ілеотифліт
- ☐ е. Синдром роздратованого кишечника


Коментар

Правильна відповідь: Гостра надниркова недостатність

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженого хлопчика чоловічої статі з 2-го тижня життя спостерігається невпинне блювання, кволість та явища зневоднення. При надходженні до стаціонару - виражені ознаки гіповолемічного шоку. У крові: калій - 6,5 ммоль/л, на- трій - 120 ммоль/л, глюкоза - 2,1 ммоль/л, ознаки ацидозу. Призначте додаткове обстеження, що дозволить виключити або підтвердити наявність у дитини вродженої гіперплазії кори наднирників:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Визначення хоріонічного гонадотропіну крові
- ☐ b. Визначення кортизолу крові та тестостерону сечі
- ☐ с. Визначення гонадотропінів у крові та сечі
- ☐ d. Каріотипування та дерматогліфіка
- ☐ е. Визначення 17-гідроксіпрогестерону в крові та 17-кетостероїдів у сечі


Коментар

Правильна відповідь: Визначення 17-гідроксіпрогестерону в крові та 17-кетостероїдів у сечі

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець перебував в зараженій зоні ОР, без протигазу. В непритомному стані винесений з вогнища ураження. При надходженні на етап кваліфікованої медичної допомоги свідомість затьмарена. Об'єктивно: видимі слизові яскраво-червоного кольору, періодично виникають клоніко-тонічні судоми. Дихання поверхневе до 25/хв.; тахікардія, під- вищення артеріального тиску до 150/100 мм рт.ст. Ураження ОР якої групи найімовірніше зумовлює таку клінічну картину?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. ОР задушливої дії
- ☐ b. ОР загальноотруйної дії
- ☐ c. ОР подразливої дії
- ☐ d. ОР нервово-паралітичної дії
- ☐ e. ОР шкірно-резорбтивної дії


Коментар

Правильна відповідь: ОР загальноотруйної дії

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 25-ти років п'ять днів тому перенесла аборт. В анамнезі - гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ). Об'єктивно: стан тяжкий, температура тіла - 37,0о С, млява, сонлива. Шкіра суха, сірого кольору. Дихання поверхневе, частота 30/хв. Тони серця глухі, ритм синусовий, частота серцевих скорочень 100/хв., артеріальний тиск - 90/70 мм рт.ст. Діурез за добу 120 мл. Яка у хворої стадія гострої ниркової недостатності?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Початкова
- ☐ b. Поліурії
- ☐ c. Одужання
- ☐ d. Олігоанурична
- ☐ e. Латентна


Коментар

Правильна відповідь: Олігоанурична

Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчика 7-ми років доставлено з політравмою в стаціонар з місця дорожньо-транспортної пригоди. Свідомість відсутня, шкіра бліда, множинні гематоми. Пульс ниткоподібний, 130/хв., частота дихання - 42/хв., артеріальний тиск - 60/20 мм рт.ст., макрогематурія. Які лабораторні обстеження необхідно призначити для уточнення причини геморагічного синдрому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вміст карбоксигемоглобіну, креатиніну крові, продуктів деградації фібриногену/фібрину
- ☐ b. Вміст тромбоцитів в периферичній крові, продуктів деградації фібриногену/фібрину, АТ III, тромбіновий час, концентрація фібриногену
- ☐ c. Вміст еритроцитів в периферичній крові, гемоглобіну, активність лужної фосфатази гранулоцитів, аналіз сечі клінічний
- ☐ d. Вміст тромбоцитів, еритроцитів в периферичній крові, гемоглобіну, ліпідограма, протеїнограма
- ☐ e. Вміст білірубину, трансаміназ крові, гемоглобіну, фібриногену, АТ III


Коментар

Правильна відповідь: Вміст тромбоцитів в периферичній крові, продуктів деградації фібриногену/фібрину, АТ III, тромбіновий час, концентрація фібриногену

Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини наприкінці 1-ї доби життя спостерігається іктеричність шкірних покривів, збільшення розмірів печінки та селезінки, загальна кволість. Рівень білірубину в крові - 200 ммоль/л, в основному за рахунок вільної фракції, погодинний приріст його 8,1 ммоль/л. Рівень гемоглобіну - 100 г/л, ретикулоцити - 5%. Ваша подальша тактика:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Фототерапія
- ☐ b. Інфузійна терапія
- ☐ c. Замінне переливання крові
- ☐ d. Ентеросорбенти
- ☐ e. Призначення фенobarбіталу


Коментар

Правильна відповідь: Замінне переливання крові

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого, що перебуває у стані септичного шоку, який виник на тлі менінгококової інфекції, проведене дослідження біохімічних показників плазми крові. Який з показників свідчить про наявність тяжкої тканинної гіперперфузії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Загальний протеїн плазми крові 52 г/л
- ☐ b. Сечовина плазми крові 16,1 ммоль/л
- ☐ c. Лактат плазми крові 5,7 ммоль/л
- ☐ d. Глюкоза плазми крові 13,4 ммоль/л
- ☐ e. Іонізований калій плазми крові 2,8 ммоль/л


Коментар

Правильна відповідь: Лактат плазми крові 5,7 ммоль/л

Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Причиною порушення функції нирок при застосуванні норадреналіну є:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Спазм артерій і вен мозкового шару нирок
- ☐ b. Токсична дія на мозковий шар нирок
- ☐ c. Причина ураження нирок не ясна
- ☐ d. Ураження канальців
- ☐ e. Ураження кіркового шару нирок


Коментар

Правильна відповідь: Спазм артерій і вен мозкового шару нирок

Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У медичну роту 14 ОМБР, яка розгорнута в районі населеного пункту Широкине, з I механізованого батальйону та добровольчого батальйону "Айдар" надійшло 16 поранених вогнепальною зброєю та 8 хворих. Який вид медичної допомоги буде наданий пораненим та хворим в функціональних підрозділах медичної роти бригади?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Перша медична та перша лікарська медична допомога
- ☐ b. Всі види медичної допомоги
- ☐ c. Перша медична та перша лікарська допомога
- ☐ d. Перша лікарська допомога та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги
- ☐ e. Долікарська допомога та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги


Коментар

Правильна відповідь: Перша лікарська допомога та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги

Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 45-ти років на міському пляжі у спекотну погоду раптово втратив свідомість. При огляді: зіниці звужені, шкіра бліда, температура тіла-39,5оС, ЧД- 28/хв., гіпотонія, тахікардія, пульс ниткоподібний. Спостерігаються періодичні судоми кінцівок. Яка причина вказаного стану? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Теплова непритомність
- ☐ b. Сонячний удар
- ☐ c. Гострий інфаркт міокарду
- ☐ d. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ e. Анафілактичний шок


Коментар

Правильна відповідь: Сонячний удар

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

25-річний пацієнт, що тривалий час вживає алкогольні напої, доставлений у хірургічну клініку з приводу багаторазової блювоти спочатку рештками їжі, потім - малозміненою кров'ю та її згустками, що виникла внаслідок вживання горілки. При ендоскопічному дослідженні виявлений

лінійний розрив слизової оболонки в ділянці переходу стравоходу в шлунок. Шлунок та дванадцятипала кишка без особливостей. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострокровоточива виразка дванадцятипалої кишки
- ☐ b. Хімічний опік стравоходу
- ☐ c. Гострі ерозії стравоходу та шлунка
- ☐ d. Синдром Меллорі-Вейсса
- ☐ e. Гострий геморагічний гастрит


Коментар

Правильна відповідь: Синдром Меллорі-Вейсса

Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини, хворої на бронхіальну астму, після катетеризації правої підключичної вени різко погіршилося самопочуття: збуджена, акроціаноз при огляді, задишка. Артеріальний тиск підвищений. Тони серця ритмічні, приглушені. Над легеньми різко ослаблене дихання з боку пункції. Перкуторно - тимпаніт справа. Який Ваш діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кардіогенний шок
- ☐ b. Напружений пневмоторакс з боку пункції
- ☐ c. Астматичний статус
- ☐ d. Повітряна емболія легеневої артерії
- ☐ e. Тромбоемболія легеневої артерії


Коментар

Правильна відповідь: Напружений пневмоторакс з боку пункції

Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий 45-ти років отримав опромінення дозою 5 Гр. Через годину після вибуху з'явилися нудота, блювання, загальна слабкість, головний біль, підвищилась температура тіла до

субфебрильних цифр. Через чотири години в аналізах крові виявлено: нейтрофільний лейкоцитоз із зсувом вліво, ретикулоцитоз, лімфоцитопенія. Який період гострої променевої хвороби виявлено у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Латентний період
- ☐ b. Період наслідків
- ☐ c. Період реконвалесценції
- ☐ d. Період розпалу
- ☐ e. Період первинної реакції


Коментар

Правильна відповідь: Період первинної реакції

Питання 75

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В ізоляторі медичної роти перебувають військовослужбовці з ознаками гострої кишкової інфекції. Яким чином здійснюється евакуація з медичної роти бригади таких хворих у військово-польовий інфекційний госпіталь?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Залученим до евакуації транспортом загального призначення
- ☐ b. На транспорті загального призначення з медичним супроводом
- ☐ c. Санітарним транспортом разом з пораненими
- ☐ d. Санітарним транспортом разом з соматичними хворими
- ☐ e. На спеціально виділеному санітарному транспорті окремо від інших постраждалих


Коментар

Правильна відповідь: На спеціально виділеному санітарному транспорті окремо від інших постраждалих

Питання 76

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При виході з оточення у військовій частині виникли значні санітарні втрати. Для надання пораненим і хворим медичної допомоги на етапах медичної евакуації начальник медичної служби Армійського корпусу наказав організувати евакуацію "На себе". Які ще види медичної евакуації можна використати з метою доставки поранених і хворих на етапи медичної евакуації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Від себе, на сусіда, за собою, через себе
- ☐ b. За собою, через сусіда, через себе
- ☐ c. Від себе, від сусіда, через сусіда
- ☐ d. На сусіда, на ВППГ, через себе
- ☐ e. За собою, за сусідом, на сусіда


Коментар

Правильна відповідь: Від себе, на сусіда, за собою, через себе

Питання 77

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У солдата, що перебуває в зоні АТО 4 місяці, почастишали сварки з товаришами, по телефону посварився з дружиною. Щоночі довго не може заснути, часто прокидається під час сну від незначного шуму і без причини. Визначте вид посттравматичної стресової реакції, яка розвинулась у солдата:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Уникання
- ☐ b. Галюциноз
- ☐ c. Гіперреактивність
- ☐ d. Інтрुзія
- ☐ e. Депресія


Коментар

Правильна відповідь: Гіперреактивність

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 92-х років доставлений у приймальне відділення у термінальному стані з ознаками гострої шлунково-кишкової кровотечі. При перекладанні хворого виникла зупинка серцевої діяльності. Чи показане проведення реанімаційних заходів у такому випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Не показане, зважаючи на вік пацієнта та супутню патологію
- ☐ b. Показане у будь-якому випадку
- ☐ c. Рішення приймається консилиумом 3-х лікарів
- ☐ d. Рішення приймається черговим реаніматологом
- ☐ e. Рішення приймається черговим адміністратором


Коментар

Правильна відповідь: Показане у будь-якому випадку

Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До ВППГ доставлено лейтенанта зі сліпим кульовим пораненням м'яких тканин лівого стегна у задовільному стані. Артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст., пульс 78/хв. Асептична пов'язка помірно просякнута кров'ю. Яких заходів профілактики інфекційних ускладнень потрібно вжити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Знеболення, антибіотикотерапія
- ☐ b. Введення фізіологічного розчину внутрішньовенно, іммобілізація лівої нижньої кінцівки шинами Крамера
- ☐ c. Первинна хірургічна обробка рани, антибіотикотерапія, знеболення
- ☐ d. Введення тампону в рану з накладанням шкірних швів
- ☐ e. Первинна хірургічна обробка рани з накладанням первинного шва, антибіотикотерапія


Коментар

Правильна відповідь: Первинна хірургічна обробка рани, антибіотикотерапія, знеболення

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У породіллі ранній післяпологовий період ускладнився масивною гіпотонічною кровотечею. На тлі проведення інтенсивної терапії та гострої крововтрати клінічно і лабораторно діагностовано ДВЗ-синдром, II стадія. Який з нижчеперерахованих препаратів доцільно використовувати з метою лікування коагулопатії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Нативну плазму
- ☐ b. Антистафілококову плазму
- ☐ c. Суху плазму
- ☐ d. Еритроцитарну масу
- ☐ e. Свіжозаморожену плазму


Коментар

Правильна відповідь: Свіжозаморожену плазму

Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 37-ми років в ургентному порядку прооперований в проктологічному відділенні. В післяопераційному періоді стан задовільний, стабільний. До лікарні звертаються родичі, співробітники, сусіди пацієнта з бажанням отримати інформацію про діагноз та стан його здоров'я. Кому з юридичної точки зору медичний працівник може надати таку інформацію?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Діагноз - керівнику установи, де працює хворий, інше - усім
- ☐ b. Діагноз - нікому, про стан здоров'я - співробітникам та сусідам
- ☐ c. Нікому без дозволу пацієнта, за винятком випадків, встановлених законом
- ☐ d. Можна усім під підписку про нерозголошення лікарської таємниці
- ☐ e. Можна надавати усім, але тільки в усній формі


Коментар

Правильна відповідь: Нікому без дозволу пацієнта, за винятком випадків, встановлених законом

Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років. На 2-й день гострого інфаркту міокарда раптово в палаті знепритомнів. Артеріальний тиск не визначається. На ЕКГ осциляції різної висоти і ширини, неоднакової форми, проведено дефібриляцію; на ЕКГ-поодинокі розширені комплекси. Ваша тактика:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Проведення непрямого масажу серця, штучної вентиляції легень і введення адреналіну в/в
- ☐ b. Ввести адреналін внутрішньосерцево і провести дефібриляцію
- ☐ c. Ввести лідокаїн внутрішньовенно і провести дефібриляцію
- ☐ d. Провести електричну дефібриляцію, і за необхідності ще раз
- ☐ e. Прекардіальний удар, штучна вентиляція легень і непрямий масаж серця

Коментар

Правильна відповідь: Проведення непрямого масажу серця, штучної вентиляції легень і введення адреналіну в/в

Питання 83

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з ГРВІ нарастають явища гострої дихальної недостатності, наявний біль в лівій половині грудної клітки, що посилюється на висоті вдиху. При аускультатії виявлено ослаблення дихання ліворуч. Рентгенологічно: масивне затемнення аж до рівня III ребра, що було розцінено як ексудативний плеврит. З чого варто розпочати лікувальні заходи?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Пункція плевральної порожнини в VII-VIII міжребер'ї по задній аксиллярній лінії
- ☐ b. Дренування лівої плевральної порожнини в V-VI міжребер'ї по середній паховій лінії
- ☐ c. Антибактеріальна + дегідратаційна терапія, за неефективності - пункція і дренування плевральної порожнини
- ☐ d. Симптоматична + антибактеріальна терапія
- ☐ e. Пункція плевральної порожнини в II міжребер'ї по середньоключичній лінії

Коментар

Правильна відповідь: Пункція плевральної порожнини в VII-VIII міжребер'ї по задній аксиллярній лінії

Питання 84

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий доставлений в реанімаційне відділення без свідомості. З анамнезу відомо, що у хворого протягом 2 годин був виражений пекучий біль за грудиною. Шкірні покриви бліді, акроціаноз. Артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст. На ЕКГ - фібриляція шлуночків. Яке ускладнення розвинулось у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Аритмогенний шок
- ☐ b. Анафілактичний шок
- ☐ c. Тампонада серця
- ☐ d. Розрив міокарда
- ☐ e. Блискавичний набряк легень


Коментар

Правильна відповідь: Аритмогенний шок

Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому в палаті зненацька стало погано. При огляді: хворий без свідомості, зовнішнє дихання відсутнє, пульс не визначається. З чого треба починати невідкладну допомогу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Проведення зовнішнього масажу серця
- ☐ b. Введення адреналіну
- ☐ c. Введення атропіну
- ☐ d. Відновлення прохідності дихальних шляхів
- ☐ e. Прекардіальний удар


Коментар

Правильна відповідь: Проведення зовнішнього масажу серця

Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної в 34 тижні під час доплерографічного ультразвукового обстеження виявили стійкий реверсивний діастолічний кровотік у судинах плода й провели кесарів розтин. У новонародженого

відсутні дихання і м'язовий тонус. Вентиляція мішком і маскою не забезпечує адекватні рухи грудної клітки, і після наступних 30 секунд вентиляції частота серцевих скорочень не збільшується. Який наступний етап реанімації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення дихальних аналептиків
- ☐ b. Інтубація трахеї немовляти
- ☐ c. Введення адреналіну
- ☐ d. Введення атропіну
- ☐ e. Введення натрію бікарбонату


Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї немовляти

Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 10-ти місяців госпіталізована до клініки зі скаргами на іктеричність шкіри, занепокоєння, відсутність сечовипускання протягом доби. За тиждень до появи цих скарг дитина хворіла на інфекційний гастроентероколіт. Hb-50 г/л, еритроцити - $2,1 \cdot 10^{12}/л$, тромбоцити - $33 \cdot 10^9/л$, у аутокоагуляційному тесті - ознаки гіперкоагуляції, зниження рівня фібриногену до 1 г/л, креатинін крові - 700 мкмоль/л, сечовина крові - 11,8 ммоль/л, загальний білірубін - 115 мкмоль/л, непрямий білірубін - 88 мкмоль/л. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тромбоцитопенічна пурпура
- ☐ b. Гемолітико-уремічний синдром
- ☐ c. Гемолітична анемія
- ☐ d. Гостра ниркова недостатність
- ☐ e. ДВЗ-синдром


Коментар

Правильна відповідь: Гемолітико-уремічний синдром

Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнту 65-ти років, який хворіє на облітеруючий атеросклероз судин нижніх кінцівок, виконали операцію ампутації ноги на рівні н/3 стегна. В зв'язку з вираженим больовим синдромом в післяопераційному періоді хворому тричі вводився омнопон, який привів до депресії дихання та гемодинаміки. Який антидот до наркотичних анальгетиків потрібно використати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Бемегрід
- ☐ b. Атропін
- ☐ c. Налоксон
- ☐ d. Унітіол
- ☐ e. Прозерин


Коментар

Правильна відповідь: Налоксон

Питання 89

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 30-ти років доставлений до лікарні машиною швидкої допомоги без свідомості. Зі слів рідних відомо, що більш ніж 10 років страждає на цукровий діабет, приймає інсулін. При огляді: запах ацетону з рота, шкіра суха, язик обкладений коричневим нальотом, сухий, тонус очних яблук знижений, дихання типу Куссмауля. У додаткових дослідженнях: цукор крові 27,5 ммоль/л, ацетон сечі ++++. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпертиреоїдна кома
- ☐ b. Гіперосмолярна кома
- ☐ c. Гіпоглікемічна кома
- ☐ d. Гіперлактацидемічна кома
- ☐ e. Кетоацидотична кома


Коментар

Правильна відповідь: Кетоацидотична кома

Питання 90

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Породілля через 2 доби після ускладнених хоріоамніонітом пологів отримує антибактеріальну терапію (цефазолін 3 г на добу). Раптом загальний стан стрімко погіршився, з'явилися лихоманка з підвищенням температури до 39,0о С, частота серцевих скорочень до 120/хв., частота дихальних рухів до 26/хв. та зниження артеріального тиску до 80/40 мм рт.ст. Встановіть діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ортостатичний колапс
- ☐ b. Анафілактичний шок
- ☐ c. Напад бронхіальної астми
- ☐ d. Гіпотонія
- ☐ e. Септичний шок


Коментар

Правильна відповідь: Септичний шок

Питання 91

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На підприємстві з виробництва ртутних термометрів один з працівників порушив правила техніки безпеки, внаслідок чого відбувся витік парів ртуті у великому об'ємі. Усі потерпілі працівники були негайно доставлені до приймального відділення найближчої лікарні з діагнозом гостре отруєння парами ртуті. Який антидотний засіб використав лікар для невідкладної допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дипіроксим
- ☐ b. Налоксон
- ☐ c. Пілокарпін
- ☐ d. Прозерин
- ☐ e. Унітіол


Коментар

Правильна відповідь: Унітіол

Питання 92

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 70-ти років скаржиться на гострий біль у правій гомілці та стопі. Захворів гостро, явної причини не відзначає. Під час огляду: шкіра гомілки та стопи бліда, холодна на дотик, тактильна та больова чутливість збережені. Пульсація на стегновій артерії правої кінцівки збережена, на підколінній та на судинах стоп - не спостерігається. Яким буде діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий тромбофлебіт
- ☐ b. Артрит гомілковостопного суглоба
- ☐ c. Глибокий флеботромбоз
- ☐ d. Бешихове запалення
- ☐ e. Тромбоз правої підшкірної артерії


Коментар

Правильна відповідь: Тромбоз правої підшкірної артерії

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До сімейного лікаря звернувся хворий 27-ми років зі скаргами на загальну слабкість, нудоту, серцебиття, появу рідкого чорного стільця. Анамнез: впродовж 2-х тижнів турбували біль в животі, переважно натще та вночі, печія, закрепи. Упродовж останніх 3-х днів інтенсивність болю зменшилась, проте стали наростати зазначені скарги. Яке обстеження має бути першочерговим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. С-уреазний тест
- ☐ b. Оглядова рентгенографія ОЧП
- ☐ c. Ендоскопічне обстеження
- ☐ d. Ультразвукове обстеження ОЧП
- ☐ e. Кoproграма


Коментар

Правильна відповідь: Ендоскопічне обстеження

Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовий близько 3-х годин тому отримав уламкове поранення лівої половини грудної клітки. Стан тяжкий, ейфорія, шкіра бліда. Тони серця глухі, пульс - 130/хв., слабкий, артеріальний тиск - 80/70 мм рт.ст. Рана грудної клітки - 2 см, розташована зліва по парастернальній лінії на рівні III міжреберного проміжку. Дихання над лівою легенею послаблене, в нижніх відділах вкорочений перкуторний звук. На Rg-грамі ОГК - розширення тіні серця. Яка тактика лікування пораненого? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Накладання оклюзійної пов'язки, дренування плевральної порожнини
- ☐ b. ПХОрани, накладання швів, дренування плевральної порожнини
- ☐ c. Невідкладна торакотомія на фоні реанімаційних заходів
- ☐ d. Ушивання рани, комплекс реанімаційних заходів
- ☐ e. Реанімаційні заходи, після стабілізації стану - торакотомія


Коментар

Правильна відповідь: Невідкладна торакотомія на фоні реанімаційних заходів

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 12-ти років під час внутрішньовенного введення рентгенконтрастної речовини (тріомбразу) раптово погіршився стан: з'явилися головний біль, відчуття здавлення в грудях з браком повітря. Через декілька хвилин несприятелі. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, акроціаноз. Пульс ниткоподібний. Тони серця різко ослаблені. Частота серцевих скорочень - 110/хв., артеріальний тиск - 60/30 мм рт.ст. Вкажіть препарат вибору для надання невідкладної допомоги: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Адреналін
- ☐ b. Преднізолон
- ☐ c. Еуфілін
- ☐ d. Супрастин
- ☐ e. Допамін


Коментар

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому 47-ми років необхідне переливання еритроцитарної маси. При визначенні групової належності крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВ0 аглютинація спостерігалась в краплях з сироватками 0 (I) та А (II). Кров якої групи потрібно перелити пацієнту? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. АВ (IV)
- ☐ b. В (III)
- ☐ c. 0 (I)
- ☐ d. А (II)

Коментар

Правильна відповідь: В (III)

Питання 97

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 30-ти років скаржиться на головний біль, марення. Об'єктивно: температура тіла- 39оС, збуджена, обличчя гіперемоване, позитивний симптом Говорова-Годельє, петехіальний висип на тулубі, кінцівках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., гепатоспленомегалія. Вживає алкоголь, ін'єкційні наркотики, живе в приміщенні підвального типу. Поставте попередній діагноз: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Лептоспіроз
- ☐ b. ВІЛ-інфекція
- ☐ c. Висипний тиф
- ☐ d. Алкогольний психоз
- ☐ e. Грип

Коментар

Правильна відповідь: Висипний тиф

Питання 98

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Мати хворої дитини віком 9 місяців скаржиться на підвищення температури тіла до 39оС, кашель, утруднення дихання протягом 3-х діб. Об'єктивно: блідість шкіри та слизових оболонок, ціаноз носогубного трикутника. Над легеньми з обох боків вислуховуються дрібнопухирчасті хрипи. Яке найбільш інформативне інструментальне обстеження слід призначити хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рентгенографія органів грудної клітки
- ☐ b. Протеїнограма
- ☐ c. Клінічний аналіз крові
- ☐ d. Бактеріологічне дослідження харкотиння
- ☐ e. Гострофазові показники


Коментар

Правильна відповідь: Рентгенографія органів грудної клітки

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У доношеної дитини через 2 години від народження після годування розпочалась сильна блювота неперетравленим молоком з домішками жовчі. Відійшла меконіальна пробка, після чого випорожнень не спостерігалось. Живіт здутий у верхніх відділах і запалий у нижніх. На оглядовій рентгенограммі - два рівні рідини. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Низька кишкова непрохідність
- ☐ b. Висока кишкова непрохідність
- ☐ c. Кишкова інфекція
- ☐ d. Пілоростеноз
- ☐ e. Пілороспазм


Коментар

Правильна відповідь: Висока кишкова непрохідність

Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У медичну роту з місця літніх польових навчань з гарматної стрільби доставлено екіпаж танка у складі чотирьох танкістів з однотипними скаргами та схожою клінічною картиною: запаморочення, головний біль у скронях, нудота. В одного з танкістів спостерігалось одноразове блювання. Об'єктивно: рясний піт, підвищення температури тіла до 38°C, тахікардія. В одного потерпілого відзначаються порушення координації рухів. Якою має бути тактика ведення потерпілих? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Госпіталізація в опікове відділення
- ☐ b. Проведення реанімаційних заходів
- ☐ c. Потерпілі не потребують допомоги
- ☐ d. Розміщення потерпілих в прохолодному місці
- ☐ e. Госпіталізація у відділення інтенсивної терапії


Коментар

Правильна відповідь: Розміщення потерпілих в прохолодному місці

Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 47-ми років діагностовано клінічну смерть, на ЕКГ - асистолія. Розпочаті реанімаційні заходи. Протягом 3 хвилин, попри непрямий масаж серця та штучне дихання, відновлення серцевої діяльності не досягнуто. Який медикаментозний засіб повинний бути введений у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Адреналін
- ☐ b. Атропін
- ☐ c. Натрію гідрокарбонат
- ☐ d. Кальцію хлорид
- ☐ e. Лідокаїн


Коментар

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта-гіпертоніка раптово знизився зір на праве око. Гострота зору 0,05 не коригується. На очному дні в центрі молочно-білий набряк сітківки, симптом "розчавленого помідора". Вени розширені, штовороподібно звиті, за ходом вен геморагії. Ваш діагноз:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Емболія центральної артерії сітківки
- ☐ б. Тромбоз центральної вени сітківки
- ☐ в. Відшарування сітківки
- ☐ г. Центральний хоріоретиніт
- ☐ д. Меланобластома хоріоїдеї

Коментар

Правильна відповідь: Тромбоз центральної вени сітківки

Питання 103

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 3-х років, яка перебуває у стаціонарі, на тлі гострої респіраторної інфекції 3 рази було блювання, непокоїть гострий біль у животі. Температура тіла - 38,5о С. Шкіра бліда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор крові - 4,0 ммоль/л. Який з діагнозів найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий апендицит
- ☐ б. Цукровий діабет
- ☐ в. Гострий гастроентерит
- ☐ г. Діабетична кома
- ☐ д. Ацетонемічний стан

Коментар

Правильна відповідь: Ацетонемічний стан

Питання 104

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 29-ти років скаржиться на різкий біль в лівій половині грудної клітки, задишку. Відомо, що годину тому назад, підірвавшись на міні, отримав закриту травму грудної клітки. При аускультатії зліва дихання різко ослаблене, вислуховуються перистальтичні шуми. При рентгенологічному дослідженні визначається наявність рівнів рідини та повітря у плевральній порожнині зліва. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Лівобічний пневмоторакс. Розрив лівого купола діафрагми
- ☐ b. Лівобічний гемоторакс. Розрив лівого купола діафрагми
- ☐ c. Лівобічна емпієма плеври. Забій лівої легені
- ☐ d. Розрив лівого купола діафрагми, зміщення кишечника у ліву плевральну порожнину
- ☐ e. Посттравматичний перикардит. Забій лівої легені. Гематома лівої легені


Коментар

Правильна відповідь: Розрив лівого купола діафрагми, зміщення кишечника у ліву плевральну порожнину

Питання 105

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 32-х років, праля, захворіла гостро 5 днів тому: озноб, гарячка, сильний головний біль, виражена слабкість, безсоння. При огляді: температура тіла - 40°C, збуджена, гіперемія й одутлість обличчя, ін'єкція судин склер, рясна розеолезно-петехіальна екзантема, тремор язика, тахікардія, гепатоспленомегалія. Виявлено педикульоз. Якою буде тривалість медичного спостереження за контактними особами?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Впродовж 21 дня
- ☐ b. Впродовж 25 днів
- ☐ c. Спостереження не проводиться
- ☐ d. Впродовж 7 днів
- ☐ e. Впродовж 14 днів

Коментар

Правильна відповідь: Впродовж 25 днів

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 5-ти років надана допомога при утопленні у прісній воді. Через 8 годин після поновлення самостійного дихання раптово значно збільшилась частота дихання, з'явився ціаноз, притуплення перкуторного тону над легеньми, послаблення дихання, дрібноміхурчаті хрипи. Яке ускладнення розвинулося?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Стороннє тіло у дихальних шляхах
- ☐ b. Гіпоксемія
- ☐ c. Пневмонія
- ☐ d. Набряк Квінке
- ☐ e. Бронхообструктивний синдром


Коментар

Правильна відповідь: Пневмонія

Питання 107

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час грози розряд блискавки влучив в дерево, під яким був пастух, 48-ми років. У нього мали місце збудження, дезорієнтація, періодичні судоми. Артеріальний тиск- 140/90 мм рт.ст., пульс- 120/хв., дихання аритмічне. Які медикаменти необхідно призначити негайно?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Седативні
- ☐ b. Глюкокортикоїди
- ☐ c. Серцеві глікозиди
- ☐ d. Адреналін
- ☐ e. Теофілін

Коментар

Правильна відповідь: Седативні

Питання 108

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У районі бомбардування, внаслідок спалахування нафтопроводу, знайдено та доставлено у МедР групу обпечених. Якими головними критеріями повинен керуватися лікар приймально-сортувального відділення МедР для ранньої діагностики опікового шоку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Задуха, тахікардія
- ☐ b. Ціаноз, задуха
- ☐ c. Спрага, м'язове тремтіння
- ☐ d. Глибина та площа ураження
- ☐ e. Відчуття холоду, блідість шкіри поза межами опіку


Коментар

Правильна відповідь: Глибина та площа ураження

Питання 109

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 18-ти років скаржиться на сильний біль внизу живота. Остання нормальна менструація 2 тижні тому. Місячні з 14-ти років, регулярні, через 28 днів. Шкіра бліда. Пульс - 96/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Живіт бере участь в акті дихання. Симптом Щоткіна слабо позитивний в нижніх відділах живота. Під час піхвового дослідження: матка не збільшена, додатки з правого боку визначається збільшений 6х6 см яєчник, різко болісний, ліворуч - не збільшені. Задне склепіння випинає. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Перекрут кістоми яєчника
- ☐ b. Трубна вагітність, яка перервалася
- ☐ c. Гострий апендицит
- ☐ d. Апоплексія яєчника
- ☐ e. Гострий калькульозний пієлонефрит


Коментар

Правильна відповідь: Апоплексія яєчника

Питання 110

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10-ти місяців після видалення стороннього тіла гортані збільшились симптоми дихальної недостатності: ціаноз, задишка інспіраторного характеру, участь допоміжної мускулатури в акті дихання. Артеріальний тиск підвищений, центральний венозний тиск підвищений. Тахікардія. Над легеньми дихання ослаблене, сухі хрипи, осиплість голосу. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Травматичний розрив трахеї
- ☐ b. Бронхоспазм
- ☐ c. набряк гортані
- ☐ d. ателектаз легені
- ☐ e. набряк легенів


Коментар

Правильна відповідь: набряк гортані

Питання 111

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 73-х років у приймальному відділенні раптово виникла асистолія. Що з перерахованого слід враховувати лікарю приймального відділення, який проводить реанімаційні заходи до прибуття бригади анестезіологів, в зв'язку з віком хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Змінити тривалість реанімаційних заходів
- ☐ b. Відмовитися від використання дефібрилятора
- ☐ c. Силу натискання при непрямому масажі серця
- ☐ d. Зменшити частоту дихання при ШВЛ
- ☐ e. Зменшити частоту компресій при непрямому масажі серця


Коментар

Правильна відповідь: Силу натискання при непрямому масажі серця

Питання 112

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 54-х років знайдений зимою вранці на вулиці. Скарги на пекучий біль, свербіння і "розпирання" пальців ніг. Об'єктивно: відчувається сильний запах алкоголю з рота, хворий агресивний, ступні набряклі, на фоні побілілої шкіри є червоно-фіолетові плями, декілька пухирів, наповнених світлою рідиною. Встановіть діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий тромбоз підколінної артерії
- ☐ б. Синдром позиційного здавлення ступні
- ☐ в. Відмороження II ст.
- ☐ г. Відмороження I ст.
- ☐ д. Відмороження III ст.


Коментар

Правильна відповідь: Відмороження II ст.

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 42-х років госпіталізований на 2-й день хвороби із скаргами на м'язовий біль. Стан тяжкий. Температура тіла - 38,8°C, ейфорія, обличчя гіперемоване, одутле, ін'єкція судин склер. Хода хитка, мова невиразна. На 3-й день хвороби з'явився у пахвинній ділянці зліва різко болючий, щільний бубон до 6 см в діаметрі, що спаяний з прилеглими тканинами. Пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Язик "крейдарний". Печінка, селезінка не пальпуються. Який діагноз є найбільш імовірним?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий гнійний лімфаденіт
- ☐ б. Бубонна форма чуми
- ☐ в. Лімфогранульоматоз
- ☐ г. Феліноз
- ☐ д. Бубонна форма туляремії

Коментар

Правильна відповідь: Бубонна форма чуми

Питання 114

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 16-ти років скаржиться на біль у правій здухвинній ділянці з іррадіацією в калитку, збільшення її розмірів. Температура - 37,8о С. Три дні тому, граючи у футбол, хлопчик отримав удар в пах м'ячем. Об'єктивно: шкіра бліда. При пальпації живота змін не виявлено. При огляді калитки спостерігається незначна гіперемія шкіри. При пальпації придатка відзначається його потовщення та болючість. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий інфекційний орхіт
- ☐ b. Гематома калитки
- ☐ c. Гостре гідроцеле
- ☐ d. Гострий епідидимоорхіт справа
- ☐ e. Кіста придатка

Коментар

Правильна відповідь: Гострий епідидимоорхіт справа

Питання 115

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 1,5 років із септичним шоком виникла кровотеча з місць ін'єкцій, по шлунковому зонду надходить "кавова гуща". При визначенні показників гемостазу збільшено МНС, АЧТЧ, рівень D-димеру, знижений фібриноген, тромбоцити - 30 109/л. Яку патологію запідозрив лікар-куратор? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Дефіцит вітаміну К
- ☐ b. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура
- ☐ c. Тромботична тромбоцитопенічна пурпура
- ☐ d. Хвороба Віллебранда
- ☐ e. Синдром ДВЗ

Коментар

Правильна відповідь: Синдром ДВЗ

Питання 116

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної 29-ти років встановлений діагноз: вагітність 1, 32 тижня. Прееклампсія тяжкого ступеня. Який із перерахованих препаратів необхідно призначити для профілактики виникнення судом? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Бензогексоній
- ☐ b. Ніфедипін
- ☐ c. Клонідину сульфат
- ☐ d. Діазепам
- ☐ e. Сульфат магнію

Коментар

Правильна відповідь: Сульфат магнію

Питання 117

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 37-ми років з тяжким вірусним гепатитом В, яка перебуває в інфекційному відділенні, з'явилися сплутаність свідомості, печінковий запах з рота, посилилася жовтяниця, блювання "кавовою гущею", носова і маткова кровотеча, крововиливи в місцях ін'єкцій. Артеріальний тиск - 95/60 мм рт.ст., загальний білірубін- 289 мкмоль/л, прямий - 100 мкмоль/л, загальний білок - 45 г/л, протромбіновий індекс 64%. Яка основна причина геморагічного синдрому, який розвинувся у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Зниження синтетичної функції печінки
- ☐ b. Зниження дезінтоксикаційної функції печінки
- ☐ c. Пошкодження судин вірусом гепатиту В
- ☐ d. Розвиток універсального капіляротоксикозу
- ☐ e. Портальна гіпертензія

Коментар

Правильна відповідь: Зниження синтетичної функції печінки

Питання 118

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпіла 28-ми років впала на вулиці з опорою на руку. При огляді виявляється деформація на рівні середньої третини передпліччя, біль при навантаженні уздовж вісі та пальпації, патологічна рухомість. Розладів магістрального кровообігу не виявлено, але скаржиться на парестезію у ділянці кисті. Яке положення передпліччя при транспортній іммобілізації є оптимальним?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Пронація 45 градусів від максимальної
- ☐ б. Середнє між пронацією та супінацією
- ☐ в. Максимальна супінація
- ☐ г. Максимальна пронація
- ☐ д. Супінація 45 градусів від максимальної

Коментар

Правильна відповідь: Середнє між пронацією та супінацією

Питання 119

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 57-ми років скаржиться на виражену загальну слабкість, біль в горлі, підвищення температури. Хворіє на дифузний токсичний зоб з тяжким перебігом, з приводу чого тиждень тому їй призначено 20 мг мерказолілу. Об'єктивно: шкіра нормального кольору, волога. Зів - мигдалики збільшені, гіперемовані. Тони серця аритмічні, миготлива аритмія. Нижній край печінки на 3 см нижче реберної дуги. Аналіз крові: Hb- 128 г/л, лейкоцити - 0,5 10⁹/л, тромбоцити - 180 10⁹/л, лейкоцитарна формула - поодинокі лімфоцити, моноцити. Що з хворою?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий гепатит
- ☐ б. Медикаментозний агранулоцитоз
- ☐ в. Гострий лейкоз
- ☐ г. Гостра респіраторна вірусна інфекція
- ☐ д. Ангіна

Коментар

Правильна відповідь: Медикаментозний агранулоцитоз

Питання 120

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Ви оглядаєте на дому хворого в тяжкому стані: контакту не доступний, психо-моторне збудження, некоординовані рухи, на больові подразники не реагує, геморагічний висип на шкірі тулуба і сідниць, різко позитивні менінгеальні симптоми, блювота. Хворому негайно потрібно ввести: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Великі дози строфантину
- ☐ b. Великі дози жарознижувальних препаратів
- ☐ c. Великі дози антибіотиків бактерицидної дії
- ☐ d. Великі дози глюкокортикостероїдів та антибіотик
- ☐ e. Великі дози інсуліну

Коментар

Правильна відповідь: Великі дози глюкокортикостероїдів та антибіотик

Питання 121

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Карета "швидкої допомоги" викликана до вагітної жінки. Вагітність I, 36 тижнів. Тиждень тому жінка лікувалась у пологовому будинку з приводу прееклампсії 2 ст. 20 хвилин тому з'явився різкий біль у животі, слабкість, запаморочення, холодний піт на потилиці. При обстеженні: стан хворої тяжкий, бліда, свідомість запаморочена, артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст., пульс - 136/хв. Живіт збільшено вагітною маткою, матка деформована вип'ячуванням у ділянці дна, напружена при пальпації, дуже болісна, серцебиття плоду не вислуховується. Кров'янистих виділень з піхви немає. Встановіть діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Шлункова кровотеча
- ☐ b. Передлежання плаценти
- ☐ c. Розрив матки
- ☐ d. Передчасне відшаровування нормально розташованої плаценти
- ☐ e. Загроза розриву матки


Коментар

Правильна відповідь: Передчасне відшаровування нормально розташованої плаценти

Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Моряк прилетів з Гонконгу. 2 дні температура тіла - 39-41^о С, озноб, пітливість, безсоння. Сьогодні порушилась свідомість. Об'єктивно: у сомнолентному стані з проявами психічного збудження і судом в кінцівках. Легка ригідність потиличних м'язів. Шкіра субіктерична, печінка +3 см. Вкажіть методи діагностики тропічної малярії:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Біологічний метод
- ☐ b. Алергологічні проби
- ☐ с. Мазок і товста крапля крові
- ☐ d. Гемокультура
- ☐ е. Вірусологічні методи


Коментар

Правильна відповідь: Мазок і товста крапля крові

Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В медичну роту механізованої бригади через 12 годин після застосування противником хімічної зброї звернувся уражений. На шкірі тильної сторони лівої кисті спостерігається еритема блідо-рожевого кольору, по краях якої кільцеподібно розташовуються дрібні бульбашки з вмістом янтарно-жовтого кольору. Яка отруйна речовина викликала дане ураження?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Люїзит
- ☐ b. Сі-Ес
- ☐ с. Іприт
- ☐ d. Зарин
- ☐ е. Адамсит

Коментар

Правильна відповідь: Інрит

Питання 124

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 68-ми років виникла зупинка серця. Після інтубації і зовнішнього масажу серця у хворого з'явився пульс, артеріальний тиск - 40/0 мм рт.ст. Яке лікування буде оптимальним? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Призначення еуфіліну
- ☐ б. Призначення альбуміну
- ☐ с. Інфузія сольових розчинів
- ☐ d. Серцеві глікозиди
- ☐ е. Інфузія допаміну

Коментар

Правильна відповідь: Інфузія допаміну

Питання 125

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Зафіксовано клінічну смерть. Яка послідовність реанімаційних заходів?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Заходи реанімації за послідовністю С-А-В
- ☐ б. Заходи реанімації за послідовністю А-В-С
- ☐ с. Покликати спеціаліста з реанімації та почати штучне дихання
- ☐ d. Заходи реанімації за послідовністю А-В-С та дефібриляція
- ☐ е. Заходи реанімації за послідовністю В-А-С

Коментар

Правильна відповідь: Заходи реанімації за послідовністю С-А-В

Питання 126

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 39-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C, озноб, профузне потовиділення. Тиждень тому було переохолодження. Симптом Пастернацького різко позитивний з обох сторін. Дані УЗД: збільшені розміри обох нирок. Аналіз крові: лейкоцити - 12 109/л, ШОЕ- 25 мм/год, е- 2, п- 15, с- 45, л- 30, м- 8. Аналіз сечі: питома вага - 1015, білок - 0,035 г/л, лейкоцити - вкривають все п/з, еритроцити - 8-10 в п/з, слиз +++, бактерії +++. Поставте діагноз: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Амілоїдоз нирок
- ☐ б. Гострий двобічний гломерулонефрит
- ☐ в. Підгострий гломерулонефрит
- ☐ г. Хронічний пієлонефрит
- ☐ д. Гострий двобічний пієлонефрит

Коментар

Правильна відповідь: Гострий двобічний пієлонефрит

Питання 127

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У породіллі 23-х років на 17 добу післяпологового періоду з'явилося відчуття страху, агресії до оточуючих. Зі слів родичів була суїцидальна спроба. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий невроз
- ☐ б. Маніакально-депресивний психоз
- ☐ в. Гострий післяпологовий психоз
- ☐ г. Шизофренія
- ☐ д. Синдром хронічної втоми

Коментар

Правильна відповідь: Гострий післяпологовий психоз

Питання 128

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 1,5 років надійшов до відділення зі скаргами на часте блювання, запах ацетону з рота, млявість, загальмованість. Токсикологічний та епідеміологічний анамнез без особливостей. Об'єктивно: температура тіла 37,1о С, частота дихання - 36/хв., частота серцевих скорочень 134/хв., блідий, ознаки середньо-тяжкого ексикозу, олігоурія. Визначте першочергові обстеження: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Бактеріологічне дослідження блювотних мас і випорожнень
- ☐ б. Глюкоза крові та сечі
- ☐ в. Консультація дитячого ендокринолога
- ☐ г. Ультрасонографічне обстеження органів черевної порожнини
- ☐ е. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини

Коментар

Правильна відповідь: Глюкоза крові та сечі

Питання 129

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дільничний лікар викликаний до хворої 56-ти років, яка скаржилася на озноб, нудоту, одноразову блювоту, підвищення температури тіла до 39оС. При огляді у хворої на шкірі в нижній третині лівої гомілки виявлено болісну, гарячу на дотик еритему з чітким нерівним контуром. Імовірний діагноз: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Бешиха
- ☐ б. Еризипелоїд
- ☐ в. Раптова екзантема
- ☐ г. Флегмона лівої гомілки
- ☐ е. Тромбофлебіт

Коментар

Правильна відповідь: Бешиха

Питання 130

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 65-ти років скаржиться на біль у правій половині обличчя, головний біль, підвищення температури тіла. Хворів 3 дні, захворювання пов'язує з переохолодженням. Об'єктивно: в ділянці правої половини шкіри лоба - запальна гіперемія, набряк. У місцях пухирів - ерозії з некротичним нальотом. По краях вогнища - пухирці з запальною гіперемією. Яка патологія найбільш імовірна? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Червоний плескатий лишай
- ☐ b. Обмороження
- ☐ c. Оперізуєчий лишай
- ☐ d. Дерматит
- ☐ e. Рожа

Коментар

Правильна відповідь: Оперізуєчий лишай

Питання 131

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 34-х років скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, відсутність апетиту. Захворів гостро 2 дні тому на тлі лікування туберкульозу легень. Об'єктивно: на питання відповідає з затримкою, визначається тремор рук, жовтяниця, гепатомегалія. В крові: загальний білірубін - 170 мкмоль/л, непрямий - 90 мкмоль/л, АЛТ - 3,4 ммоль/г л. Який препарат міг спричинити такий стан? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Піразинамід
- ☐ b. Етамбутол
- ☐ c. Індиनावір
- ☐ d. Рифампіцин
- ☐ e. Ізоніазид

Коментар

Правильна відповідь: Ізоніазид

Питання 132

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 14-ти років з феохромоцитомою розвинувся гіпертензивний криз. Який з перерахованих медикаментів є препаратом вибору для лікування гіпертонічного кризу при феохромоцитомі? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ніфедипін
- ☐ b. Гідралазін
- ☐ c. Атенолол
- ☐ d. Фентоламін
- ☐ e. Есмолол

Коментар

Правильна відповідь: Фентоламін

Питання 133

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини захворювання почалося з підвищення температури до 38,0°C та появи висипу. Спочатку висип мав вигляд плям, потім з'явилися пухирці. Під час огляду на шкірі обличчя, тулуба, кінцівок і на волосяній частині голови спостерігається рясний висип: папули, везикули, кірочки. Діагноз: вітряна віспа. Протягом якого періоду дитина має бути ізольована? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ізоляції не потребує
- ☐ b. 14 днів
- ☐ c. До появи останніх висипів
- ☐ d. 21 день
- ☐ e. До 5-го дня після появи останніх висипів

Коментар

Правильна відповідь: До 5-го дня після появи останніх висипів

Питання 134

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 40-ка років, який працює на бензозаправці, скаржиться на сильний головний біль, загальну слабкість, страх, неспокій, слинотечу, блювання, зниження пам'яті, порушення сну, повзання "мушок" по тілу, відчуття волосся в роті. Об'єктивно: пульс - 52/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Температура тіла - 35,6о С. Тремор пальців рук, нестійкість в позі Ромберга, атактична хода, підвищення сухожилкових рефлексів. Ністагм, дизартрія. Ваш попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інтоксикація фосфорорганічними сполуками
- ☐ б. Інтоксикація свинцем
- ☐ в. Інтоксикація тетраетилсвинцем
- ☐ г. Інтоксикація ртутьорганічними сполуками
- ☐ д. Інтоксикація хлорорганічними сполуками

Коментар

Правильна відповідь: Інтоксикація тетраетилсвинцем

Питання 135

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Батьки звернулися до лікарні зі скаргами на утруднення дихання у дитини 3-х років, яке розпочалося раптово ввечері після гри з мозаїкою. Об'єктивно: дитина занепокоєна, перелякана, нападоподібний малопродуктивний кашель, експіраторна задишка. Лікарем запідозрене стороннє тіло бронхів. Яка подальша тактика ведення дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Пальцеве видалення стороннього тіла наосліп
- ☐ б. Екстрена бронхоскопія
- ☐ в. Спостереження
- ☐ г. Призначити муколітики
- ☐ д. Призначити протикашльові препарати

Коментар

Правильна відповідь: Екстрена бронхоскопія

Питання 136

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Громадянка з Індії 30-ти років захворіла гостро. Після вживання некип'яченої води з'явилися багаторазові рясні водянисті випорожнення білого кольору, пізніше блювання "фонтаном". Температура тіла - 35,3о С. Шкіра і слизові оболонки сухі, шкіра збирається в складку, яка не розправляється. Афонія. Анурія. Периферичний пульс не визначається. Судоми м'язів. Артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст. Які лабораторні показники треба контролювати у першу чергу? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Рівень калію та натрію у крові
- ☐ б. Активність цитолітичних ферментів у сироватці крові
- ☐ в. Активність кислої та лужної фосфатази
- ☐ г. Активність амілази
- ☐ д. Кількість білка у крові

Коментар

Правильна відповідь: Рівень калію та натрію у крові

Питання 137

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта на 5-ту добу після операції розвинулась клініка тромбоемболії легеневої артерії, раптова коронарна смерть. Який препарат необхідно першочергово призначати для профілактики цього ускладнення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Дезагреганти
- ☐ б. Низькомолекулярні гепарини
- ☐ в. Тромболітики
- ☐ г. Вазотоніки
- ☐ д. Антиферментні засоби

Коментар

Правильна відповідь: Низькомолекулярні гепарини

Питання 138

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 30-ти років під час військової операції одержав удар в голову. Знепритомнів на 10 хвилин. Була нудота. При огляді в лікувальному закладі: заторможений, в'ялий, свідомість порушена - сопор. Задишка. Була одноразова блювота. Анізокорія. Ваш діагноз:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Перелом основи черепа
- ☐ b. Епідуральна гематома
- ☐ c. Перелом II-го шийного хребця
- ☐ d. Гіпертонічний криз
- ☐ e. Струс головного мозку

Коментар

Правильна відповідь: Епідуральна гематома

Питання 139

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

12-річна дівчинка, що спостерігається з приводу хвороби Аддісона, потребує проведення апендектомії. Стан за основним захворюванням компенсований, артеріальний тиск- 95/60 мм рт.ст., вміст натрію сироватки - 125 ммоль/л, калію 4,5 ммоль/л. Який з перерахованих заходів дозволить зменшити ризик розвитку адреналового кризу у цієї пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Відміна мінералокортикоїдів
- ☐ b. Призначення комбінованої антибактеріальної терапії
- ☐ c. Збільшення дози глюкокортикостероїдів
- ☐ d. Зменшення дози глюкокортикостероїдів
- ☐ e. Введення синтетичного аналогу АКТГ


Коментар

Правильна відповідь: Збільшення дози глюкокортикостероїдів

Питання 140

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 34-х років впав з висоти, перелізаючи огорожу. Свідомість і дихання відсутні, пульс на сонних артеріях не пальпується. Свідки стверджують, що постраждалий падав головою вниз. Видимих пошкоджень черепа немає. При виконанні первинних реанімаційних заходів необхідно: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Виконати прекардіальний удар, та провести електричну дефібриляцію
- ☐ б. Забезпечити прохідність дихальних шляхів шляхом виконання потрібного прийому Сафара
- ☐ в. Підняти ноги потерпілого догори
- ☐ г. Забезпечити прохідність дихальних шляхів шляхом відкриття рота і висування нижньої щелепи
- ☐ д. Не чіпати хворого до приїзду бригади швидкої медичної допомоги


Коментар

Правильна відповідь: Забезпечити прохідність дихальних шляхів шляхом відкриття рота і висування нижньої щелепи

Питання 141

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини від матеріносія поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) стан задовільний. Активна, дихальних розладів нема. Печінка на 2 см нижче реберної дуги. Сеча світла, меконій відходить. Які профілактичні заходи треба призначити дитині?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ізоляція дитини, щоб уникнути поширення інфекції
- ☐ б. Скринінг дитини на HBsAg, вакцинація заборонена
- ☐ в. Вакцинація проти гепатиту В на I добі життя
- ☐ г. Скринінг матері на антиген гепатиту В
- ☐ д. Очікувальна тактика, вакцинацію відкласти


Коментар

Правильна відповідь: Вакцинація проти гепатиту В на I добі життя

Питання 142

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 45-ти років скаржиться на появу протягом двох тижнів випорожнень кров'ю більш ніж 12 разів на добу, болю в животі, суглобах; болючі висипи у порожнині рота та нижніх кінцівках, набряк колінних та гомілковостопних суглобів, слабкість, підвищення температури тіла понад 39°C, втрату ваги тіла. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Реактивний артрит
- ☐ b. Ревматоїдний артрит
- ☐ c. Рак прямої кишки
- ☐ d. Неспецифічний виразковий коліт
- ☐ e. Гемороїдальна кровотеча


Коментар

Правильна відповідь: Неспецифічний виразковий коліт

Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора приблизно 72-х років доставлена в клініку бригадою ШМД. Встановлено, що вона страждає на гіпертонічну хворобу протягом 18-ти років. Об'єктивно: обличчя плеторичне, дихання шумне. Артеріальний тиск - 240/140 мм рт.ст., пульс - 110/хв., напружений. Свідомість відсутня. Опущений правий кут рота, щока парусить. Геміплегія справа. Ліквор прозорий. Який метод діагностики необхідно застосувати для верифікації діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Електроенцефалографія
- ☐ b. Реоенцефалографія
- ☐ c. Електронейроміографія
- ☐ d. Комп'ютерна томографія
- ☐ e. Викликані потенціали мозку

Коментар

Правильна відповідь: Комп'ютерна томографія

Питання 144

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На хімічному підприємстві відбувся викид отруйного газу. У всіх працівників, що були у приміщенні, де відбувся викид, через 2-3 хвилини виникли наступні симптоми: задуха змішаного характеру, бронхорея, гіперсалівація, біль у животі, нудота. Пізніше виникли тоніко-клонічні судоби, та порушення свідомості аж до коматозного стану. Яку антидотну терапію слід негайно застосувати для надання допомоги потерпілим?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Адреналін
- ☐ b. Налоксон
- ☐ c. Етиловий спирт
- ☐ d. Глюконат кальцію
- ☐ e. Атропін

Коментар

Правильна відповідь: Атропін

Питання 145

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 25-ти років через 40 хвилин після прийому оксациліну з'явилися захриплість голосу, "гавкаючий" кашель, утруднення дихання із задишкою інспіраторного характеру, задуха. Об'єктивно: хвора неспокійна, метушлива. Дихання шумне, стридорозне. Обличчя ціанотичне. Аускультативно: розсіяні сухі свистячі хрипи. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий фарингіт
- ☐ b. Стороннє тіло трахеї
- ☐ c. Напад бронхіальної астми
- ☐ d. Паратонзиллярний абсцес
- ☐ e. Гострий набряк Квінке

Коментар

Правильна відповідь: Гострий набряк Квінке

Питання 146

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитину 7-ми років в обличчя вкусив домашній сусідський кіт. Через два дні виник пекучий свербіж, краї рани припухлі, гіперемовані. Дитина відмовляється від їжі, вночі часто прокидається і плаче, скаржиться на присутність в кімнаті химерних істот. Об'єктивно: температура тіла - 37,3о С. Дихання часте, шумне. Екзофтальм. Який з методів ранньої діагностики є доцільним? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Виявлення тілець Бабеша-Негрі патогістологічно у структурах мозку
- ☐ б. Виявлення тілець Бабеша-Негрі імунофлуоресцентним методом
- ☐ в. Серологічне дослідження парних сироваток
- ☐ г. Ізоляція і спостереження за твариною
- ☐ д. Виявлення антигена вірусу сказу у відбитках з поверхні рогівки ока

Коментар

Правильна відповідь: Виявлення антигена вірусу сказу у відбитках з поверхні рогівки ока

Питання 147

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 25-річного хворого на цукровий діабет I типу через 1 годину після чергової ін'єкції виникли слабкість, відчуття голоду, пітливість. Через 10 хвилин виникли судоми, втрата свідомості. Під час огляду: непритомний, тонічні та клонічні судоми м'язів. Шкіра волога. Артеріальний тиск - 140/80 мм рт.ст., пульс - 90/хв., ритмічний. Запаху ацетону у повітрі, що видихається, немає. Необхідна перша допомога:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. В/в струменево 40% р-н глюкози 500,0
- ☐ б. В/в крапельно 5% р-н глюкози 500,0
- ☐ в. В/в струменево 40% р-н глюкози 80,0 з 8 ОД інсуліну
- ☐ г. В/в струменево 40% р-н глюкози 40,0
- ☐ д. В/в крапельно 20% р-н глюкози 60,0 з 10 ОД інсуліну

Коментар

Правильна відповідь: В/в струменево 40% р-н глюкози 40,0

Питання 148

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 28-ми років з виразковою хворобою шлунка внаслідок пілоростенозу розвинувся гіпохлоремічний метаболічний алкалоз. Введення фізіологічного розчину не поліпшило стан. Який із наступних засобів необхідно додати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Альбумін
- ☐ б. Гіпертонічний розчин натрію хлориду
- ☐ в. Хлористий калій
- ☐ г. Хлористий кальцій
- ☐ д. Хлористий амоній

Коментар

Правильна відповідь: Хлористий калій

Питання 149

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина від третьої вагітності, перших стрімких пологів, в терміні гестації 34 тижні, масою тіла 2250 г, довжиною 48 см. При огляді тахіпное, періодичне апное, центральний ціаноз, втягіння податливих місць грудної клітки. Запідозрено синдром дихальних розладів (СДР). За якою шкалою оцінити важкість СДР?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Глазго
- ☐ б. SNAPS
- ☐ в. Апгар
- ☐ г. SCORAD
- ☐ д. Сільвермана


Коментар

Правильна відповідь: Сільвермана

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У приймальне відділення лікарні доставлено вагітну жінку (38 тижнів) з клінікою гострого ілеофemorального тромбозу. Який із вказаних симптомів найбільше відповідає даному захворюванню?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Нудота і блювання
- ☐ b. Біль у паховій ділянці
- ☐ c. Гектична температура
- ☐ d. Набряк стегна і гомілки
- ☐ e. Набряк гомілки


Коментар

Правильна відповідь: Набряк стегна і гомілки

Питання 151

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець 30-ти років одержав одноразову дозу випромінювання 15 Гр. на радіоактивно забрудненій території. З'явилися скарги на стискаючий головний біль, підвищення температури тіла, нудота, дворазове блювання. Клініка якої форми гострої променевої хвороби розвивається у цієї людини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Токсемічної
- ☐ b. Кістково-мозкової, середнього ступеня тяжкості
- ☐ c. Церебральної
- ☐ d. Кістково-мозкової, дуже тяжкого ступеня
- ☐ e. Кишкової

Коментар

Правильна відповідь: Кишкової

Питання 152

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Ви йшли вулицею та побачили людину, що лежить на землі, та стали свідком нападу генералізованих тоніко-клонічних судом. Яка перша допомога під час генералізованого судомного нападу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. На вулиці не робити нічого
- ☐ b. Вжити заходів, щоб попередити травматизацію хворого
- ☐ c. Вкласти пацієнта з піднятим головним кінцем
- ☐ d. За наявності, ввести розчин діазепаму внутрішньовенно
- ☐ e. Покласти між зубами твердий предмет


Коментар

Правильна відповідь: Вжити заходів, щоб попередити травматизацію хворого

Питання 153

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В приймальне відділення доставлено хворого 45-ти років з двобічним запаленням легень. Стан вкрай важкий: без свідомості, пульс не визначається, на ЕКГ - фібриляція шлуночків. Ваші першочергові дії:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення хлориду кальцію
- ☐ b. Введення лідокаїну
- ☐ c. Введення адреналіну гідрохлориду
- ☐ d. Електрична дефібриляція
- ☐ e. Введення гідрокарбонату натрію

Коментар

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

Питання 154

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У ВРІТ інфекційної лікарні госпіталізовано хворого 26-ти років з діагнозом менінгококова інфекція, менінгококцемія, тяжкий перебіг, ІТШ I-II ступеня. Призначено етіотропну та патогенетичну терапію (в тому числі і плазму). Визначте необхідність з'ясування групової належності крові донора та реципієнта:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Обов'язкова за будь-яких умов
- ☐ б. Не обов'язкова при переливанні малих доз
- ☐ в. Не обов'язкова при відомій однокрупній реципієнта
- ☐ г. Обов'язкова при переливанні великих доз
- ☐ д. Не обов'язкова за будь-яких умов


Коментар

Правильна відповідь: Обов'язкова за будь-яких умов

Питання 155

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На виробництві з виготовлення пластмасових контейнерів відбулась аварія. Через 1 годину після цього працівник звернувся до медичного пункту зі скаргами на шум у вухах, головний біль, запаморочення, загальну слабкість, підвищення температури тіла до фебрильної, слинотечу та пронос, сірий відтінок шкірних покривів. Через півтори години звернулись ще 6 працівників зі схожою клінікою. У всіх постраждалих в крові було виявлено метгемоглобінемію. Яка речовина найбільш імовірно викликала таке отруєння?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Монооксид вуглецю
- ☐ б. Синильна кислота
- ☐ в. Аміак
- ☐ г. Сірководень
- ☐ д. Похідні фенолу

Коментар

Правильна відповідь: Похідні фенолу

Питання 156

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого на цукровий діабет розвинувся коматозний стан. При лабораторному обстеженні виявлено: глюкоза - 65 ммоль/л, рН крові - 7,35, осмолярність крові - 390 мосм/кг, К⁺ - 2,2 ммоль/л, ацетон 12 ммоль/л. Яке найбільш імовірне метаболічне порушення є причиною коми хворого: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіперосмолярність
- ☐ b. Гіпокаліємія
- ☐ c. Ацидоз
- ☐ d. Кетонемія
- ☐ e. Гіперкаліємія

Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярність

Питання 157

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 69-ти років схопилась за груди і раптово впала. Свідомість, дихання та серцева діяльність відсутні. Який імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Раптова коронарна смерть
- ☐ b. Гіпертонічний криз
- ☐ c. Кардіологічний шок
- ☐ d. набряк легень
- ☐ e. Колапс

Коментар

Правильна відповідь: Раптова коронарна смерть

Питання 158

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У приймальне відділення звернувся хворий 31-го року зі скаргами на гострий біль у попереку справа та правій половині живота. Біль віддавав у праву пахову область та яєчко. Відзначається нудота, блювання, часті позиви до сечовипускання. В аналізі сечі - гематурія. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ниркова коліка справа
- ☐ b. Гострий пієлонефрит
- ☐ c. Гіпернефрома правої нирки
- ☐ d. Гострий апендицит
- ☐ e. Гострий орхоепідидиміт


Коментар

Правильна відповідь: Ниркова коліка справа

Питання 159

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 24-х років госпіталізований до лікарні без свідомості. Зі слів дружини, захворів учора ввечері, коли з'явився сильний головний біль, підвищилась температура до 40°C, спостерігалось багаторазове блювання, сьогодні вранці втратив свідомість. При огляді визначаються позитивні менингеальні симптоми, на шкірі кінцівок поодинокі геморагічна висипка. Температура - 40,5°C, АТ-130/85 мм рт.ст. Яке дослідження дозволить уточнити діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Люмбальна пункція
- ☐ b. Глюкоза крові
- ☐ c. Загальний аналіз крові
- ☐ d. Рентгенологічне дослідження голови
- ☐ e. Сечовина крові


Коментар

Правильна відповідь: Люмбальна пункція

Питання 160

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Рядовий 19-ти років помилково зробив 2 ковтки антифризу, після чого з'явилися запаморочення, слабкість, похитування при ході. Викликав блювання, випив розчин питної соди. Було проведено зондове промивання шлунку. Об'єктивно: стан задовільний, свідомість не порушена, обличчя гіперемоване, ін'єкція склер. Пальце-носову пробу виконує невпевнено. Над легеньми дихання везикулярне. Межі серця не змінені, серцеві тони звучні, ритмічні. Частота серцевих скорочень - 90/хв., артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Живіт м'який, трохи болючий у епігастрії. Печінка біля краю реберної дуги. Набряків нема. Який наступний крок у наданні допомоги потерпілому? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Сольове проносне, перфеназин в/м
- ☐ б. Строфантин в/в
- ☐ в. Преднізолон в/м
- ☐ г. Етиловий спирт в/в
- ☐ д. Атропіну сульфат в/в, фуросемід в/в


Коментар

Правильна відповідь: Етиловий спирт в/в

Питання 161

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 46-ти років надійшов зі скаргами на сухий кашель, задишку, яка посилюється в положенні лежачи, вкритий холодним потом. Об'єктивно: частота дихання - 30/хв., артеріальний тиск - 180/100 мм рт.ст., С_{ор} - тони глухі, акцент II тону над легеневою артерією, ритм галопу, над легеньми - жорстке дихання, в н/відділах сухі та вологі дрібнопухирцеві хрипи. Який попередній діагноз більш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ б. Астматичний статус
- ☐ в. Набряк легень
- ☐ г. Неускладнений гіпертензивний криз
- ☐ д. Ішемічна кардіоміопатія

Коментар

Правильна відповідь: Набряк легень

Питання 162

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 59-ти років з пухлиною лівої легені при проведенні під інтубаційним наркозом операції (торакотомії з видаленням легені) відбулася зупинка роботи серця. Що необхідно провести першочергово?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Провести прямий масаж серця
- ☐ б. Продовжувати проведення операції
- ☐ в. Ввести в/в атропін
- ☐ г. Ввести в/в адреналін
- ☐ д. Провести непрямий масаж серця

Коментар

Правильна відповідь: Провести прямий масаж серця

Питання 163

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта 72-х років три дні тому з'явився помірний біль в животі постійного характеру, який поступово став переймоподібним. Причину захворювання пов'язує з вживанням великої кількості мучної їжі. За останні 2 години блювання коричневого кольору з неприємним фекальним запахом. Стілець відсутній. Живіт здутий, м'який, болючий в нижній половині. Симптоми подразнення очеревини відсутні. Перистальтика посилена, звучна. В правій здухвинній ділянці нечіткий інфільтрат. Позитивний симптом Склєрова. Ректально - болючості, нависання немає, на рукавичці слиз. Ваш попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий гастроентерит
- ☐ б. Гострий панкреатит
- ☐ в. Апендикулярний інфільтрат
- ☐ г. Защемлена грижа
- ☐ д. Гостра обтураційна кишкова непрохідність


Коментар

Правильна відповідь: Гостра obturacійна кишкова непрохідність

Питання 164

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 62-х років вагою 75 кг після фізичного навантаження на виробництві відчув біль за грудиною, нестачу повітря. За 2 хвилини втратив свідомість і відбулася зупинка дихання. Пульс на сонних артеріях пальпується. Лікар медпункту розпочав ШВЛ методом "рот у рот". Який дихальний об'єм оптимальний у даній ситуації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. D. 1000-1200 мл
- ☐ b. E. 1200-1400 мл
- ☐ c. A. 500-600 мл
- ☐ d. B. 100-200 мл
- ☐ e. C. 300-400 мл


Коментар

Правильна відповідь: A. 500-600 мл

Питання 165

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 65-ти років скаржиться на інтенсивний біль за грудиною пекучого, стискаючого характеру з іррадіацією в ліву руку. Біль виник 1 годину тому після психоемоційного перенапруження. Хворий самостійно прийняв декілька пігулок нітрогліцерину сублінгвально, але больові відчуття не змінились. Який засіб слід використати для послаблення болю?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Аспірин per o
- ☐ b. Нітрогліцерин сублінгвально додатково
- ☐ c. Баралгін в/м
- ☐ d. Морфін в/в
- ☐ e. Анальгін в/м


Коментар

Правильна відповідь: Морфін в/в

Питання 166

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 32-х років під час підйому важкого предмету відчув гострий біль у попереку, який віддавав по задньолатеральній поверхні лівого стегна, гомілки до IV-V пальців ступні. При огляді: відсутність лівого ахілового рефлексу, зниження чутливості по латеральному краю ступні зліва, гострий біль в точках Валле зліва. Який попередній діагноз можна встановити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вертеброгенна S 1 радикулопатія зліва
- ☐ b. Вертеброгенна L 3 радикулопатія зліва
- ☐ c. Люмбалгія
- ☐ d. Люмбоішіалгія зліва
- ☐ e. Люмбаго


Коментар

Правильна відповідь: Вертеброгенна S 1 радикулопатія зліва

Питання 167

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 10 місяців. Скарги на підвищення $t_{\text{о}}$ - 38,0°C, повторне блювання, пронос, відсутність апетиту. Дитина млява, виражена спрага. Шкіра бліда, еластичність знижена. Слизова рота волога.

Піднебінні дужки гіперемовані. Носове дихання утруднене, мізерні слизові виділення. Живіт здутий, помірна болючість, бурчання. Випорожнення за добу 10 разів, рясні, водянисті, жовто-зеленкуваті, без патологічних домішок. Незначна олігоурія. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ешерихіоз ентеропатогенний, типова середньотяжка форма
- ☐ b. Сальмонельоз, гастроентероколітична середньотяжка форма
- ☐ c. Шигельоз, типова середньотяжка форма
- ☐ d. Холера, атипова середньотяжка форма
- ☐ e. Ротавірусна інфекція, типова середньо-тяжка форма


Коментар

Правильна відповідь: Ротавірусна інфекція, типова середньо-тяжка форма

Питання 168

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота спостерігаються кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Остання менструація 2 місяці тому. При бімануальному огляді матка збільшена до 5-6 тижнів вагітності, болісна при пальпації. При огляді шийки матки в дзеркалах виявлено: шийка вкорочена. В каналі шийки матки визначаються елементи плідного яйця та згортки крові.

Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Викидень в ходу
- ☐ б. Викидень, що розпочався
- ☐ в. Повний мимовільний викидень
- ☐ г. Неповний мимовільний викидень
- ☐ д. Загроза переривання вагітності


Коментар

Правильна відповідь: Викидень в ходу

Питання 169

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 64-х років 2 місяці тому перенесла ішемічний інсульт у басейні лівої середньо-мозкової артерії, внаслідок чого розвинувся помірний парез правої ноги, періодично турбували посмикування у правій стопі. Протягом години у хворої спостерігаються клонічні судороги в правій нозі, що періодично розповсюджуються на праву руку й праву частину обличчя. Діагноз: епістатус парціальних моторних нападів. Перша допомога:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Карбамазепін перорально
- ☐ б. Введення гіпотензивних препаратів під контролем АТ
- ☐ в. Введення еуфіліну в/в
- ☐ г. Введення вазоактивних препаратів
- ☐ д. Введення діазепаму в/в


Коментар

Правильна відповідь: Введення діазепаму в/в

Питання 170

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого лихоманка 38-39°C протягом 6-ти днів, головний біль, біль в м'язах, жовтяниця, носова кровотеча, олігоурія. Лейкоцити крові - 16,5 10⁹/л, ШОЕ- 52 мм/год, аналіз сечі: білок - 0,125 г/л, лейкоцити - 15-20 в полі зору, еритроцити - 5-8 в полі зору, циліндри гіалінові - 2-3. Ваш діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Сепсис
- ☐ б. Геморагічна гарячка
- ☐ в. Гострий пієлонефрит
- ☐ г. Гострий гломерулонефрит
- ☐ д. Лептоспіроз


Коментар

Правильна відповідь: Лептоспіроз

Питання 171

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 26-ти років звернувся в поліклініку зі скаргами на наявність крові у випорожненнях, іноді із домішками слизу. Хворіє протягом кількох років, регулярно не лікувався. 3 роки тому під час амбулаторного обстеження виконане Рo товстої кишки. На рентгенограмі виявлено звуження просвіту низхідного відділу товстої кишки (симптом "струни") з розширенням попередньої ділянки. Про яке захворювання йдеться? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Синдром подразненої товстої кишки
- ☐ б. Хворобу Крона
- ☐ в. Вторинний ентероколіт
- ☐ г. Ішемічний коліт
- ☐ д. Неспецифічний виразковий коліт


Коментар

Правильна відповідь: Хворобу Крона

Питання 172

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Поранений з мінно-вибуховою травмою доставлений з поля бою в мобільний госпіталь у стані шоку. Пульс на променевій артерії не визначається. Артеріальний тиск - 50/0 мм рт.ст. Які першочергові заходи мають бути здійснені на цьому етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Крапельна інфузія 0,9% розчину NaCl межах подвоєної добової потреби в рідині
- ☐ b. Швидке внутрішньовенне введення колоїдно-кристалоїдних розчинів
- ☐ c. Внутрішньовенна інфузія фенілефрину до відновлення пульсу на променевій артерії
- ☐ d. Ультразвукове дослідження черевної та плевральних порожнин для виключення кровотечі
- ☐ e. Внутрішньом'язово ввести 1 мл адреналіну, повторити через 5 хвилин в разі неефективності


Коментар

Правильна відповідь: Швидке внутрішньовенне введення колоїдно-кристалоїдних розчинів

Питання 173

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На 5-ту добу після проведення штучного аборт у терміні 8-9 тижнів вагітності у жінки з'явився озноб, біль внизу живота, підвищення температури тіла до 39°C, гнійні виділення з піхви. Яке ускладнення проведеної операції можна припустити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Сальпінгоофорит
- ☐ b. Ендометрит
- ☐ c. Гематометра
- ☐ d. Кольпіт
- ☐ e. Субінволюція матки


Коментар

Правильна відповідь: Ендометрит

Питання 174

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна у 41 тиждень вагітності готується до екстреного оперативного втручання під загальним знеболенням. При інтубації трахеї виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів, але в подальшому виник ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, з'явилися вологі хрипи. Яка причина такого стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Шок
- ☐ b. Аспірація кислого шлункового вмісту
- ☐ c. Інфаркт міокарду
- ☐ d. набряк легенів
- ☐ e. Емболія навколоплідними водами


Коментар

Правильна відповідь: Аспірація кислого шлункового вмісту

Питання 175

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 2-х років одразу після вживання в їжу морської риби з'явилися виражений набряк обличчя та язика, інспіраторна задишка, осиплість голосу, дифузний ціаноз, стридорозне дихання, яке періодично змінюється апное. Якими будуть першочергові невідкладні заходи?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Конікотомія
- ☐ b. Дегідратуюча терапія
- ☐ c. Промивання шлунка
- ☐ d. Оксигенотерапія через носові катетери
- ☐ e. Введення глюкокортикостероїдів

Коментар

Правильна відповідь: Конікотомія

Питання 176

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна у терміні 37 тижнів доставлена своїм транспортом зі скаргами на сильний головний біль, погіршення зору, слуху. Об'єктивно: анасарка, артеріальний тиск 220/120 мм рт.ст., сечовина - 30 ммоль/л, білок сечі - 6,6 г/л, Hb- 90 г/л. У приймальному покої з'явились посмикування м'язів обличчя, які перейшли у тонічні та клонічні судоми, втратила свідомість. В свідомість прийшла через 2 хвилини. Який діагноз у вагітної?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Уремична кома
- ☐ b. Епілептичний напад
- ☐ c. Гестаційна гіпертензія
- ☐ d. Еклампсія
- ☐ e. Прееклампсія тяжкого ступеню

Коментар

Правильна відповідь: Еклампсія

Питання 177

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

28-річну жінку з терміном вагітності 23-24 тижні було доставлено у відділення інтенсивної терапії пологового будинку. Пацієнтка в стані геморагічного шоку через вагінальну кровотечу, зумовлену передчасним відшаруванням плаценти. Анамнез зібрати не вдається через важкість стану. Зі слів родичів, вагітність перша, до цього моменту протікала без особливостей. Однак вагітна страждає на артеріальну гіпертензію II ст. Об'єктивно: свідомість відсутня, пульс ниткоподібний, артеріальний тиск виміряти не вдається. Через 2 хвилини після надходження на кардіомоніторі зафіксовано фібриляцію шлуночків. негайно розпочато компресії грудної клітки. Подальші першочергові дії лікаря:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення адреналіну, дефібриляція протипоказана
- ☐ b. Введення окситоцину, електрична дефібриляція
- ☐ c. Проведення електричної дефібриляції
- ☐ d. Проведення медикаментозної кардіоверсії
- ☐ e. Переливання резус-сумісної крові


Коментар

Правильна відповідь: Проведення електричної дефібриляції

Питання 178

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої на цукровий діабет II типу розвинулась гіперосмолярна кома. Глікемія - 45 ммоль/л, калій - 4,4 ммоль/л, натрій 158 ммоль/л, рН крові - 7,24, стандартний бікарбонат - 20 ммоль/л, зсув буферних основ - 4 ммоль/л, сечовина - 12 ммоль/л. Які засоби необхідно використати для регідратаційної терапії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 5% розчин глюкози
- ☐ б. 2,5% розчин глюкози
- ☐ с. 4% розчин натрію гідрокарбонату
- ☐ d. 0,45% розчин натрію хлориду
- ☐ е. 0,9% розчин натрію хлориду


Коментар

Правильна відповідь: 0,45% розчин натрію хлориду

Питання 179

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 40-ка років доставлений в стаціонар непритомним у стані алкогольного сп'яніння. Після госпіталізації і переведення до палати звернули увагу на синюшність його шкіри та слизових. Самостійне дихання утруднене. Моніторинг не проводився в зв'язку з відсутністю апаратури стеження. Яка найбільш імовірна причина отриманого ускладнення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Аспіраційний синдром
- ☐ б. Порушення рухливості грудної клітки
- ☐ с. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ d. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ е. Зупинка серця

Коментар

Правильна відповідь: Аспіраційний синдром

Питання 180

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В хірургічному відділенні протягом 5-ти годин хворому з кровотечею з 12-палої кишки перелито близько 1 л еритроцитарної маси (взята 3 доби тому), яка сумісна за групою та резус фактором та після проведення біологічної проби. Після цього у хворого виникли тремор, судоми, прискорення пульсу, аритмія, знизився артеріальний тиск. У хворого діагностована цитратна інтоксикація. Що необхідно зробити для її попередження?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. На кожні 100 мл консервованої крові вводити 5 мл 10% кальцію хлориду
- ☐ b. На кожні 500 мл консервованої крові вводити 5 мл 10% кальцію хлориду
- ☐ c. На кожні 500 мл консервованої крові вводити 5 мл 1% кальцію хлориду
- ☐ d. На кожні 200 мл консервованої крові вводити 5 мл 10% кальцію хлориду
- ☐ e. На кожні 500 мл консервованої крові вводити 10 мл 10% кальцію хлориду

Коментар

Правильна відповідь: На кожні 500 мл консервованої крові вводити 5 мл 10% кальцію хлориду

Питання 181

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 58-ми років, що переніс Q-інфаркт міокарда, з'явилися напади серцебиття, що супроводжуються задишкою, болем за грудиною, загальною слабкістю. Об'єктивно: акроціаноз, пульс- 160/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 105/65 мм рт.ст., тони серця ослаблені. На ЕКГ: зубці Р відсутні, QRS - деформовані, розширені 0,14 с., зубці Т направлені в протилежну сторону від QRS. Яке порушення ритму розвинулося в хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Синусова тахікардія
- ☐ b. Пароксизмальна форма фібриляції передсердь
- ☐ c. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

- ☐ d. Пароксизмальна надшлуночкова тахікардія
- ☐ e. Фібриляція шлуночків


Коментар

Правильна відповідь: Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

Питання 182

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 11-ти місяців на тлі гострої респіраторної інфекції виник генералізований судомний напад тривалістю до 4-х хвилин. При огляді шкіра гіперемована, гаряча, суха на дотик, температура тіла 39,9оС. Вогнищевої неврологічної симптоматики не відзначається, ЕЕГ - варіант норми. В крові: Hb- 129 г/л, Са - 2,4 ммоль/л, глюкоза - 6,0 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Епілепсія
- ☐ b. Менінгіт
- ☐ c. Гіпоглікемія
- ☐ d. Фебрильні судоми
- ☐ e. Спазмофілія


Коментар

Правильна відповідь: Фебрильні судоми

Питання 183

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 50-ти років, яка хворіє більше 10-ти років на гіпертонічну хворобу, доставлена в лікарню зі скаргами на головний біль, важкість в потиличній ділянці, нудоту, підйом артеріального тиску до 210/100 мм рт.ст., тупий біль в ділянці серця. На ЕКГ - синусова тахікардія, ознаки гіпертрофії лівого шлуночка. Ваш попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Неускладнений гіпертензивний криз
- ☐ b. Гостра гіпертензивна енцефалопатія
- ☐ c. Тиреотоксичний криз

- ☐ d. Ускладнений гіпертензивний криз
- ☐ e. Симпато-адреналовий криз


Коментар

Правильна відповідь: Неускладнений гіпертензивний криз

Питання 184

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 35-ти років з 16 років страждає на генералізовані судомні напади, з 21 року епізоди психомоторного збудження із дезорієнтацією і люттю, прогресує зниження пам'яті. Тридцять хвилин тому напад тоніко-клонічних судом із нетриманням сечі. Після нього була дезорієнтована, намагалася бігти. Десять хвилин тому повторний напад. Під час огляду лежить нерухома, майже не реагує на зовнішні подразники, слабка мімічна реакція на біль. Які заходи необхідно вжити для попередження розвитку епілептичного статусу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Внутрішньовенно ввести натрію оксибутират
- ☐ b. Внутрішньом'язово ввести магнію сульфат
- ☐ c. Внутрішньовенно ввести діазепам
- ☐ d. Внутрішньом'язово ввести натрію тіопентал
- ☐ e. Ввести в клізмі хлоралгідрат


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенно ввести діазепам

Питання 185

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після завершення бою виявлено, що внаслідок підриву будови після обвалу бетонних конструкцій боєць 59-ти років пролежав, завалений бетонним перекриттям на ліву нижню кінцівку, 8 годин. При огляді в госпіталі виявлено: різкий набряк обох ніг, множинні переломи лівого стегна і гомілки.

Пульсація в дистальних відділах лівої нижньої кінцівки не визначається, сеча червоного кольору.

Ваша тактика:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Лампасні розтини стегна і гомілки

- ☐ b. Відновлення прохідності магістральних судин
- ☐ c. Ампутація лівої кінцівки в в/3 стегна
- ☐ d. Металоостеосинтез стрижневими апаратами лівого стегна і гомілки
- ☐ e. Лікування переломів методом скелетного витягання


Коментар

Правильна відповідь: Ампутація лівої кінцівки в в/3 стегна

Питання 186

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини після забезпечення прохідності дихальних шляхів з'явилося адекватне самостійне дихання, частота дихання - 40/хв., частота серцевих скорочень - 102/хв., акроціаноз. Ваші наступні дії:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Непрямий масаж серця
- ☐ b. Дитина не потребує подальшого спостереження
- ☐ c. ШВЛ 100% киснем
- ☐ d. Дати кисень через лицеву маску
- ☐ e. ШВЛ шляхом інтубації трахеї


Коментар

Правильна відповідь: Дати кисень через лицеву маску

Питання 187

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 29-ти років госпіталізований у коматозному стані. Тиждень тому зменшив дозу інсуліну. Зі слів родичів стан погіршився. З'явилися спрага, нудота, блювання. Об'єктивно: непритомний, шкіра суха, тургор знижений. Дихання Куссмауля. Артеріальний тиск - 90/55 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Глікемія - 30,3 ммоль/л, глюкозурія. Реакція сечі на ацетон позитивна. Яка лікувальна тактика ведення хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гемодіаліз

- ☐ b. Інсулінотерапія інсуліном короткої дії, дегідратація
- ☐ c. Інсулінотерапія інсуліном короткої дії, регідратація
- ☐ d. Інсулінотерапія інсуліном короткої та тривалої дії
- ☐ e. Інсулінотерапія інсуліном тривалої дії, регідратація


Коментар

Правильна відповідь: Інсулінотерапія інсуліном короткої дії, регідратація

Питання 188

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 21-го року хворіє на цукровий діабет з лабільним перебігом. Мало місце порушення в прийомі їжі. Госпіталізована без свідомості. Отримує інсулін вранці 24 ОД і ввечері 20 ОД. Напередодні почувала себе задовільно. Об'єктивно: свідомість відсутня, шкіра волога, тонус м'язів кінцівок підвищений. Тризм жувальних м'язів. Язик вологий, прикусу немає. Пульс - 95/хв., артеріальний тиск - 130/80 мм рт.ст. Менінгеальні симптоми відсутні. Попередній діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіперосмолярна кома
- ☐ b. Гіпоглікемічна кома
- ☐ c. Молочнокисла кома
- ☐ d. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ e. Кетоацидотична кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіпоглікемічна кома

Питання 189

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 50-ти років, що перебуває у відділенні інтенсивної терапії з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. На кардіомоніторі реєструється фібриляція шлуночків. Для відновлення ритму може бути застосовано: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Різкий поштовх в ділянку епігастрія

- ☐ b. Проведення електричної дефібриляції
- ☐ c. Масаж ділянки каротидного синуса
- ☐ d. Перкусійний масаж
- ☐ e. Масаж очних яблук


Коментар

Правильна відповідь: Проведення електричної дефібриляції

Питання 190

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 30-ти років помилково випила кілька ковтків оцтової есенції. Після надходження до лікарні на наступну добу в неї знизився діурез, сеча набула червоно-коричневого кольору. Причиною ураження нирок в цій ситуації є:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Шлункова кровотеча
- ☐ b. Метаболічний ацидоз
- ☐ c. Гострий гемоліз
- ☐ d. Дегідратація
- ☐ e. Пряма дія оцтової кислоти


Коментар

Правильна відповідь: Гострий гемоліз

Питання 191

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 23-х років скаржиться на підвищення температури тіла до 39,5°C, наростаючий головний біль з нудотою та блюванням. Захворювання розвинулось гостро протягом 2 днів. Об'єктивно: виявляються оболонкові симптоми (ригідність шийних м'язів, симптом Керніга), підвищені сухожилкові рефлексії, черевні знижені. Цереброспінальна рідина каламутна, гнійна, витікає під підвищеним тиском, виявляється нейтрофільний плеоцитоз, підвищений вміст білка, знижений рівень цукру та хлоридів. Спостерігається гіперлейкоцитоз крові та збільшення ШОЕ. Ваш діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Менінгококовий менінгіт
- ☐ b. Герпетичний менінгіт
- ☐ c. Ентеровірусний менінгіт
- ☐ d. Субарахноїдальний крововилив
- ☐ e. Туберкульозний менінгіт


Коментар

Правильна відповідь: Менінгококовий менінгіт

Питання 192

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 36-ти років систематично вживає алкоголь. На п'ятий день після чергового запою вночі заявив рідним, що в кімнаті повнісінько мишей і пацюків, був збудженим, дезорієнтованим в місці, відчував страх. Температура- 37,8о С, частота серцевих скорочень- 120/хв., артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст. Визначте попередній діагноз захворювання:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Абстинентний синдром
- ☐ b. Патологічне сп'яніння
- ☐ c. Інфекційний психоз
- ☐ d. Алкогольний делірій
- ☐ e. Психоз виснаження


Коментар

Правильна відповідь: Алкогольний делірій

Питання 193

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий зловживає спиртними напоями, останню добу алкоголь не вживав. Скаржиться на сухість у роті, біль у ділянці серця, блювання, кошмарні сновидіння. Об'єктивно: обличчя бліде, виразний тремор пальців рук і язика, хода некоординована, настрій різко знижений з суїцидальними думками, дратівливість. Спостерігався одиничний великий судомний напад. Визначте психопатологічний синдром:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дисморфоманічний
- ☐ b. Диссомнічний
- ☐ c. Істеричний
- ☐ d. Абстиненційний
- ☐ e. Епілептичний


Коментар

Правильна відповідь: Абстиненційний

Питання 194

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 15-ти років доставлений зі скаргами на головний біль, запаморочення, блювання, а також появу множинних синців на шкірі, асиметрію очних щілин, згладженість лівої носової складки, девіацію язика вправо. Спостерігається позитивний симптом Керніга зліва. В аналізі крові на сито: тромбоцити - 55, 5 109/л. Яке ускладнення тромбоцитопенічної пурпури має місце?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Мікроангіотромбоз
- ☐ b. Геморагічний шок
- ☐ c. Тромбоемболія
- ☐ d. Геморагічний інсульт
- ☐ e. Ішемічний інсульт


Коментар

Правильна відповідь: Геморагічний інсульт

Питання 195

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Працівник АЕС зі стажем роботи 15 років звернувся до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, підвищену втомлюваність, головний біль, поганий сон, поганий апетит. При обстеженні: анізорефлексія сухожилкових та черевних рефлексів, незначна атаксія при пробі Ромберга; напади пароксизмальної тахікардії з підвищенням температури та похолоданням кінцівок. На ЕКГ -

знижений вольтаж зубців Р і Т, АТ знижений. В крові: кількість лейкоцитів - 1,5 Г/л, нейтропенія, лімфоцитопенія. ШКТ - кислотність шлункового вмісту знижена, спостерігаються диспепсичні розлади. Який попередній діагноз в даного хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Астенічний синдром
- ☐ b. Хронічна променева хвороба
- ☐ c. Синдром хронічної втоми
- ☐ d. Гостра променева хвороба тяжкого ступеня
- ☐ e. Нейроциркуляторна дистонія


Коментар

Правильна відповідь: Хронічна променева хвороба

Питання 196

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 56-ти років протягом 50-ти годин перебуває на штучній вентиляції легень, що проводиться через ендотрахеальну трубку, у нього сильна лихоманка, артеріальний тиск - 85/40 мм рт.ст., частота серцевих скорочень- 120/хв., PaO_2/FiO_2 - 260 мм рт.ст., центральний венозний тиск 12 мм вод.ст., лейкоцитоз (18 Г/л), паличкоядерний зсув (18%). Якій причині сепсису відповідає даний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вентилятор-асоційована пневмонія
- ☐ b. Інтраабдомінальний сепсис
- ☐ c. Гострий безкам'яний холецистит
- ☐ d. Синусит
- ☐ e. Інфекція, пов'язана з центральним венозним катетером


Коментар

Правильна відповідь: Вентилятор-асоційована пневмонія

Питання 197

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 11-ти місяців спостерігаються адинамія, фебрильна температура, кашель, ціаноз, дистантні хрипи. Частота дихання - 90/хв. Фізикальні дані: перкуторно - коробковий звук, аускультативно - жорстке дихання, тотальні дрібноміхурцеві хрипи. 20 хвилин проводилась інсуфляція 100% кисню через маску. Рентгенологічно - ознаки емфіземи. В артеріальній крові: РаО₂ - 55 мм рт.ст., рН-7,1. З чого доцільно розпочати терапію? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Киснева маска з інфузією глюкокортикоїдів
- ☐ b. Гіпербарична оксигенація
- ☐ c. Інгаляція й інфузія глюкокортикоїдів і амброксолу
- ☐ d. Киснева палатка з інгаляцією амброксолу
- ☐ e. Штучна вентиляція легень

Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 198

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При огляді дівчинка 7-ми років непритомна. Шкіра та слизові блідо-ціанотичні. Екскурсій грудної клітки немає. Пульс на магістральних артеріях не визначається. Ваша тактика: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Викликати "швидку"
- ☐ b. Покликати на допомогу педіатра
- ☐ c. Констатувати смерть та викликати поліцію
- ☐ d. Розпочати серцево-легеневу реанімацію
- ☐ e. Почати внутрішньовенне введення ліків

Коментар

Правильна відповідь: Розпочати серцево-легеневу реанімацію

Питання 199

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі 36-ти років, яка перебуває в кінці I періоду пологів з великим плодом, з'явилися потуги при високому розташуванні голівки плода, відсутність поступального руху голівки, позитивний симптом Генкеля-Вастена, симптоми вдавнення сечового міхура. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Фізіологічний I період пологів
- ☐ b. Слабкість пологової діяльності
- ☐ c. Патологічний преліментарний період
- ☐ d. Дискоординована пологова діяльність
- ☐ e. Клінічно вузький таз


Коментар

Правильна відповідь: Клінічно вузький таз

Питання 200

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У лікаря, який оглянув хворих з високою температурою на півдні Судану, виникли лихоманка, головний біль, біль у м'язах і суглобах, загальна слабкість, пронос. На 4-й день хвороби на тілі з'явився макуло-папульозний висип, 5-й день - криваве блювання, мелена, гіпотонія. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Малярія
- ☐ b. Лептоспіроз
- ☐ c. Псевдотуберкульоз
- ☐ d. Лихоманка Ебола
- ☐ e. Висипний тиф

Коментар

Правильна відповідь: Лихоманка Ебола

[Завершити перегляд](#)

[Пропустити](#) Перехід по тесту

[Перехід по тесту](#)

[Питання 1 На цій сторінці](#) [Питання 2 На цій сторінці](#) [Питання 3 На цій сторінці](#) [Питання 4 На цій сторінці](#) [Питання 5 На цій сторінці](#) [Питання 6 На цій сторінці](#) [Питання 7 На цій сторінці](#) [Питання 8 На цій сторінці](#) [Питання 9 На цій сторінці](#) [Питання 10 На цій сторінці](#) [Питання 11 На цій сторінці](#) [Питання 12 На цій сторінці](#) [Питання 13 На цій сторінці](#) [Питання 14 На цій сторінці](#) [Питання 15 На цій сторінці](#) [Питання 16 На цій сторінці](#) [Питання 17 На цій сторінці](#) [Питання 18 На цій сторінці](#) [Питання 19 На цій сторінці](#) [Питання 20 На цій сторінці](#) [Питання 21 На цій сторінці](#) [Питання 22 На цій сторінці](#) [Питання 23 На цій сторінці](#) [Питання 24 На цій сторінці](#) [Питання 25 На цій сторінці](#) [Питання 26 На цій сторінці](#) [Питання 27 На цій сторінці](#) [Питання 28 На цій сторінці](#) [Питання 29 На цій сторінці](#) [Питання 30 На цій сторінці](#) [Питання 31 На цій сторінці](#) [Питання 32 На цій сторінці](#) [Питання 33 На цій сторінці](#)

Журнал оцінок

[Загальне](#)

[Секція 1](#)

[Секція 2](#)

[Секція 3](#)

[Секція 4](#)

[Контрольні тестування](#)

[Секція 6](#)

[Секція 7](#)

[Секція 8](#)

[Секція 9](#)

[Секція 10](#)

[Секція 11](#)

[Секція 12](#)

[Секція 13](#)

[Секція 14](#)

[Секція 15](#)

[Особистий кабінет](#)

[Домашня сторінка](#)

[Календар](#)

[Особисті файли](#)

[Мої курси](#)

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручняк Оксана Богданівна \(Вийти\)](#)

[КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)

- [Українська \(uk\)](#)
 - - [English \(en\)](#)
 - [Русский \(ru\)](#)
 - [Українська \(uk\)](#)