

[Перейти до головного вмісту](#)
Бокова панель
КРОК-123

(Інтерн БДМУ) Підручник Оксана Богданівна

П

Особистий кабінетПрофіль користувачаОцінкиПовідомленняУподобанняВийтиПовідомлення

[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане

Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане

Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)

[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Секція 3](#)
- [2018 осінь](#)

Розпочато

Tuesday 14 February 2023 20:39 PM

Стан

Завершено

Завершено

Tuesday 14 February 2023 20:39 PM

Витрачено часу

15 сек

Балів

0,00/200,00


Оцінка

0,00 з 100,00 можливих

Питання 1

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 37-ми років, у якого діагностовано латентний період гострої променевої хвороби, надійшов до терапевтичного відділення на другий тиждень після опромінення. Скарги відсутні. Стан відносно задовільний. Об'єктивно: ослаблення тонів серця. Які зміни у клінічному аналізі крові будуть у цьому періоді?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Нейтрофільний лейкоцитоз зі зсувом вліво, лімфоцитопенія
- ☐ б. Панцитопенія
- ☐ в. Лейкопенія, зниження кількості ретикулоцитів та тромбоцитів
- ☐ г. Тромбоцитопенія
- ☐ д. Змін не буде


Коментар

Правильна відповідь: Лейкопенія, зниження кількості ретикулоцитів та тромбоцитів

Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з миготливою аритмією з двома додатковими факторами ризику інсульту (похилий вік, артеріальна гіпертензія) для профілактики тромботичних ускладнень рекомендується призначати: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Варфарин
- ☐ б. Достатньо антигіпертензивної терапії
- ☐ в. Клопідогрель
- ☐ г. Пентоксифілін
- ☐ д. Аспірин

Коментар

Правильна відповідь: Варфарин

Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої в післяпологовому періоді в пологовому будинку гостро виникло різке зниження настрою. Відзначається швидке, катастрофічне наростання почуттів нестерпної туги, безвиході, відчаю. Пацієнтка рухливо збуджена, не знаходить собі місця, кричить, стогне, ридає, наполегливо завдає собі ушкодження, активно проявляє суїцидальні тенденції. Який імовірний діагноз і необхідні рекомендації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Травматичний делірій. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-нейрохірурга
- ☐ б. Тяжкий депресивний епізод. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-психіатра
- ☐ в. Аментивний тип порушення свідомості. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-терапевта
- ☐ г. Епілептичні сутінки. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-невролога
- ☐ д. Гострий напад шизофренії. Рекомендується переведення до психіатричного стаціонару


Коментар

Правильна відповідь: Тяжкий депресивний епізод. Рекомендується обов'язкова консультація лікаря-психіатра

Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пораненого в стегно на 4-й день перебування у лікарні з'явилися скарги на біль у грудях в області грудини, що підсилюється при зміні положення тіла і глибокому диханні, задишку в горизонтальному положенні, серцебиття. При обстеженні: температура фебрильна, межі серця розширені, тони серця глухі, грубий шум тертя біля лівого краю грудини, що посилюється в горизонтальному положенні. Яке ускладнення поранення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий плеврит
- ☐ б. Гострий міокардит
- ☐ в. Гострий ендокардит
- ☐ г. Інтоксикаційна міокардіопатія
- ☐ д. Гострий перикардит

Коментар

Правильна відповідь: Гострий перикардит

Питання 5

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 70-ти років раптово з'явилася слабкість, запаморочення. Виникло багаторазове випорожнення прямої кишки калом з рідиною темно-вишневого кольору, згортками крові. З анамнезу: за останні 5 місяців схуд на 17 кг, останні 3 місяці - закрепи. Об'єктивно: блідий, у лівій здухвинній ділянці пальпується нерухомий болісний інфільтрат. Роздуті поперечний та низхідний відділи ободової кишки. Які інструментальні дослідження на першому етапі будуть найбільш доцільними?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Сцинтиграфія печінки, фракційне дуоденальне зондування
- ☐ b. Рентгенконтрастне дослідження шлунка, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
- ☐ c. Ректороманоскопія, іригоскопія, фіброколоноскопія
- ☐ d. Фіброезофагогастродуоденоскопія, екскреторна урографія
- ☐ e. Ультразвукове дослідження органів черева, оглядова рентгенографія грудної клітки

Коментар

Правильна відповідь: Ректороманоскопія, іригоскопія, фіброколоноскопія

Питання 6

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки 29-ти років вдома відбулися стрімкі II пологи у терміні 36 тижнів вагітності. Народився живий хлопчик масою 2300,0 г. Лікар швидкої допомоги, який був викликаний, при огляді породіллі зазначив, що послід не виділився (після народження дитини пройшло 40 хвилин). Ознак кровотечі немає. Яку допомогу повинен надати лікар швидкої допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. негайно транспортувати жінку до пологового відділення III рівня
- ☐ b. Ввести в/в 10 ОД окситоцину і дочекатися виділення посліду
- ☐ c. Провести ручне відділення посліду
- ☐ d. негайно транспортувати жінку і дитину до найближчого пологового відділення
- ☐ e. негайно транспортувати жінку до пологового відділення II рівня

Коментар

Правильна відповідь: негайно транспортувати жінку і дитину до найближчого пологового відділення

Питання 7

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 36-ти років скарги на біль в шиї, м'язах гомілок, спині, суглобах, кістках, жовтяницю, знижений діурез. Є підозра на лептоспіроз. Які дослідження можуть підтвердити цей діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Електрокардіографічні
- ☐ b. Біохімічні
- ☐ c. Копрологічні
- ☐ d. Серологічні
- ☐ e. Вірусологічні

Коментар

Правильна відповідь: Серологічні

Питання 8

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 30-ти років скаржиться на головний біль, марення. Об'єктивно: температура тіла - 39°C, збуджена, обличчя гіперемоване, позитивний симптом Говорова-Годельє, петехіальний висип на тулубі, кінцівках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., гепатоспленомегалія. Вживає алкоголь, ін'єкційні наркотики, живе в приміщенні підвального типу.

Поставте попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. ВІЛ-інфекція
- ☐ b. Алкогольний психоз
- ☐ c. Грип
- ☐ d. Висипний тиф
- ☐ e. Лептоспіроз


Коментар

Правильна відповідь: Висипний тиф

Питання 9

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 44-х років звернувся зі скаргами на зниження гостроти зору, нежить з рясними рідкими виділеннями, слинотечу, утруднення дихання, мимовільні посмикування м'язів, тахікардію, підвищення артеріального тиску. Об'єктивно: хворий збуджений, температура тіла - 37,5°C. Пульс - 126/хв., артеріальний тиск - 180/90 мм рт.ст., зіниці різко звужені. При аускультатії в легенях поодинокі хрипи. Отруєння речовиною якої дії найбільш імовірно у даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Нервово-паралітичної
- ☐ б. Загальноотруйної
- ☐ в. Задущливої
- ☐ г. Шкірно-навивної
- ☐ д. Сльозогінної


Коментар

Правильна відповідь: Нервово-паралітичної

Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення надійшов хлопчик 7-ми років зі скаргами на утруднення дихання, біль в животі, м'язах і суглобах, слабкість, температура тіла - 35,8°C. Артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. Дві години тому дитина бавилася у морі, ловила медуз. Чим найбільш вірогідно обумовлений стан дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Сонячним ударом
- ☐ б. Анафілактичною реакцією
- ☐ в. Отруєнням
- ☐ г. Гострим інфекційним захворюванням
- ☐ д. Переохолодженням


Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичною реакцією

Питання 11

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При огляді кардіологом хворий 11-ти років, який страждає на вроджену ваду серця, раптово знепритомнів. Шкіра та слизові блідо-ціанотичні. Дихання агональне. Пульс на магістральних артеріях не визначається. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Зупинка серцевої діяльності
- ☐ б. Простий синкопальний стан
- ☐ в. Запаморочення
- ☐ г. Колапс
- ☐ д. Кома


Коментар

Правильна відповідь: Зупинка серцевої діяльності

Питання 12

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після падіння з опором на праве плече потерпілий скаржиться на біль, обмеження рухів, деформацію в ділянці плечового суглоба. Яких заходів на цьому етапі надання допомоги необхідно вжити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Накладення гіпсової пов'язки
- ☐ б. Накладення шини Крамера від пальців до плечового суглоба
- ☐ в. Транспортна іммобілізація, знеболення
- ☐ г. Накладення шини Дітерікса
- ☐ д. Блокада місця перелому

Коментар

Правильна відповідь: Транспортна іммобілізація, знеболення

Питання 13

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 9-ти років після перенесеної ГРВІ з'явилися полідипсія, поліурія, слабкість, нудота. При обстеженні: свідомість потьмарена, шкіра суха, очні яблука м'які, дихання Куссмауля, запах ацетону з рота, серцеві тони глухі, живіт м'який, неболючий. Глюкоза крові - 19 ммоль/л. Які цукрознижувальні препарати слід призначити в комплексній терапії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Препарати сульфонілсечовини
- ☐ б. Інсулін середньої дії
- ☐ в. Інсулін короткої дії
- ☐ г. Бігуаніди
- ☐ д. Інсулін пролонгований

Коментар

Правильна відповідь: Інсулін короткої дії

Питання 14

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час гасіння пожежі на військовому складі у військовослужбовців виникла клінічна картина отруєння монооксидом вуглецю середнього ступеня тяжкості. Який показник необхідно дослідити для підтвердження діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. ЯМР-томограму мозку
- ☐ б. Трансамінази сироватки крові
- ☐ в. Електрокардіограму
- ☐ г. Псевдохолінестеразу
- ☐ д. Карбоксигемоглобін

Коментар

Правильна відповідь: Карбоксигемоглобін

Питання 15

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального покою надійшов хворий зі скаргами на нудоту, одноразове блювання темною рідиною, загальну слабкість. В анамнезі: інфаркт міокарда, виразкова хвороба. Об'єктивно: пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 80 мм рт.ст., шкіра бліда, волога. В крові: гемоглобін - 80 г/л, гематокрит - 30%. Реакція Грегерсена - позитивна. Який препарат ПРОТИПОКАЗАНИЙ хворому? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Омепразол
- ☐ б. Гепарин
- ☐ в. Етамзилат натрію
- ☐ г. Амінокапронова кислота
- ☐ д. Хлорид кальцію

Коментар

Правильна відповідь: Гепарин

Питання 16

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого після проведеного оперативного втручання раптово розвинулися тетанічні судороги дистальних відділів кінцівок ("рука акушера"), спостерігаються явища бронхоспазму. Яка невідкладна терапія необхідна?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення розчину сульфату магнію
- ☐ б. Введення розчину кальцію хлориду
- ☐ в. Введення розчину фуросеміду
- ☐ г. Введення розчину калію хлориду
- ☐ д. Введення сибазону

Коментар

Правильна відповідь: Введення розчину кальцію хлориду

Питання 17

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 35-ти років, що страждає на закрепи, скаржиться на сильний, довготривалий біль після дефекації, наявність "смужки" крові в калі. Через біль обмежила вживання їжі. Поставте попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий парапроктит
- ☐ б. Анальна тріщина
- ☐ в. Гострий тромбоз гемороїдальних вузлів
- ☐ г. Анокуприковий больовий синдром
- ☐ д. Неповна параректальна нориця

Коментар

Правильна відповідь: Анальна тріщина

Питання 18

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 28-ми років після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) отримав перелом верхньої третини стегна. Оглянутий на місці лікарем швидкої допомоги. Скарги на виражений біль в місці травми. Об'єктивно: хворий блідий, свідомість потьмарена, верхній одяг залитий кров'ю. Пульс - 95/хв., ниткоподібний, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Лікар діагностував геморагічний шок. Яку невідкладну допомогу слід надати хворому для профілактики розвитку гострої ниркової недостатності?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення діуретиків, колоїдних та кристалоїдних плазмозамінників, анальгетики протипоказані
- ☐ б. Знеболення, введення діуретиків, колоїдних та кристалоїдних плазмозамінників
- ☐ в. Зупинка кровотечі, знеболення, введення колоїдних та кристалоїдних плазмозамінників
- ☐ г. Лише знеболення, плазмозамінники протипоказані
- ☐ д. Лише зупинка кровотечі та знеболення, плазмозамінники та діуретики протипоказані

Коментар

Правильна відповідь: Зупинка кровотечі, знеболення, введення колоїдних та кристалоїдних плазмозамінників

Питання 19

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 27-ми років звернулася до лікаря зі скаргами на біль внизу живота, підвищення температури до 38,7°C, слабкість. Об'єктивно: артеріальний тиск - 120/80 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в гіпогастральній ділянці. Вагінальне дослідження: матка та додатки не визначаються через напруження передньої очеревинної стінки. Заднє склепіння нависає, різко болюче. Яким буде діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий ендометрит
- ☐ б. Гострий сальпінгоофорит
- ☐ в. Позаматкова вагітність
- ☐ г. Апоплексія яєчника
- ☐ д. Пельвіоперитоніт

Коментар

Правильна відповідь: Пельвіоперитоніт

Питання 20

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 51-го року скаржиться на біль в періанальній ділянці та в зоні ануса, підвищення температури тіла до 39°C. Біль постійний, розпирального характеру. Об'єктивно: в періанальній ділянці виявлено інфільтрат з нечіткими контурами, різко болючий, розповсюджується до прямої кишки. Шкіра над інфільтратом гіперемована. Пальцеве дослідження прямої кишки різко болюче. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Геморой
- ☐ б. Випадіння прямої кишки
- ☐ в. Атрезія ануса
- ☐ г. Гострий парапроктит

☐ е. Рак прямої кишки
Коментар

Правильна відповідь: Гострий парапроктит

Питання 21

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 37-ми років є підозра на холеру. Об'єктивно: акроціаноз, суха шкіра, шкірна складка не розправляється, руки "прачки", судоми кінцівок, температура - 35,6оС, ниткоподібний пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 75/40 мм рт.ст., анурія. Які препарати необхідно ввести?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Трисіль, квартасіль
- ☐ б. Допамін
- ☐ в. 5% розчин глюкози
- ☐ г. Кордіамін, мезатон
- ☐ е. Преднізолон, гідрокортизон

Коментар

Правильна відповідь: Трисіль, квартасіль

Питання 22

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У лікарню доставлено хворого з цукровим діабетом в анамнезі, пацієнт скаржиться на спрагу, виражену загальну слабкість, блювання, біль по всьому животі, що розвинулися після алкогольно-харчового ексцесу. При обстеженні: шкіра суха, тургор знижений, пульс - 120/хв., ритмічний, артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., тахіпное, запах ацетону з рота. Які обстеження необхідно виконати у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Аналіз сечі на амілазу
- ☐ б. Аналіз сечі на цукор
- ☐ в. Аналіз крові на цукор
- ☐ г. Кислотно-лужний баланс

☐ е. Ультразвукове обстеження черевної порожнини
Коментар

Правильна відповідь: Аналіз крові на цукор

Питання 23

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 5 місяців. Під час лікування кишкової інфекції зменшується кількість сечі (останні 6 годин сечовиділення не було). Спостерігаються блювота, потьмарена свідомість, нестійкий ритм серця. Лабораторні дослідження крові: сечовина – 26 ммоль/л, рівень К- 7,0 ммоль/л. Яке лікування потрібне?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інфузійна терапія з режимом регідратації
- ☐ б. Інфузійна терапія з режимом дегідратації
- ☐ с. Заміна антибактеріального препарату
- ☐ d. Гемодіаліз
- ☐ е. Інфузійна терапія з режимом форсованого діурезу

Коментар

Правильна відповідь: Гемодіаліз

Питання 24

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Відвідування на дому. 14-та доба після операції кесаревого розтину. Пацієнтка на 8-му добу в задовільному стані була виписана додому з дитиною. Протягом останньої доби відзначає посилення кров'янистих виділень зі статевих шляхів. Об'єктивно: шкіра та слизові оболонки звичайного кольору. Артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. Пульс - 78/хв. Живіт м'який, неболючий, загоєння післяопераційних швів первинним натягненням. Висота дна матки на 2 поперечні пальці вище від лона, виділення рясні - темна кров зі згустками. Якою буде тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Направлення на ультразвукове дослідження (УЗД) з метою уточнення стану матки
- ☐ б. Направлення на госпіталізацію в гінекологічний стаціонар

- ☐ c. Екстрена госпіталізація в гінекологічний стаціонар з мобілізованою веною
- ☐ d. Призначення гемостатичної терапії
- ☐ e. Патронаж жіночої консультації


Коментар

Правильна відповідь: Екстрена госпіталізація в гінекологічний стаціонар з мобілізованою веною

Питання 25

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 32-х років внаслідок дорожньо-транспортної травми відбувся закритий перелом лівого стегна. Які суглоби повинні бути зафіксовані під час транспортування хворого з переломом стегнової кістки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гомілковостопний, колінний, кульшовий
- ☐ b. Гомілковостопний, колінний
- ☐ c. Колінний, обидва кульшові суглоби
- ☐ d. Кульшовий
- ☐ e. Колінний, кульшовий


Коментар

Правильна відповідь: Гомілковостопний, колінний, кульшовий

Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В медичну роту бригади надійшов поранений в тяжкому стані. Скарги на біль у животі, нудоту, сухість в роті. Об'єктивно: пульс - 130/хв., артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст., SaO₂ - 92%. Язик сухий, обкладений білим нальотом, живіт не бере участі у акті дихання, при пальпації напружений, болісний у всіх відділах, перистальтика поодинокими хвилями. Притуплення у пологих місцях черевної порожнини. Попередній діагноз: внутрішньочеревна кровотеча. В який підрозділ госпіталізувати постраждалого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Госпітальне відділення

- ☐ b. Відділення спецобробки
- ☐ c. Операційна
- ☐ d. Ізолятор
- ☐ e. ВРІТ


Коментар

Правильна відповідь: Операційна

Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 27-ми років відзначає виділення з неприємним запахом зі статевих шляхів, біль в нижній частині живота, підвищення температури. Вищезазначені скарги з'явилися 2 дні тому. В анамнезі: тиждень тому жінці було виконано хірургічне переривання вагітності у терміні 8 тижнів. Огляд у дзеркалах: шийка матки чиста, з зовнішнього вічка виділення з неприємним запахом. Вагінальне дослідження: матка в антефлексію, рухлива, болюча, дещо збільшена. Додатки без особливостей. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Сальпінгоофорит
- ☐ b. Післяабортний ендометрит
- ☐ c. Гостре респіраторне захворювання
- ☐ d. Ентероколіт
- ☐ e. Апендицит


Коментар

Правильна відповідь: Післяабортний ендометрит

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної на 40-му тижні гестації почалися пологи. Відійшли навколоплідні води, сильно забруднені меконієм. Народилася доношена дівчинка, шкірні покриви рожеві, сильно забруднені меконієм, закричала одразу, м'язовий тонус фізіологічний. Якою повинна бути тактика лікаря в пологовій залі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Викласти на живіт матері, обсушити
- ☐ b. Інтубація трахеї, санація верхніх дихальних шляхів
- ☐ c. Санація рото- та носоглотки, оксигенотерапія
- ☐ d. Інтубація трахеї, штучна вентиляція легень (ШВЛ)
- ☐ e. Вимити дитину, обсушити, викласти на живіт матері


Коментар

Правильна відповідь: Викласти на живіт матері, обсушити

Питання 29

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Водій, якого доставлено у приймальне відділення після автодорожньої катастрофи, у рентгенологічному кабінеті знепритомнів. Шкіра обличчя та шиї ціанотична, серцеві тони не вислуховуються, артеріальний тиск не визначається, підшкірні вени шиї розширені. На оглядовій рентгенограмі ОГК легеневі поля не змінені, серцева тінь має кулясту форму. Вкажіть найбільш імовірну причину зупинки кровообігу:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Геморагічний шок
- ☐ b. Напружена емфізема середостіння
- ☐ c. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ d. Тампонада серця
- ☐ e. Гемомедіастинум


Коментар

Правильна відповідь: Тампонада серця

Питання 30

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 5-ти років доставлений у приймальне відділення. Скарги на набряки обличчя та рук. З анамнезу відомо, що дитина розфарбовувала малюнок акриловою фарбою, після чого через 30 хвилин погіршилося самопочуття, з'явилися свербіння шкіри та набряк обличчя. При огляді

спостерігається підвищення температури тіла до 37,8oC, дитина неспокійна, шкіра обличчя набрякла, плямисті висипи, набряк повік; на обох руках виражений набряк тильної поверхні кисті, плямисті висипання з тенденцією до злиття. Сформулюйте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Набряк Квінке
- ☐ b. Хімічний опік
- ☐ c. Синдром Стівенса-Джонсона
- ☐ d. Токсико-алергічний дерматит
- ☐ e. Атопічний дерматит


Коментар

Правильна відповідь: Набряк Квінке

Питання 31

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До інфекційної лікарні лікарем сільської амбулаторії направлений хворий 17-ти років, який три дні тому був укушений коровою за кисть руки. В ході огляду на місці укусу спостерігається пухирець з кратероподібним поглибленням. Навколо пустули - круглий вінчик з пухирців із серозно-кров'янистим вмістом та регіональний лімфаденіт. Що необхідно зробити для уточнення діагнозу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Загальний аналіз крові
- ☐ b. Бактеріологічне дослідження крові хворого
- ☐ c. Бактеріологічне дослідження вмісту рани
- ☐ d. Рентгенологічне дослідження кисті
- ☐ e. Мікроскопія виділень з рани


Коментар

Правильна відповідь: Бактеріологічне дослідження вмісту рани

Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Бригадою швидкої допомоги оглянуто хворого з великою крововтратою, зі слів родичів, внаслідок порізу вен передпліччя. Шкірні покрови бліді. На правому передпліччі джгут та пов'язка, просякнута кров'ю. Пульс - 100/хв., артеріальний тиск 90/60 мм рт.ст. Якою має бути тактика лікаря швидкої допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рекомендувати плановий огляд у сімейного лікаря
- ☐ b. Негайне кровопускання з подальшою госпіталізацією
- ☐ c. Рекомендувати посилене харчування та прийом препаратів заліза в амбулаторних умовах
- ☐ d. Негайна гемотрансфузія та госпіталізація
- ☐ e. Негайна інфузійна терапія плазмозамісними та кровозупинними засобами та госпіталізація


Коментар

Правильна відповідь: Негайна інфузійна терапія плазмозамісними та кровозупинними засобами та госпіталізація

Питання 33

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 1,5 року з ознаками гострої респіраторної інфекції ввечері з'явилася ін-спіраторна задишка, "гавкаючий" кашель, захриплість голосу. Під час огляду: дихання стенотичне, інспіраторна задуха за участю допоміжної дихальної мускулатури, втягування поступливих ділянок грудної клітки. При аускультатії дихання у легенях дифузно ослаблене. Тахікардія, випадання пульсової хвилі на вдиху. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дифтерійний круп
- ☐ b. Обструктивний бронхіт
- ☐ c. Пневмонія
- ☐ d. Вірусний круп
- ☐ e. Стороннє тіло дихальних шляхів


Коментар

Правильна відповідь: Вірусний круп

Питання 34

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 35-ти років прооперовано з приводу перфоративної виразки дванадцятипалої кишки. На 3-тю добу після операції з'явилися скарги на набряк, синюшність та біль в місці катетеризації периферичним катетером G 18 поверхневої вени правої верхньої кінцівки. Температура тіла у межах норми. Яке ускладнення виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбофлебіт торакоабдомінальних вен (хвороба Мондора)
- ☐ б. Тромбофлебіт верхньої порожнистої вени
- ☐ в. Тромбофлебіт нижньої порожнистої вени
- ☐ г. Постін'єкційний тромбофлебіт поверхневої вени правої верхньої кінцівки
- ☐ д. Тромбофлебіт правої підключичної вени


Коментар

Правильна відповідь: Постін'єкційний тромбофлебіт поверхневої вени правої верхньої кінцівки

Питання 35

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 62-х років, що перебував на стаціонарному лікуванні з приводу міокардиту раптово знепритомнів, спостерігалися короткотривалі тонічні судоми скелетних м'язів. Під час огляду: свідомість відсутня, дихання поверхневе, рідке, пульс на сонних артеріях відсутній, артеріальний тиск не визначається. При надходженні на ЕКГ були періодичні випадіння комплексів QRS без наростання інтервалу Q-T. Яке ускладнення виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий коронарний синдром
- ☐ б. Напад епілепсії
- ☐ в. Динамічне порушення мозкового кровообігу
- ☐ г. Гіпоглікемічна кома
- ☐ д. Синдром Морганьї-Адамса-Стокса

Коментар

Правильна відповідь: Синдром Морганьї-Адамса-Стокса

Питання 36

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовцю в зоні бойових дій поставлений діагноз: закрыта черепно-мозкова травма, забій мозку, кома II. До якої сортувальної категорії буде зараховано потерпілого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. IV (темно-фіолетовий колір)
- ☐ b. V (синій)
- ☐ c. I (червоний колір)
- ☐ d. II (жовтий колір)
- ☐ e. III (зелений колір)


Коментар

Правильна відповідь: I (червоний колір)

Питання 37

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 25-ти років 2 тижні тому народила здорову дівчинку. Вагітність та пологи перебігали без ускладнень. Виписані на 2-гу добу. Психосоматичний анамнез не обтяжений. Після виписки з пологового будинку родичі звернули увагу на її агресивність, часті зміни настрою, відсутність бажання доглядати за дитиною. Мати викликала дільничного лікаря у зв'язку з тим, що дочка зробила спробу задушити немовля. На запитання "чому?" відповідала, що чула голос, який сказав, що вона повинна вбити дитину. Виникла підозра на післяпологовий психоз. Якою буде тактика лікаря у цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Негайна госпіталізація до спеціалізованого стаціонару
- ☐ b. Дати рекомендації щодо режиму праці та відпочинку
- ☐ c. Призначити антидепресанти та вітамінотерапію
- ☐ d. Дати направлення на консультацію до психіатру
- ☐ e. Призначити повне клінічне обстеження


Коментар

Правильна відповідь: Негайна госпіталізація до спеціалізованого стаціонару

Питання 38

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвору 48-ми років прооперовано з приводу багатовузлового еутиреоїдного зобу IV ступеня. Операція, на погляд хірурга, пройшла без суттєвих ускладнень. Але у хворої з'явилася захриплість голосу, яка не зникла і при подальшому спостереженні під час перебування її в стаціонарі. Яке післяопераційне ускладнення настало у хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гематома загрудинного простору
- ☐ б. Пошкодження трахеї
- ☐ в. Пошкодження обох зворотних нервів
- ☐ г. Пошкодження блукаючого нерву
- ☐ д. Пошкодження одного зворотного нерва


Коментар

Правильна відповідь: Пошкодження одного зворотного нерва

Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Народилась недоношена дитина, гестаційний вік 32 тижні, з вагою 1700 г, рівень глюкози крові становить 2,1 ммоль/л. У дитини відзначається порушення стану, судомна готовність. Виберіть першочергову допомогу для дитини:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 25% розчин $MgSO_4$, 1 мл/кг
- ☐ б. 10% розчин глюкози, 2 мл/кг
- ☐ в. Фенобарбітал, 20 мг/кг
- ☐ г. 0,9% розчин натрію хлориду, 10 мл/кг
- ☐ д. 10% розчин натрію хлориду, 4 мл/кг


Коментар

Правильна відповідь: 10% розчин глюкози, 2 мл/кг

Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта 45-ти років відразу після вживання твердої їжі, виникли посиніння носо-губного трутника, затяжний кашльовий рефлекс на видиху, вип'ячування поверхневих вен шиї, тахікардія, багрянний колір обличчя. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ларингоспазм
- ☐ б. Механічна асфіксія
- ☐ в. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ г. Інфаркт міокарда
- ☐ д. Напад бронхіальної астми


Коментар

Правильна відповідь: Механічна асфіксія

Питання 41

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 28-ми років, строк гестації 32 тижні, звернулась до лікаря жіночої консультації. Скаржиться на страх смерті, голод, пітливість, слабкість. З 18-ти років хворіє на цукровий діабет, приймає інсулін. Вагітна збуджена, спостерігається дрібний тремор, бліда. Пульс - 100/хв., ритмічний. Артеріальний тиск - 125/80 мм рт.ст. Рівень цукру у крові - 2,2 ммоль/л. Під час обстеження виникли потьмарення свідомості і судоми. Встановіть діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіперосмолярна кома
- ☐ б. Гіперлактацидемічна кома
- ☐ в. Еклампсія вагітних
- ☐ г. Кетонемічна кома
- ☐ д. Гіпоглікемічна кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіпоглікемічна кома

Питання 42

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий з ознаками зневоднення III ступеня, підібраний на вокзалі, транспортується в лікарню. Артеріальний тиск - 40/0 мм рт.ст., пульс - 110/хв., слабого наповнення, частота дихання - 32/хв. Судоми нижніх кінцівок. Яке лікування необхідно розпочати на догоспітальному етапі? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Глюкокортикостероїди внутрішньовенно
- ☐ б. Промивання шлунку
- ☐ в. Дофамін внутрішньовенно
- ☐ г. Кристалоїдні розчини внутрішньовенно
- ☐ д. Оксидутират натрію внутрішньом'язово


Коментар

Правильна відповідь: Кристалоїдні розчини внутрішньовенно

Питання 43

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років скаржиться на біль у лівій половині грудної клітки, задуху, слабкість. Симптоми з'явилися раптово, після фізичної напруги. Об'єктивно: стан важкий. Частота дихальних рухів - 32/хв. Зліва над легенями спостерігається тимпаніт, дихання різко ослаблене, практично не вислуховується. Пульс - 110/хв. Артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз у цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інфаркт міокарда
- ☐ б. Пневмонія
- ☐ в. Спонтанний пневмоторакс
- ☐ г. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ д. Ексудативний плеврит

Коментар

Правильна відповідь: Спонтанний пневмоторакс

Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 40-ка років надійшла у стаціонар зі скаргами на нудоту, блювоту з домішками жовчі, біль в ділянці серця, що триває 4 години, але слабшав після вживання нітрогліцерину. Об'єктивно: позитивні симптоми Кера, Мерфі, Ортнера-Грекова, артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., пульс - 100/хв. З анамнезу: хворіє на калькульозний холецистит, напередодні вживала жирну їжу. ЕКГ без особливостей. Який імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Стенокардія Принцметала
- ☐ б. Інфаркт міокарду
- ☐ в. Напад жовчної коліки
- ☐ г. Виразка шлунка
- ☐ д. Панкреонекроз


Коментар

Правильна відповідь: Напад жовчної коліки

Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілого було витягнуто з автомобіля після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Скаржиться на біль у шийному відділі хребта, який посилюється під час рухів головою. Вкажіть, який метод транспортної іммобілізації потрібен при даному пошкодженні:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Іммобілізація жорстким головоутримувачем
- ☐ б. Положення хворого на спині з валиком під головою
- ☐ в. Положення хворого на животі на жорстких ношах
- ☐ г. Іммобілізація шиною Крамера від потилиці до поперекового відділу хребта
- ☐ д. Положення хворого на жорстких ношах з валиком під шиєю

Коментар

Правильна відповідь: Іммобілізація жорстким головоутримувачем

Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років страждає на хронічну надниркову недостатність внаслідок туберкульозу наднирників. Під час відпочинку в Криму після тривалого перебування на сонці у нього посилилася загальна слабкість, тахікардія досягла 150/хв., артеріальний тиск знизився до 70/20 мм рт.ст., з'явилися олігурія, адинамія, нудота, блювання, біль у животі, депресія. Який діагноз найбільш імовірний у даного хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Сонячний удар
- ☐ б. Гостра надниркова недостатність
- ☐ в. Гостра серцева недостатність
- ☐ г. Гостра ниркова недостатність
- ☐ е. Гостра печінкова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гостра надниркова недостатність

Питання 47

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 70-ти років скаржиться на гострий біль у правій гомілці та стопі. Захворів гостро, явної причини не відзначає. Під час огляду: шкіра гомілки та стопи бліда, холодна на дотик, тактильна та больова чутливість збережені. Пульсація на стегновій артерії правої кінцівки збережена, на підколінній та на судинах стоп - не спостерігається. Яким буде діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоемболія правої підшкірної артерії
- ☐ б. Глибокий флеботромбоз
- ☐ в. Гострий тромбофлебіт
- ☐ г. Артрит гомілковостопного суглоба
- ☐ е. Бешихове запалення


Коментар

Правильна відповідь: Тромбоемболія правої підшкірної артерії

Питання 48

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 8-ми років тиждень тому перехворіла на грип, після чого мати помітила, що дівчинка стала в'ялою, в неї знизився апетит, з'явилися скарги на головний біль, спрагу. Напередодні з'явився біль в животі, багаторазове блювання. Дитина стала загальмованою, сонливою, знепритомніла.

Об'єктивно: свідомість відсутня, шкіра суха, бліда, язик сухий, малиновий, дихання важке, шумне, частота дихання - 32/хв., запах ацетону з рота, пульс - 128/хв., артеріальний тиск - 95/60 мм рт.ст., живіт м'який, край печінки виступає на 4 см з підребер'я, сухожильні рефлекси не визначаються.

Якою буде тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Негайне внутрішньовенне введення 0,1 ОД/кг інсуліну
- ☐ б. Негайне внутрішньовенне введення 0,9% розчину N aCl із розрахунку 10 мл/кг
- ☐ в. Негайне транспортування до відділення дитячої реанімації
- ☐ г. Промивання шлунку 4% розчином соди
- ☐ д. Промивання шлунку 20% розчином соди


Коментар

Правильна відповідь: Негайне транспортування до відділення дитячої реанімації

Питання 49

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної в 34 тижні під час доплерографічного ультразвукового обстеження виявили стійкий реверсивний діастолічний кровоплин у судинах плода й виконали кесарів розтин. У новонародженого відсутні дихання і м'язовий тонус. Вентиляція мішком і маскою не забезпечує адекватні рухи грудної клітки, і після наступних 30 секунд вентиляції частота серцевих скорочень не збільшується. Який наступний етап реанімації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інтубація трахеї немовляти
- ☐ б. Введення натрію бікарбонату
- ☐ в. Введення атропіну
- ☐ г. Припинити надавати допомогу
- ☐ д. Введення адреналіну

Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї немовляти

Питання 50

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 2-х років з народження спостерігається дитячим хірургом з приводу хвороби Гіршпрунга. Добу тому стан дитини різко погіршився. Випорожнення не було 4 доби, спостерігалось багаторазове блювання з домішками зелені. Живіт здутий, пальпується збільшена, щільна сигмоподібна кишка. Що є чинником інтоксикаційного синдрому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Печінкова недостатність
- ☐ b. Калова інтоксикація
- ☐ c. Багаторазове блювання
- ☐ d. Атонія кишечника
- ☐ e. Паретичний стан кишок

Коментар

Правильна відповідь: Калова інтоксикація

Питання 51

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 56-ти років випив 150 мл невідомої рідини. Скаржиться на слино- і слюзотечу, нудоту, блювання, біль у животі, пронос, утруднене дихання. Дезорієнтований, спостерігаються фібрилярні посіпування м'язів, тремор верхніх кінцівок, брадикардія, бронхоспазм, значна кількість хрипів у легенях, міоз. Якою речовиною викликане гостре отруєння?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Дихлоретаном
- ☐ b. Чотирьоххлористим вуглецем
- ☐ c. Фосфорорганічною сполукою
- ☐ d. Припікаючою рідиною
- ☐ e. Бензином

Коментар

Правильна відповідь: Фосфорорганічною сполукою

Питання 52

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час вибуху офіцер отримав удар твердим предметом по голові. Короткочасно втратив свідомість. Відчуває помірну нудоту. У лобно-тім'яній ділянці справа - великий синець, садна. Загальмований, млявий. Скарги на сильний головний біль, пульс - 60/хв., напружений. Повторне блювання. Анізокорія, права зіниця ширша. Сухожильні рефлекси справа знижені. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Відкрита черепно-мозкова травма
- ☐ b. Струс головного мозку
- ☐ c. ЗЧМТ, наростаюча внутрішньочерепна гематома
- ☐ d. Забій головного мозку II ступеня тяжкості
- ☐ e. Перелом кісток черепа, субарахноїдальний крововилив зліва

Коментар

Правильна відповідь: ЗЧМТ, наростаюча внутрішньочерепна гематома

Питання 53

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У сержанта 30-ти років після вибуху авіабомби ліва гомілка була притиснута бетонною стіною до землі. Звільнення від стиснення гомілки відбулося через 3 години, потерпілого доставлено у госпіталь. Шкіра гомілки блідо-ціанотична, холодна на дотик, набрякла. Тони серця приглушені, артеріальний тиск-80/50 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, 120/хв. У сечі: міоглобін, протеїнурія та циліндрурія, колір - бурий. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий венозний тромбоз
- ☐ b. Гострий гломерулонефрит
- ☐ c. Синдром тривалого стиснення, проміжний період
- ☐ d. Гостра печінкова недостатність
- ☐ e. Синдром тривалого стиснення, ранній період


Коментар

Правильна відповідь: Синдром тривалого стиснення, ранній період

Питання 54

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 11-ти місяців спостерігаються адинамія, фебрильна температура, кашель, ціаноз, дистантні хрипи. Частота дихання - 90/хв. Фізикальні дані: перкуторно коробковий звук, аускультативно - жорстке дихання, тотальні дрібноміхурцеві хрипи. 20 хвилин проводилась дача 100% кисню через маску. Ренгенологічно - ознаки емфіземи. pO_2 - 55 мм рт.ст., pH - 7,2. З чого доцільно розпочати терапію?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпербарична оксигенація
- ☐ б. Киснева палатка з інгаляцією амброксолу
- ☐ в. Штучна вентиляція легень
- ☐ г. Киснева маска з інфузією глюкокортикоїдів
- ☐ д. Інгаляція і інфузія глюкокортикоїдів і амброксолу


Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Юнак 18-ти років під час різкого переходу з горизонтального положення до вертикального раптом погано себе відчув. З'явилася різка блідість шкіри, проступив холодний піт, юнак знепритомнів. Об'єктивно: шкірні покриви з мармуровим відтінком, акроціаноз. Дихання часте, поверхневе, тахікардія. Тони серця гучні, хлопаючі. Артеріальний тиск - 70/0 мм рт.ст. Пульс ниткоподібний. Частота серцевих скорочень - 110/хв. За словами родичів, стоїть на обліку з приводу вегетосудинної дистонії. Чим зумовлено погіршення стану хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Напад Морганьї-Адамса-Стокса
- ☐ б. Хронічна серцева недостатність
- ☐ в. Напад епілепсії
- ☐ г. Ортостатичний колапс

☐ е. Задихово-ціанотичний напад
Коментар

Правильна відповідь: Ортостатичний колапс

Питання 56

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі з доношеною вагітністю з початком пологової діяльності на тлі головного болю підвищився артеріальний тиск (180/120 мм рт.ст.), почалися судоми. Після в/в введення 4 г сульфату магнію та загальної анестезії тіопенталом натрію судоми припинилися. Розпочата штучна вентиляція легень. Яким методом потрібно провести розродження?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньовенна стимуляція окситоци- ном
- ☐ б. Внутрішньовенна стимуляція окситоцин- простагландином
- ☐ в. Внутрішньовенна стимуляція проста- гландином
- ☐ г. Кесарів розтин

Коментар

Правильна відповідь: Кесарів розтин

Питання 57

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У реанімаційному відділенні у хворого з гострим інфарктом міокарда раптово розвинулася клінічна смерть: свідомість відсутня, зіниці вузькі, дихальні рухи відсутні, пульс на магістральних судинах відсутній. Об'єктивно: стан тяжкий. Шкіра холодна, блідо-сірого кольору, вкрита холодним потом. При аускультації легень дихання не прослуховується. Серцеві тони відсутні. Олігурія. На ЕКГ: фібриляція шлуночків. Яких першочергових лікувальних заходів необхідно вжити?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньосерцеве введення адреналіну
- ☐ б. Електрична дефібриляція
- ☐ в. Зовнішній масаж серця
- ☐ г. Штучне дихання

☐ е. Внутрішньовенне введення атропіну
Коментар

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

Питання 58

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 21-го року надійшла в ургентному порядку після удару тупим предметом у живіт. Стан важкий, свідомість потьмарена. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. Пульс - 110/хв., слабого наповнення. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний. У хворої тупа травма живота. Травматичний шок 2 ступеня. Якою буде тактика лікування? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інфузійна терапія і лапароцентез
- ☐ б. Переливання крові й оглядова рентгеноскопія черевної порожнини
- ☐ в. Протишоківі заходи і термінова лапаротомія
- ☐ г. Провести лапароскопію і катетеризувати центральну вену
- ☐ е. Реанімаційні заходи і динамічне спостереження

Коментар

Правильна відповідь: Протишоківі заходи і термінова лапаротомія

Питання 59

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 23-х років, що хворіє на цукровий діабет, на 28-му тижні вагітності доставлена непритомною до відділення інтенсивної терапії. З рота відчутно різкий запах ацетону, дихання шумне, шкіра суха, тонус очних яблук і м'язів знижений. Пульс - 142/хв. Артеріальний тиск - 60/25 мм рт.ст. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Печінкова кома
- ☐ б. Кетонемічна кома
- ☐ в. Гіпоглікемічна кома
- ☐ г. Гіперосмолярна кома

☐ е. Лактатцидемічна кома
Коментар

Правильна відповідь: Кетонемічна кома

Питання 60

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 48-ми років, працівник хімічної лабораторії, доставлений в лікарню зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, головний біль, заплітання язика при розмові, блювання, кашель, дертя в горлі, кровотечу з носа, часте болюче сечовипускання. Об'єктивно: шкіра сіро-синього кольору, судоми м'язів. Кров шоколадно-бура, вміст МtHb у крові - 60%, еритроцити з тільцями Гейнца-Ерліха - 25%. В сечі: протеїнурія, макрогематурія. Ваш попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інтоксикація тетраетилсвинцем
- ☐ б. Інтоксикація аміносполуками бензолу
- ☐ в. Інтоксикація марганцем
- ☐ г. Інтоксикація ртуттю
- ☐ е. Інтоксикація сірковуглецем

Коментар

Правильна відповідь: Інтоксикація аміносполуками бензолу

Питання 61

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 33-х років, незаміжня, проживає одна, працює бухгалтером. Звернулася до лікаря зі скаргами на дещо пригнічений настрій, "почуття незахищеності". Зміни в психічному стані пов'язує зі спробою зґвалтування, що відбулася тиждень тому. Орієнтована всебічно правильно, мовному контакту доступна, відверто розповідає лікарю про психотравмуючу ситуацію, прагне підтримки спеціаліста. Наявність суїцидальних думок категорично заперечує, будує реальні плани на майбутнє. Якою буде тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Призначити антидепресивну терапію
- ☐ б. Призначити психотерапію

- ☐ c. Призначити терапію анксіолітиками
- ☐ d. Призначити антипсихотичну терапію
- ☐ e. Госпіталізувати у психіатричний стаціонар


Коментар

Правильна відповідь: Призначити психотерапію

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У першовагітної 27-ми років вагітність 39-40 тижнів, положення плоду поздовжнє, голівка притиснута до площини входу в малий таз. Розміри тазу 23-26-29-18. Перейми болючі, тривалість 10 годин, навколоплідні води відійшли 2 години тому, роділля неспокійна. Серцебиття плоду ритмічне, 160/хв. При зовнішньому акушерському обстеженні встановлено: контракційне кільце розташоване косо, знаходиться вище пупа, ознака Вастена позитивна, матка в нижньому сегменті різко болюча, круглі зв'язки матки напружені. Про яку патологію слід думати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Розрив матки, що відбувся
- ☐ b. Загроза розриву матки
- ☐ c. Слабкість пологової діяльності
- ☐ d. Передчасне відшарування плаценти
- ☐ e. Дискоординована пологова діяльність


Коментар

Правильна відповідь: Загроза розриву матки

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 52-х років доставлений машиною швидкої допомоги до гастроентерологічного відділення зі скаргами на сильний біль за грудиною, печію, блювання яскраво-червоною кров'ю, після чого біль та печія зменшуються, дисфагію, зниження маси тіла. При рентгеноскопії стравоходу спостерігається "ніша" 2,5 см діаметром. Яких лікувальних заходів потрібно вжити? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Проведення спазмолітичної терапії
- ☐ b. Консервативне ведення хворого, призначення наркотичних анальгетиків
- ☐ c. Оперативне втручання
- ☐ d. Тактика спостереження за хворим
- ☐ e. Призначення антисекреторних препаратів


Коментар

Правильна відповідь: Оперативне втручання

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка 73-х років зі стабільною стенокардією напруги приймає ацетилсаліцилову кислоту (АСК) - 75 мг/добу. При загостренні артриту колінних суглобів їй показане призначення нестероїдних протизапальних засобів. Тактика лікаря:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Відмінити АСК та призначити диклофенак
- ☐ b. Замінити АСК на клопідогрель і призначити диклофенак
- ☐ c. Не призначати нестероїдні протизапальні, оскільки це може збільшити ризик інфаркту
- ☐ d. Залишити АСК, призначити диклофенак та омепразол
- ☐ e. Продовжити прийом АСК та призначити целекоксиб


Коментар

Правильна відповідь: Залишити АСК, призначити диклофенак та омепразол

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнтки 8 місяців назад відбулися II термінові пологи, без ускладнень. З метою контрацепції використовує метод лактаційної аменореї. Менструацій після пологів не було. Останні дні зауважила збільшення об'єму живота, відчуття "переливів" у череві. Який імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пухлина черевної порожнини

- ☐ b. Позаматкова вагітність
- ☐ c. Пухлина молочної залози з метастазами у черевну порожнину
- ☐ d. Повторна маткова вагітність
- ☐ e. Асцит нез'ясованої етіології


Коментар

Правильна відповідь: Повторна маткова вагітність

Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 35-ти років, термін вагітності 40 тижнів, надійшла в коматозному стані після нападу судом, в першому періоді пологів. Набряки кінцівок та обличчя. Білок сечі - 3 грами. Артеріальний тиск - 170/100 мм рт.ст., пульс - 90/хв. Серцебиття плода - 155/хв. Яким буде найімовірніший діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Сепсис
- ☐ b. Екламптична кома
- ☐ c. Прееклампсія тяжкого ступеня
- ☐ d. Дистрес плода
- ☐ e. Гіпоглікемічна кома


Коментар

Правильна відповідь: Екламптична кома

Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 27-ми років хворіє на цукровий діабет протягом 8-ми років. Отримує інсулін Хумодар Р 6 ОД вранці та 4 ОД ввечері, та інсулін Хумодар Б 26 ОД вранці та 12 ОД ввечері. Тиждень тому захворів на ангіну. Стан різко погіршився: посилилася спрага, збільшився діурез (до 4 л на добу), з'явився біль у животі, нудота, зник апетит. Об'єктивно: зріст - 172 см, маса тіла 66 кг. Шкіра суха. Запах ацетону з роту. Пульс - 110/хв. Артеріальний тиск - 110/65 мм рт.ст. Нижній край печінки виступає на 4 см з-під реберного краю. Набряків немає. Додаткові дослідження: глікемія - 25 ммоль/л, реакція сечі на ацетон різко позитивна. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий панкреатит
- ☐ b. Гострий апендицит
- ☐ c. Діабетичний кетоацидоз
- ☐ d. Харчове отруєння
- ☐ e. Гострий холецистит


Коментар

Правильна відповідь: Діабетичний кетоацидоз

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 10-ти років довго пірнав у домашньому басейні, раптом почав борсатися, ковтати воду. Його було витягнуто з води та доставлено у приймальний pokій лікарні. Притомний, дещо загальмований, дихання та кровообіг адекватні. Тактика лікаря:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Амбулаторне спостереження
- ☐ b. Спостереження в стаціонарі
- ☐ c. Термінова госпіталізація у відділення реанімації
- ☐ d. Спостереження не потребує
- ☐ e. Спостереження у приймальному покої протягом 1 години


Коментар

Правильна відповідь: Спостереження в стаціонарі

Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 43-х років з 25-ти років зловживає алкоголем, захворів після запою, який тривав 12 днів. Три дні тому розпочалися блювання, пронос, був неспроможний їсти, не спав. Під час огляду не пам'ятає дати й місцезнаходження, в кімнаті бачить людиноподібних істот, на ліжку - мишей, на стіні бачить "застілля з друзями", візерунки на шпалерах здаються страшними обличчями. Після скеровуючих запитань бачить намальованого щура на чистому аркуші паперу. Після відповідних

вказівок розмовляє по вимкненому мобільному телефону. Тремор кінцівок і голови, гіперрефлексія, гіпергідроз, тахікардія, субфебрилітет. Оберіть тактику надання допомоги:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Госпіталізація в неврологічне відділення
- ☐ b. Госпіталізація в наркологічне відділення
- ☐ c. Госпіталізація в психіатричне відділення
- ☐ d. Госпіталізація у відділення токсикології
- ☐ e. Госпіталізація в терапевтичне відділення


Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація в наркологічне відділення

Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 10 місяців. Скарги на температуру 38,0°C, повторне блювання, пронос, відсутність апетиту. Дитина млява, виражена спрага. Шкіра бліда, еластичність знижена. Слизова оболонка рота волога. Піднебінні дужки гіперемовані. Носове дихання утруднене, незначні слизові виділення. Живіт здутий, помірна болючість, бурчання. Випорожнення 10 разів за добу, рясні, водяністі, жовто-зеленкуваті, без патологічних домішок. Незначна олігурія. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Холера
- ☐ b. Шигельоз, типова середньотяжка форма
- ☐ c. Ротавірусна інфекція, типова середньо-тяжка форма
- ☐ d. Сальмонельоз, гастроентероколітична середньотяжка форма
- ☐ e. Ешерихіоз ентеропатогенний, типова середньотяжка форма


Коментар

Правильна відповідь: Ротавірусна інфекція, типова середньо-тяжка форма

Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 64-х років, що перебуває у стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. При огляді діагностовані зупинка серцевої діяльності та дихання, розпочато серцево-легеневу реанімацію. На ЕКГ шлуночкова тахікардія. Який захід є необхідним далі? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести внутрішньовенно магнію сульфат
- ☐ b. Ввести внутрішньосерцево адреналін
- ☐ c. Ввести внутрішньосерцево атропін
- ☐ d. Дефібриляція
- ☐ e. Ввести внутрішньовенно кальцію хлорид


Коментар

Правильна відповідь: Дефібриляція

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Бригадою екстреної медичної допомоги (ЕМД) надається допомога дитині віком 1 місяць. При огляді: пульс на сонних артеріях відсутній, екскурсій грудної клітки немає, зіниці розширені, на світло не реагують. Прийнято рішення про проведення серцево-легеневої реанімації (СЛР). Який об'єм повітря необхідний для штучної вентиляції легень (ШВЛ) в даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 6-10 мл/кг
- ☐ b. 50-60 мл/кг
- ☐ c. 20-30 мл/кг
- ☐ d. 40-50 мл/кг
- ☐ e. 30-40 мл/кг


Коментар

Правильна відповідь: 6-10 мл/кг

Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Госпіталізовано хворого 46-ти років з місця пожежі у важкому стані. При огляді: рівень свідомості - сопор, шкіра має червоно-ціанотичний відтінок. Об'єктивно: дихання спастичного характеру, артеріальний тиск - 80/55 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 110/хв., серцеві тони ослаблені. Яких першочергових заходів слід вжити у даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вдихання амлінітриу
- ☐ b. Введення кордіаміну
- ☐ c. Промивання горла содовою водою
- ☐ d. Введення антибіотиків
- ☐ e. Проведення гіпербаричної оксигенації


Коментар

Правильна відповідь: Проведення гіпербаричної оксигенації

Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпіла 25-ти років доставлена в хірургічне відділення через 2 години після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з закритою травмою живота з ознаками внутрішньоочеревинної кровотечі. Доставлено в операційну. Під час ревізії в черевній порожнині знайдено до 1,5 л рідкої крові. Селезінка пошкоджена в декількох місцях. Інших пошкоджень не виявлено. Який вид трансфузії слід застосувати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Трансфузія замороженої плазми
- ☐ b. Замінне переливання
- ☐ c. Пряма гемотрансфузія
- ☐ d. Трансфузія еритроцитарної маси
- ☐ e. Реінфузія крові


Коментар

Правильна відповідь: Реінфузія крові

Питання 75

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 42-х років доставлена машиною швидкої допомоги зі скаргами на різку загальну слабкість, схуднення, відсутність апетиту, нудоту, блювання, біль у животі. При огляді: гіперпигментація шкіри, артеріальний тиск - 70/45 мм рт.ст., брадикардія. В додаткових дослідженнях: знижений вміст альдостерону та кортизолу в крові, знижена екскреція 17-КС та 17-ОКС з сечею, гіпонатріємія, гіпохлоремія, гіпокаліємія. Яких лікувальних заходів потрібно вжити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Призначення інсуліну
- ☐ b. Призначення преднізолону
- ☐ c. Призначення глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів, дієти з підвищеним вмістом кухонної солі
- ☐ d. Призначення дієтотерапії з підвищеним вмістом кухонної солі
- ☐ e. Призначення альдостерону


Коментар

Правильна відповідь: Призначення глюкокортикоїдів, мінералокортикоїдів, дієти з підвищеним вмістом кухонної солі

Питання 76

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 1,5 років із септичним шоком виникла кровотеча з місць ін'єкцій, по шлунковому зонду надходить "кавова гуща". При визначенні показників гемостазу збільшено міжнародне нормалізаційне відношення, АЧТЧ, рівень D-димеру, знижений фібриноген, тромбоцити - 30 109/л. Діагностовано ДВЗ-синдром. Що у першу чергу треба призначити пацієнту для корекції факторів гемостазу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Етамзилат
- ☐ b. Хлорид кальцію
- ☐ c. Транексамову кислоту
- ☐ d. Тромбоцитарну масу
- ☐ e. Вітамін К

Коментар

Правильна відповідь: Тромбоцитарну масу

Питання 77

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 23-х років звернулася до гінеколога зі скаргами на рясні кров'янисті виділення зі статевих шляхів після затримки менструації на 8 тижнів. Під час огляду тіло матки збільшено до 12 тижнів вагітності, кровотеча з елементами тканини, що нагадує пухирці. Яке додаткове обстеження є найбільш доцільним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Визначення хоріонічного гонадотропіну
- ☐ b. Лапароскопічне обстеження
- ☐ c. Імунологічний тест на вагітність
- ☐ d. Ультразвукове дослідження
- ☐ e. Рентгенологічне обстеження


Коментар

Правильна відповідь: Ультразвукове дослідження

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілого 40-ка років, працівника атомної електростанції (АЕС), доставлено у лікарню через 2 доби після техногенної аварії, де він отримав опромінення у дозі 15 Гр. Скарги на слабкість, адинамію, діарею, головний біль, напади болю в животі. Виражена гіперемія шкіри, гіпертермія 38,4°C. Яка причина вказаного стану хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Токсемічна форма променевої хвороби
- ☐ b. Кістково-мозкова форма променевої хвороби
- ☐ c. Церебральна форма променевої хвороби
- ☐ d. Кишкова токсикоінфекція
- ☐ e. Кишкова форма променевої хвороби


Коментар

Правильна відповідь: Кишкова форма променевої хвороби

Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 1,5 років з діагнозом сепсис спостерігаються: потьмарення свідомості, контактний сопор, фоторефлекси збережені, акроціаноз, пульс слабкого наповнення, артеріальний тиск - 60/15 мм рт.ст. Якій стадії термінального стану відповідає дана клінічна картина?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Клінічна смерть
- ☐ b. Агонія
- ☐ c. Передагонія
- ☐ d. Соціальна смерть
- ☐ e. Біологічна смерть


Коментар

Правильна відповідь: Передагонія

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 58-ми років раптово відчув задишку, різкий біль в грудній клітці, кровохаркання, запаморочення. В анамнезі тромбофлебіт. Об'єктивно: дифузний ціаноз, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., акцент II на легеневій артерії, сухі розсіяні хрипи в нижніх відділах легень. На ЕКГ: високий R у II та III, глибокий S в I, патологічний Q в III, негативний T в II та III, елевація сегмента ST. На Ro спостерігається клиновидне затемнення в середніх відділах справа. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інфаркт легені
- ☐ b. Спонтанний пневмоторакс
- ☐ c. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ d. Кардіогенний шок
- ☐ e. Q-інфаркт міокарда по задній стінці лівого шлуночка


Коментар

Правильна відповідь: Тромбоемболія легеневої артерії

Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До пологового відділення надійшла вагітна у терміні 24 тижні. В анамнезі: 2 викидні у терміні 21 та 24 тижні. Теперішня вагітність перебігала із загрозою викидня. У плодів попередніх вагітностей мали місце множинні аномалії. У власному домі є кішка та собака. Хвора працює на м'ясокомбінаті. Яку хворобу можна припустити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Лістеріоз
- ☐ б. Бруцельоз
- ☐ в. Черевний тиф
- ☐ г. Сифіліс
- ☐ д. Токсоплазма


Коментар

Правильна відповідь: Токсоплазма

Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 54-х років з приводу відсутності пульсу на сонних артеріях і дихання вже протягом 10 хвилин бригадою екстреної медичної допомоги (ЕМД) проводяться реанімаційні заходи: зовнішній масаж серця, штучне дихання мішком Амбу, введення адреналіну, дефібриляція. Стан залишається без змін. З якою частотою і на яку глибину має здійснюватися компресія грудної клітки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 100-120/хв. та 5-6 см
- ☐ б. 90-100/хв. та 4-5 см
- ☐ в. 140/хв. та 4-5 см
- ☐ г. 60-80/хв. та 4-5 см
- ☐ д. 100-120/хв. та 3-4 см


Коментар

Правильна відповідь: 100-120/хв. та 5-6 см

Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 11-ти років гостро з'явилися головний біль, втрата свідомості. При обстеженні: свідомість потьмарена, артеріальний тиск - 130/85 мм рт.ст., ригідність м'язів потилиці, температура - 38,2оС. Яке діагностичне дослідження необхідно провести дитині першочергово? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Люмбальна пункция
- ☐ б. Визначення лейкоцитів та швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) у крові
- ☐ с. Комп'ютерна томографія (КТ) головного мозку
- ☐ d. Рентгенографія черепа
- ☐ е. Електроенцефалографія


Коментар

Правильна відповідь: Люмбальна пункция

Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 25-ти років, яка надійшла до приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги з приводу гострої ниркової недостатності, виникла зупинка роботи серця. Що було причиною цього?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ацидоз
- ☐ b. Уремія
- ☐ с. Гіпокаліємія
- ☐ d. Гіперфосфатемія
- ☐ е. Гіперкаліємія

Коментар

Правильна відповідь: Гіперкаліємія

Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 29-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на кров'янисті виділення з піхви та біль у правій здухвинній ділянці. Остання менструація була 11 тижнів тому. Вміст ХГ у сироватці крові нижче за нормативні показники для передбачуваного терміну вагітності. За даними ультразвукового дослідження (УЗД) плідне яйце в порожнині матки не визначається. В Дугласовому просторі виявлено вільну рідину з гіперехогенними включеннями. При піхвовому дослідженні: нависання склепінь, "крик Дугласа". При пункції заднього склепіння отримана кров, що не згортається.

Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Порушена позаматкова вагітність
- ☐ б. Кровотеча з жовтого тіла яєчника
- ☐ в. Міхурцевий занесок
- ☐ г. Перекрут кісти яєчника
- ☐ д. Аборт, що розпочався


Коментар

Правильна відповідь: Порушена позаматкова вагітність

Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 68-ми років скаржиться на загрудинний біль з іррадіацією у ліву руку, який триває 30 хвилин. Викликав швидку медичну допомогу і протягом 40 хвилин був доставлений у спеціалізовану лікарню з інтервенційною лабораторією. Протягом 10 хвилин було знято ЕКГ, на якій помітні підвищення сегменту ST на 5 мм у I та V2- V4 відведеннях. Результати тропонінового тесту - позитивні. Якою буде наступна тактика ведення цього хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Аортокоронарне шунтування
- ☐ б. Консервативна тактика за допомогою ТІК сумішей та в/в введення нітрогліцерину
- ☐ в. Негайна коронарографія та можлива балонна ангіопластика з імплантацією стента
- ☐ г. Реперфузія за допомогою тромболізису

Коментар

Правильна відповідь: Негайна коронарографія та можлива балонна ангіопластика з імплантацією стента

Питання 87

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До жіночої консультації звернулася жінка 25-ти років з вагітністю у терміні 11 тижнів. Скаржиться на нежить, відчуття дертя у горлі, температуру до 37,5°C, дрібноплямистий висип, який спочатку з'явився на обличчі, а потім поширився по всьому тілі. При бімануальному дослідженні: шийка матки циліндрична, зовнішній зів матки закритий, матка збільшена до 11 тижнів вагітності, придатки матки без особливостей. Слизові виділення. Є підозра на краснуху. Якою буде найдоцільніша акушерська тактика?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Госпіталізація в інфекційне відділення з наступним пролонгуванням вагітності
- ☐ b. Консультація терапевта, госпіталізація у відділення патології вагітних
- ☐ c. Поставити на облік вагітних
- ☐ d. Госпіталізація в інфекційне відділення з наступним перериванням вагітності
- ☐ e. Госпіталізація в гінекологічне відділення

Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація в інфекційне відділення з наступним перериванням вагітності

Питання 88

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вас покликали сусіди до родича, який під час приймання їжі перестав дихати. При огляді: чоловік притомний, але розмовляти не може, збуджений, робить спроби вдихнути, але повітря до легень не проходить, шкіра синюшна. Що треба зробити для відновлення дихання?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Трахеотомію
- ☐ b. Штучне дихання рот-до-рота
- ☐ c. Інтубацію трахеї
- ☐ d. Прийом Геймліха
- ☐ e. Прийом Сафара

Коментар

Правильна відповідь: Прийом Геймліха

Питання 89

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні доставлено чоловіка 50-ти років з діагнозом: переохолодження. Зовнішні пошкодження відсутні. Рівень свідомості - помірна кома. Шкірні покриви бліді, ціанотичні, холодні. Ректальна температура - 33оС. Дихання спонтанне, частота дихальних рухів - 12/хв. Пульс - 64/хв., ниткоподібний, артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст. Яких невідкладних заходів слід вжити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Нормалізація реологічних властивостей крові
- ☐ b. Компенсація дефіциту об'єму циркулюючої крові
- ☐ c. Введення вазопресорів
- ☐ d. Раціональне зігрівання хворого
- ☐ e. Проведення допоміжної штучної вентиляції легень

Коментар

Правильна відповідь: Раціональне зігрівання хворого

Питання 90

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини на 4-й день життя з'явилися кривава блювота до 3-4 разів на день, випорожнення темно-коричневого кольору до 4-5 разів на добу, кровотеча з пупкової ранки, петехіально-плямистий висип на тулубі та кінцівках. Який діагноз найімовірніший?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Пологова травма
- ☐ b. Синдром проковтнутої материнської крові
- ☐ c. Гемолітична хвороба новонароджених
- ☐ d. Геморагічна хвороба новонароджених
- ☐ e. Вада розвитку шлунково-кишкового тракту

Коментар

Правильна відповідь: Геморагічна хвороба новонароджених

Питання 91

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час бою солдат отримав кульове поранення лівої половини грудної клітки-ни. Турбує біль, задишка. Пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 90/70 мм рт.ст., частота дихання - 22/хв. Періодично спльовує кров. По середньо-ключичній лінії зліва, на рівні II ребра - рана 1x1 см, з якої при диханні виділяється піниста кров. Встановіть діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Проникаюче поранення грудної клітки
- ☐ б. Перелом II ребра зліва
- ☐ в. Тампонада серця
- ☐ г. Клапанний пневмоторакс
- ☐ д. Закрита травма органів грудної клітки

Коментар

Правильна відповідь: Проникаюче поранення грудної клітки

Питання 92

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 64-х років під час споживання їжі настала повна обтурація дихальних шляхів. Свідомість і спонтанне дихання відсутні. Пульс на сонних артеріях визначається. Що необхідно зробити першочергово?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ввести в/в атропін
- ☐ б. Провести непрямий масаж серця
- ☐ в. Провести дефібриляцію
- ☐ г. Ввести в/в адреналін
- ☐ д. Провести трахеотомію

Коментар

Правильна відповідь: Провести трахеотомію

Питання 93

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 6-ти років захворіла гостро: підвищилась температура тіла до 38,5°C, з'явився сухий кашель, кон'юнктивіт, набряк повік. На 5-ту добу на шкірі обличчя, шиї, за вухами з'явився висип плямисто-папульозного характеру, який наступної доби поширився на тулуб. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Скарлатина
- ☐ b. Вітряна віспа
- ☐ c. Кір
- ☐ d. Краснуха
- ☐ e. Аденовірусна інфекція

Коментар

Правильна відповідь: Кір

Питання 94

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 45-ти років спостерігаються інтенсивний біль в епігастральній ділянці, багаторазове блювання, яке не приносить полегшення, виражена загальна слабкість. Об'єктивно: загальний стан тяжкий, шкіра та видимі слизові оболонки бліді, акроціаноз. Пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст. При пальпації живота: напруження передньої черевної стінки та різкий біль в зоні Шоффара та у лівому реберно-хребетному куті. Позитивний симптом Воскресенського. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Перфоративна виразка ДПК
- ☐ b. Гострий холецистит
- ☐ c. Гострий апендицит
- ☐ d. Розшарувальна аневризма аорти
- ☐ e. Гострий панкреатит


Коментар

Правильна відповідь: Гострий панкреатит

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 10-ти років надійшов у відділення інтенсивної терапії і реанімації з діагнозом: політравма, геморагічний шок 3-го ступеня. Який із судинних доступів є найбільш показаним для здійснення наступних задач: 1) Масивна інфузійна та гемотрансфузійна терапія; 2) Тривале парентеральне харчування; 3) Вимірювання центрального венозного тиску (ЦВТ)?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Черезшкірна катетеризація центральної вени
- ☐ b. Пункція променевої артерії
- ☐ c. Пункція і катетеризація периферичної вени
- ☐ d. Венепункція


Коментар

Правильна відповідь: Черезшкірна катетеризація центральної вени

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого на 5-й день хвороби спостерігаються гіперемія та набряк мигдаликів, щільні білі плівчасті нашарування, які не знімаються, набряк підшкірної клітковини шиї, загальний ціаноз шкіри, температура тіла - 38,8°C, задишка до 50/хв., шумне дихання, афонія, тахікардія - 140/хв., пульс не визначається, свідомість на рівні сопору. Який лікувальний захід показаний у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення серцевих глікозидів
- ☐ b. Парові лужні інгаляції
- ☐ c. Штучне дихання рот-до-рота
- ☐ d. Трахеостомія
- ☐ e. Непрямий масаж серця

Коментар

Правильна відповідь: Трахеостомія

Питання 97

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У породіллі з цукровим діабетом типу 1 та варикозною хворобою на 4 добу після пологів з'явився гострий біль у правій нижній кінцівці. Права пупартова складка згладжена, стегно синюшне, набрякле, пальпація стегового трикутника болюча. Температура - 36,6оС. Гінекологічний статус - без патологічних відхилень. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Тромбофлебіт варикозних вен стегна
- ☐ b. Тромбоз тазових вен та вен нижньої кінцівки
- ☐ c. Септичний тазовий тромбофлебіт
- ☐ d. Пахвинний лімфаденіт
- ☐ e. Тромбоз порожнистої вени

Коментар

Правильна відповідь: Тромбоз тазових вен та вен нижньої кінцівки

Питання 98

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 45-ти років після конфліктної ситуації на роботі відчула інтенсивний головний біль, були нудота та неодноразове блювання. До цього вважала себе здоровою. Об'єктивно: свідомість ясна, артеріальний тиск - 160/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 70/хв., серцева діяльність ритмічна, загальна гіперестезія, фото- та фонофобія, ригідність м'язів потилиці. Парезів та інших неврологічних розладів не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ішемічний інсульт
- ☐ b. Гостра гіпертонічна енцефалопатія
- ☐ c. Субарахноїдальний крововилив
- ☐ d. Менінгіт
- ☐ e. Істеричний невроз

Коментар

Правильна відповідь: Субарахноїдальний крововилив

Питання 99

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженого за шкалою Апгар визначається 3 бали: центральний ціаноз, дихання типу "гаспінг", м'язова гіпотонія, арефлексія, частота серцевих скорочень - 58/хв. Пологи термінові, маса тіла - 3850 г, спостерігалось дворазове туге обвиття пуповиною довкола шиї. Першочергово треба: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Почати штучну вентиляцію легень (ШВЛ) мішком Амбу і маскою та непрямий масаж серця
- ☐ б. Почати оксигенотерапію
- ☐ в. Почати непрямий масаж серця
- ☐ г. Почати штучну вентиляцію легень (ШВЛ) за методом спонтанного дихання з постійним позитивним тиском (СДППТ)
- ☐ д. Ввести адреналін

Коментар

Правильна відповідь: Почати штучну вентиляцію легень (ШВЛ) мішком Амбу і маскою та непрямий масаж серця

Питання 100

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 57-ми років на тлі гострого порушення мозкового кровообігу розвинулася гостра затримка сечі. Назвіть першочерговий лікувальний захід: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Цистостомія
- ☐ б. Постійна катетеризація сечового міхура
- ☐ в. Антибактеріальна терапія
- ☐ г. Призначення α -адреноблокаторів
- ☐ д. Пункція сечового міхура

Коментар

Правильна відповідь: Постійна катетеризація сечового міхура

Питання 101

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік захворів гостро після повернення з Південної Америки. Турбували головний біль, підвищення температури тіла до 40°C, біль у попереку, нудота. На 5-й день хвороби відзначалася короткочасна ремісія, після чого вищезазначені симптоми загострились, з'явилися інтенсивна жовтяниця, мелена, геморагічний висип на тулубі. Який діагноз найбільш ймовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Менінгококцемія
- ☐ b. Чума
- ☐ c. Черевний тиф
- ☐ d. Висипний тиф
- ☐ e. Жовта гарячка

Коментар

Правильна відповідь: Жовта гарячка

Питання 102

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Через 3 дні після розчленування туші корови у хворого на шкірі правого передпліччя з'явилася червона пляма, яка перетворилася на папулу, а потім послідовно у везикулу, пустулу та виразку, вкриту темною кіркою й оточену зоною гіперемії. На периферії виразки спостерігається вінчик вторинних пустул, а також значний неболючий набряк та гіперемія м'яких тканин, регіональний лімфаденіт, лихоманка до 39-40°C протягом 6-ти днів. Яке захворювання найімовірніше має місце у цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Шкірна форма чуми
- ☐ b. Контагіозний вірусний дерматит
- ☐ c. Фурункул стрепто- або стафілококової етіології
- ☐ d. Еризипелоїд
- ☐ e. Сибірська виразка


Коментар

Правильна відповідь: Сибірська виразка

Питання 103

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 10-ти років доставлена в лікарню в непритомному стані. Часте, поверхнєве дихання. Виражена неврологічна симптоматика: гіпертонус м'язів, ністагм, позитивні менінгеальні ознаки. Шкірна складка розгладжується більше 2 секунд. Глюкоза крові - 45 ммоль/л, рівень кетонів в крові в нормі; кетонурії немає; осмолярність крові - 390 мосм/л. Який найбільш імовірний стан? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Лактацидотична кома
- ☐ б. Кетоацидотична кома
- ☐ в. Гіперосмолярна кома
- ☐ г. Гіпотиреоїдна кома
- ☐ д. Гіпоглікемічна кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

Питання 104

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 45-ти років п'ятнадцятирічний анамнез виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Протягом 7-ми днів спостерігалось багаторазове блювання вмістом шлунка, загальна слабкість. Пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст., тургор шкіри знижений, пальпаторно живіт дещо болючий в епігастрії. На рентгенограмі велика кількість рідини у шлунку. Поставте діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Загострення виразкової хвороби дванадцятипалої кишки
- ☐ б. Гостра кишкова непрохідність
- ☐ в. Стеноз виходу зі шлунка
- ☐ г. Гостре розширення шлунка
- ☐ д. Шлунково-кишкова кровотеча


Коментар

Правильна відповідь: Стеноз виходу зі шлунка

Питання 105

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 58-ми років скаржиться на слабкість в лівих кінцівках, помірний головний біль, хворіє на гіпертонічну хворобу. Початок захворювання гострий - прокинувшись, відчула слабкість у кінцівках. При огляді: стан середньої тяжкості, притомна, пульс - 68/хв., артеріальний тиск - 170/105 мм рт.ст., температура - 36,7°C, знижена сила в лівих кінцівках - лівобічний геміпарез, синдром Бабінського зліва, менінгеальні симптоми відсутні. Яке захворювання можна діагностувати у хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Пухлина головного мозку
- ☐ б. Геморагічний інсульт
- ☐ в. Ішемічний інсульт
- ☐ г. Енцефаліт
- ☐ д. Субарахноїдальний крововилив


Коментар

Правильна відповідь: Ішемічний інсульт

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

12-річна дівчинка скаржиться на періодичний головний біль, що переважно виникає в другій половині дня, супроводжується слабкістю, зниженням активності. Біль має дифузний характер, без чіткої локалізації, фізичний розвиток дівчинки нормальний, психологічний клімат в оточенні дитини сприятливий. При обстеженні дитина практично здорова. Якими будуть подальші рекомендації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Дослідження очного дна, полів зору та контроль артеріального тиску
- ☐ б. Консультація невролога
- ☐ в. Консультація психіатра
- ☐ г. Електроенцефалографія
- ☐ д. Комп'ютерна томографія мозку

Коментар

Правильна відповідь: Дослідження очного дна, полів зору та контроль артеріального тиску

Питання 107

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 5-ти місяців планується встановлення периферійного венозного катетеру для проведення інфузійної терапії. Які підшкірні вени можуть бути використані для цього?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Будь-які вени
- ☐ b. Лише вени кисті
- ☐ c. Лише вени голови
- ☐ d. Лише вени гомілки
- ☐ e. Лише вени ліктьового згину

Коментар

Правильна відповідь: Будь-які вени

Питання 108

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 65-ти років після побутової травми скаржиться на біль у кульшовому суглобі та неможливість рухів нижньої кінцівки. Об'єктивно: кінцівка вкорочена і ротована назовні, симптом "прилиплої п'яти". Виберіть оптимальний метод надання першої медичної допомоги:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Транспортувати в лікарню на жорстких ношах
- ☐ b. Транспортна іммобілізація шиною Дітеріхса, знеболення анальгетиками
- ☐ c. Знеболення місця перелому, іммобілізація шиною Крамера
- ☐ d. Виконати репозицію відламків та транспортну іммобілізацію
- ☐ e. Накласти шину Беллера

Коментар

Правильна відповідь: Транспортна іммобілізація шиною Дітеріхса, знеболення анальгетиками

Питання 109

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 52-х років госпіталізований у відділення інтенсивної терапії зі скаргами на інтенсивний біль за грудиною, виражену задишку, загальну слабкість, серцебиття. Свідомість потьмарена. Шкірні покрови бліді, вологі, холодні. Артеріальний тиск 60/40 мм рт.ст., пульс - 116/хв. Олігурія. ЕКГ: елевация сегменту ST I, II, avL, V2-V5, QS V2-V5. Який медикаментозний препарат при даному ускладненні найбільш доцільно ввести хворому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ніфедипін
- ☐ b. Бісопролол
- ☐ c. Фуросемід
- ☐ d. Добутамін
- ☐ e. Аміодарон

Коментар

Правильна відповідь: Добутамін

Питання 110

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В приймальне відділення доставлена пацієнтка 25-ти років. З анамнезу відомо, що кілька хвилин тому після введення знеболювального у неї почервоніла шкіра, артеріальний тиск - 50/0 мм рт.ст., пульс - 150/хв. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Анафілактичний шок
- ☐ b. Гостра дихальна недостатність
- ☐ c. Алергічна реакція
- ☐ d. Тромбоемболія легеневої артерії

Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

Питання 111

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина від другої ускладненої вагітності (загроза переривання), других пологів, термін гестації 37 тижнів, маса тіла - 2400 г, довжина - 50 см. Оцінка за шкалою Апгар 7-9 балів. Після першого прикладання до грудей у дитини з'явилася блювота та пінисті виділення з рота. Шлунковий зонд поставити не вдалось. Який попередній діагноз у дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Вроджена атрезія стравоходу
- ☐ b. Синдром аспірації амніотичної рідини
- ☐ c. Вроджена пневмонія
- ☐ d. Вроджена кишкова непрохідність
- ☐ e. Ахалазія стравоходу

Коментар

Правильна відповідь: Вроджена атрезія стравоходу

Питання 112

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Поранений з мінно-вибуховою травмою доставлений з поля бою в мобільний госпіталь у стані шоку. Пульс на променевій артерії не визначається. Артеріальний тиск - 50/0 мм рт.ст. Які першочергові заходи необхідні на цьому етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Внутрішньовенна інфузія мезатону до відновлення пульсу на променевій артерії
- ☐ b. Швидке внутрішньовенне введення колоїдно-кристалоїдних розчинів
- ☐ c. Крапельна інфузія 0,9% розчину NaCl у межах подвоєної добової потреби в рідині
- ☐ d. Внутрішньом'язово ввести 1 мл адреналіну. Повторити через 5 хвилин в разі неефективності
- ☐ e. Ультразвукове дослідження черевної та плевральних порожнин для виключення кровотечі


Коментар

Правильна відповідь: Швидке внутрішньовенне введення колоїдно-кристалоїдних розчинів

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 25-річного хворого на цукровий діабет I типу через 1 годину після чергової ін'єкції виникли слабкість, відчуття голоду, пітливість. Через 10 хвилин виникли судоми, втрата свідомості. Під час огляду: непритомний, тонічні та клонічні судоми м'язів. Шкіра волога. Артеріальний тиск - 140/80 мм рт.ст., пульс - 90/хв., ритмічний. Запаху ацетону у повітрі, що видихається, немає. Необхідна перша допомога:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. В/в струменево 40% р-н глюкози 60,0
- ☐ б. В/в крапельно 20% р-н глюкози 60,0 з 10 ОД інсуліну
- ☐ в. В/в струменево 40% р-н глюкози 60,0 з 6 ОД інсуліну
- ☐ г. В/в струменево 40% р-н глюкози 500,0
- ☐ д. В/в крапельно 5% р-н глюкози 500,0


Коментар

Правильна відповідь: В/в струменево 40% р-н глюкози 60,0

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 46-ти років надійшов зі скаргами на сухий кашель, задишку, яка посилюється в положенні лежачи, вкритий холодним потом. Об'єктивно: частота дихання - 30/хв., артеріальний тиск - 180/100 мм рт.ст., С_{ор} - тони глухі, акцент II тону над легеневою артерією, ритм галопу, над легеньми - жорстке дихання, в н/відділах сухі та вологі дрібнопухирцеві хрипи. Який попередній діагноз більш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. набряк легень
- ☐ б. астматичний статус
- ☐ в. тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ г. ішемічна кардіоміопатія
- ☐ д. гіпертензивний криз

Коментар

Правильна відповідь: набряк легень

Питання 115

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 55-ти років працювала на городі, коли раптом відчула різкий головний біль, нудоту, слабкість, а потім знепритомніла та впала. Під час огляду в стаціонарі: рівень свідомості - сопор, відзначається психомоторне збудження, артеріальний тиск 200/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 92/хв. Спеціаліст якого профілю повинен оглянути хвору в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інфекціоніст
- ☐ b. Хірург
- ☐ c. Нейрохірург
- ☐ d. Невропатолог
- ☐ e. Реаніматолог

Коментар

Правильна відповідь: Невропатолог

Питання 116

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 7-ми років захворіла гостро: підвищилась температура тіла до 39°C, з'явились головний біль, біль у горлі, блювання. Через 3 години в пахвинних ділянках, на шиї та у верхній частині грудної клітки з'явився дрібний яскраво-червоний висип на гіперемованому фоні. У ротоглотці: яскрава гіперемія, сірі нальоти на мигдаликах, підщелепні лімфовузли збільшені, болючі. Який найбільш вірогідний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Кір
- ☐ b. Дифтерія
- ☐ c. Псевдотуберкульоз
- ☐ d. Скарлатина
- ☐ e. Краснуха

Коментар

Правильна відповідь: Скарлатина

Питання 117

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 35-ти років вживав спиртні напої промислового виробництва. Привезений родичами до приймально-діагностичного відділення міської лікарні у непритомному стані. Шкіра обличчя гіперемована. Кома II, нормотензія, помірна тахікардія, частота дихання - 10/хв. Якого лікувального заходу треба вжити першочергово?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Форсований діурез
- ☐ b. Гіпербарична оксигенація
- ☐ c. Інтубація трахеї та штучна вентиляція легень (ШВЛ)
- ☐ d. Плазмаферез
- ☐ e. Промивання шлунку

Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї та штучна вентиляція легень (ШВЛ)

Питання 118

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 30-ти років. Після приїзду з Туреччини захворів гостро. Надійшов зі скаргами на профузний пронос у вигляді рисового відвару. Шкіра суха, тургор знижений, $t_{\text{о}} - 36,4^{\circ}\text{C}$, артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. За добу втратив 3 кг ваги. Діурез знижений. Діагноз - холера. Яка екстрена допомога?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Зробити сифонну клізму
- ☐ b. Інфузійна терапія
- ☐ c. Ввести препарати, які викликають закрепи
- ☐ d. Ввести великі дози антибіотиків
- ☐ e. Ввести велику кількість колоїдних розчинів

Коментар

Правильна відповідь: Інфузійна терапія

Питання 119

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після опромінення у госпіталь доставлений юнак 26-ти років. Показник індивідуального дозиметра 5 Гр. Скарги на різку загальну слабкість, головний біль, нудоту, повторне блювання. Об'єктивно: на шкірі обличчя еритема, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., блювання продовжується. В якому клінічному періоді гострої променевої хвороби перебуває хворий? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Період вторинної реакції
- ☐ b. Період запалення
- ☐ c. Період первинної реакції
- ☐ d. Період виражених клінічних проявів
- ☐ e. Період розпалу

Коментар

Правильна відповідь: Період первинної реакції

Питання 120

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної під час стрімких пологів з'явилися відчуття задухи, ціаноз, падіння артеріального тиску. Через деякий час кров, що надходила з піхви, перестала згортатися. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Емболія навколоплідними водами
- ☐ b. Серцева недостатність
- ☐ c. Анафілактичний шок
- ☐ d. Бронхіальна астма
- ☐ e. Гіпотонічна маткова кровотеча


Коментар

Правильна відповідь: Емболія навколоплідними водами

Питання 121

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 38-ми років скаржиться на виражену сонливість, набряки обличчя, мерзлякуватість, порушення пам'яті, головний біль, порушення менструального циклу, виражену загальну слабкість. Об'єктивно: зріст - 162 см, маса тіла - 87 кг. Частота серцевих скорочень - 62/хв., артеріальний тиск - 115/70 мм рт.ст., при пальпації молочні залози м'якої консистенції, виділення незначної кількості молока. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпоталамічний синдром
- ☐ b. Гіперпролактинемія
- ☐ c. Аденома гіпофіза
- ☐ d. Первинний гіпотиреоз, вторинна гіперпролактинемія
- ☐ e. Синдром "порожнього" турецького сідла


Коментар

Правильна відповідь: Первинний гіпотиреоз, вторинна гіперпролактинемія

Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець вибуховою хвилею відкинутий на землю. Піднятися самостійно не може через біль у лівому стегні. Пульс - 92/хв., артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Об'єктивно: в середній третині лівого стегна визначається припухлість, деформація стегна, підшкірна гематома. При пальпації визначається крепітація. Який об'єм домедичної допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Транспортна іммобілізація, введення протишокових розчинів
- ☐ b. Транспортна іммобілізація, накладання стискальної пов'язки
- ☐ c. Введення знеболювальних препаратів, транспортна іммобілізація, евакуація
- ☐ d. Евакуація, транспортна іммобілізація
- ☐ e. Введення протишокових розчинів, евакуація

Коментар

Правильна відповідь: Введення знеболювальних препаратів, транспортна іммобілізація, евакуація

Питання 123

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з гострим інфарктом міокарда з'явилися скарги на серцебиття, лихоманку, загальну слабкість. Загальний стан важкий, артеріальний тиск - 85/50 мм рт.ст., пульс - 190/хв., аритмічний. Дихання везикулярне. Набряки відсутні. ЕКГ: миготлива аритмія, частота серцевих скорочень 220/хв. З чого треба розпочати лікування?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення строфантину в/в
- ☐ б. Введення верапамілу в/в
- ☐ в. Введення лідокаїну в/в
- ☐ г. Електроімпульсна терапія
- ☐ д. Введення кордарону в/в

Коментар

Правильна відповідь: Електроімпульсна терапія

Питання 124

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Підліток 15-ти років доставлений до лікарні у стані непритомності. В анамнезі: часте блювання, блювотні маси чорного кольору, мелена. При огляді: блідість шкірних покривів. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. Частота серцевих скорочень - 125/хв. Пульс ниткоподібний. Тони серця приглушені, ритмічні. Живіт при пальпації м'який. Який невідкладний стан розвинувся у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра серцева недостатність
- ☐ б. Гостра судинна недостатність
- ☐ в. Шлунково-кишкова кровотеча
- ☐ г. Непритомність
- ☐ д. Колапс

Коментар

Правильна відповідь: Шлунково-кишкова кровотеча

Питання 125

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 64-х років спостерігаються спрага, слабкість, сухість у роті, часте сечовипускання, сонливість. В анамнезі ниркова недостатність. Хворий загальмований, шкіра суха, зморшувата, очні яблука запалі, періодичні судоми кінцівок. Запаху ацетону немає. Цукор крові - 48 ммоль/л, рН крові - 7,38. Яке дослідження слід призначити першочергово?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Визначення трансаміназ сироватки крові
- ☐ b. Визначення ліпідного спектру крові
- ☐ c. Визначення мікроелементів крові
- ☐ d. Визначення білкового спектру крові
- ☐ e. Визначення осмолярності крові

Коментар

Правильна відповідь: Визначення осмолярності крові

Питання 126

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини з масою тіла 4200 г, довжиною 58 см, яка народилася від III вагітності, II пологів в терміні гестації 42 тижні, відсутня функція зовнішнього дихання. При народженні в амніотичній рідині спостерігалися частки меконію. Не виключена аспірація новонародженим меконіальних навколоплідних вод. Вкажіть першу дію у послідовності заходів первинної реанімації новонародженого:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Санація верхніх дихальних шляхів
- ☐ b. Киснева допомога
- ☐ c. Штучний масаж серця
- ☐ d. Тактильна стимуляція
- ☐ e. Корекція гіповолемії

Коментар

Правильна відповідь: Санація верхніх дихальних шляхів

Питання 127

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У підлітка 16-ти років 4 місяці тому діагностовано туберкульоз легенів. Після лікування впродовж 2-х місяців дитина самостійно перервала прийом протитуберкульозних препаратів. У зв'язку з погіршенням стану було повторно призначене лікування. Через 2 тижні з'явились втрата рівноваги, зниження слуху, дзвін у вухах. Прийом якого препарату зумовив появу таких симптомів і потребує відміни?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Стрептоміцин
- ☐ b. Етамбутол
- ☐ c. Ізоніазид
- ☐ d. Рифампіцин
- ☐ e. Піразинамід

Коментар

Правильна відповідь: Стрептоміцин

Питання 128

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 40-ка років, який 3 дні тому повернувся з Індії, раптово з'явились озноб, жар, сильний головний біль, запаморочення, неспокій, надмірна рухливість, гіперемія обличчя і кон'юнктиви. Язик сухий, вкритий білим нальотом, петехіальний висип. В паховій ділянці справа з'явився сильний біль, у тому ж місці незабаром утворився бубон. У гемограмі: значний нейтрофільний лейкоцитоз, збільшення швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ). Ваш попередній діагноз: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Сибірка
- ☐ b. Псевдотуберкульоз
- ☐ c. Пахвинний фурункул
- ☐ d. Туляремія
- ☐ e. Чума

Коментар

Правильна відповідь: Чума

Питання 129

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На полі бою оглядається військовослужбовець 18-ти років, що скаржиться на різкий біль в правій половині грудної клітки, задишку. Відомо, що потерпілий зазнав колото-різаного поранення грудної клітки. При огляді в 4 міжребер'ї по передній аксиллярній лінії справа визначається рана 3х4 см, через яку з плевральної порожнини надходить повітря. Що повинен зробити санітарний інструктор на полі бою?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ввести антибактеріальні препарати
- ☐ b. Виконати дренування плевральної порожнини
- ☐ c. Виконати пункцію плевральної порожнини
- ☐ d. Обробити рану антисептиком
- ☐ e. Накласти герметичну оклюзійну пов'язку на рану

Коментар

Правильна відповідь: Накласти герметичну оклюзійну пов'язку на рану

Питання 130

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Батьки 3-місячного немовляти звернулися до лікарні зі скаргами на ціаноз шкірних покривів при крику, занепокоєння дитини при годуванні. Об'єктивно: недостатня надбавка маси тіла дитини. У легенях: жорстке дихання. Частота дихання - 32/хв., частота серцевих скорочень - 160/хв. Тони серця ритмічні, грубий систолічний шум уздовж лівого краю грудини. Який з діагностичних методів слід застосувати для підтвердження діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Бронхографію
- ☐ b. Бронхоскопію
- ☐ c. Ехокардіографію
- ☐ d. Рентгенографію органів грудної клітки
- ☐ e. Електрокардіограму

Коментар

Правильна відповідь: Ехокардіографію

Питання 131

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий перебував у вогнищі застосування напалму та продуктів горіння. Доставлений через 1,4-2 години. Скаржиться на головний біль пульсуючого характеру, шум у вухах, появу "туману" перед очима, наростаючу м'язову слабкість (переважно в ногах). Спостерігається психо- моторний розлад, гіперемія обличчя, ейфорія. Пульс - 100/хв., тони серця ослаблені, артеріальний тиск - 85/60 мм рт.ст., частота дихання - 24/хв., дихання везикулярне. Температура тіла - 37,3оС.

Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інгаляційне отруєнням хлорованими вуглеводнями
- ☐ б. Гостре пероральне отруєння дихлоретаном важкого ступеня
- ☐ с. Отруєння димом (продуктами горіння, нітрогази)
- ☐ d. Гостре отруєння окисом вуглецю
- ☐ е. Отруєння димом легкого ступеня

Коментар

Правильна відповідь: Гостре отруєння окисом вуглецю

Питання 132

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитину 10-ти років доставили після автотравми. Переважно - удар тулуба праворуч, основна скарга - біль в ділянці поперека, зглаженість та зростаюча припухлість тканин. Різко позитивний симптом Пастернацького. Мікрогематурія. Для ушкодження якого органу більш характерні вказані ознаки?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Шлунок
- ☐ б. Підшлункова залоза
- ☐ с. Печінка
- ☐ d. Нирки
- ☐ е. Селезінка

Коментар

Правильна відповідь: Нирки

Питання 133

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 34-х років через 2 тижні після пологів з'явився біль у лівій нижній кінцівці. Ліве стегно і гомілка різко збільшилися в об'ємі за рахунок набряку. Спостерігається синюшність шкірних покривів. Пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Облітеруючий ендартеріт
- ☐ b. Гострий артеріальний тромбоз
- ☐ c. Попереково-крижовий радикуліт
- ☐ d. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен
- ☐ e. Ілеофеморальний тромбоз

Коментар

Правильна відповідь: Ілеофеморальний тромбоз

Питання 134

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець 16 діб тому зазнав радіаційного ураження під час обслуговування ядерних боєприпасів. Через годину розпочалося багаторазове блювання та головний біль, які пройшли на другу добу. Об'єктивно: загальний стан задовільний, шкіра суха, на обличчі і кистях рук спостерігається еритема, а також вогнищева епіляція волосистої частини голови. Температура тіла - 37,0°C. Тони серця приглушені, тахікардія до 110/хв., артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст. В аналізі крові: лейкопенія (0,8 10³/мкл), лімфопенія, тромбоцитопенія. Яка фаза променевої хвороби залежно від її тяжкості найімовірніше спричиняє таку клінічну картину?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Фаза первинної загальної реакції гострої променевої хвороби IV ступеня тяжкості
- ☐ b. Латентна фаза гострої променевої хвороби II ступеня тяжкості
- ☐ c. Латентна фаза гострої променевої хвороби III ступеня тяжкості

- ☐ d. Фаза первинної загальної реакції гострої променевої хвороби III ступеня тяжкості
- ☐ e. Латентна фаза гострої променевої хвороби IV ступеня тяжкості


Коментар

Правильна відповідь: Латентна фаза гострої променевої хвороби III ступеня тяжкості

Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопець 16-ти років, що стояв на зупинці поряд із лікарнею раптом зблід, втратив свідомість. Зіниці розширились. Пульс на магістральних артеріях відсутній. Доставлений до приймального відділення. Черговим терапевтом розпочато реанімаційні заходи. При підключенні кардіомонітору - пряма лінія. Які заходи треба вжити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Провести дефібриляцію
- ☐ b. Провести реанімаційний комплекс за системою САВ
- ☐ c. Внутрішньосерцево ввести адреналін
- ☐ d. Внутрішньовенно ввести хлорид кальцію


Коментар

Правильна відповідь: Провести реанімаційний комплекс за системою САВ

Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого на цироз печінки з синдромом портальної гіпертензії IV ступеня з'явилися випорожнення темного кольору, розвинулися різка слабкість та запаморочення. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., пульс - 110/хв. Який прогноз подальшого стану хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Розвиток ТЕЛА
- ☐ b. Розвиток гіперосмолярної коми
- ☐ c. Розвиток печінкової коми
- ☐ d. Розвиток хронічної серцевої недостатності

☐ е. Одужання
Коментар

Правильна відповідь: Розвиток печінкової коми

Питання 137

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнта 52-х років доставлено у відділення реанімації в перші години гострого інфаркту міокарда. Стан вкрай важкий: свідомість відсутня, шкірні покриви бліді, слизові оболонки ціанотичні, м'язова атонія, поодинокі поверхневі вдихи, пульс на променевих та сонних артеріях не визначається. На ЕКГ виявлено великохвильову фібриляцію шлуночків. Якого терапевтичного заходу слід вжити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення кальцію хлориду
- ☐ б. Електрична дефібриляція
- ☐ в. Введення адреналіну гідрохлориду
- ☐ г. Введення аміодарону
- ☐ е. Введення лідокаїну

Коментар

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

Питання 138

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 8-ми років вже другий тиждень хворіє на кашлюк. Вранці дитина самостійно випила увесь флакон сиропу від кашлю, в якому містився кодеїн. Спочатку дівчинка була неспокійною, згодом стала сонливою, мати двічі спостерігала судоми. Який антидот необхідно ввести при цьому отруєнні?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Амітриптилін
- ☐ б. Тарен
- ☐ в. Атропін

- ☐ d. Цистамін
 - ☐ e. Налоксону гідрохлорид
- Коментар

Правильна відповідь: Налоксону гідрохлорид

Питання 139

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина впала на приведену руку. Скарги на сильний біль в середній третині плеча, неможливість рухів. При огляді виявляються деформація та крепітація. Поставте діагноз:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Перелом плеча
- ☐ b. Вивих пальців кисті
- ☐ c. Вивих плеча
- ☐ d. Вивих кісток передпліччя
- ☐ e. Перелом кісток передпліччя

Коментар

Правильна відповідь: Перелом плеча

Питання 140

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 43-х років, якого було госпіталізовано у гастроентерологічне відділення з діагнозом "цироз печінки з портальною гіпертензією III ступеня", після проведеного форсованого діурезу з'явилися ознаки печінкової енцефалопатії III ступеня. Призначення яких препаратів повинно бути першочерговим?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інсулін
- ☐ b. Лактулоза
- ☐ c. Гепатопротектори
- ☐ d. Діуретики

☐ е. Інгібітори протеаз
Коментар

Правильна відповідь: Лактулоза

Питання 141

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка перебуває в терміні 36 тижнів вагітності. Її зранку турбує нудота, двічі відбулося блювання, артеріальний тиск - 220/140 мм рт.ст. Впродовж 2-х тижнів спостерігалися набряки на нижніх кінцівках. В якому відділенні треба лікувати хвору?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Терапевтичному
- ☐ b. Патології вагітних
- ☐ c. Поліклінічному
- ☐ d. Денному стаціонарі
- ☐ е. Кардіологічному

Коментар

Правильна відповідь: Патології вагітних

Питання 142

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікарем швидкої допомоги оглянуто потерпілого після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з ЧМТ. Останній перебуває у непритомному стані, язик западає, зіниці розширені, брадикардія. Порушення дихання немає. Яких заходів профілактики асфіксії треба вжити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ввести повітропровід
- ☐ b. Покласти потерпілого на живіт
- ☐ c. Виконати інтубацію трахеї
- ☐ d. Надати положення напівсидячи
- ☐ е. Покласти потерпілого на бік


Коментар

Правильна відповідь: Ввести повітропровід

Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина народилася від першої вагітності, перших фізіологічних пологів, з вагою 3200 г. У матері генітальний герпес. На 7-й день життя у дитини спостерігається підвищення температури до 39,5оС, виражені симптоми інтоксикації. На 9-й день життя з'явилися порушення свідомості, клоніко-тонічні судоми, парез правої руки. При дослідженні СМР: білок - 1,5 г/л, цироз - 1300 106/л (95% лімфоцитів). Який етіотропний препарат необхідно призначити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Флуконазол
- ☐ b. РНК-аза
- ☐ c. Цефтріаксон
- ☐ d. Ацикловір
- ☐ e. Цифран


Коментар

Правильна відповідь: Ацикловір

Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 32-х років звернувся до лікаря зі скаргами на нездужання, підвищення температури тіла до 38оС, періодичний біль у надчеребній ділянці, нудоту й блювання. На другий день погіршився зір, неможливо стало читати газету, з'явився туман та сітка перед очима. Об'єктивно: двобічний птоз, анізокорія, ністагм, погіршення ковтання. За два дні до цього вживав рибні консерви. У хворого є підозра на ботулізм. Основним напрямком у лікуванні є призначення:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Церебральної пункції
- ☐ b. Левоміцетину в дозі 0,5 г 4 рази на добу
- ☐ c. Протиботулінічної антитоксичної сироватки

- ☐ d. Серцевих глікозидів
☐ e. Сольових розчинів


Коментар

Правильна відповідь: Протиботулінічної антитоксичної сироватки

Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 63-х років під час перебування на пляжі в спекотний день відчула запаморочення, шум у вухах, нудоту, відбулося одноразове блювання. Об'єктивно: шкіра обличчя гіперемована, температура - 38,3оС, частота дихання - 24/хв., пульс - 119/хв., артеріальний тиск - 135/85 мм рт.ст. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпертензивний криз
☐ b. Вегетативний криз
☐ c. Мігрень
☐ d. Тепловий удар
☐ e. Колапс


Коментар

Правильна відповідь: Тепловий удар

Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 9-ти років захворів гостро. Після укусу оси у великий палець лівої руки протягом 2 годин поступово розвинувся набряк кисті, шкіра стала щільноеластичною, білого кольору. Відчуття заніміння пальців, свербіж шкіри. В анамнезі харчова алергія. Батько страждає на поліноз. Вкажіть вірогідний діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Комплементозалежний ангіоневротичний набряк
☐ b. Псевдоалергічний ангіоневротичний набряк
☐ c. Ідіопатичний ангіоневротичний набряк

- ☐ d. Спадковий ангіоневротичний набряк
- ☐ e. Алергічний ангіоневротичний набряк


Коментар

Правильна відповідь: Алергічний ангіоневротичний набряк

Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта на 5-ту добу після операції розвинулася клінічна картина тромбоемболії легеневої артерії, настала раптова коронарна смерть. Який препарат необхідно було призначити для профілактики цього ускладнення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Курантил
- ☐ b. Трентал
- ☐ c. Аспірин
- ☐ d. Реополіглюкін
- ☐ e. Еноксипарин


Коментар

Правильна відповідь: Еноксипарин

Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 27-ми років лежить на животі непритомний після автодорожньої пригоди. З чого слід розпочинати надання першої медичної допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Не має значення з чого починати
- ☐ b. Перевернути та оглянути для виявлення ушкоджень
- ☐ c. Ввести знеболювальні
- ☐ d. Виконати прийом Селліка
- ☐ e. Накласти комір Шанца


Коментар

Правильна відповідь: Накласти комір Шанца

Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 72-х років звернувся до лікаря поліклініки зі скаргами на відсутність виділення сечі протягом 8 годин. Страждає на аденому передміхурової залози. При пальцевому ректальному дослідженні встановлено: передміхурова залоза до 7 см в діаметрі, неbolюча, тугоеластична, міжчасткова борозенка згладжена, слизова оболонка прямої кишки над нею рухома. Який метод діагностики буде найбільш інформативним для визначення розмірів передміхурової залози та об'єму залишкової сечі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Уретроцистоскопія
- ☐ b. Урофлоуметрія
- ☐ c. Низхідна цистографія
- ☐ d. Ультразвукова сонографія
- ☐ e. Екскреторна урографія


Коментар

Правильна відповідь: Ультразвукова сонографія

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після перенесеного бойового стресу у військовослужбовця спостерігаються страх, тривога, роздратованість, пригнічений настрій, відчуження, жахливі сновидіння про минулі події. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Іпохондричний розлад
- ☐ b. Посттравматичний стресовий розлад
- ☐ c. Гостра реакція на стрес
- ☐ d. Депресивний розлад

☐ е. Соматизований розлад
Коментар

Правильна відповідь: Посттравматичний стресовий розлад

Питання 151

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До перинатолога звернулася вагітна в терміні 30 тижнів зі скаргами на відсутність рухів плода впродовж 3-х днів. В анамнезі гостра респіраторна вірусна інфекція (ГР- ВІ) місяць тому. Артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст., пульс - 76/хв. Положення плода повздовжнє, передлежить голівка, серцебиття не вислуховується, при ультразвуковому дослідженні (УЗД) не візуалізується. Якими будуть подальші дії лікаря жіночої консультації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Кардіотокографія
- ☐ б. Госпіталізація в пологовий будинок
- ☐ в. Дообстеження в умовах жіночої консуль- тації
- ☐ г. Підготовка шийки матки в умовах жіночої консультації
- ☐ е. Амніоскопія

Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація в пологовий будинок

Питання 152

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 62-х років з діагнозом холедохолітіаз, механічна жовтяниця, що попередньо тривалий час приймала препарати з групи блокаторів кальцієвих каналів, настала зупинка кровообігу внаслідок асистолії. Які медикаментозні засоби, крім адреналіну, необхідно використовувати для медикаментозного забезпечення реанімаційних заходів?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Кордарон
- ☐ б. Строфантин
- ☐ в. Кальцію хлорид

- ☐ d. Еуфілін
- ☐ e. Дофамін
- Коментар

Правильна відповідь: Кальцію хлорид

Питання 153

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 25-ти років, вагітність 32 тижні. Надійшла в коматозному стані із запахом ацетону. В анамнезі цукровий діабет впродовж 8-ми років. Серцебиття плода - 160/хв., пологової діяльності немає. Артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст., пульс - 72/хв. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Екламптична кома
- ☐ b. Гіперглікемічна кома
- ☐ c. Прееклампсія
- ☐ d. Гіпоглікемічна кома
- ☐ e. Сепсис

Коментар

Правильна відповідь: Гіперглікемічна кома

Питання 154

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 45-ти років скаржиться на випорожнення кров'ю більш ніж 12 разів на добу протягом двох тижнів, біль у животі та суглобах, болючі висипи у порожнині рота та на нижніх кінцівках, набряк колінних та гомілковостопних суглобів, слабкість, підвищення температури тіла понад 39°C, втрату ваги тіла. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гемороїдальна кровотеча
- ☐ b. Неспецифічний виразковий коліт
- ☐ c. Ревматоїдний артрит

- ☐ d. Рак прямої кишки
- ☐ e. Хвороба Бехчета


Коментар

Правильна відповідь: Неспецифічний виразковий коліт

Питання 155

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У приймальне відділення лікарні ургентно доставлений хворий 19-ти років. Під час обстеження спостерігаються багаторазові розгорнуті повторні судомні напади, непритомний, піна з рота, шкіра сірувато-білого кольору, на лобі підшкірна гематома 1х2 см, частота серцевих скорочень - 120/хв., коливання артеріального тиску від 130/80 до 170/100 мм рт.ст. При неврологічному обстеженні: зіниці на світло не реагують, погляд не фокусує, патологічні рефлекси нижніх кінцівок. Який стан у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Епілептичний статус
- ☐ b. Делірій
- ☐ c. Правець
- ☐ d. Менінгіт
- ☐ e. Гостре порушення мозкового кровообігу


Коментар

Правильна відповідь: Епілептичний статус

Питання 156

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець отримав удар по шиї ребром долоні. Травмований втратив свідомість, у нього різко утруднене дихання з ускладненим вдихом, сіро-синя шкіра обличчя та рук. Яку допомогу потрібно надати постраждалому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інтубація, трахеостомія
- ☐ b. Трахеотомія

- ☐ c. Інтубація трахеї
- ☐ d. Трахеостомія
- ☐ e. Конікотомія


Коментар

Правильна відповідь: Конікотомія

Питання 157

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 54-х років втратив свідомість, дихання та серцева діяльність відсутні, зіниці широкі. Почали проводити реанімаційні заходи. Що свідчитиме про ефективність реанімаційних заходів?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Синхронне з вдихом посмикування рук
- ☐ b. Звуження зіниць
- ☐ c. Синхронне з вдихом роздування живота
- ☐ d. Синхронне з вдихом посмикування ніг
- ☐ e. Синхронне з вдихом похитування голови


Коментар

Правильна відповідь: Звуження зіниць

Питання 158

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 55-ти років впродовж 2-х місяців спостерігалася сеча червоного кольору, схуд на 5 кг. В загальному аналізі крові: еритроцити - $3,7 \cdot 10^{12}/л$, Hb- 100 г/л, кольоровий показник - 0,9, лейкоцити - $4,5 \cdot 10^9 /л$, швидкість осідання еритроцитів - 45 мм/год. В загальному аналізі сечі: білок 0,165 г/л, лейкоцити - 3-4 в п/з, еритроцити 10-15 в п/з. На УЗД нирок: розміри правої нирки - 150x80 мм, в паренхімі спостерігається гіпоехогенна зона 20 мм в діаметрі, без чітких контурів. Яке обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Оглядову урографію
- ☐ b. Хромоцистоскопію

- ☐ c. Пробу Реберга-Тареева
- ☐ d. Пробу з водним навантаженням
- ☐ e. Комп'ютерну томографію


Коментар

Правильна відповідь: Комп'ютерну томографію

Питання 159

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На місті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з пошкодженого автомобілю витягнуто хлопчика 12-ти років з численними забоями грудної клітки та відкритим переломом гомілки. При огляді: задуха, ціаноз шкіри. Права половина грудної клітини не бере участі у диханні. При перкусії: над нею визначається високий тимпаніт, аускультативно дихання не прослуховується, межі серцевої тупості зміщено вліво. Тони серця глухі, прискорені. Про який небезпечний стан це свідчить?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ателектаз правої легені
- ☐ b. Гемоторакс
- ☐ c. Забій легені
- ☐ d. Відкритий пневмоторакс
- ☐ e. Напружений правобічний пневмоторакс


Коментар

Правильна відповідь: Напружений правобічний пневмоторакс

Питання 160

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина з масою тіла 2900 г народилась в важкій асфіксії з оцінкою за шкалою Апгар - 1 бал. Незважаючи на вентиляцію легень 100% та закритий масаж серця стисканням грудини, частота серцевих скорочень не перевищує 80/хв. з тенденцією до зниження через 2 хвилини після пологів. Вкажіть медикаментозні середники для підтримки роботи міокарду:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Корглікон

- ☐ b. Адреналін
- ☐ c. Алупент
- ☐ d. Дигоксин
- ☐ e. Атропін


Коментар

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 161

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 36-ти років близько 3-х годин тому отримав проникне ножове поранення лівої половини грудної клітки. Доставлений в тяжкому стані: ейфорія, шкірні покриви бліді, тони серця глухі, тахікардія - 130/хв., артеріальний тиск - 80/70 мм рт.ст. Пульс на зап'ястку ледь визначається. Рана грудної клітки 2 см, розташована зліва по парастернальній лінії на рівні III міжреберного проміжку. Дихання над лівою легенею ослаблене, в задньо-нижніх відділах вкорочений перкуторний звук. Які лікувальні заходи найбільш доцільні?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Невідкладна торакотомія
- ☐ b. Переливання крові
- ☐ c. Комплекс реанімаційних заходів
- ☐ d. Плевральна пункція
- ☐ e. Пункція перикарду


Коментар

Правильна відповідь: Невідкладна торакотомія

Питання 162

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Тяжкопоранений солдат зі значною крововтратою вертольотом доставлений у госпіталь. В приймальному відділенні розпочато переливання крові. Одразу після початку переливання відзначили почервоніння обличчя, з'явився біль у поперековій ділянці, знизився артеріальний тиск,

прискорився пульс, з'явилися нудота та запаморочення. Якими будуть першочергові дії в цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести серцеві глікозиди
- ☐ b. Припинити переливання крові, вийти з вени
- ☐ c. Прискорити гемотрансфузію
- ☐ d. Відключити систему з кров'ю та підключити з фізіологічним розчином
- ☐ e. Негайно замінити флакон з кров'ю на інший цієї ж групи


Коментар

Правильна відповідь: Відключити систему з кров'ю та підключити з фізіологічним розчином

Питання 163

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілого 22-х років ножове поранення, перерізана артерія лівої руки, крововтрата - 1,0 л, Hb-95 г/л, геморагічний шок I ступеня. Чи показане такому хворому переливання еритроцитарної маси?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Не показане
- ☐ b. Краще свіжозаморожена плазма
- ☐ c. Альбумін
- ☐ d. Показане
- ☐ e. Інфузійна терапія взагалі не показана


Коментар

Правильна відповідь: Не показане

Питання 164

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 3-х років підвищення температури до 40°C, виражений інтоксикаційний синдром. Для зниження температури тіла використовували одночасно парацетамол в свічках і суспензії. На 3-тю

добу використання парацетамолу розпочалося блювання, дитина стала збудженою, з'явилися червоні плями на обличчі та шиї. Якою повинна бути тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Призначення заспокійливих засобів
- ☐ b. Оральна регідратація
- ☐ c. Призначення десенсибілізуючих засобів
- ☐ d. Призначення протиблювотних засобів
- ☐ e. Негайна госпіталізація у реанімаційне відділення


Коментар

Правильна відповідь: Негайна госпіталізація у реанімаційне відділення

Питання 165

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини після укусу гадюки в ногу виникли різкий біль, заніміння, двоїння в очах, порушення ковтання, афонія, порушення свідомості. Яких лікувальних заходів слід вжити в першу чергу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Зробити надрізи у місці укусу
- ☐ b. Припідняте положення ураженої ноги
- ☐ c. Припекти місце укусу
- ☐ d. Дати алкогольний напій
- ☐ e. Ввести протизміїну сироватку


Коментар

Правильна відповідь: Ввести протизміїну сироватку

Питання 166

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка 14-ти років надійшла у приймальне відділення у стані геморагічного шоку. При обстеженні діагностовано позаматкову вагітність з розривом маткової труби та внутрішньою кровотечею. Об'єктивно: загальмована, шкірні покриви сухі, бліді та холодні, артеріальний тиск - 70/20 мм рт.ст., пульс - 132/хв. Сеча (з катетеру) відсутня. Контакт з батьками дівчини неможливий.

Пацієнтка категорично відмовляється від операції. Кому з юридичної точки зору належить право прийняття рішення щодо проведення операції в цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пацієнтці за згодою її батьків
- ☐ b. Консилиуму лікарів
- ☐ c. Судовим органам
- ☐ d. Виключно пацієнтці
- ☐ e. Виключно батькам


Коментар

Правильна відповідь: Консилиуму лікарів

Питання 167

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 73-х років у приймальному відділенні раптово виникла асистолія. Що з перерахованого слід враховувати лікарю приймального відділення, який вживає реанімаційних заходів до прибуття бригади анестезіологів, у зв'язку з віком хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Зменшити частоту дихання при штучній вентиляції легень (ШВЛ)
- ☐ b. Силу натискання при непрямому масажі серця
- ☐ c. Змінити тривалість реанімаційних заходів
- ☐ d. Відмовитися від використання дефібрилятора
- ☐ e. Зменшити частоту серцевих скорочень (ЧСС) при непрямому масажі серця


Коментар

Правильна відповідь: Силу натискання при непрямому масажі серця

Питання 168

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У приймальне відділення доставлено хлопчика 7-ми років з електротравмою (взявся за оголений електропровід). У потерпілого опіки 2 ступеня I та II пальців правої кисті та порушення серцевого ритму. Які обстеження необхідно провести першочергово?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Електрокардіограма
- ☐ b. Аналіз крові на електроліти
- ☐ c. Ультразвукове дослідження серця
- ☐ d. Фонокардіограма
- ☐ e. Клінічний аналіз крові


Коментар

Правильна відповідь: Електрокардіограма

Питання 169

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого на епілепсію з'явилися постійні великі судомні напади з тонічними і клонічними судомними, між якими хворий залишається непритомним. На дотик і больові подразники не реагує. Зіниці вузькі, реакція на світло слабка. З якого препарату необхідно розпочати надання невідкладної допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Діазепам
- ☐ b. Галоперидол
- ☐ c. Дифенгідрамін
- ☐ d. Аміназин
- ☐ e. Анальгін


Коментар

Правильна відповідь: Діазепам

Питання 170

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 69-ти років, яка страждає на гіпертонічну хворобу, на тлі підвищення артеріального тиску до 200/110 мм рт.ст. з'явилися слабкість у правих кінцівках і моторна афазія, що поступово регресували впродовж доби. За даними МРТ головного мозку: виявлено численні вогнища

зниженої щільності до 10 мм у діаметрі у білій речовині мозку навколо бічних шлуночків та у субкортикальних відділах мозкових півкуль. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ішемічний інсульт
- ☐ b. Субарахноїдальний крововилив
- ☐ c. Гостра гіпертензивна енцефалопатія
- ☐ d. Тромбоз кавернозного синусу
- ☐ e. Транзиторна ішемічна атака


Коментар

Правильна відповідь: Транзиторна ішемічна атака

Питання 171

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У породіллі в ранньому післяпологовому періоді виник геморагічний шок у зв'язку з гіпотонічною кровотечею, що триває, незважаючи на лікування, крововтрата становить 1400 мл. Якою буде лікарська тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Лікування порушеної функції нирок
- ☐ b. Наркоз і проведення інтенсивної терапії
- ☐ c. Лікування геморагічного шоку
- ☐ d. Оперативне лікування
- ☐ e. Лікування геморагічного шоку паралельно з оперативною зупинкою кровотечі


Коментар

Правильна відповідь: Лікування геморагічного шоку паралельно з оперативною зупинкою кровотечі

Питання 172

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 48-ми років звернувся до лікаря зі скаргами на інтенсивний біль впродовж 2-х годин в ділянці серця, який віддає у ліву руку та ліву лопатку. Зроблено ЕКГ: ритм синусовий, правильний,

ознаки повної блокади лівої ніжки пучка Гіса. ЕКГ для порівняння в динаміці відсутня. Тест на серцевий тропонін позитивний. Вкажіть тактику ведення хворого:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Контроль ЕКГ через 10 днів
- ☐ b. Добовий моніторинг ЕКГ
- ☐ c. Призначити амбулаторне лікування
- ☐ d. Госпіталізувати у терапевтичне відділення
- ☐ e. Госпіталізувати у відділення кардіореанімації


Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізувати у відділення кардіореанімації

Питання 173

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В медичній роті проходить лікування прапорщик 22-х років, якого було поранено уламком снаряду в живіт. Стан залишався задовільним. В ділянці непроникної рани пов'язка трохи просякла кров'ю. Пульс 72/хв. Симптомів подразнення очеревини немає. Перистальтика кишечника прослуховується. В останні дні стан погіршився, з'явився кашель, підвищилася температура тіла - 37,9°C. При аускультії в нижньому відділі правої легені вислуховуються вологі хрипи. Яке ускладнення виникло у пораненого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пневмонія
- ☐ b. Загострення хронічного бронхіту
- ☐ c. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ d. Нагноєння рани
- ☐ e. Грип


Коментар

Правильна відповідь: Пневмонія

Питання 174

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 6-місячної дитини, яка отримувала терапію з приводу гострого ешерихіозного ентероколіту, з'явилися млявість, блідість шкірних покривів, набряклість обличчя, ін'єкція склер, а через дві доби - олігурія, жовтяничність, петехіальний висип, одноразова носова кровотеча. Сеча іржаво-коричневого кольору. У загальному аналізі крові: тромбоцитопенія. У цьому випадку можна припустити:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий пієлонефрит
- ☐ b. Гемолітико-уремічний синдром
- ☐ c. Спадкову гемолітичну анемію
- ☐ d. Гострий гломерулонефрит
- ☐ e. Дисбіоз кишечника


Коментар

Правильна відповідь: Гемолітико-уремічний синдром

Питання 175

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого спостерігаються явища гострої дихальної недостатності. При аускультатії ослаблене дихання ліворуч. Рентгенологічно: ексудативний плеврит ліворуч до III ребра. З чого варто розпочати лікувальні заходи?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дренування лівої плевральної порожнини в V-VI міжребер'ї по середній пахвовій лінії
- ☐ b. Симптоматична й антибактеріальна терапія
- ☐ c. Пункція плевральної порожнини в VII-VIII міжребер'ї по задній аксиллярній лінії
- ☐ d. Пункція плевральної порожнини в II міжребер'ї по середньоключичній лінії
- ☐ e. Антибактеріальна та дегідратаційна терапія, за неефективності - пункція і дренування плевральної порожнини


Коментар

Правильна відповідь: Пункція плевральної порожнини в VII-VIII міжребер'ї по задній аксиллярній лінії

Питання 176

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 3-х років, яка перебуває у стаціонарі, на тлі гострої респіраторної інфекції 3 рази було блювання, непокоїть гострий біль у животі. Температура тіла - 38,5°C. Шкіра бліда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор крові - 4,0 ммоль/л. Який з діагнозів найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Діабетична кома
- ☐ b. Ацетонемічний стан
- ☐ c. Гострий гастроентерит
- ☐ d. Цукровий діабет
- ☐ e. Гострий апендицит


Коментар

Правильна відповідь: Ацетонемічний стан

Питання 177

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10-ти років після дорожньо-транспортної пригоди спостерігається тривала кровотеча, відкритий перелом плеча, тупа травма живота, перелом стегна. Частота серцевих скорочень - 120/хв., артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст. У крові: Hb- 80 г/л, еритроцити - 2,4 · 10¹²/л, Ht-0,24. З яких кровозамінників необхідно розпочинати терапію?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кристалоїди
- ☐ b. Цільна кров
- ☐ c. Альбумін
- ☐ d. Свіжозаморожена плазма
- ☐ e. Еритроцитарна маса


Коментар

Правильна відповідь: Кристалоїди

Питання 178

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 34-х років страждає на епілептичні напади з 12-річного віку. Мають місце генералізовані тоніко-клонічні напади, пароксизми втрати свідомості на секунду із "блуканням", прогресує зниження пам'яті, інертність мислення. Годину тому почалися генералізовані напади з послідовною зміною фаз тонічних та клонічних судом. Перенесла п'ять нападів, свідомість не відновлювалася, на запитання не відповідає. Яке першочергове інструментальне обстеження слід призначити? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Аксиальну комп'ютерну томографію
- ☐ b. Рентгенографію кісток черепа
- ☐ c. Електроенцефалографію
- ☐ d. Реоенцефалографію
- ☐ e. Магнітно-резонансну томографію


Коментар

Правильна відповідь: Електроенцефалографію

Питання 179

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта скарги на слюзотечу, світлобоязнь, біль в оці та зниження зору правого ока. Гострота зору правого ока - 0,06, з корекцією не покращується, гострота зору лівого ока - 1,0. В правому оці виявлено змішану ін'єкцію, блефароспазм, слюзотечу. На рогівці в центральній зоні в середніх шарах спостерігається інфільтрат у вигляді диску. Чутливість рогівки знижена. Яка імовірна етіологія процесу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Глистна інвазія
- ☐ b. Амебіаз
- ☐ c. Бактеріальна
- ☐ d. Вірусна
- ☐ e. Грибкова


Коментар

Правильна відповідь: Вірусна

Питання 180

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На сортувальному майданчику медичної роти бригади пораненому встановлено попередній діагноз: мінно-вибухова травма. Травматичний шок. В ролі лікаря сортувальної бригади зробіть сортувальний висновок (черговість направлення та функціональний підрозділ):

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Перша черга, протишочкова для поранених
- ☐ б. Перша черга, госпітальне відділення
- ☐ с. Перша черга, перев'язочна для легкопоранених
- ☐ d. Друга черга, операційна для тяжкопоранених
- ☐ е. Перша черга, перев'язочна для поранених середньої тяжкості


Коментар

Правильна відповідь: Перша черга, протишочкова для поранених

Питання 181

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Підліток 14-ти років перебуває на диспансерному обліку з приводу артеріальної гіпертензії. Після емоційного стресу у хворого розвинувся гіпертензивний криз. Артеріальний тиск - 170/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 50/хв. Який медикаментозний засібви призначите?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Корвітол
- ☐ b. Кордіамін
- ☐ с. Каптоприл
- ☐ d. Панангін
- ☐ е. Дигоксин


Коментар

Правильна відповідь: Каптоприл

Питання 182

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У медичну роту 14-ї механізованої бригади з району ведення бойових дій аеропорту Донецьк надійшло 12 поранених. Сортувальна бригада виконує медичне сортування поранених. Яким принципом повинен керуватися медичний персонал під час проведення медичного сортування? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Єдиною класифікацією хворобі травм та єдиними вимогами до методики сортування
- ☐ б. Встановленням черговості надання медичної допомоги
- ☐ в. Розподілом поранених та хворих на групи згідно з евакуаційним призначенням
- ☐ г. Визначенням характеру поранення, встановленням черговості надання медичної допомоги
- ☐ д. Розподілом поранених та хворих на групи для направлення їх у функціональні підрозділи

Коментар

Правильна відповідь: Єдиною класифікацією хворобі травм та єдиними вимогами до методики сортування

Питання 183

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікаря жіночої консультації звернулася вагітна 20-ти років при терміні гестації 7-8 тижнів зі скаргами на блювання до 10 разів на добу, слабкість, запаморочення, підвищення температури тіла до 37,2оС, втрату маси тіла на 4 кг за 2 тижні. Ваша основна тактика: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Консультація інфекціоніста
- ☐ б. Консультація гастроентеролога
- ☐ в. Консультація хірурга
- ☐ г. Госпіталізація у гінекологічне відділення
- ☐ д. Спостереження

Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація у гінекологічне відділення

Питання 184

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Боець отримав поранення в праву нижню кінцівку на рівні колінного суглоба, після чого з рани відкрилася профузна кровотеча. Спроба зупинити кровотечу притисканням в рані не дала результату. Якими будуть ваші дії на полі бою?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Накласти стискальну пов'язку та залишити на передовій
- ☐ b. Накласти джгут на стегно, вказати час накладання та залишити на передовій
- ☐ c. Накласти джгут на стегно та відправити в операційний блок
- ☐ d. Накласти стискальну пов'язку, передати на наступний етап медичної евакуації
- ☐ e. Накласти джгут на стегно, вказати час накладання та евакуювати


Коментар

Правильна відповідь: Накласти джгут на стегно, вказати час накладання та евакуювати

Питання 185

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При проведенні реанімаційних заходів дитині 5-ти років із зупинкою кровообігу у позалікарняних умовах було інтубовано трахею, але венозний доступ відсутній. Який лікувальний засіб може бути введено ендотрахеально?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гідрокарбонат натрію
- ☐ b. Хлорид кальцію
- ☐ c. Трісамін
- ☐ d. Бретиліум
- ☐ e. Адреналін


Коментар

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 186

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Вкажіть максимальну тривалість визначення наявності пульсу:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 5 секунд
- ☐ b. 20 секунд
- ☐ c. 1 хвилина
- ☐ d. 15 секунд
- ☐ e. 10 секунд


Коментар

Правильна відповідь: 10 секунд

Питання 187

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 34-х років через 3 години після перенесеної субтотальної субфасціальної правобічної геміструмектомії раптово виникли задишка, тахікардія, відчуття неспокою, страху. Яке з наведених післяопераційних ускладнень виникло у хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пошкодження зворотного нерва
- ☐ b. Тиреотоксичний криз
- ☐ c. Паратиреоїдна тетанія
- ☐ d. Повітряна емболія
- ☐ e. Асфіксія


Коментар

Правильна відповідь: Тиреотоксичний криз

Питання 188

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 12-ти місяців захворіла вранці, підвищилася температура тіла до 39°C і з'явилися катаральні явища в носоглотці. Через 6 годин по всьому тілу з'явилася зірчаста висип. Свідомість

відсутня. Реакція зіниць на світло слабка. Пульс - 200/хв., ниткоподібний. Артеріальний тиск - 60/30 мм рт.ст. Останні 6 годин сечовипускання не було. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Менінгококова інфекція, менінгіт
- ☐ b. Менінгококова інфекція, менінгококцемія. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ c. Менінгококова інфекція, ринофарингіт
- ☐ d. Атопічний дерматит, тяжкий перебіг
- ☐ e. Геморагічний васкуліт, змішана форма


Коментар

Правильна відповідь: Менінгококова інфекція, менінгококцемія. Інфекційно-токсичний шок

Питання 189

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінці 34-х років, яка потрапила до лікарні з тяжкою кровотечею, призначено переливання свіжозамороженої плазми. Можна використати плазму групи АВ (IV), якщо хвора має:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Групу крові А (II)
- ☐ b. Групу крові О (I)
- ☐ c. Будь-яку групу крові
- ☐ d. Групу крові АВ (IV)
- ☐ e. Групу крові В (III)


Коментар

Правильна відповідь: Групу крові АВ (IV)

Питання 190

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 39-ти років надійшов у стаціонар на 6-й день хвороби в надзвичайно тяжкому стані, сонливий, в'ялий, не виділяє сечі більше доби. Захворів гостро, температура - 39,5оС, боліли голова та м'язи, особливо литкові. На 3-й день хвороби з'явилася жовтяниця, геморагічний висип

на тілі, нудота, блювання. Об'єктивно: печінка +6 см, болюча, щільна, нирки не пальпуються. Пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Яке ускладнення розвинулося у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра печінкова недостатність
- ☐ б. Гостра надниркова недостатність
- ☐ в. Гостра серцева недостатність
- ☐ г. Гостра ниркова недостатність
- ☐ д. Гостра печінково-ниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гостра печінково-ниркова недостатність

Питання 191

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини від матеріносія поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) стан задовільний. Активна, дихальних розладів немає. Печінка на 2 см нижче реберної дуги. Сеча світла, меконій відходить. Які профілактичні заходи треба призначити дитині?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Вакцинація проти гепатиту В на I добі життя
- ☐ б. Ізоляція дитини щоб уникнути поширення інфекції
- ☐ в. Скринінг матері на антиген гепатиту В
- ☐ г. Скринінг дитини на HBsAg
- ☐ д. Очікувальна тактика


Коментар

Правильна відповідь: Вакцинація проти гепатиту В на I добі життя

Питання 192

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий після переривання алкогольного запою перебуває в стані психомоторного збудження, афекту страху. Вказує на голу стіну з мімікою жаху, намагається втекти. Кричить, що його переслідують, хочуть задушити. Який стан найбільш імовірно розвинувся у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Обнубіляція
- ☐ b. Сутінки
- ☐ c. Делірій
- ☐ d. Онейроїд
- ☐ e. Аменція


Коментар

Правильна відповідь: Делірій

Питання 193

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий із серцево-судинною патологією потрапив до реанімаційного відділення з підозрою на інфаркт нирки. У нього підвищена температура - 39,5°C, гострий біль у попереку та гематурія. Артеріальний тиск - 180/110 мм рт.ст. Зроблено загальний аналіз крові, сечі, та біохімічне дослідження крові. Вкажіть найбільш характерні ознаки інфаркту нирки з перерахованих: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Біль і гематурія
- ☐ b. Протеїнурія
- ☐ c. Лейкоцитурія
- ☐ d. Підвищена швидкість осідання еритроцитів
- ☐ e. Циліндрурія


Коментар

Правильна відповідь: Біль і гематурія

Питання 194

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 38-ми років скаржиться на напади головного болю одностороннього характеру. Головний біль інтенсивний, локалізується в лобно-скроневій ділянці, починається раптово, триває від 3 до 10 годин. Перед нападом відзначається "затуманення" зору. Між нападами головного болю стан

задовільний. Неврологічний статус без особливостей. Які з наведених продуктів можуть спровокувати напад?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Молочнокислі продукти
- ☐ b. Ананас
- ☐ c. Білий хліб
- ☐ d. Смажена картопля
- ☐ e. Шоколад


Коментар

Правильна відповідь: Шоколад

Питання 195

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 57-ми років на пляжі відчула різкий головний біль, виникло блювання. Хвора знепритомніла. Об'єктивно: шкіра різко гіперемована. Артеріальний тиск - 200/130 мм рт.ст. Пульс - 98/хв., напружений. Дихання за типом Чейна-Стокса. Симптом "вітрила" справа. Права стопа ротована назовні. Глибокі рефлекси не викликаються. Який симптом необхідно перевірити у хворої в непритомному стані для визначення сторони ураженої півкулі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Хиткість у позі Ромберга
- ☐ b. Орального автоматизму
- ☐ c. Адіадохокінез
- ☐ d. Холодову пробу
- ☐ e. Ширину зіниць


Коментар

Правильна відповідь: Ширину зіниць

Питання 196

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 9-ти років доставлений в ургентну хірургічну клініку зі скаргами на переймистий біль у животі, який з'явився раптово вночі та супроводжувався блюванням. В анамнезі лікувався з приводу аскаридозу. Об'єктивно: хворий не знаходить собі місця, неспокійний. Під час нападу болю в правій здухвинній ділянці пальпується пухлиноподібне утворення. Якою буде подальша тактика? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Промити шлунок, зробити очисну клізму, ввести препарати спазмолітичної дії та відправити хворого на амбулаторне лікування
- ☐ б. Госпіталізація в хірургічне відділення для подальшого динамічного спостереження та проведення лікування
- ☐ в. Ввести спазмолітики, зробити очисну клізму та відправити хворого додому
- ☐ г. Дати рекомендації та відправити хворого додому на амбулаторне лікування
- ☐ д. Госпіталізація в інфекційне відділення


Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація в хірургічне відділення для подальшого динамічного спостереження та проведення лікування

Питання 197

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 79-ти років раптово виник біль в нижній частині живота. Хворий страждає на атеросклеротичну енцефалопатію II-III ступеня, контакт з ним утруднений. Об'єктивно: артеріальний тиск - 160/90 мм рт.ст., пульс - 78/хв. Язик вологий. Живіт м'який, болючий у нижніх відділах, де пальпується об'ємне еластичне утворення. Діурез відсутній. Яких заходів необхідно вжити на етапі приймального відділення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Цистоскопія
- ☐ б. Виведення сечі м'яким катетером
- ☐ в. Консультація невропатолога, ЕКГ, ЕЕГ
- ☐ г. Пункція сечового міхура
- ☐ д. Комп'ютерна томографія

Коментар

Правильна відповідь: Виведення сечі м'яким катетером

Питання 198

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого зі скаргами на виділення сечі з домішками крові протягом останньої доби госпіталізовано в урологічне відділення. При трьохсклянковій пробі у всіх порціях виявлені еритроцити на все поле зору. Який метод дослідження повинен провести ургентний уролог для первинної верифікації джерела кровотечі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Цистографія
- ☐ b. Комп'ютерна томографія
- ☐ c. Екскреторна урографія
- ☐ d. Цистоскопія
- ☐ e. Катетеризація сечового міхура


Коментар

Правильна відповідь: Цистоскопія

Питання 199

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В медичний пункт окремої військової частини доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням в ділянці 3-4 міжребер'я правої половини грудної клітки. Стан тяжкий. Систолічний артеріальний тиск - 90 мм рт.ст. Пульс - 140/хв. Шкіра бліда. На полі бою санітарним інструктором було накладено оклюзійну пов'язку та введено протибольовий засіб. На який етап медичної евакуації необхідно евакуювати пораненого для надання вичерпної медичної допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. В спеціалізований військово-польовий торако-абдомінальний госпіталь
- ☐ b. В військово-польовий сортувальний госпіталь
- ☐ c. В медичну роту механізованої бригади
- ☐ d. В військово-польовий госпіталь для легкопоранених
- ☐ e. В медичний пункт окремої військової частини


Коментар

Правильна відповідь: В спеціалізований військово-польовий торако-абдомінальний госпіталь

Питання 200

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років надійшов до приймально-діагностичного відділення з попереднім діагнозом защемлена пупкова грижа. Під час обстеження раптово зблід, втратив свідомість. Дихання відсутнє. Пульсація на магістральних артеріях припинилася 30 секунд тому. Зіниці розширені, на світло не реагують. З чого треба розпочати реанімаційні заходи?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Прекардіальний удар
- ☐ b. Електродефібриляція
- ☐ c. Штучне дихання
- ☐ d. Закритий масаж серця
- ☐ e. Медикаментозна терапія

Коментар

Правильна відповідь: Закритий масаж серця

[Завершити перегляд](#)

[Пропустити](#) Перехід по тесту

[Перехід по тесту](#)

[Питання 1 На цій сторінці](#) [Питання 2 На цій сторінці](#) [Питання 3 На цій сторінці](#) [Питання 4 На цій сторінці](#) [Питання 5 На цій сторінці](#) [Питання 6 На цій сторінці](#) [Питання 7 На цій сторінці](#) [Питання 8 На цій сторінці](#) [Питання 9 На цій сторінці](#) [Питання 10 На цій сторінці](#) [Питання 11 На цій сторінці](#) [Питання 12 На цій сторінці](#) [Питання 13 На цій сторінці](#) [Питання 14 На цій сторінці](#) [Питання 15 На цій сторінці](#) [Питання 16 На цій сторінці](#) [Питання 17 На цій сторінці](#) [Питання 18 На цій сторінці](#) [Питання 19 На цій сторінці](#) [Питання 20 На цій сторінці](#) [Питання 21 На цій сторінці](#) [Питання 22 На цій сторінці](#) [Питання 23 На цій сторінці](#) [Питання 24 На цій сторінці](#) [Питання 25 На цій сторінці](#) [Питання 26 На цій сторінці](#) [Питання 27 На цій сторінці](#) [Питання 28 На цій сторінці](#) [Питання 29 На цій сторінці](#) [Питання 30 На цій сторінці](#) [Питання 31 На цій сторінці](#) [Питання 32 На цій сторінці](#) [Питання 33 На цій сторінці](#) [Питання 34 На цій сторінці](#) [Питання 35 На цій сторінці](#) [Питання 36 На цій сторінці](#) [Питання 37 На цій сторінці](#) [Питання 38 На цій сторінці](#) [Питання 39 На цій сторінці](#) [Питання 40 На цій сторінці](#) [Питання 41 На цій сторінці](#) [Питання 42 На цій сторінці](#) [Питання 43 На цій сторінці](#) [Питання 44 На цій сторінці](#) [Питання 45 На цій сторінці](#) [Питання 46 На цій сторінці](#) [Питання 47 На цій сторінці](#) [Питання 48 На цій сторінці](#) [Питання 49 На цій сторінці](#) [Питання 50 На цій сторінці](#) [Питання 51 На цій сторінці](#) [Питання 52 На цій сторінці](#) [Питання 53 На цій сторінці](#) [Питання 54 На цій сторінці](#) [Питання 55 На цій сторінці](#) [Питання 56 На цій сторінці](#) [Питання 57 На цій сторінці](#) [Питання 58 На цій сторінці](#) [Питання 59 На цій сторінці](#) [Питання 60 На цій сторінці](#) [Питання 61 На цій сторінці](#) [Питання 62 На цій сторінці](#) [Питання 63 На цій сторінці](#) [Питання 64 На цій сторінці](#) [Питання 65 На цій сторінці](#) [Питання 66 На цій сторінці](#) [Питання 67 На цій сторінці](#) [Питання 68 На цій сторінці](#) [Питання 69 На цій сторінці](#) [Питання 70 На цій сторінці](#) [Питання 71 На цій сторінці](#) [Питання 72 На цій сторінці](#) [Питання 73 На цій сторінці](#) [Питання 74 На цій сторінці](#) [Питання 75 На цій сторінці](#) [Питання 76 На цій сторінці](#) [Питання 77 На цій сторінці](#) [Питання 78 На цій сторінці](#) [Питання 79 На цій сторінці](#) [Питання 80 На цій сторінці](#) [Питання 81 На цій сторінці](#) [Питання 82 На цій сторінці](#) [Питання 83 На цій сторінці](#) [Питання 84 На цій сторінці](#) [Питання 85 На цій сторінці](#) [Питання 86 На цій сторінці](#) [Питання 87 На цій сторінці](#) [Питання 88 На цій сторінці](#) [Питання 89 На цій сторінці](#) [Питання 90 На цій сторінці](#) [Питання 91 На цій сторінці](#) [Питання 92 На цій сторінці](#) [Питання 93 На цій сторінці](#) [Питання 94 На цій сторінці](#) [Питання 95 На цій сторінці](#) [Питання 96 На цій сторінці](#) [Питання 97 На цій сторінці](#) [Питання 98 На цій сторінці](#) [Питання 99 На цій сторінці](#) [Питання 100 На цій сторінці](#) [Питання 101 На цій сторінці](#) [Питання 102 На цій сторінці](#) [Питання 103 На цій сторінці](#) [Питання 104 На цій сторінці](#) [Питання 105 На цій сторінці](#) [Питання 106 На цій сторінці](#)

[illegible]

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

Учасники

Відзнаки

Компетентності

Журнал оцінок

Загальне

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Контрольні тестування

Секція 6

Секція 7

Секція 8

[Секція 9](#)

[Секція 10](#)

[Секція 11](#)

[Секція 12](#)

[Секція 13](#)

[Секція 14](#)

[Секція 15](#)

[Особистий кабінет](#)

[Домашня сторінка](#)

[Календар](#)

[Особисті файли](#)

Мої курси

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручняк Оксана Богданівна \(Вийти\)](#)
КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Українська \(uk\)](#)
 - - [English \(en\)](#)
 - [Русский \(ru\)](#)
 - [Українська \(uk\)](#)