

[Перейти до головного вмісту](#)
Бокова панель
КРОК-123

(Інтерн БДМУ) Підручняк Оксана Богданівна

П

Особистий кабінетПрофіль користувачаОцінкиПовідомленняУподобанняВийтиПовідомлення
[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане
Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане
Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)


[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Секція 3](#)
- [2014_весна](#)

Розпочато	Tuesday 14 February 2023 20:34 PM
Стан	Завершено
Завершено	Tuesday 14 February 2023 20:34 PM
Витрачено часу	16 сек
Балів	0,00/200,00
Оцінка	0,00 з 100,00 можливих
Питання 1	

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 73-х років хворіє на цукровий діабет другого типу, приймає манініл. Протягом двох тижнів приймає по 2 таблетки гіпотіазиду. Об'єктивно: свідомість сплутана, шкірні покриви сухі, теплі, тургор м'язів знижений, температура тіла - 38,0°C, Ps- 120/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст., дихання поверхневе, язик сухий, запах ацетону відсутній. Глюкоза крові - 34 ммоль/л, ацетон в сечі - слабкопозитивний, Na⁺ сироватки - 162 ммоль/л, K⁺ - 3,0 ммоль/л. Який розчин показаний для застосування в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпотонічний розчин NaCl
- ☐ b. Розчин Рінгера
- ☐ c. Поляризуєча суміш
- ☐ d. Фізіологічний розчин NaCl
- ☐ e. 5% розчин глюкози


Коментар

Правильна відповідь: Гіпотонічний розчин NaCl

Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 24-х років у терміні 40 тижнів надійшла до клініки зі скаргами на головний біль, нудоту, набряки ніг та передньої черевної стінки. АТ- 150/90 мм рт.ст. та 160/85 мм рт.ст., Ps- 92/хв. Серцебиття плоду 143/хв. Який метод дослідження необхідно зробити, щоб підтвердити діагноз прееклампсії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Загальний аналіз крові
- ☐ b. Бактеріологічний аналіз сечі
- ☐ c. Коагулограма
- ☐ d. Аналіз сечі на білок
- ☐ e. Біохімічний аналіз крові

Коментар

Правильна відповідь: Аналіз сечі на білок

Питання 3

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 49-ти років доставлена каретою швидкої допомоги в ЛОР клініку із скаргами на відчуття здавлення в горлі, утруднене дихання, кашель, відчуття наявності стороннього тіла в горлі. Захворювання пов'язує з контактом із миючими хімічними засобами, з якими контактувала 3 години тому. Об'єктивно: слизова нижнього відділу глотки та гортані блідо-рожевого водянисто-го набряку, вхід в гортань звужений, дихання утруднене, стеноз першої стадії. Які дії в профілактиці асфіксії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Бужування гортані
- ☐ б. Десенсибілізуюча та протинабрякова терапія
- ☐ в. Інтубація
- ☐ г. Протизапальна терапія, антибіотикотерапія
- ☐ д. Конікотомія

Коментар

Правильна відповідь: Десенсибілізуюча та протинабрякова терапія

Питання 4

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 47-ми років, що постраждав унаслідок ДТП, скаржиться на різкий біль у правому стегні, психомоторне збудження. Об'єктивно: шкіра бліда, волога, позитивний симптом "білої" плями. АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв. Локально виявляється деформація верхньої третини правого стегна та його патологічна рухливість. Чим зумовлена важкість стану постраждалого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Травматичний шок I ступеня
- ☐ б. Травматичний шок IV ступеня
- ☐ в. Больовий синдром
- ☐ г. Травматичний шок II ступеня
- ☐ д. Травматичний шок III ступеня

Коментар

Правильна відповідь: Травматичний шок II ступеня

Питання 5

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінку 77-ми років доставлено в лікарню без свідомості. Неврологічний статус: лівобічна параплегія. Протромбін за Квіком становить 108%. На КТ-сканах відзначається: у правій півкулі головного мозку ділянка з нерівномірним зниженням оптичної щільності. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ішемічний інсульт
- ☐ b. Геморагічний інсульт
- ☐ c. Менінгоенцефаліт
- ☐ d. Метастази у головний мозок
- ☐ e. Субарахноїдальний крововилив

Коментар

Правильна відповідь: Ішемічний інсульт

Питання 6

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 22 роки, 30 тижнів вагітності, доставлена в інфекційну лікарню з діагнозом гострий гепатит В зі скаргами на різку слабкість, повторне блювання, виражену жовтяницю. При перкусії над печінкою тимпаніт. Яке дослідження треба терміново виконати разом з печінковими пробами?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Протромбіновий індекс
- ☐ b. ПЛР HBV
- ☐ c. HBsAg, aHBc
- ☐ d. HBeAg, aHBe
- ☐ e. Посів блювотних мас

Коментар

Правильна відповідь: Протромбіновий індекс

Питання 7

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінці 32-х років з приводу пневмонії був призначений ампіцилін. Через 30 хвилин після внутрішньом'язової ін'єкції препарату хвора відчула різку слабкість, свербіж шкіри обличчя та рук, нудоту; з'явилися кашель, задишка, біль у грудній клітці. Об'єктивно: ціаноз, набряк повік та обличчя з червоними висипаннями. Ps- 120/хв, АТ- 70/20 мм рт.ст. Тони серця глухі, дихання часте, поверхнєве, з різнокаліберними сухими хрипами. Варикозне розширення вен на правій гомілці. Яка найбільш вірогідна причина раптового погіршення стану хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Набряк Квінке
- ☐ b. Астматичний напад
- ☐ c. Анафілактичний шок
- ☐ d. Тромбоемболія гілок легеневої артерії
- ☐ e. Кропивниця

Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

Питання 8

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 64-х років тривалий час хворіє на ІХС, скаржиться на сильний за груди́нний біль, що не купується прийомом таблеток нітрогліцерину. Об'єктивно: свідомість сплутана, шкірні покриви бліді, акроціаноз, холодний липкий піт, дихання поверхнєве часте, Ps- 100/хв, ниткоподібний, АТ- 80/50 мм рт.ст. Як розцінити стан хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Напад пароксизмальної шлуночкової тахікардії
- ☐ b. Кардіогенний шок
- ☐ c. Порушення мозкового кровообігу
- ☐ d. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ e. Колапс


Коментар

Правильна відповідь: Кардіогенний шок

Питання 9

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Який об'єм хірургічної допомоги слід провести пораненому з крапковими сліпими і наскрізними проникаючими пораненнями легень на етапі кваліфікованої медичної допомоги, коли відсутні симптоми вираженої внутрішньої кровотечі та пневмотораксу, що наростає?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ці поранені хірургічного втручання не потребують
- ☐ b. Проводиться дренування плевральної порожнини
- ☐ c. Проводиться ушивання ранових отворів
- ☐ d. Виконують плевральні пункції з введенням антибіотиків широкого спектру дії
- ☐ e. Слід провести екстрену торакотомію з боку ушкодження


Коментар

Правильна відповідь: Ці поранені хірургічного втручання не потребують

Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 45-ти років з переломом стегна під час пункції підключичної вени з правого боку з'явився біль у правій половині грудної клітки, задуха, кашель. Об'єктивно: ціаноз обличчя та шиї, АТ-100/60 мм рт.ст., ЧСС-114/хв. Перкуторно - тупість на боці ураження. Аускультативно - відсутність дихання. Рентгенологічно - відсутність легеневого малюнка. Яке ускладнення при виконанні маніпуляції виникло у хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Правобічний піопневмоторакс
- ☐ b. Правобічний гемопневмоторакс
- ☐ c. Правобічна емпієма плеври
- ☐ d. Правобічний гемоторакс
- ☐ e. Правобічний пневмоторакс


Коментар

Правильна відповідь: Правобічний гемоторакс

Питання 11

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 48-ми років було виявлено родичами дома без свідомості. Об'єктивно: виражений ціаноз губ, акроціаноз. Подих гучний, із частотою 28/хв. З рота запах алкоголю. При аускультатії: подих ослаблено справа на всьому протязі, більше в нижніх відділах. По обидва боки вислухуються сухі й вологі бронхіальні хрипи. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Спонтанний пневмоторакс
- ☐ b. Аспірація шлункового вмісту
- ☐ c. Гемоторакс справа
- ☐ d. Негоспітальна пневмонія
- ☐ e. Тромбоемболія легеневої артерії


Коментар

Правильна відповідь: Аспірація шлункового вмісту

Питання 12

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 24-х років доставлений в лікарню з кровотечею з різаної рани, яка триває упродовж 4-х годин. Об'єктивно: шкіра бліда, пов'язка на лівій нозі просякла кров'ю. Правий колінний суглоб деформований, рухи в ньому обмежені. Рідний брат хворого страждає на гемофілію А. У крові: Нb- 42 г/л, час кровотечі за Дюком - 3 хв., час зсідання крові за Лі-Уайтом - 20 хв. Кров не згортається. Яка невідкладна допомога?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. В/в введення епсилон-амінокапронової кислоти
- ☐ b. Трансфузія тромбоконцентрату
- ☐ c. В/м введення кріопреципітату
- ☐ d. В/в струминне введення кріопреципітату
- ☐ e. В/в краплинне введення кріопреципітату

Коментар

Правильна відповідь: В/в струминне введення кріопреципітату

Питання 13

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 46-ти років діагностована гіпоглікемічна кома. Які лікарські засоби необхідно призначити хворому в першу чергу?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Кортикостероїди
- ☐ b. Ноотропи
- ☐ c. Глюкагон
- ☐ d. Глюкоза
- ☐ e. Адреналін

Коментар

Правильна відповідь: Глюкоза

Питання 14

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Грудна клітина потерпілої 38-ми років була притиснута бортом вантажівки до стіни. Скарги на загальну слабкість, задишку, біль і відчуття тяжкості в грудній клітці на стороні ураження. Об'єктивно: блідість шкіри, тахікардія, пульс слабого наповнення, артеріальний тиск знижений, симптоми недостатності дихання. Вкажіть обсяг первинної лікарської допомоги:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Катетеризація центральної вени, інфузійна терапія
- ☐ b. Плевральна пункція у VII міжребір'ї
- ☐ c. Серцеві глікозиди, дихальні аналептики
- ☐ d. Негайна госпіталізація до травматологічного відділення
- ☐ e. Напівсидяче положення, анальгетики, інгаляція кисню

Коментар

Правильна відповідь: Напівсидяче положення, анальгетики, інгаляція кисню

Питання 15

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До дитячого відділення був доставлений хлопчик 6-ти років з гострою гематурією. Тиждень тому переніс ГРВІ. На розгинальних поверхнях кінцівок - дрібнопапульозна геморагічна висипка. Помірно виражені болі в животі. Сеча темно-бурого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Запалення сечового міхура
- ☐ б. Гострий гломерулонефрит
- ☐ в. Дисметаболічна нефропатія
- ☐ г. Синдром Альпорта
- ☐ д. Геморагічний васкуліт

Коментар

Правильна відповідь: Геморагічний васкуліт

Питання 16

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 25-ти років з метою знеболення прийняла внутрішньом'язево 2 мл 50% розчину анальгіну. На лівій половині обличчя навколо рота, на губах, слизовій оболонці ротової порожнини з'явився набряк. Набряк твердий, без ямок при натисканні. Через декілька годин стан хворої погіршився: з'явилась осиплість голосу, "гавкаючий" кашель, утруднений вдих. Який попередній діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Кропивниця (алергічна форма)
- ☐ б. Анафілактичний шок
- ☐ в. Набряк Квінке
- ☐ г. Медикаментозна хвороба
- ☐ д. Токсикодермія

Коментар

Правильна відповідь: Набряк Квінке

Питання 17

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікаря звернулася дитина 13-ти років, у якій гостро з'явилися сухість у роті, порушення зору та виражена м'язова слабкість. При огляді звертав увагу симетричний птоз повік, мідріаз, млявість реакції зіниць, зниження ковтального рефлексу. З анамнезу відомо, що дитина їла овочеві консерви. Яке захворювання можна запідозрити у дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ботулізм
- ☐ б. Дифтерійна нейропатія
- ☐ в. Бульбарна форма поліомієліту
- ☐ г. Енцефаліт
- ☐ д. Пухлина мозку

Коментар

Правильна відповідь: Ботулізм

Питання 18

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 60-ти років перенесла холецистектомію з приводу деструктивного холециститу. Впродовж 15-ти днів у комплексному лікуванні отримувала гентаміцин по 400 мг 3 рази в день. В анамнезі - патології нирок немає, проте у пацієнтки наявні симптоми гострої ниркової недостатності. Добовий діурез 1,5 л, креатинін 0,63 ммоль/л, питома густина сечі 1004. Артеріальний тиск у межах норми. При ультрасонографії черевної порожнини - патологічних змін не виявлено. Яка причина ниркової недостатності?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Нефротоксичність гентаміцину
- ☐ б. Правобічний обструктивний уролітіаз
- ☐ в. Гострий гломерулонефрит
- ☐ г. Інтраопераційне пошкодження уретри
- ☐ д. Нефротичний синдром

Коментар

Правильна відповідь: Нефротоксичність гентаміцину

Питання 19

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В приймальний покій звернувся хворий із скаргами на носову кровотечу в помірній кількості. Із анамнезу виявлено, що кровотеча виникла раптово серед повного здоров'я. Яка тактика лікаря? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Медикаментозна зупинка кровотечі
- ☐ b. Задня і передня тампонада
- ☐ c. Передня тампонада
- ☐ d. Задня тампонада
- ☐ e. Перев'язка загальної сонної артерії

Коментар

Правильна відповідь: Передня тампонада

Питання 20

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Роділля 28-ми років у пологах раптово поскаржилась на локальну болючість в дні матки. З'явилися біль за грудниною, занепокоєння, ціаноз, різка гіпотонія. Пологи завершилися операцією кесарського розтину з приводу дистресу плода на фоні передчасного відшарування нормально розташованої плаценти. Є підозра на емболію навколоплідними водами. Об'єм операції розширено до гістеректомії з матковими трубами. Яке найбільш імовірне ускладнення слід очікувати у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Асфіксія
- ☐ b. Судоми
- ☐ c. Коагулопатія
- ☐ d. Аритмогенний шок
- ☐ e. Портальна гіпертензія


Коментар

Правильна відповідь: Коагулопатія

Питання 21

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Бригада швидкої медичної допомоги, що прибула на місце дорожньо-транспортної пригоди через 2 хвилини, констатувала у 5-річної дитини відсутність функції зовнішнього дихання та кровообігу, у зв'язку з чим було розпочато проведення первинних реанімаційних заходів відповідно з прийнятим в усьому світі "правилом ABC". У чому його сутність?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. У необхідності суворо дотримуватися певної послідовності реанімаційних заходів по аналогії з буквами алфавіту
- ☐ б. У комплексному застосуванні трьох прийомів, перші букви назв яких скорочено виглядають як "ABC"
- ☐ с. "Правило ABC" регламентує перелік медичної документації та порядок її заповнення
- ☐ д. У необхідності знання населенням, як алфавіту, правил первинної реанімації
- ☐ е. "Правило ABC" ніякого відношення до реанімації не має


Коментар

Правильна відповідь: У комплексному застосуванні трьох прийомів, перші букви назв яких скорочено виглядають як "ABC"

Питання 22

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія олігоанурії. У хворой відзначається м'язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ (розширення інтервалів PQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці Т). Які біохімічні зміни викликають ці порушення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гіпокаліємія
- ☐ б. Гіперкаліємія
- ☐ с. Гіперкальціємія
- ☐ д. Ацидоз
- ☐ е. Гіпокальціємія

Коментар

Правильна відповідь: Гіперкаліємія

Питання 23

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 29-ти років на 32-му тижні вагітності потрапила у ДТП. При огляді пошкоджень опорно-рухового апарату та внутрішніх органів не виявлено. В якому положенні слід транспортувати постраждалу до лікарні?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. В сидячому положенні
- ☐ b. В положенні Тренделенбурга
- ☐ c. В горизонтальному положенні на лівому боці
- ☐ d. В положенні на спині
- ☐ e. В положенні на правому боці

Коментар

Правильна відповідь: В горизонтальному положенні на лівому боці

Питання 24

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 27-ми років доставлено у від ділення реанімації в критичному стані. Констатовано геморагічний шок. Який захід найбільш ефективний для забезпечення адекватної інфузійної терапії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пункція кубітальної вени
- ☐ b. Венесекція
- ☐ c. Катетеризація двох кубітальних вен
- ☐ d. Катетеризація центральної вени
- ☐ e. Катетеризація кубітальної вени


Коментар

Правильна відповідь: Катетеризація центральної вени

Питання 25

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвору 24-х років турбують переймоподібні болі у нижніх відділах живота, які передують позивам до дефекації. Клінічно - випорожнення з домішками слизу, гною та крові. Хворіє 10 років, останнє загострення впродовж тижня. Випорожнення 8-10 раз на добу. Об'єктивно: температура тіла 37,7°C, живіт під час пальпації м'який, болючий у лівій клубовій ділянці. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Синдром подразненої кишки
- ☐ б. Пухлина товстої кишки
- ☐ в. Неспецифічний виразковий коліт
- ☐ г. Холера
- ☐ д. Хвороба Крона


Коментар

Правильна відповідь: Неспецифічний виразковий коліт

Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 37-ми років страждає на цукровий діабет, за добу вводять 64 ОД інсуліну. На ніч ввела 28 ОД інсуліну, з'явилися тремор, пітливість, потім розвинулося психомоторне збудження, агресивність, мова незв'язана. Об'єктивно: тремор, шкіра волога. Періостальні рефлексії підвищені. Позитивний симптом Бабинського. Тонічні та клонічні судоми. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Лактацидемічна кома
- ☐ б. Діабетична кома
- ☐ в. Гіперосмолярна кома
- ☐ г. Гіпоглікемічна кома
- ☐ д. Епілепсія


Коментар

Правильна відповідь: Гіпоглікемічна кома

Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 11-ти місяців спостерігається підвищення температури тіла до 38,5°C, багаторазове блювання, часті рідкі випорожнення до 10-15 разів за добу. На 3-й день захворювання - шкіра бліда з мармуровим малюнком, риси обличчя загострені. Велике тім'ячко запале. Адинамія. Діурез помірно знижений. Чим обумовлена тяжкість захворювання?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Токсико-ексикоз
- ☐ б. Гостра ниркова недостатність
- ☐ в. Парез кишечника
- ☐ г. ДВЗ-синдром
- ☐ д. Нейротоксикоз


Коментар

Правильна відповідь: Токсико-ексикоз

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 24-х років 4 години тому одержав травму правого плеча, упавши на лікоть. Стан середньої тяжкості, Рс-100/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Праве плече нижче плечового суглоба деформоване, рухи в ньому неможливі, виражена болісність. Яка іммобілізація кінцівки для транспортування хворого до травматологічного відділення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Позавогнищевий остеосинтез
- ☐ б. Кісткове витягіння
- ☐ в. Косиначна іммобілізація
- ☐ г. Використання шини Крамера
- ☐ д. Використання шини Дітерихса


Коментар

Правильна відповідь: Використання шини Крамера

Питання 29

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 44-х років впала на ліву витягнуту руку. При обстеженні виявлено набряк та болючість при пальпації в ділянці лівого променево-зап'ясного суглоба, крепітація. Лікар швидкої допомоги вирішив провести транспортну іммобілізацію шиною Крамера. Який вид пов'язки застосовується для фіксації шини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Вельпо
- ☐ b. Косинкова
- ☐ с. Дельбе
- ☐ d. Дезо
- ☐ е. Спіральна


Коментар

Правильна відповідь: Спіральна

Питання 30

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнту 66-ти років, який перебуває у відділенні інтенсивної терапії з приводу важкого абдомінального сепсису, для стимуляції імунних реакцій організму лікар прийняв рішення провести аутогемотрансфузію шляхом ін'єкції крові пацієнта внутрішньом'язово в обсязі 20 мл. Обсяг лабораторних досліджень перед даною маніпуляцією повинен включати:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Лапароцентез
- ☐ b. Електроліти плазми
- ☐ с. ЕКГ
- ☐ d. При сепсисі аутогемотрансфузія протипоказана
- ☐ е. Аналіз сечі на вільний гемоглобін


Коментар

Правильна відповідь: При сепсисі аутогемотрансфузія протипоказана

Питання 31

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина поступила до лікарні з гострим постгеморагічним синдромом (група крові A(II), Rh+). Проведена гемотрансфузія групою крові A(II), Rh?, але на 4-ту добу розвинулася олігоанурія, погіршився стан. Креатинін плазми 320 мкмоль/л, сечовина плазми 26 ммоль/л. Про який стан у дитини можна думати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Постгіпоксична гостра ниркова недостатність
- ☐ b. Постгіповолемічна гостра ниркова недостатність
- ☐ c. Постгеморагічна гостра ниркова недостатність
- ☐ d. Постгемотрансфузійна гостра ниркова недостатність
- ☐ e. Анафілактичний шок, гостра ниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Постгемотрансфузійна гостра ниркова недостатність

Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 46-ти років, що лікується з приводу гострого абсцесу середньої частки правої легені виник біль у правій половині грудної клітки, задишка, стан різко погіршився. Об'єктивно: ЧД- 28/хв., ціаноз, асиметрія грудної клітки. Над правою легенею визначається притуплення перкуторного звуку в нижніх відділах та тимпаніт у верхніх відділах. Аускультативно: різко ослаблене везикулярне дихання. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Правобічний тотальний піопневмоторакс
- ☐ b. Правобічна емпієма плеври
- ☐ c. Правобічний обмежений піопневмото ракс
- ☐ d. Правобічний гемопневмоторакс
- ☐ e. Правобічний ексудативний плеврит

Коментар

Правильна відповідь: Правобічний тотальний піопневмоторакс

Питання 33

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Триває значний викид радіонуклідів у атмосферу з пошкодженого ядерного реактора. Доза опромінення всього тіла за перші 10 діб у дорослих становить 500 мЗв. Які заходи захисту треба запровадити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. За таких умов потрібна евакуація населення із зон радіоактивного забруднення
- ☐ b. Ніякі, тому що дози опромінення не перевищують допустимі рівні
- ☐ c. Використовуються укриття та засоби захисту органів дихання та шкірного покриву
- ☐ d. Потрібно провести йодну профілактику
- ☐ e. Обмежити вживання забруднених радіонуклідами харчових продуктів та питної води

Коментар

Правильна відповідь: За таких умов потрібна евакуація населення із зон радіоактивного забруднення

Питання 34

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчини 15-ти років при тривалому перебуванні в задушливому приміщенні з'явилися скарги на запаморочення, слабкість. Різко зблідла, тіло вкрилося холодним потом, шкіра набула "мармурового" малюнку, з'явилися ціаноз губ, сопорозна свідомість, часте поверхнєве дихання, тахікардія. Тони серця послаблені, АТ- 50/10 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Мігрень
- ☐ b. Колапс
- ☐ c. Гостра серцева недостатність
- ☐ d. Задушно-ціанотичний напад

Коментар

Правильна відповідь: Колапс

Питання 35

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 26-ти років на фоні бронхопневмонії розвинулася кома. Об'єктивно: ЧСС- 122/хв, екстрасистолія. АТ- 80/45 мм рт.ст. Шкіра суха, тургор знижений. Дихання глибоке, шумне, рідке. Різкий запах ацетону. Печінка +5 см. Глікемія - 32 ммоль/л.; рН крові - 7,0. Який розчин буде найбільш ефективним для нормалізації дихання?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 4,2% розчин натрію бікарбонату
- ☐ b. Реополіглюкін
- ☐ с. 0,9% розчин натрію хлориду
- ☐ d. 1% розчин калію хлориду
- ☐ e. 5% розчин глюкози

Коментар

Правильна відповідь: 4,2% розчин натрію бікарбонату

Питання 36

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий був збитий автомашиною. У верхній третині лівого стегна рана 4х10 см, з якої виступає уламок кістки, значна варусна деформація стегна. Виберіть оптимальний метод іммобілізації:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Шина Томаса
- ☐ b. Шини Дітерікса та Крамера
- ☐ с. Три драбинчасті шини
- ☐ d. Шина Дітерікса
- ☐ e. Дві драбинчасті шини

Коментар

Правильна відповідь: Три драбинчасті шини

Питання 37

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий 46-ти років. Добу тому отримав травму верхньої третини стегна внаслідок падіння важкого предмету. Скарги на біль у ділянці травми. Об'єктивно: праве стегно в об'ємі +4 см у порівнянні з контрлатеральною кінцівкою. Передньо-медіальна поверхня правого стегна синюшна, шкірні покриви напружені, визначається флюктуація, під час пальпації помірна болісність. Який найбільш імовірний діагноз та тактика ведення хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Перелом стегнової кістки. Імобілізація кінцівки. Транспортування у травмпункт
- ☐ б. Ненапружена гематома стегна. Госпіталізація у хірургічний стаціонар для оперативного лікування
- ☐ в. Флегмона стегна. Госпіталізація у хірургічний стаціонар
- ☐ г. Гематома правого стегна. Місцева гіпотермія. Стискаюча пов'язка. Антибіотико-профілактика
- ☐ д. Тромбоз стегнової вени. Компрес з маззю Вишневського. Амбулаторне лікування у хірурга

Коментар

Правильна відповідь: Ненапружена гематома стегна. Госпіталізація у хірургічний стаціонар для оперативного лікування

Питання 38

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після проходження радіаційної хмари, у приймальне відділення був привезений хлопчик 10-ти років зі скаргами на нудоту, дворазове блювання, головний біль. При огляді: шкіра бліда, ЧСС- 105/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст., свідомість не втрачена. Показники первинної реакції при зовнішньому рівномірному опроміненні - 3 Гр. Визначте обсяг надання первинної допомоги:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення протиблювотних засобів та госпіталізація
- ☐ б. Ізоляція
- ☐ в. Госпіталізація до інфекційного відділення
- ☐ г. Введення протиблювотних засобів та аналгетиків
- ☐ д. Введення сорбентів і госпіталізація

Коментар

Правильна відповідь: Введення протиблювотних засобів та госпіталізація

Питання 39

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У постраждалого внаслідок дії іонізуючого випромінювання виникли симптоми первинної реакції гострої променевої хвороби. Госпіталізований до стаціонару через 2 доби. Які з показників периферичної крові мають найбільше діагностичне значення у цей період?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Нейтрофіли
- ☐ b. ШЗЕ
- ☐ c. Еритроцити
- ☐ d. Лімфоцити
- ☐ e. Тромбоцити

Коментар

Правильна відповідь: Лімфоцити

Питання 40

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В момент повітряного ядерного вибуху військовослужбовець отримав світлове опромінення. При цьому відчув короточасну втрату зору, набряклість повік, відчуття обпечення шкіри обличчя та обох кистей. Через дві години після вибуху відчув слабкість, запаморочення, з'явилась нудота, було одноразове блювання. Об'єктивно: шкіра обличчя, тилу кистей сильно гіперемовані, помірно набряклі. Зір збережений, повіки набряклі, очні щілини звужені, кон'юнктива гіперемована, відзначається слъозотеча. Показання індивідуального дозиметру - 2,5 Гр. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Комбіноване радіаційне ураження середньої тяжкості. Термічний опік світловим випроміненням обличчя, обох очей, обох кистей рук 7% I ступеня. Променева хвороба II ступеня, гострий період
- ☐ b. Комбіноване радіаційне ураження середньої тяжкості. Термічний опік світловим випроміненням обличчя, обох очей, обох кистей рук 7% I ступеня. Променева хвороба I ступеня, гострий період
- ☐ c. Комбіноване радіаційне ураження середньої тяжкості. Термічний опік обличчя, обох очей, обох кистей рук 7% I ступеня. Променева хвороба I ступеня, гострий період

- ☐ d. Комбіноване радіаційне ураження середньої тяжкості. Термічний опік світловим випроміненням обличчя, обох очей, обох кистей рук 7% III ступеня. Променева хвороба II ступеня, гострий період
- ☐ e. Радіаційне ураження середньої тяжкості. Термічний опік світловим випроміненням обличчя, обох очей, обох кистей рук 7% II ступеня. Променева хвороба I ступеня, гострий період
- Коментар

Правильна відповідь: Комбіноване радіаційне ураження середньої тяжкості. Термічний опік світловим випроміненням обличчя, обох очей, обох кистей рук 7% I ступеня. Променева хвороба II ступеня, гострий період

Питання 41

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До відділення реанімації поступила дитина 7-ми років зі скаргами на підвищення температури до 38,3°C, почервоніння шкіри, які виникли вранці після вживання їжі та вітамінів (зі слів матері). Об'єктивно: шкірні покриви вкриті поліморфною висипкою у вигляді папул, везикул, геморагій, іноді є місця ерозій; симптом Нікольського позитивний. Такі ж прояви на слизових оболонках. Аускультативно: дихання жорсткого характеру, симетричне, провідні хрипи. ЧСС- 144/хв., тони серця ритмічні, глухі, систолічний шум на верхівці. На ЕКГ: метаболічні порушення міокарда. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Краснуха
- ☐ b. Поліморфна еритема (синдром Лайєлла)
- ☐ c. Раптова екзантема (герпетична інфекція)
- ☐ d. Скарлатина
- ☐ e. Кір

Коментар

Правильна відповідь: Поліморфна еритема (синдром Лайєлла)

Питання 42

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 32-х років надійшла на пологи з доношеною вагітністю. Протягом останніх 2 діб не відчуває рухи плоду. Вагітність VI, пологів III та II штучних аборти без ускладнень. Об'єктивно: загальний стан задовільний, Рс- 94/хв., температура тіла - 36, 6оС, АТ- 110/70 мм рт.ст. Положення плоду поздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плоду не прослуховується. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вагітність 40 тижнів. Інтранатальна загибель плоду
- ☐ b. Вагітність 40 тижнів. Антенатальна загибель плоду
- ☐ c. Вагітність 40 тижнів. Постнатальна загибель плоду
- ☐ d. Вагітність 40 тижнів. Пізня неонатальна загибель плоду
- ☐ e. Вагітність 40 тижнів. Рання неонатальна загибель плоду


Коментар

Правильна відповідь: Вагітність 40 тижнів. Антенатальна загибель плоду

Питання 43

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 36-ти років раптово після велопробігу з'явився різкий біль у поперековій ділянці зліва, який іррадіює в ліву пахвинну ділянку, супроводжується нудотою, блюванням. Хворий не може вибрати положення, яке б зменшувало біль. Симптом Пастернацького позитивний зліва, сечі мало, гематурія. Рс- 86/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. Який невідкладний стан розвинувся у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Поперековий радикуліт
- ☐ b. Розрив селезінки
- ☐ c. Гострий гломерулонефрит
- ☐ d. Лівобічна ниркова колька
- ☐ e. Гострий пієлонефрит


Коментар

Правильна відповідь: Лівобічна ниркова колька

Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років доставлений в лікарню зі скаргами на багаторазове блювання з домішками жовчі, затримку випорожнень та газів. Три роки тому з приводу закритої травми живота виконана резекція тонкої кишки. Живіт здутий. Визначається шум плескоту та позитивний симптом Грекова. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пухлина товстої кишки
- ☐ b. Гострий апендицит
- ☐ c. Гостра спайкова тонкокишкова непрохідність
- ☐ d. Перфоративна виразка шлунку
- ☐ e. Гострий холецистит


Коментар

Правильна відповідь: Гостра спайкова тонкокишкова непрохідність

Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі з надмірною пологовою діяльністю раптом з'явилися кров'яністі виділення з піхви в об'ємі 500 мл., погіршилось серцебиття плоду. Роділля зблідла, Ps- 100/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Прееклампсія
- ☐ b. Передчасне відшарування плаценти
- ☐ c. Розрив шийки матки
- ☐ d. Клінічно вузький таз
- ☐ e. Розрив матки


Коментар

Правильна відповідь: Передчасне відшарування плаценти

Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Варітна 31-го року, 40 тижнів, з бурхливою пологовою діяльністю, клінічно вузьким тазом. Під час індукції наркозу виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів та ротової порожнини. В подальшому розвинувся ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, над легеньми різнокаліберні вологі хрипи, підвищення тиску на вдиху. При контролі газів крові - значна гіпоксемія. Яка причина цього стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Емболія навколоплідними водами
- ☐ b. набряк легенів
- ☐ c. Синдром Мендельсону
- ☐ d. Інфаркт міокарда
- ☐ e. Ендотоксичний шок


Коментар

Правильна відповідь: Синдром Мендельсону

Питання 47

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пішохід 26-ти років, збитий автомашиною, вдарився головою при падінні об бордюр тротуару. Стан середньої важкості. Є загальна загальмованість при збереженій свідомості та орієнтуванні, гіперемія обличчя, локалізований головний біль на боці удару. Хворий лежить на боці удару. Відмічаються брадикардія, підвищення артеріального тиску, зниження м'язової сили а також різниця в реакції зіниць на світло. Як транспортувати потерпілого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Голова на здоровому боці, фіксована до шини Єланського
- ☐ b. Голова на хворому боці, фіксована до шини Єланського з піднятим головним кінцем
- ☐ c. Імобілізація голови забезпечується за допомогою шини Крамера
- ☐ d. Голова на здоровому боці, фіксована до шини Єланського з піднятим головним кінцем
- ☐ e. Голова на хворому боці, фіксована до шини Єланського


Коментар

Правильна відповідь: Голова на здоровому боці, фіксована до шини Єланського

Питання 48

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 4-х місяців госпіталізована з приводу частого блювання, рідких випорожнень більше 10 разів за добу після введення прикорму. Шкіра та слизові оболонки сухі, велике тім'ячко запале, температура тіла 38, 4оС, ЧСС- 158/хв., тони серця глухі, живіт здутий, рідкі сечовиділення, дефіцит маси тіла від початкової - 9%. Ht- 50%. У крові: К+- 3,4 ммоль/л; Na+- 152 ммоль/л. Який першочерговий етап лікування?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Жарознижуюча терапія
- ☐ b. Регідратаційна терапія
- ☐ с. Антибактеріальна терапія
- ☐ d. Корекція харчування
- ☐ е. Призначення пробіотиків


Коментар

Правильна відповідь: Регідратаційна терапія

Питання 49

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 23-х років, житель Криму, захворів гостро: температура 40оС, болі в животі та попереку. Стан тяжкий, геморагічний висип на животі. Діурез знижений, макрогематурія. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гемоглобінурійна лихоманка
- ☐ b. Бубонна форма туляремії
- ☐ с. Висипний тиф
- ☐ d. Лептоспіроз
- ☐ е. Кримська геморагічна лихоманка


Коментар

Правильна відповідь: Кримська геморагічна лихоманка

Питання 50

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 49-ти років через 3 дні після оброблення туші корови вимушеного забою на правій кисті з'явилося свербляча пляма, потім міхурець, на місці якого утворився безболісний карбункул діаметром до 3 см та набряк, який сягає ліктя. Температура до 37,8оС. Який діагноз у хворого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Еризипелоїд
- ☐ б. Сибірка
- ☐ в. Бешиха
- ☐ г. Флегмона
- ☐ д. Карбункул

Коментар

Правильна відповідь: Сибірка

Питання 51

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженого хлопчика після проведення операції замінного переливання цитратної крові з'явилися неспокій, різкий крик, напади ціанозу, тоніко-клонічні судоми. Вміст натрію в сироватці крові 142 мекв/л, магнію 0,9 мекв/л, кальцію - 1,6 ммоль/л, калію - 4,8 мекв/л. Яке електролітне порушення виникло у дитини після трансфузії цитратної крові?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гіпокаліємія
- ☐ б. Гіперкальціємія
- ☐ в. Гіпокальціємія
- ☐ г. Гіпонатріємія
- ☐ д. Гіпермагніємія

Коментар

Правильна відповідь: Гіпокальціємія

Питання 52

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Захворювання розпочалося гостро. Наявна двохвильова гарячка, біль у крижах і куприку, продромальний висип (роси) у трикутнику Сімонса, етапність і мономорфність висипу з наступним нагноєнням. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вітряна віспа
- ☐ b. Натуральна віспа
- ☐ c. Мавпяча віспа
- ☐ d. Геморагічний діатез
- ☐ e. Синдром Стівенса-Джонсона


Коментар

Правильна відповідь: Натуральна віспа

Питання 53

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 30-ти років, різнороб, скаржиться на світлобоязнь, слъозотечу, зниження гостроти зору обох очей. Вчора допомагав у роботі під час електрозварювання, захисним щитком не користувався. Гострота зору обох очей 0,9. Об'єктивно: легка світлобоязнь. Рогівка фарбується флюоресцеїном у вигляді окремих крапок. Чутливість рогівки знижена. Інші відділи ока не змінені. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Електроофтальмія
- ☐ b. Інфекційний кератит
- ☐ c. Вікова катаракта
- ☐ d. Помутніння рогівки
- ☐ e. Помутніння склистого тіла


Коментар

Правильна відповідь: Електроофтальмія

Питання 54

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинку 13-ти років щойно знайшли у віддаленому куточку парку. Дитина збентежена, на запитання відповідати відмовляється. Одяг зіпсований. На обличчі та шиї подряпини. Свідки бачили чоловіка, що тікав з цієї частини парку. Лікар, який опинився на місці подій, має перш за все: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Спробувати знайти родичів дитини
- ☐ b. Виключити травми піхви та внутрішніх органів
- ☐ c. Обробити подряпини на лиці та шиї
- ☐ d. Опитати свідків
- ☐ e. Провести профілактику вагітності та венеричних хвороб


Коментар

Правильна відповідь: Виключити травми піхви та внутрішніх органів

Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворій 30-ти років проводиться непрямий масаж серця та ШВЛ у продовж 2-3 хвилин, але пульсація на а.сarotis не визначається. Який наступний крок треба зробити в умовах операційної? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Прямий масаж серця
- ☐ b. Продовжувати непрямий масаж серця
- ☐ c. Адреналін в/в
- ☐ d. Припинити серцево-легеневу реанімацію
- ☐ e. Адреналін внутрішньосерцево


Коментар

Правильна відповідь: Прямий масаж серця

Питання 56

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час забезпечення центрального венозного доступу при транспортуванні постраждалого з місця катастрофи відмічено розвиток підшкірної емфіземи ділянки шиї та грудної клітки. Який діагноз є найбільш імовірним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пневмофіброз легені
- ☐ b. Поранення легені з розвитком пневмотораксу
- ☐ c. Пункція трахеї
- ☐ d. Плевральна нориця
- ☐ e. Газова емболія легеневої артерії


Коментар

Правильна відповідь: Поранення легені з розвитком пневмотораксу

Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В результаті ДТП у 6-річного хлопчика має місце важкий стан (пошкодження грудей, живота та кінцівок), шкіра з "мармуровим" малюнком, акроціаноз, тахікардія, пульс слабкого наповнення і напруження, АТ низький. Здійснюються невідкладні заходи після відновлення ОЦК. Дитині показано введення:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Седативних препаратів
- ☐ b. Препаратів калію
- ☐ c. Дофаміну
- ☐ d. Гангліоблокаторів
- ☐ e. Серцевих глікозидів


Коментар

Правильна відповідь: Дофаміну

Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 7-ми років скаржиться на лихоманку, пронос, блювання та запаморочення. У крові: Ht- 0,55, Na⁺- 118 ммоль/л, K⁺- 5,9 ммоль/л. Які розлади водно-електролітного балансу спостерігаються? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіперкаліємія
- ☐ b. Розладів водно-електролітного балансу немає
- ☐ c. Ізотонічна дегідратація, гіперкаліємія
- ☐ d. Гіпотонічна дегідратація, гіпокаліємія
- ☐ e. Гіпотонічна дегідратація, гіперкаліємія


Коментар

Правильна відповідь: Гіпотонічна дегідратація, гіперкаліємія

Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 23-х років, яка знаходилась певний час у горизонтальному положенні на спині, знепритомніла. Діагностовано синдром нижньої порожнистої вени. Як у подальшому запобігти виникненню даного стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Призначити калорійне харчування
- ☐ b. Призначити лікувальну фізкультуру
- ☐ c. Здійснювати контроль артеріального тиску
- ☐ d. Виключити лежання вагітної на спині
- ☐ e. Призначити ліжковий режим


Коментар

Правильна відповідь: Виключити лежання вагітної на спині

Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При проведенні бойових навчань до ПМП був доставлений військовослужбовець 20-ти років. Відомо, що він був знайдений під уламками макету танка. Нижня кінцівка набрякла, шкірні покриви бліді, з великою кількістю подряпин та крововиливів. Підшкірно-жирова клітковина та м'язи ціанотичні, цілісність магістральних судин не порушена. В легенях застійні явища. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Синдром тривалого стиснення
- ☐ b. Гострий тромбофлебіт
- ☐ c. Політравма
- ☐ d. Тромбоз нижньої порожнистої вени


Коментар

Правильна відповідь: Синдром тривалого стиснення

Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У триденного хлопчика загальний стан тяжкий: наростають млявість, адинамія, м'язова гіпотонія, гіпорексія. У пологах тривалий безводний проміжок (14 годин). Шкіра - сіро-бліда, акроціаноз. Тахіпноє. Над легеньми вкорочення перкуторного звуку в нижніх відділах, вологі дрібно-міхурцеві крепитуючі хрипи. Тахікардія, тони серця ослаблені. Живіт здутий. Печінка +3,5 см. У крові: анемія, лейкоцитоз. З крові виділена культура золотавого стафілококу. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вроджений кардит
- ☐ b. Вроджена пневмонія
- ☐ c. Гнійний менінгіт
- ☐ d. Пізній неонатальний сепсис
- ☐ e. Ранній неонатальний сепсис


Коментар

Правильна відповідь: Ранній неонатальний сепсис

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 15-річного підлітка, хворого на артеріальну гіпертензію, раптово виникли біль голови, запаморочення, дзвін у вухах, нудота, блювання. АТ- 180/100 мм рт.ст. Діагностовано гіпертензивний криз. Який препарат слід призначити в першу чергу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Нормотенс

- ☐ b. Еналаприл
- ☐ c. Гіпотіазид
- ☐ d. Ніфедипін під язик
- ☐ e. Кордарон


Коментар

Правильна відповідь: Ніфедипін під язик

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворій 26-ти років з гострим лейкозом було перелито 200 мл іншогрупної еритроцитарної маси. У хворої з'явилися інтенсивні болі у попереку, катетером з сечового міхура виведено 100 мл сечі червоно-лакового кольору. Яке ускладнення розвивається у хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Радикуліт
- ☐ b. Інфаркт нирки
- ☐ c. Гострий гломерулонефрит
- ☐ d. Ниркова колька
- ☐ e. Гостра ниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гостра ниркова недостатність

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 29-ти років при вагітності 11-12 тижнів поступила в гінекологічне відділення для штучного аборту. Вагітність 8-а, із них 2 закінчились пологам, 5 - штучними абортами (останній аборт - 7 місяців тому). Під час операції діагностовано перфорацію матки. Подальша тактика ведення хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Припинити виконання аборт, спостерігати за станом жінки

- ☐ b. Припинити виконання аборт, термінова лапаротомія
- ☐ c. Закінчити штучний аборт, призначити антибактеріальні засоби
- ☐ d. Закінчити штучний аборт, призначити антигеморагічні засоби
- ☐ e. Припинити виконання аборт, виписати жінку під нагляд жіночої консультації


Коментар

Правильна відповідь: Припинити виконання аборт, термінова лапаротомія

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 28-ми років в ургентному порядку надійшла до гінекологічного стаціонару зі скаргами на сильні кров'яні виділення з піхви, біль внизу живота переймоподібного характеру. Пацієнтка перебувала на обліку в жіночій консультації з приводу вагітності строком 11 тижнів. Вищевказані симптоми виникли після психоемоціонального напруження вдома. Який діагноз можна встановити? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий цистит
- ☐ b. Позаматкова вагітність
- ☐ c. Викидень, що розпочався
- ☐ d. Апоплексія яєчника
- ☐ e. Перекрут кісти яєчника


Коментар

Правильна відповідь: Викидень, що розпочався

Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілого в ДТП запідозрили перелом тіла 12-го грудного хребця. Рухи в нижніх кінцівках різко обмежені, чутливість порушена. Як слід транспортувати хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Лежачи на животі, підклавши під груди і голову подушку або одяг
- ☐ b. Лежачи на лівому боку

- ☐ c. Лежачи на спині з іммобілізацією голови
- ☐ d. Лежачи на правому боку
- ☐ e. На щиті


Коментар

Правильна відповідь: Лежачи на животі, підклавши під груди і голову подушку або одяг

Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 80-ти років під час оперативного втручання з приводу защемленої кили наступила асистолія. Розпочато непрямий масаж серця, ШВЛ. Які ускладнення найчастіше трапляються під час проведення серцево-легеневої реанімації у таких хворих, що не є перепорою для відновлення життєвих функцій?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Розрив селезінки
- ☐ b. Перелом ребер чи відрив хрящів
- ☐ c. Розрив шлунково-кишкового тракту
- ☐ d. Розрив печінки
- ☐ e. Крововиливи та некроз міокарда


Коментар

Правильна відповідь: Перелом ребер чи відрив хрящів

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після падіння та забою голови потерпілий 24-х років на декілька хвилин знепритомнів. Після повернення свідомості відчувається досить добре, але скаржиться на помірний головний біль, є ретроградна амнезія, вогнищної неврологічної симптоматики нема. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Епілептичний напад
- ☐ b. Струс мозку

- ☐ c. Зомління
- ☐ d. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ e. Забій мозку


Коментар

Правильна відповідь: Струс мозку

Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 82-х років протягом останніх 15-ти років хворіє на гіпертонічну хворобу, 2 роки тому переніс інфаркт міокарда. Раптово під час фізичного навантаження виник ангінозний напад, який неодноразово повторюється в спокої тривалістю 15- 30 хвилин. АТ-160/100 мм рт.ст., ритм серця правильний, частота 82/хв. На ЕКГ: в III і AV F відведеннях глибокий зубець Q без зміщення сегменту ST, позитивний зубець T. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Повторний інфаркт міокарда
- ☐ b. Гостра розшаровуюча аневризма аорти
- ☐ c. Рання післяінфарктна стенокардія
- ☐ d. Варіантна стенокардія (Принцметала)
- ☐ e. Прогресуюча стенокардія напруження


Коментар

Правильна відповідь: Прогресуюча стенокардія напруження

Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 10-ти років захворіла гостро після повернення з місцевості, де є випадки кишкової інфекції. З'явилися рідкі випорожнення до 20 разів за добу без болю в животі та тенезмів, блювання. Випорожнення поступово втратили каловий характер, стали безбарвними, нагадують рисовий відвар. Температура тіла в межах 35,5-36,0°C. Яке захворювання слід запідозрити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Холера

- ☐ b. Ешерихіоз
- ☐ c. Ротавірусний гастроентерит
- ☐ d. Сальмонельоз
- ☐ e. Дизентерія


Коментар

Правильна відповідь: Холера

Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Літня жінка знепритомніла. Припускається, що в неї могла статися зупинка кровообігу. Час, необхідний для встановлення діагнозу клінічної смерті не повинен перевищувати:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 10-15 секунд
- ☐ b. 3-5 хвилин
- ☐ c. 1-2 хвилини
- ☐ d. 30 хвилин
- ☐ e. 10-15 хвилин


Коментар

Правильна відповідь: 10-15 секунд

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 30-ти років звільнений з ув'язнення. За день до звільнення був побитий чотирма співкамерниками та зґвалтований. Похмурий, тривожний, пригнічений. В сновидіннях і спогадах яскраво, до дрібниць відтворюються епізоди перенесеного насильства. Все, що нагадує про пережиту травму, викликає спогоди з вибухом дратівливості. Відчуття самотності. Розвиток якого психічного розладу слід очікувати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Посттравматичний стресовий розлад

- ☐ b. Невротичний розвиток особистості
- ☐ c. Рекурентний депресивний розлад
- ☐ d. Пролонгована депресивна реакція
- ☐ e. Генералізований тривожний розлад


Коментар

Правильна відповідь: Посттравматичний стресовий розлад

Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У породіллі 25-ти років, яка має 0(I) групу крові та Rh(-), існує загроза розвитку гемолітичної хвороби у новонародженого. При огляді дитини на що потрібно звернути увагу в першу чергу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Колір шкіри і слизових оболонок
- ☐ b. Наявність рефлексу смоктання
- ☐ c. Частоту серцевих скорочень
- ☐ d. Кількість дихань за хвилину
- ☐ e. Рівень артеріального тиску


Коментар

Правильна відповідь: Колір шкіри і слизових оболонок

Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 12-ти років скарги на частішання випорожнень до 2-3 разів на добу з домішками слизу та крові протягом 2-х місяців. Запідозрений неспецифічний виразковий коліт. Який метод має вирішальне значення в діагностиці цього захворювання?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Рентгеноскопія товстого кишечника
- ☐ b. Рентгенографія товстого кишечника
- ☐ c. Ехоскопія черевної порожнини

- ☐ d. Ендоскопія товстого кишечника
- ☐ e. Бактеріологічне дослідження калу
- Коментар

Правильна відповідь: Ендоскопія товстого кишечника

Питання 75

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 64-х років скаржиться на сильний біль у правій гомілці розпираючого характеру, підвищення температури тіла до 38оС. Об'єктивно: шкіра гомілки набрякла, гіперемована, під час пальпації різко болісна у ділянці гомілкових м'язів. Захворювання прогресує протягом 5 діб. Який найбільш вірогідний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий флеботромбоз глибоких вен правої гомілки
- ☐ b. Бешихове запалення правої гомілки
- ☐ c. Післятромбофлебітичний синдром
- ☐ d. Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки
- ☐ e. Тромбофлебіт підшкірних вен правої гомілки

Коментар

Правильна відповідь: Гострий флеботромбоз глибоких вен правої гомілки

Питання 76

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 39-ти років під час бійки отримав удар по шиї ребром долоні. Внаслідок травми знепритомнів, дихання різко утруднене, із утрудненим вдихом, шкіра обличчя та рук сіро-синього кольору. Що треба терміново зробити хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інтубація, трахеостомія
- ☐ b. Трахеостомія
- ☐ c. Конікотомія


- ☐ d. Інтубація трахеї
- ☐ e. Трахеотомія

Коментар

Правильна відповідь: Конікотомія

Питання 77

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 24-х років скаржиться на головний біль, нудоту, блювання, зниження гостроти зору. Скарги з'явилися після перенесеної рік тому черепно-мозкової травми. Об'єктивно: напівптоз, легка асиметрія вишкіру зубів зліва. Глибокі рефлекс симетрично підвищені з обох сторін. М'язовий тонус незначно підвищений за пластичним типом. Яке інструментальне обстеження необхідно провести з метою уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ехо-енцефалоскопія
- ☐ b. Магнітно-резонансна томографія
- ☐ c. Електроміографія
- ☐ d. Електроенцефалографія
- ☐ e. Викликані потенціали

Коментар

Правильна відповідь: Ехо-енцефалоскопія

Питання 78

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілого з отруєнням однією з сильних неорганічних кислот у місцях контакту кислоти зі слизовими оболонками виявлені шкурки жовтуватого кольору. Яка кислота найбільш імовірно стала причиною отруєння?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Фосфорна
- ☐ b. Хлоридна
- ☐ c. Сірчана


- ☐ d. Молочна
- ☐ e. Азотна

Коментар

Правильна відповідь: Азотна

Питання 79

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 7-ми років важкий напад бронхіальної астми триває 7 годин, ефекту від призначення інгаляційних β_2 -агоністів та дексазону в/м не відзначається. При обстеженні - ознаки "німих легень", пригнічення свідомості. Яке лікування треба призначити насамперед? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Призначити високі дози еуфіліну внутрішньовенно
- ☐ b. Призначити кортикостероїдні гормони внутрішньовенно
- ☐ c. Призначити інфузійну терапію
- ☐ d. Штучна вентиляція легень
- ☐ e. Підвищити дозу інгаляційних β_2 -агоністів

Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 80

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 67-ми років, яка 4 місяця тому назад перенесла інфаркт міокарда, поступила до приймального відділення. Об'єктивно: без свідомості, шкірні покриви та видимі слизові різко бліді, відсутність серцевої діяльності та дихання. На ЕКГ - фібриляція шлуночків. Як відновити ритм? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. ШВЛ через маску
- ☐ b. Відкритий масаж серця
- ☐ c. Ввести глюкокортикоїди
- ☐ d. Екстрена дефібриляція

☐ е. Ввести адреналін
Коментар

Правильна відповідь: Екстрена дефібриляція

Питання 81

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчина 14-ти років з незрозумілих для батьків причин намагалась покінчити з собою (подряпала собі ножом руку), після чого втекла з дому. На прийомі відмовляється пояснити свій стан, плаче, замикається в собі, закриває обличчя руками, не дає до себе доторкнутися, здригається при спробі наблизитись до неї. При наданні невідкладної допомоги виявлені фізичні пошкодження. Яка тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Провести психотерапевтичну бесіду
- ☐ б. Госпіталізувати для всебічного обстеження та лікування
- ☐ в. Призначити медикаментозне лікування
- ☐ г. Забезпечити захист від насильства в домашніх умовах
- ☐ е. Відпустити додому

Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізувати для всебічного обстеження та лікування

Питання 82

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 10-ти років на 5-й день лікування гепарином з приводу шкірно- суглобової форми хвороби Шенляйн- Геноха, посилилась геморагічна висипка, з'явилися м'язові гематоми, гемоптос, мелена. Активований парціальний тромбoplastиновий час - 4 хвилини. Який препарат доцільно призначити хлопчику?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Протаміну сульфат
- ☐ б. Глюконат кальцію
- ☐ в. Натрію гідрокарбонат

- ☐ d. Активоване вугілля
- ☐ e. Строфантин
- Коментар

Правильна відповідь: Протаміну сульфат

Питання 83

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Група постраждалих була евакуйована із зони застосування хімічної зброї. Відомо, що усі наділи протигази, але у двох з групи відмічались постійне моторне збудження, вони щось нерозбірливо бормочуть, зіниці звужені, фібриляція, посмикування м'язів обличчя, ЧД- 32/хв, видих утруднений. Який вид хімічної зброї був застосований?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Задушливої дії
- ☐ b. Загальної дії
- ☐ c. Шкірнонаривної дії
- ☐ d. Подразливої та сльозоточивої дії
- ☐ e. Нервово-паралітичної дії

Коментар

Правильна відповідь: Нервово-паралітичної дії

Питання 84

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В гематологічному відділенні лікарні знаходиться хворий 41-го року, який скаржиться на відчуття тривоги, страху, погане загальне самопочуття, біль у животі та грудній клітці, відчуття серцебиття, задишку. Об'єктивно: гіперемія шкіри, температура тіла 38, 4оС, АТ- 90/60 мм рт.ст, тахікардія, у легенях вологі хрипи, живіт під час пальпації чутливий, особливо в ділянці правого підребер'я.

Відомо, що 3 години тому, хворому було проведене переливання еритроцитарної маси. Введення яких препаратів є патогенетично обґрунтованим в даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Нестероїдні протизапальні препарати

- ☐ b. Інгібітори ЦОГ-2
- ☐ c. Глюокортикоїди
- ☐ d. Антигістамінні
- ☐ e. Антигіпертензивні препарати


Коментар

Правильна відповідь: Глюокортикоїди

Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 2-х років надійшла до інфекційного відділення зі скаргами на багаторазове невпинне блювання, профузні рідкі випорожнення. Об'єктивно: адинамічна, риси обличчя загострені, тургор тканин різко знижений, акроціаноз. Шкірні покриви бліді, холодні з "мармуровим" малюнком. Дихання поверхневе, тони серця глухі, почашені. АТ- 55/35 мм рт.ст. Анурія. Який невідкладний стан у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостра серцева недостатність
- ☐ b. Гостра надниркова недостатність
- ☐ c. Гостра судинна недостатність
- ☐ d. Гіповолемічний шок
- ☐ e. Гостра ниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гіповолемічний шок

Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У студента 20-ти років раптово з'явилась висока температура (39,5оС), біль голови, який іррадіює в шию та спину, блювання, загальна гіперестезія, світлобоязливість, менінгеальний симптомокомплекс, ураження окорухових нервів. Хворий швидко впав у коматозний стан. У крові: нейтрофільний лейкоцитоз, ШЗЕ- 28 мм/год. Лікворний тиск - 370 мм вод.ст., ліквор мутний, 800 нейтрофілів у 1 мм3, білок 12 г/л, цукор - 1,2 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Туберкульозний менінгіт
- ☐ b. Субдуральна гематома
- ☐ c. Субарахноїдальний крововилив
- ☐ d. Серозний менінгіт
- ☐ e. Гнійний менінгоенцефаліт


Коментар

Правильна відповідь: Гнійний менінгоенцефаліт

Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 67-ми років, в анамнезі 8 років ІХС, 4 роки тому Q-інфаркт міокарда. Раптово, після емоційного навантаження, виник напад серцебиття, знепритомнів. Об'єктивно: стан важкий, шкіра волога, бліда. Пульс та ЧСС не підраховуються. АТ-130/80 мм рт.ст. ЕКГ: ЧСС- 200/хв., QRS деформовані, розширені (0,14 с), дисоціація роботи передсердь та шлуночків. Який із засобів є препаратом першої черги у даного хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Лідокаїн
- ☐ b. Дигоксин
- ☐ c. Строфантин
- ☐ d. Натрію аденозинтрифосфат
- ☐ e. Верапаміл


Коментар

Правильна відповідь: Лідокаїн

Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 29-ти років після роботи в зоні витоку азотної кислоти розвинувся токсичний набряк легень. Яка першочергова допомога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. В/в 400 мл фізіологічного розчину
- ☐ b. Оксигенотерапія з інгаляцією етилового спирту
- ☐ c. В/в 400 мл реосорбілакту
- ☐ d. Штучна вентиляція легень
- ☐ e. В/в 400 мл 5% розчину глюкози


Коментар

Правильна відповідь: Оксигенотерапія з інгаляцією етилового спирту

Питання 89

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 21-го року в терміні 38-39 тижнів надійшла після серії судомних випадків. Рівень свідомості - кома. Відзначається виражений набряк нижніх кінцівок, одутлість обличчя. АТ- 170/120 мм рт.ст., ЧСС- 120/хв. Дихання часте, поверхневе. У сечі - протеїнурія. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Отруєння невідомою речовиною
- ☐ b. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ c. Прееклампсія
- ☐ d. Епілепсія
- ☐ e. Еклампсія


Коментар

Правильна відповідь: Еклампсія

Питання 90

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 33-х років надійшов до приймального відділення після суїцидальної спроби - отруєння вихлопними газами. Рівень свідомості - кома II. Шкірна покриви сухі, яскраво-рожевого кольору, тахіпное 36/хв., АТ- 120/80 мм рт.ст., ЧСС- 128/хв. Діурез знижений. Вогнищевої симптоматики немає. Даному хворому найбільш показане:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інфузія гіпертонічних розчинів
- ☐ b. Дезінтоксикаційна терапія
- ☐ c. Оксигенотерапія
- ☐ d. Введення великих доз глюкокортикоїдів
- ☐ e. Проведення гіпербаричної оксигенації


Коментар

Правильна відповідь: Проведення гіпербаричної оксигенації

Питання 91

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 6-ти років поступила в стаціонар зі скаргами на підвищення температури до 37,2оС, кровотечу з носа, подразливість, запаморочення. Об'єктивно: шкіра і слизові бліді з іктеричним відтінком, дрібноцяткові висипання на шкірі. На язиці згладженість та атрофія сосочків. Дихання везикулярне. Серцеві тони чисті, ритмічні. Живіт чутливий в епігастрії. Печінка +1 см, селезінка +0,5 см. У крові: Нb- 35 г/л, КП- 0,75, лейко- цити 3, 6 109/л, анізо- і поїкілоцитоз. Виберіть оптимальну тактику лікування:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тромбоцитарна маса
- ☐ b. Переливання еритроцитарної маси
- ☐ c. Глюкокортикоїди
- ☐ d. Переливання крові
- ☐ e. Препарати заліза


Коментар

Правильна відповідь: Переливання еритроцитарної маси

Питання 92

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Офіцер 23-х років отримав осколкове поранення правої верхньої кінцівки. Стан задовільний. Рs- 82/хв., АТ- 110/70 мм рт.ст. На передній поверхні правого плеча у середній третині визначається рана розмірами 1,0х0,5 см. Пульсація на променевій артерії збережена. Виявляється "звисаюча

кисть", відсутність активного розгинання кисті та основних фаланг пальців, супінації кисті. Неможливо відведення великого пальця. Відмічається також порушення чутливості на тильній поверхні передпліччя, променевій половині тилу кисті та у ділянці першого міжпальцевого проміжку. Який нерв пошкоджено?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Серединний нерв
- ☐ b. Ліктьовий та променевий нерви
- ☐ c. Ліктьовий нерв
- ☐ d. Променевий нерв
- ☐ e. Ліктьовий та серединний нерви


Коментар

Правильна відповідь: Променевий нерв

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після використання інсектициду у хворої 45-ти років з'явився головний біль, загальна слабкість, погіршення зору, напади задухи, болі в ділянці серця. Хвора у вимушеному положенні, плечовий пояс фіксований, шкіра та слизові ціанотичні, фібрилярні посмикування м'язів обличчя, міоз. В легенях жорстке дихання, множинні сухі свистячі хрипи, брадикардія, зниження АТ до 90/60 мм рт.ст. Яка початкова доза введення 0,1% р-ну атропіну?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 8-10 мл
- ☐ b. 6-8 мл
- ☐ c. 4-8 мл
- ☐ d. 2-4 мл
- ☐ e. 1-2 мл


Коментар

Правильна відповідь: 2-4 мл

Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженого хлопчика з вродженою вадою серця (тетрада Фалло) гостро розвинувся задушливо-ціанотичний напад. Який препарат слід ввести негайно разом з оксигенотерапією? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Сульфокамфокаїн
- ☐ b. Допамін
- ☐ c. Обзидан
- ☐ d. Строфантин
- ☐ e. Кордіамін


Коментар

Правильна відповідь: Обзидан

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На ядерному реакторі сталася позаштатна ситуація. До навколишнього середовища потрапила значна кількість радіоіотопів йоду. Яка тривалість прийому препаратів стабільного йоду для профілактики ураження щитоподібної залози?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. До зникнення загрози потрапляння в організм радіоактивних іотопів йоду
- ☐ b. 30 днів
- ☐ c. 7 днів
- ☐ d. 14 днів
- ☐ e. 10 днів


Коментар

Правильна відповідь: До зникнення загрози потрапляння в організм радіоактивних іотопів йоду

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 42-х років госпіталізований до лікарні в невідкладному порядку. Подає скарги на безсоння, нудоту, блювання, страх. Дезорієнтований в місці та часі. Неспокійний, зривається з місця,

ховається під ліжко, бачить навколо "чорних жуків", топче їх ногами. Яке лікування єнайбільш доцільне?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Седуксен + детоксикація
- ☐ b. Анксіолітики + психотерапія
- ☐ c. Електроконвульсивна терапія
- ☐ d. Галоперидол + коректори
- ☐ e. Антидепресанти + препарати літію


Коментар

Правильна відповідь: Седуксен + детоксикація

Питання 97

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Доярка 24-х років, що мала контакт з хворими тваринами, захворіла гостро з ознобу, гарячки, болю голови та в м'язах. На 2-й день приєдналися відчуття печіння в роті, слинотеча, кон'юнктивіт, печіння під час сечовиділення. На шкірі кистей, видимих слизових оболонках - дрібні міхурці, ерозії й виразки на тлі гіперемії та набряку. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Афтозний стоматит
- ☐ b. Ящур
- ☐ c. Хвороба Бехчета
- ☐ d. Вітряна віспа
- ☐ e. Герпетична ангіна


Коментар

Правильна відповідь: Ящур

Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час проведення регламентних робіт на АЕС трапилась аварія з викидом радіоактивних речовин. 32 працівника чергової зміни отримали різні дози зовнішнього опромінення. Яка доза опромінення зумовлює гостру променеву хворобу легкого ступеня?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 1-2 Гр
- ☐ b. 0,25-0,5 Гр
- ☐ c. 12-15 Гр
- ☐ d. 4-6 Гр
- ☐ e. 8-10 Гр


Коментар

Правильна відповідь: 1-2 Гр

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 29-ти років скаржиться на колючий біль у ділянці шиї справа, болючий акт ковтання, слинотечу. 2 години тому, під час їжі (їв рибу) відчув раптово болючість в правій половині горла. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий тонзиліт
- ☐ b. Заглотковий абсцес
- ☐ c. Стороннє тіло гортаноглотки
- ☐ d. Паратонзиллярний абсцес
- ☐ e. Бокова киста шиї


Коментар

Правильна відповідь: Стороннє тіло гортаноглотки

Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В одному з сільських господарств проводилося оброблення сільськогосподарських рослин фосфорорганічними речовинами (карбофос). У помічника тракториста, який був без респіратора,

через годину після роботи з'явилися головний біль, нудота, пітливість, слинотеча, порушення зору, відчуття страху. Яка антидотна терапія показана хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення розчину хромосмону - 50 мл в/в, 5% розчину унітіолу - 5 мл в/в
- ☐ b. Введення 5% розчину унітіолу - 5 мл в/в, 20% розчину антиціану - 1 мл в/м
- ☐ c. Введення 20% розчину антиціану - 1 мл в/м, вдихання амільнітриту через зволожену вату
- ☐ d. Введення 40% розчину глюкози з 5% розчином вітаміну С - 5 мл в/в, 10% розчину кофеїну бензоату - 1 мл п/ш
- ☐ e. Введення 0,1% розчину атропіну - 2 мл в/в, 15% розчину діпіроксиму - 1 мл в/м


Коментар

Правильна відповідь: Введення 0,1% розчину атропіну - 2 мл в/в, 15% розчину діпіроксиму - 1 мл в/м

Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час виконання будівельних робіт вдома чоловік 62-х років ненароком упав, зачепивши уламок бетонної плити, який травмував та перетиснув йому праву гомілку, під час чого хворий знепритомнів. Через деякий час сусіди викликали бригаду швидкої допомоги. Опритомнівши, вказати час, який був без свідомості, постраждалий не міг. Які заходи повинні бути здійснені медиками на місці події з метою профілактики токсемії та ниркової недостатності?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Профілактичні заходи можливі лише в стаціонарі
- ☐ b. Введення фуросеміду доведено
- ☐ c. Вагосимпатична блокада
- ☐ d. Введення аскорбінової кислоти з 5% глюкозою доведено
- ☐ e. Накладання джгута на стегно справа


Коментар

Правильна відповідь: Накладання джгута на стегно справа

Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Робітник АЕС змушений тимчасово залишатися на забрудненій радіоактивними речовинами місцевості. Які заходи необхідно йому вжити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Не виконувати жодних дій до проведення масової евакуації
- ☐ b. Самостійно виконати евакуацію
- ☐ c. Герметизація приміщення та дезактивація внутрішніх поверхонь
- ☐ d. негайно одягнути респіратор та провітрити приміщення
- ☐ e. Одягнути чоботи, рукавички та комбінезон


Коментар

Правильна відповідь: Герметизація приміщення та дезактивація внутрішніх поверхонь

Питання 103

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 36-ти років хворіє на цукровий діабет, 1 тип. Скаржиться на болі в правій ступні, наявність ранової поверхні з гнійними виділеннями із нориці. Пульсація на магістральних артеріях збережена. Яке ускладнення діабету виникло?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Трофобоз вен ступні
- ☐ b. Трофічна виразка
- ☐ c. Волога гангрена правої ступні
- ☐ d. Бешиха правої ступні
- ☐ e. Суха гангрена правої ступні


Коментар

Правильна відповідь: Трофічна виразка

Питання 104

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При променевому ураженні шкіри у хворого 33-х років спостерігається вологий дерматит, пухирі малі, ненапружені, займають менш ніж 50% поля. Така клінічна картина виникає при дозі опромінення:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 7-13 Гр
- ☐ b. 20-30 Гр
- ☐ c. 15-20 Гр
- ☐ d. 5-8 Гр
- ☐ e. 10-15 Гр


Коментар

Правильна відповідь: 15-20 Гр

Питання 105

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 51-го року доставлений у відділення кардіореанімації (інтенсивної терапії), скаржиться на тривалий пекучий за грудинний біль, який виник 40 хвилин тому, задишку. Об'єктивно: в легенях дихання з жорстким відтінком, тони серця різко ослаблені, АТ- 110/70 мм рт.ст. На ЕКГ виявлено підйом сегменту ST на 5 мм над ізолінією у відведеннях I, V 1?V 4 та депресію сегмента ST у відведеннях III і aV F. Який препарат потрібно застосувати у даній ситуації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Нітрогліцерин
- ☐ b. Метопролол
- ☐ c. Аміодарон
- ☐ d. Альтеплаза
- ☐ e. Добутамін


Коментар

Правильна відповідь: Альтеплаза

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Першовагітна у терміні 34 тижні госпіталізована зі скаргами на головний біль і погіршення зору. АТ- 170/120 мм рт.ст. Набряки кінцівок, передньої черевної стінки, обличчя. Протеїнурія, циліндри гіалінові та зернисті. Протягом тижня інтенсивного лікування стан вагітної погіршився. На фоні усіх

зазначених явищ хвора почала втрачати зір. Висновок окуліста - початкове відшарування сітківки. Пологової діяльності немає. Яка подальша тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вскрити плодовий міхур
- ☐ b. Екстирпація матки
- ☐ c. Пологозбудження
- ☐ d. Кесарський розтин
- ☐ e. Консервативна терапія


Коментар

Правильна відповідь: Кесарський розтин

Питання 107

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Солдат був в осередку ураження ОР. Евакуйований в МПБ, введено підшкірно 4 мл 0,1% розчину атропіну. Скарги на загальну слабкість, спрагу, сухість у горлі, охриплість голосу. Збуджений, поведінка агресивна. Шкіра обличчя гіперемована, зіниці розширені. В легенях жорстке дихання. Рs- 112/хв., АТ- 140/90 мм рт.ст. Що могло бути причиною описаної картини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ураження зарином
- ☐ b. Ураження дифосгеном
- ☐ c. Атропінізація організму
- ☐ d. Ураження зоманом
- ☐ e. Передозування реактиваторів холінестерази


Коментар

Правильна відповідь: Атропінізація організму

Питання 108

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 50-ти років, що знаходиться у інфарктному відділенні з трансмуральним інфарктом, раптово знепритомнів. Об'єктивно: зупинка серцевої діяльності та дихання, електромеханічна дисоціація. Розпочато серцево-легеневу реанімацію. Які наступні дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дефібриляція
- ☐ b. Внутрішньовенне введення новокаїнамідю
- ☐ c. Внутрішньосерцеве введення адреналіну
- ☐ d. Внутрішньовенне введення строфантину
- ☐ e. Внутрішньовенне введення лідокаїну


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньосерцеве введення адреналіну

Питання 109

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 18-ти років, в анамнезі черепно-мозкова травма, раптово впав, знепритомнів, тоніко-клонічні судоми, кровава піна з рота. Обличчя бліде з ціанотичним відтінком, зіниці на світло не реагують. Такий стан біля 3 хвилин. Яка необхідна невідкладна допомога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Одноразове введення седуксену
- ☐ b. Введення хлоралгідрату per rectum
- ☐ c. Введення 40% розчину глюкози
- ☐ d. Оксигенотерапія
- ☐ e. Введення тиопенталу натрію


Коментар

Правильна відповідь: Одноразове введення седуксену

Питання 110

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитячій дошкільній установі серед 120 дітей зареєстровано спалах дизентерії Зонне. На 2-3 добу із середнім ступенем важкості та важкими клінічними формами було госпіталізовано 35 дітей та 4 працівника дитячої установи із різних груп. Вкажіть найбільш імовірний тип спалаху:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Харчовий
- ☐ b. Контактно-побутовий
- ☐ c. Контактний
- ☐ d. Фекально-оральний
- ☐ e. Водний

Коментар

Правильна відповідь: Харчовий

Питання 111

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 25-ти років помітила виділення яскравої крові з прямої кишки в кінці дефекації. Найбільш імовірною причиною кро вотечі є:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Поліпоз товстої кишки
- ☐ b. Рак товстої кишки
- ☐ c. Дивертикульоз товстої кишки
- ☐ d. Дивертикул Меккеля
- ☐ e. Внутрішній геморой

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішній геморой

Питання 112

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 4-х років хворіє на менінгококцемію впродовж останніх 6 годин: температура тіла 40°C, геморагічний висип поширився з обличчя на усі ділянки шкіри. Різко загальмований, ціаноз шкіри.

Кінцівки холодні, дихання поверхневе, 20/хв. ЧСС- 58/хв., АТ- 65/35 мм рт.ст. У крові: лейкоцити - 6 Г/л, ШЗЕ- 5 мм/год. ВЕ = -12 мМ/л. Ліквор - норма. Знепритомнів. Прогноз для дитини:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Сприятливий стосовно життя
- ☐ б. Прогнозована летальність майже 100%
- ☐ с. Несприятливий стосовно одужання
- ☐ д. Прогнозована летальність менше 50%
- ☐ е. Неможливо оцінити за цими даними


Коментар

Правильна відповідь: Прогнозована летальність майже 100%

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 14-ти років внаслідок автомобільної аварії виник перелом кісток тазу. Які умови транспортування необхідно забезпечити даному пацієнту?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. У положенні на животі
- ☐ б. Умови транспортування не мають значення
- ☐ с. У підвищеному положенні верхньої частини тулуба під кутом 30о
- ☐ д. У сидячому положенні
- ☐ е. У положенні "жаби"на твердій поверхні


Коментар

Правильна відповідь: У положенні "жаби"на твердій поверхні

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчини 20-ти років запідозрена недостатність наднирників (хвороба Аддісона). Що з нижче перерахованого може допомогти при підтвердженні діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпонатріємія
- ☐ b. Гіпокаліємія
- ☐ c. Гіпотермія
- ☐ d. Гіперглікемія
- ☐ e. Артеріальна гіпертензія


Коментар

Правильна відповідь: Гіпонатріємія

Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 57-ми років 18 років страждає на варикозне розширення вен нижніх кінцівок, неодноразово хворіла на тромбофлебіт. Від оперативного лікування відмовляється. При огляді на обох стегнах звиті потовщені вени. По ходу однієї з них болісність та ущільнення із запаленням шкіри. Шкіра нижньої третина стегон темнокоричневого кольору, щільна, у складку не береться. Розвиток якого ускладнення загрожує хворій?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Утворення трофічних виразок
- ☐ b. Перехід запалення на глибокі вени
- ☐ c. Розвиток гангрени кінцівок
- ☐ d. Виникнення тромбозу глибоких вен
- ☐ e. Синя флегмазія


Коментар

Правильна відповідь: Утворення трофічних виразок

Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У матері та хлопчика 7-ми років гостро розвинулися часті водянисті випорожнення за типом "рисового відвару", біль у животі відсутній. Температура тіла дитини 35,5°C, виражені ознаки зневоднення. З метою профілактики захворювання в контактних членів сім'ї слід:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ізолювати їх та призначити антибіотики
- ☐ b. Провести опромінення приміщень бактерицидними лампами
- ☐ c. Запровадити вдома заходи по боротьбі із мухами
- ☐ d. Запровадити масковий режим
- ☐ e. Рекомендувати кип'ятіння питної води


Коментар

Правильна відповідь: Ізолювати їх та призначити антибіотики

Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина народилася в машині швидкої допомоги на шляху до пологового будинку. У новонародженого відсутнє спонтанне дихання після погладжування шкіри уздовж хребта. Які подальші дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Повторювати погладжування
- ☐ b. Дати кисень
- ☐ c. Почати штучну вентиляцію легень
- ☐ d. Поплескати по п'яті
- ☐ e. Поплескати по сідницях


Коментар

Правильна відповідь: Почати штучну вентиляцію легень

Питання 118

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 10-ти років доставлена в стаціонар через 1 годину після укусу змії (в ліву ногу) зі скаргами на пекучий біль у місці укусу, нудоту, блювання, задишку, серцебиття. Під час огляду: місце укусу набрякле, на шкірі геморагічний синдром. Який головний фактор невідкладної допомоги у даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Проведення інфузійної терапії з форсуванням діурезу
- ☐ b. Обколювання місця укусу розчином адреналіну 1:10000
- ☐ c. Накладення джгута вище місця укусу
- ☐ d. Дробне введення протизміїної сироватки
- ☐ e. Введення антикоагулянтів


Коментар

Правильна відповідь: Дробне введення протизміїної сироватки

Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Група військовослужбовців тривалий час знаходилась у кімнаті під впливом іонізуючого випромінювання після аварії на АЕС. Які першочергові заходи потрібно застосувати для зменшення впливу іонізуючого випромінювання?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Надіти протигаз
- ☐ b. Не вживати жодних дій
- ☐ c. Перевдягти верхній одяг
- ☐ d. Прийняти демиткарб
- ☐ e. Провітрити приміщення


Коментар

Правильна відповідь: Прийняти демиткарб

Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 37-ми років доставлена до приймального відділення після автокатастрофи. Виражена задишка, ЧД-60/хв., дихальні шуми значно послаблені справа. Першим кроком в лікуванні повинно бути:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інфузійна терапія

- ☐ b. Трахеостомія
- ☐ c. Пункція правої плевральної порожнини
- ☐ d. Виконання перикардіоцентезу
- ☐ e. Інтубація трахеї


Коментар

Правильна відповідь: Пункція правої плевральної порожнини

Питання 121

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 7-ми років скаржиться на сильний біль у правій руці. Відомо, що 10 днів тому він впав, під час чого забив праве плече. При огляді пасивні, активні рухи в правій руці обмежені, болючі, набряк, гіперемія, гаряча на дотик шкіра плеча, температура тіла 39, 2оС. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інфікована гематома плеча
- ☐ b. Остеомієліт плечової кістки
- ☐ c. Забій плеча
- ☐ d. Артрит плечового суглоба
- ☐ e. Флегмона плеча


Коментар

Правильна відповідь: Остеомієліт плечової кістки

Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До відділення реанімації поступила дівчинка 5-ти місяців зі скаргами на наявність судом. Об'єктивно: температура 36,6оС, шкірні покриви блідо-рожевого кольору, теплі на дотик, вологі. Голова деформована, потилиця плоска, без волосся, лобні горби. Аускультативно: дихання пуерильне, симетричне; ритм правильний, тони гучні, ЧСС- 134/хв. У крові: гіпохромна анемія І ступеню, анізоцитоз, пойкилоцитоз, гіпопротеїнемія, Na- 145, К- 4,2, Са- 1,1. У відділенні реанімації

судоми повторилися, з'явилися задишка інспіраторного характеру, сиплий голос, гавкаючий кашель, апное. Діагностовано рахіт, гіпокальціємія. Яка тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 10% кальцій хлорид
- ☐ b. Фенобарбітал
- ☐ c. Вітамін D
- ☐ d. ГОМК
- ☐ e. Сибазон


Коментар

Правильна відповідь: 10% кальцій хлорид

Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 49-ти років знайдений після автоаварії в тяжкому стані. При огляді міжреберні проміжки згладжені, ліва половина грудної клітки відстає при диханні. Над лівим легеневим полем тимпаніт, аускультативно - дихання зліва не проводиться, ЧД- 32/хв. Інші пошкодження відсутні. Як транспортувати потерпілого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. На правому боці лежачи
- ☐ b. На лівому боці лежачи
- ☐ c. В положенні Волковича на щиті
- ☐ d. В напівсидячому чи напівлежачому положенні
- ☐ e. Грудна клітка фіксується шинами Крамера до щита


Коментар

Правильна відповідь: В напівсидячому чи напівлежачому положенні

Питання 124

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 27-ми років після перелому стегна виникли задишка, легке запаморочення, серцебиття. Об'єктивно: ціаноз губ, тахіпное, тахікардія, акцент II тону над легеневою артерією. Лікар припустив наявність жирової емболії. ЕКГ у нормі. Якою має бути тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Лікувати амбулаторно, спостерігати за хворим сумісно із кардіологом
- ☐ b. Забезпечити консультацію кардіолога впродовж доби
- ☐ c. Лікувати амбулаторно, госпіталізувати при погіршенні ЕКГ-показників
- ☐ d. Лікувати амбулаторно
- ☐ e. Негайно госпіталізувати хворого


Коментар

Правильна відповідь: Негайно госпіталізувати хворого

Питання 125

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час ДТП збито пішохода. При попередньому огляді бригадою ШМД у нього діагностований перелом стегна. Який з перерахованих заходів слід провести у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Забезпечення венозного доступу
- ☐ b. Інфузійна терапія
- ☐ c. Знеболювання
- ☐ d. Транспортна іммобілізація
- ☐ e. Проведення допоміжної ШВЛ


Коментар

Правильна відповідь: Забезпечення венозного доступу

Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 32-х років після діагностики відкритого пневмотораксу з пакету перев'язочного індивідуального наклали оклюзійну пов'язку. При огляді лікарем через 40 хвилин: стан важкий, хворий покритий холодним потом, дихання поверхневе, часте, малий частий пульс, виражений

ціаноз шкіри і губ. Уражена частина грудної клітки розширена, при перкусії - тимпаніт. Яка первинна лікарська допомога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Заміна пов'язки, наркотичні анальгетики
- ☐ b. Оксигенотерапія в лежачому положенні хворого
- ☐ c. Плевральна пункція у II-III міжребір'ї
- ☐ d. Плевральна пункція в VII-VIII міжребір'ї
- ☐ e. Вагосимпатична блокада за Вишневським


Коментар

Правильна відповідь: Плевральна пункція у II-III міжребір'ї

Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При аварії на ядерному реакторі відбувся викид в навколишнє середовище значної кількості радіоізотопів йоду. Який препарат є препаратом вибору у профілактиці ураження щитоподібної залози?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 5% спиртовий розчин йоду
- ☐ b. Антиструмін
- ☐ c. Йодид калію
- ☐ d. Розчин Люголю
- ☐ e. Йодомарин


Коментар

Правильна відповідь: Йодид калію

Питання 128

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий з відкритим переломом стегнової кістки в середній третині поступив до приймального відділення. Об'єктивно: стан важкий, загострені риси обличчя, рясний піт, ціаноз, похолодання нижніх кінцівок, зниження температури тіла, байдужість, дезорієнтація, сонливість, розширення

зіниць, тахікардія 140/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст., шоківий індекс - 2.0, Нb- 50 г/л, анурія. Якій втраті ОЦК відповідає дана клінічна картина?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. >50%
- ☐ b. 35-40%
- ☐ c. 30-35%
- ☐ d. 20-25%
- ☐ e. 15%


Коментар

Правильна відповідь: 35-40%

Питання 129

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В якому положенні хворого доцільно проводити заходи серцево-легеневої реанімації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Положення хворого не має суттєвого значення
- ☐ b. На спині в горизонтальному положенні
- ☐ c. В положенні Тренделенбурга
- ☐ d. В положенні на боці
- ☐ e. На спині з піднесеним головним кінцем


Коментар

Правильна відповідь: На спині в горизонтальному положенні

Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 12-ти років після ДТП. Скарги на запаморочення. Об'єктивно: на промежині - гематома, з уретри виділяються краплі крові. Який метод діагностики перелому кісток тазу є першочерговим на фоні протишоківих заходів?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ректальне пальцеве обстеження
- ☐ b. Ультразвукове обстеження
- ☐ c. Цистоскопія
- ☐ d. Рентгенографія органів тазу
- ☐ e. Висхідна уретрографія


Коментар

Правильна відповідь: Рентгенографія органів тазу

Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення доставлений хлопчик 9-ти років з діагнозом: утоплення (неповне, "сухе"). Об'єктивно: дитина загальмована, бліда, ЧСС- 65/хв., АТ- 90/45 мм рт.ст. На місці пригоди надана перша допомога. Які наступні дії лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Проведення оксигенотерапії
- ☐ b. Введення анальгетиків
- ☐ c. Введення допаміну
- ☐ d. Введення серцевих глікозидів
- ☐ e. Введення седативних препаратів


Коментар

Правильна відповідь: Введення допаміну

Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 9-ти років, яка хворіє на цукровий діабет, на тлі кишкової інфекції виникли і наростають неврологічні симптоми: порушення орієнтації, галюцинації, фокальні судоми. Наявні ознаки дегідратації III ступеню, дихальних порушень немає, запах ацетону відсутній. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пухлина головного мозку
- ☐ b. Гіперосмолярна кома
- ☐ c. Енцефаліт
- ☐ d. Діабетична кетоацидотична кома
- ☐ e. Гіпоглікемічна кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

Питання 133

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 59-ти років у ступорозному стані. При об'єктивному обстеженні: температура тіла 38,3оС, шкірні покриви жовтяничні, наявні підшкірні крововиливи. ЧД- 27/хв., Рs- 116/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. Печінка виступає з-під краю правої реберної дуги на 4 см. Що з даних лабораторного дослідження буде свідчити про наростаючу гостру печінкову недостатність?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Зниження протромбінового індексу
- ☐ b. Гіперальбумінемія
- ☐ c. Підвищення протромбінового індексу
- ☐ d. Гіперхолестеринемія
- ☐ e. Підвищення рівня фібриногену


Коментар

Правильна відповідь: Зниження протромбінового індексу

Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 33-х років під час прийому їжі почався різкий переймоподібний кашель, посилилась задишка. Під час огляду шкіра бліда, акроціаноз, ЧД- 30/хв. При аускультатії вислуховується хлопок над дихальними шляхами, дихання стридорозне. Яке дослідження найбільш доцільне при диференційній діагностиці цього стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини
- ☐ b. Бронхографія
- ☐ c. Фібробронхоскопія
- ☐ d. Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини
- ☐ e. Спірографія


Коментар

Правильна відповідь: Фібробронхоскопія

Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 35-ти років на фоні лихоманки і болю в горлі під час огляду ротоглотки виявлені плівчасті сірі нашарування на мигдаликах, що розповсюджується на піднебінну дужку, набряк, гіперемія і кровоточивість слизової. Назвіть першочерговий препарат для лікування хворої:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Протидифтерійна сироватка
- ☐ b. Макропен
- ☐ c. Доксіциклін
- ☐ d. Пеніцилін
- ☐ e. Офлоксацин


Коментар

Правильна відповідь: Протидифтерійна сироватка

Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі звуження тазу I ступеня. Передбачувана вага плоду - 4100. Тривалість II періоду пологів - 40 хв. Перейми набувають судомний характер, болісні. Матка має форму пісочного годинника. Серцебиття плоду глухе, 110/хв. При вагінальному дослідженні відкриття маткового вічка повне. Голівка плоду рухома, над входом у малий таз. Плідного міхура немає. Яка тактика ведення пологів?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Поворот плоду на ніжку, витягнення плоду за ніжку
- ☐ b. Краніотомія
- ☐ c. Накладання акушерських щипців
- ☐ d. Родопосилення окситоцином
- ☐ e. Інгаляційний наркоз. Кесарів розтин


Коментар

Правильна відповідь: Інгаляційний наркоз. Кесарів розтин

Питання 137

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий 31-го року одержав однократну дозу зовнішнього опромінення в 3 Гр, доставлений на I етап медичної евакуації з вогнища радіаційного зараження зі скаргами на нудоту, блювання, постійний головний біль, слабкість, біль у кістках. Об'єктивно: свідомість ясна, збуджений. Температура тіла 37,8оС. Спостерігається ін'єкція склер, гіперемія шкірних покривів. АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧСС- 100/хв. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостра променева хвороба, судинно-токсемічна форма, латентний період
- ☐ b. Гостра променева хвороба, кістково-мозкова форма, період первинної реакції
- ☐ c. Гостра променева хвороба, кишкова форма, період відновлення
- ☐ d. Гостра променева хвороба, кишкова форма, період розпаду захворювання
- ☐ e. Гостра променева хвороба, церебральна форма, період відновлення


Коментар

Правильна відповідь: Гостра променева хвороба, кістково-мозкова форма, період первинної реакції

Питання 138

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 37-ми років прооперована з приводу фіброміоми матки. Виконана екстирпація матки. Через 3 доби після операції хвора скаржиться на біль у ділянці правого стегна, підвищення температури до 38,5оС, набряк нижньої кінцівки. Об'єктивно: права нижня кінцівка збільшена у діаметрі, шкірні

покрови теплі на дотик, синюшного кольору. Встановлено діагноз: ілеофоморальний тромбоз правої нижньої кінцівки. При ретроградній ілеокаваграфії виявлено флотуючий тромб. Яка лікувальна тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Лікування не потребує
- ☐ b. Оперативне лікування
- ☐ c. Еластична компресія
- ☐ d. Фізіотерапевтичне лікування
- ☐ e. Консервативне медикаментозне лікування


Коментар

Правильна відповідь: Оперативне лікування

Питання 139

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймально-діагностичного відділення доставлений хлопчик 8-ми років без свідомості. Зінці звужені, на світло не реагують. Об'єктивно: шкіра суха, бліда, холодна на дотик. Слизові яскраво-червоні. Дихання поверхневе, запах ацетону. Дитина хворіє на цукровий діабет 2 роки. З якого розчину слід розпочинати інфузійну терапію?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 4% Na_2CO_3
- ☐ b. 5% глюкоза
- ☐ c. 10% глюкоза
- ☐ d. 5% альбумін
- ☐ e. 0,9% NaCl


Коментар

Правильна відповідь: 0,9% NaCl

Питання 140

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 34-х років перенесла крупозну пневмонію. На даний час скаржиться на озноб, задишку в спокої, загальну слабкість, головний біль, підвищення $t_{\text{до}}$ до 39, 5 $^{\circ}\text{C}$, пітливість. Об'єктивно: зміщення назовні лівої межі серця, тони серця значно ослаблені, систолічний шум на верхівці, АТ-80/50 мм рт.ст. У крові: лейкоц.- 10,5 10⁹/л, е.- 8%, ШЗЕ- 45 мм/год. У сечі: білок - 0,066 г/л, ер.- 15-20 у п/з, гіалінові циліндри - 4-5 в п/з. Яке ускладнення виникло у хворого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Перикардит
- ☐ б. Кардіоміопатія
- ☐ в. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ г. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ д. Інфаркт міокарда

Коментар

Правильна відповідь: Інфекційно-токсичний шок

Питання 141

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 8-ми років був введений пеніцилін. Через декілька хвилин після ін'єкції у дитини з'явилися інспіраторна задишка, шумне дихання, набряклість кисті і обличчя, свербіж шкірних покривів. Який з перерахованих препаратів слід ввести у першу чергу? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Еуфілін
- ☐ б. Піпольфен
- ☐ в. Преднізолон
- ☐ г. Мезатон
- ☐ д. Глюконат кальцію

Коментар

Правильна відповідь: Преднізолон

Питання 142

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 26-ти років знаходиться у відділенні з приводу гострого вірусного гепатиту В, стан погіршився на 20-й день хвороби: з'явилися біль у животі, нудота, наросла жовтяниця. Вночі не спав, збуджений, нечітко орієнтується у часі. Печінка пальпується біля краю реберної дуги, м'якої консистенції. Що зумовлює стан хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Є характерним для перебігу гострого вірусного гепатиту В
- ☐ б. Прийом наркотичних речовин
- ☐ в. Розвиток печінкової енцефалопатії
- ☐ г. Розвиток гострого панкреатиту
- ☐ д. Розвиток інфекційно-токсичного шоку


Коментар

Правильна відповідь: Розвиток печінкової енцефалопатії

Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 11-ти років скаржиться на кровотечу з піхви, що виникла на 5-й день менструації, слабкість, запаморочення. Кровотеча посилюється. У крові: Нb- 64 г/л, ер.- $1,8 \cdot 10^9$ /л, тромб.- $280 \cdot 10^9$ /л. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоцитопенічна пурпура
- ☐ б. Ювенільна маткова кровотеча
- ☐ в. Геморагічний васкуліт
- ☐ г. Хвороба Віллібрандта
- ☐ д. Гіповітаміноз вітаміну К


Коментар

Правильна відповідь: Ювенільна маткова кровотеча

Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 29-ти років гіперстенічної конституції, під час виконання катетеризації підключичної вени лікар діагностував пункцію артерії. Яка подальша тактика анестезіолога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Обколоти місце пункції розчином адреналіну
- ☐ b. Катетеризувати артерію та проводити інфузію внутрішньоартеріально
- ☐ c. Контрастна артеріографія для діагностики кровотечі
- ☐ d. Видалити голку, стискаючи пов'язку та холод на місце пункції
- ☐ e. Хірургічне ушивання дефекту артерії


Коментар

Правильна відповідь: Видалити голку, стискаючи пов'язку та холод на місце пункції

Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждала 22-х років під час прогулянки в лісі була вжалена змією. Через 8 годин відмічається запаморочення, шкірні пориви бліді, холодні на дотик. Права рука набрякла та ціанотична від пальців до плеча. АТ- 70/40 мм рт.ст., Рс-122 /хв., ЧД- 22/хв. Яку невідкладну допомогу треба надати в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення антитоксичної сироватки
- ☐ b. Інфузійна терапія
- ☐ c. Гострий гемодіаліз
- ☐ d. Переривчастий плазмаферез
- ☐ e. Форсований діурез


Коментар

Правильна відповідь: Інфузійна терапія

Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 35-ти років протягом 10-ти років зловживає алкоголем. П'ять днів тому випив невідому спиртову речовину. Об'єктивно: дезорієнтований, рухи безладні, аморфні, хаотичні в межах ліжка.

Викрикує окремі слова, склади, звуки. Соматичний стан вкрай важкий. Язик сухий, температура тіла 40?41оС, на тілі петехії. Невідкладна допомога повинна надаватися в:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Наркологічній лікарні
- ☐ b. Реанімаційному відділенні
- ☐ c. Неврологічному стаціонарі
- ☐ d. Соматичному стаціонарі
- ☐ e. Психіатричному відділенні


Коментар

Правильна відповідь: Реанімаційному відділенні

Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта 14-ти років після контакту з несправним електроприладом відзначається загальмованість, наростає ціаноз, пульс на периферичних артеріях відсутній, при аускультатії серця - різке послаблення тонів, тахікардія. Які невідкладні заходи на місці пригоди:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Доставити у відділення інтенсивної терапії
- ☐ b. Доставити до соматичного відділення
- ☐ c. Проведення комплексу первинних реанімаційних заходів, за можливістю дефібриляція шлуночків
- ☐ d. Внутрішньом'язево сибазон та інгаляційно - зволожений кисень
- ☐ e. Штучне дихання рот до рота, непрямий масаж серця


Коментар

Правильна відповідь: Проведення комплексу первинних реанімаційних заходів, за можливістю дефібриляція шлуночків

Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 62-х років діагностовано ішемічний інсульт. Прийнято рішення про початок тромболітичної терапії. В які строки від початку захворювання терапія буде максимально ефективною?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. До 6-12 годин
- ☐ б. До 1 години
- ☐ в. До 1 доби
- ☐ г. До 3-х годин
- ☐ д. До 6-ти годин


Коментар

Правильна відповідь: До 3-х годин

Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення доставлено хворого 56-ти років, який упродовж 3-х років страждає на пахово-каліткову грижу. 10 годин тому грижа защемила. Стан погіршувався, хворий викликав бригаду швидкої допомоги. Під час гігієнічної ванни грижа вправилась. Хворий відчув себе здоровим і проситься додому. Яка тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Порекомендувати запобігати фізичному навантаженню і носити бандаж
- ☐ б. При покращенні відпустити хворого з рекомендацією прооперуватись у плановому порядку
- ☐ в. Госпіталізувати хворого до хірургічного відділення, провести операцію в плановому порядку
- ☐ г. Провести огляд та додаткові методи дослідження і відпустити хворого додому
- ☐ д. Терміново госпіталізувати хворого до хірургічного відділення та прооперувати


Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізувати хворого до хірургічного відділення, провести операцію в плановому порядку

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 24-х років захворювання почалося гостро з появи нудоти, багаторазового блювання, ознобу, болю у верхніх відділах живота. Практично одночасно з'явилися рідкі водянисті випорожнення без патологічних домішок 2 рази. Об'єктивно: стан середньої важкості, температура 37,6оС, Рs- 86/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст., шкіра бліда, тургор збережений, язик незначно обкладений білим нальотом, живіт м'який, чутливий в епігастрії. Яку терапію слід провести у першу чергу? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Промивання шлунку
- ☐ b. 5% розчин глюкози
- ☐ c. Призначення сольового послаблюючого
- ☐ d. Лоперамід
- ☐ e. Регідрон

Коментар

Правильна відповідь: Промивання шлунку

Питання 151

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловікові близько 65-ти років. Стрибав у воду з причалу. Стан після втоплення. На березі йому розпочинають серцево-легеневу реанімацію. Які особливості техніки реанімації у даному випадку? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Штучна вентиляція легень проводиться подвійним дихальним об'ємом
- ☐ b. Не виконують виведення нижньої щелепи
- ☐ c. Не виконують закидання голови
- ☐ d. Непрямий масаж серця розпочинають раніше, ніж штучну вентиляцію легень
- ☐ e. Завжди виконують прийом Геймліха

Коментар

Правильна відповідь: Не виконують закидання голови

Питання 152

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 49-ти років скаржиться на судоми м'язів рук, які виникли через 2 тижні після струмектомії. Об'єктивно: загальний стан задовільний, Рс- 78/хв, АТ- 125/70 мм рт.ст. Патологічних змін з боку внутрішніх органів немає. Позитивні симптоми Хвостека і Труссо. Який препарат потрібно ввести для купування судом?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Препарати калію
- ☐ b. Седативні
- ☐ c. Нейролептики
- ☐ d. Протисудомні препарати
- ☐ e. Препарати кальцію


Коментар

Правильна відповідь: Препарати кальцію

Питання 153

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 27-ми років на стегні виникло почервоніння і невелика болісність у пахвинній ділянці. Об'єктивно: округле вогнище гіперемії шкіри з просвітленням у центрі, помірно болісний регіонарний лімфовузол у паху. Температура нормальна. Близько тижня тому з шкіри ноги зняв кліща. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Бешиха
- ☐ b. Кліщовий системний бореліоз
- ☐ c. Епідемічний бореліоз
- ☐ d. Еризипелоїд
- ☐ e. Лімфаденіт


Коментар

Правильна відповідь: Кліщовий системний бореліоз

Питання 154

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець доставлений на МПП після хімічного ураження. Лікар встановив діагноз отруєння синильною кислотою. На попередніх етапах антидот не вводився. Яка перша лікарська допомога потрібна хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Будаксим внутрішньом'язово
- ☐ b. Атропін підшкірно
- ☐ c. Антиціан внутрішньовенно
- ☐ d. Амільнітрил інгаляційно
- ☐ e. Унітіол внутрішньовенно


Коментар

Правильна відповідь: Антиціан внутрішньовенно

Питання 155

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До реанімаційного відділення доставлена хвора 48-ми років без свідомості. Шкіра холодна, бліда, суха, акроціаноз. Щільний набряк обличчя, тіла, гомілок, температура тіла 33,0°C. Сухожильні рефлекси мляві. Ps- 50/хв., малий, ритмічний. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Дихання рідке, глибоке. У крові: гіпохромна анемія, гіперхолестеринемія, високий рівень ТТГ крові. Який препарат необхідно призначити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Глюкоза
- ☐ b. Преднізолон
- ☐ c. Мерказоліл
- ☐ d. Трийодтиронін
- ☐ e. Анаприлін


Коментар

Правильна відповідь: Трийодтиронін

Питання 156

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 53-х років скаржаться на біль у ділянці прямої кишки при дефекації, яскраво-червону кров на калових масах, яка з'являється на початку акту дефекації, закрепи. Загальний стан задовільний. Тони серця ритмічні, ЧСС- 74/хв. Живіт м'який, не болючий. Яке інструментальне дослідження найбільш інформативне для встановлення остаточного діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Копрограма
- ☐ b. Пальцеве дослідження прямої кишки
- ☐ c. Іригоскопія
- ☐ d. Фіброколоноскопія
- ☐ e. Ректоскопія


Коментар

Правильна відповідь: Ректоскопія

Питання 157

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 55-ти років раптово на вулиці знепритомнів. Пульс на сонних артеріях відсутній, дихання відсутнє, шкірні покриви ціанотичні, зіниці розширені. Бригада швидкої допомоги прибула на місце події через 2 хвилини та успішно провела реанімаційні заходи: відновилася серцева діяльність, але самостійне дихання відсутнє. Необхідно:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести строфантин
- ☐ b. Ввести цитітон
- ☐ c. Продовжувати ШВЛ
- ☐ d. Ввести бемеGRID
- ☐ e. Накласти трахеостому


Коментар

Правильна відповідь: Продовжувати ШВЛ

Питання 158

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після вживання м'яса свині, яка була зарізана у зв'язку з хворобою, яку лікували пеніциліном, у хворого на atopічну екзему розвинулись: сильний свербіж шкіри, набряк обличчя, уртикарні висипання по тулубу, верхнім кінцівкам. Який найбільш імовірний діагноз?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Атопічний дерматит
- ☐ b. Медикаментозна токсикодермія
- ☐ c. Гостра кропив'янка
- ☐ d. Харчова токсикодермія
- ☐ e. Гостра екзема

Коментар

Правильна відповідь: Медикаментозна токсикодермія

Питання 159

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 25-ти років у терміні 32 тижні страждає на міастенію. З'явилися розлади дихання, тахікардія, психомоторне збудження, яке змінюється в'ялістю, парезом кишечника та сфінктерів. Які першочергові засоби невідкладної допомоги?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Профілактика гіпоксії плоду
- ☐ b. Призначення прозерину
- ☐ c. Термінове розродження
- ☐ d. Застосування міорелаксантів
- ☐ e. Штучна вентиляція легень

Коментар

Правильна відповідь: Призначення прозерину

Питання 160

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 21-го року, вагітність 10 тижнів, надійшла до лікарні зі скаргами на блювання до 10 раз на добу. Відмічаються гіперсалівація, відсутність апетиту, розлади смаку та нюху, сухість шкіри та

язика. АТ- 100/60 мм рт.ст., ЧСС- 92/хв. Живіт м'який, безболісний. Діурез знижений. В сечі: питома вага - 1020, ацетон ++. Яка найбільш імовірна патологія обумовила таку картину?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий пієлонефрит
- ☐ b. Гострий гастрит
- ☐ c. Гострий апендицит
- ☐ d. Блювання вагітних
- ☐ e. Харчова токсикоінфекція


Коментар

Правильна відповідь: Блювання вагітних

Питання 161

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 33-х років захворіла гостро, коли з'явилися озноб, нудота, підвищилась температура тіла до 39, 3оС, наростала слабкість. На 2 день хвороби з'явився висип на шкірі. Об'єктивно: гіперемія обличчя, дрібнокрапчастий геморагічний висип в над-, підключичній та пахвовій ділянках, різко позитивний симптом Пастернацького з обох боків. В сечі: білок, циліндри, еритроцити. Яке захворювання є найбільш імовірним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вітряна віспа
- ☐ b. Висипний тиф
- ☐ c. Менінгококова інфекція
- ☐ d. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом
- ☐ e. Сепсис


Коментар

Правильна відповідь: Геморагічна гарячка з нирковим синдромом

Питання 162

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 44-х років 3 роки тому перенесла операцію - струмектомію, після якої була призначена замісна терапія. Останній час препарати приймала нерегулярно, в результаті чого стан різко погіршився. В коматозному стані доставлена до лікарні. Об'єктивно: ЧСС- 40/хв., АТ- 50/30 мм рт.ст., tо- 34, 2оС. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпотиреоїдна кома
- ☐ b. Гіпертиреоїдна кома
- ☐ c. Гіперглікемічна кома
- ☐ d. Гіпоглікемічна кома
- ☐ e. Надниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гіпотиреоїдна кома

Питання 163

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого на шостий день після отримання невеличкої рани правої кисті при роботі в полі підвищилась температура тіла до 39оС, з'явились ускладнене ковтання, утруднене відкриття рота, "сардонічна посмішка". Яке ускладнення виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Флегмона кисті
- ☐ b. Газова гангрена
- ☐ c. Флеботромбоз судин кисті
- ☐ d. Бешихове запалення кисті
- ☐ e. Правець


Коментар

Правильна відповідь: Правець

Питання 164

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 49-ти років з 30-ти років зловживає алкоголем. Толерантність, раніше висока, останнім часом впала, потяг до алкоголю компульсивний, запої по 14 днів, сформовано абстинентний синдром із блюванням, артеріальною гіпотензією. П'ять діб тому скінчився запій. На тлі безсоння, тремору кінцівок та гіпергідрозу три години тому став бачити "гадюк". Під час огляду лікарем швидкої допомоги дезорієнтований в часі, психомоторне збудження, "бачить зелену нитку" в порожній руці лікаря. Оберіть оптимальну схему медикаментозного лікування:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Внутрішньовенно ввести 25 мг тізерцину
- ☐ b. Дати всередину 10 мг рудотелю
- ☐ c. Дати всередину 300 мг фенобарбіталу
- ☐ d. Внутрішньовенно ввести 20 мг седуксену
- ☐ e. Внутрішньовенно крапельно ввести 25 мг аміназину


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенно ввести 20 мг седуксену

Питання 165

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лейтенант отримав ураження у вогнищі застосування супротивником хімічної зброї. Одночасно був поранений уламком міни в праве стегно. Через 2-3 години у потерпілого виник біль у рані, що наростав, свербіж та відчуття печіння. Пов'язка на рані видає інтенсивний часниковий запах. Шкіра навколо рани покрита краплями маслянистої рідини чорного кольору, набрякла, гіперемована, з множинними міхурами жовтого кольору. Яку хімічну речовину найімовірніше застосували на полі бою?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Зарін
- ☐ b. Іприт
- ☐ c. Люїзит
- ☐ d. Синильна кислота
- ☐ e. Зоман

Коментар

Правильна відповідь: Іприт

Питання 166

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 23-х років з центральним передлежанням плаценти розроджена в 37 тижнів гестації шляхом корпорального кесарева розтину. Операція була ускладнена гіпотонією матки, яка ліквідувалася після введення утеротоніків. Загальний об'єм крововтрати становив 900 мл. Через декілька хвилин, вже під час ушивання передньої черевної стінки, матка знову розслаблюється, тонус не відновлюється. Які подальші дії операційної бригади?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення препарату новоссеєвен
- ☐ b. Хірургічна зупинка кровотечі
- ☐ c. Посилення інфузійної терапії
- ☐ d. Масаж матки на кулаці
- ☐ e. Ретельний облік об'єму крововтрати


Коментар

Правильна відповідь: Хірургічна зупинка кровотечі

Питання 167

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Сімейний лікар оглянув хвору 39-ти років зі скаргами на напад гострого болю за грудниною, серцебиття, запаморочення, нудоту, слабкість. На ЕКГ: ЧСС- 230/хв., зубець Р відсутній, шлуночкові комплекси деформовані. Який препарат доцільно призначити у якості першочергового на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Строфантин
- ☐ b. Новокаїнамід
- ☐ c. Морфін
- ☐ d. Ізоптин
- ☐ e. Лідокаїн


Коментар

Правильна відповідь: Лідокаїн

Питання 168

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 56-ти років доставлений в тяжкому стані. Об'єктивно: свідомість сплутана. Іктеричність склер, "судинні зірочки" на шкірі кінцівок, гіперемія долоней. Із рота "печінковий" запах. АТ- 90/50 мм рт.ст. Рс- 100/хв. Живіт збільшений, помітні розширені вени, пупок видається. Перкуторно визначається асцит. Печінка збільшена на 6 см. Яка причина погіршення стану хворого? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Постгіпоксична енцефалопатія
- ☐ б. Гостра печінкова недостатність
- ☐ в. Гостра ниркова недостатність
- ☐ г. Метаболічний алкалоз
- ☐ д. Гіпоглікемічна кома


Коментар

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

Питання 169

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 36-ти років знаходиться на лікуванні у відділенні реанімації з діагнозом: отруєння невідомою отрутою важкого ступеня. Кома. З анамнезу: знайдений вдома у непритомному стані. На АКТ головного мозку - без патології. Дані біохімічних досліджень крові: білірубін загальний - 120 мкмоль/л, глюкоза - 5 ммоль/л, ПТІ - 36%, загальний білок - 40 г/л, альбумін - 30%. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Отруєння ФОІ
- ☐ б. Отруєння атропіном
- ☐ в. Отруєння дихлоретаном
- ☐ г. Отруєння серцевими глікозидами
- ☐ д. Отруєння протитуберкульозними препаратами

Коментар

Правильна відповідь: Отруєння дихлоретаном

Питання 170

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 40-ка років страждає на хворобу Іценко-Кушинга протягом 3-х років, останні 5 місяців не приймає медикаментозних засобів. Після переохолодження гостро з'явився біль у животі, блювання, знизився артеріальний тиск до 80/40 мм рт.ст., Рс- 94/хв. В яких умовах потрібно провести обстеження та лікування хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. В хірургічному відділенні
- ☐ б. В ендокринологічному відділенні
- ☐ в. Амбулаторне лікування
- ☐ г. В неврологічному відділенні
- ☐ д. В кардіологічному відділенні

Коментар

Правильна відповідь: В ендокринологічному відділенні

Питання 171

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 74-х років викликав швидку допомогу з приводу блювання, здуття живота, наявності болючого грижового випинання у паху, яке не вправляється у черевну порожнину зі вчорашнього дня. Під час огляду лікарем швидкої допомоги грижове випинання вправилося, біль пройшов. Які дії лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Доставити хворого до стаціонару
- ☐ б. Призначити дієту і холод на живіт
- ☐ в. Протягом години спостерігати за динамікою клінічної картини
- ☐ г. Призначити амбулаторне обстеження
- ☐ д. Рекомендувати хірургічне лікування у плановому порядку

Коментар

Правильна відповідь: Доставити хворого до стаціонару

Питання 172

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому 22-х років з політравмою в реанімаційній залі проводиться серцево- легенево-мозкова реанімація. Який критерій ефективності закритого масажу серця має найбільшу прогностичну цінність?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Відновлення самостійного дихання
- ☐ b. Звуження зіниць
- ☐ c. Аускультативно вислуховуються тони серця
- ☐ d. Наявність пульсу на променевої артерії
- ☐ e. Наявність пульсації на сонній артерії

Коментар

Правильна відповідь: Наявність пульсації на сонній артерії

Питання 173

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Бригадою швидкої допомоги до лікарні швидкої допомоги доставлений хворий 56-ти років, що лежав на снігу при температурі повітря $+20^{\circ}\text{C}$. Об'єктивно: свідомість сплутана, міміка відсутня, шкіра бліда, синюшна, холодна на дотик. Рс- 52/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст., ЧД- 9-10/хв., поверхневе; різкий запах алкоголю, температура тіла 29°C . Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Загальне переохолодження
- ☐ b. Закрита черепно-мозкова травма
- ☐ c. Тяжка ступінь алкогольного сп'яніння
- ☐ d. Отруєння сурогатами алкоголю
- ☐ e. Гостре порушення мозкового кровообігу


Коментар

Правильна відповідь: Загальне переохолодження

Питання 174

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

З вогнища хімічного ураження, утвореного зарином, до МПП доставлено ураженого. Відзначаються напади ядухи за типом бронхіальної астми, фібрилярні посмикування жувальних м'язів. Який антидот необхідно ввести ураженому разом з атропіном на даному етапі медичної евакуації? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Антиціан
- ☐ b. Амілнітрит
- ☐ c. Дипіроксим
- ☐ d. Унітіол
- ☐ e. Тіосульфат натрію


Коментар

Правильна відповідь: Дипіроксим

Питання 175

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вночі у хворого з'явилися задуха, кашель з рясним харкотинням рожевого кольору. З анамнезу: страждаєна гіпертонічну хворобу, варикозне розширення вен обох кінцівок, 2 роки тому переніс інфаркт міокарда. Об'єктивно: неспокійний, положення ортопное, акроціаноз, ЧДР- 40/хв. АТ- 220/110 мм рт.ст. У легенях - різнокаліберні середньо- і великопухирчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Легенева кровотеча
- ☐ b. Крупозна пневмонія
- ☐ c. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ d. Гостра лівошлуночкова недостатність
- ☐ e. Астматичний статус


Коментар

Правильна відповідь: Гостра лівошлуночкова недостатність

Питання 176

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 38-ми років через добу після вживання невідомої отрути з метою самогубства з'явилися скарги на виражену слабкість, головний біль, нудоту, появу сечі кольору "м'ясних помиїв", олігурія. Об'єктивно: АТ- 170/105 мм рт.ст., Рс- 84/хв., ритмічний. У сечі: білок - 0,99 г/л, еритроцити вкривають все поле зору, К+ крові - 6,9 ммоль/л, креатинін - 1,2 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Токсична енцефалопатія
- ☐ b. Токсичний гепатит
- ☐ c. Гостра ниркова недостатність
- ☐ d. Токсичний гастрит
- ☐ e. Гострий гломерулонефрит


Коментар

Правильна відповідь: Гостра ниркова недостатність

Питання 177

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 11-ти років слабкість, часті рідкі випорожнення, багаторазове блювання, які з'явилися після початку кишкових розладів. Температура 36,0С, шкіра землиста, суха, пульс прискорений, артеріальний тиск знижений. Живіт безболісний. Випорожнення у вигляді "рисового відвару". Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Сальмонельоз
- ☐ b. Холера
- ☐ c. Харчова токсикоінфекція
- ☐ d. Ротавірусний гастроентерит
- ☐ e. Неспецифічний виразковий коліт

Коментар

Правильна відповідь: Холера

Питання 178

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 52-х років зі слабкістю синусового вузла під час ходьби раптово впала. Черговим лікарем при огляді констатовано відсутність свідомості, пульсації на сонних артеріях та тонів серця. Зіниці вузькі, шкіра бліда з ціанотичним відтінком, рідке поверхнєве дихання. З чого в даному випадку необхідно розпочинати реанімаційні заходи?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньовенне введення ізоптину
- ☐ б. Імплантація штучного водія ритму
- ☐ в. Удар кулаком по груднині
- ☐ г. Внутрішньовенне введення лазиксу
- ☐ д. Інтубація та проведення штучної вентиляції легень

Коментар

Правильна відповідь: Удар кулаком по груднині

Питання 179

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий 46-ти років, виявлений на місці ДТП, скаржиться на біль у ділянці таза та правого стегна. Об'єктивно: загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. ЧДР- 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле, у верхній його третині патологічна рухливість, крепітація кісткових уламків. Великий крововилив, набряк та біль під час пальпації в правих пахвинній, здухвинній та сідничній ділянках. Рс- 112/хв, АТ- 80/45 мм рт.ст. Якому ступеню травматичного шоку відповідає стан потерпілого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. II
- ☐ б. IV
- ☐ в. III
- ☐ г. I

Коментар

Правильна відповідь: II

Питання 180

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 38-ми років з 14-ти років страждає на генералізовані судомні напади. Звернулася до дільничого терапевта з приводу підвищення температури, нежиті й кашлю. Під час огляду стає напруженою, перестає відповідати на запитання, з'являється вираз жаху на обличчі, раптово кидається бігти. Яка тактика організації надання допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Трансфузія реосорбілакту, госпіталізація в реанімаційне відділення
- ☐ b. Призначення антиконвульсантів, спостереження в динаміці
- ☐ c. Введення транквілізаторів, госпіталізація в психіатричну лікарню
- ☐ d. Введення нейролептиків, госпіталізація в неврологічне відділення
- ☐ e. Введення транквілізаторів, доставка до дільничого психіатра

Коментар

Правильна відповідь: Введення транквілізаторів, госпіталізація в психіатричну лікарню

Питання 181

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вперше народжуюча знаходиться у другому періоді пологів. Під час огляду виявлено брадикардію плоду до 90-100/хв., що не вирівнюється після потуги та заходів, направлених на лікування гіпоксії плоду. При піхвовому дослідженні: голівка плоду знаходиться у вузькій частині порожнини малого тазу. Яка тактика ведення пологів?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Накласти акушерські щипці
- ☐ b. Кесарів розтин
- ☐ c. Розпочати внутрішньовенне введення окситоцину з метою посилення пологової діяльності
- ☐ d. Виконати перінеотомію
- ☐ e. Продовжити лікування гіпоксії плоду

Коментар

Правильна відповідь: Накласти акушерські щипці

Питання 182

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На заводі розірвалась ємність з білим фосфором, в результаті чого 10 працівників одержали опіки. Яку допомогу необхідно надати постраждалим негайно? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Промивання опіків розчином мідного купоросу
- ☐ b. Промивання опіків фізрозчином
- ☐ c. Промивання опіків кислотою
- ☐ d. Промивання опіків водою
- ☐ e. Промивання опіків спиртом

Коментар

Правильна відповідь: Промивання опіків розчином мідного купоросу

Питання 183

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого після важкої скелетної травми на другу добу раптово виникло зниження артеріального тиску, порушення свідомості та самостійного дихання, дрібноточкові крововиливи на шкірі. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Жирова емболія
- ☐ b. Травматичний шок
- ☐ c. Анафілактичний шок
- ☐ d. Синдром тривалого стиснення
- ☐ e. Септичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Жирова емболія

Питання 184

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 37-ми років, що вживав на- передодні копченого ляща, поступово розвинулись м'язова слабкість, неможливість читати газетний текст, на другий день - порушення ковтання. Об'єктивно: стан тяжкий, ціаноз шкіри, страбізм, ЧД- 50/хв., Рс- 120/хв. Голос гугнявий, парез зіниць, метеоризм 2 ступеня. Випорожнення відсутні 2 доби. Який лікувальний захід показаний у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Штучна вентиляція легень
- ☐ б. Призначення прозерину
- ☐ в. Трахеостомія
- ☐ г. Введення діуретиків
- ☐ д. Штучне дихання "рот у рот"


Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 185

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 11-ти років збита автомобілем. Скарги на гострий біль у промежині та тазовій ділянці. Є підозра на перелом кісток тазу. Яка маніпуляція може зменшити біль при проведенні протишокового комплексу при переломах тазу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Лікувальний наркоз без імобілізації
- ☐ б. Фіксація на щиті з випрямленими ногами
- ☐ в. Внутрішньотазова блокада за Школьніковим-Селівановим
- ☐ г. Масивна трансфузійна терапія
- ☐ д. Внутрішньом'язове введення наркотиків

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньотазова блокада за Школьніковим-Селівановим

Питання 186

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 63-х років доставлена до кардіологічного відділення з приводу повної атріовентрикулярної блокади. Після призначеного лікування (нітрогліцерин, преднізолон, фуросемід, атропін, мілдронат) у неї виникла гостра затримка сечі. Який препарат привів до даного ускладнення? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Атропін
- ☐ b. Нітрогліцерин
- ☐ c. Фуросемід
- ☐ d. Мілдронат
- ☐ e. Преднізолон


Коментар

Правильна відповідь: Атропін

Питання 187

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Яка найбільш раціональна методика евакуації сечі з сечового міхура при гострій затримці сечовипускання внаслідок гострого паренхіматозного простатиту? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Катетеризація сечового міхура еластичним катетером
- ☐ b. Епіцистостомія
- ☐ c. Троакарна цистостомія
- ☐ d. Надлонна капілярна пункція сечового міхура
- ☐ e. Катетеризація сечового міхура металевим катетером


Коментар

Правильна відповідь: Надлонна капілярна пункція сечового міхура

Питання 188

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У стаціонар бригадою швидкої допомоги доставлений потерпілий 49-ти років із ознаками зупинки кровообігу і дихання внаслідок ураження електричним струмом. Після неуспішних реанімаційних заходів, у результаті огляду потерпілого, була ідентифікована локалізація відповідних меток току, викликаних вольтовою дугою, а також світлове ураження очей. На ЕКГ - ізолінія. Які з нижче перерахованих причин привели до розвитку термінального стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Асфіксія
- ☐ б. Фібриляція шлуночків серця
- ☐ в. Асистолія
- ☐ г. Тетанічний спазм дихальної мускулатури і голосових зв'язок
- ☐ д. набряк головного мозку


Коментар

Правильна відповідь: Асистолія

Питання 189

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 9-ти місяців виникла раптова зупинка дихання. Розпочато штучне дихання за методом "рот до рота". Що є показником правильності техніки проведення штучного дихання?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Екскурсії грудної клітки хворого
- ☐ б. Зміна забарвлення шкіри
- ☐ в. Зменшення проявів гіпоксії
- ☐ г. Відновлення самостійного дихання
- ☐ д. Дихальні шуми при аускультції легень

Коментар

Правильна відповідь: Екскурсії грудної клітки хворого

Питання 190

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 19-ти років скаржиться на слабкий біль у горлі впродовж трьох місяців. Лікувалась самостійно. Об'єктивно: загальний стан задовільний, температура 36,6°C. Під час фарингоскопії на правому піднебінному мигдалику виявлена виразка з підритими краями, сальним дном. В підщелепній ділянці знайдено збільшений рухомий лімфатичний вузол. Рентгенографія грудної клітки без патологічних змін. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дифтерія глотки
- ☐ b. Сифіліс глотки
- ☐ c. Рак мигдалика
- ☐ d. Туберкульоз глотки
- ☐ e. Виразково-плівчаста ангіна


Коментар

Правильна відповідь: Сифіліс глотки

Питання 191

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Студент 17-ти років скаржиться на сухий кашель, дряпання в горлі, підвищення температури тіла до 38,1°C. За порадою друга приймає ампіцилін. Через 2 дні після початку захворювання з'явилася висипка по всьому тілу, рожевого кольору, 1 см у діаметрі, дещо припіднята. Який НАЙМЕНШ вірогідний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Медикаментозний дерматит
- ☐ b. Менінгококцемія
- ☐ c. Мононуклеоз
- ☐ d. Кір


Коментар

Правильна відповідь: Менінгококцемія

Питання 192

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пологи у 42 тижня. Вагітність перебігала на тлі дифузного зобу II А стадії, обтяженого акушерського анамнезу, ускладнена дистресом плоду в пологах. Передні та задні навколоплідні води містять частки меконію. Новонароджений хлопчик з масою 4000 г, довжиною 56 см. При народженні відсутня функція зовнішнього дихання, значно знижений м'язовий тонус, ЧСС- 90/хв. Вкажіть першу дію у послідовності заходів первинної реанімації новонародженого у даному випадку:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тактильна стимуляція
- ☐ b. Корекція гіповолемії
- ☐ c. Киснева допомога
- ☐ d. Штучний масаж серця
- ☐ e. Санація верхніх дихальних шляхів


Коментар

Правильна відповідь: Санація верхніх дихальних шляхів

Питання 193

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 5-ти років доставлений до приймального відділення після вживання оцтової есенції в невідомій кількості. Об'єктивно: загальний стан середньої важкості, збуджений, АТ- 120/80 мм рт.ст., Рс- 97/хв. Після реанімаційних заходів дитині необхідно:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Нейтралізувати шлунковий вміст лугом
- ☐ b. Виконати ФЕГДС
- ☐ c. Виконати рентгенографію органів грудної клітки
- ☐ d. Призначити нагляд та ліжковий режим

Коментар

Правильна відповідь: Виконати ФЕГДС

Питання 194

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 39-ти років раптово з'явився біль у епігастральній ділянці 3 години тому. Рс- 60/хв. Живіт напружений, різко болючий у всіх відділах, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Перфоративна гастродуоденальна виразка
- ☐ б. Гострий холецистит
- ☐ в. Гострий апендицит
- ☐ г. Гостра кишкова непрохідність
- ☐ д. Гострий панкреатит


Коментар

Правильна відповідь: Перфоративна гастродуоденальна виразка

Питання 195

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвору 69-ти років доставлено до приймального відділення з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу в лівій гемисфері, правостороння геміплегія. Хвора контактна, але дезорієнтована, спонтанно розплющує очі, виконує інструкції. Який рівень свідомості за шкалою ком Глазго?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Сопор (9-12 балів)
- ☐ б. Оглушення (13-14 балів)
- ☐ в. Ясна свідомість (15 балів)
- ☐ г. Кома (4-8 балів)
- ☐ д. Смерть мозку (3 бали)

Коментар

Правильна відповідь: Оглушення (13-14 балів)

Питання 196

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 41-го року, який повернувся із Перу, протягом 3-х діб температура до 39°C, сильний головний біль, міальгії, нудота. Об'єктивно: шкіра обличчя та верхньої половини тулуба багряного кольору, "кролячі очі", одутлість язика, губ. Збільшення та болючість печінки, носова кровотеча. Запідозрена жовта лихоманка. Які протиепідемічні заходи необхідно провести у родині?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Екстрена хіміопротекція
- ☐ b. Нічого не проводити
- ☐ c. Екстрена вакцинація
- ☐ d. Екстрена госпіталізація
- ☐ e. Карантин на 10 днів


Коментар

Правильна відповідь: Нічого не проводити

Питання 197

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час огляду дівчинка 8-ми років раптово знепритомніла. Шкіра та слизові блідо-ціанотичні. Екскурсій грудної клітки немає. Пульс на магістральних артеріях не визначається. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Набряк легенів
- ☐ b. Зомління
- ☐ c. Колапс
- ☐ d. Кома
- ☐ e. Стан клінічної смерті


Коментар

Правильна відповідь: Стан клінічної смерті

Питання 198

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 29-ти років протягом останнього тижня скаржиться на періодичні озноби, підвищення температури до 39°C, рясну пітливість. При огляді: температура 36,2°C, блідий, склери жовтяничні, спленомегалія. Два тижні тому повернувся з Індії. Який попередній діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Лейшманіоз
- ☐ б. Жовта лихоманка
- ☐ в. Вірусний гепатит Е
- ☐ г. Малярія
- ☐ д. Лептоспіроз


Коментар

Правильна відповідь: Малярія

Питання 199

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В медичну роту механізованої бригади поступили з поля бою 10 легкопоранених, 15 поранених середньої важкості і 20 тяжкопоранених. Якими принципами та вимогами керується медичний персонал, який виконує сортування поранених в приймально-сортувальному відділенні медичної роти?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. За потребою якнайшвидшої евакуації поранених до наступного етапу медичної евакуації
- ☐ б. Сортування поранених за принципом "Пироговських рядів"
- ☐ в. За потребою місця надання медичної допомоги пораненим
- ☐ г. За потребою розподілу та по важкості стану поранених
- ☐ д. Єдиною класифікацією хвороб і травм та єдиними вимогами до методики сортування

Коментар

Правильна відповідь: Єдиною класифікацією хвороб і травм та єдиними вимогами до методики сортування

Питання 200

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пішохід 52-х років під час ожеледиці послизнувся та впав на бордюр тротуару грудною кліткою. Скаржиться на локалізований біль у ділянці грудної клітки справа по задній пахвовій лінії. Відмічаються тахікардія, підвищення артеріального тиску, припухлість, синець та крепітація в ділянці 9-10 ребра справа. При диханні та кашлі - різкий біль. Запідозрено перелом ребер. Як слід транспортувати хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. В напівсидячому положенні з палкою в ліктьових згинах
- ☐ b. Наклавши шину Крамера з фіксацією плечового, ліктьового, променево- зап'ясткового суглобів
- ☐ c. Прибинтувавши праву верхню кінцівку до грудної клітки
- ☐ d. Наклавши пов'язку Дезо з валиком в пахвовій ділянці
- ☐ e. В напівсидячому положенні, наклавши окклюзійну пов'язку

Коментар

Правильна відповідь: В напівсидячому положенні, наклавши окклюзійну пов'язку

[Завершити перегляд](#)

[Пропустити Перехід по тесту](#)

[Перехід по тесту](#)

[Питання 1 На цій сторінці](#) [Питання 2 На цій сторінці](#) [Питання 3 На цій сторінці](#) [Питання 4 На цій сторінці](#) [Питання 5 На цій сторінці](#) [Питання 6 На цій сторінці](#) [Питання 7 На цій сторінці](#) [Питання 8 На цій сторінці](#) [Питання 9 На цій сторінці](#) [Питання 10 На цій сторінці](#) [Питання 11 На цій сторінці](#) [Питання 12 На цій сторінці](#) [Питання 13 На цій сторінці](#) [Питання 14 На цій сторінці](#) [Питання 15 На цій сторінці](#) [Питання 16 На цій сторінці](#) [Питання 17 На цій сторінці](#) [Питання 18 На цій сторінці](#) [Питання 19 На цій сторінці](#) [Питання 20 На цій сторінці](#) [Питання 21 На цій сторінці](#) [Питання 22 На цій сторінці](#) [Питання 23 На цій сторінці](#) [Питання 24 На цій сторінці](#) [Питання 25 На цій сторінці](#) [Питання 26 На цій сторінці](#) [Питання 27 На цій сторінці](#) [Питання 28 На цій сторінці](#) [Питання 29 На цій сторінці](#) [Питання 30 На цій сторінці](#) [Питання 31 На цій сторінці](#) [Питання 32 На цій сторінці](#) [Питання 33 На цій сторінці](#) [Питання 34 На цій сторінці](#) [Питання 35 На цій сторінці](#) [Питання 36 На цій сторінці](#) [Питання 37 На цій сторінці](#) [Питання 38 На цій сторінці](#) [Питання 39 На цій сторінці](#) [Питання 40 На цій сторінці](#) [Питання 41 На цій сторінці](#) [Питання 42 На цій сторінці](#) [Питання 43 На цій сторінці](#) [Питання 44 На цій сторінці](#) [Питання 45 На цій сторінці](#) [Питання 46 На цій сторінці](#) [Питання 47 На цій сторінці](#) [Питання 48 На цій сторінці](#) [Питання 49 На цій сторінці](#) [Питання 50 На цій сторінці](#) [Питання 51 На цій сторінці](#) [Питання 52 На цій сторінці](#) [Питання 53 На цій сторінці](#) [Питання 54 На цій сторінці](#) [Питання 55 На цій сторінці](#) [Питання 56 На цій сторінці](#) [Питання 57 На цій сторінці](#) [Питання 58 На цій сторінці](#) [Питання 59 На цій сторінці](#) [Питання 60 На цій сторінці](#) [Питання 61 На цій сторінці](#) [Питання 62 На цій сторінці](#) [Питання 63 На цій сторінці](#) [Питання 64 На цій сторінці](#) [Питання 65 На цій сторінці](#) [Питання 66 На цій сторінці](#) [Питання 67 На цій сторінці](#) [Питання 68 На цій сторінці](#) [Питання 69 На цій сторінці](#) [Питання 70 На цій сторінці](#) [Питання 71 На цій сторінці](#) [Питання 72 На цій сторінці](#) [Питання 73 На цій сторінці](#) [Питання 74 На цій сторінці](#) [Питання 75 На цій сторінці](#) [Питання 76 На цій сторінці](#) [Питання 77 На цій сторінці](#) [Питання 78 На цій сторінці](#) [Питання 79 На цій сторінці](#) [Питання 80 На цій сторінці](#) [Питання 81 На цій сторінці](#) [Питання 82 На цій сторінці](#) [Питання 83 На цій сторінці](#) [Питання 84 На цій сторінці](#) [Питання 85 На цій сторінці](#) [Питання 86 На цій сторінці](#) [Питання 87 На цій сторінці](#) [Питання 88 На цій сторінці](#) [Питання 89 На цій сторінці](#) [Питання 90 На цій сторінці](#) [Питання 91 На цій сторінці](#) [Питання 92 На цій сторінці](#) [Питання 93 На цій сторінці](#) [Питання 94 На цій сторінці](#) [Питання 95 На цій сторінці](#) [Питання 96 На цій сторінці](#) [Питання 97 На цій сторінці](#) [Питання 98 На цій сторінці](#) [Питання 99 На цій сторінці](#) [Питання 100 На цій сторінці](#) [Питання 101 На цій сторінці](#) [Питання 102 На цій сторінці](#) [Питання 103](#)

[illegible]

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

Учасники

Відзнаки

Компетентності

Журнал оцінок

Загальне

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Контрольні тестування

Секція 6

Секція 7

[Секція 8](#)

[Секція 9](#)

[Секція 10](#)

[Секція 11](#)

[Секція 12](#)

[Секція 13](#)

[Секція 14](#)

[Секція 15](#)

[Особистий кабінет](#)

[Домашня сторінка](#)

[Календар](#)

[Особисті файли](#)

Мої курси

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручняк Оксана Богданівна \(Вийти\)](#)

[КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)

- [Українська \(uk\)](#)
 - - [English \(en\)](#)
 - [Русский \(ru\)](#)
 - [Українська \(uk\)](#)