

[Перейти до головного вмісту](#)
Бокова панель
КРОК-123

(Інтерн БДМУ) Підручняк Оксана Богданівна

П

Особистий кабінетПрофіль користувачаОцінкиПовідомленняУподобанняВийтиПовідомлення

[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане

Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане

Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)

[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Секція 3](#)
- [2020 весна](#)

Розпочато

Tuesday 14 February 2023 20:41 PM

Стан

Завершено

Завершено

Tuesday 14 February 2023 20:41 PM

Витрачено часу

13 сек

Балів

0,00/130,00


Оцінка

0,00 з 100,00 можливих

Питання 1

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини виник гострий респіраторний дистрес-синдром. Який лікарський препарат в першу чергу потрібно вводити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Теофілін
- ☐ б. Маніт
- ☐ в. Дофамін
- ☐ г. Сурфактант
- ☐ д. Строфантин


Коментар

Правильна відповідь: Сурфактант

Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 55-ти років отримав травму при ДТП. Стан потерпілого важкий. Ps- 114/хв, АТ- 90/50 мм рт.ст. В ділянці правого стегна деформація у верхній та середній третині з рваною раною, крізь яку виступають кісткові відламки та пульсує кров. Яка послідовність дій при наданні першої медичної допомоги в такому випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Зупинка кровотечі, знеболення, асептична пов'язка, іммобілізація
- ☐ б. Іммобілізація, негайне транспортування до стаціонару
- ☐ в. Анестезія місця перелому, зупинка кровотечі, накладання гіпсової пов'язки
- ☐ г. Первинна хірургічна обробка рани, іммобілізація, зупинка кровотечі
- ☐ д. Анестезія місця перелому, асептична пов'язка, зупинка кровотечі

Коментар

Правильна відповідь: Зупинка кровотечі, знеболення, асептична пов'язка, іммобілізація

Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Студент 15 хвилин тому в хімічній лабораторії випадково пролив собі на стегна розчин гідроксиду натрію. При огляді: на обох стегнах по передніх та бічних поверхнях плями неправильної форми, яскраво червоного кольору, вологі, з набряком навколишніх тканин, чутливість різко знижена. Яку невідкладну допомогу слід надати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Промивання водою протягом тривалого часу
- ☐ б. Введення наркотичних анальгетиків
- ☐ в. Обробка місця опіку розчинами антисептиків
- ☐ г. Промивання 2% розчином лимонної кислоти
- ☐ д. Накладання асептичної пов'язки


Коментар

Правильна відповідь: Промивання водою протягом тривалого часу

Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 6-ти місяців діагностований гострий стенозуючий ларинготрахеїт III ст. Наростає клініка гострої дихальної недостатності. Встановити інтубаційну трубку в трахею не вдалось. Яка маніпуляція дозволить відновити прохідність дихальних шляхів?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Встановлення ларингеальної маски
- ☐ б. Проведення конікотомії
- ☐ в. Розгинання голови в шийному відділі
- ☐ г. Виведення нижньої щелепи
- ☐ д. Встановлення повітроводу

Коментар

Правильна відповідь: Проведення конікотомії

Питання 5

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Через 10 хвилин після внутрішньом'язової ін'єкції цефтріаксона у хлопчика 9-ти років стан різко погіршився: виникли слабкість, млявість, блідість шкірних покривів, з наступною втратою свідомості. Діагностовано анафілактичний шок. Який препарат необхідно ввести першочергово? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Монтелукаст
- ☐ b. Адреналін
- ☐ c. Супрастин
- ☐ d. Гідрокортизон
- ☐ e. Будесанід


Коментар

Правильна відповідь: Адреналін

Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 16-ти років звернулась до лікаря зі скаргами на інтенсивний головний біль, підвищену температуру тіла, сонливість. На шиї слід від укусу кліща з зоною гіперемії. Запідозрений кліщовий енцефаліт. Якою має бути екстрена специфічна профілактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Профілактичний прийом антибіотиків
- ☐ b. Специфічна профілактика не проводиться
- ☐ c. Вакцинація
- ☐ d. Введення інтерферону
- ☐ e. Введення специфічного донорського імуноглобуліну

Коментар

Правильна відповідь: Введення специфічного донорського імуноглобуліну

Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 10-ти років впав з висоти 4 м. Скарги на інтенсивний біль в ділянці проксимального відділу лівого стегна, лівої сідниці, неможливість встати на ноги. Об'єктивно: шкірні покриви бліді, підшкірна гематома в ділянці лівої половини тазу та проксимального відділу стегна, ЧСС-120/хв., АТ- 90/55 мм рт.ст., при здавленні крил клубових кісток відзначається різкий біль зліва. Як необхідно транспортувати пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. У положенні стоячи
- ☐ b. У положенні сидячи
- ☐ c. У положенні на правому боці
- ☐ d. У положенні лежачи на спині
- ☐ e. За допомогою милиць


Коментар

Правильна відповідь: У положенні лежачи на спині

Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчина 14-ти років була свідком жорстокого ДТП з летальними наслідками. При огляді: сидить в незмінній позі, погляд застиглий, на питання не відповідає, інструкції не виконує. Досі росла і розвивалась нормально, психіатричний анамнез не обтяжений. Який психічний розлад спостерігається?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостра реакція на стрес
- ☐ b. Травматична деменція
- ☐ c. Дисоціативний розлад моторики
- ☐ d. Післятравматичний стресовий розлад
- ☐ e. Кататонічний ступор


Коментар

Правильна відповідь: Гостра реакція на стрес

Питання 9

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна у терміні 35 тижнів поскаржилась на головний біль, порушення зору, біль в епігастрії, посмикування м'язів обличчя. Загальний стан важкий. АТ- 180/120 мм рт.ст., набряки нижніх кінцівок та передньої черевної стінки. Серцебиття плода - 175/хв. Яке обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Цукор крові
- ☐ б. Білок сечі
- ☐ в. Загальний аналіз крові
- ☐ г. Рівень амілази крові
- ☐ д. Загальний білок крові


Коментар

Правильна відповідь: Білок сечі

Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 74-х років хворіє на цукровий діабет другого типу 12 років, приймає глібенкламід. Протягом двох тижнів щоденно без контролю лікаря приймає по 2 таблетки гіпотіазиду. П'ять днів назад, після переохолодження, підвищилась температура тіла до 38°C, з'явився біль у горлі, головний біль, нудота, трьохразове блювання. Об'єктивно: свідомість сплутана, шкірні покриви сухі, теплі, тургор м'язів знижений, температура тіла - 38°C, пульс - 120/хв, АТ- 60/40 мм рт.ст., дихання поверхневе, язик сухий, запах ацетону відсутній. Глюкоза крові - 25,4 ммоль/л, ацетон в сечі - слабопозитивний, N a+ сироватки - 162 ммоль/л, K+ - 3,0 ммоль/л. Який розчин показаний для введення в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Фізіологічний розчин N aCl
- ☐ б. Розчин Рінгера
- ☐ в. Гіпотонічний розчин N aCl
- ☐ г. Поляризуюча суміш
- ☐ д. 5% розчин глюкози

Коментар

Правильна відповідь: Гіпотонічний розчин N aCl

Питання 11

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У лісі знайдено молодого чоловіка в тяжкому стані. Об'єктивно: хворий перебуває в коматозному стані, дихання Чейн-Стокса, шкіра гаряча на дотик, волога, відзначаються судами тетанічного характеру. На лівій гомілці 4 точкові ранки, по краях яких геморагічний набряк. Що спричинило розвиток невідкладного стану?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Повець
- ☐ б. Укус бджоли
- ☐ в. Укус гадюки
- ☐ г. Епілептичний напад
- ☐ д. Діабетична кома

Коментар

Правильна відповідь: Укус гадюки

Питання 12

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пораненого в стегно на 4-й день перебування у лікарні з'явилися скарги на біль у грудях в ділянці грудини, що підсилюється при зміні положення тіла і глибокому диханні, задишку в горизонтальному положенні, серцебиття. При обстеженні: температура фебрильна, межі серця розширені, тони серця глухі, грубий шум тертя біля лівого краю грудини, що посилюється в горизонтальному положенні. Яке ускладнення поранення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий міокардит
- ☐ б. Гострий перикардит
- ☐ в. Інтоксикаційна міокардіопатія
- ☐ г. Гострий ендокардит
- ☐ д. Гострий плеврит

Коментар

Правильна відповідь: Гострий перикардит

Питання 13

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час бойових дій при наданні медичної допомоги для визначення черговості її надання виникає потреба в сортуванні потерпілих. Для проведення сортування поранених та хворих в медичній роті механізованої бригади розгортається:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Сортувальна площадка
- ☐ b. Госпітальне відділення
- ☐ c. Евакуаційне відділення
- ☐ d. Операційно-перев'язувальне відділення
- ☐ e. Аптека

Коментар

Правильна відповідь: Сортувальна площадка

Питання 14

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинку 3-х років доставлено до приймального відділення швидкою. При огляді стан дитини дуже важкий. В свідомості. Менінгеальних симптомів немає. Температура тіла - 40,0°C, кінцівки холодні. Виражені розлади мікроциркуляції. На шкірі нижніх кінцівок, сідниць, тулуба, обличчя - зливна "зірчаста" геморагічна висипка, що швидко розповсюджується. Невеличкі крововиливи на слизових оболонках. Висипка з'явилась декілька годин тому. ЧД- 48/хв., ЧСС- 160/хв. АТ- 55/30 мм рт.ст.

Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Аддісонічний криз
- ☐ b. Блискавична менінгококцемія
- ☐ c. Тромбоцитопенічна пурпура
- ☐ d. Геморагічний васкуліт
- ☐ e. Геморагічна лихоманка

Коментар

Правильна відповідь: Блискавична менінгококцемія

Питання 15

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 19-ти років у непритомному стані доставлено швидкою допомогою з місця автоаварії. Об'єктивно: свідомість відсутня, у відповідь на больові подразники мимовільно з'являється тонічне напруження м'язів з випростовуванням рук і ніг та закиданням голови назад, двосторонні стопні патологічні рефлекси. Дихання "машинне", пульс - 110/хв., артеріальний тиск - 160/100 мм рт.ст., температура тіла - 37,9°C. Який імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Забій головного мозку важкого ступеня
- ☐ б. Менінгіт
- ☐ в. Аневризма судин головного мозку
- ☐ г. Внутрішньочерепна гематома
- ☐ д. Гостре порушення мозкового кровообігу

Коментар

Правильна відповідь: Забій головного мозку важкого ступеня

Питання 16

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років страждає на хронічну надниркову недостатність внаслідок туберкульозу наднирників. Під час відпочинку після тривалого перебування на сонці у нього посилилася загальна слабкість, тахікардія досягла 150/хв., артеріальний тиск знизився до 70/20 мм рт.ст., з'явилися олігурія, адинамія, нудота, блювання, біль у животі, депресія. Який діагноз найбільш імовірний у даного хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра печінкова недостатність
- ☐ б. Гостра надниркова недостатність
- ☐ в. Гостра серцева недостатність
- ☐ г. Сонячний удар
- ☐ д. Гостра ниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гостра наднирникова недостатність

Питання 17

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 10-ти років надійшов у відділення інтенсивної терапії і реанімації з діагнозом: політравма, геморагічний шок 3-го ступеня. Який із судинних доступів є найбільш показаним для масивної інфузійної та гемотрансфузійної терапії; тривалого парентерального харчування; вимірювання центрального венозного тиску?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Венепункція периферичної вени
- ☐ b. Пункція променевої артерії
- ☐ c. Пункція стегнової артерії
- ☐ d. Черезшкірна катетеризація центральної вени
- ☐ e. Пункція і катетеризація периферичної вени


Коментар

Правильна відповідь: Черезшкірна катетеризація центральної вени

Питання 18

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 1,5 років з діагнозом сепсис спостерігаються: потьмарення свідомості, контактний сопор, фоторефлекси збережені, акроціаноз, пульс слабкого наповнення, артеріальний тиск - 60/15 мм рт.ст. Якій стадії термінального стану відповідає дана клінічна картина?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Передагонія
- ☐ b. Біологічна смерть
- ☐ c. Соціальна смерть
- ☐ d. Агонія
- ☐ e. Клінічна смерть

Коментар

Правильна відповідь: Передагонія

Питання 19

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 3 тижнів із гіпертрофованим клітором значно погіршився стан: постійне блювання, дефіцит ваги 15%, ЧСС- 178/хв, шкіра мармурова, м'язова гіпотонія, артеріальна гіпотензія. При додатковому обстеженні характерними для цієї патології є:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіпокаліємія, гіпернатріємія
- ☐ b. Гіпоглікемія, гіпокаліємія
- ☐ c. Гіпокаліємія, гіперглікемія
- ☐ d. Гіпонатріємія, гіперкаліємія
- ☐ e. Гіпоглікемія, гіпернатріємія

Коментар

Правильна відповідь: Гіпонатріємія, гіперкаліємія

Питання 20

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Через 10 хв. після аварії на атомній електростанції у оператора виникла виражена слабкість, з'явився сильний головний біль. Об'єктивно: гіпергідроз, блідість шкіри, лабільність пульсу, його частота 100/хв; АТ- 100/70 мм рт.ст. За даними дозиметрії отримав опромінення в дозі 2 Грей. Який з лікарських засобів є необхідним для надання першої долікарської допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Реосорбілакт
- ☐ b. Розчин Рінгера
- ☐ c. Хлорпромазин
- ☐ d. Метоклопрамід
- ☐ e. Цистамін

Коментар

Правильна відповідь: Цистамін

Питання 21

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В ході бойових дій боєць отримав вогнепальне поранення черевної стінки. При огляді на передній черевній стінці виявлено вхідний отвір рани до 4 см в діаметрі, з якого на поверхню виходить близько 10 см тонкої кишки. Які заходи домедичної допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Обробити кишку розчином антисептика та виконати ПХО рани
- ☐ b. Обробити кишку розчином антисептика та накласти пов'язку
- ☐ c. Виконати первинну хірургічну обробку рани
- ☐ d. Кишку не вправляти, накласти вологу пов'язку
- ☐ e. Кишку вправити та накласти пов'язку

Коментар

Правильна відповідь: Кишку не вправляти, накласти вологу пов'язку

Питання 22

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік захворів гостро після повернення з Південної Америки. Турбували головний біль, підвищення температури тіла до 40°C, біль у попереку, нудота. На 5-й день хвороби відзначалася короткочасна ремісія, після чого вищезазначені симптоми загострились, з'явилися інтенсивна жовтяниця, мелена, геморагічний висип на тулубі. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Чума
- ☐ b. Жовта гарячка
- ☐ c. Черевний тиф
- ☐ d. Менінгококцемія
- ☐ e. Висипний тиф

Коментар

Правильна відповідь: Жовта гарячка

Питання 23

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Солдат в результаті вибуху отримав поранення правої руки. При огляді були виявлені уламкові поранення правого передпліччя, відрив II та III пальців, зовнішня кровотеча. Евакуація і допомога надається:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. В лежачому положенні, в другу чергу
- ☐ b. В сидячому положенні, в другу чергу
- ☐ c. В лежачому положенні, в першу чергу
- ☐ d. В сидячому положенні, в першу чергу
- ☐ e. Стоячи, в першу чергу

Коментар

Правильна відповідь: В сидячому положенні, в другу чергу

Питання 24

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 32-х років скаржиться на сильний постійний біль в животі з іррадіацією в спину, багаторазове блювання, загальну слабкість. Захворів гостро 3 години тому, перед захворюванням вживав гостру жирну їжу. Стан хворого середньої важкості, шкіра синюшно-сіра. АТ- 90/60 мм рт.ст., температура тіла - 37,2оС. При пальпації: живіт здутий, вище пупка відзначається м'язовий дефанс, болючий інфільтрат, перистальтичні шуми значно послаблені. Які з лабораторних обстежень є найбільш інформативними для постановки діагнозу в даному випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Рівень креатиніну крові
- ☐ b. Кількість хлоридів сечі
- ☐ c. Загальний аналіз крові
- ☐ d. Визначення діастази сечі
- ☐ e. Електроліти крові

Коментар

Правильна відповідь: Визначення діастази сечі

Питання 25

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 29-ти років скаржиться на різкий біль в лівій половині грудної клітки, задишку. Відомо, що годину тому назад, підірвавшись на міні, отримав закриту травму грудної клітки. При аускультції зліва дихання різко ослаблене, вислуховуються перистальтичні шуми. При рентгенологічному дослідженні визначається наявність рівнів рідини та повітря у плевральній порожнині зліва. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Лівобічний гемоторакс. Розрив лівого купола діафрагми
- ☐ b. Лівобічний пневмоторакс. Розрив лівого купола діафрагми
- ☐ c. Розрив лівого купола діафрагми, зміщення кишечника у ліву плевральну порожнину
- ☐ d. Лівобічна емпієма плеври. Забій лівої легені
- ☐ e. Посттравматичний перикардит. Забій лівої легені. Гематома лівої легені

Коментар

Правильна відповідь: Розрив лівого купола діафрагми, зміщення кишечника у ліву плевральну порожнину

Питання 26

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 12-річної дівчинки після вживання двох таблеток аспірину температура тіла підвищилася до 39-40,0°C. Скаржиться на загальне нездужання, запаморочення, несподівану появу червоних плям на шкірі з утворенням пухирів та відшаровуванням епідермісу з ерозуванням поверхні. Ураження на шкірі нагадують опіки другого ступеню. Симптом Нікольського - позитивний. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Токсикодермія
- ☐ b. Гострий епідермальний некроліз
- ☐ c. Вульгарна пухирчатка
- ☐ d. Еритродермія
- ☐ e. Багатоформна ексудативна еритема


Коментар

Правильна відповідь: Гострий епідермальний некроліз

Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 7-ми років після хіміотерапії з'явилася петехіальна висипка на шкірі, а потім виникла важка кровотеча з носа. Які заходи слід провести в обласній лікарні для зупинки кровотечі? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гемотрансфузія, тампонада
- ☐ б. Тампонада, трансфузія плазми
- ☐ в. Тампонада, трансфузія тромбоконтрату
- ☐ г. Тампонада, введення преднізолону
- ☐ д. Тампонада, введення вікасолу


Коментар

Правильна відповідь: Тампонада, трансфузія тромбоконтрату

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого після проведеного оперативного втручання раптово розвинулися тетанічні судоми дистальних відділів кінцівок ("рука акушера"), спостерігаються явища бронхоспазму. Яка невідкладна терапія необхідна?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення розчину сульфату магнію
- ☐ б. Введення сибазону
- ☐ в. Введення розчину калію хлориду
- ☐ г. Введення розчину фуросеміду
- ☐ д. Введення розчину кальцію хлориду

Коментар

Правильна відповідь: Введення розчину кальцію хлориду

Питання 29

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини захворювання почалося з підвищення температури до 38,0оС та появи висипу. Спочатку висип мав вигляд плям, потім з'явилися пухирці. Під час огляду на шкірі обличчя, тулуба, кінцівок і на волосяній частині голови спостерігається рясний висип: папули, везикули, кірочки. Діагноз: вітряна віспа. Протягом якого періоду дитина має бути ізольована?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 14 днів
- ☐ b. 21 день
- ☐ c. До 5-го дня після появи останніх висипів
- ☐ d. До появи останніх висипів
- ☐ e. Ізоляції не потребує

Коментар

Правильна відповідь: До 5-го дня після появи останніх висипів

Питання 30

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

72-х річний чоловік був оглянутий лікарем у приймальному відділенні. Зі слів родичів він раптово втратив свідомість. З медичної документації, що була при пацієнті, стало відомо, що нещодавно він переніс операцію аорто-коронарного шунтування та у задовільному стані був виписаний додому. Після операції хворому була призначена подвійна антитромбоцитарна терапія, зі слів родичів всі ліки приймав вчасно. Об'єктивно: свідомість порушена, шкірні покриви бліді, дихання часте, глибоке. Аускультативно дихання везикулярне, проводиться в усі відділи легень, тони серця приглушені, аритмічні. На ЕКГ: широкі комплекси QRS (0,18 с), частота скорочень передсердь - 105/хв., частота скорочень шлуночків - 176/хв. Яка оптимальна тактика припинення даного стану? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. В/в введення верапамілу 0,25%
- ☐ b. Електроімпульсна терапія
- ☐ c. В/в введення атропіну 0,1%
- ☐ d. Непрямий масаж серця
- ☐ e. Масаж каротидних синусів


Коментар

Правильна відповідь: Електроімпульсна терапія

Питання 31

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 40-ка років доставлений до приймального відділення в алкогольній комі. Після проведення дезінтоксикації прийшов до тями, проте надалі стан почав погіршуватися, з'явилися задишка, психомоторне збудження, тахікардія, гіпертензія. В ЗАК: лейкоцитоз з паличкоядерним зсувом. Яке обстеження необхідно зробити в першу чергу для з'ясування причини погіршення стану? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Визначення вмісту глюкози в крові
- ☐ б. Рентгенографію кісток черепа
- ☐ с. Рентгенографію органів грудної клітки
- ☐ d. Загальний аналіз сечі
- ☐ е. Люмбальну пункцію


Коментар

Правильна відповідь: Рентгенографію органів грудної клітки

Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час бою солдата відкинуто вибухом на спину. Доставлений на МПБ через 2 години. Турбує задишка, біль у грудях. Пульс - 130/хв., АТ- 100/70 мм рт.ст., ЧД- 14/хв. При огляді по середньоключичній лінії справа, на рівні IV ребра - рвана рана 2х3 см, з якої виділяється цівкою ала кров. Яку першу лікарську допомогу слід надати пораненому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Проведення гемостатичної терапії
- ☐ б. Невідкладна торакотомія
- ☐ с. Пальцеве притискання рани
- ☐ d. Тампонада рани
- ☐ е. Проведення ПХО рани


Коментар

Правильна відповідь: Тампонада рани

Питання 33

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 17-ти років, житель села, через 2 тижні після ангіни помітив набряки повік і виділення сечі червоного кольору. При огляді терапевтом було виявлено АТ- 140/100 мм рт.ст. У ЗАС: білок - 2 г/л, змінені еритроцити у великій кількості, гіалінові та зернисті циліндри. В ЗАК: ШОЕ- 30 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Пухлина нирки
- ☐ b. Гострий пієлонефрит
- ☐ c. Гострий гломерулонефрит
- ☐ d. Сечокам'яна хвороба
- ☐ e. Загострення хронічного пієлонефриту


Коментар

Правильна відповідь: Гострий гломерулонефрит

Питання 34

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 80-ти років була збита машиною на пішохідному переході. Непритомна протягом 5 хвилин. Самостійного дихання немає. Який симптом є первинним для постановки діагнозу "зупинка кровообігу"?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Поява блідо-сірого кольору шкіри обличчя
- ☐ b. Розширення зіниць
- ☐ c. Відсутність дихання
- ☐ d. Відсутність свідомості
- ☐ e. Відсутність пульсу на сонних артеріях

Коментар

Правильна відповідь: Відсутність пульсу на сонних артеріях

Питання 35

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 23-х років, що страждає на цукровий діабет, доставлена в відділення інтенсивної терапії в непритомному стані. З рота різкий запах ацетону, дихання Куссмаля, шкіра суха, тонус очних яблук і м'язів знижений. Сухожильні рефлексі відсутні. Рс- 142/хв., АТ- 60/25 мм рт.ст., глюкоза крові - 20,6 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Кетоацидотична кома
- ☐ b. Печінкова кома
- ☐ с. Лактатцидемічна кома
- ☐ d. Гіпоглікемічна кома
- ☐ е. Гіперосмолярна кома

Коментар

Правильна відповідь: Кетоацидотична кома

Питання 36

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора доставлена із забрудненою колото-різаною раною правої ступні, в зв'язку з чим введена протиправцева сироватка. Раптово стан хворої різко погіршився: з'явилася різка слабкість, часте серцебиття. Об'єктивно: відзначається блідість шкіри, холодний піт, частий пульс слабкого наповнення до 100/хв., АТ- 90/40 мм рт.ст. Яка причина раптового погіршення стану хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Больовий шок
- ☐ b. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ с. Геморагічний шок
- ☐ d. Сироваткова хвороба
- ☐ е. Анафілактичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

Питання 37

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 43-х років скаржиться на рідкі випорожнення до 10 разів на добу з домішкою крові, різкі позиви до дефекації в нічний час, колькоподібний біль в нижніх і бічних відділах живота, який посилюється при рухах і дефекації, підвищення температури тіла до 38°C. Запідозрено хворобу Крона. Яке дослідження дозволить верифікувати діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини
- ☐ b. Аналіз калу на приховану кров
- ☐ c. Копроцитограма
- ☐ d. Ультразвукове дослідження ШКТ
- ☐ e. Колоноскопія з біопсією

Коментар

Правильна відповідь: Колоноскопія з біопсією

Питання 38

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної 23-х років, терміном гестації 22 тижні, яка хворіє на міастенію і приймає щоденно калімін, протягом останніх 2 днів з'явилися скарги на гіперсаливацію, порушення зору, діарею, брадикардію, порушення дихання. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Міастенічний криз
- ☐ b. Холінергічний криз
- ☐ c. Алергічна реакція
- ☐ d. Прееклампсія вагітних
- ☐ e. Ранній гестоз вагітних

Коментар

Правильна відповідь: Холінергічний криз

Питання 39

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 2-х років під час їжі раптово почався напад надсадного гавкаючого кашлю, інспіраторна задишка, періоральний ціаноз, різка слабкість, дитина неспокійна, периферичний пульс слабкий, ЧСС- 146/хв, ЧД- 40/хв., втягнення піддатливих місць грудної клітки. Який лікувально-діагностичний метод необхідно застосувати у дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Пульсоксиметрія
- ☐ b. Торакоцентез
- ☐ c. Гастродуоденоскопія
- ☐ d. Бронхографія
- ☐ e. Бронхоскопія

Коментар

Правильна відповідь: Бронхоскопія

Питання 40

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 34-х років спостерігається тремор, психомоторне збудження, страх, які наростають ввечері. Не спав 2 ночі, відзначаються ілюзії та парейдолії. Тони серця приглушені, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 170/90 мм рт.ст. Стверджує, що п'є з 20 років, але не пив останні 4 дні. З чого повинна початися фармакологічна терапія?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Діазепам
- ☐ b. Дифенгідрамін
- ☐ c. Карбамазепін
- ☐ d. Амітриптилін
- ☐ e. Галоперидол

Коментар

Правильна відповідь: Діазепам

Питання 41

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час святкування дня народження одному з гостей раптово стає погано: зблід, кашляє. Присутні підозрюють, що він вдихнув кістку з риби. Найбільш специфічним проявом наявності стороннього тіла гортані є:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Розвиток гіпотонії
- ☐ b. Почервоніння обличчя
- ☐ c. Напад експіраторної ядухи
- ☐ d. Напад інспіраторної ядухи
- ☐ e. Посиніння обличчя

Коментар

Правильна відповідь: Напад інспіраторної ядухи

Питання 42

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнтки 28-ми років під час вагітності (III триместр) та захворювання на гострий гепатит Е стався викидень, після чого різко погіршився стан: з'явилися психомоторне збудження, сплутаність свідомості, "хлопаючий" тремор, агресивність, дезорієнтованість у часі, тахікардія, блювання "кавовою гущею", значно зменшилися розміри печінки. Як оцінюється стан хворої лікарем?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий реактивний психоз
- ☐ b. Шлунково-кишкова кровотеча
- ☐ c. Септичний шок
- ☐ d. Геморагічний шок
- ☐ e. Гостра печінкова недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

Питання 43

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 57-ми років на тлі гострого порушення мозкового кровообігу розвинулася гостра затримка сечі. Назвіть першочерговий лікувальний захід:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Пункція сечового міхура
- ☐ b. Цистостомія
- ☐ c. Постійна катетеризація сечового міхура
- ☐ d. Призначення α -адреноблокаторів
- ☐ e. Антибактеріальна терапія

Коментар

Правильна відповідь: Постійна катетеризація сечового міхура

Питання 44

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної в 34 тижні під час доплерографічного ультразвукового обстеження виявили стійкий реверсивний діастолічний кровоплин у судинах плода й провели кесарів розтин. У новонародженого відсутні дихання і м'язовий тонус. Вентиляція мішком і маскою не забезпечує адекватні рухи грудної клітки, і після наступних 30 секунд вентиляції частота серцевих скорочень не збільшується. Який наступний етап реанімації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інтубація трахеї немовляти
- ☐ b. Введення адреналіну
- ☐ c. Введення натрію бікарбонату
- ☐ d. Припинити надавати допомогу
- ☐ e. Введення атропіну

Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї немовляти

Питання 45

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 46-ти років надійшов зі скаргами на сухий кашель, задишку, яка посилюється в положенні лежачи, вкритий холодним потом. Об'єктивно: частота дихання - 30/хв., артеріальний тиск - 180/100 мм рт.ст., С₀₂ - тони глухі, акцент II тону над легеневою артерією, ритм галопу, над легеньми - жорстке дихання, в н/відділах сухі та вологі дрібнопухирцеві хрипи. Який попередній діагноз більш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. набряк легень
- ☐ b. гіпертензивний криз
- ☐ c. астматичний статус
- ☐ d. тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ e. ішемічна кардіоміопатія

Коментар

Правильна відповідь: набряк легень

Питання 46

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 52-х років з декомпенсованим стенозом ворота в анамнезі: багаторазове блювання протягом декількох днів, виник напад судом. Найбільш імовірною причиною їх є:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. гіпохлоремія
- ☐ b. гіпонатріємія
- ☐ c. гіпоглікемія
- ☐ d. гіпоальбумінемія
- ☐ e. гіпомагніємія

Коментар

Правильна відповідь: гіпохлоремія

Питання 47

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 43-х років хворіє на виразкову хворобу протягом 20-ти років. Напередодні ввечері з'явились нудота, запаморочення, "метелики" перед очами, сухість у роті, загальна слабкість, тахікардія. При огляді шкіра бліда, пульс - 100/хв. АТ- 90/60 мм рт.ст., тони серця ритмічні. Живіт м'який, при пальпації в епігастральній ділянці помірна болючість. Печінка та селезінка нормальних розмірів. Аналіз крові: еритроцити - 3,1 10¹²/л, Нб- 100 г/л, лейкоцити - 6, 0 10⁹/л, ШОЕ- 5 мм/год. Яке дослідження повинно бути зроблено першим?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Загальний аналіз сечі
- ☐ б. Рентгенографія шлунку
- ☐ в. Фіброгастродуоденоскопія
- ☐ г. Аналіз крові на цукор
- ☐ д. Колоноскопія

Коментар

Правильна відповідь: Фіброгастродуоденоскопія

Питання 48

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка 28-ми років протягом 2 тижнів лежить у ліжку, голова піднята над подушкою, покриви обличчя сальні. Тонус м'язів підвищений, на запитання не відповідає, інструкції не виконує. З боку внутрішніх органів без патології. Артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст., пульс 62/хв, температура тіла - 36,7оС. Який Ваш попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Психогенний ступор
- ☐ б. Кататонічний ступор
- ☐ в. Епілептичний ступор
- ☐ г. Депресивний ступор
- ☐ д. Апатичний ступор


Коментар

Правильна відповідь: Кататонічний ступор

Питання 49

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 56-ти років раптово на вулиці втратив свідомість. Пульс на сонних артеріях відсутній, дихання відсутнє, шкірні покриви ціанотичні, зіниці розширені. Бригада швидкої медичної допомоги, що прибула успішно провела реанімаційні заходи: відновлено серцеву діяльність, але самостійне дихання відсутнє. Необхідно:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Накладення трахеостоми
- ☐ b. Введення строфантину
- ☐ c. Введення дихальних аналептиків
- ☐ d. Введення бемегриду
- ☐ e. Продовжувати ШВЛ


Коментар

Правильна відповідь: Продовжувати ШВЛ

Питання 50

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 48-ми років, працівник хімічної лабораторії, доставлений в лікарню зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, головний біль, заплітання язика при розмові, блювання, кашель, дертя в горлі, кровотечу з носа, часте болісне сечовипускання. Об'єктивно: шкіра сіро-синього кольору, судоми м'язів. Кров шоколадно-бура, вміст MtHb у крові - 60%, еритроцити з тільцями Гейнца-Ерліха - 25%. В сечі: протеїнурія, макрогематурія. Ваш попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інтоксикація марганцем
- ☐ b. Інтоксикація аміносполуками бензолу
- ☐ c. Інтоксикація тетраетилсвинцем
- ☐ d. Інтоксикація ртуттю
- ☐ e. Інтоксикація сірковуглецем


Коментар

Правильна відповідь: Інтоксикація аміносполуками бензолу

Питання 51

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина впала на приведену руку. Скарги на сильний біль в середній третині плеча, неможливість рухів. При огляді виявляються деформація та крепітація. Поставте діагноз:
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вивих кісток передпліччя
- ☐ b. Вивих пальців кисті
- ☐ c. Вивих плеча
- ☐ d. Перелом плеча
- ☐ e. Перелом кісток передпліччя


Коментар

Правильна відповідь: Перелом плеча

Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після падіння з опором на праве плече потерпілий скаржиться на біль, обмеження рухів, деформацію в ділянці плечового суглоба. Яких заходів на цьому етапі надання допомоги необхідно вжити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Транспортна іммобілізація, знеболення
- ☐ b. Накладення гіпсової пов'язки
- ☐ c. Накладення шини Крамера від пальців до плечового суглоба
- ☐ d. Блокада місця перелому
- ☐ e. Накладення шини Дітеріхса

Коментар

Правильна відповідь: Транспортна іммобілізація, знеболення

Питання 53

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 32-х років, потерпілого в автомобільній катастрофі, оперують з приводу внутрішньочеревної кровотечі та геморагічного шоку. В яких випадках можна використати з метою реінфузії кров, зібрану з черевної порожнини пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Розрив селезінки
- ☐ b. Розрив печінки
- ☐ c. Розрив сечового міхура
- ☐ d. Розрив тонкої кишки
- ☐ e. Розрив шлунку

Коментар

Правильна відповідь: Розрив селезінки

Питання 54

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Ви прибули на місце реанімації потерпілого після утоплення, яке сталося внаслідок пірнання в необстеженій частині річки. Основні вітальні функції відновленні рятівниками. Потерпілий в свідомості, скаржиться на відсутність чутливості в нижній частині тулуба, біль в шиї. Виберіть спосіб транспортної іммобілізації:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Шина Еланського
- ☐ b. Шина Крамера
- ☐ c. Комірець Шанца
- ☐ d. Іммобілізація не потрібна
- ☐ e. Шина Дітерікса

Коментар

Правильна відповідь: Комірець Шанца

Питання 55

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 4-х років розкрутила розетку і доторкнулася до оголених дротів. Дитина без свідомості, ознаки спазму дихальних м'язів за типом ларингоспазму, тонічне скорочення м'язів скелета, серцева діяльність не визначається. Визначити першочерговість тактики надання медичної допомоги:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Анальгезія: трамадол 1-2 мг/кг, діазепам 0,2-0,3 мл/кг
- ☐ б. Звільнити потерпілого від дії електроструму
- ☐ в. Госпіталізація до опікового відділення
- ☐ г. Накладення асептичних пов'язок
- ☐ д. ЕКГ контроль для верифікації порушень ритму серцевої діяльності

Коментар

Правильна відповідь: Звільнити потерпілого від дії електроструму

Питання 56

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Вкажіть максимальну тривалість визначення наявності пульсу:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 20 секунд
- ☐ б. 5 секунд
- ☐ в. 15 секунд
- ☐ г. 10 секунд
- ☐ д. 1 хвилина

Коментар

Правильна відповідь: 10 секунд

Питання 57

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На фармацевтичному підприємстві сталась пожежа. Декілька працівників виявились заблокованими без можливості самостійної евакуації. Засоби індивідуального захисту на випадок пожежі також виявились недоступними. Коли рятувальники евакуювали їх до безпечного місця потерпілі мали наступні симптоми: запаморочення, порушення зору, нудота, часте дихання, задишка, вишневий колір обличчя. Який вид гіпоксії розвивається при таких умовах? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Циркуляторна
- ☐ b. Тканинна
- ☐ c. Токсична
- ☐ d. Гемічна
- ☐ e. Гіпоксична

Коментар

Правильна відповідь: Гемічна

Питання 58

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 20-ти років надійшов на 2-й день хвороби без свідомості. З 1-го дня хвороби турбували головний біль, підвищення температури до 39°C, блювання. Об'єктивно: виражена ригідність м'язів потилиці, симптоми Керніга та Брудзинського позитивні. Вкажіть стартовий розчин для проведення інфузійної терапії:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Трисоль
- ☐ b. Глюкоза
- ☐ c. Реосорбілакт
- ☐ d. Манітол
- ☐ e. Гепасол

Коментар

Правильна відповідь: Манітол

Питання 59

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Першовагітна в терміні 11-12 тижнів скаржиться на інтенсивний переймоподібний біль внизу живота та кровотечу зі статевих шляхів. Піхвове дослідження: канал шийки матки відкрито на 2 см, в ньому визначається нижній полюс плодового яйця. Кров'янисті виділення рясні. Яка стадія мимовільного аборт?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Аборт у ходу
- ☐ b. Неповний аборт
- ☐ c. Повний аборт
- ☐ d. Загрозливий аборт
- ☐ e. Аборт, що не стався

Коментар

Правильна відповідь: Аборт у ходу

Питання 60

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Які трансфузійні середовища виявляють оптимальний гемостатичний ефект при гіпокоагуляційній кровотечі у потерпілих в аваріях і катастрофах?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Еритроцитарна маса
- ☐ b. Свіжозаморожена плазма
- ☐ c. Фібриноген
- ☐ d. Кріопреципітат
- ☐ e. Нативна плазма

Коментар

Правильна відповідь: Свіжозаморожена плазма

Питання 61

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі 36-ти років, яка перебуває в кінці I періоду пологів з великим плодом, з'явилися потуги при високому розташуванні голівки плода, відсутність поступального руху голівки, позитивний симптом Генкеля-Вастена, симптоми вдавнення сечового міхура. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Слабкість пологової діяльності
- ☐ b. Анатомічно вузький таз
- ☐ c. Фізіологічний I період пологів
- ☐ d. Клінічно вузький таз
- ☐ e. Дискоординована пологова діяльність

Коментар

Правильна відповідь: Клінічно вузький таз

Питання 62

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 34-х років через 3 години після перенесеної субтотальної субфасціальної правобічної гемітиреоїдектомії раптово виникли задишка, тахікардія, відчуття неспокою, страху. Яке з наведених післяопераційних ускладнень виникло у хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Повітряна емболія
- ☐ b. Асфіксія
- ☐ c. Тиреотоксичний криз
- ☐ d. Паратиреоїдна тетанія
- ☐ e. Пошкодження зворотного нерва

Коментар

Правильна відповідь: Тиреотоксичний криз

Питання 63

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 44-х років скаржиться на біль в ділянці прямої кишки. Біль з'явився 3 дні тому назад, поступово посилюючись. Температура тіла - 38°C, пульс - 92/хв., ритмічний. В періанальній ділянці зліва припухлість, шкіра гіперемована, при пальпації визначається різко болючий інфільтрат з отвором, з якого виділяється гній. Загальний аналіз крові: лейкоцити - 11,5 10⁹/л, е. - 3%, п. - 10%, с. - 59%, л. - 22%, м. - 6%. Ваш попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тріщина заднього проходу
- ☐ б. Випадіння прямої кишки
- ☐ в. Гострий парапроктит
- ☐ г. Пухлина прямої кишки
- ☐ д. Тромбоз гемороїдального вузла


Коментар

Правильна відповідь: Гострий парапроктит

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В селищі група дітей скаржиться на головний біль, нудоту, підвищення температури тіла. Під час огляду встановлено іктеричність склер, шкіри. Санітарно-епідеміологічна розвідка встановила виникнення групового інфекційного захворювання, яке має тенденцію до подальшого поширення серед населення. До якого санітарно-епідеміологічного стану належить дане селище?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Надзвичайний
- ☐ б. Неблагополучний
- ☐ в. Нестійкий
- ☐ г. Нормальний
- ☐ д. Благополучний


Коментар

Правильна відповідь: Неблагополучний

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 43-х років, якого було госпіталізовано у гастроентерологічне відділення з діагнозом цироз печінки з портальною гіпертензією III ступеня, після проведеного форсованого діурезу з'явилися ознаки печінкової енцефалопатії III ступеня. Призначення яких препаратів повинно бути першочерговим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інсулін
- ☐ b. Діуретики
- ☐ c. Гепатопротектори
- ☐ d. Інгібітори протеаз
- ☐ e. Лактулоза


Коментар

Правильна відповідь: Лактулоза

Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 58-ми років, що лікувався в стаціонарі з приводу нестабільної стенокардії, при ходьбі раптово втратив свідомість, впав. Об'єктивно: свідомість і пульсація на центральних артеріях відсутні, зіниці вузькі, на світло не реагують, рідкі малоамплітудні рухи грудної клітки до 8-10/хв. АТ не визначається. На ЕКГ: синусоїдна крива з частими, різними по формі і амплітуді хвилями до 300/хв. Яке ускладнення виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Асистолія шлуночків
- ☐ b. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ c. Фібриляція шлуночків
- ☐ d. Фібриляція передсердь
- ☐ e. Повна атріо-вентрикулярна блокада

Коментар

Правильна відповідь: Фібриляція шлуночків

Питання 67

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 42-х років. Протягом 5-ти років хворіє на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень. Лікувався нерегулярно. Скаржиться на сильний біль в лівій половині грудної клітки, задишку. Об'єктивно: стан хворого середнього ступеня важкості. Над лівою легенею перкуторно визначається тимпаніт, аускультативно - дихання не вислуховується. Яке ускладнення фіброзно-кавернозного туберкульозу виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ателектаз легень
- ☐ b. Ексудативний плеврит
- ☐ c. Бульозна емфізема
- ☐ d. Хронічне легеневе серце
- ☐ e. Спонтанний пневмоторакс

Коментар

Правильна відповідь: Спонтанний пневмоторакс

Питання 68

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років після дорожньо-транспортної пригоди надійшов у приймальний відділ лікарні швидкої допомоги у коматозному стані, виявлена гемолікворея з правого вуха. Який вид та обсяг радіологічних методів обстеження необхідно провести?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Магніто-резонансна томографія голови
- ☐ b. Ультрасонографія головного мозку
- ☐ c. Радіологічні дослідження недоцільно проводити
- ☐ d. Комп'ютерна томографія голови
- ☐ e. Рентгенографія черепа в 2-х проекціях

Коментар

Правильна відповідь: Комп'ютерна томографія голови

Питання 69

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 25-ти років, яка надійшла до приймального відділення лікарні швидкої медичної допомоги з приводу гострої ниркової недостатності, виникла зупинка роботи серця. Що найімовірніше стало причиною цього?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гіперкаліємія
- ☐ b. Гіпокаліємія
- ☐ c. Уремія
- ☐ d. Ацидоз
- ☐ e. Гіперфосфатемія

Коментар

Правильна відповідь: Гіперкаліємія

Питання 70

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В зоні обстрілу хімічними снарядами у військовослужбовця була пошкоджена маска протигазу. Незабаром з'явилася виражена задуха, головний біль. Об'єктивно: ціаноз шкіри та слизових, виражений міоз, вимушене положення тіла з фіксацією плечового поясу, задишка з подовженим видихом. В легенях аускультативно жорстке дихання, множинні сухі свистячі хрипи. З боку органів кровообігу - брадикардія, зниження АТ. Табельними антидотами при описаній клінічній картині ураження є:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Фіцилін, метацин, димедрол
- ☐ b. Будагсим, атропін, дипіроксим
- ☐ c. Тіосульфат натрію, нітрит натрію
- ☐ d. Унітіол, вуглеводні
- ☐ e. Амілнітрит, хромосмон

Коментар

Правильна відповідь: Будагсим, атропін, дипіроксим

Питання 71

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У військовослужбовця, який перебував в зоні бойових дій в ситуації загрози його життю, спостерігалось рухове збудження, порушення орієнтації в місці та часі, неадекватні вчинки, небезпечні для оточуючих. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Шизофренія
- ☐ b. Гострий реактивний стан
- ☐ c. Психопатоподібна поведінка
- ☐ d. Депресивні та тривожні розлади
- ☐ e. Невроз

Коментар

Правильна відповідь: Гострий реактивний стан

Питання 72

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий скаржиться на інтенсивний біль у грудній клітці, задишку, кашель, кровохаркання, що виникли раптово після фізичного навантаження. Об'єктивно: стан важкий, ціаноз верхньої половини тулуба. Тони серця приглушені, ритм правильний, акцент II тону над легеневою артерією. АТ- 100/80 мм рт.ст. ЕКГ: електрична вісь серця відхилена вправо, глибокі зубці S в I та Q в III стандартних відведеннях. Яке дослідження дозволить верифікувати діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Пульмоноангіографія
- ☐ b. Магнітно-резонансна томографія органів грудної клітки
- ☐ c. Коронарографія
- ☐ d. Рентгенографія органів грудної клітки
- ☐ e. Ультразвукове дослідження серця та аорти

Коментар

Правильна відповідь: Пульмоноангіографія

Питання 73

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з менінгококовою інфекцією, синдромом Уотерхауса-Фрідеріксена в приймальному відділенні виникла зупинка дихання, артеріальний тиск виміряти не вдається, ЧСС- 58/хв. Які невідкладні дії лікаря приймального відділення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Термінова трахеостомія
- ☐ b. Введення адреналіну
- ☐ c. Введення великих доз глюкокортикостероїдів
- ☐ d. Вентиляція мішком Амбу
- ☐ e. Введення кордіаміну

Коментар

Правильна відповідь: Вентиляція мішком Амбу

Питання 74

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 60-ти років на тлі підвищення артеріального тиску до 170/90 мм рт.ст. порушилась мова і ослабли праві кінцівки. Доставили до стаціонару через годину після виникнення симптомів. Діагностовано: ішемічний інсульт. Яке лікування слід призначити хворому для відновлення кровотоку в зоні ішемії, якщо немає протипоказань?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Проведення тромболізу
- ☐ b. Оперативне втручання - ендартеректомія
- ☐ c. Антиагрегантна терапія
- ☐ d. Дегідратаційна терапія
- ☐ e. Введення антикоагулянтів


Коментар

Правильна відповідь: Проведення тромболізу

Питання 75

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В інфекційний стаціонар госпіталізовано хворого 26-ти років на 2-й день хвороби з підвищенням температури до 38°C, багаторазовою блювотою і частими водянистими випорожненнями. Маса тіла знижена на 9%. Який метод регідратації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення рідини ендогастрально
- ☐ b. Внутрішньовенний крапельний
- ☐ c. Внутрішньоартеріальний
- ☐ d. Оральна регідратація
- ☐ e. Введення рідини підшкірно крапельно


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенний крапельний

Питання 76

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На підприємстві, що виробляє добрива, у працівників, що були в приміщенні з поганою вентиляцією з'явилися нежить, біль у горлі, слинотеча, осиплість голосу, головний біль та біль в шлунку, блювота, ціаноз. Яке отруєння має місце?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Отруєння сірководнем
- ☐ b. Отруєння аміаком
- ☐ c. Отруєння хлором
- ☐ d. Отруєння сірчаною кислотою
- ☐ e. Отруєння соляною кислотою

Коментар

Правильна відповідь: Отруєння аміаком

Питання 77

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 62-х років на 5-й день після операції апендектомії розвинулись явища перитоніту. Після чергової операції та масивної антибактеріальної терапії розвинулись явища інфекційно-токсичного шоку. Який з препаратів найкраще використовувати для стабілізації гемодинаміки після відновлення волемії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ефедрин
- ☐ b. Адреналін
- ☐ c. Сульфокамфокаїн
- ☐ d. Мезатон
- ☐ e. Дофамін


Коментар

Правильна відповідь: Дофамін

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років на роботі раптово відчув різкий головний біль, було одноразове блювання, знепритомнів. У анамнезі рідкі епізоди головного болю. Об'єктивно: у свідомості, неспокійний, періодично тримається рукою за голову, стогне. Парезів, чутливих порушень немає. Помірно виражені менінгеальні симптоми. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку клінічну картину?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Головний біль м'язової напруги
- ☐ b. Ішемічний інсульт
- ☐ c. Гіпертонічний церебральний криз
- ☐ d. Мігрень
- ☐ e. Субарахноїдальний крововилив


Коментар

Правильна відповідь: Субарахноїдальний крововилив

Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 39-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C, озноб, профузне потовиділення. Тиждень тому було переохолодження. Симптом Пастернацького різко позитивний з обох сторін. Дані УЗД: збільшені розміри обох нирок. Аналіз крові: лейкоцити - 12 109/л, ШОЕ- 25 мм/год, е- 2%, п- 15%, с- 45%, л- 30%, м- 8%. Аналіз сечі: питома вага - 1015, білок - 0,035 г/л, лейкоцити вкривають все п/з, еритроцити - 8-10 в п/з, слиз +++, бактерії +++. Поставте діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий інтерстиціальний нефрит
- ☐ б. Підгострий гломерулонефрит
- ☐ в. Гострий гломерулонефрит
- ☐ г. Гострий пієлонефрит
- ☐ е. Амілоїдоз нирок


Коментар

Правильна відповідь: Гострий пієлонефрит

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Породілля перебуває у пологовому залі. Пологи тривають 11 годин, розпочався другий період пологів. При проведенні кардіотокографії плода встановлено, що частота серцевих скорочень знизилася до 100/хв. При проведенні піхвового дослідження встановлено, що голівка плода розташована у вузькій частині порожнини малого тазу. Який стан плода найбільш імовірний? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Фізіологічна брадикардія плода
- ☐ б. Фетоплацентарна недостатність плода
- ☐ в. Дистрес плода
- ☐ г. Краніоспінальна травма
- ☐ е. Агональний стан плода

Коментар

Правильна відповідь: Фізіологічна брадикардія плода

Питання 81

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпіла 12-ти років витягнута з холодної морської води через 15 хвилин після утоплення без ознак життя. Які заходи необхідно розпочати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Звільнити дихальні шляхи від води, створити дренажне положення, розпочати заходи серцево-легеневої реанімації
- ☐ б. Не втрачаючи часу на видалення води, розпочати серцево-легеневу реанімацію
- ☐ в. Не проводити серцево-легеневу реанімацію, внаслідок великого проміжку часу після утоплення
- ☐ г. Виконати конікотомію
- ☐ д. Транспортувати потерпілу в найближчу лікувальну установу для проведення серцево-легеневої реанімації

Коментар

Правильна відповідь: Звільнити дихальні шляхи від води, створити дренажне положення, розпочати заходи серцево-легеневої реанімації

Питання 82

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 30-ти років скаржиться на головний біль, марення. Об'єктивно: температура тіла - 39,0°C, збуджена, обличчя гіперемоване, позитивний симптом Говорова-Годельє, петехіальний висип на тулубі, кінцівках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., гепатоспленомегалія. Вживає алкоголь, ін'єкційні наркотики, живе в приміщенні підвального типу. Поставте попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Алкогольний психоз
- ☐ б. Висипний тиф
- ☐ в. Лептоспіроз
- ☐ г. Грип
- ☐ д. ВІЛ-інфекція

Коментар

Правильна відповідь: Висипний тиф

Питання 83

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка віком 28-ми років, білява, з блакитними очима, рудим волоссям була на відкритому сонці у липні місяці з 10 ранку до 15 години. Наступного дня шкіра відкритих ділянок, що перебували на сонці - гіперемована, з набряком, на тлі еритеми - множинні бульозні елементи. Висипка супроводжується болем та печінням. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Герпетичний дерматоз Дюрінга
- ☐ б. Справжня екзема
- ☐ в. Акантолітична пухирчатка
- ☐ г. Алергічний дерматит
- ☐ д. Простий контактний дерматит

Коментар

Правильна відповідь: Простий контактний дерматит

Питання 84

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При наданні невідкладної допомоги хлопцю 7-ми років із гострою крововтратою до 10% ОЦК, яка зумовлена ушкодженням вен нижньої кінцівки, необхідно відновити обсяг циркулюючої крові.

Оберіть оптимальний інфузійний розчин:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Цільна кров
- ☐ б. Свіжозаморожена плазма
- ☐ в. Реополіглюкін
- ☐ г. Кристалоїди
- ☐ д. Розчин глюкози

Коментар

Правильна відповідь: Кристалоїди

Питання 85

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки 25-ти років при виконанні інструментальної ревізії порожнини матки у зв'язку з неповним самовільним викиднем відбулася перфорація стінки матки в ділянці дна. Кровотеча з піхви незначна. Яка тактика ведення хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Призначити утеротоніки, спостереження
- ☐ б. Ліжковий режим, спостереження
- ☐ в. Надпівхова ампутація матки
- ☐ г. Екстирпація матки
- ☐ д. Ушивання перфораційного отвору

Коментар

Правильна відповідь: Ушивання перфораційного отвору

Питання 86

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з проникаючим пораненням грудної клітки крововтрата 40% ОЦК. В анамнезі численні гемотрансфузії, більшість з яких супроводжувалась гемотрансфузійними реакціями. Виберіть компонент крові для переливання:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Свіжозаморожена плазма
- ☐ б. Кріопреципітат
- ☐ в. Еритроцитарна суспензія
- ☐ г. Концентрат тромбоцитів
- ☐ д. Відмиті еритроцити

Коментар

Правильна відповідь: Відмиті еритроцити

Питання 87

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 35-ти років скаржиться на підвищення температури тіла до 39°C, біль по передній поверхні шиї, що посилюється при ковтанні, повороті голови. При огляді: щитоподібна залоза збільшена у розмірах, при пальпації різко болюча, з почервонінням шкіри та флюктуацією. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Зоб Ріделя
- ☐ b. Тиреоїдит де Кервена
- ☐ c. Тиреоїдит Хашімото
- ☐ d. Гострий гнійний тиреоїдит
- ☐ e. Гострий медіастиніт

Коментар

Правильна відповідь: Гострий гнійний тиреоїдит

Питання 88

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В реанімаційне відділення доставлено хворого 24-х років з підозрою на отруєння невідомими лікарськими засобами (суїцидальна спроба). Дата та час вживання невідомі. При огляді: свідомість відсутня, зіниці розширені, фотореакція квола. АТ- 80/40 мм рт.ст., Рс- 114/хв., слабого наповнення. Брадикард до 10/хв. Сліди блювотних мас навколо рота. Який захід в рамках надання невідкладної допомоги слід провести першочергово?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Антидотна терапія
- ☐ b. Налагодження ЕКГ моніторингу
- ☐ c. Зондове промивання шлунку
- ☐ d. Інтубація трахеї з роздуванням манжети
- ☐ e. Форсований діурез

Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї з роздуванням манжети

Питання 89

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 34-х років доставлений в лікарню зі скаргами на задишку, задуху, сухий кашель. Стан погіршився 2 доби тому назад. За останні 12 годин користувався беротеком близько 50 разів. Об'єктивно: ЧДР - 30/хв., дистанційні хрипи. Обличчя ціанотичне. У легенях прослуховуються ділянки "німої легені". Чим ускладнився перебіг бронхіальної астми?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Астматичним статусом
- ☐ b. Ексудативним плевритом
- ☐ c. Ателектазом легенів
- ☐ d. Гострою пневмонією
- ☐ e. Спонтанним пневмотораксом

Коментар

Правильна відповідь: Астматичним статусом

Питання 90

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 9-ти років після перенесеної ГРВІ з'явилися полідипсія, поліурія, слабкість, нудота. При обстеженні: свідомість потьмарена, шкіра суха, очні яблука м'які, дихання Куссмауля, запах ацетону з рота, серцеві тони глухі, живіт м'який, неболючий. Глюкоза крові - 19 ммоль/л. Які цукрознижувальні препарати слід призначити в комплексній терапії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інсулін середньої дії
- ☐ b. Бігуаніди
- ☐ c. Інсулін короткої дії
- ☐ d. Інсулін пролонгований
- ☐ e. Препарати сульфонілсечовини

Коментар

Правильна відповідь: Інсулін короткої дії

Питання 91

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Ветлікар 38-ми років, захворів гостро: озноб, гарячка, головний біль, біль в очних яблуках, м'язах, суглобах, грудній клітці, кашель, безсоння. Об'єктивно: температура тіла - 40°C, гіперемія обличчя, шиї, слизової оболонки зіву, ін'єкція судин склер, герпес, брадикардія, гіпотонія, сухі хрипи над легеньми, гепатоспленомегалія. У працівників ферми почастишали випадки пневмоній. Найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Крупозна пневмонія
- ☐ b. Ку-гарячка
- ☐ c. Ентеровірусна міалгія
- ☐ d. Гостре респіраторне захворювання
- ☐ e. Епідемічний висипний тиф

Коментар

Правильна відповідь: Ку-гарячка

Питання 92

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В учасника ліквідації наслідків аварії на АЕС діагностована гостра променева хвороба. Який гематологічний показник є найбільш інформативним як критерій ступеня тяжкості?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кількість лімфоцитів
- ☐ b. Кількість еритроцитів
- ☐ c. Кількість моноцитів
- ☐ d. Кількість нейтрофілів
- ☐ e. Кількість тромбоцитів


Коментар

Правильна відповідь: Кількість лімфоцитів

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини двох років раптово з'явився біль спастичного характеру у животі. При первинному огляді дитина заспокоїлась, болю нема. Був стілець з домішкою крові. В правій нижній ділянці живота пальпується пухлиноподібне утворення, циліндричної форми. Який Ваш попередній діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Хвороба Крона
- ☐ b. Хвороба Гіршпрунга
- ☐ c. Дизентерія
- ☐ d. Черевний тиф
- ☐ e. Кишкова інвагінація


Коментар

Правильна відповідь: Кишкова інвагінація

Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 3-х років, яка перебуває у стаціонарі, на тлі гострої респіраторної інфекції 3 рази було блювання, непокоїть гострий біль у животі. Температура тіла - 38,5°C. Шкіра бліда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор крові - 4,0 ммоль/л. Який з діагнозів найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий гастроентерит
- ☐ b. Цукровий діабет
- ☐ c. Діабетична кома
- ☐ d. Гострий апендицит
- ☐ e. Ацетонемічний стан


Коментар

Правильна відповідь: Ацетонемічний стан

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий шахтар був госпіталізований на 5-й день хвороби зі скаргами на гарячку, головний біль, біль в литкових м'язах. Об'єктивно: стан важкий, температура тіла - 39,5оС, жовтяниця, кон'юнктивіт, гепатоспленомегалія, діурез знижений до 200 мл. Діагноз: лептоспіроз, гостра ниркова недостатність. Який засіб лікування слід призначити хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Серцеві глікозиди
- ☐ b. Гемодіаліз
- ☐ c. Дегідратація
- ☐ d. Регідратація
- ☐ e. Кортикостероїди


Коментар

Правильна відповідь: Гемодіаліз

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При обстеженні дитини отримано аналіз сечі, забарвлений кров'ю. При лабораторному дослідженні виявлено незмінені еритроцити. Яке, на вашу думку, найбільш імовірне джерело гематурії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Клубочки
- ☐ b. Нефрон
- ☐ c. Нижні сечовивідні шляхи
- ☐ d. Канальці
- ☐ e. Петля Генле


Коментар

Правильна відповідь: Нижні сечовивідні шляхи

Питання 97

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної 29-ти років виникли скарги на головний біль, нудоту, блювоту на висоті головного болю, мерехтіння "мушок" перед очима, озноб з тремором кінцівок, порушення зору. АТ- 145/90 мм рт.ст., пульс - 86/хв. Периферичні набряки відсутні. Напередодні підйому АТ вагітна відзначала емоційну напругу. Після надання допомоги виділилася світла сеча, протеїнурія відсутня. Який попередній діагноз має бути встановлений?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Прееклампсія легкого ступеня
- ☐ б. Прееклампсія тяжкого ступеня
- ☐ в. Прееклампсія середнього ступеня
- ☐ г. Гіпертонічний криз
- ☐ д. Еклампсія


Коментар

Правильна відповідь: Гіпертонічний криз

Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 52-х років госпіталізований у відділення інтенсивної терапії зі скаргами на інтенсивний біль за грудиною, виражену задишку, загальну слабкість, серцебиття. Свідомість затьмарена. Шкірні покрови бліді, вологі, холодні. Артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст., пульс - 116/хв. Олігурія. ЕКГ: елевація сегменту ST I, II, avL, V2-V5, QS V2-V5. Який медикаментозний препарат при даному ускладненні найбільш доцільно ввести хворому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Бісопролол
- ☐ б. Фуросемід
- ☐ в. Аміодарон
- ☐ г. Добутамін
- ☐ д. Ніфедипін

Коментар

Правильна відповідь: Добутамін

Питання 99

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 24-х років була прооперована з приводу позаматкової вагітності. Крововтрата становила - 1500 мл, рівень Hb - 60 г/л, Ht - 20%, група крові 0(I) Rh(+) позитивний. В операційній помилково почато переливання донорської еритроцитарної маси B(III) Rh(+) позитивної. Через 15 хвилин відмічена підвищена кровоточивість, зниження АТ до 70/40 мм рт.ст., виділення по катетеру сечі темно-вишневого кольору, тахікардія, блідість шкірних покривів. Який діагноз в цій ситуації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Геморагічний шок
- ☐ б. Гемотрансфузійний шок
- ☐ в. Постлягеморагічна анемія
- ☐ г. Анафілактичний шок
- ☐ д. Септичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Гемотрансфузійний шок

Питання 100

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого доставлено до реанімаційної зали без свідомості. Об'єктивно: апное, пульс на магістральних судинах відсутній, мідріаз. Яке першочергове обстеження необхідно провести одночасно з серцево-легеневою реанімацією?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Визначення газового складу крові
- ☐ б. Томографію головного мозку
- ☐ в. ЕКГ-моніторинг
- ☐ г. Рентгенографію органів грудної клітки
- ☐ д. Електроенцефалографію

Коментар

Правильна відповідь: ЕКГ-моніторинг

Питання 101

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 44-х років після вживання алкоголю з'явились нудота, багаторазове блювання, спочатку їжею, а потім згортками крові, слабкість. При огляді: шкіряні покриви та слизові оболонки бліді, пульс - 120/хв., при пальпації живіт м'який, безболісний у всіх відділах; в лівому підребер'ї визначається збільшена, тверда селезінка. У хворого підозрюється кровотеча з варикозно розширених вен стравоходу. Яку тактику слід обрати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Спостереження в умовах хірургічного стаціонару
- ☐ б. Введення холодної амінокапронової кислоти через зонд
- ☐ в. Застосування методики керованої гіпотензії
- ☐ г. Ургентна лапаротомія, пластика стравоходу
- ☐ д. Ендоскопічна зупинка кровотечі

Коментар

Правильна відповідь: Ендоскопічна зупинка кровотечі

Питання 102

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після опромінення у госпіталь доставлений юнак 26-ти років. Показник індивідуального дозиметра 5 Гр. Скарги на різку загальну слабкість, головний біль, нудоту, повторне блювання. Об'єктивно: на шкірі обличчя еритема, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., блювання продовжується. В якому клінічному періоді гострої променевої хвороби перебуває хворий? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Період запалення
- ☐ б. Період первинної реакції
- ☐ в. Період виражених клінічних проявів
- ☐ г. Період вторинної реакції
- ☐ д. Період розпаду

Коментар

Правильна відповідь: Період первинної реакції

Питання 103

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 35-ти років госпіталізований в коматозному стані. Зі слів родичів, погіршення самопочуття протягом доби. На тлі ГРВІ з'явились сильний біль в животі, нудота, блювання, діарея, виражена слабкість у м'язах, температура тіла підвищилась до 39,2оС. Об'єктивно: сопор, шкіра суха, з геморагічним висипом, тургор знижений, акроціаноз, тонус м'язів та сухожильні рефлексії підвищені. Дихання часте, АТ- 65/40 мм рт.ст., пульс - 96/хв., слабкий. При пальпації живота - здуття, позитивні симптоми подразнення очеревини. Глікемія - 2,9 ммоль/л, кортизол - 17 мкг/100 мл. Яка найбільш імовірна патологія, що зумовлює таку картину?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіпоглікемічна кома
- ☐ b. Аддісонічний криз
- ☐ c. Шлунково-кишкова кровотеча
- ☐ d. Кетоацидотична діабетична кома
- ☐ e. Гіпотиреоїдна кома

Коментар

Правильна відповідь: Аддісонічний криз

Питання 104

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

6-місячний хлопчик був знайдений матюю вранці у ліжечку без ознак дихання і серцебиття обличчям донизу. Зі слів матері напередодні ніяких змін у стані дитини не спостерігалось. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Синдром раптової смерті
- ☐ b. Кардіогенний шок
- ☐ c. Менінгоенцефаліт
- ☐ d. Коматозний стан
- ☐ e. Аспірація стороннього тіла

Коментар

Правильна відповідь: Синдром раптової смерті

Питання 105

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий із серцево-судинною патологією потрапив в реанімаційне відділення з підозрою на інфаркт нирки. У нього підвищена температура - 39,5°C, гострий біль у попереку та гематурія. Артеріальний тиск - 180/110 мм рт.ст. Зроблено загальний аналіз крові, сечі, та біохімічне дослідження крові. Вкажіть найбільш характерні ознаки інфаркту нирки з перерахованих: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Циліндрурія
- ☐ b. Біль і гематурія
- ☐ c. Протеїнурія
- ☐ d. Лейкоцитурія
- ☐ e. Підвищена швидкість осідання еритроцитів

Коментар

Правильна відповідь: Біль і гематурія

Питання 106

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В медичну роту доставлено військовослужбовця з вогнепальним відкритим переломом правої плечової кістки. Загальний стан середньої тяжкості. Шкірні покриви та видимі слизові оболонки бліді. Систолічний АТ - 90 мм рт.ст. Пульс - 100/хв. Кінцівка іммобілізована за допомогою табельних засобів. Який вид медичної допомоги буде надано цьому пораненому на даному етапі медичної евакуації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Перша лікарська допомога з елементами кваліфікованої хірургічної допомоги
- ☐ b. Долікарська (фельдшерська) допомога
- ☐ c. Спеціалізована медична допомога
- ☐ d. Кваліфікована терапевтична медична допомога
- ☐ e. Перша медична допомога

Коментар

Правильна відповідь: Перша лікарська допомога з елементами кваліфікованої хірургічної допомоги

Питання 107

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Батьки 3-місячного немовляти звернулися до лікарні зі скаргами на ціаноз шкірних покривів при крику, занепокоєння дитини при годуванні. Об'єктивно: недостатня надбавка маси тіла дитини. У легенях: жорстке дихання. Частота дихання - 32/хв., частота серцевих скорочень - 160/хв. Тони серця ритмічні, грубий систолічний шум уздовж лівого краю грудини. Який з діагностичних методів слід застосувати для підтвердження діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Електрокардіограму
- ☐ b. Рентгенографію органів грудної клітки
- ☐ c. Бронхографію
- ☐ d. Бронхоскопію
- ☐ e. Ехокардіографію

Коментар

Правильна відповідь: Ехокардіографію

Питання 108

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років, шкіряник, звернувся в поліклініку зі скаргами на підвищення температури до 38,5°C, головний біль, виражений безболісний набряк в ділянці тилу лівої кисті, наявність виразки з чорною кірочкою. За три дні до захворювання поранив руку на роботі. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Еризипелоїд
- ☐ b. Сибірка
- ☐ c. Туляремія
- ☐ d. Стафілококовий карбункул
- ☐ e. Бешиха

Коментар

Правильна відповідь: Сибірка

Питання 109

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 9-ти місяців з важкою формою дизентерії Флекснера на фоні гіпертермії та діареї з'явилися блювання та судоми. Чим викликано погіршення стану дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Нейротоксикозом
- ☐ b. Приєднанням менінгіту
- ☐ c. Токсикозом з ексікозом
- ☐ d. Пухлиною мозку
- ☐ e. Травмою голови

Коментар

Правильна відповідь: Нейротоксикозом

Питання 110

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 10-ти років доставлена в приймальне відділення без свідомості. З анамнезу відомо, що хворіє на цукровий діабет. Об'єктивно: шкірні покриви і видимі слизові сухі, тонус очних яблук знижений, язик обкладений коричневим нальотом, у видихуваному повітрі відсутній запах ацетону, м'язовий тонус знижений. АТ- 90/50 мм рт.ст., ЧСС- 116/хв. У крові: глюкоза - 40 ммоль/л, осмолярність плазми - 380 ммоль/л. Який стан розвинувся у дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Кетоацидотична кома
- ☐ b. Гіперосмолярна кома
- ☐ c. Гостра наднирникова недостатність
- ☐ d. Гіпоглікемічна кома
- ☐ e. Гіперлактатацедотична кома

Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

Питання 111

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 2 доби, від 4 вагітності, 2-х пологів. Акушерський анамнез: перша дитина народилась доношеною, здоровою. Було 2 медичних аборти. Теперішня вагітність перебігала із загрозою переривання. Пологи на 30 тижні, вага тіла новонародженого - 1400,0 г. Стан після пологів важкий, Значна млявість, гіподинамія, гіпорексія. Дихання - 80/хв., втягуються всі податливі місця грудної клітки, симптом "гойдалки", звучний видих, симптом "трубача". Акроціаноз. Перкуторно-легеневий звук, аускультативно - ослаблене дихання. Рентгенологічно - "нодозно-ретикулярна сітка". Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Хвороба гіалінових мембран
- ☐ b. Крововиливи в легені
- ☐ c. Первинний полісегментарний ателектаз
- ☐ d. Внутрішньоутробна пневмонія
- ☐ e. Бронхо-легенева дисплазія

Коментар

Правильна відповідь: Хвороба гіалінових мембран

Питання 112

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 56-ти років госпіталізований з приводу гострої затримки сечі. 15 років хворіє на хронічний простатит. При пальцевому ректальному дослідженні простата розмірами 2х2 см, симетрична, щільна, неболюча, дно сечового міхура - на 5 см вище лобкової кістки. При УЗД: сечовий міхур переповнений, залишкова сеча 450 мл, простата розмірами - 23х24 мм, з кальцинатами. Концентрація загального PSA - 2 нг/мл, креатиніну - 320 мкмоль/л. Визначте найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рак простати
- ☐ b. Склероз простати, постренальна гостра ниркова недостатність
- ☐ c. Цистоцеле
- ☐ d. Нейрогенний сечовий міхур
- ☐ e. Доброякісна гіперплазія простати


Коментар

Правильна відповідь: Склероз простати, постренальна гостра ниркова недостатність

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 10-місячної дитини внаслідок порушення правил вигодовування виникло багаторазове блювання, рідкі випорожнення 20 разів на добу. При огляді сімейним лікарем дитина різко загальмована, дихання стогнуче. Втрата маси тіла понад 10%. Велике тім'ячко та очні яблука запалі, слизові сухі. Тургор шкіри знижений, шкіра з мармуровим малюнком. Час заповнення капілярів становить 6 сек. ЧСС- 182/хв., АТ- 73/24 мм рт.ст. ЧДР- 66/хв. Останнє сечовипускання було 18 годин тому. Який імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Септичний шок
- ☐ b. Гіповолемічний шок
- ☐ c. Помірне зневоднення
- ☐ d. Кардіогенний шок
- ☐ e. Синдром Рея


Коментар

Правильна відповідь: Гіповолемічний шок

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При огляді дівчинки 9-місячного віку лікар виявив: різке збудження дитини, температура тіла - 38,5оС, голова закинута назад, несиметричний поодинокий геморагічний висип на нижніх кінцівках. До яких першочергових заходів на догоспітальному етапі слід вдатись?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Катетеризувати центральну вену, ввести тетрациклін
- ☐ b. Провести катетеризацію центральної вени
- ☐ c. Ввести внутрішньовенно дексаметазон
- ☐ d. Провести катетеризацію центральної та периферичної вен

☐ е. Ввести внутрішньовенно преднізолон та левоміцетин
Коментар

Правильна відповідь: Ввести внутрішньовенно преднізолон та левоміцетин

Питання 115

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий 32-х років був водієм легкового автомобіля, що перевернувся і зайнявся. Спостерігалася короточасна втрата свідомості. Об'єктивно: анізокорія. Тахіпное до 30/хв. Крепітація 6-10 ребер зліва по передній пахвовій лінії. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Деформація правого передпліччя в нижній третині за типом "багнета", гематома. Має місце опікова рана грудей, тулуба та стегон, площею 36% з наявністю великої кількості епідермальних пухирів що прорвалися. Який вид травми у хворого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Поєднана
- ☐ б. Множинна
- ☐ в. Комбінована
- ☐ г. Поліфокальна
- ☐ е. Монолокальна

Коментар

Правильна відповідь: Комбінована

Питання 116

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 65-ти років, який 8 років страждає на ІХС, раптово виник пекучий біль за грудиною, що іррадіює у ліву лопатку, плече, передпліччя. АТ- 140/90 мм рт.ст. Пульс - 80/хв. На ЕКГ: реєструються негативні зубці Т та депресія сегменту S-T у відведеннях II, III, V5-V6, співвідношення зубця Q до зубця R в цих відведеннях 1:5. Який діагноз найбільш імовірний у цьому випадку? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інфаркт міокарду з елевацією сегмента ST
- ☐ б. ТЕЛА

- ☐ c. Інфаркт міокарду без елевації сегмента ST
- ☐ d. Міокардит
- ☐ e. Міжреберна невралгія


Коментар

Правильна відповідь: Інфаркт міокарду без елевації сегмента ST

Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 34-х років через 2 тижні після пологів з'явився біль у лівій нижній кінцівці. Ліве стегно і гомілка різко збільшилися в об'ємі за рахунок набряку. Спостерігається синюшність шкірних покривів. Пульсація на стегновій і підколінній артеріях збережена. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий артеріальний тромбоз
- ☐ b. Ілеофemorальний тромбоз
- ☐ c. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен
- ☐ d. Облітеруючий ендартеріїт
- ☐ e. Попереково-крижовий радикуліт


Коментар

Правильна відповідь: Ілеофemorальний тромбоз

Питання 118

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення після дорожньо-транспортної пригоди надходять 12 потерпілих пасажирів автобусу з травмами різного ступеня тяжкості. Розпочинаючи реанімаційні заходи, лікар повинен звернути увагу на:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Наявність вільних ліжок в профільних відділеннях
- ☐ b. Дані лабораторних обстежень

- ☐ c. Використання засобів особистої безпеки
- ☐ d. Анамнез хвороби
- ☐ e. Наявність супутніх хвороб


Коментар

Правильна відповідь: Використання засобів особистої безпеки

Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 58-ми років раптово відчув задишку, різкий біль в грудній клітці, кровохаркання, запаморочення. В анамнезі тромбофлебіт. Об'єктивно: дифузний ціаноз, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., акцент II тону на легеневій артерії, сухі розсіяні хрипи в нижніх відділах легень. На ЕКГ: високий зубець Р у II та III, глибокий S в I, патологічний Q в III, негативний Т в II та III. На Ro спостерігається клиновидне затемнення в середніх відділах справа. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кардіогенний шок
- ☐ b. Інфаркт легені
- ☐ c. Спонтанний пневмоторакс
- ☐ d. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ e. Q-інфаркт міокарда по задній стінці лівого шлуночка


Коментар

Правильна відповідь: Тромбоемболія легеневої артерії

Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 8-ми років вже другий тиждень хворіє на кашлюк. Вранці дитина самостійно випила увесь флакон сиропу від кашлю, в якому містився кодеїн. Спочатку дівчинка була неспокійною, згодом стала сонливою, мати двічі спостерігала судом. Який антидот необхідно ввести при цьому отруєнні?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Налоксону гідрохлорид


- ☐ b. Цистамін
- ☐ c. Амітриптилін
- ☐ d. Тарен
- ☐ e. Атропін

Коментар

Правильна відповідь: Налоксону гідрохлорид

Питання 121

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий з опіком полум'ям. У відділенні інтенсивної терапії почали наростати явища дихальної недостатності. Яка невідкладна допомога?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення дихальних аналептиків
- ☐ b. Інгаляція зволоженого кисню
- ☐ c. Введення бронхолітиків
- ☐ d. Трахеостома
- ☐ e. Інтубація трахеї та ШВЛ

Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї та ШВЛ

Питання 122

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта на 5-ту добу після операції розвинулася клінічна картина тромбоемболії легеневої артерії, настала раптова коронарна смерть. Який препарат необхідно було призначити для профілактики цього ускладнення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Курантил
- ☐ b. Аспірин
- ☐ c. Реополіглюкін

- ☐ d. Еноксипарин
☐ e. Трентал
- Коментар

Правильна відповідь: Еноксипарин

Питання 123

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На полі бою знаходиться потерпілий з вогнепальним пораненням правого стегна, кінцівка в ділянці середньої третини деформована. З рани під коліном йде яскраво-червона кров. Ви діагностуєте вогнепальний перелом стегна з кровотоком з кінцевої артерії. Що слід першочергово здійснити на етапі домедичної допомоги потерпілому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Накласти джгут на верхню третину стегна
☐ b. Накласти давлячу асептичну пов'язку на рану
☐ c. Накласти джгут на середню третину стегна
☐ d. Накласти джгут на кінцівку вище місця перелому
☐ e. Іммобілізувати кінцівку

Коментар

Правильна відповідь: Накласти джгут на кінцівку вище місця перелому

Питання 124

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка похилого віку раптово знепритомніла на вулиці. Випадково опинившись поряд через одну хвилину, лікар-лаборант констатував зупинку серця. Які дії лікаря повинні бути першочерговими? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Покласти під язик таблетку нітрогліцерину
☐ b. Завдати прекардіального удару
☐ c. Почати непрямий масаж серця
☐ d. Викликати швидку допомогу

☐ е. Забезпечити прохідність дихальних шляхів
Коментар

Правильна відповідь: Почати непрямий масаж серця

Питання 125

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 25-ти років, вагітність 32 тижні. Надійшла в коматозному стані із запахом ацетону з рота. В анамнезі цукровий діабет впродовж 8-ми років. Серцебиття плода - 160/хв., пологової діяльності немає. Артеріальний тиск - 120/70 мм рт.ст., пульс - 72/хв. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Прееклампсія
- ☐ b. Екламптична кома
- ☐ с. Сепсис
- ☐ d. Гіпоглікемічна кома
- ☐ е. Гіперглікемічна кома

Коментар

Правильна відповідь: Гіперглікемічна кома

Питання 126

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої з гострим інфарктом міокарда різка слабкість, запаморочення, ціаноз губ, акроціаноз, дихання самостійне, артеріальний тиск на периферичних судинах не визначається. На ЕКГ: крупнохвильова фібриляція шлуночків. Яких заходів треба вжити насамперед? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ввести повітровід
- ☐ b. Прекардіальний удар
- ☐ с. Закритий масаж серця
- ☐ d. Електрична дефібриляція
- ☐ е. Інтубація трахеї


Коментар

Правильна відповідь: Електрична дефібриляція

Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У сержанта 30-ти років після вибуху авіабомби ліва гомілка була притиснута бетонною стіною до землі. Звільнення від стиснення гомілки відбулося через 3 години, потерпілого доставлено у госпіталь. Шкіра гомілки блідо-ціанотична, холодна на дотик, набрякла. Тони серця приглушені, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс слабкого наповнення, 120/хв. У сечі: міоглобін, протеїнурія та циліндрурія, колір - бурий. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Синдром тривалого стиснення, ранній період
- ☐ б. Синдром тривалого стиснення, проміжний період
- ☐ в. Гострий венозний тромбоз
- ☐ г. Гострий гломерулонефрит
- ☐ д. Гостра печінкова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Синдром тривалого стиснення, ранній період

Питання 128

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При роботі на хімкомбінаті у зв'язку з порушенням герметичності газопроводу виник вихід газу, хімічний склад якого спочатку був невідомий. Враховуючи характер виробництва, це могли бути пари азотної, сірчаної кислот, бензолу, нітробензолу, окисів азоту. Через 3 години після перебування в забрудненому приміщенні у робітника з'явився головний біль, головокружіння, тахікардія, задишка, ціаноз губ і рук. Об'єктивно: шкіра і слизові оболонки сіро-синього забарвлення, печінка збільшена, в крові - ретикулоцитоз 40%. Наявністю якої сполуки в крові зумовлене забарвлення шкіри?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Відновлений гемоглобін
- ☐ б. Метгемоглобін


- ☐ с. Оксигемоглобін
- ☐ d. Карбгемоглобін
- ☐ е. Карбоксигемоглобін

Коментар

Правильна відповідь: Метгемоглобін

Питання 129

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини з гострою нирковою недостатністю при біохімічному моніторингу визначено: фібриноген - 4,5 г/л, натрій плазми - 145 мМ/л, креатинін плазми - 380 мкМ/л. В сечі: білок - 0,67 г/л, лей- коцити - 3-5 в п/з, еритроцити - 6-8 в п/з. Який показник з наведених є найбільш інформативним для визначення ступеня гострого ураження нирок?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Формені елементи крові в осаді сечі
- ☐ b. Натрій плазми крові
- ☐ с. Креатинін плазми
- ☐ d. Фібриноген плазми крові
- ☐ е. Протеїнурія

Коментар

Правильна відповідь: Креатинін плазми

Питання 130

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 50-ти років після надмірного вживання алкоголю раптово виник інтенсивний біль в епігастрії. Пульс -100/хв., екстрасистолія. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко ослаблені. Лейкоцити - 13, 8 109/л. На ЕКГ: сегмент ST у відведеннях II, III, aVF вище ізолінії на 3 мм. Яка тактика лікаря на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення анальгетиків, виклик дільничного лікаря
- ☐ b. Введення реосорбілакту, анальгетиків

- ## Коментар

[Завершити перегляд](#)

Перехід по тесту

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

Відзнаки

Компетентності

[Журнал оцінок](#)

[Загальне](#)

[Секція 1](#)

[Секція 2](#)

[Секція 3](#)

[Секція 4](#)

[Контрольні тестування](#)

[Секція 6](#)

[Секція 7](#)

[Секція 8](#)

[Секція 9](#)

[Секція 10](#)

[Секція 11](#)

[Секція 12](#)

[Секція 13](#)

[Секція 14](#)

[Секція 15](#)

[Особистий кабінет](#)

[Домашня сторінка](#)

[Календар](#)

[Особисті файли](#)

[Мої курси](#)

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручник Оксана Богданівна \(Вийти\)](#)
КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- ☐ [Українська \(uk\)](#)
 - - ☐ [English \(en\)](#)
 - ☐ [Русский \(ru\)](#)
 - ☐ [Українська \(uk\)](#)