

[Перейти до головного вмісту](#)
[Бокова панель](#)
[КРОК-123](#)

(Інтерн БДМУ) Підручняк Оксана Богданівна

П

Особистий кабінетПрофіль користувачаОцінкиПовідомленняУподобанняВийтиПовідомлення
[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане
Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане
Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)


[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Контрольні тестування](#)
- [ДТТ 08.02.2023](#)

Розпочато	Wednesday 8 February 2023 14:00 PM
Стан	Завершено
Завершено	Wednesday 8 February 2023 15:03 PM
Витрачено часу	1 година 3 хв
Балів	127,00/150,00
Оцінка	84,67 з 100,00 можливих
Питання 1	

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У палаті інтенсивної терапії перебуває новонароджена дитина з респіраторним дистрес-синдромом I типу, III ступеня та інтранатальною асфіксією важкого ступеня. Дитина народилася на 30 тижні вагітності. Вона отримує штучну вентиляцію легень у примусовому режимі. Об'єктивно виявляється: порушення гемодинаміки, середній артеріальний тиск — 20 мм рт. ст. Який лікарський засіб треба насамперед увести дитині?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 25%-й розчин $MgSO_4$ 1 мл/кг
- ☐ б. 10% - й розчин глюкози 2 мл/кг
- ☐ в. Фенобарбітал 20 мг/кг
- ☒ г. Допамін 10 мкг/кг/хв
- ☐ д. 5% - й розчин глюкози 4 мл/кг

Питання 2

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка, який багато років хворіє на епілепсію, госпіталізовано до приймального відділення. Пацієнт скаржиться на судомні напади, що значно почастишали. Раптово пацієнт збліднів, утратив свідомість, розвинувся судомний напад із мимовільним сечовипусканням. Напади повторювалися з інтервалом у 5-10 хвилин, між ними пацієнт перебував у коматозному стані. Якою має бути тактика лікаря приймального відділення?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Викликати бригаду спеціалізованої (психіатричної) медичної допомоги
- ☒ б. Забезпечити пацієнту прохідність дихальних шляхів
- ☐ в. Проконсультувати пацієнта у невропатолога
- ☐ г. Госпіталізувати пацієнта до реанімаційного відділення
- ☐ д. Проконсультувати пацієнта у психіатра

Питання 3

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

У жінки віком 32 роки з терміном вагітності 36 тижнів виникло блювання, що не зупиняється ніякими методами, погіршився зір та з'явилися сильні головні болі. Під час комп'ютерної томографії виявлено об'ємне утворення у головному мозку. Який імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ б. Набряк мозку
- ☐ в. Прееклампсія
- ☒ г. Пухлина мозку
- ☐ д. Арахноїдит

Питання 4

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

Пацієнт знаходиться у стані травматичного шоку, що обумовлений ураженням вогнепальною зброєю» Які заходи треба провести на етапі долікарської допомоги? Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Тимчасову зупинку кровотечі, знеболення, зігрівання, іммобілізацію
- ☐ б. Транспортну іммобілізацію, знеболення
- ☐ в. Новокаїнові блокади, зігрівання
- ☐ г. Тимчасову зупинку кровотечі, новокаїнову блокаду
- ☐ д. Уведення протиправцевої сироватки, іммобілізацію

Питання 5

Неправильно
Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопця віком 17 років після нервово-психічної травми раптово з'явилися скарги на головний біль, запаморочення, нудоту, блювання, погіршення зору, біль у серці та відчуття серцебиття. Об'єктивно виявлено: ЧСС — 120/хв, озноб, м'язове тремтіння, пітливість, гіперемія шкіри, пацієнт збуджений. На ЕКГ спостерігаються ознаки гіпертрофії та систолічного перевантаження лівого шлуночка. З анамнезу відомо, що батько пацієнта хворіє на гіпертонічну хворобу. Яку терапію треба призначити для усунення нападу?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Сублінгвально фенігідин
- ☐ б. Ентерально клонідин
- ☐ в. Сублінгвально каптоприл
- ☒ г. Сублінгвально пропранолол
- ☐ д. Парентерально фуросемід

Питання 6

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопець віком 19 років стрибнув із паркану на кам'яну бруківку та вдарився правим коліном. Об'єктивно спостерігається: сильний біль та набряк у ділянці колінного суглоба, підшкірна гематома. Пальпаторно виявляються уламки надколінника. Який засіб транспортної іммобілізації треба застосувати для цього пацієнта?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпсову лонгетку
- ☐ б. Пневматичну шину
- ☐ в. Колосоподібну пов'язку
- ☐ г. Дві дошки
- ☒ д. Шину Крамера

Питання 7

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Під час відпочинку на природі жінку в руку вкусила бджола. Об'єктивно спостерігається: плече припухле, у місці укусу є жало, гемодинаміка стабільна. Яка схема надання першої допомоги є оптимальною?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Увести адреналін, накласти джгут на кінцівку
- ☐ b. Увести хл орід кальцію, глюкокортикоїди та антигістамінні препарати
- ☐ c. Прикласти сорбент до рани, накласти джгут на кінцівку, увести протизміїну сироватку
- ☐ d. Накласти джгут, увести глюкокортикоїди
- ☒ e. Видалити жало, прикласти холодний компрес або лід, увести антигістамінні препарати

Питання 8

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У чоловіка віком 40 років упродовж 3-х діб температура тіла піднімається до 39°C, сильний головний біль, міалгії, нудота. Об'єктивно спостерігається: шкіра обличчя та верхньої половини тулуба багрового кольору, «кролячі очі», одутлість язика та губ, збільшення та болючість печінки, носова кровотеча. Пацієнт 5 днів тому приїхав із африканської країни. Йому діагностовано жовту лихоманку. Які запобіжні заходи треба провести для тих, хто контактував із пацієнтом?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Уведення гамма-глобуліну
- ☐ b. Призначити метісазон
- ☒ c. Вакцинацію
- ☐ d. Провести антибіотикотерапію
- ☐ e. Призначити інтерферони

Питання 9

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До реанімаційного відділення госпіталізовано чоловіка віком 54 років, без свідомості, із проявами клонічних судом. Під час огляду пацієнта виявлено: екскурсія грудної клітки та пульсація на магістральних судинах відсутні, зіниці помірно розширені, на світло не реагують. На кардіомоніторі електрична активність серця збережена. Який із нижченаведених заходів буде малоефективним у цьому разі?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Штучна вентиляція легень
- ☒ b. Електрична дефібриляція
- ☐ c. Внутрішньовенне струменеве введення адреналіну

- ☐ d. Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- ☐ e. Непрямий масаж серця

Питання 10

Неправильно
Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Велосипедист постраждав у ДТП. Об'єктивно спостерігається: ліве стегно деформоване в нижній третині та на задній поверхні стегна рана, з якої фонтанує кров. Який спосіб зупинки кровотечі треба застосувати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Артеріальний джгут у середній третині стегна
- ☒ b. Артеріальний джгут у верхній третині стегна
- ☐ c. Тампонаду рани
- ☐ d. Венозний джгут безпосередньо над раною стегна
- ☐ e. Венозний джгут на верхню третину гомілки

Питання 11

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У чоловіка віком 43 роки на тлі загальної різкої слабкості з'явилися фібрилярні посмикування м'язів кінцівок із подальшим переходом у генералізовані тонічні судоми. З анамнезу відомо, що три місяці тому переніс субтотальну структурію. Під час огляду спостерігається: свідомість збережена, дихання адекватне, АТ — 140/80 мм рт.ст. Симптом Труссо позитивний. Визначте тактику лікаря у цьому разі.

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Увести діазепам 10 мг внутрішньом'язово
- ☐ b. Забезпечити адекватну оксигенацію
- ☒ c. Уводити кальцію хлорид 10% внутрішньовенно до припинення тетанії
- ☐ d. Увести фуросемід 40 мг внутрішньовенно
- ☐ e. Увести калію хлорид 50 мл внутрішньовенно

Питання 12

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

Пацієнта віком 56 років госпіталізовано до лікарні. Скаржиться на сухий кашель, холодний піт, задишку, що посилюється в положенні лежачи. Об'єктивно спостерігається: частота дихання — 30/хв, артеріальний тиск — 180/100 мм рт. ст., Аускультативно виявляються: глухі серцеві тони, акцент II тону над легеневою артерією, ритм галопу, над легенями вислуховується жорстке дихання, в нижніх відділах сухі та вологі дрібнопухирцеві хрипи. Який попередній діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Астматичний статус
- ☐ б. Гіпертензивний криз неускладнений
- ☐ в. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☒ г. набряк легень
- ☐ д. Ішемічна кардіоміопатія

Питання 13

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 27 років потрапив у ДТП. У нижній третині лівої гомілки виявляється деформація, патологічна рухливість кісткових сегментів, рана 5х3 см з якої непульсуючим струменем витікає темна кров. Який оптимальний метод зупинки кровотечі у пацієнта? Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Стискальна асептична пов'язка
- ☐ б. Асептична пов'язка
- ☐ в. Накладення джгута вище рани
- ☐ г. Пальцеве перетискання в пахвинній ділянці
- ☐ д. Накладення джгута нижче рани

Питання 14

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт, госпіталізований за 4 години після ядерного вибуху, скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, нудоту та багаторазове блювання. Ці симптоми з'явилися за 40 хв після опромінення. Під час огляду встановлено: свідомість ясна, збуджений, обличчя помірно гіперемоване, продовжується блювота, пульс — 92/хв, задовільного наповнення, тони серця ясні, АТ — 105/60 мм рт. ст., дихання везикулярне. Температура тіла — 37,0°C. Показники індивідуального дозиметру 4,8 Гр. Який попередній діагноз?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Гостра променева хвороба, кістково-мозкова форма, III ступінь тяжкості
- ☐ б. Гостра променева хвороба, кишкова форма, III ступінь тяжкості
- ☐ в. Гостра променева реакція, II ступінь тяжкості
- ☐ г. Гостра променева хвороба, кістково-мозкова форма, II ступінь тяжкості
- ☐ е. Гостра променева реакція, I ступінь тяжкості

Питання 15

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення госпіталізована чотирирічна дитина із температурою тіла 38,8°C та проявами ГРВІ. Який лікарський засіб треба застосувати насамперед для зменшення гіпертермії у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Димедрол
- ☐ б. Діазспам
- ☐ в. Німесулід
- ☒ г. Парацетамол
- ☐ е. Мефенамінову кислоту

Питання 16

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка віком 48 років госпіталізована до відділення реанімації інфекційної лікарні. Об'єктивно спостерігається: ригідність м'язів глотки та гортані, зростаюче напруження скелетної мускулатури, свідомість не порушена, поодинокі судоми мимічної мускулатури за типом сардонічної гримаси, наростають явища артеріальної гіпертензії та гіпоксемії, гіпертермічний синдром (40,5°C). Які невідкладні заходи треба провести пацієнтці насамперед?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Допоміжну вентиляцію, корекцію метаболічних та гемодинамічних порушень
- ☒ б. Перевести на ШВЛ з уведенням міорелаксантів, корекцію енергозатрат, метаболічних та гемодинамічних порушень, застосування протиправцевої сироватки
- ☐ в. Корекцію енергозатрат, метаболічних та гемодинамічних порушень, застосування протиправцевої сироватки
- ☐ г. Допоміжну вентиляцію, інфузійно-детоксикаційну терапію, сироваткову терапію
- ☐ д. Застосування протиправцевої сироватки, проведення інфузійно-детоксикаційної терапії

Питання 17

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Медичне сортування проводиться під час надзвичайних ситуацій, що пов'язані з великою кількістю поранених. На скільки сортувальних категорій розподіляються потерпілі та за якими критеріями? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Дві сортувальні групи за потребою в евакуаційних заходах
- ☐ б. Три сортувальні групи за станом здоров'я
- ☐ в. Дві сортувальні групи за станом здоров'я та потребою в однорідних лікувальних та евакуаційних заходах
- ☐ г. На догоспітальному етапі медичне сортування не проводиться
- ☒ д. Чотири сортувальні групи за станом здоров'я та потребою в однорідних лікувальних та евакуаційних заходах

Питання 18

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

Новонародженій дитині з тяжкою асфіксією під час народження проводиться реанімація в пологовому залі. Після 40 секунд проведення непрямого масажу серця і штучної вентиляції легень 100% киснем у дитини встановлено ЧСС — 50/хв. Яка подальша лікувальна тактика? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Продовжувати непрямий масаж серця
- ☐ б. Внутрішньовенно ввести атропін
- ☐ в. Продовжувати штучну вентиляцію легень
- ☒ г. Внутрішньовенно ввести адреналін, продовжувати непрямий масаж серця
- ☐ д. Внутрішньовенно ввести розчин налоксону

Питання 19

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

У роділлі віком 25 років другі термінові пологи. Перейми по 20-25 сек. за 5-6 хвилин. Положення плода поздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз, розкриття шийки матки 7-8 см. Який період пологів відбувається? Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Перший
- ☐ б. Другий
- ☐ в. Післяродовий
- ☐ г. Третій
- ☐ д. Прелімінальний

Питання 20

Правильно

Балів 1,00 з 1,00

Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка віком 32 роки, який госпіталізований до лікарні з діагнозом: лептоспіроз, розвинувся септичний шок. Об'єктивно спостерігається: ціаноз шкіри і слизових, центральний венозний тиск — 20 мм вод. ст., артеріальний тиск — 80/40 мм рт. ст. Які лікарські засоби з наведених нижче треба додати до інтенсивної терапії?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Анальгетики
- ☐ b. Гепарин
- ☒ c. Симпатоміметики
- ☐ d. Діуретики
- ☐ e. Вазодилататори

Питання 21

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До яких захворювань призводить не діагностована чи несвоєчасно пролікована гіпоглікемія у новонароджених і дітей раннього віку?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Розладів функціонування підшлункової залози
- ☒ b. Розладів функціонування ЦНС
- ☐ c. Розладів функціонування міокарду
- ☐ d. Розладів функціонування печінки
- ☐ e. Розладів функціонування нирок

Питання 22

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпіла віком 28 років упала на вулиці з опорою на руку. Під час огляду виявляється деформація на рівні середньої третини передпліччя, біль у разі навантаження, патологічна рухливість. Розладів магістрального кровообігу не виявлено, але пацієнтка скаржиться на парестезію у ділянці кисті. Яке положення передпліччя для транспортної іммобілізації потерпілої є оптимальним?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Максимальна супінація
- ☐ b. Супінація 45 градусів від максимальної

- ☐ с. Пронація 45 градусів від максимальної
- ☒ d. Середнє між пронацією та супінацією
- ☐ е. Максимальна пронація

Питання 23

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловік віком 68 років госпіталізований за 2 години після появи раптового стискаючого болю за грудиною. Об'єktiv спостерігається: шкірні покриви бліді, акроціаноз, пульс ниткоподібний, 130/хв, АТ — 70/50 мм рт. ст., діяльність серця ритмічна, тони приглушені, частота дихання - 30/хв, у нижніх відділах легень прослуховуються вологі хрипи. На ЕКГ у відведеннях V1-V4 комплекс QRS типу QS, сегмент ST вище ізолінії, негативний зубець Т. Які лікарські засоби необхідно призначити пацієнту насамперед?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Реополіглюкін
- ☐ b. Інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту
- ☒ с. Тромболітики
- ☐ d. Серцеві глікозиди
- ☐ е. Діуретики

Питання 24

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка віком 24 роки госпіталізована до лікарні. Скаржиться на біль унизу живота з іррадіацією в задній прохід, слабкість та запаморочення. Остання менструація була 2 місяці тому. Об'єktivно встановлено: шкіра бліда, АТ — 60/40 мм рт. ст., пульс 110/хв, температура тіла — 36,6°C. Живіт напружений, різко болючий, більше з лівого боку, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Який попередній діагноз?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий апендицит
- ☒ b. Позаматкова вагітність
- ☐ с. Апоплексія яєчника
- ☐ d. Гострий сальпінгоофорит

- ☐ е. Кишкова непрохідність

Питання 25

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

У чоловіка, який хворіє хронічною наднирковою недостатністю, після апендектомії різко погіршився стан: спостерігається прогресуюче зниження АТ, глухість тонів серця, тахікардія, пульс слабого наповнення, акроціаноз, «мармуровість» шкіри. Яке ускладнення виникло у пацієнта? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Серцева недостатність
- ☐ б. Гіповолемічний шок
- ☐ в. Перитоніт
- ☐ г. Кишкова непрохідність
- ☒ е. Гостра надниркова недостатність

Питання 26

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У трирічного хлопчика, який грався без нагляду дорослих, почався сильний напад кашлю, з'явилася задишка. На рентгенограмі виявляється гомогенне затемнення середньої частки правої легені з підтягнутим догори контуром, тінь середостіння помірно зміщена в правий бік, стороннє тіло не виявлено. Який попередній діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. набряк легень
- ☐ б. осумкований плеврит
- ☒ в. ателектаз частки легені
- ☐ г. гіпоплазія правої легені
- ☐ е. плевропневмонія

Питання 27

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловік віком 25 років госпіталізований до інфекційного відділення зі скаргами на загальну слабкість, блювання, інтенсивний стискаючий головний біль у тім'яно потиличній частці, світлобоязнь, гарячку до 39°C. Об'єктивно спостерігається: ригідність потиличних м'язів, симптом Керніга. Яке дослідження буде найінформативнішим для встановлення діагнозу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ренгенограма пазух носа
- ☐ б. Загальний аналіз крові
- ☐ в. Ренгенограма органів грудної клітки
- ☐ г. ЕКГ
- ☒ д. Люмбальна пункція

Питання 28

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини віком 10 років після дорожньо-транспортної пригоди спостерігається тривала кровотеча, відкритий перелом плеча, тупа травма живота, перелом стегна. Частота серцевих скорочень — 120/хв, артеріальний тиск — 60/40 мм рт. ст. У результаті дослідження крові виявлено: НЬ — 96 г/л, еритроцити — $3,8 \cdot 10^{12}/л$, Ш — 0,37. З яких кровозамінників треба розпочати інфузійну терапію? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Цільна кров
- ☐ б. Еритроцитарна маса
- ☒ в. Кристалоїди
- ☐ г. Альбумін
- ☐ д. Свіжозаморожена плазма

Питання 29

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка віком 46 років, у якого в анамнезі є виразкова хвороба шлунку, за годину після приймання їжі з'явився біль в епігастрії, а через декілька годин на фоні загальної слабкості виникла одноразова блювота типу «кавової гущі». Пацієнт викликав екстрену (швидку) медичну допомогу. Об'єктивно спостерігається: пацієнт у свідомості, гемодинаміка стабільна. Якими будуть подальші дії лікаря екстреної (швидкої) медичної допомоги?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Призначити консультацію гастроентеролога
- ☒ б. Транспортувати пацієнта до хірургічного відділення
- ☐ в. Рекомендувати планове амбулаторне обстеження
- ☐ г. Призначити знеболюючі та протиблювотні засоби
- ☐ ґ. Призначити дезінтоксикаційну терапію

Питання 30

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У п'ятирічної дівчинки, яка хворіє на цукровий діабет I типу протягом 2-х років і отримує інсулін, раптово виникло занепокоєння, відчуття голоду, тремор у кінцівках, блідість. Дитина втратила свідомість. Рівень глюкози у крові — 2,2 ммоль/л. Який препарат насамперед треба призначити дитині?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Адреналін
- ☐ б. Ноотропіл
- ☒ в. Глюкагон
- ☐ г. Преднізолон
- ☐ ґ. Глюкозу

Питання 31

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка у терміні вагітності 39 тижнів перестала відчувати рухи плода, з'явилися болі в животі та значно підвищився АТ. З анамнезу відомо що пацієнтка хворіє на гіпертонічну хворобу. Пологова діяльність бурхлива. Передбачувана маса плода — 4000,0 г. Під час акушерського обстеження спостерігається: матка в гіпертонусі, у ділянці дна пальпується болюче вип'ячування, голівка плода в порожнині малого тазу. Серцебиття плода не вислуховується, на УЗД не виявляється. Визначте тактику ведення пологів.


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Накладання акушерських щипців
- ☐ б. Кесарів розтин
- ☒ в. Плродоруйнівна операція я
- ☐ г. Пологопідсиленн
- ☐ д. Вакуум-екстракція плода

Питання 32

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка віком 47 років за 10 хв після трансфузії еритроцитарної маси скаржиться на загальну слабкість та головний біль. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 37,4°C, пульс — 82/хв, АТ — 110/80 мм рт. ст. Порушень сечовиділення немає. Яку невідкладну допомогу треба надати пацієнтці?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Уведення вітаміну К
- ☐ б. Трансфузію замороженої плазми
- ☐ в. Уведення глюкокортикоїдів
- ☒ г. Лікування не потребує, спостереження за станом здоров'я пацієнтки
- ☐ д. Уведення промедолу

Питання 33

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дворічного хлопчика, який хворіє на тетраду Фалло, раптово збільшилася інтенсивність ціанозу, з'явилася задишка, він присів навпочіпки. Що з наведеного нижче має призначити лікар у цьому разі?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Серцеві глікозиди
- ☐ b. Бронхолітики
- ☒ c. Оксигенотерапію
- ☐ d. Сечогінні
- ☐ e. Антибіотики

Питання 34

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення лікарні після ДТП госпіталізовано постраждалого віком 72 роки з тяжкою політравмою. Об'єктивно спостерігається: стан чоловіка вкрай тяжкий, спонтанне дихання агональне, гемодинаміка нестабільна. Під час перекладання постраждалого з нош виникла зупинка кровообігу. Реанімаційні заходи, які треба розпочати мають включати штучну вентиляцію легенів та непрямую компресію міокарда у співвідношенні:


Виберіть одну відповідь:

- ☒ a. 2:30
- ☐ b. 2:15
- ☐ c. 1:5
- ☐ d. 1:1
- ☐ e. 1:2

Питання 35

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка віком 78 років госпіталізовано до приймального відділення. Пацієнт скаржиться на переймоподібний біль та сильне здуття живота, невідходження газів, відсутність випорожнень упродовж 4-х діб. З анамнезу відомо: у чоловіка часті закрепи, що чергуються з проносами, за останні 6 місяців спостерігається втрата ваги. Об'єктивно встановлено: пульс — 92/хв, АТ — 140/80 мм рт. ст. Живіт здутий, пальпаційно болючий, аускультативно вислуховується «шум плескоту» в епігастрп. За даними рентгенографії ШКТ — множинні чаші Клойбера. Під час спроби поставити пацієнту сифонну клізму рідина, після введення її в кількості 500 мл, виливається назад. Для якого захворювання характерні такі клінічні показники?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Заворот сигмоподібної кишки
- ☐ б. Гострий дивертикуліт сигмоподібної кишки
- ☐ в. Гострий парапроктит
- ☐ г. Неспецифічний виразковий коліт
- ☒ д. Обтураційна пухлина лівої половини ободової кишки, гостра непрохідність кишок

Питання 36

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 38 років під час огля скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, блювання темно-коричневими масами, випорожнення чорного кольору. Раніше періодично турбував біль в епігастрії. Об'єктивно встановлено: шкіра та видимі слизові оболонки блілого кольору, вологі. Пульс — 98/хв., слабкого наповнення. АТ — 90/60 мм рт. ст. Гемоглобін — 108 г/л, еритроцити — 2,9 Т/л. Реакція на приховану кров у калі позитивна. Встановіть попередній діагноз.


Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Виразкова хвороба шлунку або ДПК
- ☐ б. Неспецифічний виразковий коліт
- ☐ в. Черевний тиф
- ☐ г. Рак шлунку
- ☐ д. Хвороба Крона

Питання 37

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка віком 56 років раптово виник дзвін у вухах, що супроводжувався нудотою, блюванням, «миготінням мушок» і потемнінням в очах. Об'єктивно спотерігається: АТ — 210/100 мм рт. ст., пульс — 62/хв. Встановлено діагноз: неускладнена гіпертензивна криза. Який- лікарський засіб треба використати у цьому разі?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Резерпін
- ☐ b. Верапаміл
- ☐ c. Еналаприлат
- ☒ d. Метопролол
- ☐ e. Аміодарон

Питання 38

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка з політравмою та гострою крововтратою за 5 хвилин після початку гемотрансфузії з'явилися біль за грудиною і в попереку та миготіння мушок перед очима. Сеча набула кольору «м'ясних помиїв». Плазма крові після центрифугування червона. Яке ускладнення найімовірніше виникло у пацієнта?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☒ b. Гострий гемоліз
- ☐ c. Жирова емболія
- ☐ d. Синдром масивної трансфузії
- ☐ e. Алергічна реакція

Питання 39

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитячому садочку спалах шигельозу. Які заходи профілактики треба застосувати для припинення розповсюдження інфекції?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Використати антибіотики
- ☒ b. Поточну та заключну дезінфекцію

- ☐ c. Використати імуномодулятори
- ☐ d. Використати живі вакцини
- ☐ e. Використати рекомбінантні вакцини

Питання 40

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

Пацієнтка з діагнозом: тотальна тиреоїдектомія, скаржиться на загальну слабкість, сонливість, здуття живота, відсутність сечі протягом доби, набряки ніг. Під час обстеження спостерігається: обличчя одутле, «тверді» набряки на ногах, сухожильні рефлекси сповільнені, температура тіла — 33,1°C, АТ — 90/60 мм рт. ст., пульс — 62/хв, глікемія — 3,1 ммоль/л. Який попередній діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☒ a. Мікседематозна прекома
- ☐ b. Загальне переохолодження
- ☐ c. Гіпоксично-циркуляторний синдром
- ☐ d. Гостра ниркова недостатність
- ☐ e. Гіпоглікемія

Питання 41

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

У пацієнта після введення 100 мл реополіглюкіна з'явилися головний біль, шум у вухах, відчуття жару, пухирцевий висип, спастичний кашель, прискорене дихання, нудота, тахікардія. Артеріальний тиск знизився до 70/40 мм рт. ст. Які заходи терапії треба використати? Виберіть одну відповідь:

- ☒ a. Адреналін в/м, оксигенотерапію
- ☐ b. Оксигенотерапію, преднізолон в/м
- ☐ c. Преднізолон, супрастин в/в
- ☐ d. Супрастин в/в, оксигенотерапію
- ☐ e. Реополіглюкін, адреналін в/в

Питання 42

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У однорічної дитини з'явилися нежить, сухий кашель, підвищення температури тіла до 39°C. За 30 хв після госпіталізації з'явилися тоніко-клонічні судоми тривалістю 2 хв із подальшою втратою свідомості. Яка найімовірніша причина судом?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Спазмофілія
- ☐ b. Епілепсія
- ☒ c. Лихоманка
- ☐ d. набряк мозку
- ☐ e. Менінгоенцефаліт

Питання 43

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Військовослужбовець отримав поранення та лежить на спині, свідомість збережена, у ділянці н/3 правого стегна — різана рана та сильна кровотеча. Яку домедичну допомогу треба надати потерпілому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Провести знеболювання
- ☒ b. Накласти джгут, транспортувати до зони укриття
- ☐ c. Обстежити пораненого
- ☐ d. Виконати імобілізацію
- ☐ e. Накласти давлячу пов'язку

Питання 44

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У військовослужбовця, який отримав поранення осколком у середню третину правого стегна, об'єктивно спостерігається: загальний стан середньої тяжкості, пульс — 100/хв, ритмічний, АТ — 100/70 мм рт. ст. Стегно іммобілізоване підручними засобами та накладено джгут. У середній третині стегна є рана 2х3 см, стопа холодна, чутливість знижена. Після зняття джгута артеріальної кровотечі немає. Яку першу лікарську допомогу треба надати пацієнту?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Уведення знеболюючих препаратів, тампонада рани, введення антибіотиків
- ☐ б. Повторне накладання джгута, введення антибіотиків
- ☐ в. Уведення антибіотиків та знеболюючих препаратів
- ☐ г. Максимальне згинання кінцівки, введення знеболюючих препаратів
- ☐ д. Накладання затискача, введення антибіотиків

Питання 45

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 43 роки працює водієм вантажного автотранспорту. Під час переливання бензину через шланг із однієї ємності в іншу, заковтнув невелику кількість рідини. За 3 дні після цього звернувся до лікаря зі скаргами на головний біль за типом мігрені, запаморочення, поганий сон, дратівливість, відчуття повзання мурах по тілу, наявність відчуття «клубка волосся» в роті, кошмарні сновидіння. Який попередній діагноз?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інтоксикація ртутьорганічними сполуками
- ☒ б. Інтоксикація тетраетилсвинцем
- ☐ в. Інтоксикація фосфорорганічними сполуками
- ☐ г. Інтоксикація етиленгліколем
- ☐ д. Інтоксикація бензолом

Питання 46

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Який лікарський засіб треба використати для надання невідкладної допомоги шестирічному хлопчику із гострою крововтратою до 20% ОЦК?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Цільну кров
- ☐ б. Свіжозаморожену плазму
- ☐ в. Неогемодез
- ☒ г. 0,9% натрію хлориду
- ☐ д. Розчин глюкози

Питання 47

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 37 років, має виразкову хворобу шлунку, скаржиться на болі в епігастральній ділянці живота, що виникають натще та зменшуються після їжі, слабкість, рідке випорожнення чорного кольору. Протягом 10 днів приймав диклофенак із приводу болю в спині. Об'єктивно спостерігається: стан задовільний. АТ — 120/80 мм рт. ст., ЧСС — 86/хв, наявний наліт на язиці. Біль під час пальпації в епігастрії. Ректально спостерігається чорний кал на рукавичці. Яке ускладнення виникло у пацієнта?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Кровотеча з виразки шлунку
- ☐ б. Кровотеча у просвіт кишківника
- ☐ в. Пенетрація виразки шлунку
- ☐ г. Гемороїдальна кровотеча
- ☐ д. Перфорація виразки шлунку

Питання 48

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка, який перебуває на стаціонарному лікуванні з приводу гострого інфаркту міокарда і отримує гепарин у дозі 5000 Од підшкірно 4 рази на добу, з'явилися різка слабкість, блідість, випорожнення чорного кольору. Гемоглобін — 96 г/л. Що треба застосувати для нейтралізації дії ге-парину?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Апротинін
- ☐ б. Свіжозаморожену плазму
- ☒ в. Протаміну сульфат
- ☐ г. Кальцію хлорид
- ☐ д. Амінокапронову кислоту

Питання 49

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 40 років протягом 10-ти років працює слюсарем ливарного цеху. У день захворювання виконував електрозварювальні роботи в закритому приміщенні. Звернувся до лікаря зі скаргами на провали в пам'яті, різку адинамію, порушення координації рухів, тремтіння. Об'єктивно спостерігається: обличчя гіперемоване, шкіра суха, пульс — 100/хв. АТ — 100/60 мм рт. ст, частота дихання — 24/хв, поверхнєве, тони серця приглушені. Сухожильні, периостальні та черевні рефлексі знижені. Який найінформативніший метод дослідження треба використати для встановлення діагнозу?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Аналіз крові на карбоксигемоглобін
- ☐ б. Аналіз крові на метгемоглобін
- ☐ в. Аналіз сечі на свинець
- ☐ г. Аналіз сечі на параамінофенол
- ☐ д. Аналіз крові на сульфгемоглобін

Питання 50

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 70 років госпіталізований до судинного відділення з приводу лівобічного ілеофemorального тромбозу на 7-му добу після початку захворювання. Під час дуплексного дослідження виявлено венозний тромбоз стегнової вени без явищ флотації верхівки, розташований пристінково. Який вид лікування треба застосувати пацієнту?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тромбектомію
- ☐ b. Установлення кава-фільтра
- ☒ c. Консервативне лікування
- ☐ d. Еластичну компресію, антикоагулянтну та гемореологічну терапію
- ☐ e. Плікацію нижньої порожнистої вени

Питання 51

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчика віком 14 років госпіталізовано до лікарні без свідомості. Хворіє на цукровий діабет протягом 6-ти років. Напередодні переніс харчове отруєння, що супроводжувалося блювотою. Об'єктивно встановлено: шкіра суха, гаряча на дотик, тургор тканин знижений, дихання — 30/хв, поверхневе. Пульс — 110/хв. АТ — 140/80 мм рт. ст. Виявляється двобічний ністагм, м'язева гіпертонія, судоми, позитивний симптом Бабінського. Цукор крові — 40 ммоль/л. Цукор сечі — 3,5%. Ацетон сечі відсутній. Який тип коми розвинувся у дитини?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ a. Діабетична гіперосмолярна
- ☐ b. Печінкова
- ☐ c. Лактоацидотична
- ☐ d. Гіпоглікемічна
- ☐ e. Діабетична кетоацидотична

Питання 52

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовця знайшли притиснутого уламками через 2 години після вибуху міни. Його ліва рука щільно здавлена дошкою. Що найперше треба зробити санінструктору?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ a. Накласти джгут вище місця здавлення

- ☐ b. Напоїти постраждалого лужно-сольовим розчином
- ☐ c. Увести знеболюючі препарати
- ☐ d. Увести внутрішньовенно кристалоїдні розчини
- ☐ e. Увести розчин димедролу

Питання 53

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

Чоловіка віком 43 роки госпіталізовано до хірургічного відділення зі скаргами на загальну слабкість, апатію, сонливість, втрату апетиту, жовтяницю шкіри і склер, зуд, печінковий запах із рота. У пацієнта спостерігається виражений судинний малюнок черевної стінки. Печінка збільшена на 4 см, твердої консистенції. Попередній діагноз: гостра печінкова недостатність. Яке медичне дослідження треба провести пацієнту найперше? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Провести комп'ютерну томографію печінки
- ☐ b. Використати відеолапароскопічний метод
- ☐ c. Провести УЗД печінки
- ☐ d. Провести ретроградну холангіопанкреатографію
- ☒ e. Взначити вміст білірубіну та рівень трансаміназ

Питання 54

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки віком 25 років за 40 хвилин пі прийому оксациліну з'явилися захриплість голосу, «гавкаючий» кашель, утру дихання із задишкою інспіраторного характеру, задуха. Об'єктивно встановлено: пацієнтка неспокійна, метушлива. Дихання шумне, стридорозне. Обличчя ціанотичне. Аускультативно вислуховуються поодинокі розсіяні сухі свистячі хрипи. Який найімовірніший діагноз?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий фарингіт
- ☐ b. Паратонзиллярний абсцес
- ☐ c. Стороннє тіло в трахеї
- ☐ d. Напад бронхіальної астми

- ☒ е. Гострий набряк Квінке

Питання 55

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Після проведеного інфільтраційного знеболення 1%-м розчином лідокаїну у пацієнта різко погіршився загальний стан, з'явилися слабкість, блідість, озноб. Об'єктивно спостерігається: свідомість збережена, пульс слабкий, АТ знижений, дихання часте та поверхневе, виступив холодний піт. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Набряк Квінке
☒ б. Колапс
☐ с. Кома
☐ d. Гостра дихальна недостатність
☐ е. Непритомність

Питання 56

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У жінки віком 37 років після туристичної поїздки до Африки з'явилися різко виражена загальна слабкість, головний біль, нудота. За день після повернення почалися блювання та пронос. Під час огляду встановлено: шкірні покриви бліді, сухі, шкіра легко збирається в складки, риси обличчя загострені, очі запалі, тони серця приглушені, живіт здутий, перистальтика кишечника посилена. Стілець у вигляді рисового відвару, з домішками крові та слизу. Добовий діурез — 200 мл. Які дослідження треба провести насамперед?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. УЗД органів черевної порожнини
☐ б. Бактеріологічне дослідження сечі
☐ с. Рентгенологічне дослідження органів черевної порожнини
☒ d. Бактеріологічне дослідження випорожнень і блювотних мас
☐ е. Ендоскопію шлунково-кишкового тракту

Питання 57

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Жінка віком 76 років госпіталізована до лікарні. Скаржиться на сильні та різкі болі у черевній порожнині, що виникли раптово, здуття живота, затримку відходження газів і калу. З анамнезу відомо, що хворіє на миготливу аритмію. Об'єктивно спостерігається: живіт дещо здутий, м'який та різко болючий під час пальпації. Перистальтика відсутня. Церкуторно виявлено у всіх відділах тимпаніт. Per rectum виявлено: ампула порожня, на рукавиці є залишки калу малинового кольору. За результатами аналізу крові виявлено лейкоцитоз — $28 \cdot 10^9/\text{л}$. Який імовірний діагноз у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий панкреатит
- ☒ б. Мезентеріальний тромбоз
- ☐ в. Інфаркт міокарда, абдомінальна форма
- ☐ г. Обтураційна кишкова непрохідність
- ☐ д. Перфоративна виразка

Питання 58

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


До лікарні госпіталізовано чоловіка у непритомному стані. Об'єктивно спостерігається: самостійне дихання відсутнє, шкіра блідо-ціанотична, тони серця ледь вислуховуються. Який захід надання медичної допомоги є невідкладним у цьому разі?

Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Штучна вентиляція легенів
- ☐ б. Уведення атропіну
- ☐ в. Уведення дихальних анолептиків
- ☐ г. Уведення мезатону
- ☐ д. Електрокардіографія

Питання 59

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

У шестимісячної дитини спостерігається блювання до 10 разів та рідкі випорожнення 12-15 разів. Лікарем-педіатром об'єктивно встановлено: дитина млява, адинамічна, шкірні покриви бліді з «мармуровим» малюнком, симптом «білої плями» упродовж 5 секунд. Тургор тканин знижений, велике джерельце та очні яблука запалі, сліз немає. ЧСС — 180/хв, артеріальний тиск — 60/40 мм рт. ст. Які лікарські заходи треба провести дитині насамперед? Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Інфузію розчину NaCl 0,9% в/в
- ☐ б. Інфузію 10-20% розчину глюкози в/в
- ☐ в. Оральну регідратаційну терапію
- ☐ г. Інфузію реополіглюкіну або неогемодезу в/в
- ☐ д. Антибактеріальну терапію

Питання 60

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

У дитини діагноз: гостра ниркова недостатність. Під час біохімічного моніторингу визначено: фібриноген — 4,5 г/л, натрій плазми — 145 мМ/л, креатинін плазми — 380 мкмоль/л. За результатами лабораторного дослідження сечі виявлено: білок — 0,67 г/л, лейкоцити — 3-5 у полі зору мікроскопу, еритроцити — 6-8 у полі зору мікроскопа. Який показник із наведених нижче є найінформативнішим для визначення ступеня гострого ураження нирок? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Формені елементи крові в осаді сечі
- ☐ б. Протеїнурія
- ☐ в. Фібриноген плазми крові
- ☐ г. Натрій плазми крові
- ☒ д. Креатинін плазми крові

Питання 61

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

Чотиримісячна дитина раптово втратила свідомість. Об'єктивно спостерігається: зіниці розширені, пульс на магістральних артеріях відсутній. Непрямий масаж серця виявився неефективним. Прийнято рішення про проведення електричної дефібриляції. Яка величина розряду дефібрилятора повинна використовуватися у цьому разі ?
Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Перший розряд — 2 Дж/кг, у разі неефективності — 4 Дж/кг
- ☐ б. Перший розряд — 3 Дж/кг, повторні — 2 Дж/кг
- ☐ в. Перший розряд — 4 Дж/кг, повторні — 2 Дж/кг
- ☐ г. Перший розряд — 3 Дж/кг, у разі неефективності повторити двічі
- ☐ д. Перший розряд — 4 Дж/кг, повторні — 8 Дж/кг

Питання 62

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

Хлопчик віком 10 років довго пірнав у домашньому басейні, раптом почав борсатися та ковтати воду. Його госпіталізували до лікарні. Об'єктивно спостерігається: притомний, дещо загальмований, дихання та кровообіг адекватні. Визначте тактику лікаря у цьому разі.
Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Амбулаторне спостереження
- ☐ б. Спостереження у приймальному покої протягом 1 години
- ☒ в. Спостереження в стаціонарі
- ☐ г. Термінова госпіталізація до відділення реанімації
- ☐ д. Спостереження не потребує

Питання 63

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 65 років отримав поранення іржавим цвяхом. Наступного дня побачив, що рана глибока, з ознаками запалення. Останнє профілактичне щеплення від правця було понад 15 років тому. Яка невідкладна допомога показана пацієнту у цьому разі?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Імуноглобулін
- ☒ b. Протиправцевий анатоксин + протиправцева сироватка
- ☐ c. Протиправцева сироватка + протигангренозна сироватка
- ☐ d. Ванкоміцин
- ☐ e. Протиправцевий анатоксин + протигангренозна сироватка

Питання 64

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Народилася доношена дитина в асфіксії середнього ступеня тяжкості з слабким неритмічним диханням, незначною флексією кінцівок, серцевим скороченням менше ніж 100/хв, ціанозом кінцівок, гримасою обличчя на тактильну стимуляцію. Відсмоктування секрету з носа і рота резиною грушею ефекту не дало. Які наступні реанімаційні заходи треба виконати?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Застосувати лікарські засоби
- ☐ b. Провести штучну вентиляцію легень
- ☐ c. Провести непрямий масаж серця
- ☒ d. Інтубувати трахею і провести відсмоктування вмісту з дихальних шляхів через ендотрахеальну трубку
- ☐ e. Застосувати кисневу терапію з використанням маски

Питання 65

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка віком 54 роки знайдено зимою вранці на вулиці. Він скаржиться на пекучий біль, свербіння і «розпирання» пальців ніг. Об'єктивно встановлено: відчувається сильний запах алкоголю, пацієнт агресивний, ступні набряклі, на фоні побілілої шкіри є червоно-фіолетові плями, декілька пухирів, наповнених світлою рідиною. Встановіть діагноз.


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Обмороження III ст.

- ☐ b. Гострий тромбоз підколінної артерії
- ☐ c. Синдром позиційного здавлення ступні
- ☐ d. Обмороження I ст.
- ☒ e. Обмороження II ст.

Питання 66

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловік віком 54 років скаржиться на гострий біль, набряк і почервоніння суглобів великого пальця лівої ноги. Під час огляду виявлено: температура тіла — 37,5°C, палець збільшений в об'ємі, активні і пасивні рухи в ньому різко болючі, в інших суглобах змін немає. За результатами лабораторних досліджень: еритроцити — $4,4 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін — 130 г/л, лейкоцити — $10 \cdot 10^9/л$, в сечі — кристали уратів +++. Для якого захворювання характерні такі клініко-лабораторні показники?

Виберіть одну відповідь:

- ☒ a. Подагра
- ☐ b. Хвороба Бехтерева
- ☐ c. Гострий спондиліт
- ☐ d. Ревматоїдний артрит
- ☐ e. Деформуючий остеоартроз

Питання 67

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка народила на 38 тижні вагітності. Вагітність перебігала на тлі анемії I ступеня, хронічного бронхіту, гострого гаймориту на 32 тижні гестації. Навколоплідні води світлі. Новонароджена дівчинка вагою 3100 г, довжиною — 53 см. На момент народження самостійне дихання відсутнє, м'язевий тонус знижений. Після проведення первинної реанімаційної допомоги за 30 секунд з'явилося самостійне дихання, частота серцевих скорочень — 110/хв, але зберігається ціаноз тулуба та слизових оболонок. Які подальші дії лікаря?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інтубація трахеї
- ☐ b. Відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів

- ☐ с. Штучний масаж серця
- ☒ d. Додаткова оксигенація вільним потоком
- ☐ e. Допоміжна вентиляція легень

Питання 68

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Жінка на 41-му тижні вагітності готується до екстреного оперативного втручання під загальним знеболенням. Під час інтубації трахеї у неї виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів, але виник ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, з'явилися вологі хрипи. Яка причина такого стану у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. набряк легень
- ☒ b. Аспірація кислого шлункового вмісту
- ☐ c. Емболія навколоплідними водами
- ☐ d. Інфаркт міокарду
- ☐ e. Шок

Питання 69

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Доношена дитина, народжена природнім шляхом одразу після народження мала нерегулярне дихання та знижений м'язовий тонус. Після надання початкової реанімаційної допомоги — дитина голосно кричить, дихання — 40/хв, м'язовий тонус задовільний, ЧСС — 140/хв. Яку подальшу тактику треба вибрати лікарю?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Почати ШВЛ мішком та маскою атмосферним повітрям
- ☐ b. Дати 100%-й кисень вільним потоком
- ☐ c. Повторити санацію ВДШ гумовою грушею
- ☒ d. Викласти дитину на живіт матері
- ☐ e. Почати ШВЛ мішком та маскою 100%-м киснем

Питання 70

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Десятимісячна дитина захворіла раптово. Об'єктивно спостерігається: зниження апетиту, млявість, однократне блювання, підвищення температури тіла до 37,5°C, водянисті зі слизом випорожнення. Який спосіб треба обрати для запобігання зневоднення організму дитини?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Призначення діуретиків
- ☐ b. Призначення еубіотиків
- ☐ c. Призначення антикоагулянтів
- ☒ d. Оральну регідратаційну терапію
- ☐ e. Призначення кортикостероїдів

Питання 71

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 35 років упав із висоти 2,5 метри на ліву руку і ногу. Скаржиться на біль у ділянці лівого стегна і лівого плеча. Об'єктивно встановлено: шкіра і видимі слизові дещо бліді. АТ — 110/75 мм рт. ст. пульс — 88/хв. Ліве плече і стегно в середній третині деформовані. У цих сегментах виявляється патологічна рухомість і кісткова крепітація. Діагностовано закриті переломи стегна та плеча. Яку транспортну іммобілізацію треба провести пацієнту у цьому разі?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ a. Шину Дітерікса — на ногу, шину Крамера на руку
- ☐ b. Дві шини Крамера — на ногу, іммобілізацію руки медичною косинкою
- ☐ c. Шину Крамера на стегно, іммобілізацію руки медичною косинкою
- ☐ d. Прибинтувати ногу до здорової, іммобілізацію руки медичною косинкою
- ☐ e. Одну шину Крамера — на ногу, другу — на руку

Питання 72

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

Чоловік віком 53 роки транспортований до приймального відділення з діагнозом: гострий коронарний синдром. Під час реєстрації ЕКГ раптово втратив свідомість, зіниці розширилися. На стрічці спостерігається хвиляста лінія. З чого треба розпочати невідкладну допомогу? Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Дефібриляції
- ☐ б. Уведення кордарону
- ☐ в. Штучного дихання
- ☐ г. Інтубації
- ☐ д. Уведення адреналіну

Питання 73

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

Постраждалий віком 19 років у непритомному стані госпіталізований з місця ДТП. Об'єктивно встановлено: свідомість відсутня, у відповідь на больові подразники мимовільно з'являється тонічне напруження м'язів із випростовуванням рук і ніг та закиданням голови назад, двосторонні стопні патологічні рефлекси. Дихання «машинне», пульс — 110/хв, артеріальний тиск — 160/100 мм рт. ст., температура тіла — 37,9°C. Встановіть попередній діагноз. Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Внутрішньочерепна гематома
- ☐ б. Менінгіт
- ☒ в. Забій головного мозку важкого ступеня
- ☐ г. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ д. Аневризма судин головного мозку

Питання 74

Неправильно
Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 59 років раптово на вулиці втратив свідомість. Діагностовані ознаки клінічної смерті. З чого треба починати реанімаційні заходи?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Уведення атропіну та адреналіну
- ☐ б. Виконання зовнішнього масажу серця
- ☒ в. Виконання потрібного прийому Сафара
- ☐ г. Виконання конікотомії
- ☐ д. Уведення аміодарону чи лідокаїну

Питання 75

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта на 17-й день лихоманки з'явилися дьогтеподібні випорожнення. Під час огляду спостерігається: шкірні покриви бліді, температура тіла — 37,3°C, пульс — 118/хв, АТ — 90/60 мм рт. ст. Коричневий наліт на язиці, живіт помірно роздутий, безболісний, гепатоспленомегалія. Яке ймовірно ускладнення розвинулося у пацієнта?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Шлунково-кишкова кровотеча
- ☐ б. Активація ендогенної флори
- ☐ в. Дисбіоз кишечника
- ☐ г. Тромбоз мезентеріальних судин
- ☐ д. Перфорація кишок

Питання 76

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У пацієнта віком 18 років під час лікування з приводу бактеріального ендокардиту раптово на фоні емоційного напруження розвинувся генералізований судомний напад. Після нападу в неврологічному статусі визначалися: центральний параліч VII, XII пар черепних нервів, геміанестезія та центральний параліч праворуч. Який імовірний діагноз у пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Субарахноїдальний крововилив
- ☐ b. Гемодинамічний інсульт
- ☐ c. Генералізований епілептичний напад
- ☐ d. Лакунарний інсульт
- ☒ e. Кардіоемболічний інсульт

Питання 77

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У дитини віком 6 років після вживання шоколадних цукерок раптово на різних ділянках шкіри з'явилися висипання у вигляді множинних і схильних до злиття елементів. Їх поява супроводжувалася нестерпним свербіжем, підвищенням температури тіла до 37,2°C. За результатом клінічного аналізу крові виявлено еозинофілію. Для якого захворювання характерні такі клініко-лабораторні показники?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Синдром Лайєлла
- ☐ b. Вітряна віспа
- ☐ c. Пухирчатка
- ☐ d. Синдром Стівена-Джонса
- ☒ e. Кропив'янка

Питання 78

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 46 років скаржиться на загальну слабкість, нудоту, рідкі дьогтеподібні випорожнення. Під час обстеження встановлено: пацієнт у свідомості, шкіра бліда, ЧСС — 100/хв, АТ — 105/60 мм рт. ст., ЧД — 16/хв, тремор пальців рук, асцит, розширення вен передньої черевної стінки, печінка щільна +8 см, селезінка збільшена. У результаті аналізу крові виявлено: НЬ — 90 г/л, КП — 0,95, білірубін — 156 мкмоль/л, протромбін — 65%. Визначте ймовірний діагноз та ускладнення, що виникло у пацієнта.


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Хронічний гепатит, кровотеча з гемороїдальних вен
- ☒ b. Цироз печінки, шлункова кровотеча з варикозно-розширених вен

- ☐ c. Виразка шлунка, кровотеча
- ☐ d. Неспецифічний виразковий коліт, кишкова кровотеча
- ☐ e. Гепато-ренальна недостатність, кишкова кровотеча

Питання 79

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловік віком 48 років постраждав від ураження блискавкою. Під час огляду у пацієнта спостерігається: збудження, дезорієнтація, періодичні судоми. Артеріальний тиск — 140/90 мм рт.ст., пульс — 120/хв, дихання аритмічне. Які лікарські засоби треба призначити пацієнту терміново?

Виберіть одну відповідь:

- ☒ a. Седативні
- ☐ b. Глюкокортикоїди
- ☐ c. Теофілін
- ☐ d. Адреналін
- ☐ e. Серцеві глікозиди

Питання 80

Неправильно
Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У чоловіка віком 42 роки первинно з'явився напружений набряк правого надпліччя і всієї правої руки з ціанозом та посиленням венозного малюнку на плечі і надпліччі. Пальпаторно відзначається болючість в аксиллярній ямці та по ходу судинного пучка на плечі. Пульсація артерій збережена, але ослаблена через набряк. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Правобічний гідраденіт
- ☐ b. Тромбоз правої підключичної вени
- ☒ c. Тромбоемболія правої аксиллярної артерії
- ☐ d. Гнійний артрит правого плечового суглоба
- ☐ e. Флегмона правого плеча

Питання 81

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Пацієнтка віком 19 років із ревматичною хворобою серця, комбінованою мітральною вадою серця під час складання іспитів втратила свідомість. Об'єктивно встановлено: свідомість відсутня, пульс на променевих і сонних артеріях не визначається, дихання поверхнєве, шумне, АТ не визначається, тони серця не вислуховуються. Який метод діагностики буде найінформативнішим у цьому разі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Коронароангіографія
- ☐ b. Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини
- ☒ c. Електрокардіографія
- ☐ d. Ехокардіографія
- ☐ e. Рентгенографія органів грудної порожнини

Питання 82

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловік віком 28 років, який 4 дні тому повернувся із Середньої Азії, госпіталізований з підозрою на бубонну форму чуми. Після повернення проживав удома з батьками. Які лікарські засоби треба використати для екстреної профілактики осіб, які контактували з пацієнтом?

Виберіть одну відповідь:

- ☒ a. Стрептоміцин по 0,5 г 2 рази на добу в/м протягом 5 діб
- ☐ b. Ацикловір по 0,4 г 5 разів на добу протягом 5 діб
- ☐ c. Бісептол по 480 мг 2 рази на добу протягом 5 діб
- ☐ d. Левоміцетин по 0,5 г 3 рази на добу протягом 7 діб
- ☐ e. Пеніцилін по 1млн МО 6 разів на добу протягом 7 діб

Питання 83

Неправильно
Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Для прийняття поранених та хворих у складі медичної роти механізованої бригади розгорнуто приймально-сортувальне та операційно-перев'язувальне відділення. Які ще відділення треба розгорнути для роботи медичної роти бригади?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Відділення анестезіології та реанімації, відділення госпіталізації та лікування
- ☐ б. Відділення анестезіології та реанімації, ізолятори, аптека, підрозділи забезпечення
- ☐ в. Госпітальне відділення, відділення спеціальної обробки, аптеку, підрозділи забезпечення
- ☐ г. Госпітальне відділення, відділення спеціальної обробки, аптека, підрозділи забезпечення, відділення швидко повернутих санітарних втрат бробки
- ☐ д. Відділення швидко-повернутих санітарних втрат, сортувальний пост, аптека, відділення спеціальної о

Питання 84

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час вживання їжі у чоловіка раптово виникло стридорозне дихання, задишка понад 30/хв та втрата свідомості. Що могло спричинити гостру дихальну недостатність у пацієнта?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Обструкція трахеї стороннім тілом
- ☐ б. Астматичний статус
- ☐ в. Бронхоспазм
- ☐ г. ГДН центрального генезу
- ☐ д. Гостре порушення мозкового кровообігу

Питання 85

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Шахтар, за 3 години після удару відламком породи у праву половину грудної клітки, скаржиться на біль, що посилюється під час кашлю й глибокому диханні. Об'єктивно спостерігається: права половина грудної клітини відстає в акті дихання, під час пальпації виникає різка локальна болісність у ділянці V-VII ребер по середньо-підпахвовій лінії та виявляється крепітація відламків. Пульс — 98/хв. Яку невідкладну медичну допомогу треба надати потерпілому та куди госпіталізувати?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Провести шийну вагосимпатичну блокаду і направити на амбулаторне лікування
- ☐ б. Увести наркотичні препарати, накласти тугу пов'язку і направити на амбулаторне лікування
- ☐ в. Зробити міжреберну блокаду і направити до стаціонару
- ☐ г. Накласти тугу пов'язку на фазі видиху і направити до терапевтичного відділення
- ☒ д. Увести анальгетики в/м і направити до стаціонару

Питання 86

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка віком 55 років із діагнозом: інсулінозалежний цукровий діабет, госпіталізовано до лікарні. Він скаржиться на загальну слабкість, поліурію, гіпотонію, тахікардію. У газовому складі крові виявлено: рН — 7,31, P_{aCO_2} — 35 мм рт. ст., P_{aO_2} 80 мм рт.ст., стандартний бікарбонат 17 ммоль/л, істинний бікарбонат — 15 ммоль/л, дефіцит основ — 1,5 ммоль/л, натрій — 132 ммоль/л, глюкоза — 25 ммоль/л, хлориди — 102 ммоль/л, кетонів тіла. Визначте порушення кислотно-основного стану пацієнта.


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Респіраторний алкалоз
- ☒ б. Метаболічний ацидоз
- ☐ в. Метаболічний алкалоз
- ☐ г. Респіраторний ацидоз
- ☐ д. Змішаний ацидоз

Питання 87

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Декілька працівників фармацевтичного підприємства під час пожежі виявилися заблокованими без можливості самостійної евакуації. Засоби індивідуального захисту на випадок пожежі також були

недоступними. Після евакуації рятувальниками до безпечного місця потерпілі мали такі симптоми: запаморочення, порушення зору, нудоту, часте дихання, задишку, вишневий колір обличчя. Для якого виду гіпоксії характерні такі симптоми?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Токсична
- ☐ b. Тканинна
- ☐ c. Циркуляторна
- ☒ d. Гемічна
- ☐ e. Респіраторна

Питання 88

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна у терміні 37 тижнів госпіталізована зі скаргами на сильний головний біль, погіршення зору, слуху. Об'єктивно встановлено: анасарка, АТ — 220/120 мм рт. ст. За результатами лабораторних досліджень: сечовина — 30 ммоль/л, білок сечі — 6,6 г/л, НЬ — 90 г/л. Серцебиття плоду — 110/хв. Перебуваючи у приймальному відділенні у пацієнтки з'явилися посмикування м'язів обличчя, що перейшли у тонічні та клонічні судоми. Вона втратила свідомість. Який метод ведення пологів треба обрати у цьому разі?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ведення пологів із накладанням акушерських щипців
- ☐ b. Ведення пологів із проведенням епізіотомії
- ☒ c. Терміновий кесарів розтин
- ☐ d. Консервативне лікування протягом 24 годин
- ☐ e. Консервативне лікування протягом 6 годин

Питання 89

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка віком 22 роки прооперована з приводу позаматкової вагітності. У післяопераційний період з замісною метою їй призначили трансфузію еритроцитарної маси. Під час її проведення у пацієнтки виникла різка слабкість, запаморочення, пропасниця, сильний біль за грудиною та в поперековій ділянці, одноразове блювання. Об'єктивно спостерігається: тахікардія до 120/хв, АТ знизився до 80/60 мм рт. ст. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостра серцево-судинна недостатність
- ☐ b. Гостра ниркова недостатність
- ☒ c. Гемотрансфузійний шок
- ☐ d. Цитратний шок
- ☐ e. Анафілактичний шок

Питання 90

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 42 роки госпіталізований до лікарні з діагнозом: гостре отруєння етиленгліколем. Який антидотний препарат треба призначити пацієнту?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Налоксон гідрохлорид у дозі 0,8-2,0 мг внутрішньовенно
- ☐ b. Унітіол 5%-й — 5—150 мг/кг/добу
- ☐ c. Бензилпеніциліну натрієва сіль 250 мг/кг/добу
- ☐ d. Мекапид 40%-й — 2,0 в/м'язово
- ☒ e. Фомепізол у дозі 15 мг/кг

Питання 91

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після авіаудару з-під уламків бліндажа звільнено військового, який перебував під завалами понад 2-х годин. Об'єктивно спостерігається: свідомість пригнічена, зіниці розширені, на світло реагують в'яло, пульс — 130/хв, АТ — 60/30 мм рт. ст. Праве плече має нсфізіологічне положення, деформоване, виявляється крепітація під час пальпації. У нижній третини правого стегна видно рвану рану, з якої інтенсивно витікає темно-червона кров. Які найперші дії для надання домедичної допомоги пораненому?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Увести пацієнту 2 мл 2%-го розчину промедолу внутрішньом'язово
- ☐ b. Накласти шину Крамера на праву плечову кістку
- ☐ c. Налагодити внутрішньовенну інфузію 0,9%-го розчину каСІ

- ☒ d. Накласти асептичну пов'язку на рану стегна
- ☐ e. Накласти тиснучу пов'язку на рану стегна

Питання 92

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

Моряк, який повернувся із закордонного плавання, скаржиться на високу температуру тіла до 40°C та кашель із пінистою іржавою мокротою. Об'єктивно встановлено: блідий, ціаноз слизових, ЧД — 30/хв, тахікардія, дихання в легенях ослаблене, поодинокі вологі хрипи, крепітація. Попередній діагноз: чума, первинно-легенева форма. Який лікарський засіб треба призначити пацієнту? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Людський імуноглобулін
- ☒ b. Стрептоміцин
- ☐ c. Цефтріаксон
- ☐ d. Інфліксимаб
- ☐ e. Пеніцилін

Питання 93

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Жінка віком 40 років скаржиться на слабкість, сильний біль у горлі, різко утруднене ковтання. Об'єктивно спостерігається: загальний стан важкий, субіктичність склер, температура тіла — 40°C, пульс — 97/хв, помірна гіперемія мигдаликів, що покриті некротичними нашаруваннями, регіонарні лімфовузли не збільшені. За результатами аналізу крові: лейкоцити — $1,2 \cdot 10^9/\text{л}$, е — 1%, п/я — 1%, с/я — 12%, л — 56%, м — 30%, ШОЕ — 37 мм/год. Встановіть імовірний діагноз. Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Токсична дифтерія ротоглотки
- ☐ b. Скарлатинозна ангіна
- ☒ c. Агранулоцитарна ангіна
- ☐ d. Інфекційний моноклеоз
- ☐ e. Лакунарна ангіна

Питання 94

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У шестирічного хлопчика на тлі гострого бронхіту з підвищенням температури тіла до 38,7°C з'явилося блювання до 8 разів за добу. Об'єктивно встановлено: кволий, апатичний, ознаки ексікозу, запах ацетону з рота та ацетон у сечі (++++). Діагностовано: синдром ацетонемічної блювоти. З яким захворюванням треба проводити диференційну діагностику насамперед? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Хвороба Аддисона
- ☒ б. Цукровий діабет
- ☐ в. Пангіпопітуїтаризм
- ☐ г. Нецукровий діабет
- ☐ д. Гостра надниркова недостатність

Питання 95

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчина віком 25 років госпіталізована до інфекційного відділення у перший день захворювання в тяжкому стані з температурою 39,5°C, явищами катарального синдрому, висипом геморагічного характеру неправильної форми на шкірі тулуба і кінцівок, деякі елементи з некрозом у центрі. Який імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоцитопенічна пурпура (хвороба Верльгофа)
- ☐ б. Геморагічний васкуліт (хвороба Шенлейна-Ієноха)
- ☐ в. Геморагічна гарячка з нирковим синдромом
- ☒ г. Менінгококова інфекція, генералізована форма, менінгококцемія
- ☐ д. Алергічна реакція

Питання 96

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловік віком 25 років травмований під час ДТП. Під час пальпації таза виявляється виражений біль, обмеження рухів нижньої кінцівки, симптом Ларрея позитивний. Вкажіть оптимальний варіант транспортування пацієнта.

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. На жорстких ношах, положення Волковича
- ☐ b. Положення напівлежачи
- ☒ c. На жорстких ношах, положення Тренделенбурга
- ☐ d. Положення на ношах, на спині
- ☐ e. Положення на ношах, на животі

Питання 97

Неправильно
Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Семирічний хлопчик травмував око, шматочок скла проник у праве очне яблуко. За 3 години після травмування скло видалили. Проводилося закапування ока атропіном. Повторно робилися ін'єкції атропіну. За добу хлопчик став неспокійним, в афекті страху і тривоги то ховався, то відганяв щось від себе. Перестав упізнавати матір та не розумів, що перебуває у лікарні. Спостерігається мідріаз, сухість у роті, тахікардія. Яке лікування треба призначити дитині?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Снодійне
- ☐ b. Прозерин
- ☐ c. Аміназин
- ☐ d. Галоперідол
- ☒ e. Дезінтоксикаційне

Питання 98

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіку віком 83 роки ампутували нижню кінцівку на рівні стегна з приводу діабетичної стопи. За добу після оперативного втручання стан хворого почав раптово прогресивно погіршуватися. Порушилася свідомість, виникло часте поверхнєве дихання, помірне оглушення, хворий став блідим, з'явився холодний піт. На ЕКГ спостерігається: суправентрикулярна тахікардія з ЧСС — 188/хв, блокада правої ніжки пучка Гісса, ознаки перенапруження правого шлуночка. Хірург припустив ТЕЛА і викликав реаніматолога. На момент огляду реаніматологом пацієнта на ЕКГ спостерігається: ізолінія, свідомість на рівні коми, пульс на магістральних судинах відсутній, дихання відсутнє. Які найперші дії має виконати реаніматолог?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Оксигенотерапію
- ☐ б. В/в введення метопрололу
- ☐ в. В/в введення гепарину
- ☒ г. Непрямий масаж серця
- ☐ д. Електричну дефібриляцію

Питання 99

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка віком 46 років, після емоційного навантаження, раптово відчувала сильний біль за грудиною та втратила свідомість. Об'єктивно встановлено: тони серця відсутні, апное, АТ та пульс не визначається. На ЕКГ спостерігається: хвилі різної висоти та ширини, неоднакової форми. Який із наведених нижче заходів буде найбільш ефективним у цьому разі?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Адреналін в/с
- ☐ б. Атропин в/с
- ☒ в. Електрична дефібриляція
- ☐ г. Строфантин в/с
- ☐ д. Дігоксін в/с

Питання 100

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

Рядового віком 19 років, який отримав опіки тулуба і верхніх кінцівок під час вибуху ємності з пальним, направили до медичної роти бригади. Стан середньої тяжкості. Об'єктивно спостерігається: АТ — 100/65 мм рт. ст., пульс — 105/хв. На верхніх кінцівках і грудній клітці визначаються ділянки гіперемії та набряку міхурів, блідість шкіри з утратою больової і тактильної чутливості. Яку допомогу треба надати на цьому етапі медичної евакуації?
Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Увести допамін в/в крапельно
- ☐ б. Обробити рани дегазуючою рідиною
- ☐ в. Обробити рани масляним розчином
- ☐ г. Увести дексаметазон
- ☒ д. Накласти суху асептичну пов'язку

Питання 101

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

Із вогнища хімічного ураження в зимовий період госпіталізовано постраждалого військовослужбовця з симптомами отруєння. Під час надання першої лікарської допомоги цьому пацієнту, які заходи треба провести найперше?
Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Усунути тяжкі прояви інтоксикації
- ☐ б. Зігрівання
- ☐ в. Психологічну реабілітацію
- ☐ г. Повне відновлення гомеостазу
- ☐ д. Корекцію метаболізму

Питання 102

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Новонародженій дитині з важкою асфіксією під час народження проведено первинну реанімацію в пологовому залі. Після стабілізації стану дитину перевели до відділення інтенсивної терапії та розпочали моніторинг лабораторних досліджень. Які з наведених нижче лабораторних показників потребують корегування?
Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Рівень загального кальцію 2,1 ммоль/л

- ☐ b. Рівень натрію 140 ммоль/л
- ☒ c. Рівень глюкози в крові 2,5 ммоль/л
- ☐ d. Рівень глюкози в крові 5,5 ммоль/л
- ☐ e. Рівень калію 5,0 ммоль/л

Питання 103

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Дівчину віком 20 років, через 3 дні після зґвалтування, шпиталізовано до психіатричного відділення. Під час клініко-психопатологічному обстеженні у психічному статусі пацієнтки спостерігаються пригнічений настрій та підвищена тривога. Вона уникає спогадів та нездатна відтворити в пам'яті основні, важливі елементи травматичної ситуації. Скаржиться на труднощі із засинанням, нічні кошмари, пов'язані з психотравматичною подією, що постійно повторюються, неможливість сконцентрувати увагу, втрату колишніх інтересів і захоплень. Яке порушення психічного стану розвинулося в пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Змішаний тривожний і депресивний розлад
- ☒ b. Посттравматичний стресовий розлад
- ☐ c. Неврастенія
- ☐ d. Панічний розлад
- ☐ e. Дисоціативна амнезія

Питання 104

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки, яка хворіє на хронічний вірусний гепатит С, раптово розвинулися сонливість, сплутаність свідомості, носова кровотеча. На шкірі з'явилися геморагічні висипання та відчувається солодкуватий запах з рота. Яке ускладнення найімовірніше виникло у пацієнтки?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіперглікемічний стан
- ☐ b. Жовчнокам'яна хвороба
- ☐ c. Кетоацидоз
- ☐ d. Гостра ниркова недостатність

- ☒ е. Гостра печінкова недостатність

Питання 105

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У чоловіка діагностовано клінічні ознаки напруженого пневмотораксу. Екстрена допомога у разі цієї патології — пункція плевральної порожнини у:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. II міжребер'ї по середньоключичній лінії на здоровому боці
- ☐ б. VIII-IX міжребер'ї по задній аксилярній лінії на здоровому боці
- ☐ в. VII-IX міжребер'ї по задній аксилярній лінії на боці ураження
- ☒ г. II міжребер'ї по середньоключичній лінії на боці ураження
- ☐ д. V-VI міжребер'ї по середній аксилярній лінії на боці ураження

Питання 106

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Хлопець віком 15 років хворіє на цукровий діабет упродовж 10-ти років. Протягом останнього тижня у нього діагностовано ентероколіт, скаржився на слабкість та часте сечовипускання. Сьогодні з'явилися галюцинації, олігурія. Пацієнт втратив свідомість. Об'єктивно спостерігається: судороги, шкіра і слизові оболонки сухі, бліді, язик сухий, тургор тканин різко знижений, гіпертонус м'язів. Виявляються менінгеальні симптоми, очні яблука м'які, з рота запаху ацетона немає. Дихання часте, поверхневе. Тони серця глухі до 110/хв, АТ — 80/40 мм рт. ст, живіт м'який. Яку невідкладну терапію треба провести пацієнту?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інсулінотерапію методом малих доз, ре гідратацію (в/в краплинне введення 5%-го розчину глюкози)
- ☒ б. Інсулінотерапію методом малих доз, ре гідратацію (в/в краплинне введення 0,9%-го розчину хлориду натрію)
- ☐ в. Інсулінотерапію методом малих доз, ре гідратацію (в/в краплинне введення 1,8%-го розчину хлориду натрію)
- ☐ г. Інсулінотерапію методом малих доз, призначити глюкокортикоїди
- ☐ д. Регідратацію (в/в краплинне введення 5%-го розчину глюкози), антибактеріальну терапію

Питання 107

Неправильно
Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Батьки одномісячного хлопчика, госпіталізованого до педіатричного відділення, занепокоєні тим, що у дитини 10 діб тому виникло блювання, його частота та об'єм блювотних мас постійно збільшуються. Об'єктивно спостерігається: блювотні маси не забарвлені жовчю, апетит у дитини не змінився, він має задовільний вигляд, але маса тіла зменшується. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Інвагінація
- ☐ б. Тонкокишкова непрохідність
- ☐ в. Гастроентерит
- ☐ г. Пухлина головного мозку
- ☐ д. Пілоростеноз

Питання 108

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Робітниця тваринницької ферми госпіталізована до інфекційного відділення на 3-й день хвороби у вкрай тяжкому стані. Об'єктивно встановлено: свідомість на рівні сопору, шкіра бліда, на тулубі та кінцівках нерясні геморагічні висипання, виражений набряк обличчя, на правій щоці безболісна виразка, укрита чорним струпом. Тони серця приглушені, ЧД — 30/хв, ЧСС — 112/хв, АТ — 60/30 мм рт. ст. Температу тіла — 37,5°C. Гепатоспленомегалія. Для якого захворювання характерні ці симптоми?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Бешиха
- ☐ б. Шкірний лейшманіоз
- ☒ в. Сибірка, септична форма
- ☐ г. Туляремія
- ☐ д. Чума, шкірна форма

Питання 109

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловік віком 49 років, який зловживає алкоголем, госпіталізований до хірургічного відділення для оперування грижі. Наступного дня після успішної операції у пацієнта спостерігається порушення орієнтації, він метушливий, не впізнає лікаря, каже, що по шкірі повзають павуки, що він у в'язниці і його не випускають стіни. Об'єктивно виявлено: температура тіла — 38°C, тремор, озноб, пульс аритмічний, гіпергідроз, живіт спокійний. Для якого патологічного стану характерні такі симптоми? Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Алкогольний делірій
- ☐ б. Гострий алкогольний параноїд
- ☐ в. Післяопераційний психоз
- ☐ г. Гостра енцефалопатія Гайє-Верніке
- ☐ д. Гострий алкогольний галюциноз

Питання 110

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина віком 10 років перебуває 2-гу добу в лікарні з приводу гострого гломерулонефриту з нефритичним синдромом. Стан поступово погіршився. Об'єктивно спостерігається: сильний головний біль, блювота, судоми, короткочасна втрата свідомості, набряки, АТ — 175/100 мм рт. ст. За результатами лабораторного дослідження виявлено: креатинін — 320 мкмоль/л, сечовина — 35 ммоль/л, калій — 5,8 ммоль/л. З аналізу сечі відомо: питома вага — 1001, білок — 1,5 г/л, лейкоцити — 5-7 в полі зору мікроскопа, еритроцити на все поле зору мікроскопа. Добовий діурез — 235 мл. Під час УЗД нирок спостерігається підвищення ехогенності паренхіми. Який вид замісної терапії треба вибрати для лікування дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Перитональний діаліз
- ☐ б. Замінне переливання крові
- ☒ в. Гемодіаліз
- ☐ г. Антибактеріальну терапію
- ☐ д. Трансплантацію нирки

Питання 111

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


До медичного пункту за 12 годин після застосування противником хімічної зброї звернувся постраждалий чоловік. На шкірі тильного боку лівої кисті спостерігається еритема блідо-рожевого кольору, по краях якої кільцеподібно розташовані дрібні пухирі з вмістом бурштиново-жовтого кольору. Яка отруйна речовина викликала подібне ураження?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. CS
- ☒ b. Іприт
- ☐ c. Люїзит
- ☐ d. Зарин
- ☐ e. Адамсит

Питання 112

Неправильно
Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 25 років раптово втратив свідомість. Лікар екстреної (швидкої) медичної допомоги встановив: стан у край тяжкий, періодично виникають клонічні судороги кінцівок, на тілі — множинна геморагічна зірчаста висипка різної величини, на шкірі тулуба і кінцівок темно-багряні плями. Тони серця глухі, пульс — 140—160/хв, АТ — 40/0 мм рт. ст., дихання поверхневе, 40/хв. Які невідкладні заходи треба провести лікарю?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Увести доксициклін
- ☐ b. Увести аміодарон
- ☐ c. Увести діазепам
- ☒ d. Провести конікотомію
- ☐ e. Увести преднізолон та провести інфузійну терапію

Питання 113

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Жінка віком 54 роки госпіталізована на 5-й день хвороби. Скаржиться на помірний біль у горлі та виражену загальну слабкість. Об'єктивно встановлено: температура тіла — 37,7°C, шкіра бліда, набряк шиї, у ротоглотці розповсюджені щільні фібринозні нашарування. Попередній діагноз: дифтерія. Яке дослідження дасть змогу підтвердити попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Біохімічне
- ☐ b. Вірусологічне
- ☐ c. Проба Бюрне
- ☐ d. Біологічна проба
- ☒ e. Бактеріологічне

Питання 114

Неправильно
Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловік унаслідок ДТП отримав закритий перелом тазових кісток та правої стегнової кістки. Лікарем екстреної (швидкої) медичної допомоги виконано транспортну іммобілізацію та знеболення. За годину після госпіталізації стан пацієнта різко змінився: виражена блідість шкіри, холодний липкий піт, пульс слабкий до 140/хв, АТ — 60-70/0 мм рт. ст. Яка причина погіршення стану пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☒ b. Кровотеча, що продовжується
- ☐ c. Травматичний шок
- ☐ d. Гострий інфаркт міокарда
- ☐ e. Струс головного мозку

Питання 115

Неправильно
Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Поранений військовослужбовець скаржиться на біль у ділянці таза та промежини. Об'єктивно спостерігається: він блідий, із холодним потом, у нього запаморочення свідомості та обмеження рухів нижніх кінцівок. Під час пальпації виявлено наявність деформації та зміщення однієї половини таза уверх, позитивний симптом приклеєної п'яти. Як безпечно транспортувати пораненого до госпіталю?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. На довгій транспортувальній дошці на боці
- ☐ b. На спині на довгій транспортувальній дошці
- ☒ c. На спині на ношах у позі «жаби»
- ☐ d. На ношах напівсидячи
- ☐ e. На спині на ношах

Питання 116

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта віком 30 років на ЕКГ зафіксована фібриляція шлуночків. Проведено три безрезультатні спроби відновити серцевий ритм за допомогою електричної дефібриляції. Скільки разів поспіль дозволяється проводити дефібриляцію одному пацієнту?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Не більше ніж 10 розрядів
- ☒ b. Поки на ЕКГ реєструється фібриляція
- ☐ c. Поки на ЕКГ реєструється асистолія
- ☐ d. Не більше ніж 3-5 розрядів
- ☐ e. Проводити протягом години

Питання 117

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Підліток віком 16 років скаржиться на біль у правій здухвинній ділянці з іррадіацією в калитку та збільшення її розмірів. Температура тіла — 37,8°C. Три дні тому, граючи у футбол, хлопець отримав удар м'ячем у пах. Об'єктивно встановлено: шкіра бліда. Під час пальпації живота змін не

виявлено, спостерігається потовщення і болючість придатка та гіперемія калитки. Встановіть діагноз.


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостре гідроцеле
- ☐ b. Кіста придатка
- ☐ c. Перекрут яєчка
- ☐ d. Гострий інфекційний орхіт
- ☒ e. Гострий епідидимоорхіт справа

Питання 118

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У півторарічної дитини із септичним шоком виникла кровотеча з місць ін'єкцій, по шлунковому зонду надходить «кавова гуща». Під час визначення показників гемостазу виявлено: збільшено МНВ, АЧТЧ, рівень D-димеру, знижений фібриноген, тромбоцити — $30 \cdot 10^9/\text{л}$. Для якого патологічного процесу характерні такі показники?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дефіциту вітаміну К
- ☐ b. Тромботичної тромбоцитопенічної пурпури
- ☐ c. Хвороби Віллебранда
- ☐ d. Ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури
- ☒ e. Синдрому дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові

Питання 119

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 67 років під час ожеледиці послизнувся та впав на бордюр тротуару. Об'єктивно спостерігається: стан середньої тяжкості, є загальна загальмованість при збереженій свідомості та орієнтуванні, гіперемія обличчя, локалізований біль у ділянці правої ключиці. Виявляється тахікардія, підвищення артеріального тиску, припухлість, синець та крепітація в ділянці правої ключиці. Попередній діагноз: перелом правої ключиці. Як треба транспортувати пацієнта?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. У положенні Волковича з палкою в ліктьових згинах

- ☐ b. Напівсидячі з палкою в ліктьових згинах
- ☒ c. Прибинтувавши праву верхню кінцівку до грудної клітини
- ☐ d. Наклавши шину Крамера з фіксацією плечового, ліктьового та променево-зап'ясткового суглобів
- ☐ e. Напівсидячи з накладанням шини Еланського

Питання 120

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У чоловіка на 5-ту добу після оперативного втручання виникли симптоми тромбоемболії легеневої артерії, що спричинило раптову коронарну смерть. Який препарат треба було призначати пацієнту для профілактики цього ускладнення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Вазотоніки
- ☐ b. Деагреганти
- ☐ c. Антиферментні засоби
- ☐ d. Тромболітики
- ☒ e. Низькомолекулярні гепарини

Питання 121

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


До військового шпиталю госпіталізовано 8 солдат із місця події. У потерпілих спостерігається слабкість, нудота, гіркота у роті, слинотеча. У одного бійця шкіра та слизові оболонки яскраво-червоного кольору, брадикардія, судом. Зі слів потерпілих, на місці події відчувався різкий запах гіркого мигдалю. Яка отруйна речовина спричинила такий стан військовослужбовців? Виберіть одну відповідь:

- ☒ a. Синильна кислота
- ☐ b. Фосген
- ☐ c. Зарин
- ☐ d. Зоман
- ☐ e. Іприт

Питання 122

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини діагностовано гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Батьки скаржаться на задишку, що виникла у дитини вночі під час сну. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 37,9°C, задишка інспіраторного характеру з участю допоміжної мускулатури, періоральний ціаноз, голос сиплий, періодично з'являється «гавкаючий» кашель. Яка ступінь гострого стенозу гортані є показанням до проведення інтубації трахеї або трахеостомії?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. III ступінь (стадія декомпенсації)
- ☐ б. II ступінь (стадія субкомпенсації)
- ☐ в. Будь-яка стадія у разі неефективності інгаляції з адреналіном
- ☐ г. I ступінь (стадія компенсації)

Питання 123

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінку віком 74 роки госпіталізовано до приймального відділення з діагнозом: повторне гостре порушення мозкового кровообігу в правій гемісфері, лівобічний геміпарез. Із анамнезу відомо, що пацієнтка перенесла геморагічний інсульт. Пацієнтка неконтактна, не розмовляє, очі розплющує тільки коли відчуває біль, моторна реакція на біль — у вигляді флексії кінцівок. Оцініть стан свідомості у пацієнтки за шкалою ком Глазго.

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Смерть мозку (3 бали)
- ☐ б. Сопор (9-12 балів)
- ☐ в. Ясна свідомість (15 балів)
- ☒ г. Кома (8 балів)
- ☐ д. Оглушення (13-14 балів)

Питання 124

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 40 років отримав електротравму. За допомогою до лікаря не звертався. Наступного дня відчув погіршення стану здоров'я. Бригада екстреної (швидкої) медичної допомоги діагностувала шлуночкову екстрасистолію. Під час огляду встановлено: пацієнт у свідомості, АТ — 120/80 мм рт. ст., пульс — 84/хв, ритмічний, ЧД — 16/хв. На правій та лівій руках наявні специфічні «знаки» від електричного струму. Пацієнту уведено протиправцеву сироватку та оброблено рани. Визначте подальшу тактику лікаря.


Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Госпіталізувати пацієнта до реанімаційного відділення
- ☐ б. Провести ЕКГ обстеження і, за відсутності серцевої патології, відпустити пацієнта додому
- ☐ в. Госпіталізувати пацієнта до терапевтичного відділення
- ☐ г. Рекомендувати пройти ЕКГ обстеження в поліклініці за місцем проживання впродовж тижня
- ☐ д. Рекомендувати пройти ЕКГ обстеження в поліклініці за місцем проживання через три дні

Питання 125

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Півторарічну дитину госпіталізовано до приймального відділення. Об'єктивно спостерігається: шкіра дитини бліда, дихання поверхневе, пульс ниткоподібний. Які з наведених нижче послідовних дій лікаря щодо оцінювання стану свідомості є правильними?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Укол голкою
- ☐ б. Перевірка больової реакції
- ☐ в. Перевірка рефлексорної збудливості
- ☒ г. Гучний оклик та легке потрушування за плечі
- ☐ д. Перевірка зіничної реакції на світло

Питання 126

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У чоловіка віком 72 роки унаслідок фібриляції шлуночків настала зупинка кровообігу. Проводиться комплекс елементарної серцево-легеневої реанімації (зовнішній масаж серця та штучна вентиляція легень). Тричі проведена дефібриляція, яка виявилася неефективною. Яку медикаментозну терапію треба провести?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Увести в/в дофамін
- ☐ б. Увести в/в натрію гідрокарбонат
- ☐ в. Увести в/в магнія сульфат
- ☐ г. Увести в/в атропін
- ☒ е. Увести в/в адреналін

Питання 127

Неправильно
Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловіку віком 22 роки, який хворіє на гарячку Марбурга з тяжким перебігом і значною гострою крововтратою, проведена гемотрансфузія без будь-яких ускладнень. Пацієнт помер через прогресуючу крововтрату. Яка найімовірніша причина смерті цього пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпопротеїнемія
- ☐ б. Дефіцит гемоглобіну
- ☐ в. Гіповолемія
- ☒ г. Коагулопатія
- ☐ е. Гіпоксія

Питання 128

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець віком 30 років на радіоактивно забрудненій території отримав одноразову дозу випромінювання 15 Гр. Скаржить на стискаючий головний біль, підвищену температуру тіла, нудоту, дворазове блювання. Яка клінічна форма гострої променевої хвороби розвивається у потерпілого?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кістковомозкова, середнього ступеня тяжкості
- ☐ b. Церебральна
- ☐ c. Судинно-токсична
- ☐ d. Кістковомозкова, тяжкого ступеня
- ☒ e. Кишкова

Питання 129

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 50 років хворіє на бронхіальну астму та знаходиться на лікуванні у пульмонологічному відділенні. Уночі раптово стан погіршився та посилилася задишка. Черговим лікарем об'єктивно встановлено: апное, АТ — 100/70 мм рт.ст., пульс — 134/хв, ЧСС — 152/хв, миготлива аритмія. Пацієнта перевели до палати інтенсивної терапії. Який із невідкладних заходів треба провести пацієнту?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ a. Інтубацію трахеї
- ☐ b. Постуральний дренаж
- ☐ c. Перкусійний масаж грудної клітки
- ☐ d. Дефібриляцію серця
- ☐ e. Внутрішньоаортальну балонну контрпульсацію

Питання 130

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловіку віком 43 роки через гостре отруєння фосфорорганічними сполуками за добу введено понад 100 мг атропіну сульфату. Під ранок у пацієнта розвинувся психоз із галюцинаціями та судом. АТ — 90/60 мм рт.ст. Який лікарський засіб треба насамперед ввести пацієнту для лікування ускладнення, що виникло?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Аміназин
- ☐ b. Галоперидол
- ☐ c. Унітіол
- ☒ d. Галантаміну гідробромід
- ☐ e. Налоксон

Питання 131

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У військовослужбовця спостерігається вогнепальне поранення лівої половини грудної клітки. Він скаржиться на біль та задишку. Під час огляду встановлено: шкіра бліда, під час видиху через рану грудної клітки повітря виділяється назовні, а під час вдиху — поступає всередину, дихання на стороні поранення ослаблене, ЧСС — 112/хв, АТ — 100/60 мм рт. ст. Яку домедичну допомогу треба надати пораненому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Швидко евакуювати пораненого до госпіталю
- ☐ b. Термінова ПХО рани, асептична пов'язка
- ☐ c. Дренування плевральної порожнини по Бюлау
- ☒ d. Накладання оклюзійної пов'язки з клапаном
- ☐ e. Дренування середостіння

Питання 132

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілого протягом перших 2-х годин після опромінення розвинулися симптоми первинної реакції: нудота, часте блювання, оніміння шкіри лівої половини тулуба, температура тіла 38°C. За 2 тижні після опромінення у пацієнта з'явилися множинні пухирці на шкірі, ерозії, дрібноточкові крововиливи, запалення повік, епіляція, різка втрата маси тіла. За даними дозиметрії потерпілий отримав середню дозу гамма-нейтронного опромінення 6,4 Зв., середньотканинна доза для лівої половини тіла становила 8 Зв., а для правої — 2,4 Зв. У периферичній крові хворого наявний нейтрофільний лейкоцитоз, виражена лім фопенія. Який попередній діагноз?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Підгостра променева хвороба тяжкого ступеня від зовнішнього нерівномірного гамма-нейтронного опромінення

- ☒ b. Гостра променева хвороба від зовнішнього нерівномірного гамма-нейтронного опромінення
- ☐ c. Нейроциркуляторна дистонія
- ☐ d. Хронічна променева хвороба від зовнішнього нерівномірного гамма-нейтронного опромінення
- ☐ e. ВСД за гіпотонічним типом

Питання 133

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

У військовослужбовця за 12 годин після повернення з розвідувальної операції раптово з'явилися блювання, пронос, судоми. Температура тіла — 35,0°C. Стан пацієнта погіршується. До якої сортувальної групи має бути віднесений цей пацієнт на етапі медичної евакуації? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ті, які потребують лише догляду та симптоматичного лікування
- ☐ b. Ті, які підлягають поверненню у підрозділ після надання амбулаторної допомоги
- ☒ c. Небезпечні для оточення
- ☐ d. Ті, які підлягають подальшій евакуації без надання їм медичної допомоги
- ☐ e. Ті, які потребують допомоги на цьому етапі медичної евакуації

Питання 134

Неправильно
Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


До лікарні госпіталізована пацієнтка віком 35 років із безсимптомною макрогематурією. Урологічну патологію заперечує, гематурія розвинулася вперше. Яке інструментальне дослідження треба провести найперше?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Комп'ютерну томографію органів сечової системи
- ☐ b. Цистоскопію
- ☐ c. Цистографію
- ☐ d. Катетеризацію сечового міхура
- ☒ e. Ультразвукове дослідження органів сечової системи

Питання 135

Неправильно
Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У чоловіка віком 57 років із діагнозом: інфаркт міокарда, виник рецидив стискаючого болю за грудниною, з'явилася задишка в спокої та болі у правому підребер'ї. Об'єктивно встановлено: положення ортопное, АТ — 90/60 мм рт. ст., ЧСС — 120/хв, прослуховуються вологі хрипи над нижніми відділами легень та грубий пансистолічний шум у III—IV міжребер'ї ліворуч від грудини, печінка пальпується на 4 см нижче краю реберної дуги. Що обумовило розвиток такої симптоматики у пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інфаркт правого шлуночка
- ☐ б. Розрив сосочкового м'яза
- ☐ в. Гостра аневризма серця
- ☒ г. Розрив стінки лівого шлуночка
- ☐ д. Розрив міжшлуночкової перетинки

Питання 136

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після поранення у ліве стегно, у військовослужбовця виникла кровотеча та сильний біль у рані. Об'єктивно спостерігається: пацієнт на ногу стати не може, кінцівка неприродно зігнута на рівні середньої третини стегна, пульсація тильної артерії стопи збережена. На передній поверхні стегна рана розміром 1х1 см, на задній — 3х5 см. Які найперші дії санінструктора під час надання домедичної допомоги пораненому?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Увести внутрішньом'язово знеболювальний засіб зі шприц-тюбика
- ☐ б. Провести іммобілізацію кінцівки за допомогою підручних засобів
- ☒ в. Зупинити кровотечу з рани
- ☐ г. Накласти асептичну пов'язку
- ☐ д. Дати потерпілому антибіотик з аптечки медичної індивідуальної

Питання 137

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловік віком 62 роки (вага тіла 75 кг) після фізичного навантаження на виробництві відчув біль за грудиною та нестачу повітря. За 2 хвилини втратив свідомість, відбулася зупинка дихання. Об'єктивно спостерігається: пульс на сонних артеріях пальпується. Лікар медпункту розпочав ШВЛ методом «рот до рота». Який дихальний об'єм оптимальний для цього пацієнта? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 100-200 мл
- ☒ b. 500-600 мл
- ☐ c. 1200-1400 мл
- ☐ d. 300-400 мл
- ☐ e. 1000-1200 мл

Питання 138

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловік віком 47 років скаржиться на збільшення температури тіла до 39°C, загальну слабкість, виражену задишку, непродуктивний кашель, відчуття важкості й повноти в правій половині грудної клітки. Об'єктивно встановлено: пацієнт лежить на правому боці, акроціаноз, відставання правої половини грудної клітки в акті дихання, притуплення перкуторного звуку справа до рівня II ребра. Встановіть попередній діагноз. Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Міліарний туберкульоз
- ☒ b. Масивний ексудативний плеврит
- ☐ c. Спонтанний пневмоторакс справа
- ☐ d. Масивний ексудативний перикардит
- ☐ e. Правобічна крупозна пневмонія

Питання 139

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після вибуху бойової гранати постраждалий відчув різучий біль у грудній клітці справа. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 36,6°C, акроціаноз, ЧД — 26/хв. Аускультативно виявлено: справа дихання не вислуховується, зліва — везикулярне, тони серця ритмічні, акцент II тону над легеневою артерією. Пульс — 120/хв, АТ — 110/80 мм рт. ст. Який механізм порушення дихальної функції у пацієнта?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ б. Обмеження рухомості грудної клітини
- ☒ в. Пневмоторакс
- ☐ г. Пригнічення функції дихального центру
- ☐ д. Обструкція дрібних бронхів

Питання 140

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець унаслідок вибухової хвилі отримав сильний удар грудьми об кам'яну брилу. Об'єктивно спостерігається: у постраждалого ціаноз обличчя, акроціаноз, тахіпное до 40/хв., роздуті шийні вени, АТ - 65/40 мм рт. ст., тони серця глухі. Який попередній діагноз?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гемоторакс
- ☐ б. Напружений пневмоторакс
- ☒ в. Тампонада серця
- ☐ г. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ д. Гострий респіраторний дистрес-синдром

Питання 141

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловік віком 34 роки госпіталізований до стаціонару у тяжкому стані. У результаті клініко-лабораторних досліджень встановлено: фруктовий запах із рота, гіпотензія, дегідратація, електролітні порушення, гіперглікемія, кетонурія. Визначте ймовірний діагноз у пацієнта. Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра надниркова недостатність
- ☐ б. Гіперосмолярний гіперглікемічний синдром
- ☐ в. Синдром неадекватної секреції антидіуретичного гормону
- ☒ г. Діабетичний кетоацидоз
- ☐ д. Нецукровий діабет

Питання 142

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка з діагнозом: перелом кісток таза, стегнової та великогомілкової кісток, на другу добу травматичної хвороби виникла немотивована задишка, порушення свідомості, петехіальні висипання на кон'юнктиві та шкірі шиї і грудної клітки. Об'єктивно спостерігається: температура тіла — 39°C, ЧСС — 120/хв. На оглядовій рентгенограмі легень спостерігаються білатеральні інфільтрати. Яке ускладнення виникло у пацієнта?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Жирова емболія
- ☐ б. Нозокоміальна пневмонія
- ☐ в. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ г. Сепсис
- ☐ д. Кардіогенний набряк легень

Питання 143

Неправильно

Балів 0,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У жінки віком 37 років після фізичної перевтоми раптово з'явилося відчуття серцебиття, задишка та тупий біль у ділянці серця. З анамнезу відомо: упродовж 12-ти років перебуває на диспансерному обліку в зв'язку з ревматизмом та мітральною вадою серця без порушень кровообігу. Об'єктивно встановлено: пульс — 96/хв, аритмічний, різного наповнення. АТ — 110/85 мм рт. ст. ЧСС —

120/хв. На ЕКГ спостерігається: замість зубців Р зареєстровані дрібні, різної форми хвилі, інтервали R-R мають різну довжину. Який імовірний діагноз у пацієнтки?
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Екстрасистолія
- ☒ b. Тріпотіння передсердь
- ☐ c. Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія
- ☐ d. Миготлива аритмія
- ☐ e. Шлуночкова пароксизмальна тахікардія

Питання 144

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання


Текст питання

У післяопераційного пацієнта розвинувся інфаркт міокарда та виникла парокси змальна шлуночкова тахікардія. Об'єктивно спостерігається: ЧСС — 150/хв, АТ — 105/70 мм рт. ст. Який антиаритмічний лікарський засіб треба використати?
Виберіть одну відповідь:

- ☒ a. Лідокаїн
- ☐ b. Верапаміл
- ☐ c. Дилтіазем
- ☐ d. Дигоксин
- ☐ e. Дизопірамід

Питання 145

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Військовослужбовець звернувся до лікаря зі скаргами на постійне безсоння, відчуття немотивованої пильності, епізоди «напливу жахливих спогадів», «відчуття провини за те, що вижив». Який психічний розлад розвинувся у пацієнта?
Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Біполярний розлад
- ☐ b. Великий депресивний розлад
- ☐ c. Нейроциркуляторна астенія

- ☒ d. Посттравматичний стресовий розлад
- ☐ e. Невроз нав'язливих станів

Питання 146

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


Чоловік віком 26 років звернувся до лікаря-хірурга зі скаргами на появу пульсуючого утворення до 5 см у діаметрі в правій підпахвовій ділянці. З анамнезу відомо, що 4 місяці тому отримав ножове поранення в цій ділянці. Пульс на артеріях правої руки збережений, але послаблений. Який патологічний стан розвинувся у пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гідраденіт
- ☒ b. Несправжня післятравматична аневризма правої аксілярної артерії
- ☐ c. Абсцес підпахвової ділянки
- ☐ d. Лімфаденіт
- ☐ e. Кіста аксілярної ділянки

Питання 147

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінку віком 28 років, у терміні вагітності 23—24 тижні, госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії пологового будинку. Пацієнтка перебуває в стані геморагічного шоку через вагінальну кровотечу, зумовлену передчасним відшаруванням плаценти. Анамнез зібрати не вдається через тяжкий стан пацієнтки. Зі слів родичів, вагітність перша, протікала без особливостей. Однак вагітна хворіє на артеріальну гіпертензію II ст. Об'єктивно встановлено: свідомість відсутня, пульс ниткоподібний, артеріальний тиск виміряти не вдається. За 2 хвилини після приїзду до лікарні на кардіомоніторі зафіксовано фібриляцію шлуночків. негайно розпочато компресії грудної клітки. Які повинні бути найперші невідкладні дії лікаря?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Уведення окситоцину, електрична дефібриляція
- ☐ b. Переливання резус-сумісної крові
- ☐ c. Проведення медикаментозної кардіоверсії
- ☒ d. Проведення електричної дефібриляції

- ☐ е. Уведення адреналіну, дефібриляція протипоказана

Питання 148

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання


У роділлі з багатоводдям під час положення на спині раптово з'явилися запаморочення, загальна слабкість, миготіння «мушок» перед очима, задишка. Спостерігається зниження АТ до 90/40 мм рт. ст. Для якого патологічного стану характерні такі симптоми?

Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Синдром нижньої порожнистої вени
☐ б. Геморагічний шок
☐ в. Кардіогенний шок
☐ г. Анафілактичний шок
☐ д. Септичний шок

Питання 149

Правильно
Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У приймальному відділенні лікарні чоловік віком 30 років скаржиться на інтенсивний «кинжальний» біль в епігастрії, тошноту та загальну слабкість. Захворів раптово 2 години тому. З анамнезу відомо, що виразкового ураження ПКТ не було. Об'єктивно спостерігається: загальний стан відносно середнього ступеню тяжкості, температура тіла — 37,0°C, пульс — 110/хв, АТ 100/70 мм рт. ст. Живіт в акті дихання участі не бере, напружений. «Печінкова тупість» не визначається. Симптом подразнення брюшини позитивний у всіх відділах. Для якого патологічного стану характерні такі симптоми?


Виберіть одну відповідь:

- ☒ а. Перфорація порожнистого органа. Больовий синдром
☐ б. Гострий панкреатит. Асцит
☐ в. Загострення виразкової хвороби шлунку
☐ г. Гострий апендицит. Локальний перитоніт
☐ д. Розрив аневризми аорти. Геморагічний шок

Питання 150

Правильно

Балів 1,00 з 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік віком 63 роки звернувся до лікаря зі скаргами на біль унизу живота, загальну слабкість та неможливість сечовипускання. З анамнезу відомо, що утруднене сечовипускання пацієнт спостерігає близько 6 місяців, характерна ніктурія. Об'єктивно встановлено: стан задовільний, живіт під час пальпації напружений та болючий внизу, над лобком пальпується еластичне утворення 10x10 см. Симптоми подразнення очеревини — негативні. Встановіть попередній діагноз.

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Правобічна ниркова коліка
- ☐ б. Анурія
- ☐ в. Гострий простатит
- ☒ г. Гостра затримка сечі
- ☐ д. Гострий цистит

[Завершити перегляд](#)

[Пропустити](#) Перехід по тесту

[Перехід по тесту](#)

[Питання 1](#) [На цій сторінці](#) [Питання 2](#) [На цій сторінці](#) [Питання 3](#) [На цій сторінці](#) [Питання 4](#) [На цій сторінці](#) [Питання 5](#) [На цій сторінці](#) [Питання 6](#) [На цій сторінці](#) [Питання 7](#) [На цій сторінці](#) [Питання 8](#) [На цій сторінці](#) [Питання 9](#) [На цій сторінці](#) [Питання 10](#) [На цій сторінці](#) [Питання 11](#) [На цій сторінці](#) [Питання 12](#) [На цій сторінці](#) [Питання 13](#) [На цій сторінці](#) [Питання 14](#) [На цій сторінці](#) [Питання 15](#) [На цій сторінці](#) [Питання 16](#) [На цій сторінці](#) [Питання 17](#) [На цій сторінці](#) [Питання 18](#) [На цій сторінці](#) [Питання 19](#) [На цій сторінці](#) [Питання 20](#) [На цій сторінці](#) [Питання 21](#) [На цій сторінці](#) [Питання 22](#) [На цій сторінці](#) [Питання 23](#) [На цій сторінці](#) [Питання 24](#) [На цій сторінці](#) [Питання 25](#) [На цій сторінці](#) [Питання 26](#) [На цій сторінці](#) [Питання 27](#) [На цій сторінці](#) [Питання 28](#) [На цій сторінці](#) [Питання 29](#) [На цій сторінці](#) [Питання 30](#) [На цій сторінці](#) [Питання 31](#) [На цій сторінці](#) [Питання 32](#) [На цій сторінці](#) [Питання 33](#) [На цій сторінці](#) [Питання 34](#) [На цій сторінці](#) [Питання 35](#) [На цій сторінці](#) [Питання 36](#) [На цій сторінці](#) [Питання 37](#) [На цій сторінці](#) [Питання 38](#) [На цій сторінці](#) [Питання 39](#) [На цій сторінці](#) [Питання 40](#) [На цій сторінці](#) [Питання 41](#) [На цій сторінці](#) [Питання 42](#) [На цій сторінці](#) [Питання 43](#) [На цій сторінці](#) [Питання 44](#) [На цій сторінці](#) [Питання 45](#) [На цій сторінці](#) [Питання 46](#) [На цій сторінці](#) [Питання 47](#) [На цій сторінці](#) [Питання 48](#) [На цій сторінці](#) [Питання 49](#) [На цій сторінці](#) [Питання 50](#) [На цій сторінці](#) [Питання 51](#) [На цій сторінці](#) [Питання 52](#) [На цій сторінці](#) [Питання 53](#) [На цій сторінці](#) [Питання 54](#) [На цій сторінці](#) [Питання 55](#) [На цій сторінці](#) [Питання 56](#) [На цій сторінці](#) [Питання 57](#) [На цій сторінці](#) [Питання 58](#) [На цій сторінці](#) [Питання 59](#) [На цій сторінці](#) [Питання 60](#) [На цій сторінці](#) [Питання 61](#) [На цій сторінці](#) [Питання 62](#) [На цій сторінці](#) [Питання 63](#) [На цій сторінці](#) [Питання 64](#) [На цій сторінці](#) [Питання 65](#) [На цій сторінці](#) [Питання 66](#) [На цій сторінці](#) [Питання 67](#) [На цій сторінці](#) [Питання 68](#) [На цій сторінці](#) [Питання 69](#) [На цій сторінці](#) [Питання 70](#) [На цій сторінці](#) [Питання 71](#) [На цій сторінці](#) [Питання 72](#) [На цій сторінці](#) [Питання 73](#) [На цій сторінці](#) [Питання 74](#) [На цій сторінці](#) [Питання 75](#) [На цій сторінці](#) [Питання 76](#) [На цій сторінці](#) [Питання 77](#) [На цій сторінці](#) [Питання 78](#) [На цій сторінці](#) [Питання 79](#) [На цій сторінці](#) [Питання 80](#) [На цій сторінці](#) [Питання 81](#) [На цій сторінці](#) [Питання 82](#) [На цій сторінці](#) [Питання 83](#) [На цій сторінці](#) [Питання 84](#) [На цій сторінці](#) [Питання 85](#) [На цій сторінці](#) [Питання 86](#) [На цій сторінці](#) [Питання 87](#) [На цій сторінці](#) [Питання 88](#) [На цій сторінці](#) [Питання 89](#) [На цій сторінці](#) [Питання 90](#) [На цій сторінці](#) [Питання 91](#) [На цій сторінці](#) [Питання 92](#) [На цій сторінці](#) [Питання 93](#) [На цій сторінці](#) [Питання 94](#) [На цій сторінці](#) [Питання 95](#) [На цій сторінці](#) [Питання](#)

96 На цій сторінці Питання 97 На цій сторінці Питання 98 На цій сторінці Питання 99 На цій сторінці
Питання 100 На цій сторінці Питання 101 На цій сторінці Питання 102 На цій сторінці Питання 103
На цій сторінці Питання 104 На цій сторінці Питання 105 На цій сторінці Питання 106 На цій сторінці
Питання 107 На цій сторінці Питання 108 На цій сторінці Питання 109 На цій сторінці Питання 110
На цій сторінці Питання 111 На цій сторінці Питання 112 На цій сторінці Питання 113 На цій сторінці
Питання 114 На цій сторінці Питання 115 На цій сторінці Питання 116 На цій сторінці Питання 117
На цій сторінці Питання 118 На цій сторінці Питання 119 На цій сторінці Питання 120 На цій сторінці
Питання 121 На цій сторінці Питання 122 На цій сторінці Питання 123 На цій сторінці Питання 124
На цій сторінці Питання 125 На цій сторінці Питання 126 На цій сторінці Питання 127 На цій сторінці
Питання 128 На цій сторінці Питання 129 На цій сторінці Питання 130 На цій сторінці Питання 131
На цій сторінці Питання 132 На цій сторінці Питання 133 На цій сторінці Питання 134 На цій сторінці
Питання 135 На цій сторінці Питання 136 На цій сторінці Питання 137 На цій сторінці Питання 138
На цій сторінці Питання 139 На цій сторінці Питання 140 На цій сторінці Питання 141 На цій сторінці
Питання 142 На цій сторінці Питання 143 На цій сторінці Питання 144 На цій сторінці Питання 145
На цій сторінці Питання 146 На цій сторінці Питання 147 На цій сторінці Питання 148 На цій сторінці
Питання 149 На цій сторінці Питання 150 На цій сторінці
Показати одну сторінку за разЗавершити перегляд

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

Учасники

Відзнаки

Компетентності

Журнал оцінок

Загальне

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Контрольні тестування

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Секція 9

Секція 10

Секція 11

Секція 12

Секція 13

[Секція 14](#)

[Секція 15](#)

[Особистий кабінет](#)

[Домашня сторінка](#)

[Календар](#)

[Особисті файли](#)

Мої курси

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручняк Оксана Богданівна \(Вийти\)](#)
КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Українська \(uk\)](#)
 - - [English \(en\)](#)
 - [Русский \(ru\)](#)
 - [Українська \(uk\)](#)