

[Перейти до головного вмісту](#)  
Бокова панель  
КРОК-123

(Інтерн БДМУ) Підручняк Оксана Богданівна

П

Особистий кабінетПрофіль користувачаОцінкиПовідомленняУподобанняВийтиПовідомлення  
[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане  
Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане  
Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)


[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

## КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Секція 3](#)
- [2016 весна](#)

Розпочато	Tuesday 14 February 2023 20:36 PM
Стан	Завершено
Завершено	Tuesday 14 February 2023 20:36 PM
Витрачено часу	9 сек
Балів	0,00/200,00
Оцінка	0,00 з 100,00 можливих
Питання 1	

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні звернулася родина (двоє дітей та двоє дорослих), які 2 години тому вживали самостійно зібрані гриби. Усі скаржаться на нудоту, біль у животі, слиновиділення. Лікар діагностував отруєння грибами. Якою повинна бути першочергова допомога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Форсований діурез
- ☐ b. Промивання шлунка
- ☐ c. Парентеральне водне навантаження
- ☐ d. Ентеральне водне навантаження
- ☐ e. Гемодіаліз


Коментар

Правильна відповідь: Промивання шлунка

## Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Породілля 23-х років, на другий день після пологів відчула наростаючий біль в правій нозі, важкість. Об'єктивно: стан хворої середньої важкості. Рс- 100/хв., температура - 37,3оС, тони серця приглушені, ритм синусовий, в легенях дихання везикулярне, 18-20/хв. Ліва нога на всьому протязі набрякла, синюшна, порівняно з правою температура знижена. Пульсація артерій лівої ноги на всьому протязі пальпується, ослаблена. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тромбофлебіт глибоких вен правої нижньої кінцівки, післяпологовий сепсис
- ☐ b. Тромбоемболія стегнової артерії
- ☐ c. Гострий клубово-стегновий флеботромбоз
- ☐ d. Тромбоемболія клубової артерії
- ☐ e. Гострий тромбофлебіт вен правої нижньої кінцівки

Коментар

Правильна відповідь: Гострий клубово-стегновий флеботромбоз

## Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 46-ти років скаржиться на появу протягом двох тижнів випорожнень кров'ю більш за 12 разів на добу, болю в животі, суглобах; болючі висипки у порожнині рота та нижніх кінцівках, набряк колінних та гомілковостопних суглобів, слабкість, підвищення температури тіла понад 39°C, втрату ваги тіла. Який метод обстеження є найбільш інформативним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рентгенологічне дослідження кишечника
- ☐ b. Рентгенографія суглобів
- ☐ c. Загальний аналіз крові
- ☐ d. Ендоскопічне дослідження
- ☐ e. Біопсія кишечника та шкіри


Коментар

Правильна відповідь: Ендоскопічне дослідження

#### Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі 35-ти років відбулися треті термінові нормальні пологи. Загальна крововтрата склала 400 мл, через 1 годину з піхви з'явилося 100 мл кров'янистих виділень із згустками. Які діагностичні заходи необхідно провести для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Визначення висоти стояння дна матки
- ☐ b. Огляд шийки матки в дзеркалах
- ☐ c. Кюретаж порожнини матки
- ☐ d. Зондування порожнини матки
- ☐ e. Загальний аналіз крові

Коментар

Правильна відповідь: Огляд шийки матки в дзеркалах

#### Питання 5

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілих в результаті аварії на нафтопроводі в перші години спостерігаються слюзотеча, збудження, ейфорія, головний біль, нудота, блювання, атаксія, порушення мови та ковтання. Яка тактика невідкладної терапії є найбільш обґрунтованою?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. ШВЛ, оксигенотерапія, кортикостероїди, ліпін
- ☐ б. Промивання шлунку, введення вазелінового масла
- ☐ в. Промивання шлунку, ентеросорбент, аллоксим
- ☐ г. Форсований діурез, куприніл, унітіол
- ☐ д. Промивання шлунку, унітіол, гемодіаліз


Коментар

Правильна відповідь: ШВЛ, оксигенотерапія, кортикостероїди, ліпін

## Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час застілля один з молодих людей, не проковтнувши їжу, почав розповідати історію та раптово поперхнувся. Втратив здатність говорити, спроба відкашлятися ефекту не надала, з'явилося нарастаюче утруднення подиху, ціаноз. Постраждалий в свідомості. Який рекомендований обсяг допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Провести компресію грудної клітки
- ☐ б. Підручними засобами виконати термінову трахеостомію
- ☐ в. Відкрити рота та здійснити спробу видалити стороннє тіло
- ☐ г. Нанести удари по спині та здійснити компресію живота
- ☐ д. Запрокинути голову, відкрити рота, висунути нижню щелепу

Коментар

Правильна відповідь: Нанести удари по спині та здійснити компресію живота

## Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В аеропорт прибув літак із ендемічної по холері країни. Лікар санітарно-карантинного пункту аеропорту при огляді літака виявив хворого громадянина України з діареєю. Пізніше був підтверджений діагноз холера. Особи, які знаходились в контакті з хворим на холеру підлягають: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ізоляції вдома
- ☐ б. Госпіталізації в інфекційний стаціонар
- ☐ в. Розміщенню в ізоляторі з обов'язковим проведенням превентивного лікування
- ☐ г. Госпіталізації у провізорний стаціонар
- ☐ д. Медичному нагляду протягом 5-ти діб


Коментар

Правильна відповідь: Розміщенню в ізоляторі з обов'язковим проведенням превентивного лікування

## Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 8-ми років, катаючись на ковзанах на річці, несподівано провалився під лід. Після вилучення з води: шкіра ціанотична, холодна, не дихає, Рс- 36/хв. Які першочергові заходи необхідно провести?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Загальне зігрівання
- ☐ б. Вливання до рота гарячого напою
- ☐ в. Непрямий масаж серця
- ☐ г. Штучне дихання
- ☐ д. Транспортування до лікарні

Коментар

Правильна відповідь: Штучне дихання

## Питання 9

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 5-ти років через 8-10 хвилин після укусу бджоли з'явилися занепокоєння, гіперемія і свербіж шкіри обличчя, нудота, захриплість голосу, свистяче дихання, сплутаність свідомості, блідість, пітливість. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Кропивниця
- ☐ б. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ в. Анафілактичний шок
- ☐ г. Гострий стенозуючий ларингіт
- ☐ д. набряк Квінке


Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

## Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При проведенні реанімаційних заходів дитині 5-ти років із зупинкою кровообігу у позалікарняних умовах було інтубовано трахею, але венозний доступ відсутній. Який лікарський засіб може бути введено ендотрахеально?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Хлорид кальцію
- ☐ б. Атропін
- ☐ в. Гідрокарбонат натрію
- ☐ г. Бретиліум
- ☐ д. Трісамін


Коментар

Правильна відповідь: Атропін

## Питання 11

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 11-ти років грала у футбол та під час падіння отримала травму. Встановлено попередній діагноз: закритий вивих правого передпліччя. Який обсяг допомоги повинен надати лікар на місці пригоди?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Знеболювання, транспортна іммобілізація косинкою
- ☐ б. Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною
- ☐ в. Знеболювання, спроба вправлення вивиху
- ☐ г. Косинкова пов'язка на праву верхню кінцівку
- ☐ д. Восьмиподібна пов'язка на правий ліктьовий суглоб


Коментар

Правильна відповідь: Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною

## Питання 12

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 15-ти років скарги на відчуття серцебиття, слабкість, які виникли раптово 40 хвилин тому, такі напади відбувались раніше і закінчувалися раптово за декілька хвилин. Викликана бригада швидкої допомоги, при огляді ЧСС до 220/хв., АТ- 115/68 мм рт.ст., стан стабільний. Яке обстеження має бути виконано терміново?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Кліно-ортостатична проба
- ☐ б. Проби Ашнера і Вальсальви
- ☐ в. ЕКГ
- ☐ г. Доплер ЕхоКГ
- ☐ д. Холтеровське моніторування


Коментар

Правильна відповідь: ЕКГ

## Питання 13

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після бою солдат зі зниженою руховою активністю, постійно згадує бій, момент, коли впритул застрелив ворога. Вночі спав погано, постійно просинався від жахів в яких він бачив бойові дії, обличчя вбитого ним. Визначте вид посттравматичної стресової реакції, яка розвинулась у солдата?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Депресія
- ☐ b. Уникання
- ☐ c. Гіперреактивність
- ☐ d. Галюциноз
- ☐ e. Інтрузія


Коментар

Правильна відповідь: Інтрузія

#### Питання 14

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При проведенні закритого масажу серця людини 76-ти років, що знаходиться у стані клінічної смерті, необхідно здійснювати компресії з частотою:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Не менше 120 на 1 хвилину
- ☐ b. Не менше 60 на 1 хвилину
- ☐ c. Не менше 40 на 1 хвилину
- ☐ d. Не менше 80 на 1 хвилину
- ☐ e. Не менше 100 на 1 хвилину

Коментар


Правильна відповідь: Не менше 100 на 1 хвилину

#### Питання 15

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00





Відмітити питання

Текст питання

На фоні гіпертермії та сильного головного болю в дитини 5-ти років виникли зорові галюцинації жахливого змісту, марення, дезорієнтація. Шкіра гіперемована, з дрібною висипкою, рожевого кольору. Шкіра носо-губного трикутника бліда, ознаки напруження м'язів потилиці, симптоми Керніга, Брудзинського, пожвавлення рефлексів без різниці між сторонами. Який діагноз можна припустити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Деліріозний синдром при алергічному захворюванні
- ☐ б. Деліріозний синдром при отруєнні їжею
- ☐ в. Коревий менінгіт із деліріозним синдромом
- ☐ г. Деліріозний синдром при черепно мозковій травмі
- ☐ д. Менінгококовий менінгіт з деліріозним синдромом


Коментар

Правильна відповідь: Коревий менінгіт із деліріозним синдромом

## Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий вдома вчинив суїцидальну спробу через повішення. Витягнутий із петлі через 2 хвилини. Свідомість відсутня, проте є виражене локомоторне збудження, періодично виникають короточасні судоми. Проте рухи збережені в усіх кінцівках. Дихання часте, інспіраторна ядуха. Ціаноз виражений помірно. Тахікардія до 110/хв. АТ- 170/100 мм рт.ст. Що потрібно зробити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ввести сибазон, проводити ШВЛ
- ☐ б. Ввести дихальні аналептики (кордіамін)
- ☐ в. Негайно знизити артеріальний тиск
- ☐ г. Негайно почати масаж серця
- ☐ д. Ввести еуфілін, дати кисень

Коментар

Правильна відповідь: Ввести сибазон, проводити ШВЛ

## Питання 17

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної жінки у терміні 36 тижнів раптово з'явився біль в епігастральній ділянці, блювання кавовою гущею. Після обстеження встановлений діагноз: вагітність 1, 36 тижнів, прееклампсія важкого ступеня, HELLP-синдром. Тактика ведення вагітної: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Стимуляція пологової діяльності
- ☐ б. Дезінтоксикаційна терапія
- ☐ в. Гемостатична терапія
- ☐ г. Термінове оперативне розродження
- ☐ д. Інтенсивна терапія прееклампсії

Коментар

Правильна відповідь: Термінове оперативне розродження

## Питання 18

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікаря швидкої допомоги викликали до дитини в віці 1 рік, що раптово посиніла та стала задихатися. Лікар застав дитину серед розсипаних дрібних предметів (гудзики, квасоля і так далі). Стан дитини мало відрізняється від звичайного, продовжує грати. Ознак дихальної недостатності немає. Які дії лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Оглянути дитині ротову порожнину, не дивлячись на його опір
- ☐ б. Постукати по спині і стимулювати кашель
- ☐ в. Заспокоїти мати і сказати, що дитині нічого не загрожує і такі напади у дітей бувають
- ☐ г. Залишити під спостереженням батьків
- ☐ д. Провести аускультацию і перкусію органів грудної порожнини та доставити дитину в стаціонар

Коментар

Правильна відповідь: Провести аускультацию і перкусію органів грудної порожнини та доставити дитину в стаціонар

## Питання 19

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При огляді у новонародженої дитини шкіра ціанотична, неритмічне дихання, ЧСС- 0/хв., зниження м'язового тону, виражене ослаблення рефлексів. Перший етап реанімації слід розпочати з: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Відновлення прохідності дихальних шляхів
- ☐ b. Введення розчину адреналіну
- ☐ c. Оксигенотерапії
- ☐ d. Закритого масажу серця
- ☐ e. Е.Штучної вентиляції легень

Коментар

Правильна відповідь: Відновлення прохідності дихальних шляхів

## Питання 20

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта 40-ка років, який впродовж 17-ти років хворіє на неспецифічний виразковий коліт, при останньому ендоскопічному дослідженні виявлено множинні запальні псевдополіпи у всіх відділах товстої кишки. Результати біопсії показали наявність в поліпах дисплазії II-III ст. Яке лікування необхідно застосувати в даного хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Трансендоскопічне видалення поліпів
- ☐ b. Рентгенотерапія
- ☐ c. Хірургічне
- ☐ d. Хіміотерапія
- ☐ e. Медикаментозне

Коментар

Правильна відповідь: Хірургічне

## Питання 21

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної в 32 тижні після падіння при об'єктивному обстеженні лікарем швидкої допомоги виявлено: матка в гіпертонусі, шкіра бліда, АТ - 90/60 мм рт.ст., Рс - 105/хв., частота дихання - 22/хв. Вагітна занепокоєна і вказує на локальний біль біля пупка. В якому положенні слід проводити інфузійну терапію під час транспортування до стаціонару?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Положення не має значення
- ☐ б. 3 припіднятим головним кінцем
- ☐ с. 3 опущеним головним кінцем
- ☐ d. Положення на лівому боці з припіднятими ногами
- ☐ е. На спині з припіднятими ногами


Коментар

Правильна відповідь: Положення на лівому боці з припіднятими ногами

## Питання 22

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий поступив у клініку у вкрай важкому стані: кінцівки холодні, акроціаноз, шкіра і слизові сухі, темні кола навколо очей, повторне блювання, живіт безболісний, АТ- 40/0 мм рт.ст., багаторазові водянисті випорожнення без домішок. Діагноз: холера. Вкажіть ступінь зневоднення:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. II
- ☐ б. V
- ☐ с. III
- ☐ d. IV
- ☐ е. I

Коментар

Правильна відповідь: IV

## Питання 23

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 15-річного хлопчика діагностовано бубонну форму чуми. Які антибактеріальні препарати слід призначити дитині?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Пеніцилін або цефотаксим
- ☐ b. Бісептол або сульфален
- ☐ с. Стрептоміцин або хлорамфенікол
- ☐ d. Тетрациклін або доксициклін
- ☐ е. Гентаміцин або нетроміцин


Коментар

Правильна відповідь: Стрептоміцин або хлорамфенікол

## Питання 24

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Новонароджений в стані апное з ціанозом. Після відновлення прохідності дихальних шляхів та проведення стимуляції і вентиляції під позитивним тиском протягом 30 секунд самостійне дихання не з'явилося. На 60 секунд ЧСС становить 45/хв. Подальші лікувальні дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Подальше спостереження за станом
- ☐ b. Розпочати введення адреналіну
- ☐ с. Розпочати непрямий масаж серця
- ☐ d. Розпочати непрямий масаж серця та продовжувати вентиляцію під позитивним тиском
- ☐ е. Продовжувати вентиляцію під позитивним тиском

Коментар

Правильна відповідь: Розпочати непрямий масаж серця та продовжувати вентиляцію під позитивним тиском

## Питання 25

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої доношеної дитини віком 2 дні розвинулося багаторазове блювання з домішками жовчі, наростає здуття живота. Меконіальний стілець відсутній від народження, гази не відходять. Об'єктивно: живіт різко здутий, виражена венозна сітка на передній черевній стінці, контуруються роздуті петлі кишечника, після очисної клізми стул та гази не відходять. Рентгенологічно виявляються розширені та заповнені газом петлі товстої кишки. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Перитоніт новонароджених
- ☐ б. Вроджена низька непрохідність кишок
- ☐ в. Адрено-генітальний синдром
- ☐ г. Виразково-некротичний ентероколіт новонародженого
- ☐ д. Вроджена висока непрохідність кишок


Коментар

Правильна відповідь: Вроджена низька непрохідність кишок

## Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 45-ти років на міському пляжі у спекотну погоду раптово втратив свідомість. Об'єктивно: зіниці звужені, реакцій на легкі подразники немає, шкіра бліда, температура тіла - 39,0°C, частота дихань - 28/хв., АТ-100/60 мм рт.ст., пульс ниткоподібний, ритмічний, 100/хв. Спостерігаються періодичні судоми кінцівок. Яка причина вказаного стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Сонячний удар
- ☐ б. Гострий інфаркт міокарду
- ☐ в. Анафілактичний шок
- ☐ г. Теплова непритомність
- ☐ д. Гостре порушення мозкового кровообігу


Коментар

Правильна відповідь: Сонячний удар

## Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 36-ти років скаржиться на неможливість самотійного сечовипускання при наявності покликів. 3 години тому - падіння в каналізаційний люк з забоем промежини. Об'єктивно: виділення крові з зовнішнього отвору сечівника, помірно виражена гематома промежини. Ознаків переломів немає. Яка подальша лікувальна тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Однократна катетеризація
- ☐ б. Встановлення постійного катетера
- ☐ в. Пункційна цистостомія
- ☐ г. Стимуляція діурезу
- ☐ д. Відкрите накладення цистостоми


Коментар

Правильна відповідь: Пункційна цистостомія

## Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 40-ка років скаржиться на інтенсивні болі в горлі при ковтанні, виражену задишку, що посилюється у горизонтальному положенні і супроводжується нападами задухи. При непрямій ларингоскопії виявлений абсцес надгортанника. Відділи гортані розташовані нижче оглянути не вдається. Від трахеотомії хворий категорично відмовився. На висоті чергового нападу задухи розвинулися ціаноз, судоми та наступила зупинка дихання. Яку першочергову допомогу слід надати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Штучна вентиляція легенів методом з роту в рот
- ☐ б. Інтубація трахеї
- ☐ в. Ендоларингеальне розкриття абсцесу під контролем прямої ларингоскопії
- ☐ г. Трахеотомія
- ☐ д. Конікотомія

Коментар

Правильна відповідь: Конікотомія

## Питання 29

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 36-ти років відбулися патологічні пологи на фоні прееклампсії. В анамнезі - вірусний гепатит А. Після гіпотонії матки, кровотечі та трансфузії еритроцитарної маси іншої групи з'явилися наступні ознаки: істеричність шкіри та склер, гематурія, геморагії, лихоманка, болі в попереку. Назвіть головну причину цих симптомів:  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гіпертензія
- ☐ б. Післягеморагічна анемія
- ☐ в. Гепатит в анамнезі
- ☐ г. Гострий внутрішньосудинний гемоліз
- ☐ д. Гострий пієлонефрит

Коментар

Правильна відповідь: Гострий внутрішньосудинний гемоліз

## Питання 30

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікар швидкої допомоги, приїхавши на місце ДТП, діагностував закритий перелом правого стегна в середній третині. Яким повинен бути обсяг допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Іммобілізація трьома шинами Крамера до пахвинної ділянки
- ☐ б. Знеболення наркотичними препаратами, фіксація пошкодженої кінцівки до здорової
- ☐ в. Іммобілізація трьома шинами Крамера до кульшового суглоба
- ☐ г. Знеболення, іммобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія
- ☐ д. Знеболення введенням в місце перелому 1% р-ну новокаїну, іммобілізація шиною Дітеріхса, внутрішньовенне введення розчинів

Коментар


Правильна відповідь: Знеболення, іммобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія

## Питання 31

Відповіді не було



Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 7-ми років внаслідок падіння з турніка виник біль у лівому підребер'ї. При ультразвуковому дослідженні є підозра на розрив селезінки у воріт та кровотечу. Який метод лікування показаний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Спленектомія
- ☐ б. Динамічне спостереження за хворим
- ☐ в. Лапаротомія, перев'язка артерії селезінки
- ☐ г. Переливання еритроцитарної маси
- ☐ д. Лапароцентез, страхувальний дренаж


Коментар

Правильна відповідь: Спленектомія

## Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 30-ти років госпіталізований без свідомості. Зі слів родичів отримує інсулін пролонгованої дії 28 ОД вранці та 14 ОД ввечері. Раптово втратив свідомість. Судоми. Шкіра волога, тонус м'язів підвищений, очні яблука без змін. Рс- 96/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст. Язик вологий. Менінгеальні симптоми відсутні. Яка терапія необхідна в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Введення інсуліну короткої дії внутрішньовенно
- ☐ б. Введення 4% гідрокарбонату натрію внутрішньовенно
- ☐ в. Введення 40% розчину глюкози внутрішньовенно
- ☐ г. Введення гідрокортизону внутрішньовенно
- ☐ д. Введення адреналіну підшкірно


Коментар

Правильна відповідь: Введення 40% розчину глюкози внутрішньовенно

## Питання 33

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До медичної роти доставлено постраждалого з тяжким вогнепальним пораненням нижньої третини правого стегна. Кістка роздроблена. Магістральні судини пошкоджені. Кінцівка висить на клапті м'яких тканин. До якого виду медичної допомоги відноситься проведення відсікання кінцівки, яка висить на клапті м'яких тканин?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кваліфікована медична допомога
- ☐ b. Спеціалізована медична допомога
- ☐ c. Перша медична допомога
- ☐ d. Перша лікарська допомога
- ☐ e. Долікарська (фельдшерська) медична допомога


Коментар

Правильна відповідь: Перша лікарська допомога

#### Питання 34

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини на третю добу життя з'явилися ознаки шлунково-кишкової кровотечі (блювання з домішками крові, мелена), постгеморагічної анемії. З якого розчину слід розпочати парентеральне лікування геморагічного синдрому у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Реополіглюкін
- ☐ b. Тромбоцитарна маса
- ☐ c. Глюкозо-сольовий розчин
- ☐ d. Амінокапронова кислота
- ☐ e. Свіжозаморожена плазма


Коментар

Правильна відповідь: Свіжозаморожена плазма

#### Питання 35

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Робітник АЕС змушений тимчасово залишатися на забрудненій радіоактивними речовинами місцевості. Які заходи необхідно йому вжити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Самостійно виконати евакуацію
- ☐ б. Одягнути чоботи, рукавички та комбінезон
- ☐ в. Герметизація приміщення та дезактивація внутрішніх поверхонь
- ☐ г. Не виконувати жодних дій до проведення масової евакуації
- ☐ д. негайно одягнути респіратор та провітрити приміщення


Коментар

Правильна відповідь: Герметизація приміщення та дезактивація внутрішніх поверхонь

### Питання 36

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілого 36-ти років, що переніс закриту черепно-мозкову травму, в процесі проведення ехоенцефалоскопії виявлено зміщення серединного еха на 5 мм. Про що це свідчить?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тріщина кісток склепіння черепа
- ☐ б. Ехо-ЕС патології не виявила
- ☐ в. Перелом основи черепа
- ☐ г. Травматичний субарахноїдальний крововилив
- ☐ д. Наявність підоболонкової гематоми

Коментар

Правильна відповідь: Наявність підоболонкової гематоми

### Питання 37

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На хімічному комбінаті 7 чоловік отримали отруєння невідомою речовиною. Доставлені до токсикологічного відділення в коматозному стані. Об'єктивно: мідріаз, зіниці на світло не реагують, арефлексія, повторне блювання, мимовільне сечовипускання, судоми, ціаноз,  $t_{\text{о}} - 35^{\circ}\text{C}$ , ЧД - 8-10/хв., дихання глибоке, АТ - 80/40 мм рт.ст. Яку антидотну терапію слід застосувати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Розчин хромосмону внутрішньовенно
- ☐ б. Унітіол внутрішньом'язово
- ☐ в. Тетацин-кальцію внутрішньовенно
- ☐ г. 5% розчин етанолу внутрішньовенно
- ☐ д. Тіосульфат натрію внутрішньовенно


Коментар

Правильна відповідь: 5% розчин етанолу внутрішньовенно

### Питання 38

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого під час операції на шлунку було ушкоджено селезінкову артерію, в результаті чого виникла масивна кровотеча, яка призвела до зупинки кровообігу. Найдоцільніше проводити: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Електрокардіостимуляцію
- ☐ б. Введення гідрокортизону
- ☐ в. Абдомінальну компресію
- ☐ г. Прямий масаж серця
- ☐ д. Непрямий масаж серця

Коментар

Правильна відповідь: Прямий масаж серця

### Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні бригадою ШМД доставлено жінку 32-х років. З анамнезу: протягом останніх 2-х років перебувала на диспансерному обліку з приводу аутоімунної гемолітичної анемії. Об'єктивно: стан середньої важкості, температура - 37, 3оС, шкіра лимонножовтого кольору, Рс- 98/хв., АТ- 80/55 мм рт.ст., збільшена селезінка. У крові: ер.- 2,6х10<sup>12</sup>/л, Нб- 70 г/л, КП- 0,94, лейкоц.- 6,1х10<sup>9</sup>/л, ШОЕ- 19 мм/год, непрямий білірубін - 58 мкмоль/л. Що необхідно призначити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Преднізолон
- ☐ б. Інтерферон
- ☐ в. Еритроцитарна маса
- ☐ г. Трансфузія консервованої крові
- ☐ д. Ферум-лек


Коментар

Правильна відповідь: Преднізолон

#### Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років після аварії на виробництві був госпіталізований із скаргами на металевий присмак та печіння у роті, нудоту, слинотечу, багаторазове блювання, пронос з домішками слизу та крові, біль у епігастральній та поперековій ділянках. Об'єктивно: стан важкий, виразковий стоматит, гінгівіт, некроз слизової оболонки носа, набряк гортані. АТ- 150/100 мм рт.ст., Рс- 48/хв., тони серця глухі. Поліурія, гіпостенурія, альбумінурія, гематурія. Який антидот слід ввести хворому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Атропіну сульфат
- ☐ б. Антарсин
- ☐ в. Дієтиоксим
- ☐ г. Унітіол
- ☐ д. Хромосмон

Коментар

Правильна відповідь: Унітіол

#### Питання 41

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10-ти років на тлі введення гепарину з приводу геморагічного васкуліту різко погіршився стан: АТ-70/30 мм рт.ст., блювота, посилились болі в животі. Запідозрено крововилив у наднирники. Яка тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ввести знеболюючі засоби
- ☐ б. Ввести великі дози метилпреднізолону
- ☐ в. Зменшити дозу гепарину
- ☐ г. Ввести протаміну сульфат
- ☐ д. Почати інфузію допаміну

Коментар

Правильна відповідь: Ввести великі дози метилпреднізолону

## Питання 42

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У відділення реанімації бригадою швидкої допомоги доставлена дитина 3-х років у непритомному стані. Під час проведення штучного дихання та непрямого масажу серця на ЕКГ реєструється шлуночкова брадикардія 50/хв. Якому із наведених медикаментозних заходів необхідно надати перевагу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Електрична дефібриляція серця
- ☐ б. Внутрішньовенне введення гідрокарбонату натрію
- ☐ в. Внутрішньовенне введення атропіну
- ☐ г. Внутрішньовенне введення адреналіну
- ☐ д. Електрична дефібриляція серця + введення адреналіну


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне введення атропіну

## Питання 43

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Сімейного лікаря викликали до хлопчика 5-ти років, що хворіє на епілепсію. За 3 дні до того батьки самостійно відмінили протисудомні препарати. Об'єктивно у дитини клоніко-тонічні генералізовані судоми, свідомість відсутня. Шкіра бліда, волога. Дихання аритмічне, тахікардія. Зіниці звужені. Що в першу чергу повинен зробити лікар?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Призначити серцеві глікозиди
- ☐ б. Ввести протисудомні препарати парентерально
- ☐ в. Викликати машину швидкої медичної допомоги
- ☐ г. Ввести дихальні аналептики
- ☐ д. Проводити серцево-легеневу реанімацію


Коментар

Правильна відповідь: Ввести протисудомні препарати парентерально

#### Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому 32-х років необхідне переливання еритроцитарної маси. При визначенні групової належності крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВ0 аглютинація спостерігалась в краплях з сироватками 0 (I), A (II) та B (III). Кров якої групи потрібно перелити пацієнту?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 0 (I)
- ☐ б. АВ (IV)
- ☐ в. А (II)
- ☐ г. В (III)


Коментар

Правильна відповідь: АВ (IV)

#### Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 57-ми років раптово з'явився біль розпираючого характеру в лівій гомілці. Підвищилася температура тіла до 38°C. Захворіла три дні тому. Об'єктивно: шкіра лівої ступні та гомілки помірно ціанотична, блищить. Ліва ступня та гомілка помітно збільшені в об'ємі. Окружність лівої гомілки більша окружності правої на 4 см. Пальпація литкового м'язу болюча. Симптом Хоманса позитивний. Пульсація на дистальних артеріях лівої стопи ослаблена. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Неврит сідничного нерва
- ☐ b. Гострий тромбоз вен лівої гомілки
- ☐ c. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен
- ☐ d. Гострий артеріальний тромбоз
- ☐ e. Хвороба Бюргера


Коментар

Правильна відповідь: Гострий тромбоз вен лівої гомілки

#### Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 40-ка років доставлено до приймального відділення. Відзначається запах алкоголю з рота, відкривання очей та мовні відповіді відсутні, нецілеспрямований рух на біль. Об'єктивно: дихання часте (>40/хв.), поверхневе, АТ-90/40 мм рт.ст., Рс- 112/хв. Що треба зробити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Позаниркові методи детоксикації (гемодіаліз, гемосорбція)
- ☐ b. Інтубація трахеї
- ☐ c. Форсований діурез
- ☐ d. Внутрішньовенно бемегрид
- ☐ e. Зондове промивання шлунку


Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї

#### Питання 47



Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 43-х років викликав швидку медичну допомогу. Скаржиться на різкий біль у лівій половині живота з іррадіацією в ліву ногу. В анамнезі сечокам'яна хвороба. Об'єктивно: шкіра бліда, Рс-100/хв., АТ- 160/90 мм рт.ст. Симптом Пастернацького різко позитивний зліва. Почати лікування найбільш доцільно із призначення:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Уролесан перорально
- ☐ b. Морфін внутрішньовенно
- ☐ c. Спазмалгон перорально
- ☐ d. Баралгін внутрішньовенно
- ☐ e. Анальгін внутрішньом'язово

Коментар

Правильна відповідь: Баралгін внутрішньовенно

## Питання 48

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 25-ти років була доставлена у гінекологічне відділення, вагітність 19 тижнів. Скарги на болі внизу живота, переймоподібного характеру, через деякий час після їх початку з'явилися кров'яністі виділення з піхви. При огляді розміри матки відповідають терміну вагітності, церві кальний канал дещо відкритий, шийка матки сформована, розм'якшена. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Аборт в ходу
- ☐ b. Загрозливий аборт
- ☐ c. Позаматкова вагітність
- ☐ d. Неповний аборт
- ☐ e. Завмерла вагітність

Коментар

Правильна відповідь: Загрозливий аборт

## Питання 49

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Для профілактики гнійносептичних ускладнень при постановці катетера у центральні та периферійні вени потрібно:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення тромболітичних препаратів
- ☐ б. Застосовувати при інфузії автоматичні дозатори
- ☐ в. Щоденний догляд та асептичні перев'язки
- ☐ г. Зрошення розчином антибіотиків місця знаходження катетера
- ☐ ґ. Не застосовувати білкових препаратів

Коментар

Правильна відповідь: Щоденний догляд та асептичні перев'язки

## Питання 50

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років надійшов до приймально-діагностичного відділення з попереднім діагнозом: защемлена пупкова кіла. Під час обстеження раптово зблід, втратив свідомість. Дихання відсутнє. Пульсація на магістральних артеріях припинилася 30 секунд тому. Зіниці розширені, на світло не реагують. З чого треба розпочати реанімаційні заходи?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Електродефібриляція
- ☐ б. Прекардіальний удар
- ☐ в. Закритий масаж серця
- ☐ г. Штучне дихання
- ☐ ґ. Медикаментозна терапія

Коментар

Правильна відповідь: Закритий масаж серця

## Питання 51

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після введення ампіциліну у хворої на сальпінгіт, в області рук з'явилися еритематозно-бульозні висипки, шкіра відторгається значними шарами по типу рукавичок. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Синдром Лайела
- ☐ b. Алергічний дерматит
- ☐ c. Епідермофітія
- ☐ d. Генералізований кандидоз
- ☐ e. Екзема


Коментар

Правильна відповідь: Синдром Лайела

## Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 28-ми років, з Анголи, госпіталізований в лікарню із скаргами на сильний кашель та задуху, проноси, кровохаркання. Протягом року відмічав пережну гарячку, значну пітливість з профузними нічними потами, різку загальну слабкість. Місяць тому появився тривалий пронос, у калі є домішки слизу і крові. Об'єктивно: стан тяжкий, температура тіла - 40°C, кахексія. На лівому оці виявлена пухлина на рогівці. Шкіра та слизові оболонки бліді. Який діагноз найбільш імовірний у цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. ВІЛ-інфекція
- ☐ b. Криптоспоридіоз
- ☐ c. Сепсис
- ☐ d. Пре-СНІД
- ☐ e. СНІД, генералізована форма


Коментар

Правильна відповідь: СНІД, генералізована форма

## Питання 53

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора на варикозну хворобу нижніх кінцівок впала. Виникла сильна кровотеча із варикозно розширеного вузла в середній третині лівої гомілки. Як зупинити кровотечу на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Накласти джгут нижче місця ушкодження
- ☐ b. Накласти стискаючу пов'язку на місце ушкодження
- ☐ c. Накласти джгут вище місця ушкодження
- ☐ d. Накласти стискаючу пов'язку вище місця ушкодження
- ☐ e. Накласти джгут на місце ушкодження


Коментар

Правильна відповідь: Накласти стискаючу пов'язку на місце ушкодження

## Питання 54

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 16-ти років скаржиться на затримку сечі та різкий біль в надлобковій ділянці. Відомо, що дитина лікувалась в нефрологічному відділенні з приводу гіперурікемії та уролітіазу. Під час обстеження пальпується напружений сечовий міхур в надлобковій ділянці. Викликано ШМД. Яка має бути тактика ведення цього пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 2% розчин но-шпи внутрішньом'язово
- ☐ b. Парацетамол внутрішньо
- ☐ c. Фенобарбітал внутрішньо
- ☐ d. 50%розчин анальгін у внутрішньом'язово
- ☐ e. 0,5% розчин седуксену внутрішньом'язово

Коментар

Правильна відповідь: 2% розчин но-шпи внутрішньом'язово

## Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час транспортування хворого реанімаційною бригадою в лікарню настигла раптова зупинка серця. За який термін часу людині без будь-яких видимих ознак життя і за відсутності каротидного пульсу необхідно почати серцево-легеневу реанімацію для профілактики мозкового дефіциту? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 3 хвилини
- ☐ b. 15 хвилин
- ☐ c. 10 секунд
- ☐ d. 5 хвилин
- ☐ e. 60 секунд


Коментар

Правильна відповідь: 10 секунд

## Питання 56

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнту 65-ти років, який хворіє облітеруючим атеросклерозом судин нижніх кінцівок, виконали операцію - ампутації ноги на рівні н/3 стегна. В зв'язку з вираженим больовим синдромом в післяопераційному періоді хворому тричі вводився омнопон. Які ускладнення можуть виникнути у хворого в зв'язку з використанням великих доз наркотичних анальгетиків? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра ниркова недостатність
- ☐ b. Гостра печінкова недостатність
- ☐ c. Фібриляція шлуночків серця
- ☐ d. Зупинка серця
- ☐ e. Зупинка дихання

Коментар

Правильна відповідь: Зупинка дихання

## Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На місці пригоди один реаніматолог розпочинає реанімаційні заходи. Яке співвідношення частоти непрямого масажу серця до частоти штучного дихання необхідно обрати в даному випадку? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 30:2
- ☐ b. 7:1
- ☐ c. 10:2
- ☐ d. 4:1
- ☐ e. 5:1


Коментар

Правильна відповідь: 30:2

## Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 58-ми років багато років зловживає алкоголем, на даний час має справжні запої, останній із яких закінчився два дні тому. Скаржиться на безсоння, тривогу, слабкість. Об'єктивно: тремор всього тіла, дезорієнтований, вважає, що він у в'язниці. Бачить навколо величезних пацюків, відчуває, як вони вгризаються йому в ноги, настрій нестійкий: то сміється, то плаче, часто впадає в напівсонний стан. Мова нерозбірлива, переходить в бубоніння. Соматичний стан важкий. Яке лікування є найбільш доцільним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Антигістамінні + коректори
- ☐ b. Галоперидол + аміназин
- ☐ c. Інтенсивна детоксикація + седуксен
- ☐ d. Препарати вісмуту + антибіотики
- ☐ e. Аміназин + діуретики

Коментар

Правильна відповідь: Інтенсивна детоксикація + седуксен

## Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого на епілепсію в стаціонарі виник статус генералізованих тоніко-клонічних випадків. Який з немедикаментозних заходів може бути використаний для покращення стану хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Краніо-церебральна гіпотермія
- ☐ b. Су-джок терапія
- ☐ c. Магнітотерапія
- ☐ d. Електрофорез комірцевої зони
- ☐ e. Бальнеотерапія


Коментар

Правильна відповідь: Краніо-церебральна гіпотермія

## Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчинки 3-х тижнів з'явилося блювання після кожного годування. Вага при народженні 3200 г, під час огляду - 3000 г. При огляді підшкірножирова клітковина відсутня на животі, тулубі.

Еластичність, тургор тканин знижені. Визначається перистальтика шлунка. Стул "голодний".

Лікарем виставлено попередній діагноз пілоростеноз. Яка подальша тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Госпіталізація у відділення дитячої хірургії
- ☐ b. Призначення корекції харчування
- ☐ c. Призначення метоклопраміду
- ☐ d. Призначення оральної регідrataції
- ☐ e. Госпіталізація у педіатричне відділення

Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація у відділення дитячої хірургії

## Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінці 28-ми років виконано кесарів розтин за показаннями слабкості пологової діяльності. Під час операції крововтрата склала 1200 мл та була негайно відновлена переливанням еритроцитарної маси у кількості 350 мл, плазми - 800 мл, кристалоїдів - 1500 мл. Після операції виведена сеча у кількості 150 мл бурого кольору. При лабораторному дослідженні у сечі кров'яний детрит. Яке виникло ускладнення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ушкодження сечоводу
- ☐ b. Переливання несумісної крові
- ☐ c. Ускладнень немає
- ☐ d. Ушкодження сечового міхура
- ☐ e. Характеризує початок розвитку ДВЗ-синдрому


Коментар

Правильна відповідь: Переливання несумісної крові

## Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого після автомобільної аварії з'явилися скарги на різку задишку, кашель з кров'ю. Об'єктивно: шкіра бліда, ціанотична. Підшкірна емфізема в ділянці грудної клітки, живота, шиї справа. Аускультативно: справа дихання не вислуховується. Рс-130/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., Нt-0,25, Нb-88 г/л. Які першочергові заходи лікаря на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди
- ☐ b. Активна аспірація повітря справа
- ☐ c. Негайна штучна вентиляція легень
- ☐ d. Дофамін 2-5 мкг/кг/хв., інфузія колоїдних розчинів
- ☐ e. Трансфузія еритромаси відповідно до групової і резусної належності

Коментар


Правильна відповідь: Активна аспірація повітря справа

## Питання 63

Відповіді не було



Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 30-ти років в ході огляду в поліклініці терапевтом виявлено ножове поранення правої половини живота. Живіт м'який, біль відсутній. В крові: Нb- 140 г/л, лейкоц.- 6,8х10<sup>9</sup>/л. Яку тактику слід обрати лікарю?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Направити постраждалого до хірургічного стаціонару
- ☐ b. Направити на планове лікування до хірургічного відділення
- ☐ c. Призначити рентгенографію органів черевної порожнини
- ☐ d. Призначити УЗД органів черевної порожнини
- ☐ e. Амбулаторне лікування


Коментар

Правильна відповідь: Направити постраждалого до хірургічного стаціонару

## Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У породіллі 16-ти років почалась гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Об'єм крововтрати 1,6% від маси тіла, Рs- 115/хв., систолічний АТ- 80 мм рт.ст., ЦВТ- 35 мм вод.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок III ступеня
- ☐ b. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок II ступеня
- ☐ c. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок I ступеня
- ☐ d. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді без ознак геморагічного шоку
- ☐ e. Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок IV ступеня


Коментар

Правильна відповідь: Гіпотонічна кровотеча у ранньому післяпологовому періоді. Геморагічний шок II ступеня

## Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого періодично виникають напади клонічних судом у лівій руці, які іноді розповсюджуються на ліву половину обличчя. Напад триває 5 хвилин, після чого відмічається слабкість у лівій руці, яка поступово зникає впродовж 2-3 годин. Який варіант судомного синдрому наведено? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Напад скроневої епілепсії
- ☐ b. Напад Кожевніковської епілепсії
- ☐ c. Малий епілептичний напад
- ☐ d. Генералізований епілептичний напад
- ☐ e. Напад Джексонівської епілепсії


Коментар

Правильна відповідь: Напад Джексонівської епілепсії

## Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Селективні  $\alpha$ -адреноміметики недоцільно застосовувати для поновлення серцевої діяльності внаслідок:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Здатності підвищувати систолічний артеріальний тиск
- ☐ b. Відсутності позитивного ефекту на міокард
- ☐ c. Значного підвищення потреби міокарда у кисні
- ☐ d. Нездатності підвищувати діастолічний артеріальний тиск
- ☐ e. Вираженого аритмогенного ефекту

Коментар

Правильна відповідь: Нездатності підвищувати діастолічний артеріальний тиск

## Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з черепно-мозковою травмою, який знаходиться в комі, на ШВЛ через ендотрахеальну трубку, при аускультатії виявлені ділянки різко ослабленого дихання, та ділянки "німої легені". Яка лікувальнодіагностична процедура показана?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Призначити ацетилцистеїн
- ☐ б. Механічна стимуляція кашлю
- ☐ в. Вібромасаж грудної клітки
- ☐ г. Санаційна фібробронхоскопія
- ☐ д. Ввести кофеїн


Коментар

Правильна відповідь: Санаційна фібробронхоскопія

## Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікаря на прийом звернувся хворий, у якого два дні назад з'явились приступи інтенсивного болю в лівій половині грудної клітки, загальна слабкість, лихоманка і біль голови. Сьогодні вранці помітив висип на шкірі грудей. При огляді хворого зліва по ходу 4-5 міжреберного нерва на еритематозному, набряклому фоні є множинні згруповані міхурці із напруженою покривною, наповнені прозорим вмістом, величиною 2-4 мм в діаметрі. Для якого захворювання характерна вказана симптоматика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Стрептококове імпетиго
- ☐ б. Герпетичний дерматоз Дюринга
- ☐ в. Рожевий лишай
- ☐ г. Простий герпес
- ☐ д. Оперізуючий герпес


Коментар

Правильна відповідь: Оперізуючий герпес

## Питання 69

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 59-ти років проходить курс реабілітаційного лікування після перенесеного інфаркту міокарда. Гемодинамічні показники стабільні. Фракція викиду 50%. Які засоби профілактики раптової серцевої смерті потрібно застосувати у даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Антагоністи кальцію, іАПФ, статини
- ☐ б. Діуретики, іАПФ, статини
- ☐ в. Амiodарон,  $\alpha$ -адреноблокатори
- ☐ г.  $\beta$ -адреноблокатори, іАПФ, статини
- ☐ д. Хірургічна корекція


Коментар

Правильна відповідь:  $\beta$ -адреноблокатори, іАПФ, статини

## Питання 70

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На другу добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зобу у хворої з'явилися тонічні судоми пальців ("рука акушера"), позитивні симптоми Хвостека, Вейса, Труссо. Яке ускладнення операції виникло?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тиреотоксичний криз
- ☐ б. Гіпопаратиреоз
- ☐ в. Інфаркт міокарда
- ☐ г. Асфіксія
- ☐ д. Анафілактичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Гіпопаратиреоз

## Питання 71

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 38-ми років, що страждає на нирковий туберкульоз, в непритомному стані привезений родичами до районної лікарні. Об'єктивно: кома 1. Гіпотрофія 2 ст. Шкіра та слизові оболонки коричневого кольору з бронзовим полиском. На шкірі спостерігаються окремі осередки вітиліго. АТ- 65/0 мм рт.ст., ЧСС- 44/хв. Діагностована гостра надниркова недостатність. Який препарат треба ввести в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Новодрин
- ☐ б. Дексаметазон
- ☐ в. Реополіглюкін
- ☐ г. Мезатон
- ☐ д. Адреналін


Коментар

Правильна відповідь: Дексаметазон

## Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий скаржиться на головний біль, біль у ділянці серця, нудоту, сухість у роті, безсоння. Об'єктивно: обличчя гіперемоване, тремор пальців рук і язика, хода некоординована, виражена пітливість, настрій різко знижений. Зловживає спиртними напоями, останню добу алкоголь не вживав. Визначте психопатологічний синдром:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Депресивний
- ☐ б. Астенічний
- ☐ в. Аментивний
- ☐ г. Деліріозний
- ☐ д. Абстинентний


Коментар

Правильна відповідь: Абстинентний

## Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна з преєклампсією важкого ступеню знаходиться у відділенні інтенсивної терапії. Під час обходу поскаржилась на відчуття тяжкості при диханні, загальну слабкість, АТ- 135/80 мм рт.ст. та 130/80 мм рт.ст., Рс- 62/хв., частота дихання - 20/хв., знижені сухожильні рефлекси. За останні 12 годин діурез - 200 мл. Впродовж 2-х діб отримує сульфат магнію. Яке ускладнення виникло у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ b. Передвісники еклампсії
- ☐ с. Транзиторна ішемічна атака
- ☐ d. Передозування сульфату магнію
- ☐ е. Госпітальна пневмонія


Коментар

Правильна відповідь: Передозування сульфату магнію

## Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 44-х років скарги на загальну слабкість, гіпертермію до 39оС, свербіння шкіри, висип, болісність і припухлість суглобів. Об'єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., папульозно-макульозний висип, генералізоване збільшення лімфовузлів, припухлість суглобів, збільшення селезінки. 7 днів тому у травмпункті провели первинну хірургічну обробку рани стопи та ввели протиправцеву сироватку. Вкажіть причину розвитку даного стану:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Геморагічний васкуліт
- ☐ b. Сепсис
- ☐ с. Сироваткова хвороба
- ☐ d. Менінгіт
- ☐ е. Анафілактична реакція

Коментар

Правильна відповідь: Сироваткова хвороба

## Питання 75

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому 22-х років з політравмою в реанімаційній залі проводиться серцево-легенево-мозкова реанімація. Який критерій ефективності закритого масажу серця має найбільшу прогностичну цінність?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Аускультативно вислуховуються тони серця
- ☐ b. Наявність пульсу на променевої артерії
- ☐ c. Відновлення самостійного дихання
- ☐ d. Звуження зіниць
- ☐ e. Наявність пульсації на сонній артерії

Коментар

Правильна відповідь: Наявність пульсації на сонній артерії

## Питання 76

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнтка гінекологічного відділення 32-х років, з загостренням хронічного лівостороннього сальпінгоофориту під час внутрішньовенного введення цефтріаксону раптово зблідла, посиніла. Лікарем констатована відсутність свідомості, широкі зіниці, відсутність реакції на світло. З чого необхідно починати реанімаційні заходи?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Місце введення алергену обколоти 0,1% розчином адреналіну
- ☐ b. Непрямий масаж серця
- ☐ c. Вище місця введення препарату накласти джгут
- ☐ d. Покласти хвору, повернути її голову в бік, висунути нижню щелепу
- ☐ e. Інтубація та проведення ШВЛ


Коментар

Правильна відповідь: Покласти хвору, повернути її голову в бік, висунути нижню щелепу

## Питання 77

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 47-ми років доставлено в токсикологічне відділення в тяжкому стані. Об'єктивно: свідомість за типом оглушення, АТ- 75/40 мм рт.ст., ЧСС- 40/хв. Із анамнезу: 1 годину тому прийняв 3 таблетки клофеліну із суїцидальною метою. Діагноз: отруєння клофеліном. Яка тактика лікаря? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інфузійна терапія, атропіну сульфат внутрішньовенно, промивання шлунка
- ☐ б. Промивання шлунка, спостереження
- ☐ в. Преднізолон внутрішньовенно, інфузійна терапія, промивання шлунка
- ☐ г. Кордіамін внутрішньовенно, інфузійна терапія
- ☐ д. Інфузійна терапія, промивання шлунка


Коментар

Правильна відповідь: Інфузійна терапія, атропіну сульфат внутрішньовенно, промивання шлунка

## Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років поступив у відділення зі скаргами на пекучий біль, сильне розпирання тканин пальців обох стоп. Об'єктивно: пухирі, наповнені геморагічною рідиною; після зняття пухирів видно некротизовану шкіру, котра нечутлива і неболюча. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Термічний опік III А ступеня
- ☐ б. Відмороження III ступеня
- ☐ в. Відмороження II ступеня
- ☐ г. Термічний опік II ступеня
- ☐ д. Відмороження I ступеня

Коментар

Правильна відповідь: Відмороження III ступеня

## Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00





Відмітити питання

Текст питання

У дитини 6-ти років на 2-у добу після гемотрансфузії наявні біль і гіперемія шкіри в області лівого ліктьового згину (місце венепункції), обмеження рухливості в суглобі. При пальпації - болючий інфільтрат у підшкірній клітковині без чітких меж по ходу кубітальної вени протяжністю 4-5 см, симптом флюктуації негативний. Пахвові лімфовузли на стороні ураження не збільшені. Набряку лівої кисті немає. Рухи пальців кисті вільні і безболісні. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Абсцес лівого передпліччя
- ☐ б. Постінфузійний паравазальний інфільтрат
- ☐ в. Тромбофлебіт кубітальної вени
- ☐ г. Паравазальна флегмона
- ☐ д. Бешиха лівої верхньої кінцівки


Коментар

Правильна відповідь: Постінфузійний паравазальний інфільтрат

## Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 68-ми років страждає на сечокам'яну хворобу, конкременти обох нирок. Впродовж останніх 3-х діб на тлі двобічної ниркової кольки відмітив зменшення кількості сечі до 50 мл на добу. За останні 48 годин креатинін крові з нормального рівня збільшився майже вдвічі. Який найбільш імовірний діагноз у даному випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Термінальна стадія хронічного ураження нирок на тлі сечокам'яної хвороби
- ☐ б. Ренальне гостре ураження нирок
- ☐ в. Преренальне гостре ураження нирок
- ☐ г. Постренальне гостре ураження нирок
- ☐ д. Двобічний блок нирок


Коментар

Правильна відповідь: Постренальне гостре ураження нирок

## Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Бригада швидкої допомоги була викликана до 8-місячної дитини у зв'язку з тим, що мама звернулась зі скаргами на періодичне посмикування підборіддя у дитини, яке посилюється під час неспокою, посмикування окремих груп м'язів, здригання під час сну. При об'єктивному огляді виявлені ознаки рахіту II ступеня. Анамнестично з'ясовано, що дитина знаходилася на молочно-вуглеводному вигодовуванні, профілактику рахіту не проводили. Діагностовано спазмофілію.

Вкажіть препарат вибору для зняття судомного синдрому:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Фенобарбітал
- ☐ b. Сульфат магнію
- ☐ c. Седуксен
- ☐ d. Натрію оксидобутірат
- ☐ e. Кальцію глюконат


Коментар

Правильна відповідь: Кальцію глюконат

## Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна при терміні гестації 36 тижнів звернулася до лікаря жіночої консультації зі скаргами на нудоту, блювання, болі в епігастральній ділянці. При лабораторному обстеженні: гіпопротейнемія, гіпербілірубінемія, тромбоцитопенія, підвищення трансаміназ. Яка основна тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Консультація терапевта
- ☐ b. Консультація хірурга
- ☐ c. Консультація інфекціоніста
- ☐ d. Консультація гастроентеролога
- ☐ e. Негайна госпіталізація у пологовий будинок

Коментар

Правильна відповідь: Негайна госпіталізація у пологовий будинок

## Питання 83

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час діагностичної ендоскопії у хворого 45-ти років виникла асистолія, яка діагностована електрокардіографічно. З яких заходів слід негайно розпочати лікування?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення атропіну
- ☐ b. Інфузія гідрокарбонату натрію
- ☐ c. Дефібриляція
- ☐ d. Електрокардіостимуляція
- ☐ e. Масаж серця, ШВЛ, адреналін

Коментар

Правильна відповідь: Масаж серця, ШВЛ, адреналін

## Питання 84

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікар швидкої допомоги при огляді хворого 19-ти років встановив, що пацієнт захворів раптово: підвищилась температура до 39,2°C, виражений головний біль, часте блювання, що не приносить полегшення. На шкірі сідниць, стегнах, гомілкях, тулубі з'явилися петехіальний висип, який місцями зливається. Менінгеальні симптоми позитивні. Лікар запідозрив генералізовану форму менінгококової інфекції. Яке лікування необхідно призначити на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пеніцилін, кортикостероїди
- ☐ b. Доксидиклін, кортикостероїди
- ☐ c. Роваміцин, кортикостероїди
- ☐ d. Фізіологічний розчин, контрикал довенно
- ☐ e. Левоміцетин, кортикостероїди, інфузійна терапія


Коментар

Правильна відповідь: Левоміцетин, кортикостероїди, інфузійна терапія

## Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець 36-ти років доставлений в хірургічне відділення з вогнепальним пораненням правого стегна і масивною кровотечею із рани. В операційній під час ревізії встановлено наявність повного дефекту стегнової вени на протязі 3 см. Який метод тимчасової зупинки кровотечі є найбільш ефективний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Накладання затискача на проксимальний відрізок вени
- ☐ b. Накладання затискача на дистальний відрізок вени
- ☐ c. Накладання турнікетів на кінці вени
- ☐ d. Тимчасове шунтування вени
- ☐ e. Накладання затискачів на кінці вени


Коментар

Правильна відповідь: Накладання затискачів на кінці вени

## Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

З метою вправлення вивиху пальця лівої руки хворому 20-ти років було виконано блокаду променевого нерва. Через 10 хвилин після введення 5 мл 2%розчину лідокаїну хворий почав скаржитись на різку слабкість, порушення зору, нудоту, нестачу повітря, відчуття стискання у грудній клітці. Об'єктивно: шкіра бліда, волога, осиплість голосу, ЧД- 35/хв., ЧСС- 120/хв., АТ- 50/20 мм рт.ст. Який лікарський засіб необхідно ввести негайно?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Адреналін
- ☐ b. Димедрол
- ☐ c. Фуросемід
- ☐ d. Седуксен
- ☐ e. Еуфілін

Коментар

Правильна відповідь: Адреналін

## Питання 87

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовий знаходиться в секторі укриття на полі бою. Його поранено в живіт. Стогне. На передній черевній стінці обширна рана з випавши ми петлями кишківника. Пульс слабкий. Температура повітря +7оС. Які дії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Накласти пов'язку на рану живота. Знеболити
- ☐ б. Вклати в простирадло та транспортувати до пункту надання допомоги
- ☐ с. Випавші нутрощі вправити та фіксувати пов'язкою до черевної стінки. Накласти пов'язку на рану живота
- ☐ д. Вправити нутрощі, що випали, знеболити, транспортувати до пункту надання допомоги
- ☐ е. Накласти вологу пов'язку на рану живота, випавші нутрощі не вправляти

Коментар

Правильна відповідь: Накласти вологу пов'язку на рану живота, випавші нутрощі не вправляти

## Питання 88

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ встановлена асистолія. Першочерговим терапевтичним заходом має бути:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Введення лідокаїну
- ☐ б. Введення адреналіну
- ☐ с. Електрична дефібриляція
- ☐ д. Введення атропіну
- ☐ е. Введення хлориду кальцію

Коментар

Правильна відповідь: Введення адреналіну

## Питання 89

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 66-ти років скаржиться на серцебиття, біль у серці, слабкість. Симптоми з'явилися раптово, після фізичного навантаження. На ЕКГ: комплекси QRS поширені до 0,12 секунд, зубець Р перед шлуночковим комплексом відсутній, ЧСС- 200/хв. Який препарат є препаратом вибору в цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Верапаміл
- ☐ b. Дигоксин
- ☐ c. Обзидан
- ☐ d. Хінідин
- ☐ e. Лідокаїн


Коментар

Правильна відповідь: Лідокаїн

## Питання 90

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пологи у 36 тижнів. Вагітність перебігала на тлі загрози переривання у 28 тижнів, гострої респіраторної вірусної інфекції у 24 тижні. Навколоплідні води світлі. Новонароджена дівчинка з масою 2400 г, довжиною 45 см. При народженні самостійне дихання відсутнє, м'язовий тонус значно знижений. Після проведення штучної вентиляції легенів за допомогою маски та мішка 100% киснем впродовж 30 секунд самостійне дихання не відновилося, частота серцевих скорочень складає 50/хв., зберігається акроціаноз. Яка подальша тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Киснева допомога вільним потоком
- ☐ b. Санація верхніх дихальних шляхів
- ☐ c. Корекція гіповолемії
- ☐ d. Введення адреналіну
- ☐ e. Непрямий масаж серця

Коментар

Правильна відповідь: Непрямий масаж серця

## Питання 91

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Першовагітна 25-ти років з терміном гестації 26 тижнів звернулася до лікаря жіночої консультації зі скаргами на погіршення загального стану, спрагу, слабкість, блювання, сонливість, болі по всьому животу впродовж останніх 8-ми діб. Хворіє на цукровий діабет. Запах ацетону з рота. Рс-100/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Рівень цукру в крові - 19,4 ммоль/л. Набряки ніжних кінцівок. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Кетонемічна кома
- ☐ b. Гіпоглікемічна кома
- ☐ c. Гіперлактацидемічна кома
- ☐ d. Гіперосмолярна кома
- ☐ e. Прееклампсія, тяжка форма

Коментар

Правильна відповідь: Кетонемічна кома

## Питання 92

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілого 33-х років через 3 години після землетрусу доставлено до клініки. Об'єктивно: відірвана верхня права кінцівка, кукса під джгутом. АТ-60/30 мм рт.ст., ЧСС- 140/хв. Який ступінь шоку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. IV
- ☐ b. V
- ☐ c. I
- ☐ d. II
- ☐ e. III

Коментар

Правильна відповідь: III

## Питання 93

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної у терміні 38 тижнів, що лежить на спині, раптово з'явилося утруднене дихання, блдість шкірних покривів, холодний липкий піт, знизився АТ. Встановіть діагноз невідкладного стану: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Синдром стиснення нижньої порожнистої вени
- ☐ б. Пізній гестоз
- ☐ в. Відшарування плаценти
- ☐ г. Емболія навколоплідними водами
- ☐ д. Розрив матки

Коментар

Правильна відповідь: Синдром стиснення нижньої порожнистої вени

#### Питання 94

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі 24-х років у пологах раптом погіршилося серцебиття плода, матка в постійному гіпертонусі, з'явилися значні кров'яністі виділення з піхви. Роділля зблідла, Рс- 130/хв., АТ-80/50 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Розрив матки
- ☐ б. Розрив шийки матки
- ☐ в. Гострий апендицит
- ☐ г. Передчасне відшарування плаценти
- ☐ д. Клінічно вузький таз

Коментар

Правильна відповідь: Передчасне відшарування плаценти

#### Питання 95

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00





Відмітити питання

Текст питання

До інфекційного відділення надійшов хворий 20-ти років з ознаками дегідратації III ступеня. Спостерігаються судоми, блювання фонтаном, різке зниження артеріального тиску, тахікардія, температура тіла - 35,5°C. З якою швидкістю треба проводити внутрішньовенну інфузію для відновлення водно-електролітного балансу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 50-80 мл/хв
- ☐ b. Швидкість не має значення
- ☐ c. 100-120 мл/хв
- ☐ d. 80-100 мл/хв
- ☐ e. 30-50 мл/хв


Коментар

Правильна відповідь: 100-120 мл/хв

## Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 64-х років перебуває на лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби. На момент огляду АТ- 200/110 мм рт.ст., ЧСС- 96/хв. Застосування якого препарату в даній ситуації ПРОТИПОКАЗАНО?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Клофелін
- ☐ b. Добутамін
- ☐ c. Каптоприл
- ☐ d. Фуросемід
- ☐ e. Рибоксин


Коментар

Правильна відповідь: Добутамін

## Питання 97

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 19-ти років, в терміні 30 тижнів, поскаржилася на головний біль, порушення зору, блювання з домішками крові. Стан важкий, АТ-160/100 мм рт.ст., склери жовтушні, підшкірні крововиливи, набряки нижніх кінцівок, сеча геморагічного кольору. В крові: тромбоцитопенія. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гепатоз вагітних
- ☐ б. HELLP-синдром
- ☐ в. Хвороба Боткіна
- ☐ г. Еклампсія
- ☐ д. ДВЗ-синдром


Коментар

Правильна відповідь: HELLP-синдром

## Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 48-ми років скаржиться на задишку, що раптово посилилася, слабкість. Знаходиться у кардіологічному відділенні впродовж 12-ти годин, отримує: гепарин, аспірин, стрептокіназу. Збуджений, шкіра холодна, волога, ціаноз. Пульс слабого наповнення, ритмічний, 135/хв., АТ-60/40 мм рт.ст. У нижніх відділах легень вологі хрипи. На ЕКГ у відведеннях V 3 - V 6 комплекс QRS типу QS, підйом сегменту ST вище ізолінії, позитивний зубець Т. З якого препарату необхідно починати невідкладну терапію?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Альбумін
- ☐ б. Допамін
- ☐ в. Дигоксин
- ☐ г. Лазикс
- ☐ д. Верапаміл

Коментар

Правильна відповідь: Допамін

## Питання 99

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

З вогнища радіаційної катастрофи до медичного пункту полку доставлено 15 потерпілих. Через 20-25 хвилин після вибуху потерпілі стали відчувати різку слабкість, запаморочення, нудоту, з'явилося невпинне блювання. Стан хворих тяжкий. Кволі, апатичні, на запитання відповідають з великою затримкою. ЧСС- 120/хв., з частими екстрасистолами, АТ- 70/30 мм рт.ст., ЧД-28/хв. За даними індивідуального дозиметра доза отриманого випромінювання склала 8 Гр. Якій стадії гострої променевої хвороби відповідає наведена симптоматика? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. III
- ☐ b. II
- ☐ c. IV
- ☐ d. I
- ☐ e. V

Коментар

Правильна відповідь: IV

## Питання 100

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 6-місячної дитини несподівано з'явилися занепокоєність, блювання, відходження з каловими масами крові у вигляді "малинового желе". При обстеженні живота виявлені напруження черевної стінки, праворуч від пупка - ковбасоподібне утворення. Який діагноз найбільш імовірний? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Поліп кишечника
- ☐ b. Кишкова інвагінація
- ☐ c. Дизентерія
- ☐ d. Ентероколіт
- ☐ e. Геморагічний васкуліт

Коментар

Правильна відповідь: Кишкова інвагінація

## Питання 101

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У молодого чоловіка під час акту дефекації при натужуванні раптово виник гострий біль у лівій половині грудної клітки, задишка, запаморочення. Легеневий анамнез відсутній. Доставлений в стаціонар через 2 години. Блідий, адинамічний, задишка більше 35 за хвилину. Ps- 110/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Лабораторні дані: гематокрит 26%. Дихання зліва не проводиться, перкуторно - вкорочення перкуторного звуку. Рентгенологічно: масивне затемнення з горизонтальним рівнем. При пункції отримано більше ніж 500 мл крові. Кров продовжує поступати. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий інфаркт міокарда
- ☐ б. Гострий ексудативний плеврит
- ☐ с. Спонтанний гемоторакс
- ☐ d. Пневмоторакс
- ☐ е. Напад стенокардії

Коментар

Правильна відповідь: Спонтанний гемоторакс

## Питання 102

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 75-ти років поскаржився на інтенсивний біль в нижній половині живота, слабкість, відсутність сечовипускання протягом доби. В анамнезі помірна артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, доброякісна гіперплазія простати. Об'єктивно: шкіра бліда, волога; тони серця глухі, ритм правильний ЧСС- 100/хв., АТ- 180/90 мм рт.ст., перкуторно сечовий міхур визначається на 10 см над лоном. Які першочергові заходи слід провести для покращення стану хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Призначення  $\alpha$ -адреноблокаторів
- ☐ б. Катетеризація сечового міхура за допомогою катетеру Фолея
- ☐ с. Термінове хірургічне втручання
- ☐ d. Внутрішньовенне введення дротаверину
- ☐ е. Внутрішньовенне введення еналаприлату для швидкого зниження АТ

Коментар

Правильна відповідь: Катетеризація сечового міхура за допомогою катетеру Фолея

### Питання 103

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На прийомі в жіночій консультації вагітна 37 тижнів поскаржилася на різкий головний біль, погіршення зору, біль у ділянці сонячного сплетіння. Об'єктивно: АТ- 170/110 мм рт.ст., набряки нижніх кінцівок. Яку першу невідкладну допомогу слід надати у жіночій консультації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення лазіксу 40 мг внутрішньовенно
- ☐ б. Введення магнію сульфату 25% -20,0, сибазону 0,02 внутрішньовенно, госпіталізація до акушерського стаціонару
- ☐ с. Введення кокарбоксилази 150 мг внутрішньовенно
- ☐ d. Введення аскорбінової кислоти 5% - 5 мл внутрішньовенно
- ☐ е. Введення анальгину 50% - 2,0

Коментар

Правильна відповідь: Введення магнію сульфату 25% -20,0, сибазону 0,02 внутрішньовенно, госпіталізація до акушерського стаціонару

### Питання 104

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Зафіксовано клінічну смерть. Вкажіть цільові значення сатурації киснем артеріальної крові (SpO2) постраждалого після повернення спонтанного кровообігу:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 100%
- ☐ b. 86-90%
- ☐ с. 85%
- ☐ d. 96-98%
- ☐ е. 91-93%

Коментар

Правильна відповідь: 96-98%

## Питання 105

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Травмований мотоцикліст лежить на проїжджій частині дороги. Ліве стегно його деформоване в нижній третині, через зовнішню рану фонтанує кров. Де і який кровоспинний джгут необхідно застосувати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна
- ☐ b. Артеріальний джгут в середній третині стегна
- ☐ c. Артеріальний джгут в верхній третині стегна
- ☐ d. Венозний джгут на верхню третину гомілки
- ☐ e. Венозний джгут безпосередньо над раною

Коментар

Правильна відповідь: Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна

## Питання 106

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнтки в післяпологовому періоді гостро виникло значне зниження настрою, катастрофічне наростання відчуття непереносимої туги, безвихідності, відчаю. Пацієнтка тривожна, не знаходить собі місця, кричить, стогне, плаче, причиняє самоушкодження, активно висловлює суїцидальні наміри. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий приступ шизофренії
- ☐ b. Тяжкий депресивний епізод
- ☐ c. Травматичний делірій
- ☐ d. Епілептичні сутінки
- ☐ e. Аментивний тип порушення свідомості

Коментар

Правильна відповідь: Тяжкий депресивний епізод

## Питання 107

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 38-ми років впродовж 23-х років страждає на часті, серійні генералізовані судомні напади. Прогресує зниження пам'яті, інертність мислення, запальність. 12 годин тому розпочалися генералізовані тоніко-клонічні напади. Впродовж останніх двох годин між нападами свідомість не поновлюється. Який першочерговий захід надання допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення внутрішньом'язово гексеналу
- ☐ b. Введення внутрішньом'язово магнію сульфату
- ☐ c. Введення внутрішньовенно діазепаму
- ☐ d. Введення в клізмі хлоралгідрату
- ☐ e. Введення внутрішньовенно натрію оксибутирату

Коментар

Правильна відповідь: Введення внутрішньовенно діазепаму

## Питання 108

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 76-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність безболісних нерухливих утворень в пахвинних ділянках, розмірами до 2-3 см в діаметрі. З анамнезу: останнім часом погіршився апетит, втратив вагу, у випорожненнях періодично відмічає свіжу кров. Яке дослідження для встановлення діагнозу необхідно провести першочергово?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Комп'ютерна томографія
- ☐ b. Ультразвукове дослідження лімфовузлів пахвинної ділянки
- ☐ c. Ультразвукове дослідження пахвинної ділянки
- ☐ d. Пальцеве дослідження прямої кишки
- ☐ e. Іригографія

Коментар

Правильна відповідь: Пальцеве дослідження прямої кишки

## Питання 109

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 40-ка років страждає на персистуючу бронхіальну астму, легкого перебігу. Хворіє на бронхіальну астму з 7-ми років. Вагітність VI, передують 4 пологи, госпіталізована до палати патології вагітних. Виник важкий напад бронхіальної астми (тахіпное більше 30/хв., ЧСС більше 120/хв., різниця систолічного АТ на вдосі і видосі більше 18 мм рт.ст.). Інгаляції сальбутамолу неефективні протягом 6-ти годин. Яка тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньовенно крапельно розчин анаприліну кожні 3-4 години до поліпшення стану
- ☐ б. Внутрішньовенно ввести преднізолон 60 мг - 90 мг, повторюючи введення по 30 мг кожні 3-4 години до поліпшення стану
- ☐ с. Внутрішньовенно крапельно антибіотики широкого спектру дії
- ☐ д. Внутрішньовенно галоперидол, седативні препарати
- ☐ е. Внутрішньовенно ввести платифілін, повторюючи кожні 3-4 години до поліпшення стану

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенно ввести преднізолон 60 мг - 90 мг, повторюючи введення по 30 мг кожні 3-4 години до поліпшення стану

## Питання 110

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Черговий лікар міської лікарні був викликаний у палату до пацієнта, що раптово втратив свідомість. При огляді в першу чергу необхідно:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Оглянути зіниці пацієнта
- ☐ б. Визначити рівень глюкози в крові
- ☐ с. Пальпувати пульс на сонній артерії, візуально оцінити дихання, провести аускультацию серцевої діяльності
- ☐ д. Реєстрація ЕКГ
- ☐ е. Вимірити АТ


Коментар



Правильна відповідь: Пальпувати пульс на сонній артерії, візуально оцінити дихання, провести аускультацию серцевої діяльності

## Питання 111

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 4-х років доставлена в лікарню зі скаргами на 3-кратне блювання за добу. Об'єктивно: запах ацетону з рота, млявість, блідість. Дані скарги виникли вперше після зловживання жирною, пряною їжею. В аналізі сечі ацетон +++ . Що рекомендовано дитині по виписці з відділення в даному випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Тільки дієтотерапія протягом тижня
- ☐ б. Лікування в спеціалізованому відділенні
- ☐ с. Протирецидивне лікування 1 раз на рік
- ☐ d. Диспансерний нагляд протягом 5-ти років
- ☐ е. Дієтотерапія, диспансерний нагляд

Коментар

Правильна відповідь: Дієтотерапія, диспансерний нагляд

## Питання 112

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 13-ти років, що страждає на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки, відома виникла клініка шлунково-кишкової кровотечі. Яка подальша тактика?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення серцевих глікозидів
- ☐ б. Госпіталізація дитини у реанімаційне відділення
- ☐ с. Спостереження за дитиною
- ☐ d. Проведення гемостатичної терапії
- ☐ е. Введення глюкокортикоїдів

Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація дитини у реанімаційне відділення

### Питання 113

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 17-ти років у терміні 34-35 тижнів доставлена бригадою ШМД в пологовий будинок зі скаргами на головний біль, погіршення зору, посмикування м'язів, судом. АТ- 190/100 мм рт.ст. на обох руках, набряки на ногах та животі. Стан плоду не порушений, виділень із статевих органів немає. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Менінгоенцефаліт
- ☐ b. Епілепсія
- ☐ c. Прееклампсія тяжкого ступеня
- ☐ d. Гіпертонічна енцефалопатія
- ☐ e. Еклампсія

Коментар

Правильна відповідь: Еклампсія

### Питання 114

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитину 11-ти місяців на 3-й день хвороби госпіталізовано до інфекційного стаціонару з підвищенням температури тіла до 38оС, багаторазовим блюванням і частими водянистими випорожненнями. Маса тіла знижена на 6%. Який метод регідратації треба призначити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення рідини ендогастралью
- ☐ b. Оральна регідратація
- ☐ c. Введення рідини підшкірно крапельно
- ☐ d. Внутрішньовенний крапельний
- ☐ e. Внутрішньовенний струминний

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенний крапельний

## Питання 115

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 38-ми років масою 76 кг з поширеним перитонітом внаслідок гострого деструктивного апендициту був прооперований через 2 доби після початку захворювання. Проведена апендектомія. В палаті інтенсивної терапії через 40 хвилин після операції внутрішньовенно введено 2 г меропенему. Перед введенням проведена алергологічна проба: негативна. Через 40 хвилин після введення антибіотика АТ низився до 70/40 мм рт.ст., Ps- 120/хв. Діурез - 11 мл/год, ЦВТ- 5 мм вод.ст., гематокрит - 50 г/л, температура тіла - 39оС, шкірні покриви гіперемовані, тахіпное до 40 за хвилину, ціаноз слизових оболонок. Який стан розвинувся у хворого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Геморагічний шок
- ☐ b. Гіповолемічний шок
- ☐ с. Анафілактичний шок
- ☐ d. Кардіогенний шок
- ☐ е. Інфекційно-токсичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Інфекційно-токсичний шок

## Питання 116

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 75-ти років з діагнозом: гострий поширений передній інфаркт міокарда, раптово відчув біль у грудній клітці, задишку, що швидко збільшувались. Аускультативно: вологі хрипи над легеньми з обох боків. ЧД- 22/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: ЧСС - 200/хв., комплекси QRS більше 0,12 с. Що необхідно призначити при наданні невідкладної допомоги? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Атропін
- ☐ b. Адреналін
- ☐ с. Кардіоверсія
- ☐ d. Лідокаїн
- ☐ е. Аміодарон


Коментар

Правильна відповідь: Кардіоверсія

### Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років скаржиться на різкий біль в грудному відділі хребта. 3 дні тому отримав травму в ділянці спини при падінні з висоти, за допомогою не звертався. Об'єктивно: загальний стан задовільний, біль під час пальпації в ділянці остистих відростків Th 9-10 хребців. М'язова сила в нижніх кінцівках знижена до 3-4 балів. Колінні та ахілові рефлекси підвищені, симптом Бабінського з двох сторін. Яка патологія у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Забій м'яких тканин спини
- ☐ b. Травматичне пошкодження хребта та спинного мозку
- ☐ c. Ниркова коліка
- ☐ d. Енцефаломієліт
- ☐ e. Остеохондроз грудного відділу хребта


Коментар

Правильна відповідь: Травматичне пошкодження хребта та спинного мозку

### Питання 118

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 8-ми років доставлена в лікарню в непритомному стані. Протягом 5-ти днів хворіє на кишкову інфекцію з підвищенням температури, діареєю, блюванням. Різка дегідратація. Часте поверхневе дихання. Виражена неврологічна симптоматика: ністагм, менінгеальні знаки, гіпертонус м'язів, судоми. Запаху ацетону у повітрі немає. Глюкоза крові - 42 ммоль/л, кетонемія в нормі, кетонурія відсутня, осмолярність крові - 385 мосм/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Менінгоенцефальний синдром
- ☐ b. Лактацидемічна кома
- ☐ c. Церебральна кома
- ☐ d. Кетоацидотична кома
- ☐ e. Гіперосмолярна кома

Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

### Питання 119

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт під час ковтання цукерки захрипів, схопився за шию, посинів і через 3 хвилини знепритомнів. Об'єктивно: свідомість відсутня, обличчя і шия ціанотичні, нерегулярні та непродуктивні рухи грудної клітки. На сонних артеріях - слабка пульсація. При пальцевій ревізії ротоглотки визначається округле стороннє тіло, змістити яке не вдається. Спроба змістити його при перекиданні пацієнта через коліно - невдала. Які подальші дії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Пункція трахеї
- ☐ b. Транспортування до стаціонару
- ☐ c. Нижня трахеотомія
- ☐ d. Крікотиреотомія
- ☐ e. Верхня трахеотомія

Коментар

Правильна відповідь: Крікотиреотомія

### Питання 120

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 30-ти років скаржиться на пронос з домішками слизу і крові, переймоподібний біль у животі. Хворіє 4 роки, впродовж яких схуд на 10 кг. Об'єктивно: Рс- 100/хв., АТ-100/60 мм рт.ст., температура - 38оС. Живіт м'який, болючий у лівій здухвинній ділянці. У крові: ер.- 3,1х10<sup>12</sup>/л, Нb- 85 г/л, лейкоц.- 11,2х10<sup>9</sup>/л, ШОЕ- 32 мм/год. Реакція Грегерсена позитивна. Іригоскопія - товста кишка звужена, зернистість слизової оболонки, гаустри відсутні, контури нечіткі. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Неспецифічний виразковий коліт
- ☐ b. Синдром подразненої товстої кишки
- ☐ c. Хвороба Крона

- ☐ d. Хронічний коліт
- ☐ e. Туберкульоз кишечника
- Коментар

Правильна відповідь: Неспецифічний виразковий коліт

## Питання 121

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 15-ти років раптово підвищилася температура тіла до 39,5°C, виник біль у горлі під час ковтання. На другу добу на обличчі, шиї, верхній частині тулуба на тлі гіперемованої шкіри тулуба виник дрібнокрапковий розеолезний висип з блідим носогубним трикутником. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Скарлатина
- ☐ b. Краснуха
- ☐ c. Інфекційний мононуклеоз
- ☐ d. Кір
- ☐ e. Вітряна віспа

Коментар

Правильна відповідь: Скарлатина

## Питання 122

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого після важкої скелетної травми на другу добу раптово виникло зниження артеріального тиску, порушення свідомості та самостійного дихання, дрібноточкові крововиливи на шкірі. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Септичний шок
- ☐ b. Синдром тривалого стиснення
- ☐ c. Анафілактичний шок

- ☐ d. Травматичний шок
- ☐ e. Жирова емболія


Коментар

Правильна відповідь: Жирова емболія

### Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 65-ти років скаржиться на зміну кольору сечі. Сеча червона, з домішками кров'яних згустків, що нагадують "черв'яків", болю немає, непокоїть слабкість. У сечі: гематурія. У крові: Hb- 84 г/л, ШОЕ- 31 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Сечокам'яна хвороба
- ☐ b. Гострий пієлонефрит
- ☐ c. Пухлина нирки
- ☐ d. Гострий цистит
- ☐ e. Гострий гломерулонефрит


Коментар

Правильна відповідь: Пухлина нирки

### Питання 124

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 2-х років у стаціонарі на фоні гострої респіраторної вірусної інфекції з явищами риніту, фарингіту, трахеїту, температури тіла - 39, 6оС, розвинувся приступ генералізованих судом. Який метод невідкладних протисудомних заходів слід вважати методом вибору?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Фенобарбітал зондом у шлунок
- ☐ b. Діазепам довенно
- ☐ c. Хлоралгідрат у клізмі
- ☐ d. Дроперидол довенно

☐ е. Діазепам дом'язово  
Коментар

Правильна відповідь: Діазепам довенно

## Питання 125

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 47-ми років після нервово-психічного перенапруження з'явився виражений головний біль ("ніби хтось вдарив палкою по голові"), світлобоязнь, загальна гіперестезія. При огляді: анталгічна поза, різко виражена ригідність потиличних м'язів, симптоми Керніга та Брудзинського. За даними рентгенівської комп'ютерної томографії - без патології. Який наступний метод дослідження є найінформативнішим для визначення подальшої тактики ведення пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Огляд очного дна
- ☐ б. Коагулограма
- ☐ в. Магнітнорезонансна томографія
- ☐ г. Транскраніальна доплерографія
- ☐ е. Аналіз спинномозкової рідини

Коментар

Правильна відповідь: Аналіз спинномозкової рідини

## Питання 126

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Очікувана доза опромінення населення, що мешкає на забрудненій радіонуклідами території, за перший рік становить 500 мЗв. Яких заходів захисту потребує це населення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Обмежити вживання забруднених радіонуклідами харчових продуктів та питної води
- ☐ б. Використовуються укриття та засоби захисту органів дихання та шкірного покриву
- ☐ в. Ніяку, тому що дози х-опромінення не перевищують допустимі рівні
- ☐ г. Потрібно провести йодну профілактику




☐ е. За даних умов потрібне переселення або евакуація населення  
Коментар

Правильна відповідь: За даних умов потрібне переселення або евакуація населення

### Питання 127

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення військового госпіталю доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням в ділянку черевної порожнини. Шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рс- 100/хв. Симптоми подразнення очеревини сумнівні. Яке дослідження треба виконати для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Лапаротомія
- ☐ б. УЗД органів черевної порожнини
- ☐ с. Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини
- ☐ д. Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини
- ☐ е. Фіброгастродуоденоскопія

Коментар

Правильна відповідь: УЗД органів черевної порожнини

### Питання 128

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вночі у хворого з'явилися задуха, кашель з рясним харкотинням рожевого кольору. З анамнезу: страждає на гіпертонічну хворобу, варикозне розширення вен обох кінцівок, 2 роки тому переніс інфаркт міокарда. Об'єктивно: неспокійний, положення ортопное, акроціаноз, ЧДР- 40/хв., АТ- 220/110 мм рт.ст. У легенях – різнокаліберні середньо- і великопухирчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Крупозна пневмонія
- ☐ б. Гостра лівошлуночкова недостатність
- ☐ с. Легенева кровотеча

- ☐ d. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ e. Астматичний статус


Коментар

Правильна відповідь: Гостра лівошлуночкова недостатність

## Питання 129

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення лікарні звернувся постраждалий у стані легкого алкогольного сп'яніння зі скаргами на порушення зору, що виникли після вживання спиртного. Найбільш імовірний діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий напад глаукоми
- ☐ b. Отруєння метанолом
- ☐ c. Отруєння етиленгліколем
- ☐ d. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ e. Отруєння етанолом


Коментар

Правильна відповідь: Отруєння метанолом

## Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 72-х років раптово розвинулось блювання кров'ю з крововтратою до 1,0 л. Об'єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС- 112/хв., ЦВТ - 0. Які інфузійні середовища першочергово треба застосувати для лікування?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Свіжозаморожена плазма
- ☐ b. Розчини глюкози
- ☐ c. Кристалоїдні розчини
- ☐ d. Колоїдні розчини
- ☐ e. Жирові емульсії


Коментар

Правильна відповідь: Кристалоїдні розчини

### Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 12-ти років хворіє на atopічну бронхіальну астму з важким перебігом. Під час останнього нападу 4 інгаляції сальбутамолу ефекту не дали. Наросли задишка, тахікардія, неспокій. Шкіра бліда з ціанотичним відтінком. У легенях різко ослаблене дихання, хрипи не вислуховуються. Який з перелічених заходів є першочерговим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Внутрішньовенне введення амброксолу
- ☐ b. Інгаляція зволоженого кисню
- ☐ c. Внутрішньовенне введення еуфіліну
- ☐ d. Внутрішньовенне введення кларитроміцину
- ☐ e. Внутрішньовенне введення преднізолону


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне введення преднізолону

### Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінку 77-ми років доставлено в лікарню без свідомості. Неврологічний статус: лівобічна параплегія. Протромбін за Квіком становить 108%. На КТ-сканах відзначається: у правій півкулі головного мозку ділянка з нерівномірним зниженням оптичної щільності. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ішемічний інсульт
- ☐ b. Менінгоенцефаліт
- ☐ c. Геморагічний інсульт
- ☐ d. Метастази у головний мозок
- ☐ e. Субарахноїдальний крововилив


Коментар

Правильна відповідь: Ішемічний інсульт

### Питання 133

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення доставлено чоловіка 30-ти років після утоплення у прісній воді, яке відбулося близько 40 хвилин тому і супроводжувалося клінічною смертю та успішною реанімацією. Чоловік у свідомості, при аускультатії у легенях вислуховуються хрипи над всіма легеновими полями. Основний напрямок подальшої терапії:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення глюкокортикоїдів
- ☐ b. Введення інгібіторів протеолізу
- ☐ c. Дегідратація
- ☐ d. Киснетерапія
- ☐ e. Відновлення ОЦК


Коментар

Правильна відповідь: Дегідратація

### Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 6-ти років госпіталізована до дитячого відділення з бронхо-пневмонією. Страждає на atopічний дерматит. Після внутрішньом'язового введення ампіциліну з'явилися відчуття стиснення у грудях, запаморочення, різка блідість, ціаноз, холодний піт, прискорене шумне дихання. Який з перерахованих препаратів слід ввести в маніпуляційній негайно?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Розчин адреналіну підшкірно
- ☐ b. Розчин строфантину внутрішньовенно
- ☐ c. Розчин еуфіліну внутрішньовенно
- ☐ d. Розчин тавегілу внутрішньовенно
- ☐ e. Розчин преднізолону внутрішньовенно


Коментар

Правильна відповідь: Розчин адреналіну підшкірно

### Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 2-х років, що страждає на гемофілію А, доставлений в клініку із скаргами на різкий біль в животі, наростаючу блідість. Об'єктивно: стан дуже важкий, блідий, збудливість змінюється адинамією, виражена задишка: ЧД- 80/хв., ЧСС- 170/хв., АТ- 70/25 мм рт.ст. Живіт напружений, гази не виходять, сечовипускань не було. В крові: Hb- 55 г/л, лейкоцити -  $5,2 \times 10^9$ /л, ШОЕ - 10 мм/год, центральний венозний тиск - 0 мм рт.ст., систолічний індекс - 1,5 л/м<sup>2</sup> за хвилину. Лікар встановив наявність геморагічного шоку. Призначте невідкладну терапію:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гемотрансфузія
- ☐ b. Введення кріопреципиту
- ☐ c. Трансфузія еритроцитарної маси
- ☐ d. Інфузійна терапія для підвищення ОЦК
- ☐ e. Трансфузія сухої плазми


Коментар

Правильна відповідь: Введення кріопреципиту

### Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки 32-х років після внутрішньовенної ін'єкції антибіотиків пеніцилінового ряду з приводу загострення хронічного сальпінгоофориту раптово з'явилась задишка, біль в ділянці серця, слабкість, свербіж шкіри обличчя та верхніх кінцівок, висипка. Об'єктивно: свідомість запаморочена, АТ- 80/50 мм рт.ст., пульс ниткоподібний, серцева аритмія. Попередній діагноз - анафілактичний шок. Які перші дії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ввести антигістамінні препарати
- ☐ b. Накласти джгут проксимальніше місця ін'єкції
- ☐ c. Розпочати інфузійну терапію

- ☐ d. Ввести розчин адреналіну
- ☐ e. Провести інтубацію трахеї
- Коментар

Правильна відповідь: Ввести розчин адреналіну

### Питання 137

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення госпіталю МНС потрапили з зони катастрофи 20 осіб. Під час огляду постраждалого 30-ти років, якого вилучили з-під уламків споруди, визначається: блідість шкірного покриву, у свідомості, деформація правої гомілки, багаточисельні забиття м'яких тканин нижніх кінцівок. До якої групи постраждалих треба призначити цього постраждалого при проведенні медичного сортування?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Потребує симптоматичного лікування
- ☐ b. Не потребує медичної допомоги на даний момент
- ☐ c. Допомогу може бути відкладено
- ☐ d. Потребує невідкладної медичної допомоги
- ☐ e. Потребує евакуації до іншого лікувального закладу

Коментар

Правильна відповідь: Потребує невідкладної медичної допомоги

### Питання 138

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 18-ти років через 3 тижні після перенесеної скарлатини з'явилися набряки на гомілках та повіках, біль у поперековій ділянці, олігурія, дизурія, сеча кольору "м'ясних помий", підвищення температури до 38,5°C. У сечі: реакція лужна, відносна щільність - 1028, білок - 0,8 г/л, еритроцити – все поле зору, лейкоцити - 2-4 в п/зору, циліндри гіалінові - 4-6 в п/зору, зернисті – 1-3 в п/зору. Добова екскреція білка – 1 г. Який діагноз є найбільш імовірним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий пієлонефрит

- ☐ b. Хронічний гломерулонефрит із нефротичним синдромом
- ☐ c. Гострий гломерулонефрит із нефритичним синдромом
- ☐ d. Тубулоінтерстиціальний нефрит
- ☐ e. Сечокам'яна хвороба, ниркова колька


Коментар

Правильна відповідь: Гострий гломерулонефрит із нефритичним синдромом

### Питання 139

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі 25-ти років із вродженою вадою серця в I періоді пологів з'явився кашель, задишка, харкотиння, болі за грудиною, тахікардія. АТ- 90/60 мм рт.ст.,  $t_{\text{о}} - 36,8^{\circ}\text{C}$ . Роділля займає вимушене сидяче положення. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. набряк легень
- ☐ b. інфаркт міокарда
- ☐ c. емболія навколоплідними водами
- ☐ d. напад бронхіальної астми
- ☐ e. розрив матки


Коментар

Правильна відповідь: набряк легень

### Питання 140

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілого 78-ми років знайдено у дворі будинку тепло вдягненим, лежачим на снігу. Без свідомості. Пульс - 100/хв., ритмічний, АТ- 160/100 мм рт.ст., частота дихальних рухів - 20/хв. Температура тіла у прямій кишці  $35,8^{\circ}\text{C}$ . Кисті і стопи холодні, звичайного кольору. Пасивні рухи у суглобах без обмежень. Який з діагнозів найбільш вірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. загальне охолодження середнього ступеня важкості

- ☐ b. Алкогольне сп'яніння
- ☐ c. Кома невідомого генезу
- ☐ d. Відмороження кистей і стоп, дореактивний період
- ☐ e. Закрита черепно-мозкова травма


Коментар

Правильна відповідь: Кома невідомого генезу

## Питання 141

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На заводі розірвалась ємність з білим фосфором, в результаті чого 10 працівників одержали опіки. Яку допомогу необхідно надати постраждалим негайно?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Промивання опіків розчином мідного купоросу
- ☐ b. Промивання опіків спиртом
- ☐ c. Промивання опіків водою
- ☐ d. Промивання опіків фізрозчином
- ☐ e. Промивання опіків кислотою


Коментар

Правильна відповідь: Промивання опіків розчином мідного купоросу

## Питання 142

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого болі в грудній клітці, які виникли після травми, задишка, слабкість. б'єктивно: тахіпное, відставання правої половини грудної клітки в диханні, розширені вени шиї. Прогресує дихальна недостатність. Рентгенологічно: відсутність легеневого малюнка правої легені, середостіння зміщене вліво, на вдиху зміщується вправо. Купол діафрагми зміщений донизу. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Закритий пневмоторакс



- ☐ b. Гемопневмоторакс
- ☐ c. Емфізема середостіння
- ☐ d. Емболія легеневої артерії
- ☐ e. Напружений пневмоторакс


Коментар

Правильна відповідь: Напружений пневмоторакс

### Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В медичну роту доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням верхньої третини правої гомілки з пошкодженням магістральних судин. Систолічний АТ- 100 мм рт.ст., Рs- 90/хв. При наданні домедичної допомоги годину тому накладено джгут, пов'язку на рану та уведений знеболюючий засіб. В яку чергу необхідно евакуювати пораненого на подальший етап медичної евакуації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. В першу чергу
- ☐ b. В другу чергу
- ☐ c. Підлягає амбулаторному лікуванню
- ☐ d. Залишається для лікування на даному етапі медичної евакуації
- ☐ e. Не підлягає евакуації


Коментар

Правильна відповідь: В першу чергу

### Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після використання супротивником хімічної зброї у більшості військових спостерігаються кашель, утруднення дихання, слинотеча, які майже зникли після виходу постраждалих з зони хімічного зараження. Через 6 годин у всіх отруєних з'явився різкий кашель з великою кількістю пінистого харкотиння, вислуховуються численні вологі хрипи різного характеру. Яка бойова хімічна речовина була використана супротивником?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Фосген
- ☐ b. Табун
- ☐ c. Люїзит
- ☐ d. Адамсит
- ☐ e. Зарін


Коментар

Правильна відповідь: Фосген

## Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Населення, яке проживає близько атомної електростанції, у зв'язку з аварією на одному з енергоблоків, зазнало радіаційного опромінення. Більшість уражених отримали дозу зовнішнього опромінення 2 Гр. Який вид медичної допомоги необхідно надати ураженим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Само-взаємодопомога
- ☐ b. Перша лікарська
- ☐ c. Спеціалізована
- ☐ d. Кваліфікована
- ☐ e. Перша долікарська


Коментар

Правильна відповідь: Кваліфікована

## Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 26-ти років надійшла до пологового стаціонару в строку пологів для проведення планового кесарського розтину з приводу рівномірно звуженого тазу. Під час інтубації трахеї виникли технічні труднощі, що зумовили розвиток стану клінічної смерті. Одним з етапів реанімаційних заходів є: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Проведення вставленої абдомінальної компресії
- ☐ b. Надати пацієнтці положення Тренделенбурга
- ☐ c. Надати пацієнтці положення Фовлера
- ☐ d. негайно підняти нижні кінцівки пацієнтки
- ☐ e. Екстрене розродження шляхом проведення кесарського розтину


Коментар

Правильна відповідь: Екстрене розродження шляхом проведення кесарського розтину

### Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому 52-х років виконана екскреторна урографія. Через 10 хвилин після внутрішньовенного введення контрастної речовини стан хворого різко погіршився. Непритомний. АТ-50/20 мм рт.ст., Рс- 120/хв., ритмічний. В анамнезі - медикаментозна алергія. З метою лікування необхідно ввести: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Внутрішньовенно преднізолон, інфузія кристалоїдів
- ☐ b. Адреналін підшкірно, димедрол внутрішньовенно
- ☐ c. Внутрішньовенно еуфілін
- ☐ d. Адреналін внутрішньовенно, швидка інфузія кристалоїдів
- ☐ e. Внутрішньом'язово димедрол, преднізолон


Коментар

Правильна відповідь: Адреналін внутрішньовенно, швидка інфузія кристалоїдів

### Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В амбулаторію сімейної медицини родичами доставлена хвора 80 років, яка впала з ліжка, відчувала різкий біль в ділянці верхньої третини стегна. Стан важкий. Хвора виснажена, погано розуміє питання, не завжди відповідає по суті. Пульс аритмічний, тони серця глухі, миготлива аритмія. Гомілки пастозні, трофічні порушення на шкірі. Нога на боці ушкодження значно ротована назовні. У ділянці великого вертлюга видно синець. Запідозрений черезвертлюговий перелом стегнової кістки. Які анатомічні межі для транспортної іммобілізації слід обрати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Від основи пальців до гребеня клубової кістки
- ☐ b. Від основи пальців до пахвинної ямки
- ☐ c. Від основи пальців до кульшового суглоба
- ☐ d. Від колінного суглоба до пахвинної ямки
- ☐ e. Від колінного суглоба до гребеня клубової кістки


Коментар

Правильна відповідь: Від основи пальців до пахвинної ямки

## Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 37-ми років, що вживав напередодні копчену рибу власного виробництва, поступово розвинулись м'язова слабкість, неможливість читати газетний текст, на другий день - порушення ковтання. Об'єктивно: стан тяжкий, ціаноз шкіри, страбізм, ЧД - 50/хв., Рс - 120/хв. Голос гугнявий, парез зіниць, метеоризм 2 ступеня. Випорожнення відсутні 2 доби. Який лікувальний захід показаний у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Штучна вентиляція легень
- ☐ b. Трахеостомія
- ☐ c. Призначення прозерину
- ☐ d. С.Штучне дихання "рот у рот"
- ☐ e. Введення діуретиків


Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

## Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікаря швидкої допомоги звернулася роділля після домашніх пологів. Зі слів відомо, що за 30 хвилин тому в неї народилася дівчинка, після чого через 10 хвилин виділився послід. Почалася кровотеча. Які дії лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести ензапрост та спостерігати
- ☐ b. Ввести окситоцин та спостерігати
- ☐ c. Госпіталізувати роділлю
- ☐ d. Ввести ергометрін та спостерігати
- ☐ e. Ввести метилергометрін і госпіталізувати роділлю


Коментар

Правильна відповідь: Ввести метилергометрін і госпіталізувати роділлю

## Питання 151

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 2 роки, хворіє протягом 3-х днів. Захворювання розпочалося з підвищення температури тіла до 38,0°C, блюванням, через 4 години приєдналася діарея. Випорожнення рідкі водянисті 8 разів на добу, домішки слизу та крові відсутні. На час огляду дитина активна, шкіра чиста, тургор тканин незмінений, слизові вологі, п'є жадібно, останній час мочилася 1 годину тому.

Тактика ведення хворого:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Проведення парентеральної регідrataції в домашніх умовах
- ☐ b. Планова госпіталізація через 1 тиждень
- ☐ c. Негайна госпіталізація
- ☐ d. Проведення оральної регідrataції в домашніх умовах


Коментар

Правильна відповідь: Проведення оральної регідrataції в домашніх умовах

## Питання 152

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 36-ти років скаржиться на інтенсивний біль у епігастральній ділянці, багаторазове блювання, яке не приносить полегшення, виражену загальну слабкість. Об'єктивно: загальний стан важкий, шкіра та видимі слизові - бліді, з поодинокими фіолетовими плямами. Рс- 100/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Під час пальпації живота визначається ригідність черевної стінки та різка

болючість у епігастральній ділянці на 6 см вище пупка та у лівому реберно-хребетному куті. Пульсація аорти у епігастральній ділянці не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Перфоративна виразка
- ☐ b. Розшаровуюча аневризма аорти
- ☐ c. Гострий панкреатит
- ☐ d. Гострий апендицит
- ☐ e. Гострий холецистит


Коментар

Правильна відповідь: Гострий панкреатит

### Питання 153

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна в терміні 32 тижні страждає на міастенію. З'явились розлади дихання, тахікардія, психомоторне збудження, яке змінюється млявістю, апатією, парезом кишечника та сфінктерів. Першочергові засоби невідкладної допомоги: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. ШВЛ з застосуванням міорелаксантів курареподібної дії
- ☐ b. Призначення прозерину
- ☐ c. Термінове розродження
- ☐ d. Профілактика гіпоксії плоду
- ☐ e. Введення транквілізаторів


Коментар

Правильна відповідь: Призначення прозерину

### Питання 154

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 28-ми років доставлений в лікарню у зв'язку із втратою свідомості. Скаржиться на виражену загальну слабкість, запаморочення. Об'єктивно: загальний стан тяжкий, шкірні покриви бліді. Ps-

110/хв., АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця ритмічні. В легенях дихання везикулярне. Живіт м'який, нерізка виражена болючість в епігастрії. В яке відділення повинен бути госпіталізований хворий? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. У терапевтичне відділення
- ☐ б. У гастроентерологічне відділення
- ☐ в. У неврологічне відділення
- ☐ г. У хірургічне відділення
- ☐ д. У кардіологічне відділення


Коментар

Правильна відповідь: У хірургічне відділення

## Питання 155

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Солдат доставлений у непритомному стані до медичної роти з казарми. Зі слів товаришів по службі, приблизно за 6 годин до цього він прав обмундирування в закритому приміщенні в розчині технічної рідини. Об'єктивно: непритомний, однак реакція на больові подразники збережена. Шкіра і видимі слизові оболонки бліді, у повітрі, що видихається, солодкий запах. Рс-80/хв., ритмічний, тони серця звучні, АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧДР- 18/хв., дихання везикулярне, живіт м'який, неболючий. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Отруєння ароматичними вуглеводнями середнього ступеня
- ☐ б. Інгаляційне отруєння тетраетилсвинцем важкого ступеня
- ☐ в. Отруєння етиленгліколем важкого ступеня
- ☐ г. Пероральне отруєння хлорованими вуглеводнями важкого ступеня
- ☐ д. Інгаляційне отруєння хлорованими вуглеводнями


Коментар

Правильна відповідь: Інгаляційне отруєння хлорованими вуглеводнями

## Питання 156

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До постраждалого 38-ми років викликана бригада невідкладної медичної допомоги. Зі слів очевидців хворий травму отримав внаслідок ураження електричним струмом. Об'єктивно: свідомість відсутня, дихання та пульс не визначаються, на ЕКГ - ознаки фібриляції міокарду. Першочерговий захід у даному випадку:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Непрямий масаж серця
- ☐ b. Дефібриляція
- ☐ c. Інфузійна терапія
- ☐ d. Транспортування постраждалого в лікувальний заклад
- ☐ e. Введення серцевих глікозидів


Коментар

Правильна відповідь: Дефібриляція

### Питання 157

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікаря звернувся хворий 62-х років, який після тривалого перебування в темряві та емоційного напруження скаржиться на сильний біль в лівому оці, в лівій половині голови, затуманювання зору, нудоту, блювання. Різко знижена гострота зору лівого ока, на очному яблуці змішана ін'єкція, рогова оболонка набрякла, передня камера мілка, зіниця розширена, внутрішньоочний тиск пальпаторно різко підвищений. Для якої патології характерна така клінічна картина?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий напад глаукоми
- ☐ b. Гострий кон'юнктивіт
- ☐ c. Іридоцикліт з гіпертензією
- ☐ d. Кератит
- ☐ e. Іридоцикліт


Коментар

Правильна відповідь: Гострий напад глаукоми

### Питання 158

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання



Хворий 44-х років звернувся до дільничного лікаря на 7-й день хвороби зі скаргами на підвищену температуру тіла, поганий сон, закреп. Початок хвороби поступовий. В ході огляду: блідість шкірних покривів, температура - 38,2°C, ЧСС- 68/хв. Печінка збільшена. Які методи дослідження допоможуть підтвердити діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Паразитоскопічне дослідження фекалій
- ☐ b. Полімеразна ланцюгова реакція на віруси гепатитів
- ☐ c. РМАЛ
- ☐ d. Реакція Пауль-Буннеля
- ☐ e. Гемокультура, реакція Відаля


Коментар

Правильна відповідь: Гемокультура, реакція Відаля

### Питання 159

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчини 19-ти років після зґвалтування виникли постійна плаксивість, тривога, настрій став пригніченим, знизилася працездатність, рухи загальмовані, з'явилися думки про недоцільність життя. Визначте психопатологічний стан:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тривожна депресія
- ☐ b. Інволюційна депресія
- ☐ c. Ендогенна депресія
- ☐ d. Реактивна депресія
- ☐ e. Судинна депресія


Коментар

Правильна відповідь: Реактивна депресія

### Питання 160

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 17-ти років 3 дні хворіє на ГРЗ. Після різкого вставання з ліжка відчув загальну слабкість, шум у вухах, потемніння в очах. Шкіра холодна, бліда, з мармуровим відтінком. АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧСС- 56/хв. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Енцефаліт
- ☐ б. Непритомність
- ☐ в. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ г. Ортостатичний колапс
- ☐ д. Синдром Морганьї-Адамса-Стокса


Коментар

Правильна відповідь: Ортостатичний колапс

## Питання 161

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка покусав сусідський собака за стегна та передпліччя біля 20 хвилин тому назад. Які засоби повинен застосувати сімейний лікар на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Промити рану антибіотиками
- ☐ б. Промити рану розчином йоду
- ☐ в. Ввести протиправцеву сироватку
- ☐ г. Накласти герметичну пов'язку
- ☐ д. Промити рану розчином господарського мила


Коментар

Правильна відповідь: Промити рану розчином господарського мила

## Питання 162

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На медичному пункті полку хворий 25-ти років зі скаргами на слабкість, нудоту, запаморочення. Біля 3 годин був ядерний вибух. Шкіра бліда, волога, ЧДР - 28/хв., периферичні лімфовузли не збільшені, геморагій немає, дихання везикулярне, тони приглушені; Рс- 106/хв., АТ-110/70 мм рт.ст.

Живіт болісний по ходу тонкого кишківника. Набряків немає. Показник індивідуального дозиметра 3,9 Гр. Чим обумовлені клінічні прояви захворювання?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра променева хвороба III ступеня
- ☐ б. Гостра променева хвороба II ступеня
- ☐ в. Гостра токсикоінфекція
- ☐ г. Гостра променева хвороба IV ступеня
- ☐ д. Гостра променева хвороба I ступеня


Коментар

Правильна відповідь: Гостра променева хвороба II ступеня

### Питання 163

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Повторновагітна 28-ми років з приводу теперішньої вагітності у жіночій консультації не спостерігалася. З анамнезу: під час попередньої вагітності виявлений гестаційний цукровий діабет. Скарги на шкірний свербіж, пітливість, загальну слабкість. З рота відзначається запах ацетону. Тиждень тому при проведенні ультразвукового обстеження діагностована вагітність 10 тижнів. Яка тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Рекомендувати вагітній стати на облік у жіночу консультацію
- ☐ б. Направити до гінекологічного відділення
- ☐ в. Госпіталізація в ендокринологічне відділення в ургентному порядку
- ☐ г. Планова госпіталізація в ендокринологічне відділення
- ☐ д. Амбулаторне обстеження


Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація в ендокринологічне відділення в ургентному порядку

### Питання 164

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 50-ти років, що знаходиться у інфарктному відділенні з трансмуральним інфарктом, раптово знепритомнів. Об'єктивно: зупинка серцевої діяльності та дихання, електромеханічна дисоціація. Розпочато серцеволегеневу реанімацію. Які наступні дії?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньосерцеве введення адреналіну
- ☐ б. Дефібриляція
- ☐ с. Внутрішньовенне введення новокаїнамідю
- ☐ д. Внутрішньовенне введення лідокаїну
- ☐ е. Внутрішньовенне введення строфантину

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньосерцеве введення адреналіну

### Питання 165

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 28-ми років на фоні бронхопневмонії розвинулася кома. Об'єктивно: ЧСС- 122/хв., екстрасистолія. АТ- 80/45 мм рт.ст. Шкіра суха, тургор знижений. Дихання глибоке, шумне, рідке. Різкий запах ацетону. Печінка +5 см. Глікемія - 32 ммоль/л; рН крові - 7,0. Який розчин буде найбільш ефективним для нормалізації дихання?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 4,2%розчин натрію бікарбонату
- ☐ б. Реополіглюкін
- ☐ с. 5% розчин глюкози
- ☐ д. 1%розчин калію хлориду
- ☐ е. 0,9%розчин натрію хлориду

Коментар

Правильна відповідь: 4,2%розчин натрію бікарбонату

### Питання 166

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 56-ти років, скаржиться на слабкість, біль в м'язах, парестезії в ділянці обличчя, нижніх кінцівок, симетричні судоми, які виникають спонтанно, утруднення дихання, блювання. В анамнезі - два тижні тому перенесла тотальну резекцію щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зобу III ступеня і отримує тироксин 100 мкг на добу. Об'єктивно: свідомість затьмарена, шкіра суха. У верхніх кінцівках - судоми м'язів за типом "руки акушера", порушений акт ковтання, задишка. Рс-62/хв., ритмічний. АТ-115/60 мм рт.ст. Позитивні симптоми Хвостека, Труссо. Лабораторно: рівень кальцію в крові - 1,3 ммоль/л; глікемія - 5,3 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Епілептичний статус
- ☐ b. Гіпокальціємічна криза
- ☐ c. Правець
- ☐ d. Інсулома
- ☐ e. Істерія


Коментар

Правильна відповідь: Гіпокальціємічна криза

### Питання 167

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 51-го року доставлений у відділення кардіореанімації (інтенсивної терапії), скаржиться на тривалий пекучий за груднинний біль, який виник 40 хвилин тому, задишку. Об'єктивно: в легенях - дихання з жорстким відтінком, тони серця різко ослаблені, АТ- 110/70 мм рт.ст. На ЕКГ виявлено підйом сегменту ST на 5 мм над ізолінією у відведеннях I, V1-V4 та депресію сегмента ST у відведеннях III і aV F. Який препарат потрібно застосувати у даній ситуації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Аміодарон
- ☐ b. Добутамін
- ☐ c. Нітрогліцерин
- ☐ d. Метопролол
- ☐ e. Альтеплаза

Коментар

Правильна відповідь: Альтеплаза

### Питання 168

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 4-тижневого віку через 2 тижні від початку захворювання, що проявляється блюванням "фонтаном", вираженою гіпотрофією і ексикозом, педіатр припустив вроджений пілоростеноз. При надходженні до дитячого відділення стан вкрай важкий: риси обличчя загострені, адинамія, сильна спрага, анурія, запах сечі з рота, сірість шкірних покривів. У сироватці крові: натрій - 135 моль/л, калій - 3,7 ммоль/л. Коматозний стан якого характеру розвинувся у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпохлоремічна кома
- ☐ б. Гіпоглікемічна кома
- ☐ в. Кетоацидотична кома
- ☐ г. Азотемічна кома
- ☐ д. Гіперосмолярна кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіпохлоремічна кома

## Питання 169

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Триває значний викид радіонуклідів у атмосферу з пошкодженого ядерного реактора. Доза опромінення всього тіла за перші 10 діб у дорослих становить 500 мЗв. Які заходи захисту треба запровадити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Обмежити вживання забруднених радіонуклідами харчових продуктів та питної води
- ☐ б. За таких умов потрібна евакуація населення із зон радіоактивного забруднення
- ☐ в. Використовуються укриття та засоби захисту органів дихання та шкірного покриву
- ☐ г. Ніякі, тому що дози опромінення не перевищують допустимі рівні
- ☐ д. Потрібно провести йодну профілактику


Коментар

Правильна відповідь: За таких умов потрібна евакуація населення із зон радіоактивного забруднення

## Питання 170

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 77-ми років звернувся в хірургічну клініку зі скаргами на тупий, ниючий біль в животі з іррадіацією в попереk, нестійкі випорожнення, зниження апетиту, схуднення. Об'єктивно в мезогастрії пальпується пульсуюче утворення з систолічним шумом над ним. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Абдомінальний ішемічний синдром
- ☐ b. Синдром Леріша
- ☐ c. Цироз печінки
- ☐ d. Рак підшлункової залози
- ☐ e. Аневризма черевної аорти


Коментар

Правильна відповідь: Аневризма черевної аорти

## Питання 171

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий побитий невідомими особами, побої наносились руками по голові. Хворий втрачав свідомість на 5-10 хвилин, мали місце нудота та блювання, загальна слабкість в неврологічному статусі розсіяна мікроогнищева неврологічна симптоматика. Місцеві зміни: забої м'яких тканин голови. Який метод обстеження, найбільш інформативний, слід провести для постановки діагнозу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Електроенцефалографія
- ☐ b. Рентгенографія черепа
- ☐ c. Ехоенцефалографія
- ☐ d. Ангіографія судин головного мозку
- ☐ e. Комп'ютерна томографія головного мозку


Коментар

Правильна відповідь: Комп'ютерна томографія головного мозку

## Питання 172

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 27-ми років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу вірусного гепатиту А. На 7-й день лікування після вечері великою кількістю м'ясної їжі у хворого пропав апетит, з'явились блювання, гикавка, запаморочення. Хворий збуджений. Шкіра жовтяничного кольору, геморагії на шкірі, тремор м'язів, сповільнена мова. Розміри печінки зменшилися. Діагностовано гостру печінкову недостатність. Введення якого препарату, що використовується в лікуванні печінкової недостатності, дозволить зменшити ендогенну інтоксикацію?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Орнідазол
- ☐ b. 20 мл 40% глюкози
- ☐ c. Лактулоза
- ☐ d. Небіволол
- ☐ e. 100 мл ізотонічного розчину


Коментар

Правильна відповідь: Лактулоза

## Питання 173

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик у віці 6 місяців хворіє на тяжку форму кашлюка: число нападів кашлю становить 25, напади тяжкі, тривалістю до 10 хвилин, мають 6-8 репризів, закінчуються блюванням. Один з нападів кашлю призвів до апное. Які невідкладні дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Налагодити подачу кисню
- ☐ b. Седуксен внутрішньом'язово
- ☐ c. Лобелін внутрішньом'язово
- ☐ d. Преднізолон внутрішньом'язово
- ☐ e. Штучне дихання (в ручному режимі)


Коментар

Правильна відповідь: Штучне дихання (в ручному режимі)

## Питання 174



Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з інфекційним ендокардитом з ураженням аортального клапану виник інтенсивний біль у попереку, зліва та справа, який був розцінений як інфаркт нирок. Протягом доби у хворого посилювались загальна слабкість, апатія, тахікардія, артеріальний тиск знизився до 60/0 мм рт.ст., з'явилися блювання, пронос, холодний липкий піт, олігурія. Чим ускладнився перебіг захворювання?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інфаркт селезінки
- ☐ b. Гостра надниркова недостатність внаслідок крововиливу у наднирники
- ☐ c. Гостра серцева недостатність
- ☐ d. Інфаркт мозку
- ☐ e. Гостра ниркова недостатність внаслідок інфаркту нирки

Коментар

Правильна відповідь: Гостра надниркова недостатність внаслідок крововиливу у наднирники

## Питання 175

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пологи другі, своєчасні. 3 години тому відійшли навколоплідні води. Пологова діяльність активна, загальнонормованозвужений таз II ступеня. Передбачувана маса плоду 3900 г. Серцебиття плоду не вислуховується. При піхвовому дослідженні відкриття шийки матки повне, плідного міхура немає, передлежить голівка плоду, притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов у поперечному розмірі. Яка лікарська тактика?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ведення пологів через природні статеві шляхи
- ☐ b. Краніотомія
- ☐ c. Накладання акушерських щипців
- ☐ d. Стимуляція пологової діяльності окситоцином
- ☐ e. Кесарів розтин

Коментар

Правильна відповідь: Краніотомія

## Питання 176

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час оперативного втручання, що виконувалося в умовах ендотрахеального наркозу, у жінки 82-х років на кардіомоніторі зафіксовано фібриляцію шлуночків. Розпочато реанімаційні заходи. Оберіть шлях введення лікарських засобів під час проведення серцево-легеневої та церебральної реанімації:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інтраперитонеальний
- ☐ b. Внутрішньосерцевий
- ☐ c. Внутрішньокістковий
- ☐ d. Внутрішньовенний
- ☐ e. Введення лікарських засобів протипоказано

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенний

## Питання 177

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 42-х років, оглянутий лікарем-психіатром, перебуває в стані оглушення, що періодично змінюється тривогою, відчаєм, афективними спалахами, гіперактивністю. На запитання не реагує. Відомо, що стан виник через декілька хвилин після бойових дій та триває 2 години. Який імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Параноїдна реакція
- ☐ b. Іпохондричний невроз
- ☐ c. Гостра реакція на стрес
- ☐ d. Тривожна реакція
- ☐ e. Конверсійна реакція

Коментар

Правильна відповідь: Гостра реакція на стрес

## Питання 178

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого, який перебуває в гіперглікемічній комі, через 4 години після початку інсулінотерапії раптово розвинулися тахікардія, м'язова гіпотонія; АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: подовження інтервалу QT, зниження S – T, розширення і сплюснення T. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіперглікемія
- ☐ b. Гіповолемія
- ☐ c. Гіпокаліємія
- ☐ d. Гіперкаліємія
- ☐ e. Гіпоглікемія

Коментар

Правильна відповідь: Гіпокаліємія

## Питання 179

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 38-ми років протягом тривалого часу відчував зубний біль. Згодом з'явилися біль голови і ока, загальна слабкість, підвищилася температура тіла. Об'єктивно: хемоз кон'юнктиви, застійна ін'єкція очного яблука, екзофтальм, обмеження рухів очного яблука. В крові: лейкоцитоз, ШОЕ- 24 мм/год. На рентгенограмі орбіт патології не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ретробульбарний крововилив
- ☐ b. Запальний псевдотумор орбіти
- ☐ c. Теноніт
- ☐ d. Целюліт орбіти
- ☐ e. Флегмона орбіти

Коментар

Правильна відповідь: Флегмона орбіти

## Питання 180

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Перша медична допомога (самота взаємодопомога) при радіаційних ураженнях передбачає усунення або послаблення початкових ознак променевої хвороби. З цією метою особовий склад Збройних Сил безпосередньо після вибуху для профілактики первинної реакції бере з індивідуальної аптечки (одну таблетку):

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Будаксим
- ☐ б. Доксидикліну гідрохлорид
- ☐ в. Цистамін
- ☐ г. Вібрацин
- ☐ д. Етаперазин

Коментар

Правильна відповідь: Етаперазин

## Питання 181

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 7-ми років госпіталізована з явищами адинамії, що змінюється на збудження, сонливості, задухи, блювання. Об'єктивно:  $t_{\text{о}} - 40,1^{\circ}\text{C}$ ,  $P_{\text{с}} - 189/\text{хв.}$ , виражена жовтяниця, тремор кінцівок, печінковий запах з рота, зменшення розмірів печінки. Кров: білірубін -  $200 \text{ мкмоль/л}$ . Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ацетонемічний синдром
- ☐ б. Панкреатична кома
- ☐ в. Менінгоенцефаліт
- ☐ г. Діабетична кома
- ☐ д. Гостра печінкова недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

## Питання 182

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 56-ти років госпіталізований зі скаргами на відчуття важкості в верхніх відділах живота, схуднення, періодичні блювання з'їденою їжею. Виразковий анамнез - 30 років. При пальпації визначається "шум плескоту" натщесерце. Добовий діурез до 800 мл на добу. При рентген дослідженні шлунка - затримання барієвої суспензії в шлунку до 14 годин, деформація пілородуоденальної зони. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Компенсований виразковий пілоростеноз
- ☐ b. Гострий панкреатит
- ☐ c. Декомпенсований виразковий пілоростеноз
- ☐ d. Субкомпенсований виразковий пілоростеноз
- ☐ e. Гострий пієлонефрит

Коментар

Правильна відповідь: Субкомпенсований виразковий пілоростеноз

## Питання 183

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора на дифузний токсичний зоб 30-ти років, не лікувалася. Після надмірного навантаження під час занять спортом виникли збудження, серцебиття, пітливість, блювання. Рс-140/хв., миготлива аритмія. АТ- 100/40 мм рт.ст. Тони серця звучні. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіпоталамічний криз
- ☐ b. Тиреотоксична криза
- ☐ c. Метаболічна кардіоміопатія
- ☐ d. Гостра серцево-судинна недостатність
- ☐ e. Гостра судинна недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Тиреотоксична криза

## Питання 184

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 34-х років скаржиться на біль та скутість у грудному та поперековому відділах хребта після довготривалого сидіння та в нічний час. Об'єктивно: невелика сутулість, ходіння скутне, позитивні симптоми Томаєра і Шобера, ознаки правобічного іридоцикліту. Рентгенографія кісток тазу: крижово-здухвинні з'єднання нерівні, нечіткі, ділянки остеосклерозу, їх щілини з обох боків нерівномірно звужені. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Псоріатичний артрит, сакроілеїт
- ☐ b. Остеоартроз із ураженням хребта
- ☐ c. Анкілозуючий спондилоартрит
- ☐ d. Туберкульозне ураження хребта
- ☐ e. Хвороба Рейтера, сакроілеїт

Коментар

Правильна відповідь: Анкілозуючий спондилоартрит

## Питання 185

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Увійськовослужбовця в зоні бойових дій має місце вивих великого пальця лівої руки. До якої сортувальної категорії з її візуальним позначенням буде віднесений потерпілий?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. II (жовтий колір)
- ☐ b. V (синій колір)
- ☐ c. IV (темно-фіолетовий колір)
- ☐ d. I (червоний колір)
- ☐ e. III (зелений колір)

Коментар

Правильна відповідь: III (зелений колір)

### Питання 186

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дівчинки після народження відсутнє серцебиття (асистолія). Шляхи введення адреналіну при первинній реанімації новонароджених:  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньом'язовий та внутрішньовенний
- ☐ б. Внутрішньом'язовий
- ☐ с. Внутрішньом'язовий та інтратрахеальний
- ☐ d. Внутрішньошкірний
- ☐ е. Внутрішньовенний та інтратрахеальний

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенний та інтратрахеальний

### Питання 187

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10-ти років зупинена артеріальна кровотеча (плечова артерія) через 10 хвилин після травми. При надходженні АТ- 90/50 мм рт.ст., еритроцити -  $2,5 \times 10^{12}/л$ , Hb- 60 г/л. Раніше при переливанні цільної крові була анафілактична реакція. Який препарат крові найбільш безпечний для корекції крововтрати?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Цільна кров
- ☐ б. Відмиті еритроцити
- ☐ с. Свіжозаморожена плазма
- ☐ d. Лейкоконцентрат
- ☐ е. Еритроцитарна маса

Коментар

Правильна відповідь: Відмиті еритроцити

### Питання 188

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка з терміном вагітності 6 тижнів скаржиться на спрагу, свербіння шкіри, порушення зору, поліурію. В анамнезі I тип цукрового діабету. В аналізі крові: цукор 9 ммоль/л натще, після навантаження глюкозою - 12 ммоль/л. Огляд окуліста: проліферативна ретинопатія. Що необхідно запропонувати жінці?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Лікування дієтою
- ☐ б. Перервати вагітність
- ☐ в. Подальше обстеження
- ☐ г. Лікування інсуліном
- ☐ д. Зберігання вагітності

Коментар

Правильна відповідь: Перервати вагітність

## Питання 189

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 28-ми років екстрено доставлено до операційної з приводу профузної шлунково-кишкової кровотечі. Загальний стан тяжкий, свідомість - оглушення, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС-110/хв., олігурія. Вкажіть об'єм крововтрати:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. >40% дефіциту ОЦК (>2000 мл)
- ☐ б. 30-40% дефіциту ОЦК (>1750 мл)
- ☐ в. Крововтрати немає
- ☐ г. 15% дефіциту ОЦК (750-1250 мл)
- ☐ д. 20-25% дефіциту ОЦК (1250-1750 мл)

Коментар


Правильна відповідь: 30-40% дефіциту ОЦК (>1750 мл)

## Питання 190

Відповіді не було



Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час обстрілу в зоні бойових дій, у солдата з'явилися наступні симптоми: став тривожним, надмірно метушливим, гіперактивним, не виконував накази командира, неадекватно реагував на навколишніх. Впродовж двох годин стан покращився, симптоми стали менш вираженими, пам'ять на події, що відбувались, частково втрачена. Поставте імовірний діагноз:  
Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Посттравматичний стресовий розлад
- ☐ b. Контузія
- ☐ c. Гостра реакція на стрес
- ☐ d. Розлад адаптації
- ☐ e. Гострий поліморфний психотичний розлад


Коментар

Правильна відповідь: Гостра реакція на стрес

## Питання 191

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Солдат 19 років під час пожежі в БТР отримав циркулярні футлярні опіки нижніх кінцівок IV ступеню на площі 30% поверхні тіла. Яке лікування постраждалого слід провести під час надання кваліфікованої хірургічної допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Протишокова терапія та накладання асептичних пов'язок
- ☐ b. Протишокова терапія
- ☐ c. Протишокова терапія та некротомії вражених ділянок
- ☐ d. Висічення некрозу та пересадка шкіри
- ☐ e. Протишокова терапія та пересадка шкіри


Коментар

Правильна відповідь: Протишокова терапія та некротомії вражених ділянок

## Питання 192

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 9-ти років, яка хворіє на цукровий діабет, на тлі кишкової інфекції виникли і наростають неврологічні симптоми: порушення орієнтації, галюцинації, фокальні судоми. Наявні ознаки дегідратації III ступеня, дихальних порушень немає, запах ацетону відсутній. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пухлина головного мозку
- ☐ b. Енцефаліт
- ☐ c. Гіперосмолярна кома
- ☐ d. Гіпоглікемічна кома
- ☐ e. Діабетична кетоацидотична кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

### Питання 193

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий 42-х років, виявлений на місці ДТП, скаржиться на біль у ділянці таза та правого стегна. Об'єктивно: загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. ЧДР- 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле, у верхній його третині патологічна рухливість, крепітація кісткових уламків. Великий крововилив, набряк та біль під час пальпації в правих пахвинній, здухвинній та сідничній ділянках. Рс-112/хв., АТ- 80/45 мм рт.ст. Якому ступеню травматичного шоку відповідає стан потерпілого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. IV
- ☐ b. II
- ☐ c. I
- ☐ d. III


Коментар

Правильна відповідь: II

### Питання 194

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 8-ми років підвищення температури до 39°C, нежить зі значними гнійними виділеннями, вологий кашель, кон'юнктивіт з гнійним виділенням, світлобоязливість. На слизовій оболонці щік білуваті ділянки висівкоподібно злушеного епітелію. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кореподібна краснуха
- ☐ b. Кір
- ☐ c. Скарлатина
- ☐ d. Висипний тиф
- ☐ e. Грип


Коментар

Правильна відповідь: Кір

## Питання 195

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 14-річного хлопця з верифікованою виразковою хворобою відмічається посилення больового синдрому. Біль постійний, не зменшується після прийому їжі, відмічається стул чорного кольору. При обстеженні живіт різко болючий при пальпації з іррадіацією болю в ліве підребер'я, відмічається напруження м'язів живота, в пілородуоденальній зоні пальпується щільне утворення. Яка найбільш обґрунтована тактика ведення хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Госпіталізація в гастроентерологічне відділення
- ☐ b. Обстеження та спостереження в умовах поліклініки
- ☐ c. Симптоматичне лікування вдома
- ☐ d. Планова госпіталізація в хірургічне відділення
- ☐ e. Ургентна госпіталізація хворого в хірургічне відділення


Коментар

Правильна відповідь: Ургентна госпіталізація хворого в хірургічне відділення

## Питання 196

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На 4-ту добу після переливання несумісної по групі крові, у хворого різко зменшився діурез, розвинулася анурія, різко погіршився загальний стан, підвищився артеріальний тиск. При лабораторних дослідженнях: креатинін плазми - 680 мкмоль/л, сечовина плазми - 24 мкмоль/л. Яке захворювання і яку його стадію можна припустити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий інтерстиціальний нефрит, обтураційна анурія
- ☐ б. Гемотрансфузійний шок, постренальна гостра ниркова недостатність, анурія
- ☐ в. Анафілактичний шок, гостра ниркова недостатність, анурія
- ☐ г. Постгеморагічна гостра ниркова недостатність, анурія
- ☐ д. Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія


Коментар

Правильна відповідь: Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія

## Питання 197

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пішохід 62-х років під час ожеледиці послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є локалізований біль у ділянці верхньої третини лівого передпліччя. Спостерігаються тахікардія, підвищення артеріального тиску, припухлість, деформація, синець та крепітація в ділянці верхньої третини лівого передпліччя, рухи кінцівки неможливі. Можна припустити пошкодження верхньої третини лівого передпліччя. Як ви будете транспортувати хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Прибинтувавши праву верхню кінцівку до грудної клітини та здорової кінцівки
- ☐ б. Наклавши шину Крамера з фіксацією плечового, ліктьового, променево-зап'ясткового суглобів
- ☐ в. Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п'ястно-фалангових суглобів
- ☐ г. Наклавши пов'язку Дезо з валиком в пахвовій ділянці
- ☐ д. В напівсидячому положенні з палкою в ліктьових згинах

Коментар

Правильна відповідь: Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п'ястно-фалангових суглобів

## Питання 198

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 8-ми років впав з велосипеда, відчув різкий біль у шийному відділі. Об'єктивно: голова повернута вправо, спроби повороту голови вліво болісні. Для транспортної іммобілізації необхідно: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Необхідності у фіксації немає
- ☐ b. Виведення голови в середнє положення
- ☐ c. Парентеральне введення міорелаксантів
- ☐ d. Гіперкорекція (нахил голови у протилежний бік)
- ☐ e. Фіксація голови у цьому ж положенні

Коментар

Правильна відповідь: Фіксація голови у цьому ж положенні

## Питання 199

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 15-ти років раптово поскаржилась на запаморочення, потемніння в очах, після чого знепритомніла. Тривалий час дитина знаходилась у душному приміщенні. Об'єктивно: дівчинка без свідомості, шкірні покриви бліді. Дистальні відділи верхніх та нижніх кінцівок холодні.

Відзначаються тахікардія, ниткоподібний пульс, зниження артеріального тиску. Який препарат на догоспітальному етапі треба призначити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кофеїн бензонат
- ☐ b. Ефедрин
- ☐ c. Адреналін
- ☐ d. Допамін
- ☐ e. Мезатон


Коментар

Правильна відповідь: Кофеїн бензонат

## Питання 200

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого із вкрай важким ступенем кістковомозкової форми гострої променевої хвороби у початковому періоді з'явилися: лихоманка, сильний головний біль, адинамія, біль у м'язах і суглобах. Який синдром гострої променевої хвороби у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Синдром ураження нервової системи
- ☐ б. Синдром інфекційних ускладнень
- ☐ в. Синдром загальної токсемії
- ☐ г. Гастроінтестинальний синдром
- ☐ д. Геморагічний синдром

Коментар

Правильна відповідь: Синдром загальної токсемії

[Завершити перегляд](#)

[Пропустити](#) Перехід по тесту

[Перехід по тесту](#)

[Питання 1](#) [На цій сторінці](#) [Питання 2](#) [На цій сторінці](#) [Питання 3](#) [На цій сторінці](#) [Питання 4](#) [На цій сторінці](#) [Питання 5](#) [На цій сторінці](#) [Питання 6](#) [На цій сторінці](#) [Питання 7](#) [На цій сторінці](#) [Питання 8](#) [На цій сторінці](#) [Питання 9](#) [На цій сторінці](#) [Питання 10](#) [На цій сторінці](#) [Питання 11](#) [На цій сторінці](#) [Питання 12](#) [На цій сторінці](#) [Питання 13](#) [На цій сторінці](#) [Питання 14](#) [На цій сторінці](#) [Питання 15](#) [На цій сторінці](#) [Питання 16](#) [На цій сторінці](#) [Питання 17](#) [На цій сторінці](#) [Питання 18](#) [На цій сторінці](#) [Питання 19](#) [На цій сторінці](#) [Питання 20](#) [На цій сторінці](#) [Питання 21](#) [На цій сторінці](#) [Питання 22](#) [На цій сторінці](#) [Питання 23](#) [На цій сторінці](#) [Питання 24](#) [На цій сторінці](#) [Питання 25](#) [На цій сторінці](#) [Питання 26](#) [На цій сторінці](#) [Питання 27](#) [На цій сторінці](#) [Питання 28](#) [На цій сторінці](#) [Питання 29](#) [На цій сторінці](#) [Питання 30](#) [На цій сторінці](#) [Питання 31](#) [На цій сторінці](#) [Питання 32](#) [На цій сторінці](#) [Питання 33](#) [На цій сторінці](#) [Питання 34](#) [На цій сторінці](#) [Питання 35](#) [На цій сторінці](#) [Питання 36](#) [На цій сторінці](#) [Питання 37](#) [На цій сторінці](#) [Питання 38](#) [На цій сторінці](#) [Питання 39](#) [На цій сторінці](#) [Питання 40](#) [На цій сторінці](#) [Питання 41](#) [На цій сторінці](#) [Питання 42](#) [На цій сторінці](#) [Питання 43](#) [На цій сторінці](#) [Питання 44](#) [На цій сторінці](#) [Питання 45](#) [На цій сторінці](#) [Питання 46](#) [На цій сторінці](#) [Питання 47](#) [На цій сторінці](#) [Питання 48](#) [На цій сторінці](#) [Питання 49](#) [На цій сторінці](#) [Питання 50](#) [На цій сторінці](#) [Питання 51](#) [На цій сторінці](#) [Питання 52](#) [На цій сторінці](#) [Питання 53](#) [На цій сторінці](#) [Питання 54](#) [На цій сторінці](#) [Питання 55](#) [На цій сторінці](#) [Питання 56](#) [На цій сторінці](#) [Питання 57](#) [На цій сторінці](#) [Питання 58](#) [На цій сторінці](#) [Питання 59](#) [На цій сторінці](#) [Питання 60](#) [На цій сторінці](#) [Питання 61](#) [На цій сторінці](#) [Питання 62](#) [На цій сторінці](#) [Питання 63](#) [На цій сторінці](#) [Питання 64](#) [На цій сторінці](#) [Питання 65](#) [На цій сторінці](#) [Питання 66](#) [На цій сторінці](#) [Питання 67](#) [На цій сторінці](#) [Питання 68](#) [На цій сторінці](#) [Питання 69](#) [На цій сторінці](#) [Питання 70](#) [На цій сторінці](#) [Питання 71](#) [На цій сторінці](#) [Питання 72](#) [На цій сторінці](#) [Питання 73](#) [На цій сторінці](#) [Питання 74](#) [На цій сторінці](#) [Питання 75](#) [На цій сторінці](#) [Питання 76](#) [На цій сторінці](#) [Питання 77](#) [На цій сторінці](#) [Питання 78](#) [На цій сторінці](#) [Питання 79](#) [На цій сторінці](#) [Питання 80](#) [На цій сторінці](#) [Питання 81](#) [На цій сторінці](#) [Питання 82](#) [На цій сторінці](#) [Питання 83](#) [На цій сторінці](#) [Питання 84](#) [На цій сторінці](#) [Питання 85](#) [На цій сторінці](#) [Питання 86](#) [На цій сторінці](#) [Питання 87](#) [На цій сторінці](#) [Питання 88](#) [На цій сторінці](#) [Питання 89](#) [На цій сторінці](#) [Питання 90](#) [На цій сторінці](#) [Питання 91](#) [На цій сторінці](#) [Питання 92](#) [На цій сторінці](#) [Питання 93](#) [На цій сторінці](#) [Питання 94](#) [На цій сторінці](#) [Питання 95](#) [На цій сторінці](#) [Питання 96](#) [На цій сторінці](#) [Питання 97](#) [На цій сторінці](#) [Питання 98](#) [На цій сторінці](#) [Питання 99](#) [На цій сторінці](#) [Питання 100](#) [На цій сторінці](#) [Питання 101](#) [На цій сторінці](#) [Питання 102](#) [На цій сторінці](#) [Питання 103](#) [На цій сторінці](#) [Питання 104](#) [На цій сторінці](#) [Питання 105](#) [На цій сторінці](#) [Питання 106](#) [На цій сторінці](#) [Питання 107](#) [На цій сторінці](#) [Питання 108](#) [На цій сторінці](#) [Питання 109](#) [На цій сторінці](#) [Питання 110](#)

[illegible]

### КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

## Учасники

## Відзнаки

## Компетентності

## Журнал оцінок

## Загальне

## Секція 1

## Секція 2

### Секція 3

## Секція 4

## Контрольні тестування

## Секція 6

## Секція 7

## Секція 8

[Секція 9](#)

[Секція 10](#)

[Секція 11](#)

[Секція 12](#)

[Секція 13](#)

[Секція 14](#)

[Секція 15](#)

[Особистий кабінет](#)

[Домашня сторінка](#)

[Календар](#)

[Особисті файли](#)

Мої курси

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручняк Оксана Богданівна \(Вийти\)](#)

**КРОК 3. Загальна лікарська підготовка**

- [Українська \(uk\)](#)
  - - [English \(en\)](#)
    - [Русский \(ru\)](#)
    - [Українська \(uk\)](#)