

[Перейти до головного вмісту](#)  
Бокова панель  
КРОК-123

(Інтерн БДМУ) Підручняк Оксана Богданівна

П

Особистий кабінетПрофіль користувачаОцінкиПовідомленняУподобанняВийтиПовідомлення  
[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане  
Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане  
Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)


[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

## КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Секція 3](#)
- [2018 весна](#)

Розпочато	Tuesday 14 February 2023 20:39 PM
Стан	Завершено
Завершено	Tuesday 14 February 2023 20:39 PM
Витрачено часу	12 сек
Балів	0,00/200,00
Оцінка	0,00 з 100,00 можливих
Питання 1	

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 10-ти років протягом 3-х років хворіє на цукровий діабет. Отримує інсулінотерапію. Під час тривалої прогулянки пішки дівчинка раптово втратила свідомість. Шкірні покриви вкрилися рясним потом, спостерігається гіпертонус очних яблук, судоми. Яке ускладнення виникло у дитини? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Молочнокисла кома
- ☐ b. Діабетична нейропатія
- ☐ c. Кетоацидотична кома
- ☐ d. Гіпоглікемічна кома
- ☐ e. Синдром Морганьї-Адамса-Стокса


Коментар

Правильна відповідь: Гіпоглікемічна кома

## Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини з гострою кишковою інфекцією розвинулася клініка парезу кишечника - живіт здутий, гази відходять погано, кишкові шуми ледве прослуховуються. Введення якого препарату має першочергове значення? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Цефазолін
- ☐ b. Неогемодез
- ☐ c. Альбумін
- ☐ d. Хлорид калію
- ☐ e. Глюкоза


Коментар

Правильна відповідь: Хлорид калію

## Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час патрулювання військовослужбовець отримав мінно-вибухову травму. Об'єктивно: ліва стопа відсутня, із рани гомілки спостерігається виражена кровотеча. Шкіра бліда, пульс на променевій артерії відсутній, на сонній артерії - 112/хв. В чому полягає алгоритм надання домедичної допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Знеболення, накладання кровоспинного джгута та негайна евакуація на наступний етап
- ☐ б. Знеболення та негайна евакуація на наступний етап
- ☐ в. Накладання асептичної пов'язки, у разі неможливості зупинки кровотечі - накладання кровоспинного джгута
- ☐ г. Знеболення, накладання кровоспинного джгута, накладання асептичної пов'язки
- ☐ д. Накладання джгута та асептичної пов'язки, транспортна іммобілізація, знеболення


Коментар

Правильна відповідь: Накладання джгута та асептичної пов'язки, транспортна іммобілізація, знеболення

#### Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 25-ти років демобілізований та госпіталізований на 3-ю добу після сильного обстрілу під час бою. Скаржиться на три-вогу, відстороненість, відсутність апетиту, слабкість, швидку зміну настрою. Симптоми швидко припинилися після дії стресового фактору через 48 годин. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Депресивний синдром
- ☐ б. Дисоціативний розлад особистості
- ☐ в. Тривожний синдром
- ☐ г. Розлад свідомості
- ☐ д. Гостра реакція на стрес

Коментар

Правильна відповідь: Гостра реакція на стрес

#### Питання 5

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Поранений з мінно-вибуховою травмою доставлений з поля бою в мобільний госпіталь у стані шоку. Пульс на променевій артерії не визначається. Артеріальний тиск - 50/0 мм рт.ст. Які першочергові заходи мають бути здійснені на цьому етапі?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ультразвукове дослідження черевної та плевральних порожнин для виключення кровотечі
- ☐ б. Внутрішньом'язово ввести 1 мл адреналіну. Повторити через 5 хвилин при неефективності
- ☐ в. Крапельна інфузія 0,9% розчину NaCl у межах подвоєної добової потреби в рідині
- ☐ г. Швидке внутрішньовенне введення колоїдно-кристалоїдних розчинів
- ☐ д. Внутрішньовенна інфузія мезатону до відновлення пульсу на променевій артерії

Коментар

Правильна відповідь: Швидке внутрішньовенне введення колоїдно-кристалоїдних розчинів

## Питання 6

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки 32-х років стан після операції кесаревого розтину. На третю добу відзначено збільшення в об'ємі лівої нижньої кінцівки, поява болю за ходом глибоких вен гомілки і гіперемія шкіри. Температура тіла - 37,8°C. Яких заходів необхідно вжити після операції для профілактики глибокого венозного тромбозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Лікування антибіотиками
- ☐ б. Озонотерапія
- ☐ в. Введення фраксипарину
- ☐ г. Лікування утеротонічними препаратами
- ☐ д. Лікування цитостатиками


Коментар

Правильна відповідь: Введення фраксипарину

## Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 27-ми років звернулася до лікаря зі скаргами на біль внизу живота, підвищення температури до 38,7°C, слабкість. Об'єктивно: артеріальний тиск - 120/80 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Симптом Щоткіна-Блюмберга позитивний в гіпогастральній області. Вагінальне дослідження: матка та додатки не визначаються через напруження передньої очеревинної стінки. Заднє склепіння нависає, різко болюче. Яким буде діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пельвіоперитоніт
- ☐ b. Апоплексія яєчника
- ☐ c. Гострий ендометрит
- ☐ d. Гострий сальпінгоофорит
- ☐ e. Позаматкова вагітність


Коментар

Правильна відповідь: Пельвіоперитоніт

## Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 4-річної дитини на 5-ту добу після прийому парацетамолу, що перевищував максимально допустиму дозу в 4 рази, з'явилися порушення свідомості, збудження змінювалось сонливістю, втрата свідомості, носові кровотечі, тремор та гіперкінези верхніх кінцівок. Об'єктивно:  $t_{\text{о}}$  - 38,2°C,  $P_{\text{с}}$  - 110/хв., ЧД - 32/хв., з рота "печінковий запах". Склери та шкіра жовтушні, зірчасті ангіоми на верхній половині тулубу. Печінка - не збільшена, селезінка +1 см. В крові: К - 2,8 ммоль/л, Na - 100 ммоль/л, підвищення аміаку. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. ДВЗ-синдром
- ☐ b. Менінгококцемія
- ☐ c. Гостра ниркова недостатність
- ☐ d. Гостра печінкова недостатність
- ☐ e. Вірусний енцефаліт

Коментар

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

## Питання 9

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілого було витягнуто з автомобіля після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Скаржиться на біль в шийному відділі хребта, який посилюється при рухах головою. Вкажіть, який метод транспортної іммобілізації потрібен при даному пошкодженні:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Іммобілізація шиною Крамера від потилиці до поперекового відділу хребта
- ☐ b. Положення хворого на жорстких ношах з валиком під шиєю
- ☐ c. Іммобілізація жорстким головоутримувачем
- ☐ d. Положення хворого на спині з валиком під головою
- ☐ e. Положення хворого на животі на жорстких ношах

Коментар

Правильна відповідь: Іммобілізація жорстким головоутримувачем

## Питання 10

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 8-ми років вже другий тиждень хворіє на кашлюк. Вранці дитина самостійно випила увесь флакон сиропу від кашлю, в якому містився кодеїн. Спочатку дівчинка була неспокійною, згодом стала сонливою, мати двічі спостерігала судом. Який антидот необхідно ввести при цьому отруєнні?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Тарен
- ☐ b. Налоксону гідрохлорид
- ☐ c. Цистамін
- ☐ d. Атропін
- ☐ e. Амітриптилін

Коментар

Правильна відповідь: Налоксону гідрохлорид

## Питання 11

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Граючись на будівельному майданчику, хлопчик 10-ти років впав з висоти на бетонне покриття. Під час огляду дитина непритомна, дихальна екскурсія грудної клітки відсутня, пульс на сонній артерії не визначається, зіниці різко розширені, у дитини наявний відкритий перелом кісток гомілки, численні садна на видимих ділянках шкіри, на губах свіжі сліди крові. Яких заходів невідкладної допомоги потребує потерпілий у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Відновлення прохідності дихальних шляхів та проведення серцево-легеневої реанімації
- ☐ b. Транспортування потерпілого до найближчого лікувального закладу
- ☐ c. Загальний огляд потерпілого з пальпацією з метою визначення провідного ушкодження
- ☐ d. Накладання пов'язки та первинна іммобілізація нижньої кінцівки
- ☐ e. Введення протишокових засобів

Коментар

Правильна відповідь: Відновлення прохідності дихальних шляхів та проведення серцево-легеневої реанімації

## Питання 12

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До порту прибуває теплохід із Заїру, за даними командира екіпажу на борту перебувають 4 хворих з підозрою на гарячку Ебола. Вкажіть термін спостереження за особами, що спілкувалися із хворими:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 6 діб
- ☐ b. 21 доба
- ☐ c. 10 діб
- ☐ d. 5 діб
- ☐ e. 15 діб

Коментар

Правильна відповідь: 21 доба

### Питання 13

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий з цирозом печінки, портальною гіпертензією III ступеня скаржиться на виражену слабкість, запаморочення, втрату свідомості, серцебиття, нудоту, блювання кров'ю, чорний рідкий кал. Означені симптоми наростають протягом доби. Шкіра і слизові бліді, іктеричні, холодні, липкі. Пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Живіт м'який, безболісний. Аналіз крові: еритроцити -  $1,8 \cdot 10^{12}/л$ , гемоглобін 60 г/л, КП- 1,0, лейкоцити -  $8 \cdot 10^9/л$ . Яке ускладнення виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра кровотеча
- ☐ б. Печінкова кома
- ☐ в. Перфорація виразки
- ☐ г. Інфаркт кишки
- ☐ д. Гемолітичний криз

Коментар

Правильна відповідь: Гостра кровотеча

### Питання 14

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 24-х років лікується у відділенні інтенсивної терапії з приводу синдрому тривалого стиснення, гострої ниркової недостатності. При лабораторному обстеженні: сечовина - 28,4 ммоль/л; креатинін - 820 мкмоль/л; К - 8,4 ммоль/л; гемоглобін - 76 г/л; гематокрит - 0,26 л/л; еритроцити -  $2,4 \cdot 10^{12}/л$ . Яке ускладнення може безпосередньо загрожувати життю хворого? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гемічна гіпоксія
- ☐ б. Респіраторний дистрес-синдром
- ☐ в. ДВЗ-синдром
- ☐ г. Гіперкаліємічна зупинка серця
- ☐ д. Анемія

Коментар




Правильна відповідь: Гіперкаліємічна зупинка серця

## Питання 15

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 62-х років скаржиться на виражену слабкість, втомлюваність, набряки обличчя і ніг. Погіршення стану наростало протягом останнього року. У 55 років перенесла субтотальну тиреоїдектомію, 2 роки тому - інфаркт міокарда, з того часу зберігається миготлива аритмія. Зміна якого лабораторного показника вказує на причину погіршення стану хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Креатинін - 95,3 мкмоль/л
- ☐ б. ТТГ - 12,0 мМЕ/л
- ☐ в. Загальний холестерин - 8,7 ммоль/л
- ☐ г. Протеїнурія - 0,03 г/л
- ☐ д. КФК - 250 од/л


Коментар

Правильна відповідь: ТТГ - 12,0 мМЕ/л

## Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 52-х років з наявним трансфузіологічним анамнезом одразу після початку внутрішньовенного введення свіжозамороженої плазми виникли непродуктивний кашель, бронхоспазм, задуха, нудота, біль у животі, гіпотонія, після чого наступила втрата свідомості. Які найбільш правильні лікувальні заходи?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Негайна зупинка інфузії, в/в введення адреналіну, преднізолону, еуфіліну, інгаляція кисню
- ☐ б. В/в введення еуфіліну, гідрокортизону, інфузійна терапія, інгаляція кисню
- ☐ в. Негайна зупинка інфузії, інтубація трахеї, штучна вентиляція легень (ШВЛ)
- ☐ г. Продовження інфузії, введення адреностимуляторів, глюкокортикостероїдів
- ☐ д. Джгут вище місця введення, обколювання розчином адреналіну, гідрокортизон в/в

Коментар

Правильна відповідь: Негайна зупинка інфузії, в/в введення адреналіну, преднізолону, еуфіліну, інгаляція кисню

## Питання 17

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної в 34 тижні під час доплерографічного ультразвукового обстеження виявили стійкий реверсивний діастолічний кровоплин у судинах плода й провели кесарів розтин. У новонародженого відсутні дихання і м'язовий тонус. Вентиляція мішком і маскою не забезпечує адекватні рухи грудної клітки, і після наступних 30 секунд вентиляції частота серцевих скорочень не збільшується. Який наступний етап реанімації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення атропіну
- ☐ b. Введення адреналіну
- ☐ c. Уведення натрію бікарбонату
- ☐ d. Припинити надавати допомогу
- ☐ e. Інтубація трахеї немовляти

Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї немовляти

## Питання 18

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 48-ми років скаржиться на задишку, що раптово посилилася, слабкість. Перебуває у кардіологічному відділенні впродовж 12-ти годин, отримує гепарин, аспірин, стрептокіназу. Збуджений, шкіра холодна, волога, ціаноз. Пульс слабкого наповнення, ритмічний, 135/хв., артеріальний тиск - 60/40 мм рт.ст. У нижніх відділах легень вологі хрипи. На ЕКГ у відведеннях V 3 - V 6 комплекс QRS типу QS, підйом сегменту ST вище ізолінії, позитивний зубець T. З якого препарату необхідно починати невідкладну терапію?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Дигоксин
- ☐ b. Альбумін
- ☐ c. Фуросемід

- ☐ d. Дофамін
- ☐ e. Верапаміл
- Коментар

Правильна відповідь: Дофамін

## Питання 19

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 25-річного хворого на цукровий діабет I типу через 1 годину після чергової ін'єкції виникли слабкість, відчуття голоду, пітливість. Через 10 хвилин виникли судоми, втрата свідомості. Під час огляду: непритомний, тонічні та клонічні судоми м'язів. Шкіра волога. Артеріальний тиск - 140/80 мм рт.ст., пульс - 90/хв., ритмічний. Запаху ацетону у повітрі, що видихається, немає. Необхідна перша допомога:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. В/в крапельно 5% р-н глюкози 500,0
- ☐ b. В/в крапельно 20% р-н глюкози 60,0 з 10 ОД інсуліну
- ☐ c. В/в струменево 40% р-н глюкози 60,0
- ☐ d. В/в струменево 40% р-н глюкози 60,0 з 6 ОД інсуліну
- ☐ e. В/в струменево 40% р-н глюкози 500,0

Коментар

Правильна відповідь: В/в струменево 40% р-н глюкози 60,0

## Питання 20

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий із серцево-судинною патологією потрапив в реанімаційне відділення з підозрою на інфаркт нирки. У нього підвищена температура - 39,5°C, гострий біль у попереку та гематурія. Артеріальний тиск - 180/110 мм рт.ст. Зроблено загальний аналіз крові, сечі, та біохімічне дослідження крові. Вкажіть найбільш характерні ознаки інфаркту нирки із перерахованих: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Протеїнурія
- ☐ b. Лейкоцитурія

- ☐ c. Циліндрурія
- ☐ d. Біль і гематурія
- ☐ e. Підвищена швидкість осідання еритроцитів


Коментар

Правильна відповідь: Біль і гематурія

## Питання 21

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого доставили у стаціонар з клінічною картиною загального переохолодження: сопор, шкірні покриви мармурово-ціанотичні, ректальна температура - 32оС, брадикардія - 48/хв., артеріальна гіпотензія 80/30 мм рт.ст. Який захід з перерахованих необхідний в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Обкласти хворого грілками з температурою 40оС
- ☐ b. Дати хворому випити алкоголю
- ☐ c. Негайне занурення потерпілого в гарячу ванну (t - 45оС)
- ☐ d. Розтерти шкірні покриви спиртом
- ☐ e. Внутрішньовенна інфузія кристалоїдів нагрітих до температури 37оС


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенна інфузія кристалоїдів нагрітих до температури 37оС

## Питання 22

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий має опіки обох гомілок, 10% поверхні тіла, стадія 2-А, опіковий шок середньої важкості. Яку невідкладну допомогу необхідно надати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Знеболювання та введення кортизону
- ☐ b. Введення діуретиків та асептична пов'язка на раневу поверхню
- ☐ c. Знеболювання та введення розчину Рінгер-лактату
- ☐ d. Введення антибіотиків та охолодження гомілок

☐ е. Введення колоїдних розчинів  
Коментар

Правильна відповідь: Знеболювання та введення розчину Рінгер-лактату

### Питання 23

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого через 48 годин після застілля, де він їв в'ялену рибу, з'явилися слабкість у м'язах, порушення зору, сухість у роті, порушення дихання. Куди треба госпіталізувати хворого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ревматологічне відділення
- ☐ б. Неврологічне відділення
- ☐ в. ВРІТ інфекційної лікарні
- ☐ г. Терапевтичне відділення
- ☐ е. Очне відділення

Коментар

Правильна відповідь: ВРІТ інфекційної лікарні

### Питання 24

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 63-х років з трансмуральним задньодіафрагмальним інфарктом міокарда на 21 добу втратив свідомість. Об'єктивно: пульс на периферичних судинах не визначається. На ЕКГ: частота серцевих скорочень - 180/хв., зубці Р відсутні, шлуночкові комплекси розширені, деформовані, ширина QRS більше 0,14 с; QS тип шлуночкового комплексу у V 6. Яке ускладнення виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Тріпотіння шлуночків
- ☐ б. Фібриляція шлуночків
- ☐ в. Пароксизм суправентрикулярної тахікардії
- ☐ г. Миготлива аритмія

☐ е. Пароксизмальна шлуночкова тахікардія  
Коментар

Правильна відповідь: Пароксизмальна шлуночкова тахікардія

## Питання 25

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної під час стрімких пологів з'явилися відчуття задухи, ціаноз, падіння артеріального тиску. Через деякий час кров, що надходила з піхви, перестала згортатися. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Серцева недостатність
- ☐ б. Гіпотонічна маткова кровотеча
- ☐ в. Бронхіальна астма
- ☐ г. Емболія навколоплідними водами
- ☐ е. Анафілактичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Емболія навколоплідними водами

## Питання 26

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець потрапив під бомбардування, отримав закриту черепно-мозкову травму; при огляді спостерігаються зміни в неврологічному статусі та психіці. До якого госпіталю направити хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Військово-польового травматологічного госпіталю
- ☐ б. Військово-польового хірургічного госпіталю
- ☐ в. Військово-польового інфекційного госпіталю
- ☐ г. Військово-польового неврологічного госпіталю
- ☐ е. Військово-польового терапевтичного госпіталю


Коментар

Правильна відповідь: Військово-польового неврологічного госпіталю

## Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До шпиталю доставлений військовий, який був в 1 км від епіцентру ядерного вибуху. З анамнезу відомо, що пацієнт пив воду з річки, через 6 годин після чого з'явилися нудота, болі за ходом кишківника, блювання, рідкі випорожнення. Об'єктивно: шкіра звичайного забарвлення, язик сухий, обкладений білим нальотом. Живіт м'який, болісний в епігастрії. Артеріальний тиск - 110/60 мм рт.ст. Пульс ритмічний, 84/хв. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Радіаційне ураження від внутрішнього зараження радіонуклідами
- ☐ б. Гостра кишкова непрохідність
- ☐ в. Гострий гастроентероколіт
- ☐ г. Гострий геморагічний гастрит
- ☐ д. Гостре респіраторне захворювання


Коментар

Правильна відповідь: Радіаційне ураження від внутрішнього зараження радіонуклідами

## Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 72-х років звернувся до лікаря поліклініки зі скаргами на відсутність виділення сечі протягом 8 годин. Страждає на аденому передміхурової залози. При пальцевому ректальному дослідженні встановлено: передміхурова залоза до 7 см в діаметрі, безболісна тугоеластична, міжчасткова борозенка згладжена, слизова оболонка прямої кишки над нею рухома. Який метод діагностики найбільш інформативний для визначення розмірів передміхурової залози та об'єму залишкової сечі?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Екскреторна урографія
- ☐ б. Ультразвукова сонографія
- ☐ в. Низхідна цистографія

- ☐ d. Урофлоуметрія
- ☐ e. Уретероцистоскопія
- Коментар

Правильна відповідь: Ультразвукова сонографія

## Питання 29

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Через годину після пологів у породіллі почалася рясна кровотеча, яка склала 1 100 мл та продовжувалася, артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст., пульс до 120/хв., центральний венозний тиск - 60 мм вод.ст. В аналізі крові: тромбоцитопенія, анемія. Діагноз: геморагічний шок. Які показники необхідно визначити щодо встановлення його ступеня? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Шоковий індекс
- ☐ b. Загальний аналіз сечі
- ☐ c. Загальний аналіз крові
- ☐ d. ЕКГ
- ☐ e. Коагулограма

Коментар

Правильна відповідь: Шоковий індекс

## Питання 30

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна у терміні 34 тижні доставлена своїм транспортом зі скаргами на сильний головний біль, погіршення зору, слуху, нудоту, біль в епігастрії. Об'єктивно: анасарка, акроціаноз, артеріальний тиск - 190/100 мм рт.ст., пульс - 78/хв., ригідність м'язів потилиці. Яка тактика ведення вагітної на даному етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Утеротонічна терапія
- ☐ b. Терміновий кесарський розтин
- ☐ c. Протисудомна терапія



- ☐ d. Сечогінні препарати
- ☐ e. Гіпотензивна терапія


Коментар

Правильна відповідь: Терміновий кесарський розтин

### Питання 31

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 16-ти років скаржиться на інтенсивний біль у горлі зліва, що віддає у вухо, різке утруднення ковтання та відкриття рота, підвищення температури тіла до 39,2оС. Хворіє третю добу, за тиждень до початку скарг лікувалася у дільничного лікаря з при- воду ангіни. Відкриття рота значно утруднене (тризм жувальних м'язів), асиметрія зіву за рахунок випинання лівого мигдалика, піднебінно-язикова дужка різко гіперемована, інфільтрована, набрякла. За кутом нижньої щелепи визначаються збільшені та болючі лімфовузли. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Фарингіт
- ☐ b. Дифтерія
- ☐ c. Хронічний тонзиліт
- ☐ d. Паратонзиллярний абсцес
- ☐ e. Ангіна


Коментар

Правильна відповідь: Паратонзиллярний абсцес

### Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До інфекційної лікарні лікарем сільської амбулаторії направлений хворий 17-ти років, який три дні тому був укушений короною за кисть руки. При огляді на місці укусу визначається пухирець з кратероподібним поглибленням. Навколо пустули - круглий вінчик з пухирців із серозно-крово'янистим вмістом та регіональний лімфаденіт. Що необхідно зробити для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Загальний аналіз крові

- ☐ b. Рентгенологічне дослідження кисті
- ☐ c. Бактеріологічне дослідження вмісту рани
- ☐ d. Бактеріологічне дослідження крові хворого
- ☐ e. Мікроскопія виділень з рани


Коментар

Правильна відповідь: Бактеріологічне дослідження вмісту рани

### Питання 33

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 53-х років, яка протягом 2-х місяців перебувала в зоні бойових дій, скаржиться на біль в ділянці серця, напади серцебиття, дисфункцію кишково-шлункового тракту, безсоння, нічні кошмари, тривогу, відчуття страху, яке посилюється, коли хвора чує звуки, які нагадують постріли чи вибухи. Артеріальний тиск - 130/80 мм рт.ст., тахікардія. Куди треба госпіталізувати хвору? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. В гастроентерологічне відділення
- ☐ b. В кардіологічне відділення
- ☐ c. В хірургічне відділення
- ☐ d. В інфекційне відділення
- ☐ e. В психіатричне відділення


Коментар

Правильна відповідь: В психіатричне відділення

### Питання 34

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До сімейного лікаря звернулася хвора 54-х років, зі скаргами на "стартовий", "блокадний" біль в колінних та кульшових суглобах, рухи обмежені, болючі. Хвора працює кухарем, підвищеного живлення. З анамнезу відомо, що мати хворої теж мала подібні скарги. Який метод діагностики є визначальним для встановлення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Загальний аналіз сечі

- ☐ b. Загальний аналіз крові
- ☐ c. Біохімічне визначення рівня сечовини
- ☐ d. Рентгенографія
- ☐ e. Артроскопія


Коментар

Правильна відповідь: Рентгенографія

### Питання 35

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини від матері-носія поверхневого антигену гепатиту В (HBsAg) стан задовільний. Активна, дихальних розладів нема. Печінка на 2 см нижче реберної дуги. Сеча світла, меконій відходить. Які профілактичні заходи треба призначити дитині?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ізоляція дитини щоб уникнути поширення інфекції
- ☐ b. Скринінг дитини на HBsAg
- ☐ c. Скринінг матері на антиген гепатиту В
- ☐ d. Вакцинація проти гепатиту В на I добі життя
- ☐ e. Очікувальна тактика


Коментар

Правильна відповідь: Вакцинація проти гепатиту В на I добі життя

### Питання 36

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Студент 2 дні тому прилетів з Індії. Його госпіталізовано в тяжкому стані: голос беззвучний, акроціаноз, загострені риси обличчя, "руки прачки", язик сухий, склери тьмяні. Живіт втягнутий. Генералізовані судоми м'язів. Пульс ниткоподібний, артеріальний тиск не визначається. Яка невідкладна допомога необхідна хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ентеросорбція

- ☐ b. Оральна регідратація
- ☐ c. Дегідратаційна терапія
- ☐ d. Дезінтоксикаційна терапія
- ☐ e. Внутрішньовенна регідратація


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенна регідратація

### Питання 37

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 74-х років протягом останніх 5-ти років страждає на доброякісну гіперплазію простати. 4 доби тому, після вживання алкоголю, виникла гостра затримка сечовипускання. На догоспітальному етапі двічі на добу катетеризували сечовий міхур металевим катетером. Під час огляду: придаток правого яєчка збільшений, ущільнений, болючий, є гнійні виділення з уретри. Який вид невідкладної допомоги слід обрати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Трансуретральна резекція
- ☐ b. Епіцистостомія в ургентному порядку
- ☐ c. Встановлення постійного уретрального катетера
- ☐ d. Мікрохвильова термотерапія простати
- ☐ e. Встановлення інтрапростатичного стенту


Коментар

Правильна відповідь: Епіцистостомія в ургентному порядку

### Питання 38

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У підлітка 15-ти років під час забору крові спостерігалася раптова короткочасна втрата свідомості зі спонтанним відновленням стану. Під час огляду помірна блідість шкірних покривів, виражений гіпергідроз кінцівок, частота дихання - 20/хв., тони серця звучні, ритмічні, частота серцевих скорочень - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Який невідкладний стан розвинувся у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Психогенна атака
- ☐ b. Синкопе
- ☐ c. Гіпоглікемічний стан
- ☐ d. Повна AV-блокада
- ☐ e. Епілептичний напад


Коментар

Правильна відповідь: Синкопе

### Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На дорожньо-транспортну пригоду була викликана бригада швидкої медичної допомоги (ШМД). Постраждалий непритомний, у нього діагностовано відкритий перелом правої стегнової кістки, артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. Якими будуть дії лікаря швидкої допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Імобілізація, крапельне введення плазмозамінних розчинів, асептична пов'язка
- ☐ b. негайно транспортувати в спеціалізоване відділення
- ☐ c. Імобілізація шинами Крамера, введення вазопресорів, блокада місця перелому
- ☐ d. Імобілізація, транспортування в лікарню
- ☐ e. Знеболювання, асептична пов'язка, імобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія


Коментар

Правильна відповідь: Знеболювання, асептична пов'язка, імобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія

### Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В приймальне відділення доставили дитину 7-ми років. Стан свідомості - сопор. На шкірі тулуба та кінцівок спостерігаються геморагічні зірчасті висипи, що зливаються між собою та мають в центрі ділянки некрозу. Менінгеальні ознаки різко позитивні. Дихання часте, поверхнєве, артеріальний

тиск 50/0 мм рт.ст., частота серцевих скорочень 132/хв. Що з перерахованого необхідно застосувати для корекції гемодинаміки в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Антигістамінні препарати + Адреноміметики
- ☐ b. Кристалоїди + Антибіотик
- ☐ c. Глюкокортикоїди + Антибіотик
- ☐ d. Колоїди + Глюкокортикоїди
- ☐ e. Адреноміметики + Колоїди


Коментар

Правильна відповідь: Глюкокортикоїди + Антибіотик

## Питання 41

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10-ти місяців, яка хворіє на гостру респіраторну інфекцію, погіршився стан за рахунок підвищення температури до 39,8°C. Дитина притомна. Шкіра бліда, акроціаноз, кінцівки холодні, позитивний симптом "білої плями". Тахікардія, задишка, судомна готовність. Яку терапію слід призначити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Жарознижувальні + судинорозширювальні препарати
- ☐ b. Жарознижувальні + кардіотонічні препарати
- ☐ c. Жарознижувальні + преднізолон
- ☐ d. Фізичний метод охолодження
- ☐ e. Жарознижувальні + протисудомні препарати


Коментар

Правильна відповідь: Жарознижувальні + судинорозширювальні препарати

## Питання 42

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 18-ти років захворів гостро з підвищенням температури до 39°C, катаральними явищами, головним болем, світлобоязню. На 5-й день з'явився рясний плямисто-папульозний висип на

обличчі та тулубі. Об'єктивно: ін'єкція судин склер, гіперемія обличчя, слизова зіву гіперемована, енантема. На шкірі обличчя та тулуба яскравий плямисто-папульозний висип. Над легеньми жорстке дихання. Назвіть найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кропив'янка
- ☐ b. Кір
- ☐ c. Скарлатина
- ☐ d. Вітряна віспа
- ☐ e. Інфекційний мононуклеоз


Коментар

Правильна відповідь: Кір

### Питання 43

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікаря психотерапевта звернулися батьки 14-річної дівчинки у зв'язку з різкою зміною поведінки доньки протягом останніх 10-ти днів. Вона стала замкненою, не хоче ходити до школи, увесь час сидить у своїй кімнаті. Під час огляду дівчинки лікар звернув увагу на наявність старих синців на руках, ногах, садна, що загоюються, на внутрішній поверхні стегон. Найбільш можлива причина зміни поведінки дівчинки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Нервова анорексія
- ☐ b. Конфлікт з батьками
- ☐ c. Проблеми у школі
- ☐ d. Проблеми у особистих стосунках
- ☐ e. Зґвалтування


Коментар

Правильна відповідь: Зґвалтування

### Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 54-х років на вулиці раптово втратив свідомість. По прибутті лікарем бригади швидкої медичної допомоги встановлено ознаки клінічної смерті. Проводились реанімаційні заходи. На ЕКГ визначена фібриляція шлуночків. Тричі проведено дефібриляцію. Медикаментозне лікування слід розпочати з:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Новокаїнамід
- ☐ b. Аміодарону
- ☐ c. Натрію гідрокарбонату
- ☐ d. Магнію сульфату
- ☐ e. Анальгін


Коментар

Правильна відповідь: Аміодарону

## Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 10 місяців. Скарги на  $t_{\text{о}} - 38,0^{\circ}\text{C}$ , повторне блювання, пронос, відсутність апетиту. Дитина млява, виражена спрага. Шкіра бліда, еластичність знижена. Слизова рота волога. Піднебінні дужки гіперемовані. Носове дихання утруднене, мізерні слизові виділення. Живіт здутий, помірна болючість, бурчання. Випорожнення за добу 10 разів, рясні, водянисті, жовто-зеленкуваті, без патологічних домішок. Незначна олігоурія. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ротавірусна інфекція, типова середньо-тяжка форма
- ☐ b. Шигельоз, типова середньотяжка форма
- ☐ c. Ешерихіоз ентеропатогенний, типова середньотяжка форма
- ☐ d. Сальмонельоз, гастроентероколітична середньотяжка форма
- ☐ e. Холера


Коментар

Правильна відповідь: Ротавірусна інфекція, типова середньо-тяжка форма

## Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання



У хворого 57-ми років, під час трансфузії еритроцитарної маси виникли занепокоєння, задишка. При огляді: почервоніння обличчя, ціаноз, пульс - 110/хв., артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст., сеча червонуватого кольору. Який діагноз найбільш імовірний? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра ниркова недостатність
- ☐ б. Анафілактичний шок
- ☐ в. Переливання свіжоцитратної крові
- ☐ г. Переливання несумісної еритромаси
- ☐ д. Гостра серцева недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Переливання несумісної еритромаси

## Питання 47

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 36-ти років госпіталізований у коматозному стані. Після грипу з'явилися спрага, головний біль. Напередодні виник біль у животі, блювання та втрата свідомості. Об'єктивно: запах ацетону з рота, шкіра та язик сухі, дихання глибоке, шумне, 23/хв. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Пульс - 110/хв., малого наповнення. Живіт м'який. Печінка збільшена. Глікемія - 25,6 ммоль/л. В аналізі сечі: глюкоза та ацетон. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гіперосмолярна кома
- ☐ б. Кетоацидотична кома
- ☐ в. Харчова токсикоінфекція
- ☐ г. Молочнокисла кома
- ☐ д. Гіпоглікемічна кома

Коментар

Правильна відповідь: Кетоацидотична кома

## Питання 48

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Через 7 годин після вживання тістечка дитина 12-ти років захворіла з нудотою, повторним блюванням, болем в животі, температурою тіла, підвищеною до 38,5оС, млявістю. Відомо, що в цій родині ще дві особи захворіли з аналогічною клінічною картиною. Дитина надійшла до інфекційного відділення. Якою буде невідкладна першочергова допомога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести в/м пеніцилін
- ☐ b. Терміново промити шлунок та кишківник
- ☐ c. Дати смекту для внутрішнього прийому
- ☐ d. Ввести в/м церукал
- ☐ e. Ввести в/м левоміцетин


Коментар

Правильна відповідь: Терміново промити шлунок та кишківник

## Питання 49

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 38-ми років скаржиться на напади головного болю одностороннього характеру. Головний біль інтенсивний, локалізується в лобно-скроневій області, починається раптово, триває від 3 до 10 годин. Перед нападом відзначається "затуманення" зору. Між нападами головного болю - стан задовільний. Неврологічний статус без особливостей. Які з наведених продуктів можуть спровокувати напад?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Молочнокислі продукти
- ☐ b. Білий хліб
- ☐ c. Смажена картопля
- ☐ d. Шоколад
- ☐ e. Ананас


Коментар

Правильна відповідь: Шоколад

## Питання 50

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 36-ти років працює на хімічному заводі. Після грубого порушення правил техніки безпеки та виникнення аварійної ситуації, була госпіталізована в стаціонар зі скаргами на підвищення температури тіла до 38°C, біль у грудній клітці, кашель з виділенням слизово-гнійного харкотиння з домішками крові, задишку. Об'єктивно: в нижніх відділах легень ослаблене везикулярне дихання, вислуховуються дрібноміхурцеві вологі хрипи та крепітація. Рентгенологічно: вогнищево-інфільтративні зміни в нижніх відділах легень. Поставте попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий токсичний ларингіт
- ☐ б. Гострий токсичний набряк легень
- ☐ в. Гострий токсичний пневмоніт
- ☐ г. Гострий токсичний фарингіт
- ☐ д. Гострий токсичний бронхіт


Коментар

Правильна відповідь: Гострий токсичний пневмоніт

## Питання 51

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

28-річна жінка скаржиться на переймоподібний біль у нижніх відділах живота, кров'янисті виділення з піхви. Хвора бліда, пульс 78/хв., артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст., температура - 36,6°C. Під час бімануального дослідження: матка збільшена до 6-7 тижнів вагітності, болюча, плідне яйце в цервікальному каналі, виділення з піхви кров'янисті. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Загроза викидня
- ☐ б. Позаматкова вагітність
- ☐ в. Неповний аборт
- ☐ г. Аборт в ходу
- ☐ д. Апоплексія яєчника


Коментар

Правильна відповідь: Аборт в ходу

## Питання 52

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки 35-ти років через вживання забруднених харчових продуктів в організм потрапила значна кількість радіоактивного йоду-131. Які заходи необхідні в першу чергу?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Якнайшвидше розпочати йодну профілактику
- ☐ б. Ретельно зібрати харчові продукти в закриту тару для подальшого аналізу
- ☐ в. негайно промити шлунок
- ☐ г. негайно провести евакуацію жінки
- ☐ д. Провести антибіотикотерапію для профілактики вторинної інфекції на тлі пригнічення імунітету

Коментар

Правильна відповідь: Якнайшвидше розпочати йодну профілактику

### Питання 53

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з ангіною раптово на різних ділянках шкіри з'явилися схильні до злиття пухирі. Їх поява супроводжувалася нестерпним свербінням, підвищенням температури тіла до 37,2о С. У аналізі крові: еозінофілія. Який найбільш імовірний діагноз?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Кропивниця
- ☐ б. Синдром Лайєлла
- ☐ в. Пухирчатка
- ☐ г. Вітряна віспа
- ☐ д. Синдром Стівена-Джонса

Коментар

Правильна відповідь: Кропивниця

### Питання 54

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 42-х років доставлена у сопорозному стані до лікарні машиною швидкої допомоги. З анамнезу, що зібраний зі слів рідних, відомо, що хвора страждає на Аддісонову хворобу. Напередодні відзначалося неодноразове блювання. Під час огляду: риси обличчя загострені, гіперпігментація шкіри, артеріальний тиск - 50/30 мм рт.ст. У додаткових дослідженнях: цукор крові - 3,5 ммоль/л, аглюкозурія, відсутність ацетону в сечі, осмолярність крові - 295 мосмоль/л. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіперлактацидемічна кома
- ☐ b. Гіполітуїтарна кома
- ☐ c. Гіперкетонемічна прекома
- ☐ d. Аддісонова криза
- ☐ e. Гіперацидотична кома


Коментар

Правильна відповідь: Аддісонова криза

## Питання 55

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Рядовий був притиснутий уламками зруйнованого будинку протягом 7 годин. Хворий збуджений, погано орієнтується у навколишньому середовищі. Пульс - 92/хв., слабкого наповнення і напруження, набряк всієї правої нижньої кінцівки, на зовнішній поверхні стегна та гомілки шкіра має синьо-багряний колір. Рухи в колінному та гомілково-ступневому суглобах відсутні. Протягом доби поранений не мочився. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Синдром тривалого розчавлення
- ☐ b. Травматичний шок тяжкого ступеня, торпідна фаза
- ☐ c. Синдром тривалого розчавлення легкого ступеня
- ☐ d. Синдром тривалого розчавлення тяжкого ступеня, II стадія
- ☐ e. Травматичний шок середнього ступеня, еректильна фаза

Коментар

Правильна відповідь: Синдром тривалого розчавлення тяжкого ступеня, II стадія

## Питання 56

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому 22-х років з політравмою в реанімаційній залі проводиться серцево- легенево-мозкова реанімація. Який критерій ефективності закритого масажу серця має найбільшу прогностичну цінність?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Наявність пульсу на променевій артерії
- ☐ б. Наявність пульсації на сонній артерії
- ☐ в. Звуження зіниць
- ☐ г. Відновлення самостійного дихання
- ☐ д. Аускультативно вислуховуються тони серця


Коментар

Правильна відповідь: Наявність пульсації на сонній артерії

## Питання 57

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 49-ти років надійшов зі скаргами на біль за грудниною стискального характеру, який з'явився після фізичного навантаження, іррадіює в ліве плече. Пацієнт самостійно приймав нітрогліцерин, проте стан суттєво не змінився (за 30 хвилин). Об'єктивно: частота серцевих скорочень - 94/хв., пульс ритмічний, артеріальний тиск - 115/70 мм рт.ст. На ЕКГ: підйом сегменту ST у лівих відведеннях. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий міокардит
- ☐ б. Спонтанний пневмоторакс
- ☐ в. Розшарувальна аневризма аорти
- ☐ г. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ д. Гострий коронарний синдром


Коментар

Правильна відповідь: Гострий коронарний синдром

## Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Водій, якого доставлено у приймальне відділення після автодорожньої катастрофи, у рентгенологічному кабінеті неспритомнів. Шкіра обличчя та шиї ціанотична, серцеві тони не вислуховуються, артеріальний тиск не визначається, підшкірні вени шиї розширені. На оглядовій рентгенограмі ОГК легеневі поля не змінені, серцева тінь має кулясту форму. Вкажіть найбільш імовірну причину зупинки кровообігу:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тампонада серця
- ☐ b. Гемомедіастинум
- ☐ c. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ d. Геморагічний шок
- ☐ e. Напружена емфізема середостіння


Коментар

Правильна відповідь: Тампонада серця

## Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 54-х років з приводу відсутності пульсу на сонних артеріях і дихання вже протягом 10 хвилин бригадою екстреної медичної допомоги (ЕМД) проводяться реанімаційні заходи: зовнішній масаж серця, штучне дихання мішком Амбу, введення адреналіну, дефібриляція. Стан залишається без змін. З якою частотою і на яку глибину має здійснюватися компресія грудної клітки?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. C. 100-120/хв. та 3-4 см
- ☐ b. D. 90-100/хв. та 4-5 см
- ☐ c. B. 60-80/хв. та 4-5 см
- ☐ d. A. 100-120/хв. та 5-6 см
- ☐ e. E. 140/хв. та 4-5 см

Коментар

Правильна відповідь: A. 100-120/хв. та 5-6 см

## Питання 60

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікарем швидкої медичної допомоги у хворого констатовані ознаки клінічної смерті, розпочато реанімаційні заходи. Для введення лікарських засобів обрана пункція крікотиреоїдної зв'язки та ендотрахеальне введення. Як змінюється доза препаратів для цього шляху введення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Залишається незмінною
- ☐ b. Збільшується в 6 разів
- ☐ c. Збільшується в 4 рази
- ☐ d. Зменшується в 2 рази
- ☐ e. Збільшується в 2 рази

Коментар

Правильна відповідь: Збільшується в 2 рази

## Питання 61

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 28-ми років скаржиться на слабкість, мерехтіння в очах, запаморочення, випорожнення темного кольору. Протягом 10-ти років хворіє на виразку. При огляді: шкіра та слизові оболонки бліді, пульс - 112/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Нb- 86 г/л. До якого відділення слід направити хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. До терапевтичного відділення
- ☐ b. До гастроентерологічного відділення
- ☐ c. До проктологічного відділення
- ☐ d. До відділення інтенсивної терапії
- ☐ e. До хірургічного відділення

Коментар


Правильна відповідь: До хірургічного відділення

## Питання 62

Відповіді не було



Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 10-ти років через 5 хвилин після ін'єкції біциліну-5 з'явилися млявість, біль за грудиною і в ділянці серця, утруднене дихання, судоми з наступною втратою свідомості. Дихання аритмічне, тони серця глухі, пульс - 130/хв., слабкого наповнення, артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. З чого треба почати невідкладну допомогу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Почати оксигенотерапію
- ☐ б. Внутрішньовенно ввести серцеві глікозиди
- ☐ в. Внутрішньовенно ввести глюкокортикоїди
- ☐ г. Внутрішньом'язово ввести антигістамінні препарати
- ☐ д. Обколоти місце ін'єкції адреналіном


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенно ввести глюкокортикоїди

## Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 31-го року госпіталізований з приводу кетоацидотичної коми. Проведені невідкладні заходи. Однак, незважаючи на покращення лабораторних показників (глікемія - 8,6 ммоль/л, на момент надходження 32,0 ммоль/л, К<sup>+</sup> - 3,6 ммоль/л, на момент надходження - 2,8 ммоль/л), хворий перебуває в стані глибокої коми. Яка найбільш імовірна причина непритомного стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоз мозкових судин
- ☐ б. Гіпокаліємія
- ☐ в. набряк мозку
- ☐ г. Гіпоглікемічний стан
- ☐ д. Крововилив у головний мозок


Коментар

Правильна відповідь: набряк мозку

## Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До Вас звернулися батьки з дитиною 8-ми років, покусаною вуличним собакою, який після нападу зник. Рани розташовані у ділянці передпліччя та кисті. Оберіть оптимальний комплекс лікувальних заходів:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Якнайшвидше провести антирабічне щеплення
- ☐ б. Призначити антибіотики та якнайшвидше провести антирабічне щеплення
- ☐ с. Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком, призначити антибіотики та якнайшвидше провести антирабічне щеплення
- ☐ d. Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком, та якнайшвидше провести антирабічне щеплення
- ☐ е. Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком


Коментар

Правильна відповідь: Промити рану мильним розчином, обробити шкіру антисептиком, призначити антибіотики та якнайшвидше провести антирабічне щеплення

## Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 48-ми років, працівник хімічної лабораторії, доставлений в лікарню зі скаргами на загальну слабкість, запаморочення, головний біль, заплітання язика при розмові, блювання, кашель, дертя в горлі, кровотечу з носа, часте болюче сечовипускання. Об'єктивно: шкіра сіро-синього кольору, судоми м'язів. Кров шоколадно-бура, вміст МtНb у крові - 60%, еритроцити з тільцями Гейнца-Ерліха - 25%. В сечі: протеїнурія, макрогематурія. Ваш попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інтоксикація сірковуглецем
- ☐ б. Інтоксикація марганцем
- ☐ с. Інтоксикація тетраетилсвинцем
- ☐ d. Інтоксикація ртуттю
- ☐ е. Інтоксикація аміносполуками бензолу

Коментар

Правильна відповідь: Інтоксикація аміносполуками бензолу

## Питання 66

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час роботи в шахті чоловік 37-ми років пошкодив кабель високої напруги, та був уражений струмом. Об'єктивно: стан вкрай тяжкий, дихання - 9/хв., частота серцевих скорочень - 56/хв. Яких лікувальних заходів треба негайно вжити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Електродефібриляція
- ☐ б. Введення дихальних аналептиків
- ☐ в. Штучна вентиляція легенів
- ☐ г. Введення атропіну сульфату
- ☐ д. Введення адреналіну гідрохлориду

Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легенів

## Питання 67

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До медичної роти бригади доставлено військовослужбовців з ознаками інфекційного кишкового захворювання (гіпертермія, діарея). До якої сортувальної групи необхідно зарахувати цих хворих при проведенні медичного сортування?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ті, що підлягають подальшій евакуації без надання їм медичної допомоги
- ☐ б. Небезпечні для оточуючих
- ☐ в. Ті, що потребують надання медичної допомоги на даному етапі медичної евакуації в першу чергу
- ☐ г. Ті, що потребують надання медичної допомоги на даному етапі медичної евакуації в другу чергу
- ☐ д. Ті, що підлягають поверненню до своїх під- розділів після надання їм медичної допомоги

Коментар

Правильна відповідь: Небезпечні для оточуючих

## Питання 68

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 35-ти років, що страждає на закрепи, скаржиться на сильний, довготривалий біль після дефекації, наявність "смужки" крові в калі. Через біль обмежила вживання їжі. Поставте попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Неповна параректальна нориця
- ☐ б. Анальна тріщина
- ☐ в. Гострий тромбоз гемороїдальних вузлів
- ☐ г. Гострий парапроктит
- ☐ д. Анакуприковий больовий синдром

Коментар

Правильна відповідь: Анальна тріщина

## Питання 69

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 48-ми років оперована з приводу багатовузлового еутиреоїдного зоба IV ступеня. Операція на погляд хірурга пройшла без суттєвих ускладнень. Але у хворої з'явилася захриплість голосу, яка не зникла і при подальшому спостереженні під час перебування її в стаціонарі. Яке післяопераційне ускладнення настало у хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Пошкодження трахеї
- ☐ б. Пошкодження одного зворотного нерва
- ☐ в. Гематома загрудинного простору
- ☐ г. Пошкодження блукаючого нерву
- ☐ д. Пошкодження обох зворотних нервів

Коментар

Правильна відповідь: Пошкодження одного зворотного нерва

## Питання 70

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

7-річному хлопчику з дифузним гнійним перитонітом в післяопераційному періоді для компенсації існуючого дефіциту калію протягом доби потрібно ввести 25 мл 7,5% розчину калію хлориду. Яким чином потрібно вводити калію хлорид?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньовенно, струменево, повільно
- ☐ б. Внутрішньовенно, струменево, швидко
- ☐ в. Внутрішньом'язово
- ☐ г. Внутрішньовенно, крапельно, повільно
- ☐ д. Внутрішньовенно, крапельно, швидко

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенно, крапельно, повільно

## Питання 71

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 40-ка років, інженер, має скарги на пароксизми гострого болю в лівій половині обличчя, тривалістю 1-2 хвилини. Частота нападів до 10 разів на добу. Провокуються напади болю вмиванням, вживанням їжі, розмовами, дотиком до лівої щоки ("куркова зона"). Хворобливість при пальпації супраорбітальної точки зліва. Сформулюйте клінічний діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Лицева симпаталгія
- ☐ б. Невралгія великого потиличного нерву
- ☐ в. Невралгія трійчастого нерва
- ☐ г. Пухлина головного мозку
- ☐ д. Неврит лицевого нерву

Коментар

Правильна відповідь: Невралгія трійчастого нерва

## Питання 72

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 30-ти років під час сильного кашлю виникли різка задишка та гострий біль в правій половині грудної клітки, який посилюється при диханні. Хворіє на бронхіт другу добу. Об'єктивно: артеріальний тиск - 110/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень 80/хв. Аускультативно: над легеньми праворуч дихання не прослуховується. Який метод дослідження найбільш інформативний в цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Клінічний аналіз крові
- ☐ б. УЗД органів черевної порожнини
- ☐ в. УЗД серця
- ☐ г. ЕКГ
- ☐ е. Рентгеноскопія ОГК

Коментар

Правильна відповідь: Рентгеноскопія ОГК

## Питання 73

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 45-ти років на 1 добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зоба виникли психомоторне збудження, профузна пітливість, тремор рук, гіперемія обличчя, гіпертермія - 40°C, частота серцевих скорочень - 140/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий гіпаратиреоз
- ☐ б. Тиреотоксичний криз тяжкого ступеня
- ☐ в. Гострий інфаркт міокарда
- ☐ г. Пневмоторакс
- ☐ е. Гіпотиреоз

Коментар

Правильна відповідь: Тиреотоксичний криз тяжкого ступеня

## Питання 74

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У реанімаційне відділення доставлений хлопчик 10-ти років з гострим отруєнням свинцем. Млявий, шкіра бліда, артеріальний тиск - 110/55 мм рт.ст., ендogenous креатинін 1,098 ммоль/л, сечовина - 20,8 ммоль/л, калій плазми - 7,9 ммоль/л, діурез - 200 мл/добу. Що слід призначити першочергово? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Лазикс
- ☐ б. Хелатоутворювачі
- ☐ в. Активоване вугілля
- ☐ г. Плазмаферез
- ☐ д. Ентеросгель

Коментар

Правильна відповідь: Хелатоутворювачі

## Питання 75

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На місті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з пошкодженої автівки вилучено дитину 10-ти років з численними забоями та відкритим переломом гомілки. При огляді спостерігаються задуха, ціаноз шкіри. Права половина грудної клітини не бере участі у диханні. Перкуторно над нею визначається високий тимпаніт, аускультативно дихання не прослуховується, межі серцевої тупості зміщено вліво. Тони серця глухі, прискорені. Ви діагностували напружений правобічний пневмоторакс. Якими будуть Ваші дії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Призначити кордіамін підшкірно
- ☐ б. Негайно транспортувати постраждалу дитину до лікарні
- ☐ в. Розпочати штучну вентиляцію легень (ШВЛ)
- ☐ г. Призначити оксигенотерапію
- ☐ д. Негайна декомпресія правої плевральної порожнини

Коментар

Правильна відповідь: Негайна декомпресія правої плевральної порожнини

## Питання 76

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У постраждалого в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) чоловіка 31-го року лікар швидкої медичної допомоги діагностував закритий перелом правого стегна, травматичний шок 2 ступеня. В комплексі протишокової терапії почав швидку в/в інфузію кристалоїдів. Через 10 хвилин систолічний артеріальний тиск стабілізовано на 90 мм рт.ст. Яка подальша інфузійна терапія потрібна потерпілому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Крапельне введення розчину крохмалю
- ☐ b. Швидке введення розчину низькомолекулярних декстранів
- ☐ c. Швидке введення альбуміну
- ☐ d. Крапельне введення еритроцитарної маси
- ☐ e. Повільне крапельне введення кристалоїдів

Коментар

Правильна відповідь: Повільне крапельне введення кристалоїдів

## Питання 77

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина народилася від 2 вагітності, 2 пологів в терміні 34-35 тижнів, з оцінкою за шкалою Апгар 1/3 балів, на початку другої доби спостерігається зривування кров'янистим вмістом, мелена. Hb- 165 г/л, еритроцити - 4,8 10<sup>12</sup>/л, тромбоцити - 192 10<sup>9</sup>/л. Назвіть основні принципи лікування:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення вітаміну K1, плазмотрансфузія
- ☐ b. Термінове переливання однокрупної крові
- ☐ c. Інфузія 5% розчину амінокапронової кислоти
- ☐ d. Внутрішньовенне болюсне введення 10% розчину альбуміну
- ☐ e. Інфузія 10% глюконату кальцію


Коментар

Правильна відповідь: Введення вітаміну K1, плазмотрансфузія



## Питання 78

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий 32-х років був водієм легкового автомобіля, що перевернувся і зайнявся. Спостерігалася короточасна втрата сві- домості. Об'єктивно: анізокорія. Тахіпное до 30/хв. Крепітація 6-10 ребер зліва по передній пахвовій лінії. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Деформація правого передпліччя в нижній третині за типом "багнета", гематома. Має місце опікова рана грудей, тулуба та стегон, площею 36% з наявністю великої кількості епідермальних пухирів що прорвалися. Який вид травми у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Монолокальна
- ☐ б. Множинна
- ☐ в. Комбінована
- ☐ г. Поліфокальна
- ☐ д. Поєднана

Коментар

Правильна відповідь: Комбінована

## Питання 79

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У підлітка 16-ти років 4 місяці тому діагностовано туберкульоз легенів. Після лікування впродовж 2-х місяців дитина самостійно перервала прийом протитуберкульозних препаратів. У зв'язку з погіршенням стану було повторно призначене лікування. Через 2 тижні з'явилися втрата рівноваги, зниження слуху, дзвін у вухах. Прийом якого препарату зумовив появу таких симптомів і потребує відміни?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Етамбутол
- ☐ б. Ріфампіцин
- ☐ в. Стрептоміцин
- ☐ г. Ізоніазід
- ☐ д. Піразінамід


Коментар

Правильна відповідь: Стрептоміцин

## Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 33-х років після введення анальгину з'явилась слабкість, шум у вухах, почуття страху, серцебиття. На шкірі обличчя - уртикарні висипання. Шкіра вкрита холодним, липким потом. Артеріальний тиск 50/20 мм рт.ст. Пульс слабкий, ниткоподібний, його не можливо підрахувати. Через 15 хвилин з'явилися здуття живота, тиск у епігастральній області, нудота, блювання. Який найбільш імовірний діагноз у даного хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра кишкова непрохідність
- ☐ б. Анафілактичний шок
- ☐ в. Геморагічний шок
- ☐ г. Прободна виразка шлунка
- ☐ е. Гострий панкреатит


Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

## Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Підліток 14-ти років перебуває на диспансерному обліку з приводу артеріальної гіпертензії. Після емоційного стресу у хворого розвинулася гіпертензивна криза. Артеріальний тиск - 170/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 50/хв. Який медикаментозний засіб Ви призначите?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Панангін
- ☐ б. Каптоприл
- ☐ в. Кордіамін
- ☐ г. Дигоксин
- ☐ е. Корвітол


Коментар

Правильна відповідь: Каптоприл

## Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 32-х років перебуває в збудженому стані, напружений, від чогось відмахується. Показує на вікно і говорить, що йому хтось погрожує, викликає його. Стверджує, що в кімнаті повно щурів, ногою на них замахується. Рік тому отримав ЧМТ з втратою свідомості. З'ясувалось, що хворий зловживає алкоголем, останній тиждень п'є запоем. Третю ніч не спить, боїться виходити з дому. Не хоче їхати в лікарню. Яким буде діагноз та якої допомоги потребує хворий? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Посттравматичний психоз. Лікування в неврологічному відділенні
- ☐ б. Патологічне сп'яніння. Дати снодійне
- ☐ с. Сутінковий стан свідомості. Слід надати медичну допомогу на дому
- ☐ d. Соматогенний психоз. Лікування в терапевтичному відділенні
- ☐ е. Алкогольний делірій. Підлягає госпіталізації в психіатричну лікарню


Коментар

Правильна відповідь: Алкогольний делірій. Підлягає госпіталізації в психіатричну лікарню

## Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець опинився в осередку хімічного ураження. За даними хімічної розвідки супротивник застосував зарин. У потерпілого швидко погіршився зір, з'явилися слинотеча, відчуття стиснення за грудниною. Який антидот має ввести собі потерпілий? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Будахим
- ☐ б. Амілнітрит
- ☐ с. Антидоту немає
- ☐ d. Унітіол
- ☐ е. Діпіроксим


Коментар

Правильна відповідь: Будаксим

## Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

14-річний хлопчик на тлі високої температури тіла раптом починає поводитися неадекватно, спостерігається агресивна поведінка, викрикує нецензурні слова. З'являються епізоди клоніко-тонічних судом. Яка причина такого стану є найбільш імовірною?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Енцефаліт
- ☐ b. Афективно-респіраторні напади
- ☐ с. Істерична реакція
- ☐ d. Фебрильні судоми
- ☐ е. Пневмонія


Коментар

Правильна відповідь: Енцефаліт

## Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 70-ти років надійшов зі скаргами на лихоманку до 39°C, тупий, ниючий біль в поперековій ділянці справа. В анамнезі: гематурія з черв'якоподібними згустками крові. Об'єктивно: в поперековій ділянці справа пальпується утворення еластичної консистенції розміром з кулак, малорухливе, дещо болісне. Припущено новоутворення нирки. Яка перша ознака злоякісних новоутворень нирок?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Втрата маси тіла
- ☐ b. Протеїнурія
- ☐ с. Болісне утворення у фланках
- ☐ d. Гарячка
- ☐ е. Гематурія


Коментар

Правильна відповідь: Гематурія

## Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 46-ти років виведена з вогнища пожежі. Бригада екстреної медичної допомоги діагностувала термічні опіки верхніх дихальних шляхів. З чого необхідно розпочати невідкладну допомогу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Довенного введення 2,4% розчину еуфіліну
- ☐ b. Аналгезії наркотичними аналгетиками
- ☐ c. Серцево-легеневої реанімації
- ☐ d. Інгаляції сальбутамолу (вентоліну)
- ☐ e. Інгаляції 100% киснем через лицьову маску


Коментар

Правильна відповідь: Інгаляції 100% киснем через лицьову маску

## Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 43-х років доставлений швидкою медичною допомогою у приймальний покій ЦРЛ зі скаргами на слабкість, що виникла раптово, запаморочення, мерехтіння "мушок" перед очима, одноразові рясні рідкі випорожнення дьогтеподібної консистенції. Об'єктивно: блідий, пульс - 100/хв., пальпація черевної порожнини безболісна, симптоми подразнення очеревини негативні. Який метод діагностики необхідно провести хворому в першочерговому порядку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Спостереження хірурга у палаті невідкладної терапії
- ☐ b. Фіброгастродуоденоскопія
- ☐ c. УЗД органів черевної порожнини
- ☐ d. Аналіз калу на приховану кров
- ☐ e. Рентгенографія шлунку і дванадцятипалої кишки

Коментар

Правильна відповідь: Фіброгастродуоденоскопія

## Питання 88

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Бригада екстреної медичної допомоги (ЕМД) викликана у дитячий садок, де хлопчик 4-х років випадково проковтнув іграшкову кульку. При огляді: інспіраторна задишка, судоми, мідріаз. Які невідкладні заходи необхідно негайно провести в даному випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. ШВЛ "рот до рота"
- ☐ б. Прийом Хеймліха (Геймліха)
- ☐ в. Потрійний прийом Сафара
- ☐ г. Прийом Селіка
- ☐ д. Прекардіальний удар

Коментар

Правильна відповідь: Прийом Хеймліха (Геймліха)

## Питання 89

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До інфекційного відділення надійшов хлопчик 4-х місяців у важкому стані. Дитина млява, гіподинамічна. Вогнищевої симптоматики не виявлено. Велике тім'ячко запале, 1,5х1,5 см. Шкіра суха, бліда. Тургор тканин знижений. Тахіпное - 60/хв., тахікардія - 170/хв. З анамнезу: хворів протягом тижня, коли виникло блювання після кожного годування. Лабораторно: гемоглобін - 146 г/л, гематокрит - 0,58, калій плазми - 3,6 ммоль/л, натрій плазми - 148 ммоль/л, глюкоза крові 3,6 ммоль/л, сечовина - 13 ммоль/л. Який стартовий інфузійний розчин необхідно призначити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Розчин Рінгер-лактату
- ☐ б. 10% розчин глюкози
- ☐ в. Реосорбілакт
- ☐ г. Інфузійна терапія не показана
- ☐ д. 5% розчин альбуміну

Коментар

Правильна відповідь: Розчин Рінгер-лактату

## Питання 90

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До відділення травматології надійшов чоловік 25-ти років із переломом кісток тазу (ДТП). Через кілька годин почав скаржитися на відсутність сечовипускання при наявності бажання це зробити та біль у надлобковій зоні. При огляді хворого привернув до себе увагу повний сечовий міхур, при ректальному обстеженні у хворого виявилася зміщена вверху, високо "посаджена" простата. Який метод обстеження необхідний для остаточного діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Уретроскопія
- ☐ b. Внутрішньовенна урографія
- ☐ c. УЗД органів малого тазу
- ☐ d. Ретроградна уретрографія
- ☐ e. Екскреторна урографія

Коментар

Правильна відповідь: Ретроградна уретрографія

## Питання 91

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Солдат перебуває у військовому польовому пересувному госпіталі з кульовим пораненням середньої третини правого стегна. Стан важкий, шкіра бліда, температура тіла 37,8°C, пульс - 106/хв., артеріальний тиск - 90/70 мм рт.ст. Останні 3 дні турбує кашель з харкотинням. При аускультції у нижній частці лівої легені вологі хрипи. З чим пов'язане погіршення стану?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ)
- ☐ b. Приєднання пневмонії
- ☐ c. Пневмоторакс
- ☐ d. набряк легень
- ☐ e. Плеврит

Коментар

Правильна відповідь: Приєднання пневмонії

## Питання 92

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років скаржиться на погіршення зору, головний біль, загальну слабкість, відчуття нестачі повітря. Ці явища виникли через 1,5-2 години після роботи на городі з інсектицидними препаратами. Об'єктивно: ціаноз слизових, фібрилярні посмикування окремих м'язів обличчя. В легенях - жорстке дихання, незвучні сухі свистячі хрипи. Спостерігаються брадикардія, зниження артеріального тиску до 90/60 мм рт.ст. З метою антидотної терапії даному хворому рекомендується призначити:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 10% розчину етилового спирту на 5% розчині глюкози довенно
- ☐ b. 30% розчину етилового спирту всередину
- ☐ c. 5% розчину унітіолу дом'язово
- ☐ d. 0,1% розчину атропіну підшкірно
- ☐ e. 3% розчину нітриту натрію довенно

Коментар

Правильна відповідь: 0,1% розчину атропіну підшкірно

## Питання 93

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини віком 2 тижні спостерігається раптове блювання фонтаном після їжі. Після блювання стан дещо покращується, але наступний прийом їжі закінчується так само. Від призначення спазмолітиків ефекту немає. Поставте попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інвагінація
- ☐ b. Пілоростеноз
- ☐ c. Пілороспазм
- ☐ d. Кишкова непрохідність
- ☐ e. Гастроентерит


Коментар

Правильна відповідь: Пілоростеноз



## Питання 94

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В хірургічний стаціонар направлений хворий з явищами кишкової кровотечі та імовірною пухлиною селезінкового кута ободової кишки. Який метод дослідження матиме вирішальне значення для встановлення і підтвердження діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Анамнез та фізикальні методи дослідження
- ☐ b. Іригоскопія
- ☐ c. Оглядова рентгенограма черевної порожнини
- ☐ d. Ректороманоскопія
- ☐ e. Колоноскопія з біопсією

Коментар

Правильна відповідь: Колоноскопія з біопсією

## Питання 95

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 54-х років під час фізичного навантаження три доби тому відчув гострий біль у лівій нозі, швидко з'явилися набряк та посиніння ноги. Встановлено діагноз: "Гострий іліофеморальний флеботромбоз зліва". На УЗД вен нижніх кінцівок виявлено оклюзійний тромбоз загальної клубової вени. Якою буде лікувальна тактика?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Системна антикоагуляція та протизапальні засоби
- ☐ b. Системна антикоагуляція
- ☐ c. Системна антикоагуляція та діуретики
- ☐ d. Хірургічна венозна тромбектомія
- ☐ e. Тромболітична терапія

Коментар

Правильна відповідь: Тромболітична терапія

## Питання 96

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 33-х років, приїхав з Ефіопії, де перебував у туристичній поїздки. На другу добу виникла профузна діарея, блювання фонтаном до 7-8 разів на добу, сухість в роті, загальна слабкість. Об'єктивно: хворий блідий, акроціаноз. Шкіра суха, холодна на дотик. Під очима темні кола, живіт запалий, температура - 35,8оС, артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст., пульс - 105/хв., слабого наповнення. Судоми литкових м'язів. Яке невідкладне лікування необхідно призначити хворому? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Реополіглюкін
- ☐ б. Глюкоза з інсуліном
- ☐ в. Кортикостероїди
- ☐ г. Парентеральне харчування
- ☐ д. Кристалоїдні сольові розчини

Коментар

Правильна відповідь: Кристалоїдні сольові розчини

## Питання 97

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Юнак надійшов до стаціонару на 7-й день хвороби, що розпочалася гостро з остуди, підвищення температури тіла до 39,5оС, болю у м'язах, головного болю. Тиждень тому повернувся з Південної Америки. Свідомість на рівні сопору, шкіра та склери жовтяничні. На тулубі та кінцівках рясний геморагічний висип. Температура тіла - 38,8оС. Пульс - 110/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Гепатоспленомегалія. Олігурія. В крові: протромбіновий індекс - 45%, сечовина - 24,8 ммоль/л. Діагностовано жовту гарячку. Чим зумовлена тяжкість стану хворого? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіповолемічним шоком
- ☐ б. Гострою асфіксією
- ☐ в. Інфекційно-токсичним шоком
- ☐ г. Гострою печінково-нирковою недостатністю
- ☐ д. Гострою затримкою сечі


Коментар

Правильна відповідь: Гострою печінково-нирковою недостатністю

## Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 2-х років на 5-й день діареї (*E.coli*) та субфебрильної лихоманки з'явився поширений петехіальний висип, діурез - 50 мл на добу. Загальний аналіз крові: гемоглобін - 70 г/л, КП- 0,85, фрагментовані еритроцити, тромбоцити - 55 Г/л. Креатинін - 240 мкМ/л. Найімовірнішою причиною ниркової недостатності є:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіповолемія
- ☐ б. Гемолітико-уремічний синдром
- ☐ в. Інтерстиціальний нефрит
- ☐ г. Геморагічний васкуліт
- ☐ д. Гломерулонефрит


Коментар

Правильна відповідь: Гемолітико-уремічний синдром

## Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 40-ка років доставлений швидкою медичною допомогою, свідомість потьмарена, блідий, вкритий холодним потом. Частота дихальних рухів - 28/хв., артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., тони серця приглушені, живіт при пальпації болісний в епігастрії, в анамнезі вживання кавової гущею. Які першочергові заходи невідкладної допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення довенно атропіну
- ☐ б. Введення довенно розчину глюкози
- ☐ в. Введення довенно кристалоїдних розчинів
- ☐ г. Введення довенно гепарину
- ☐ д. Введення довенно адреналіну

Коментар

Правильна відповідь: Введення довенно кристалоїдних розчинів

## Питання 100

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Яких заходів домедичної допомоги необхідно вжити при клапанному пневмотораксі?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Дренування плевральної порожнини за Бюлау
- ☐ b. Герметична пов'язка на рану
- ☐ c. Плевральна пункція
- ☐ d. Штучна вентиляція легенів
- ☐ e. Торакотомія та бронхотомія

Коментар

Правильна відповідь: Плевральна пункція

## Питання 101

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта 35-ти років після надмірного вживання алкоголю і калорійної їжі з'явилися гострий біль у верхній частині живота, блювання без домішок жовчі, здуття, температура - 38оС. Поступово наростав метеоризм, розвинулася затримка газів і випорожнень. При аускультатії кишкові шуми не вислуховуються. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий холецистит
- ☐ b. Гострий панкреатит з явищами парезу кишечника
- ☐ c. Перфорація виразки
- ☐ d. Панкреонекроз
- ☐ e. Гостра кишкова непрохідність

Коментар

Правильна відповідь: Гострий панкреатит з явищами парезу кишечника

## Питання 102

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У гуртожитку виявлено хворого з підозрою на чуму. 2 дні назад він повернувся з Індії. Яких профілактичних заходів треба вжити щодо контактних осіб?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Термометрія
- ☐ б. Екстрена профілактика тетрацикліном, ізоляція
- ☐ в. Спостереження на дому 6 днів
- ☐ г. Лабораторне обстеження
- ☐ д. Вакцинація

Коментар

Правильна відповідь: Екстрена профілактика тетрацикліном, ізоляція

## Питання 103

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У першовагітної 27-ми років вагітність 39-40 тижнів, положення плоду поздовжнє, голівка притиснута до площини входу в малий таз. Розміри тазу 23-26-29-18. Перейми болючі, тривалість 10 годин, навколоплідні води відійшли 2 години тому, роділля неспокійна. Серцебиття плоду ритмічне, 160/хв. В ході зовнішнього акушерського обстеження встановлено: контракційне кільце розташоване косо, розташоване вище пупа, ознака Вастена позитивна, матка в нижньому сегменті різко болюча, круглі зв'язки матки напружені. Яку патологію можна припустити?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Розрив матки, що відбувся
- ☐ б. Загроза розриву матки
- ☐ в. Дискоординована пологова діяльність
- ☐ г. Передчасне відшарування плаценти
- ☐ д. Слабкість пологової діяльності

Коментар

Правильна відповідь: Загроза розриву матки

## Питання 104

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В жіночу консультацію звернулася вагітна в терміні 37 тижнів, яка протягом останніх 3-х діб не відчуває ворухіння плода. Які дослідження необхідно провести для встановлення діагнозу? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Клінічний аналіз сечі
- ☐ б. Клінічний аналіз крові
- ☐ в. УЗД
- ☐ г. Кардіотокографія
- ☐ д. Амніоскопія

Коментар

Правильна відповідь: УЗД

## Питання 105

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 25-ти років відчула себе погано в приміщенні аптеки. Стоїть, спираючись на підвіконня з фіксованим плечовим поясом. Об'єктивно: обличчя одутле, вдих короткий, видих подовжений, частота дихання - 22/хв., частота серцевих скорочень - 100/хв., арте-ріальний тиск - 100/70 мм рт.ст., над легеньми при перкусії коробковий відтінок перкуторного звуку. При аускультатії - дихання везикулярне, жорстке, сухі, свистячі хрипи, більше на видиху. Сog - акцент II тону над легеневою артерією. Живіт без особливостей. Попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Бронхіальна астма
- ☐ б. ХОЗЛ
- ☐ в. Трахеобронхіальна дискінезія
- ☐ г. Гострий ларинготрахеїт
- ☐ д. Тромбоемболія легеневої артерії

Коментар

Правильна відповідь: Бронхіальна астма

## Питання 106

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 1,5 року з ознаками гострої респіраторної інфекції ввечері з'явилася інспіраторна задишка, "гавкаючий" кашель, захриплість голосу. При огляді: дихання стенотичне, інспіраторна задуха з участю допоміжної дихальної мускулатури, втягування поступливих ділянок грудної клітки. При аускультатії дихання у легенях дифузно послаблене. Тахікардія, випадання пульсової хвилі на вдиху. Поставте діагноз:  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Обструктивний бронхіт
- ☐ б. Пневмонія
- ☐ в. Вірусний круп
- ☐ г. Дифтерійний круп
- ☐ д. Стороннетіло дихальних шляхів

Коментар

Правильна відповідь: Вірусний круп

## Питання 107

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 25-ти років скаржиться на плаксивість, різкі зміни настрою, прискорене серцебиття, що пов'язує з втомою - місяць тому народила близнюків. З ранку відчула "зупинки" серцевої діяльності. При огляді з боку внутрішніх органів патології не встановлено. Артеріальний тиск - 130/70 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 115/хв., часті екстрасистולי, частота дихання - 17/хв. Щитоподібна залоза збільшена до другого ступеня, безболісна. Який найбільш імовірний попередній діагноз?  
Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий вірусний тиреоїдит, гіпотиреоз
- ☐ б. Підгострий вірусний тиреоїдит, гіпертиреоз
- ☐ в. Післяпологовий тиреоїдит, гіпотиреоз
- ☐ г. Післяпологовий тиреоїдит, гіпертиреоз
- ☐ д. Гострий вірусний тиреоїдит, гіпертиреоз


Коментар

Правильна відповідь: Післяпологовий тиреоїдит, гіпертиреоз

## Питання 108

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 5-ти років вночі стався напад ядухи, який характеризувався: сухим кашлем, експираторною задишкою, відчуттям стиснення у грудях. В акті дихання бере участь допоміжна мускулатура. В анамнезі напади ядухи 1-2 рази на місяць протягом 3-х років, atopічний дерматит з 2-х років. Препаратом вибору для надання першої допомоги на догоспітальному етапі є: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Метилксантини
- ☐ b. Інгаляційні холінолітики
- ☐ c. Інгаляційні глюкокортикостероїди
- ☐ d. Бета-2-агоністи короткої дії
- ☐ e. Пролонговані бета-2-агоністи


Коментар

Правильна відповідь: Бета-2-агоністи короткої дії

## Питання 109

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий надійшов у лікарню на третій день захворювання з  $t - 39^{\circ}\text{C}$ , головним болем, остудою. Захворювання почалося з появи папули у пахвинній ділянці. Наступного дня з'явився пухирець із темним вмістом, що потім розкрився з утворенням болючої ранки з жовтуватим дном й болючим синьо-червоним інфільтратом в пахвинній ділянці розміром 4x4 см. Яких заходів необхідно вжити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Введення жарознижувальних препаратів
- ☐ b. Накласти пов'язку на рану
- ☐ c. Ізоляція хворого з протиепідемічними заходами
- ☐ d. Первинна хірургічна обробка рани
- ☐ e. Введення протиправцевої сироватки

Коментар




Правильна відповідь: Ізоляція хворого з протиепідемічними заходами

### Питання 110

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Народилася недоношена дитина, гестаційний вік 32 тижні, з вагою 1700 г, рівень глюкози крові становить 2,1 ммоль/л. У дитини спостерігається порушення стану, судомна готовність. Оберіть першочергову допомогу для дитини:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 0,9% розчин натрію хлориду, 10 мл/кг
- ☐ б. 25% розчин MgSO<sub>4</sub>, 1 мл/кг
- ☐ в. 10% розчин натрію хлориду, 4 мл/кг
- ☐ г. 10% розчин глюкози, 2 мл/кг
- ☐ д. Фенобарбітал, 20 мг/кг


Коментар

Правильна відповідь: 10% розчин глюкози, 2 мл/кг

### Питання 111

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої протягом 2-х годин спостерігаються дуже часті напади, під час яких вона перебуває в одному положенні, погляд її спрямований в одну точку, а в окремих м'язах обличчя і рук постійно виникають короточасні мимовільні посмикування. Свідомість у хворої весь час порушена. Ваша тактика:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Госпіталізація в реанімаційне відділення
- ☐ б. Призначення амбулаторного лікування
- ☐ в. Госпіталізація в неврологічне відділення
- ☐ г. Госпіталізація в психіатричне відділення
- ☐ д. Призначення консультації лікаря- епілептолога

Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація в реанімаційне відділення

## Питання 112

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Солдат 20-ти років на полі бою отримав ураження у вигляді термічного опіку обох кистей.  
Об'єктивно: загальний стан задовільний частота дихальних рухів - 16/хв., дихання везикулярне.  
Частота серцевих скорочень - 78/хв. Діяльність серця ритмічна. На тильній поверхні долонь пухирі з блідо- рожевим вмістом. З чого необхідно розпочати невідкладну допомогу?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ввести знеболювальні препарати
- ☐ b. Ввести антигістамінні препарати
- ☐ c. Промити перекисом водню
- ☐ d. Накласти асептичну пов'язку
- ☐ e. Промити холодною водою

Коментар

Правильна відповідь: Промити холодною водою

## Питання 113

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 32-х років після перебування у лісі та контакту з мурахами з'явилися набряк суглобів рук, блювання, біль у шлунку, остуда, утруднене дихання, загальна слабкість. При огляді хворого відзначено набряк обличчя, шкірні покриви гіперемовані. Над легеньми вислуховуються жорстке дихання, сухі свистячі хрипи. Тахікардія. Артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Які заходи невідкладної допомоги необхідно провести хворому?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення антигістамінних препаратів
- ☐ b. Призначення сорбентів
- ☐ c. Введення адреналіну
- ☐ d. Введення кордіаміну
- ☐ e. Введення серцевих глікозидів

Коментар

Правильна відповідь: Введення адреналіну

## Питання 114

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 26-ти років неадекватно себе поводить, звернувся до відділку міліції з вимогами, щоб його передали до суду, оскільки він відчуває себе винним за розповсюдження зла та насильства у світі. Співробітникам міліції вдалося встановити особу чоловіка, зв'язатися з його родичами, які повідомили, що за останні 5 років хворий неодноразово лікувався у психіатричних закладах. При огляді збуджений, легко стає розлюченим, підозрілим. Стверджує, що голос всередині голови говорить: "я заслуговую на смерть". Який тип психомоторного збудження у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Депресивне
- ☐ b. Галюцинаторно-параноїдне
- ☐ c. Психопатичне
- ☐ d. Маніакальне
- ☐ e. Кататонічне

Коментар

Правильна відповідь: Галюцинаторно-параноїдне

## Питання 115

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 39-ти років скаржиться на раптову появу задишки, болю в грудній клітці, серцебиття після пробіжки в парку. В анамнезі: тривалий прийом оральних контрацептивів, паління. Об'єктивно: стан важкий, дифузний ціаноз. Частота дихання - 36/хв., пульс 124/хв., малого наповнення, ритмічний. Артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст. ЕКГ: блокада правої ніжки пучка Гіса, глибокий зубець QIII, глибокі зубці S I, aVL, високий загострений зубець PII. Визначте серологічний маркер даного невідкладного стану:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Д-димер в крові
- ☐ b. Тропонін
- ☐ c. Аспартатамінотрансфераза
- ☐ d. Антинуклеарні антитіла
- ☐ e. Креатинфосфокіназа


Коментар

Правильна відповідь: Д-димер в крові

### Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В приймальне відділення доставлений 6-ти річний хлопчик, у якого через 30 хвилин після введення ампіциліну внутрішньом'язово з'явилися блідість, слабкість, відчуття стискання за грудиною та нестачі повітря, утруднене дихання. Артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Черговий лікар припускає анафілактичний шок. Що треба виконати в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Серцеві глікозиди
- ☐ b. Ввести адреналін
- ☐ c. Атропін
- ☐ d. Димедрол
- ☐ e. Кортикостероїди


Коментар

Правильна відповідь: Ввести адреналін

### Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 20-ти років опинився під завалом. Протягом 6 годин гомілки були під фрагментом стіни. Стан потерпілого важкий. Свідомість відсутня, артеріальний тиск 80/50 мм рт.ст. Яку невідкладну допомогу треба надати хворому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Дезінтоксикаційна терапія
- ☐ b. Знеболення
- ☐ c. Накласти джгут на стегна, іммобілізувати нижні кінцівки шинами Крамера, ввести знеболювальні, інфузійна терапія
- ☐ d. Іммобілізація кінцівок
- ☐ e. Накласти джгут на стегна, іммобілізувати нижні кінцівки шинами Крамера

Коментар

Правильна відповідь: Накласти джгут на стегна, іммобілізувати нижні кінцівки шинами Крамера, ввести знеболювальні, інфузійна терапія

## Питання 118

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 72-х років скаржиться на запаморочення з нудотою і блюванням. В ході неврологічного дослідження виявлені горизонтальний ністагм вліво, лівобічна геміатаксія, зниження тонулу лівих кінцівок. Яка локалізація патологічного процесу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Потилична частка
- ☐ б. Скроневая частка
- ☐ с. Стовбур головного мозку
- ☐ d. Мозочок
- ☐ е. Лобова частка

Коментар

Правильна відповідь: Мозочок

## Питання 119

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 50-ти років надійшла в клініку зі скаргами на напади сильного головного болю, запаморочення, відчуття пульсації в голові, пітливість, м'язову слабкість. Під час нападу підвищується артеріальний тиск до 280/170 мм рт.ст. Напади тривають до 30 хвилин. Останнім часом почастишали. За даними УЗД - визначається об'ємне утворення правого наднирника. Який препарат найбільш показаний хворій?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Фуросемід в/в
- ☐ б. Папаверин в/в
- ☐ с. Фентоламін в/в
- ☐ d. Дибазол в/в
- ☐ е. Пентамін в/в


Коментар

Правильна відповідь: Фентоламін в/в

## Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 43-х років, будівельник, скаржиться на напруження і болючість жувальних м'язів, утруднення при відкриванні рота. Хвороба розпочалась 4 дні тому з появи тягнучого болю в ділянці рани на лівій кисті, поранення сталось 2 тижні тому під час роботи. При огляді відкривання рота утруднене через тонічне напруження м'язів. М'язи живота напружені, болісні. Температура - 38,8оС. Вкажіть імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Сказ
- ☐ b. Правець
- ☐ c. Паратонзиллярний абсцес
- ☐ d. Поліомієліт
- ☐ e. Енцефаліт


Коментар

Правильна відповідь: Правець

## Питання 121

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 30-ти років швидкою допомогою доставлена у непритомному стані з місця автоаварії. Об'єктивно: свідомість відсутня, на больові подразники або спонтанно з'являється тонічне напруження м'язів з випростуванням рук і ніг та закиданням голови назад, двосторонні стопні патологічні рефлексі. Дихання Чейн-Стокса, пульс - 120/хв., артеріальний тиск - 140/90 мм рт.ст., температура - 37,9оС. Назвіть найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Аневризма судин головного мозку
- ☐ b. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ c. Забій головного мозку важкого ступеня
- ☐ d. Менінгіт
- ☐ e. Внутрішньочерепна гематома


Коментар

Правильна відповідь: Забій головного мозку важкого ступеня

## Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 12-ти років на тлі неревматичного кардиту з'явилися занепокоєння, акроціаноз, експіраторна задишка, біль за грудниною, кінцівки холодні, вологі, артеріальна гіпотонія. Які заходи необхідні під час транспортування?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Положення на лівому боці
- ☐ б. Горизонтальне положення з піднятим головним кінцем
- ☐ с. Положення на правому боці
- ☐ d. Ортопное
- ☐ е. Горизонтальне положення з опущеним головним кінцем


Коментар

Правильна відповідь: Ортопное

## Питання 123

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Поранений з травматичною ампутацією правої верхньої кінцівки доставлений з поля бою в мобільний госпіталь у стані шоку. Артеріальний тиск - 50/0 мм рт.ст. На травмованій кінцівці - турнікет. Які першочергові заходи мають бути здійснені на цьому етапі?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Розпочати краплинну інфузію 0,9% розчи- ну натрію хлориду у межах подвоєної добової потреби в рідині
- ☐ б. Внутрішньовенно ввести 1 мл адреналіну. Повторювати кожні 5 хвилин для підтримки адекватного артеріального тиску
- ☐ с. Послабити турнікет. Якщо відновилась кровотеча, то ввести гемостатичні препарати і розпочати інфузію кристалоїдів
- ☐ d. Швидке відновлення ОЦК, адекватне знеболювання

☐ е. Розпочати внутрішньовенну інфузію мезатону і норадреналіну  
Коментар

Правильна відповідь: Швидке відновлення ОЦК, адекватне знеболювання

## Питання 124

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Мати залишила здорового сина 2,5 років із старшою дочкою, хворою на гостру респіраторну вірусну інфекцію (ГРВІ). Вона через 3 години повернулася додому і помітила у сина частий кашель. На другий день стан його погіршився, температура тіла - 38°C, частота дихання - 42/хв., частота серцевих скорочень - 132/хв., ціаноз шкіри. Перкуторно: справа нижче кута лопатки вкорочення звуку, аускультативно в цьому місці різке ослаблення дихання. На Ro ОГК ателектаз правих сегментів S4 і S5, тінь органів середостіння зміщена вправо. Яка імовірна причина такого стану дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра пневмонія
- ☐ б. Гостра респіраторна вірусна інфекція
- ☐ в. Гострий обструктивний бронхіт
- ☐ г. Стороннє тіло бронхів
- ☐ е. Напружений пневмоторакс

Коментар

Правильна відповідь: Стороннє тіло бронхів

## Питання 125

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 45-ти років після конфліктної ситуації на роботі відчула інтенсивний головний біль, була нудота та неодноразове блювання. До цього вважала себе здоровою. Об'єктивно: свідомість ясна, артеріальний тиск - 160/100 мм рт.ст., частота серцевих скорочень - 70/хв., серцева діяльність ритмічна, загальна гіперестезія, фото-фонофобія, ригідність м'язів потилиці. Парезів та інших неврологічних розладів не виявлено. Найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ішемічний інсульт



- ☐ b. Субарахноїдальний крововилив
- ☐ c. Гостра гіпертонічна енцефалопатія
- ☐ d. Істеричний невроз
- ☐ e. Менінгіт


Коментар

Правильна відповідь: Субарахноїдальний крововилив

## Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 64-х років, що перебуває у стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. При огляді діагностовані зупинка серцевої діяльності і подиху, розпочато легенево-серцеву реанімацію. На ЕКГ шлуночкова тахікардія. Далі необхідно:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ввести внутрішньосерцево адреналін
- ☐ b. Ввести внутрішньовенно кальцію хлорид
- ☐ c. Ввести внутрішньосерцево атропін
- ☐ d. Ввести внутрішньовенно магнію сульфат
- ☐ e. Дефібриляція


Коментар

Правильна відповідь: Дефібриляція

## Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 18-ти років під час пірнання потонув. Після проведення заходів реанімації близькими потерпілого було відновлено са- мостійне дихання. На час прибуття бригади швидкої допомоги на місце події хворий самостійно дихає, свідомість не порушена. Спостерігається легкий стан алкогольного сп'яніння. Частота дихання - 20/хв., артеріальний тиск - 140/70 мм рт.ст., пульс - 100/хв. Скаржиться на слабкість, при частому кашлі відхаркує білувату піну. Яка подальша тактика ведення такого потерпілого?


Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Госпіталізація для подальшого спостереження та обстеження
  - ☐ b. Відвідування районної лікарні після зникнення ознак сп'яніння
  - ☐ c. Хворому мають бути призначені заспокійливі засоби (настойки валеріани чи півонії), рекомендовано відмовитися від вживання алкогольних напоїв
  - ☐ d. Хворий не потребує подальшого спостереження та лікування
  - ☐ e. Спостереження за хворим протягом 30 хвилин, за відсутності погіршення стану - амбулаторний нагляд
- Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація для подальшого спостереження та обстеження

## Питання 128

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 63-х років надійшов до хірургічного відділення з кровотечею з хронічної виразки правої гомілки. Туге бинтування виразки неефективне. Якою буде тактика лікування?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Тампонування виразки
- ☐ b. Склерозувальна терапія
- ☐ c. Венектомія в плановому порядку
- ☐ d. Венектомія в терміновому порядку
- ☐ e. Прошивання судини, що кровоточить

Коментар

Правильна відповідь: Прошивання судини, що кровоточить

## Питання 129

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після падіння з опором на праве плече, потерпілий скаржиться на біль, обмеження рухів, деформацію в ділянці плечового суглоба. Які заходи на даному етапі надання допомоги необхідно провести?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Блокада місця перелому
- ☐ b. Транспортна іммобілізація, знеболення
- ☐ c. Накладення шини Дітеріхса
- ☐ d. Накладення шини Крамера від пальців до плечового суглоба
- ☐ e. Накладення гіпсової пов'язки


Коментар

Правильна відповідь: Транспортна іммобілізація, знеболення

### Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 56-ти років звернувся зі скаргами на біль та набряк лівої гомілки. Об'єктивно: ліва гомілка збільшена в діаметрі (+5 см у порівнянні з правою), тепла на дотик. Болючість та напружений набряк гомілки при пальпації. Для уточнення діагнозу першочергово необхідно виконати: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Доплерографію вен нижніх кінцівок
- ☐ b. Рентгенографію нижніх кінцівок
- ☐ c. Плетизмографію нижніх кінцівок
- ☐ d. Флебографію нижніх кінцівок
- ☐ e. Коагулограму


Коментар

Правильна відповідь: Доплерографію вен нижніх кінцівок

### Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До стаціонару надійшов хворий на неспецифічний виразковий коліт зі скаргами на гострий біль у животі, здуття, криваву діарею, підвищення температури тіла до 39°C. На другу добу перебування у стаціонарі на тлі зростання симптомів інтоксикації частота випорожнень значно зменшилась. На оглядовій рентгенограмі: збільшення товстої кишки понад 6 см, переміжні островці виразок слизової оболонки. Яке ускладнення зумовило погіршення стану хворого? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Перфорація товстої кишки
- ☐ b. Тромбоз мезентеріальних артерій
- ☐ c. Рак кишечника
- ☐ d. Стриктура товстої кишки
- ☐ e. Токсична дилатація товстої кишки


Коментар

Правильна відповідь: Токсична дилатація товстої кишки

## Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 30-ти років скаржиться на головний біль, марення. Об'єктивно: температура тіла - 39°C, збуджена, обличчя гіперемоване, позитивний симптом Говорова-Годелє, петехіальний висип на тулубі, кінцівках, частота серцевих скорочень - 92/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., гепатоспленомегалія. Вживає алкоголь, ін'єкційні наркотики, живе в приміщенні підвального типу.

Поставте попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. ВІЛ-інфекція
- ☐ b. Висипний тиф
- ☐ c. Лептоспіроз
- ☐ d. Грип
- ☐ e. Алкогольний психоз


Коментар

Правильна відповідь: Висипний тиф

## Питання 133

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 19-ти річної жінки у III періоді пологів проведене ручне відокремлення та видалення посліду в зв'язку з інтимним прирощенням плаценти. Одразу після пологів з'явився гострий плевральний біль, занепокоєння, лихоманка, кашель. Шкірні покриви бліді, температура - 38,9°C, частота пульсу - 98/хв., артеріальний тиск - 100/70; 90/60 мм рт.ст., розпочалась маткова кровотеча, проте матка

контурується. На ЕКГ - синусова тахікардія, гостре легеневе серце [SIQ III; P - pulmonale], парціальний тиск O<sub>2</sub> становить 64 мм рт.ст., тиск CO<sub>2</sub> - 18 мм рт.ст. Встано- віть діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Емболія амніотичною рідиною
- ☐ b. Інфаркт міокарду
- ☐ c. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ d. Синдром Мендельсона
- ☐ e. Повітряна емболія


Коментар

Правильна відповідь: Емболія амніотичною рідиною

### Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До гінекологічного відділення надійшла хвора зі значною кровотечею зі статевих шляхів, болем внизу живота. В анамнезі: стоїть на обліку в ж/к з вагітністю 12 тижнів. Об'єктивно: хвора бліда, артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс - 90-100/хв. Зі статевих шляхів значні кров'яністі виділення. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Неповний аборт
- ☐ b. Спонтанний аборт. Геморагічний шок I ступеня
- ☐ c. Самовільний аборт, що починається
- ☐ d. Загроза переривання вагітності
- ☐ e. Кровотеча з вагіни


Коментар

Правильна відповідь: Спонтанний аборт. Геморагічний шок I ступеня

### Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 34-х років, чабан, захворів раптово. Об'єктивно: стан тяжкий, задуха, домішки крові в харкотинні, t - 40°C, явища кон'юнктивіту, виражені катаральні явища, ціаноз, пульс - 140/хв.,

артеріальний тиск - 80/40 мм рт.ст., над легенями притуплення перкуторного звуку, вислуховуються сухі та вологі хрипи. З епіданамнезу відомо про масову загибель овець. Поставте попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Туляремія, легенева форма
- ☐ b. Сибірка, легенева форма
- ☐ c. Крупозна пневмонія
- ☐ d. Чума, легенева форма
- ☐ e. Легіонельоз


Коментар

Правильна відповідь: Сибірка, легенева форма

### Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 73-х років у приймальному відділенні раптово виникла асистолія. Що з перерахованого, слід враховувати лікарю приймального відділення, який проводить реанімаційні заходи до прибуття бригади анестезіологів, в зв'язку з віком хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Зменшити ЧСС при непрямому масажі серця
- ☐ b. Змінити тривалість реанімаційних заходів
- ☐ c. Силу натискання при непрямому масажі серця
- ☐ d. Відмовитися від використання дефібрилятора
- ☐ e. Зменшити частоту дихання при ШВЛ


Коментар

Правильна відповідь: Силу натискання при непрямому масажі серця

### Питання 137

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 47-ми років госпіталізовано у терапевтичне відділення. Скарги на зниження апетиту, багаторазовий пронос, кровоточивість ясен, біль при ковтанні, підвищену пітливість, які виникли

після опромінювання. Об'єктивно: хворий загальмований, крововиливи у пахвинній ділянці. Температура тіла - 38,7оС. Пульс - 90/хв., артеріальний тиск - 140/95 мм рт.ст. Відзначається значне розширення площі відносної серцевої тупості вправо. Тони серця приглушені, ритмічні, систолічний шум над верхівкою. Встановлено діагноз гострої променевої хвороби. Який період гострої променевої хвороби найбільш імовірний у потерпілого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Період віддалених наслідків
- ☐ b. Період розпалу
- ☐ c. Період виходів
- ☐ d. Початковий період
- ☐ e. Латентний період


Коментар

Правильна відповідь: Період розпалу

### Питання 138

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 70-ти років звернулася до лікаря зі скаргами на блювання з домішками жовчі, затримку випорожнень та газів. П'ять років тому оперована з приводу перфораційної виразки 12-палої кишки. Живіт здутий. Спостерігаються шум плескоту та симптом Валя. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий апендицит
- ☐ b. Гостра непрохідність кишечника
- ☐ c. Загострення виразкової хвороби 12-палої кишки
- ☐ d. Гострий панкреатит
- ☐ e. Гострий холецистит


Коментар

Правильна відповідь: Гостра непрохідність кишечника

### Питання 139

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 70-річного пацієнта скарги на біль в правій поперековій ділянці з іррадіацією в статеві органи, часте болюче сечовипускання, підвищення температури тіла до 38,3оС, лихоманку, блювання. Аналіз сечі: реакція кисла, лейкоцитів більше 110, еритроцитів 48 в полі зору, сеча каламутна, бурого кольору. Ультрасонографічно виявлено нерівномірно виражені зміни паренхіми, значне розширення миски правої нирки. Попередній діагноз:  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Карбункул нирки. Гострий гнійний паранефрит
- ☐ b. Загострення хронічного пієлонефриту
- ☐ c. Сечо-сольовий діатез. Абсцес нирки
- ☐ d. Сосочковий некроз
- ☐ e. Сечокам'яна хвороба

Коментар

Правильна відповідь: Сечокам'яна хвороба

## Питання 140

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілого знайдено непритомним на вулиці під час зливи з грозою. На потилиці рвана рана розміром 4х2 см. Чітких даних щодо враження електричним струмом або блискавкою, через неможливість провести детальний огляд, не виявлено. До якого відділення проводиться госпіталізація?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Реанімаційного
- ☐ b. Нейрохірургічного
- ☐ c. Неврологічного
- ☐ d. Хірургічного
- ☐ e. Політравми

Коментар

Правильна відповідь: Реанімаційного

## Питання 141

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання



Через годину після аварії на підприємстві з виробництва пластмас співробітник скаржиться на головний біль, шум у вухах, слинотечу, пронос, підвищення температури тіла до 38°C. Діагностовано отруєння похідними фенолу. Вміст якої речовини у крові підвищується при отруєнні фенолом?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Карбоксигемоглобін
- ☐ b. Карбгемоглобін
- ☐ c. Метгемоглобін
- ☐ d. Креатинін та сечовина
- ☐ e. Калій


Коментар

Правильна відповідь: Метгемоглобін

## Питання 142

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 42-х років доставлений в інфекційне відділення на третій день хвороби зі скаргами на головний біль, загальну слабкість, сухість у роті, двоїння в очах, утруднення при ковтанні, відсутність випорожнень. Напередодні захворювання їв в'ялену рибу. Об'єктивно: гугнявий голос, птоз, мідріаз, анізокорія. Язик сухий, живіт здутий. Найефективнішим лікуванням хворого є:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Колоїдні розчини
- ☐ b. Сольові розчини
- ☐ c. Протиботулінічна антитоксична сироватка
- ☐ d. Антибіотики
- ☐ e. Гіпербарична оксигенація


Коментар

Правильна відповідь: Протиботулінічна антитоксична сироватка

## Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий доставлений у МедР з вогнища через добу після застосування хімічної зброї. Скаржиться на сильний біль в очах, світлобоязнь, слюзотечу, запаморочення, слабкість, нудоту, блювання. Зі слів постраждалого, краплі отруйної речовини (ОР) потрапили на шкіру обличчя й в очі. Через кілька хвилин з'явилися відчуття піску в очах, світлобоязнь, слюзотеча, які неухильно наростали. При огляді трохи загальмований, млявий, адинамічний. Блефароспазм, виражений набряк і гіперемія повік, еритематозні вогнища на шкірі обличчя. Пульс 60/хв., ритмічний, тони серця ослаблені, артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. Дихання жорстке. Якими властивостями володіє отруйна речовина?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ураження пароподібним іпритом важкого ступеня
- ☐ б. Ураження рідкою ОР нервово-паралітичної дії
- ☐ с. Отруєння ароматичними вуглеводнями
- ☐ d. Ураження рідкою ОР шкірно-нарівної дії
- ☐ е. Ураження ОР подразливої дії


Коментар

Правильна відповідь: Ураження рідкою ОР шкірно-нарівної дії

## Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 32-х років страждає на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки протягом 6-ти років. Годину назад після їжі з'явився раптово різкий біль в епігастральній області. Загальний стан важкий, стогне від болю в животі. Живіт різко напружений, болісний у всіх відділах, черевна стінка відстає в акті дихання. При пальпації печінка на 1 см нижче реберної дуги. При перкусії визначається відсутність печінкової тупості. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий холецистит
- ☐ б. Гострий панкреатит
- ☐ с. Перфоративна виразка
- ☐ d. Гостра кишкова непрохідність
- ☐ е. Цироз печінки

Коментар

Правильна відповідь: Перфоративна виразка

## Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Полковника 39-ти років поранено у ліве стегно. Спостерігається пульсуюча кровотеча з рани, кров'яско-червоного кольору. Скарги пораненого на слабкість, серцебиття, запаморочення, біль в ураженій кінцівці. Тони серця ритмічні. Пульс - 104/хв. Артеріальний тиск - 110/65 мм рт.ст. Живіт м'який, безболісний. Що дозволить попередити розвиток геморагічного шоку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Накладання шини Дітерікса
- ☐ б. Накладання джгута нижче місця поранення
- ☐ в. Накладання пов'язки типу "Дезо"
- ☐ г. Накладання джгута вище місця поранення
- ☐ д. Накладання пов'язки типу "Дамуазо"


Коментар

Правильна відповідь: Накладання джгута вище місця поранення

#### Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілого внаслідок тривалого впливу високих концентрацій чадного газу діагностовано тяжкий ступінь отруєння. Назвіть найбільш ефективну схему проведення кисневої терапії:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпербарична оксигенація
- ☐ б. 40% киснево-повітряна суміш протягом 6 годин
- ☐ в. 80% киснево-повітряна суміш протягом 2 годин
- ☐ г. 100% кисень протягом 1 години
- ☐ д. 60% киснево-повітряна суміш протягом 4 годин

Коментар

Правильна відповідь: Гіпербарична оксигенація

#### Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років був збитий автомобілем в результаті чого отримав відкритий перелом лівого стегна в середній третині з кутовим та поздовжнім зміщенням уламків. Який оптимальний метод транспортної іммобілізації слід застосувати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Шину Дітерікса
- ☐ b. Дві драбинчасті шини
- ☐ c. Шину Дітерікса та Крамера
- ☐ d. Три драбинчасті шини
- ☐ e. Шину Томаса


Коментар

Правильна відповідь: Три драбинчасті шини

## Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після опромінення до госпіталю доставлений юнак 26-ти років. Показник індивідуального дозиметра 5 Гр. Скарги на різку загальну слабкість, головний біль, нудоту, повторне блювання. Об'єктивно: на шкірі обличчя еритема, пульс - 100/хв., артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст., блювання продовжується. В якому клінічному періоді гострої променевої хвороби перебуває хворий?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Період виражених клінічних проявів
- ☐ b. Період запалення
- ☐ c. Період розпаду
- ☐ d. Період вторинної реакції
- ☐ e. Період первинної реакції

Коментар

Правильна відповідь: Період первинної реакції

## Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 15-ти років госпіталізована зі скаргами на блювання "кавовою гущею", жовтушність шкіри, носові кровотечі, лихоманку. Об'єктивно: дихання уповільнене, шкіра іктерична, частота серцевих скорочень - 110/хв., артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст. В біохімічному аналізі крові: АлАт- 220 ОД л; АсАт- 300 ОД л; загальний білірубін - 160 мкмоль/л, протромбіновий індекс - 30%, фібриноген - 1,1 г/л. З анамнезу: дитина страждає на хворобу Вільсона-Коновалова. Яке ускладнення виникло у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра надниркова недостатність
- ☐ б. Гостра ниркова недостатність
- ☐ в. Гемолітичний криз
- ☐ г. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ д. Гостра печінкова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

## Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Рядовий 19-ти років помилково зробив 2 ковтки антифризу, після чого з'явилися запаморочення, слабкість, похитування при ході. Викликав блювання, випив розчин питної соди. У ПМГ промили шлунок. Об'єктивно: стан задовільний, свідомість не порушена, обличчя гіперемоване, ін'єкція склер. Пальценосову пробу виконує невпевнено. У легенях подих везикулярний. Межі серця не змінені, діяльність серця ритмічна, тони збережені. Частота серцевих скорочень - 90/хв., артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст. Живіт м'який, трохи болючий у епігастрії. Печінка біля краю реберної дуги. Набряків нема. Діурез - 500 мл/добу. Який обсяг допомоги в ОМедБ?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Строфантин в/в
- ☐ б. Сольове проносне, етаперазин в/м
- ☐ в. Етиловий спирт в/в, фуросемід в/в
- ☐ г. Преднізолон в/м
- ☐ д. Атропін, фуросемід

Коментар

Правильна відповідь: Етиловий спирт в/в, фуросемід в/в

## Питання 151

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 52-х років впала на вулиці. Свідомість та серцева діяльність відсутні. Реанімацію почали з непрямому масажу серця. Яка ознака свідчить про його ефективність?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Посмикування кінцівок
- ☐ б. Роздування живота
- ☐ в. Поява пульсації на сонних артеріях
- ☐ г. Розширення зіниць
- ☐ д. Підняття грудної клітки

Коментар

Правильна відповідь: Поява пульсації на сонних артеріях

## Питання 152

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 57-ми років на пляжі відчула різкий головний біль, виникло блювання. Хвора непритомніла. Об'єктивно: шкіра різко гіперемована. Артеріальний тиск - 200/130 мм рт.ст. Пульс - 98/хв., напружений. Дихання за типом Чейн-Стокса. Симптом "вітрила" справа. Права стопа ротована назовні. Глибокі рефлекс не викликаються. Який симптом необхідно перевірити у хворої в непритомному стані для визначення сторони ураженої півкулі?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Адіадохінез
- ☐ б. Хиткість у позі Ромберга
- ☐ в. Ширину зіниць
- ☐ г. Холодову пробу
- ☐ д. Орального автоматизму

Коментар

Правильна відповідь: Ширину зіниць

## Питання 153

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 40-ка років загальмований, часом агресивний, на питання відповідає неадекватно. Відомо, що тривалий час зловживає алкоголем. Шкіра та слизові оболонки жовті. Живіт збільшений у розмірі, на передній черевній стінці розширені вени у вигляді голови медузи. Печінка +4 см, край щільний, болючий, гладенький. Перкуторно: збільшення меж селезінки та притуплення у спадистих місцях. Назвіть найбільш інформативний метод для діагностики печінкової недостатності: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Біохімічні дослідження крові
- ☐ б. Комп'ютерна томографія
- ☐ в. Сонографія
- ☐ г. Гастроскопія
- ☐ д. Загальний аналіз крові

Коментар

Правильна відповідь: Біохімічні дослідження крові

## Питання 154

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 44-х років звернувся зі скаргами на зниження гостроти зору, нежить з рясними рідкими виділеннями, слинотечу, утруднення дихання, мимовільні посмикування м'язів, тахікардію, підвищення артеріального тиску. Об'єктивно: хворий збуджений, температура тіла - 37,5°C. Пульс - 126/хв., артеріальний тиск - 180/90 мм рт.ст., зіниці різко звужені. При аускультатії в легенях поодинокі хрипи. Отруєння речовиною якої дії найбільш імовірно у даному випадку? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Шкірно-наривної
- ☐ б. Нервово-паралітичної
- ☐ в. Загальноотруйної
- ☐ г. Сльозогінної
- ☐ д. Задушливої

Коментар

Правильна відповідь: Нервово-паралітичної

### Питання 155

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 26-ти років в нижній третині лівого стегна є рана 7х3 см неправильної форми з рваними краями та помірною кровотечею. Близько 20-ти хвилин тому хворого вкусив бродячий пес. Якою буде перша допомога?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Накладання стискальної пов'язки. Рану не зашивати. Госпіталізація в хірургічний стаціонар для проведення антирабічної профілактики
- ☐ б. ПХО. Рану зашити. Амбулаторне спостереження хірурга та рабіолога
- ☐ с. ПХО. Рану зашити. Госпіталізація в хірургічний стаціонар для проведення антирабічної профілактики
- ☐ d. ПХО. Рану не зашивати. Амбулаторне спостереження хірурга та рабіолога

Коментар

Правильна відповідь: Накладання стискальної пов'язки. Рану не зашивати. Госпіталізація в хірургічний стаціонар для проведення антирабічної профілактики

### Питання 156

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 49-ти років протягом останнього тижня після стоматологічної операції в зв'язку з остеомієлітом нижньої челюсті стала тривожною, плаксивою, порушився сон. Виказує ідеї поганого до неї ставлення з боку близьких, мовляв, її засуджують, звинувачують у матеріальних негараздах сім'ї. У відділенні весь час ходить по палаті, заламує руки, голосить, "краще б убили одразу", "так жити не хочу". Який препарат слід призначити в першу чергу хворій?  
Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Аміназин
- ☐ б. Діазепам
- ☐ с. Амітриптилін
- ☐ d. Галоперидол
- ☐ e. Імізин




Коментар

Правильна відповідь: Амітриптилін

### Питання 157

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 62-х років, що перебував на стаціонарному лікуванні з приводу міокардиту раптово знепритомнів, спостерігались короткотривалі тонічні судоми скелетних м'язів. Під час огляду: свідомість відсутня, дихання поверхневе, рідке, пульс на сонних артеріях відсутній, артеріальний тиск не визначається. При надходженні на ЕКГ були періодичні випадіння комплексів QRS без наростання інтервалу Q-T. Яке ускладнення виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Синдром Морганьї-Адамса-Стокса
- ☐ b. Гіпоглікемічна кома
- ☐ c. Динамічне порушення мозкового кровообігу
- ☐ d. Напад епілепсії
- ☐ e. Гострий коронарний синдром

Коментар

Правильна відповідь: Синдром Морганьї-Адамса-Стокса

### Питання 158

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 40-ка років раптово, виходячи з тролейбуса, падає на землю. У нього відсутнє самостійне дихання, та пульсація на магістральних артеріях, розширені зіниці. Ваш діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Клінічна смерть
- ☐ b. Запаморочення
- ☐ c. Ортостатичний колапс
- ☐ d. Гострий інфаркт міокарда
- ☐ e. Тромбоемболія легеневої артерії


Коментар

Правильна відповідь: Клінічна смерть

### Питання 159

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 5-ти років захворіла гостро, підвищення  $t_{re}$  до 38-39°C, явища нежитю, посилений головний біль, супроводжений нудотою і блюванням. Об'єктивно: загальна гіперестезія, ригідність м'язів шиї, симптоми Керніга, Брудзинського. В області стегон геморагічний висип. Який з методів обстеження необхідно провести для уточнення ді- агнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. МРТ головного мозку
- ☐ b. Комп'ютерна томографія головного мозку
- ☐ c. Люмбальна пункція
- ☐ d. Променева діагностика придаткових пазух носа
- ☐ e. Загальний аналіз крові


Коментар

Правильна відповідь: Люмбальна пункція

### Питання 160

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При огляді кардіологом хворий 11-ти років, який страждає на вроджену ваду серця, раптово знепритомнів. Шкіра та слизові оболонки блідо-ціанотичні. Дихання агональне. Пульс на магістральних артеріях не визначається. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Кома
- ☐ b. Зупинка серцевої діяльності
- ☐ c. Колапс
- ☐ d. Простий синкопальний стан
- ☐ e. Запаморочення

Коментар

Правильна відповідь: Зупинка серцевої діяльності

## Питання 161

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У лікарню доставлена група потерпілих у результаті бійки із застосуванням холодної і вогнепальної зброї. Які поранення найбільш несприятливі для прогнозу розвитку інфекційних ускладнень? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Колото-різані
- ☐ b. Проникні
- ☐ c. Рвано-різані
- ☐ d. Вогнепальні
- ☐ e. Різані

Коментар

Правильна відповідь: Вогнепальні

## Питання 162

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В результаті проведення антитерористичної операції боєць на полі бою внаслідок дії ударної хвилі отримав тупу травму живота. При огляді, через 30 хвилин, солдат блідий, артеріальний тиск - 80/50 мм рт.ст., пульс 110/хв., частота дихальних рухів - 18/хв., живіт помірно болючий у всіх відділах. Яке імовірне ускладнення виникло у хворого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гемоторакс
- ☐ b. Пневмоторакс
- ☐ c. Гемопневмоторакс
- ☐ d. Пневмоперитонеум
- ☐ e. Гемоперитонеум

Коментар

Правильна відповідь: Гемоперитонеум

## Питання 163

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час виконання сільськогосподарських робіт молодий тракторист отримав відкритий перелом стегна в його нижній третині. Відзначається деформація стегна, патологічна рухомість, крепітація кісткових уламків. З рани фонтанує кров. На якому рівні потрібно застосувати кровоспинний джгут? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Венозний джгут безпосередньо над раною стегна
- ☐ б. Венозний джгут на верхню третину гомілки
- ☐ в. Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна
- ☐ г. Артеріальний джгут в середній третині стегна
- ☐ д. Артеріальний джгут в верхній третині стегна

Коментар

Правильна відповідь: Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна

#### Питання 164

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого явища гострої дихальної недостатності. При аускультції ослаблене дихання ліворуч. Рентгенологічно: ексудативний плеврит ліворуч до III ребра. З чого варто розпочати лікувальні заходи?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Пункція плевральної порожнини в VII- VIII міжребер'ї по задній аксиллярній лінії
- ☐ б. Антибактеріальна + дегідратаційна терапія, за неефективності - пункція і дренування плевральної порожнини
- ☐ в. Дренування лівої плевральної порожнини в V-VI міжребер'ї по середній пахвовій лінії
- ☐ г. Пункція плевральної порожнини в II міжребер'ї по середньоключичній лінії
- ☐ д. Симптоматична + антибактеріальна терапія

Коментар

Правильна відповідь: Пункція плевральної порожнини в VII- VIII міжребер'ї по задній аксиллярній лінії

#### Питання 165

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У жінки 29-ти років вдома відбулися стрімкі II пологи у терміні 36 тижнів вагітності. Народився живий хлопчик масою 2300,0 г. Лікар швидкої допомоги, який був викликаний, при огляді породіллі відмітив, що послід не виділився (після народження дитини пройшло 40 хвилин). Ознак кровотечі немає. Яку допомогу повинен надати лікар швидкої допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ввести в/в 10 ОД окситоцину і дочекатися виділення посліду
- ☐ б. Негайно транспортувати жінку і дитину до найближчого пологового відділення
- ☐ в. Негайно транспортувати жінку до пологового відділення III рівня
- ☐ г. Негайно транспортувати жінку до пологового відділення II рівня
- ☐ д. Провести ручне відділення посліду

Коментар

Правильна відповідь: Негайно транспортувати жінку і дитину до найближчого пологового відділення

## Питання 166

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Учасник ліквідації аварії на АЕС направлений у стаціонар з діагнозом "променева хвороба". Протягом 8 днів перебування в стаціонарі не знайдено ніяких суттєвих відхилень від норми. Чи можна очікувати прояви гострого радіаційного ураження у майбутньому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Не очікується
- ☐ б. Так, протягом першого місяця
- ☐ в. Так, протягом півроку
- ☐ г. Так, протягом двох місяців
- ☐ д. Так, протягом року

Коментар

Правильна відповідь: Не очікується

## Питання 167

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 32-х років, який страждає на епілепсію з частими тоніко-клонічними судомними нападами, після самовільного припинення вживання антиконвульсантів, доставлено бригадою швидкої медичної допомоги у епілептичному статусі. З яких препаратів доцільно починати невідкладну допомогу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Кавінтон 2,0 мл внутрішньовенно на 250,0 мл фізіологічного розчину
- ☐ б. Сибазон внутрішньовенно 20 мг на 20 мл 40% розчину глюкози або фізіологічного розчину
- ☐ в. 10,0 мл 25% розчину магнію сульфату внутрішньовенно
- ☐ г. Лазикс 2,0 мл внутрішньом'язово
- ☐ д. Тіопентал-натрію 1 мл 10% розчину на 10 кг маси хворого внутрішньовенно

Коментар

Правильна відповідь: Сибазон внутрішньовенно 20 мг на 20 мл 40% розчину глюкози або фізіологічного розчину

## Питання 168

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 39-ти років госпіталізовано після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) з діагнозом "Забій грудної клітки". Скаржиться на біль у лівій половині грудної клітки, задишку. Об'єктивно: блідий, акроціаноз, артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст., пульс - 110/хв. При глибокому диханні відзначається значне відставання лівої половини грудної клітки, аускультативно - відсутність дихальних шумів зліва. Поставте попередній діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Відкритий пневмоторакс
- ☐ б. Закритий пневмоторакс справа
- ☐ в. Закритий пневмоторакс зліва
- ☐ г. Закрита травма живота
- ☐ д. Перелом ребер

Коментар

Правильна відповідь: Закритий пневмоторакс зліва

### Питання 169

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Солдат активний, рухливий, метушливий. Чинить опір обстеженню. Говорить швидко, голосно. Вислови спонтанні, непослідовні. Поставте діагноз:  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Психомоторне збудження
- ☐ b. Ейфорія
- ☐ c. Аменція
- ☐ d. Делірій
- ☐ e. Кататонічне збудження

Коментар

Правильна відповідь: Психомоторне збудження

### Питання 170

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Розривом міни бійця відкинуло лівим боком на кам'яну брилу, після чого він тимчасово втратив свідомість. Під час огляду блідий, постійно поривається сісти. Порушення цілісності ребер та кісток не виявлено. Живіт болючий в лівому підребер'ї, притуплення перкуторного звуку в бокових відділах. Артеріальний тиск - 80/60 мм рт.ст. Пульс - 120/хв. Який попередній діагноз?  
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Тупа травма живота, розрив аневризми черевної частини аорти, геморагічний шок
- ☐ b. Закрита травма живота, розрив селезінки, геморагічний шок
- ☐ c. Тупа травма живота без пошкодження внутрішніх органів
- ☐ d. Закрита травма живота, розрив тонкої кишки, геморагічний шок
- ☐ e. Тупа травма живота, розрив печінки, травматичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Закрита травма живота, розрив селезінки, геморагічний шок

### Питання 171

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 72-х років доставлено до лікарні машиною швидкої допомоги у стані непритомності. При огляді: шкіра бліда, суха зі зниженим тургором, тонус очних яблук знижений, арефлексія, пульс частий, м'який, артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. У додаткових дослідженнях: виявлена глюкоза в сечі, цукор крові - 28,5 ммоль/л, гіпернатріємія, осмолярність плазми - 430 мосм/л. Розвиток якого стану можна припустити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіперосмолярної коми
- ☐ b. Кетоацидотичної коми
- ☐ c. Гострої надниркової недостатності
- ☐ d. Гіпотиреоїдної коми
- ☐ e. Гіперлактацидемічної коми

Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярної коми

## Питання 172

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини захворювання почалося з підвищення температури до 38,0°C та появи висипу. Спочатку висип мав вигляд плям, потім з'явилися пухирці. Під час огляду на шкірі обличчя, тулуба, кінцівок і на волосяній частині голови спостерігається рясний висип: папули, везикули, кірочки. Діагноз: вітряна віспа. Протягом якого періоду дитина має бути ізольована?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 21 день
- ☐ b. До 5-го дня після появи останніх висипів
- ☐ c. Ізоляції не потребує
- ☐ d. До появи останніх висипів
- ☐ e. 14 днів


Коментар

Правильна відповідь: До 5-го дня після появи останніх висипів

## Питання 173



Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 67-ми років впродовж 15-ти років страждає на гіпертонічну хворобу. Під час фізичної роботи раптово з'явився сильний біль у епігастрії, нудота, непритомність, артеріальний тиск - 190/90 мм рт.ст., пульс - 110/хв. При пальпації в епігастрії визначається болюче утворення, що пульсує. Який діагноз є найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Розшарувальна аневризма черевного відділу аорти
- ☐ б. Інфаркт міокарда, гастралгічна форма
- ☐ в. Ракова пухлина шлунка
- ☐ г. Підпечінковий абсцес
- ☐ д. Лімфогранулематоз з ураженням черевних лімфовузлів

Коментар

Правильна відповідь: Розшарувальна аневризма черевного відділу аорти

#### Питання 174

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 19-ти років надійшла на 4-й день хвороби. У пацієнтки блювання, різка слабкість, сонливість, виражена жовтяниця. Через добу хвора не орієнтується в часі, свідомість потьмарена, періодичне психомоторне збудження. Зменшилися розміри печінки. Яке ускладнення зумовило таку клінічну картину?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра печінкова колька
- ☐ б. Гостра печінкова недостатність
- ☐ в. Гостра надниркова недостатність
- ☐ г. Гіповолемічний шок
- ☐ д. Механічна жовтяниця

Коментар

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

#### Питання 175

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років надійшов до приймально-діагностичного відділення з попереднім діагнозом: защемлена пупкова кила. Під час обстеження раптово зблід, втратив свідомість. Дихання відсутнє. Пульсація на магістральних артеріях припинилася 30 секунд тому. Зіниці розширені, на світло не реагують. З чого треба розпочати реанімаційні заходи?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Штучне дихання
- ☐ b. Закритий масаж серця
- ☐ c. Прекардіальний удар
- ☐ d. Електродефібриляція
- ☐ e. Медикаментозна терапія

Коментар

Правильна відповідь: Закритий масаж серця

## Питання 176

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В хірургічне відділення військового шпиталю доставлений поранений із зони бойових дій, з проникним вогнепальним ураженням черевної порожнини. При обстеженні встановлено наявність пошкодження 0,5 см нижньої третини лівого сечоводу на відстані 3 см від сечового міхура, що поєднане з пошкодженням прямої кишки. Якою буде тактика лікування?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ушивання прямої кишки, уретерокутанеостомія
- ☐ b. Колостомія, первинний анастомоз сечоводу
- ☐ c. Колостомія, уретерокутанеостомія
- ☐ d. Імплантація сечоводу в пряму кишку
- ☐ e. Ушивання дефектів прямої кишки, сечоводу

Коментар

Правильна відповідь: Колостомія, уретерокутанеостомія

## Питання 177

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пораненого в ділянку черепа спостерігається біль у грудях, кровохаркання, кашель, задишка. Температура тіла - 37,0оС. При обстеженні: дихання в легенях ослаблене, хрипів немає. При рентгенологічному дослідженні виявляються множинні дрібні тіні в обох легенях. Яка причина виявлених змін?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Аспіраційна пневмонія
- ☐ b. Крововилив у легені
- ☐ c. Пневмоторакс
- ☐ d. Гемоперикард
- ☐ e. Гемоторакс

Коментар

Правильна відповідь: Крововилив у легені

## Питання 178

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілого 36-ти років переведено до хірургічного відділення військового госпіталю через 4 доби лікування в районній лікарні. Діагноз: уламкове сліпе множинне поранення лівої кінцівки. У пацієнта підвищилася температура тіла, рана почервоніла, набрякла. Який вид хірургічної допомоги слід надати потерпілому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Відкладена первинна хірургічна обробка рани
- ☐ b. Рання первинна хірургічна обробка рани
- ☐ c. Пізня первинна хірургічна обробка рани
- ☐ d. Вторинна хірургічна обробка рани
- ☐ e. Ампутація кінцівки

Коментар

Правильна відповідь: Вторинна хірургічна обробка рани

## Питання 179

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна в терміні 30 тижнів надійшла до пологового будинку у важкому стані. Скарги на головний біль, блювання, мерехтіння мушок перед очима. Об'єктивно: анасарка, артеріальний тиск - 180/120 мм рт.ст., з'явилися фібрилярні посмикування м'язів обличчя, тонічні судоми, дихання припинилося. Через 2 хвилини дихання відновилося. Амнезія. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Еклампсія
- ☐ b. Пухлина мозку
- ☐ c. Епілепсія
- ☐ d. Гіпертонічний криз
- ☐ e. Черепно-мозкова травма

Коментар

Правильна відповідь: Еклампсія

## Питання 180

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До медичного пункту окремої військової частини доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням живота та явніми ознаками внутрішньої кровотечі. Загальний стан важкий. Блідість шкіри та слизових оболонок. Пульс - 130/хв. Систолічний артеріальний тиск - 70/40 мм рт.ст. Язик сухий. Біль при пальпації живота, симптоми подразнення очеревини позитивні. Притуплення перкуторного звуку в пологих місцях черевної порожнини. В якому положенні необхідно евакуювати пораненого на наступний етап медичної евакуації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. У положенні сидячи
- ☐ b. У положенні стоячи
- ☐ c. У положенні лежачи
- ☐ d. У положенні лежачи на щиті
- ☐ e. У положенні лежачи на спині з піднятим головним кінцем носилок

Коментар

Правильна відповідь: У положенні лежачи

### Питання 181

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 10-ти років під час шкільної лінійки знепритомніла. Під час огляду шкіра бліда, кінцівки холодні. Тони серця послаблені. Частота серцевих скорочень - 62/хв., артеріальний тиск - 90/50 мм рт.ст. З чого необхідно розпочати надання допомоги на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Забезпечити доступ свіжого повітря
- ☐ б. Звільнити від стискаючого одягу
- ☐ в. Дати теплий чай
- ☐ г. Покласти дитину на спину з припіднятими ногами
- ☐ д. Покласти теплу грілку до ніг

Коментар

Правильна відповідь: Покласти дитину на спину з припіднятими ногами

### Питання 182

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 49-ти років на прийомі у сімейного лікаря втратила свідомість. Під час огляду непритомна, пульс на сонних артеріях не визначається, дихання поверхневе. Розпочато реанімаційні процедури. Як слід розташувати долоні під час проведення зовнішнього масажу серця?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. На межі середньої та нижньої третин груднини
- ☐ б. На рухів'ї груднини
- ☐ в. На верхній третині груднини
- ☐ г. На мечоподібному відростку
- ☐ д. На межі верхньої та середньої третин груднини

Коментар

Правильна відповідь: На межі середньої та нижньої третин груднини

### Питання 183

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Юнак одержав травму під час дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Свідомість була відсутня протягом 2 хвилин. Після цього скарги на головний біль, запаморочення, нудоту, блювання. Не пам'ятає, що було під час дорожньо-транспортної пригоди (ДТП). Брадикардія. Гіпотензія. Шкіра бліда. Анізокорія. Сухожильні рефлекс трохи знижені. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Внутрішня кровотеча
- ☐ b. Струс головного мозку
- ☐ c. Закритий перелом черепа
- ☐ d. Забій головного мозку
- ☐ e. Крововилив в головний мозок

Коментар

Правильна відповідь: Струс головного мозку

## Питання 184

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 3-х років, яка перебуває у стаціонарі, на тлі гострої респіраторної інфекції 3 рази було блювання, непокоїть гострий біль у животі. Температура тіла - 38,5°C. Шкіра бліда, суха. Дихання глибоке, частота серцевих скорочень - 130/хв. Цукор крові - 4,0 ммоль/л. Який з діагнозів найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Діабетична кома
- ☐ b. Гострий апендицит
- ☐ c. Цукровий діабет
- ☐ d. Ацетонемічний стан
- ☐ e. Гострий гастроентерит

Коментар

Правильна відповідь: Ацетонемічний стан

## Питання 185

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Бригадою швидкої медичної допомоги (ШМД) транспортується потерпілий з черепно-мозковою травмою: свідомість відсутня, зіниці рівномірно звужені, артеріальний тиск - 100/60 мм рт.ст., дихання самостійне, ефективне. Яке положення слід надати потерпілому під час транспортування до лікувального закладу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Горизонтальне на спині з припіднятим головним кінцем на 30о
- ☐ b. На правому боці з опущеним головним кінцем
- ☐ c. Горизонтальне на спині з опущеним головним кінцем
- ☐ d. Горизонтальне на спині
- ☐ e. Горизонтальне на спині з піднятими ногами на 70о

Коментар

Правильна відповідь: Горизонтальне на спині з припіднятим головним кінцем на 30о

## Питання 186

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 58-ми років, що перебував одну добу в палаті інтенсивної терапії з приводу інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. Об'єктивно: шкіра бліда, пульс на а. carotis відсутній, на ЕКГ - фібриляція шлуночків. Яких заходів буде найбільш доцільно вжити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Електроімпульсну терапію
- ☐ b. Вагусні проби
- ☐ c. Введення внутрішньовенно лідокаїну
- ☐ d. Через стравохідну кардіостимуляцію
- ☐ e. Введення внутрішньосерцево адреналіну


Коментар

Правильна відповідь: Електроімпульсну терапію

## Питання 187

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 45-ти років скаржиться на появу протягом двох тижнів випорожнень кров'ю більш ніж 12 разів на добу, болю в животі, суглобах; болючі висипи у порожнині рота та нижніх кінцівках, набряк колінних та гомілковостопних суглобів, слабкість, підвищення температури тіла понад 39°C, втрату ваги тіла. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Хвороба Бехчета
- ☐ b. Неспецифічний виразковий коліт
- ☐ c. Рак прямої кишки
- ☐ d. Ревматоїдний артрит
- ☐ e. Гемороїдальна кровотеча


Коментар

Правильна відповідь: Неспецифічний виразковий коліт

## Питання 188

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 32-х років з'явилися загальна слабкість, пітливість, відчуття печіння та м'язові посмикування в правій стопі, яка була травмована за три дні до цього під час прогулянки в лісі. При надходженні до стаціонару температура тіла - 37,1°C, куточки рота відтягнуті догори, очні щілини звужені, дрібні зморшки в куточках очей та на лобі. Права стопа набрякла, гіперемована, на підошві колота рана. Тонус м'язів рук і ніг, за винятком кистей і стоп, тулуба значно підвищений. Під час огляду з'явилися генералізовані судоми. Яку невідкладну допомогу потрібно надати хворому? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Застосування хлоралгідрату, нейролептаналгезія та введення лікувальної сироватки
- ☐ b. Введення лікувальної сироватки та первинна хірургічна обробка рани
- ☐ c. Застосування міорелаксантів та переведення на штучну вентиляцію легень (ШВЛ)
- ☐ d. Введення пеніциліну
- ☐ e. Первинна хірургічна обробка та введення спазмолітиків


Коментар

Правильна відповідь: Застосування хлоралгідрату, нейролептаналгезія та введення лікувальної сироватки



### Питання 189

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 52-х років скаржиться на набряк та посиніння правої гомілки, біль, що розпирає та зменшується при піднятому положенні гомілки. При пальпації гомілки больова реакція посилюється. Яким буде діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Тромбофлебіт вен таза
- ☐ б. Тромбофлебіт поверхневих вен в колінній ділянці правої нижньої кінцівки
- ☐ в. Тромбофлебіт нижньої порожнистої вени
- ☐ г. Тромбофлебіт вен правого клубово-стегнового сегменту
- ☐ д. Тромбофлебіт глибоких вен правої гомілки

Коментар

Правильна відповідь: Тромбофлебіт глибоких вен правої гомілки

### Питання 190

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 12-ти років скаржиться на появу червоного кольору сечі, лихоманку до 38,0оС, висип на кінцівках. При огляді стан важкий, на кінцівках, сідницях симетрично розташований геморагічний висип. В загальному аналізі крові: еритроцити - 3,2 10<sup>12</sup>/л, тромбоцити - 180 10<sup>9</sup>/л. В загальному аналізі сечі: еритроцити вкривають все поле зору, лейкоцити - одиночні в препараті. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Алергічна реакція
- ☐ б. Кір
- ☐ в. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура
- ☐ г. Геморагічний васкуліт
- ☐ д. Краснуха

Коментар

Правильна відповідь: Геморагічний васкуліт

## Питання 191

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 1 року 6 місяців доставлена у лікарню швидкою допомогою зі скаргами батьків на часте дихання. Під час бесіди стало відомо, що дитина була на кухні, де мати розбирала різні крупи та залишилася на де- який час без нагляду. При огляді: задишка мішаного характеру за участю допоміжної мускулатури. Частота дихання - 60/хв. Частота серцевих скорочень - 120/хв. Який з інструментальних методів треба застосувати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Рентгеноскопію
- ☐ b. Спірометрію
- ☐ c. МРТ
- ☐ d. Бронхоскопію
- ☐ e. Доплерехокардіографію

Коментар

Правильна відповідь: Бронхоскопію

## Питання 192

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 60-ти років скаржиться на біль в лівій половині грудної клітки, який підсилюється при поворотах тіла. Застосування нітрогліцерину не дало ефекту. Біль зменшився після застосування диклофенаку. Аускультативна картина легенів та серця ЕКГ без патології. Поставте діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Пневмонія
- ☐ b. Плеврит
- ☐ c. Міжреберна невралгія
- ☐ d. Стенокардія напруги
- ☐ e. Інфаркт міокарда

Коментар

Правильна відповідь: Міжреберна невралгія

### Питання 193

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 9-ти років, хворої на черевний тиф, на 18-ту добу хвороби з'явилися слабкість, блідість шкіри та слизових оболонок, холодний піт, тахікардія, артеріальний тиск - 80/20 мм рт.ст. Через 12 годин з'явилися чорні випорожнення. З чим може бути пов'язане погіршення стану?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Перитонітом
- ☐ b. Кишковою кровотечею
- ☐ c. Гострим апендицитом
- ☐ d. Кишечною суперінфекцією
- ☐ e. Перфорацією кишечника

Коментар

Правильна відповідь: Кишковою кровотечею

### Питання 194

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі 36-ти років, яка перебуває в кінці I періоду пологів з великим плодом, з'явилися потуги при високому розташуванні голівки плода, відсутність поступального руху голівки, позитивний симптом Генкеля-Вастена, симптоми вдавнення сечового міхура. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Дискоординована пологова діяльність
- ☐ b. Фізіологічний I період пологів
- ☐ c. Клінічно вузький таз
- ☐ d. Слабкість пологової діяльності
- ☐ e. Анатомічно вузький таз

Коментар

Правильна відповідь: Клінічно вузький таз

### Питання 195

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 3,5 років із тетрадою Фалло раптово виникли задуха, збудження, дифузний ціаноз і тахікардія. Після призначення пропранололу стан дитини нормалізувався. Яка причина цього епізоду задухи?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ б. Гостра лівошлуночкова недостатність
- ☐ в. Стенозувальний ларингіт
- ☐ г. Задишково-ціанотичний криз
- ☐ д. Гостра дихальна недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Задишково-ціанотичний криз

## Питання 196

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 44-річного чоловіка після вживання сурогатів алкоголю виникло багаторазове блювання шлунковим вмістом та дворазове блювання малозміненою кров'ю. Пульс - 100/хв. Артеріальний тиск - 100/70 мм рт.ст. Гемоглобін - 110 Г/л. При ендоскопічному обстеженні у кардіальному відділі шлунка виявлена лінійна тріщина слизової оболонки. Який діагноз можна встановити на основі клініки й ендоскопічних даних?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ерозивний гастрит, ускладнений кровотечею
- ☐ б. Гостра виразка шлунка, кровотеча
- ☐ в. Синдром Меллорі-Вейса
- ☐ г. Грижа стравохідного отвору діафрагми
- ☐ д. Варикозне розширення вен кардіального відділу шлунка, кровотеча

Коментар

Правильна відповідь: Синдром Меллорі-Вейса

## Питання 197

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнта 19-ти років доставлено з місця дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), ліва нижня кінцівка іммобілізована шиною Дітеріхса. Свідомість потьмарена, шкірні покриви бліді, з синюшним відтінком. Пульс - 130/хв., артеріальний тиск - 70/0 мм рт.ст. Дихання поверхневе, часте. Спостерігаються гіпорексія, м'язова гіпотонія. Який патофізіологічний стан супроводжує дане пошкодження?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Травматичний шок III ступеня
- ☐ б. Кома помірна
- ☐ в. Кома глибока
- ☐ г. Травматичний шок I ступеня
- ☐ д. Травматичний шок II ступеня

Коментар

Правильна відповідь: Травматичний шок III ступеня

## Питання 198

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 58-ми років скаржиться на безсоння, неспокій, кровоточивість ясен, збільшення живота. Хворіє 10 років на цироз печінки. Об'єктивно: хворий збуджений, шкіра жовтушна, множинні петехії та судинні зірочки, "печінковий" запах з рота. Рівень сечовини крові - 138 мкмоль/л, загальний білок - 54 г/л, альбуміни - 22 г/л, холестерин - 2,3 ммоль/л, білірубін - 48,5 мкмоль/л, протромб. індекс - 61%, фібриноген - 1,7 г/л. Чим ускладнилося захворювання?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гепатоцелюлярною недостатністю
- ☐ б. Астено-невротичним синдромом
- ☐ в. Портальною гіпертензією
- ☐ г. Гострою нирковою недостатністю
- ☐ д. Кровотечею з варикозно розширених вен стравоходу

Коментар

Правильна відповідь: Гепатоцелюлярною недостатністю

## Питання 199

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитину 5-ти років на п'ятий день гострої кишкової інфекції доставлено в стаціонар у зв'язку з погіршенням загального стану. При надходженні свідомість відсутня, виражений ексікоз, гіпертермія, напади судом, афазія. Виявлені гіперглікемія - 50 ммоль/л, осмолярність плазми (360 мОсм/л), нормальний рівень кетонових тіл в крові, відсутність ацетону в сечі. Відомо, що з трьох років хворіє на цукровий діабет 1-го типу. З якого препарату треба починати невідкладну інфузійну терапію?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 0,45% розчин натрію хлориду
- ☐ b. 5% розчин глюкози
- ☐ c. 10% розчин натрію гідрокарбонату
- ☐ d. 4% розчин натрію гідрокарбонату
- ☐ e. 10% розчин глюкози

Коментар

Правильна відповідь: 0,45% розчин натрію хлориду

## Питання 200

Відповіді не було  
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий на алкоголізм на третій день після проведеної резекції шлунка вночі став збудженим: робив спроби вставати з ліжка, кричав, що "по ньому бігають щурі, повзають змії; струшував їх із себе". Дезорієнтований в навколишньому середовищі. Артеріальний тиск - 90/60 мм рт.ст. З якого препарату необхідно розпочати надання невідкладної допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Діазепам
- ☐ b. Димедрол
- ☐ c. Аміназин
- ☐ d. Ноотропіл
- ☐ e. Амітриптилін

Коментар

Правильна відповідь: Діазепам

[Завершити перегляд](#)

[Пропустити <span id="mod\\_quiz\\_navblock\\_title">Перехід по тесту</span>](#)

## Перехід по тесту

[illegible]

Питання 191 На цій сторінці Питання 192 На цій сторінці Питання 193 На цій сторінці Питання 194 На цій сторінці Питання 195 На цій сторінці Питання 196 На цій сторінці Питання 197 На цій сторінці Питання 198 На цій сторінці Питання 199 На цій сторінці Питання 200 На цій сторінці  
Показати одну сторінку за разЗавершити перегляд

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

Учасники

Відзнаки

Компетентності

Журнал оцінок

Загальне

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Контрольні тестування

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Секція 9

Секція 10

Секція 11

Секція 12

Секція 13

Секція 14

Секція 15

Особистий кабінет

Домашня сторінка

Календар



[Особисті файли](#)

Мої курси

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручняк Оксана Богданівна](#) ([Вийти](#))  
**КРОК 3. Загальна лікарська підготовка**

- ☐ [Українська \(uk\)](#)
  - - ☐ [English \(en\)](#)
    - ☐ [Русский \(ru\)](#)
    - ☐ [Українська \(uk\)](#)