

[Перейти до головного вмісту](#)
Бокова панель
КРОК-123

(Інтерн БДМУ) Підручняк Оксана Богданівна

П

Особистий кабінетПрофіль користувачаОцінкиПовідомленняУподобанняВийтиПовідомлення

[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане

Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане

Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)

[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Секція 3](#)
- [2015 весна](#)

Розпочато

Tuesday 14 February 2023 20:35 PM

Стан

Завершено

Завершено

Tuesday 14 February 2023 20:35 PM

Витрачено часу

11 сек

Балів

0,00/200,00


Оцінка

0,00 з 100,00 можливих

Питання 1

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Черговий лікар припустив розвиток у хворого гіперосмолярної діабетичної коми. Почато інтенсивну терапію з використанням великих доз інсуліну. Назвіть недолік лікування діабетичної коми уведенням великих доз інсуліну:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпокаліємія
- ☐ b. Гіперлейкоцитоз
- ☐ c. Гіпертонія
- ☐ d. Гіпотонія
- ☐ e. Гіпоглікемія


Коментар

Правильна відповідь: Гіпоглікемія

Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина народилася в машині швидкої допомоги на шляху до пологового будинку. У новонародженого відсутнє спонтанне дихання після поглажування шкіри уздовж хребта. Які подальші дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дати кисень
- ☐ b. Почати штучну вентиляцію легень
- ☐ c. Поплескати по п'яті
- ☐ d. Повторювати поглажування
- ☐ e. Поплескати по сідницях

Коментар

Правильна відповідь: Почати штучну вентиляцію легень

Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 40 тижнів з бурхливою пологовою діяльністю, клінічно вузьким тазом. Під час індукції наркозу виникло блювання. Після інтубації проведена санація дихальних шляхів та ротової порожнини. В подальшому розвинувся ціаноз, підвищився центральний венозний тиск, над легеньми різнокаліберні вологі хрипи, підвищення тиску на вдиху. При контролі газів крові значна гіпоксемія. Яка причина цього стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Синдром Мендельсона
- ☐ b. Ендотоксичний шок
- ☐ c. Інфаркт міокарда
- ☐ d. Емболія навколоплідними водами
- ☐ e. набряк легенів


Коментар

Правильна відповідь: Синдром Мендельсона

Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженого на 2 добу життя виникла шлункова кровотеча, діагностована геморагічна хвороба. Найбільш ефективним препаратом для внутрішньовенного введення є:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дицинон
- ☐ b. Нативна плазма
- ☐ c. Свіжозаморожена плазма
- ☐ d. Альбумін
- ☐ e. Адроксон

Коментар

Правильна відповідь: Свіжозаморожена плазма

Питання 5

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 10-ти місяців бригадою швидкої допомоги доставлений у реанімаційне відділення. Під час проведення серцево-легеневої реанімації на електрокардіограмі реєструється шлуночкова брадикардія. Якому із наведених медикаментозних заходів необхідно надати перевагу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Внутрішньовенне введення атропіну 0,01 мг/кг
- ☐ б. Електрична дефібриляція серця
- ☐ с. Електрична дефібриляція серця + введення адреналіну
- ☐ д. Внутрішньовенне введення мезатону
- ☐ е. Внутрішньовенне введення 4% NaHCO₃ 2 мг/кг


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне введення атропіну 0,01 мг/кг

Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пішохід 62-х років під час ожеледиці послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є локалізований біль у ділянці верхньої третини лівого передпліччя. Відмічається тахікардія, підвищення артеріального тиску, припухлість, деформація, синець та крепітація в ділянці верхньої третини лівого передпліччя, рухи в кінцівці неможливі. Можна думати про пошкодження верхньої третини лівого передпліччя. Як ви будете транспортувати хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Наклавши шину Крамера з фіксацією плечового, ліктьового, променево-зап'ясткового суглобів
- ☐ б. Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п'ястно-фалангових суглобів
- ☐ с. В напівсидячому положенні з палкою в ліктьових згинах
- ☐ д. Наклавши пов'язку Дезо з валиком в пахвовій ділянці
- ☐ е. Прибинтувавши праву верхню кінцівку до грудної клітини та здорової кінцівки

Коментар

Правильна відповідь: Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п'ястно-фалангових суглобів

Питання 7

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 80-ти років одержувала серцеві глікозиди і діуретики з приводу застійної серцевої недостатності. Періодично напади фібриляції шлуночків. Рівень калію - 2,5 ммоль/л. Яка безпосередня причина нападів фібриляції шлуночків?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Діуретики
- ☐ b. Гіпокаліємія
- ☐ c. Серцеві глікозиди
- ☐ d. Напади Морганьї-Едемса-Стокса
- ☐ e. Фібриляція передсердь

Коментар

Правильна відповідь: Гіпокаліємія

Питання 8

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому 52-х років виконана екскреторна урографія. Через 10 хвилин після внутрішньовенного введення контрастної речовини стан хворого різко погіршився. Непритомний. АТ- 50/20 мм рт.ст., РС- 120/хв., ритмічний. В анамнезі - медикаментозна алергія. З метою лікування необхідно ввести: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Адреналін підшкірно, димедрол внутрішньовенно
- ☐ b. Адреналін внутрішньовенно, швидка інфузія кристалоїдів
- ☐ c. Внутрішньовенно преднізолон, інфузія кристалоїдів
- ☐ d. Внутрішньом'язово димедрол, преднізолон
- ☐ e. Внутрішньовенно еуфілін

Коментар

Правильна відповідь: Адреналін внутрішньовенно, швидка інфузія кристалоїдів

Питання 9

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 49-ти років діагностовано ішемічний інсульт. Прийнято рішення про початок тромболітичної терапії. В які строки від початку захворювання терапія буде максимально ефективною?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. До 1-ї доби
- ☐ б. До 6-ти годин
- ☐ в. В діапазоні 6-12 годин
- ☐ г. До 1-ї години
- ☐ д. До 3-х годин


Коментар

Правильна відповідь: До 3-х годин

Питання 10

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 45-ти років через 2 дні після повернення з Непалу, де він вивчав популяції диких гризунів, раптово підвищилася температура тіла до 40°C, виник озноб, біль голови, блювання, біль у грудній клітці, кашель з харкотинням кривавого характеру. Об'єктивно: гіперемія шкірних покривів, ін'єкція судин склер, поверхнєве дихання збудження, язик густо обкладений білим нальотом, мова нечітка, порушена координація рухів, вологі хрипи над легеньми. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Чума, легенева форма
- ☐ б. Туберкульоз
- ☐ в. Пташиний грип
- ☐ г. Сибірка, легенева форма
- ☐ д. Крупозна пневмонія

Коментар

Правильна відповідь: Чума, легенева форма

Питання 11

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець отримав вогнепальне поранення стегна з пошкодженням стегнової кістки. На догоспітальному етапі проведено знеболювання, зупинена кровотеча, кінцівка іммобілізована. Під час транспортування з'явився біль у грудній клітці, задишка, тахікардія. Що стало причиною погіршення стану пораненого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. набряк легенів
- ☐ b. Жирова емболія
- ☐ c. Інфаркт міокарда
- ☐ d. Напад бронхіальної астми
- ☐ e. Тромбоемболія гілок легеневої артерії


Коментар

Правильна відповідь: Жирова емболія

Питання 12

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Санітар 38-ми років захворів раптово 5 днів тому: озноб, гарячка, сильний головний біль, виражена слабкість, безсоння. Об'єктивно: температура - 40,20С. Збуджений, гіперемія обличчя, ін'єкція судин склер з крововиливами, рясний розеолезно-петехіальний висип на тілі, тремор язика, тахікардія, гепатоспленомегалія. Виявлено педикульоз. Яке дослідження підтвердить діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Реакція Райта і Хеддльсона
- ☐ b. Посів крові на жовчний бульйон
- ☐ c. РЗК і РА рикетсій Провачека
- ☐ d. Мікроскопія товстої краплі крові
- ☐ e. Реакція аглютинації Відаля

Коментар

Правильна відповідь: РЗК і РА рикетсій Провачека

Питання 13

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинку 14-ти років доставлено в стаціонар без свідомості. При огляді педіатр відмітив запах ацетону в повітрі, сухість шкіри, знижений тонус очних яблук, дихання Кусмауля. Рівень глюкози в крові становив 19,2 ммоль/л, кетонів тіл - 500 мкмоль/л. У сечі - позитивна реакція на ацетон, цукор 5%. Яка із ком має місце у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіперлактацидемічна
- ☐ b. Кетоацидотична
- ☐ c. Гіперосмолярна
- ☐ d. Гіпоосмолярна
- ☐ e. Гіпоглікемічна


Коментар

Правильна відповідь: Кетоацидотична

Питання 14

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В інфекційний стаціонар госпіталізовано хворого 26-ти років на 2-й день хвороби з підвищенням температури до 38,0°C, багаторазовим блюванням і частими водянистими випорожненнями. Маса тіла знижена на 6%. Який метод регідrataції показаний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Внутрішньоартеріальний
- ☐ b. Внутрішньовенний крапельний
- ☐ c. Введення рідини ендогастралью
- ☐ d. Введення рідини підшкірно крапельно
- ☐ e. Оральна регідrataція


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенний крапельний

Питання 15

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років рік тому переніс операцію по розкриттю гострого парапроктиту. Протягом 3-х місяців відзначає біль у промежині при дефекації, підвищення температури тіла до 37,50С та гнійні виділення з отвору, що знаходиться на 4 см від заднього проходу. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тріщина прямої кишки
- ☐ б. Защемлений геморой
- ☐ с. Епітеліальний куприковий хід
- ☐ d. Випадіння прямої кишки
- ☐ е. Аноректальна нориця


Коментар

Правильна відповідь: Аноректальна нориця

Питання 16

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 15-річного хлопчика діагностовано бубонну форму чуми. Які антибактеріальні препарати слід призначити дитині?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Стрептоміцин або хлорамфенікол
- ☐ б. Тетрациклін або доксициклін
- ☐ с. Пеніцилін або цефотаксим
- ☐ d. Гентаміцин або нетроміцин
- ☐ е. Бісептол або сульфален


Коментар

Правильна відповідь: Стрептоміцин або хлорамфенікол

Питання 17

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Студент 19-ти років скаржиться на сухий кашель, дряпання в горлі, підвищення температури тіла до 38,10С. За порадою друга приймав ампіцилін. Через 2 дні після початку захворювання з'явилася висипка по всьому тілу, рожевого кольору, 1 см у діаметрі, дещо припіднята. Який найменш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кір
- ☐ b. Менінгококцемія
- ☐ c. Медикаментозний дерматит
- ☐ d. Мононуклеоз


Коментар

Правильна відповідь: Менінгококцемія

Питання 18

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілого 35-ти років доставлено до приймального відділення без свідомості. Брав участь у ліквідації аварії на хімічному виробництві, пов'язаному з галогенованими вуглеводнями. Об'єктивно: зіниці розширені, на світло не реагують, дихання Кусмауля, ригідність м'язів потилиці та кінцівок, позитивні рефлекси Бабінського, Гордона, Жуковського. Різко виражена жовтяниця, петехіальна висипка. Температура тіла - 37,60С. Що зумовило розвиток вказаного стану в хворого? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ b. Гостра надниркова недостатність
- ☐ c. Гостра печінкова недостатність
- ☐ d. Гостра ниркова недостатність
- ☐ e. Геморагічна лихоманка


Коментар

Правильна відповідь: Гостра печінкова недостатність

Питання 19

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У лікарню швидкої медичної допомоги звернулась жінка зі скаргами на періодичні, незначні кров'янисті виділення з піхви, болі внизу живота протягом доби. Остання нормальна менструація 2 місяці тому. Живіт при пальпації м'який, болючий в нижніх відділах, матка збільшена на 6 тижнів вагітності. Виділення з піхви кров'янисті, незначні. Яке обстеження необхідно провести для встановлення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ультразвукове обстеження
- ☐ b. Рентгенологічне обстеження
- ☐ c. Імунологічний тест на вагітність
- ☐ d. Загальний аналіз крові
- ☐ e. Лапароскопічне обстеження


Коментар

Правильна відповідь: Ультразвукове обстеження

Питання 20

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої на цукровий діабет II типу розвинулась кома. Глікемія - 45 ммоль/л, калій 4,4 ммоль/л, натрій -158 ммоль/л, рН крові 7,24, стандартний бікарбонат - 20 ммоль/л, зсув буферних основ - 4 ммоль/л, сечовина - 12 ммоль/л. Які засоби необхідно використати для регідратаційної терапії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 0,9% розчин натрію хлориду
- ☐ b. 4% розчин натрію гідрокарбонату
- ☐ c. 5% розчин глюкози
- ☐ d. 2,5% розчин глюкози
- ☐ e. 0,45% розчин натрію хлориду

Коментар

Правильна відповідь: 0,45% розчин натрію хлориду

Питання 21

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчини 19-ти років запідозрена недостатність наднирників (хвороба Аддісона). Що з нижче перерахованого може допомогти під час диференційної діагностики даної патології?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпотермія
- ☐ б. Гіпонатріємія
- ☐ в. Артеріальна гіпертензія
- ☐ г. Гіпокаліємія
- ☐ д. Гіперглікемія


Коментар

Правильна відповідь: Гіпонатріємія

Питання 22

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час бою солдата відкинуто вибухом на спину. Турбує задишка, біль у грудях. Рс- 120/хв., АТ- 100/70 мм рт.ст. ЧД- 14/хв. При огляді по середньо-ключичній лінії справа, на рівні III ребра, рвана рана 2х4 см, з якої виділяється ціркою яскраво-червона кров. Яку першу лікарську допомогу слід надати пораненому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тампонада рани
- ☐ б. Пальцеве притискання рани
- ☐ в. Проведення гемостатичної терапії
- ☐ г. Проведення ПХО рани
- ☐ д. Невідкладна торакотомія

Коментар

Правильна відповідь: Тампонада рани

Питання 23

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час діагностичної ендоскопії у хворого 45-ти років виникла асистолія, яка діагностована електрокардіографічно. З яких заходів слід негайно розпочати лікування?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Інфузія гідрокарбонату натрію
- ☐ b. Введення атропіну
- ☐ c. Електрокардіостимуляція
- ☐ d. Дефібриляція
- ☐ e. Масаж серця, ШВЛ, адреналін


Коментар

Правильна відповідь: Масаж серця, ШВЛ, адреналін

Питання 24

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення доставлений потерпілий з опіком полум'ям IIIA-B IV ст. обличчя, шиї, передньої поверхні грудної клітки. Волосся у ніздрях обгоріло, слизова губ та язик сіро-білого кольору. Голос хриплий, дихання часте, поверхнєве, "трубний кашель", що супроводжується виділенням харкотиння з домішками кіптяви. Під час транспортування у відділення інтенсивної терапії почали наростати явища дихальної недостатності. Яка невідкладна допомога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Введення бронхолітиків
- ☐ b. Інтубація трахеї та ШВЛ
- ☐ c. Введення дихальних аналептиків
- ☐ d. Інгаляція зволоженого кисню
- ☐ e. Трахеостомія та ШВЛ


Коментар

Правильна відповідь: Трахеостомія та ШВЛ

Питання 25

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого госпіталізовано в інфекційний стаціонар на 5-й день хвороби з макуло- везикульозною висипкою на шкірі обличчя, шиї і тулуба. Хворий зазначає, що на 5-й день на шкірі з'явилися плямки, які з часом перетворилися в щільні міхурці, окрім цього з появою висипки покращилося самопочуття - знизилася температура тіла, зник біль голови. При дослідженні вмісту везикул методом світлової мікроскопії виявлено великі клітини з включеннями Гварнієрі. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Сибірка
- ☐ b. Контагіозний молюск
- ☐ c. Оперізувальний герпес
- ☐ d. Ящур
- ☐ e. Натуральна віспа


Коментар

Правильна відповідь: Натуральна віспа

Питання 26

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з'явився різкий біль у правій половині грудної клітки, задуха, яка наростає. При огляді - ціаноз губ, акроціаноз, ЧД- 60/хв. При перкусії грудної клітки - справа тимпаніт, дихання не прослуховується. Яка необхідна невідкладна медична допомога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пункція плевральної порожнини
- ☐ b. Введення серцевих препаратів
- ☐ c. Транспортування хворого в лікарню
- ☐ d. Введення знеболюючих препаратів
- ☐ e. Оперативне втручання


Коментар

Правильна відповідь: Пункція плевральної порожнини

Питання 27

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Яка найбільш раціональна методика евакуації сечі з сечового міхура при гострій затримці сечовипускання внаслідок гострого паренхіматозного простатиту?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Надлонна капілярна пункція сечового міхура
- ☐ b. Троакарна цистостомія
- ☐ c. Катетеризація сечового міхура еластичним катетером
- ☐ d. Епіцистостомія
- ☐ e. Катетеризація сечового міхура металевим катетером


Коментар

Правильна відповідь: Надлонна капілярна пункція сечового міхура

Питання 28

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта 40-ка років, котрий впродовж 17-ти років хворіє на неспецифічний виразковий коліт, при останньому ендоскопічному дослідженні виявлено множинні запальні псевдополіпи у всіх відділах товстої кишки. Результати біопсії показали наявність в поліпах дисплазії II-III ст. Яке лікування необхідно застосувати в даного хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рентгенотерапія
- ☐ b. Трансендоскопічне видалення поліпів
- ☐ c. Хірургічне
- ☐ d. Медикаментозне
- ☐ e. Хіміотерапія

Коментар

Правильна відповідь: Хірургічне

Питання 29

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після субтотальної резекції щитоподібної залози у хворої почала наростати слабкість, сонливість, втомлюваність, з'явився набряк повік. Запідозрено гіпотиреоз. Для підтвердження діагнозу необхідно визначення:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Рівня поглинання радіоактивного йоду
- ☐ б. Рівня T4
- ☐ в. Рівня тиреотропного гормону (ТТГ) крові
- ☐ г. Рівня T3
- ☐ д. Рівня антитиреоїдних антитіл


Коментар

Правильна відповідь: Рівня тиреотропного гормону (ТТГ) крові

Питання 30

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

З вогнища хімічного ураження, утвореного зарином, до МПП доставлено ураженого. Відзначаються напади ядухи за типом бронхіальної астми, фібрилярні посмикування жувальних м'язів. Який антидот необхідно ввести ураженому разом з атропіном на даному етапі медичної евакуації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Амлінітрил
- ☐ б. Діпіроксим
- ☐ в. Тіосульфат натрію
- ☐ г. Унітіол
- ☐ д. Антиціан


Коментар

Правильна відповідь: Діпіроксим

Питання 31

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому 39-ти років необхідне переливання еритроцитарної маси. При визначенні групової належності крові пацієнта за системою еритроцитарних антигенів АВ0 аглютинація спостерігалась в краплях з сироватками 0 (I) та B (III). Кров якої групи потрібно перелити пацієнту? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. A (II)
- ☐ b. 0 (I)
- ☐ c. B (III)
- ☐ d. AB (IV)


Коментар

Правильна відповідь: A (II)

Питання 32

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 24-х років захворів гостро з підвищення температури тіла до 39,0°C, сильного головного болю, слабкості. Через 5 годин від початку захворювання, на кінцівках, тулубі, сідницях з'явився геморагічний висип, який швидко розповсюджувався у вигляді екхімозів із некрозом у центрі. Хворий загальмований. Дихання везикулярне, ЧД- 40/хв. Тони серця приглушені, Ps- 120/хв. АТ- 90/40 мм рт.ст. Олігурія. Про розвиток якого ускладнення слід думати? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Респіраторний дистрес-синдром
- ☐ b. Гостра ниркова недостатність
- ☐ c. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ d. Гіповолемічний шок
- ☐ e. Геморагічний шок


Коментар

Правильна відповідь: Інфекційно-токсичний шок

Питання 33

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 46-ти років скаржиться на появу протягом двох тижнів випорожнень кров'ю більш за 12 разів на добу, болю в животі, суглобах; болючі висипки у порожнині рота та нижніх кінцівках, набряк колінних та гомілковостопних суглобів, слабкість, підвищення температури тіла понад 390C, втрату ваги тіла. Який метод обстеження є найбільш інформативним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ендоскопічне дослідження
- ☐ b. Біопсія кишечника та шкіри
- ☐ c. Загальний аналіз крові
- ☐ d. Рентгенографія суглобів
- ☐ e. Рентгенологічне дослідження кишечника


Коментар

Правильна відповідь: Ендоскопічне дослідження

Питання 34

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дворічного хлопчика сплутана свідомість, невпинне блювання кров'ю, мелена, глибоке шумне дихання, печінка +6 см з-під краю реберної дуги. З'явилися судоми. Стан погіршився декілька годин тому. В анамнезі - з приводу застуди впродовж трьох днів дитина отримувала по дві таблетки ліків на день. Який лікарський засіб міг викликати такі побічні явища?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ампіцилін
- ☐ b. Парацетамол
- ☐ c. Анальгін
- ☐ d. Аспірин
- ☐ e. Бісептол

Коментар

Правильна відповідь: Аспірин

Питання 35

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Очікувана доза опромінення населення, що мешкає на забрудненій радіонуклідами території, за перший рік становить 500 мЗв. Яких заходів захисту потребує це населення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. За даних умов потрібне переселення або евакуація населення
- ☐ б. Ніяку, тому що дози х-опромінення не перевищують допустимі рівні
- ☐ в. Обмежити вживання забруднених радіонуклідами харчових продуктів та питної води
- ☐ г. Потрібно провести йодну профілактику
- ☐ д. Використовуються укриття та засоби захисту органів дихання та шкірного покриву


Коментар

Правильна відповідь: За даних умов потрібне переселення або евакуація населення

Питання 36

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінці 35-ти років з приводу пневмонії був призначений ампіцилін. Через 30 хвилин після внутрішньом'язової ін'єкції препарату хвора відчула різку слабкість, свербіж шкіри обличчя та рук, нудоту; з'явилися кашель, задишка, біль у грудній клітці. Об'єктивно: ціаноз, набряк повік та обличчя з червоними висипаннями. Р8- 120/хв, АТ- 70/20 мм рт.ст. Тони серця глухі, дихання часте, поверхневе, з різнокаліберними сухими хрипами. Варикозне розширення вен на правій гомілці. Яка найбільш імовірна причина раптового погіршення стану хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Анафілактичний шок
- ☐ б. Астматичний напад
- ☐ в. Тромбоемболія гілок легеневої артерії
- ☐ г. Кропивниця
- ☐ д. Набряк Квінке

Коментар

Правильна відповідь: Анафілактичний шок

Питання 37

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 8-ми років, катаючись на ковзанах на річці, несподівано провалився під лід. Після вилучення з води: шкіра ціанотична, холодна, не дихає, Р8- 36/хв. Які першочергові заходи необхідно провести?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Вливання до рота гарячого напою
- ☐ b. Штучне дихання
- ☐ с. Непрямий масаж серця
- ☐ d. Транспортування до лікарні
- ☐ е. Загальне зігрівання


Коментар

Правильна відповідь: Штучне дихання

Питання 38

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До реанімаційного відділення доставлена хвора 48-ми років без свідомості. Шкіра холодна, бліда, суха, акроціаноз. Щільний набряк обличчя, тіла, гомілок, температура тіла 33°C. Сухожилльні рефлекси мляві. PS- 50/хв., малий, ритмічний. АТ- 90/60 мм рт.ст. Тони серця різко послаблені. Дихання рідке, глибоке. У крові: гіпохромна анемія, гіперхолестеринемія, високий рівень ТТГ крові. Який препарат необхідно призначити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Глюкоза
- ☐ b. Преднізолон
- ☐ с. Анаприлін
- ☐ d. Трийодтиронін
- ☐ е. Мерказоліл

Коментар

Правильна відповідь: Трийодтиронін

Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 5-ти років доставлений у лікарню з раптовим епілептичним нападом. Через декілька хвилин виник новий напад. Дитина в 2 і 3 роки життя перенесла атипові фебрильні напади. Від призначеного на той час лікування батьки відмовились. Визначити препарат вибору для ургентної допомоги:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Внутрішньовенне чи ректальне введення діазепаму (сибазону)
- ☐ б. Внутрішньовенне введення дексаметазону
- ☐ в. Внутрішньовенне введення тіопенталу натрію - барбітуровий наркоз
- ☐ г. Внутрішньом'язове введення розчину сірчаної кислоти магnezії
- ☐ д. Плазмаферез


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне чи ректальне введення діазепаму (сибазону)

Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 49-ти років потрапив у ДТП. Об'єктивно: стан важкий, міжреберні проміжки згладжені, ліва половина грудної клітки відстає при диханні. Над лівим легеневим полем тимпаніт. Аускультативно: дихання зліва не проводиться, ЧДР- 32/хв. Інші пошкодження відсутні. Як транспортувати потерпілого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. На правому боці лежачи
- ☐ б. На лівому боці лежачи
- ☐ в. В положенні Волковича на щиті
- ☐ г. В напівсидячому чи напівлежачому положенні
- ☐ д. Грудна клітина фіксується шинами Крамера до щита


Коментар

Правильна відповідь: В напівсидячому чи напівлежачому положенні

Питання 41

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 35-ти років під час прийому їжі почався різкий переймоподібний кашель, посилилась задишка. Під час огляду шкіра бліда, акроціаноз, ЧД- 30/хв. При аускультатії вислуховується хлопок над дихальними шляхами, дихання стридорозне. Яке дослідження найбільш доцільне при диференційній діагностиці цього стану?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Бронхографія
- ☐ b. Спірографія
- ☐ c. Фібробронхоскопія
- ☐ d. Оглядова рентгенографія органів грудної порожнини
- ☐ e. Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини


Коментар

Правильна відповідь: Фібробронхоскопія

Питання 42

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 37-ми років страждає на хронічний алкоголізм (II стадія), 3 роки назад переніс алкогольний делірій. Після 5-денного запою був госпіталізований для лікування абстинентного синдрому у наркологічне відділення. На 11-й день лікування зберігається порушення сну. Що призначити хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Валеріана
- ☐ b. Дезінтоксикаційна терапія
- ☐ c. Транквілізатори
- ☐ d. Групова психотерапія
- ☐ e. Сенсibiliзуюча терапія

Коментар

Правильна відповідь: Транквілізатори

Питання 43

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 40-ка років доставлено до приймального відділення. Відзначається запах алкоголю з рота, відкривання очей та мовні відповіді відсутні, нецілеспрямований рух на біль. Об'єктивно: дихання часте (>40/хв), поверхнєве, АТ- 90/40 мм рт.ст., РС- 112/хв. Що треба зробити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Зондове промивання шлунка
- ☐ б. Позаниркові методи детоксикації (гемодіаліз, гемосорбція)
- ☐ в. Форсований діурез
- ☐ г. Інтубація трахеї
- ☐ д. Внутрішньовенно бемегрід


Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї

Питання 44

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 4-х років блювання до 10 разів на добу після того, як вона поїла копченої риби. Скаржиться на значну спрагу, порушення зору у вигляді подвоєння. При огляді: мідріаз, горизонтальний ністагм, птоз, поперхування. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Дифтерія
- ☐ б. Ботулізм
- ☐ в. Правець
- ☐ г. Сказ
- ☐ д. Ангін

Коментар

Правильна відповідь: Ботулізм

Питання 45

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До відділення реанімації поступила дитина 6-ти місяців зі скаргами на наявність судом. Об'єктивно: температура 36,60С, шкірні покриви блідо-рожевого кольору, теплі на дотик, вологі. Голова деформована, потилиця пласка, без волосся, лобні горби. Аускультативно: дихання пуерильне, симетричне; ритм правильний, тони гучні, ЧСС- 134/хв. У крові: гіпохромна анемія I ступеню, анізоцитоз, пойкилоцитоз, гіпопротейнемія, Na - 145, K - 4,2, Са - 1,1. У відділенні реанімації судом повторилися, з'явилися задишка інспіраторного характеру, сиплий голос, "гавкаючий"кашель, апное. Діагностовано рахіт, гіпокальціємія. Яка тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Фенобарбітал
- ☐ b. Сибазон
- ☐ с. Вітамін В
- ☐ d. ГОМК
- ☐ е. 10% кальцій хлорид


Коментар

Правильна відповідь: 10% кальцій хлорид

Питання 46

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В ході оперативного втручання з приводу резекції легені пацієнту 53-х років, під час гемотрансфузії 200 мл еритроцитарної маси виникла артеріальна гіпотензія до 50/10 мм рт.ст., по сечовому катетеру - бура сеча в зниженому об'ємі. Діагностовано ускладнення - гемотрансфузія крові іншої групи. Який провідний клінічний синдром може привести до смерті хворого протягом 7 діб від розвитку даного ускладнення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра ниркова недостатність
- ☐ b. Гемолітична анемія
- ☐ с. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ d. набряк легенів
- ☐ е. Пірогенна реакція

Коментар

Правильна відповідь: Гостра ниркова недостатність

Питання 47

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 32-х років перенесла крупозну пневмонію. На даний час скаржиться на озноб, задишку в спокої, загальну слабкість, головний біль, підвищення t до 5°C , пітливість. Об'єктивно: зміщення назовні лівої межі серця, тони серця значно ослаблені, систолічний шум на верхівці, АТ- 80/50 мм рт.ст. У крові: лейкоц.- $5 \times 10^9/\text{л}$, е- 8%, ШОЕ- 45 мм/год. У сечі: білок - 0,066 г/л, ер.-15-20 у п/з, гіалінові циліндри - 4-5 в п/з. Яке ускладнення виникло у хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інфекційно-токсичний шок
- ☐ б. Кардіоміопатія
- ☐ в. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ г. Інфаркт міокарда
- ☐ д. Перикардит

Коментар

Правильна відповідь: Інфекційно-токсичний шок

Питання 48

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 26-ти років, що лікується в гастроентерологічному відділенні з приводу пептичної виразки 12-палої кишки, годину тому з'явилися гострий біль у животі, блювання. Об'єктивно: живіт дошкоподібний, різко болючий у верхніх відділах. Яке дослідження доцільно провести хворому для встановлення причини ускладнення хвороби?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини
- ☐ б. Іригоскопія
- ☐ в. Аналіз крові клінічний
- ☐ г. Рентгеноскопія шлунково-кишкового тракту з барієм
- ☐ д. Оглядова рентгеноскопія живота в положенні стоячи

Коментар

Правильна відповідь: Оглядова рентгеноскопія живота в положенні стоячи

Питання 49

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 53-х років скаржаться на біль у ділянці прямої кишки при дефекації, яскраво-червону кров на калових масах, яка з'являється на початку акту дефекації, закрепи. Загальний стан задовільний. Тони серця ритмічні, ЧСС- 74/хв. Живіт м'який, не болючий. Яке інструментальне дослідження найбільш інформативне для встановлення остаточного діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Іригоскопія
- ☐ b. Ректоскопія
- ☐ c. Фіброколоноскопія
- ☐ d. Копрограма
- ☐ e. Пальцеве дослідження прямої кишки

Коментар

Правильна відповідь: Ректоскопія

Питання 50

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення військового госпіталю доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням в ділянку черевної порожнини. Шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт. ст., Рс- 100/хв. Симптоми подразнення очеревини сумнівні. Яке дослідження треба виконати для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. УЗД органів черевної порожнини
- ☐ b. Лапаротомія
- ☐ c. Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини
- ☐ d. Фіброгастродуоденоскопія
- ☐ e. Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини

Коментар

Правильна відповідь: УЗД органів черевної порожнини

Питання 51

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина народжена в терміні 42 тижні гестації. Навколоплідні води з домішками меконію. Через 2 хвилини після народження з'явилися ознаки вторинної асфіксії, тахіпное, парадоксальне дихання. При аускультатії в легенях - велика кількість вологих хрипів. Рентгенологічна картина характеризується зливними вогнищами ущільнення легеневої тканини. Який імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ателектаз легенів
- ☐ b. Хвороба гіалінових мембран
- ☐ c. Вроджена пневмонія
- ☐ d. Дистресс-синдром
- ☐ e. Аспіраційний синдром

Коментар

Правильна відповідь: Аспіраційний синдром

Питання 52

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після вживання м'яса свині, яка була зарізана у зв'язку з хворобою, яку лікували пеніциліном, у хворого на atopічну екзему розвинулись: сильний свербіж шкіри, набряк обличчя, уртикарні висипання по тулубу, верхнім кінцівкам. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гостра кропив'янка
- ☐ b. Гостра екзема
- ☐ c. Харчова токсикодермія
- ☐ d. Медикаментозна токсикодермія
- ☐ e. Атопічний дерматит

Коментар

Правильна відповідь: Медикаментозна токсикодермія

Питання 53

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого із вкрай важким ступенем кістковомозкової форми гострої променевої хвороби у початковому періоді з'явилися: лихоманка, сильний головний біль, адинамія, біль у м'язах і суглобах. Який синдром гострої променевої хвороби у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Синдром загальної токсемії
- ☐ b. Синдром ураження нервової системи
- ☐ c. Гастроінтестинальний синдром
- ☐ d. Геморагічний синдром
- ☐ e. Синдром інфекційних ускладнень

Коментар

Правильна відповідь: Синдром загальної токсемії

Питання 54

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної в 37 тижнів вагітності виникла кровотеча із статевих шляхів, наступила втрата свідомості. Що потрібно запідозрити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Геморагічний шок
- ☐ b. Центральне передлежання плаценти
- ☐ c. Рак шийки матки
- ☐ d. Септичний шок
- ☐ e. Відшарування плаценти

Коментар

Правильна відповідь: Геморагічний шок

Питання 55

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10-ти років після тотальної струмектомії з приводу фолікулярного раку щитовидної залози з'явилися симптоми гіпаратиреозу у вигляді судомного синдрому: клоніко-тонічні судоми кінцівок, тулуба. Яке лікування слід призначити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. L-тироксин 50 мкг/добу
- ☐ б. Розчин хлориду кальцію 10% внутрішньовенно струминно
- ☐ в. Препарати вітаміну D
- ☐ г. Розчин хлориду калію 4% внутрішньовенно струминно
- ☐ д. Гіпертонічний розчин хлориду натрію внутрішньовенно струминно

Коментар

Правильна відповідь: Розчин хлориду кальцію 10% внутрішньовенно струминно

Питання 56

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 43-х років, ветеринара, 2-й день хвороби. Виражений поширений набряк шкіри лівої половини обличчя, бульозні елементи з геморагічною рідиною, біль у зоні ураження відсутній, t0-39, 80С. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Натуральна віспа
- ☐ б. Флегмона обличчя
- ☐ в. Сибірка
- ☐ г. Еризипелоїд
- ☐ д. Бешиха

Коментар

Правильна відповідь: Сибірка

Питання 57

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 83-х років, що відчуває часте сечовиділення малими порціями, та отримує лікування з приводу аденоми передміхурової залози, раптово виникла гостра затримка сечі. Під час пальпації живота у надлобковій ділянці пальпується сечовий міхур. Які заходи невідкладної допомоги необхідно виконати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Провести катетеризацію сечового міхура гнучким катетером
- ☐ b. Накласти цистостому
- ☐ c. Призначити спазмолітини
- ☐ d. Збільшити дозу препарату, що приймається
- ☐ e. Провести катетеризацію сечового міхура ригідним катетером


Коментар

Правильна відповідь: Провести катетеризацію сечового міхура гнучким катетером

Питання 58

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому під час бойових дій куля потрапила в бронежилет в ділянці лівого підребер'я. Через деякий час хворий відчув слабкість, запаморочення, біль у животі. При огляді хворий блідий, АТ-80/40 мм рт.ст., Рс-110/хв. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пошкодження селезінки
- ☐ b. Травматичний шок
- ☐ c. Перелом ребер зліва
- ☐ d. Забій черевної стінки
- ☐ e. Психогенна реакція на травму


Коментар

Правильна відповідь: Пошкодження селезінки

Питання 59

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець отримав осколкове поранення м'яких тканин стегна. Після первинної обробки рани стан погіршився: на 4-ту добу з'явилися набряк у ділянці рани, біль, підвищилася температура тіла до 38,50С. Констатовано нагноєння рани. Хворому показано проведення вторинної хірургічної обробки. В чому полягає суть вторинної хірургічної обробки рани?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Хірургічне втручання з метою видалення нежиттєздатних тканин
- ☐ б. Друге за рахунком хірургічне втручання
- ☐ в. Відновна операція (шов судини, нерва, остеосинтез кісток при вогнепальному переломі)
- ☐ г. Шкірна пластика з метою закриття рани
- ☐ д. Накладення вторинних швів (раннього та пізнього)


Коментар

Правильна відповідь: Хірургічне втручання з метою видалення нежиттєздатних тканин

Питання 60

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженого хлопчика з вродженою вадою серця (тетрада Фалло) гостро розвинувся задушливо-ціанотичний напад. Який препарат слід ввести негайно разом з оксигенотерапією?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Сульфоксамфокаїн
- ☐ б. Строфантин
- ☐ в. Кордіамін
- ☐ г. Допамін
- ☐ д. Обзидан


Коментар

Правильна відповідь: Обзидан

Питання 61

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До медичної роти доставлено постраждалого з тяжким вогнепальним пораненням нижньої третини правого стегна. Кістка роздроблена. Магістральні судини пошкоджені. Кінцівка висить на клапті м'яких тканин. До якого виду медичної допомоги відноситься проведення відсікання кінцівки, яка висить на клапті м'яких тканин?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Кваліфікованої медичної допомоги
- ☐ b. Першої лікарської допомоги
- ☐ c. Першої медичної допомоги
- ☐ d. Спеціалізованої медичної допомоги
- ☐ e. Долікарської (фельдшерської) медичної допомоги


Коментар

Правильна відповідь: Першої лікарської допомоги

Питання 62

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 70-ти років поступив до кардіореанімації в тяжкому стані. Об'єктивно: шкіра бліда, пульс ниткоподібний 120/хв., АТ- 60/20 мм рт.ст. Діагностовано вогнищевий інфаркт міокарда. Який провідний синдром?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Больовий
- ☐ b. Гіповолемічний
- ☐ c. Зниження скорочувальної функції міокарда
- ☐ d. Ендогенної інтоксикації
- ☐ e. Системної запальної реакції


Коментар

Правильна відповідь: Зниження скорочувальної функції міокарда

Питання 63

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Роділля 28-ми років у пологах раптово поскаржилась на локальну болючість в дні матки. З'явилися біль за грудниною, занепокоєння, ціаноз, різка гіпотонія. Пологи завершилися операцією кесарського розтину з приводу дистресу плоду на фоні передчасного відшарування нормально розташованої плаценти. Є підозра на емболію навколоплідними водами. Об'єм операції розширено до гістеректомії з матковими трубами. Яке найбільш імовірне ускладнення слід очікувати у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Судоми
- ☐ b. Аритмогенний шок
- ☐ c. Коагулопатія
- ☐ d. Асфіксія
- ☐ e. Портальна гіпертензія


Коментар

Правильна відповідь: Коагулопатія

Питання 64

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Робітник попав під дію електричного струму декілька хвилин тому. Втратив свідомість. Мали місце судоми. Дія струму була припинена. Хворий лежить, дихання відсутнє, пульс не визначається, шкіра ціанотична, зіниці широкі, на світло не реагують. Яку першочергову допомогу слід надати? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Внутрішньовенно ввести атропіну сульфат
- ☐ b. Закритий масаж серця і штучна вентиляція легень
- ☐ c. Внутрішньовенне введення реополіглюкіну
- ☐ d. Введення протисудомних препаратів
- ☐ e. Внутрішньовенне введення дихальних аналептиків


Коментар

Правильна відповідь: Закритий масаж серця і штучна вентиляція легень

Питання 65

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого, який знаходиться в гіперглікемічній комі, через 4 години після початку інсулінотерапії раптово розвинулась тахікардія, м'язова гіпотонія; АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: подовження інтервалу QT, зниження S - T, розширення і сплюснення Т. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіповолемія
- ☐ b. Гіпоглікемія
- ☐ с. Гіперглікемія
- ☐ d. Гіперкаліємія
- ☐ е. Гіпокаліємія


Коментар

Правильна відповідь: Гіпокаліємія

Питання 66

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У приймальне відділення лікарні доставлено вагітну жінку (38 тижнів) з клінікою гострого ілеофemorального тромбозу. Який із вказаних симптомів найбільше відповідає даному захворюванню?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Напади нудоти та блювання
- ☐ b. Гектична лихоманка
- ☐ с. набряк стегна і гомілки
- ☐ d. набряк гомілки
- ☐ е. Біль у пахвинній ділянці

Коментар

Правильна відповідь: набряк стегна і гомілки

Питання 67

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 48-ми років надійшов до стаціонару із клінікою печінкової недостатності. При огляді виявлено незначні неврологічні зрушення. Втрата ваги незначна. Наявний асцит легко піддається лікуванню. У крові: білірубін в сироватці крові - 3,0 мг/%, рівень альбуміну - 3,2 мг/%, протромбіновий індекс - 75%. До якої групи печінково-клітинної недостатності можна віднести дані зрушення згідно з класифікацією печінкової дисфункції за Чайлд-П'ю?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 2
- ☐ c. 3
- ☐ d. 1a
- ☐ e. 1b


Коментар

Правильна відповідь: 2

Питання 68

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 47-ми років госпіталізована зі скаргами на слабкість, жовтяницю, свербіж шкіри. Захворіла 2,5 місяці тому, гостро, з явищами ознобу та підвищенням температури до 39,0°C; через 2 тижні виникла наростаюча жовтяниця. Об'єктивно: значна жовтяниця, печінка не пальпується, жовчний міхур збільшений, не болючий. Білірубін крові - 190 мкмоль/л, за рахунок прямого. Кал ахолічний. Яка ймовірна причина жовтяниці у хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Механічна жовтяниця
- ☐ b. Паренхіматозна жовтяниця
- ☐ c. Гемолітична жовтяниця
- ☐ d. Синдром Каролі
- ☐ e. Хвороба Жильбера

Коментар

Правильна відповідь: Механічна жовтяниця

Питання 69

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого протягом декількох годин спостерігаються часті судомні напади, впродовж яких він знаходиться в одному положенні, погляд спрямований в одну точку, свідомість весь час порушена. Яка тактика?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Госпіталізація до неврологічного відділення
- ☐ б. Госпіталізація до психіатричного відділення
- ☐ в. Призначення амбулаторного лікування
- ☐ г. Госпіталізація до реанімаційного відділення
- ☐ ґ. Призначення консультації епілептолога

Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація до реанімаційного відділення

Питання 70

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 74-х років хворіє на цукровий діабет другого типу, приймає манініл. Протягом двох тижнів приймає по 2 таблетки гіпотіазиду. Об'єктивно: свідомість сплутана, шкірні покриви сухі, теплі, тургор м'язів знижений, температура тіла - 38,0°C, Р8- 120/хв., АТ- 60/40 мм рт.ст., дихання поверхневе, язик сухий, запах ацетону відсутній. Глюкоза крові - 34 ммоль/л, ацетон в сечі слабо позитивний, Na+ сироватки - 162 ммоль/л, K+ - 3,0 ммоль/л. Який розчин показаний для застосування в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Розчин Рінгера
- ☐ б. Поляризуюча суміш
- ☐ в. Гіпотонічний розчин NaCl
- ☐ г. 5% розчин глюкози
- ☐ ґ. Фізіологічний розчин NaCl

Коментар

Правильна відповідь: Гіпотонічний розчин NaCl

Питання 71

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Медична рота 14 механізованої бригади прибула в район населеного пункту для розгортання, з метою прийняття з поля бою поранених і хворих. Після прибуття розгорнуто сортувально-евакуаційне та операційно-перев'язувальне відділення. Які відділення необхідно розгорнути в другу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Медичний пост, відділення швидкоповернутих санітарних втрат, аптека
- ☐ б. Відділення анестезіології та реанімації, відділення спеціальної обробки, аптека
- ☐ в. Сортувальний пост, відділення анестезіології та реанімації, відділення госпіталізації та лікування
- ☐ г. Госпітальне, відділення спеціальної обробки, підрозділи забезпечення
- ☐ д. Сортувально-евакуаційне відділення, дезінфекційне відділення, відділення анестезіології та реанімації, ізолятори, аптека

Коментар

Правильна відповідь: Госпітальне, відділення спеціальної обробки, підрозділи забезпечення

Питання 72

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 37-ми років після фізичного навантаження раптово виникає виражений біль у правому підребер'ї, нудота та блювання. Біль триває 5 хвилин та знов повторюється через 1 годину. Симптом Мерфі позитивний. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий панкреатит
- ☐ б. Гострий гепатит
- ☐ в. Жовчна колька
- ☐ г. Хронічний холецистит
- ☐ д. Гострий апендицит

Коментар

Правильна відповідь: Жовчна колька

Питання 73

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 60-ти років скаржиться на різку м'язову слабкість, утруднене дихання, біль в очах, зниження зору. Шкіра бліда, волога. Виражений ціаноз губ. Слиновиділення підвищене. З рота - специфічний запах ФОС. Дихання почашене, клопочуче. АТ- 80/40 мм рт.ст. Рс- 48/хв. У біохімічних аналізах крові пригнічення активності холінестераз справжньої ХЕ і псевдо-ХЕ. Яка тактика ведення хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Налорфін або налоксон
- ☐ b. Цитохром С, дибунол
- ☐ c. Метиленовий синій
- ☐ d. Атропін, дипіроксим
- ☐ e. Унітіол або тетацин кальцію

Коментар

Правильна відповідь: Атропін, дипіроксим

Питання 74

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 47-ми років доставлено в токсикологічне відділення в тяжкому стані. Об'єктивно: свідомість за типом оглушення, АТ- 75/40 мм рт.ст., ЧСС- 40/хв. Із анамнезу: 1 годину тому прийняв 3 таблетки клофеліну із суїцидальною метою. Діагноз: отруєння клофеліном. Яка тактика лікаря? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Промивання шлунка, спостереження
- ☐ b. Кордіамін в/в, інфузійна терапія
- ☐ c. Преднізолон в/в, інфузійна терапія, промивання шлунка
- ☐ d. Інфузійна терапія, промивання шлунка
- ☐ e. Інфузійна терапія, атропіну сульфат в/в, промивання шлунка

Коментар

Правильна відповідь: Інфузійна терапія, атропіну сульфат в/в, промивання шлунка

Питання 75

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 5-ти років скаржиться на лихоманку, пронос, блювання та запаморочення. У крові: Ht- 0,55, Na+- 118 ммоль/л, K+- 5,9 ммоль/л. Які розлади водно-електролітного балансу спостерігаються? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гіпотонічна дегідратація, гіперкаліємія
- ☐ б. Гіпотонічна дегідратація, гіпокаліємія
- ☐ в. Гіперкаліємія
- ☐ г. Ізотонічна дегідратація, гіперкаліємія
- ☐ д. Розладів водно-електролітного балансу немає

Коментар

Правильна відповідь: Гіпотонічна дегідратація, гіперкаліємія

Питання 76

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної 29-ти років у приймальному відділенні виникли біль у епігастральній ділянці, нудота, блювання, мерехтіння "мушок" перед очима. АТ- 170/100 мм рт.ст. на обох руках; визначаються генералізовані набряки. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Відшарування сітківки ока
- ☐ б. Еклампсія
- ☐ в. Загроза крововиливу в мозок
- ☐ г. Прееклампсія важкого ступеня
- ☐ д. Прееклампсія середнього ступеня

Коментар

Правильна відповідь: Прееклампсія важкого ступеня

Питання 77

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвору 69-ти років доставлено до приймального відділення з діагнозом гостре порушення мозкового кровообігу в лівій гемисфері, правостороння геміплегія. Хвора контактна, але дезорієнтована, спонтанно розплющує очі, виконує інструкції. Який рівень свідомості за шкалою ком Глазго? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Сопор (9-12 балів)
- ☐ б. Кома (4-8 балів)
- ☐ в. Оглушення (13-14 балів)
- ☐ г. Ясна свідомість (15 балів)
- ☐ д. Смерть мозку (3 бали)


Коментар

Правильна відповідь: Оглушення (13-14 балів)

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 42-х років гострий лівобічний пієлонефрит ускладнився бактеріальним шоком та гострою нирковою недостатністю. Дві доби тому настала поліурична стадія. Які зміни в організмі слід попередити в першу чергу? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпоальбумінемія
- ☐ б. Гіпокаліємія
- ☐ в. Гіперазотемія
- ☐ г. Анемія
- ☐ д. набряковий синдром

Коментар

Правильна відповідь: Гіпокаліємія

Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На 5-й день лікування гепарином з приводу шкірно-суглобової форми хвороби Шенляйн-Геноха у хлопчика посилилась геморагічна висипка, з'явилися м'язові гематоми, гемоптоє, мелена. Активований парціальний тромбопластиновий час - 4 хвилини. Який препарат доцільно призначити хлопчику?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Строфантин
- ☐ б. Активоване вугілля
- ☐ в. Протаміну сульфат
- ☐ г. Натрію гідрокарбонат
- ☐ д. Глюконат кальцію


Коментар

Правильна відповідь: Протаміну сульфат

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинку 5-ти років на вулиці вкусила кішка. При огляді рани виявлено незначне пошкодження шкірних покривів. Першочергові дії лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Вакцинація проти сказу і правця
- ☐ б. Обробити рану розчином йоду
- ☐ в. Промити рану стерильним ізотонічним розчином
- ☐ г. Промити рану антисептиком, накласти пов'язку
- ☐ д. Госпіталізація


Коментар

Правильна відповідь: Промити рану антисептиком, накласти пов'язку

Питання 81

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На 4-ту добу після переливання несумісної по групі крові, у хворого різко зменшився діурез, розвинулася анурія, різко погіршився загальний стан, підвищився артеріальний тиск. При лабораторних дослідженнях: креатинін плазми - 680 мкмоль/л, сечовина плазми - 24 мкмоль/л. Про яке захворювання і про яку його стадію слід думати в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гемотрансфузійний шок, постренальна гостра ниркова недостатність, анурія
- ☐ б. Гострий інтерстиціальний нефрит, обтураційна анурія
- ☐ в. Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія
- ☐ г. Анафілактичний шок, гостра ниркова недостатність, анурія
- ☐ д. Постгеморагічна гостра ниркова недостатність, анурія


Коментар

Правильна відповідь: Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія

Питання 82

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Учасник АТО віком 27-ми років під час обстрілу військ системою "Град" отримав закриту черепно-мозкову травму. Перебуваючи у військовому госпіталі раптово змінився в поведінці: став збудженим, повністю дезорієнтованим, висловлює маячні ідеї переслідування. Який медикаментозний засіб необхідно застосувати для усунення гострого травматичного психозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Діазепам
- ☐ б. Ноотропіл
- ☐ в. Ламотриджин
- ☐ г. Галоперидол
- ☐ д. Амітриптилін


Коментар

Правильна відповідь: Галоперидол

Питання 83

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На заводі розірвалась ємність з білим фосфором, в результаті чого 10 працівників одержали опіки. Яку допомогу необхідно надати постраждалим негайно?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Промивання опіків кислотою
- ☐ б. Промивання опіків розчином мідного купоросу
- ☐ в. Промивання опіків водою
- ☐ г. Промивання опіків спиртом
- ☐ д. Промивання опіків фізрозчином


Коментар

Правильна відповідь: Промивання опіків розчином мідного купоросу

Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 36-ти років скаржиться на інтенсивний біль у епігастральній ділянці, багаторазове блювання, яке не приносить полегшення, виражену загальну слабкість. Об'єктивно: загальний стан важкий, шкіра та видимі слизові - бліді, з поодинокими фіолетовими плямами. PS- 100/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Під час пальпації живота визначається ригідність черевної стінки та різка болючість у епігастральній ділянці на 6 см вище пупка та у лівому реберно-хребетному куті. Пульсація аорти у епігастральній ділянці не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий апендицит
- ☐ б. Гострий холецистит
- ☐ в. Перфоративна виразка
- ☐ г. Гострий панкреатит
- ☐ д. Розшаровуюча аневризма аорти


Коментар

Правильна відповідь: Гострий панкреатит

Питання 85

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 37-ми років, що вживав напередодні копчену рибу власного виробництва, поступово розвинулись м'язова слабкість, неможливість читати газетний текст, на другий день - порушення ковтання. Об'єктивно: стан тяжкий, ціаноз шкіри, страбізм, ЧД- 50/хв., Рс - 120/хв. Голос гугнявий, парез зіниць, метеоризм 2 ступеня. Випорожнення відсутні 2 доби. Який лікувальний захід показаний у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Введення діуретиків
- ☐ б. Призначення прозерину
- ☐ в. Трахеостомія
- ☐ г. Штучна вентиляція легень
- ☐ д. Штучне дихання "рот у рот"


Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 86

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 78-ми років викликав швидку допомогу з приводу блювання, здуття живота, наявності болючого грижового випинання у паху, яке не вправляється у черевну порожнину зі вчорашнього дня. Під час огляду лікарем швидкої допомоги грижове випинання вправилося, біль пройшов. Які дії лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Рекомендувати хірургічне лікування у плановому порядку
- ☐ б. Протягом години спостерігати за динамікою клінічної картини
- ☐ в. Призначити дієту і холод на живіт
- ☐ г. Призначити амбулаторне обстеження
- ☐ д. Доставити хворого до стаціонару


Коментар

Правильна відповідь: Доставити хворого до стаціонару

Питання 87

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В приймальне відділення батько доставив дитину 3,5 років у термінальному стані: дитина без свідомості, шкіра блідо-ціанотична, м'язова гіпотонія. Не дихає. Тони серця ледве прослуховуються, тахікардія. Що із перерахованого є невідкладною і першочерговою дією? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. В/в введення 4% розчину NaHCO_3
- ☐ б. Дихальні аналептики
- ☐ в. Відновлення прохідності дихальних шляхів
- ☐ г. Штучне дихання "з рота в рот" та "з рота в рот і ніс"
- ☐ д. Введення адреналіну 0,1% - 0,01 мг/кг


Коментар

Правильна відповідь: Відновлення прохідності дихальних шляхів

Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 10-ти років після вжалення бджоли виникли біль у животі, задишка, запаморочення, на шкірі з'явилися уртикарні елементи висипки. АТ- 60/10 мм рт.ст. ЧСС- 140/хв. Які першочергові лікувальні заходи?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ввести кордіамін підшкірно
- ☐ б. Дати вдихнути випари нашатирного спирту
- ☐ в. Ввести адреналін 1:10000 підшкірно
- ☐ г. Призначити антигістамінні засоби всередину
- ☐ д. Ввести в/м глюконат кальцію

Коментар

Правильна відповідь: Ввести адреналін 1:10000 підшкірно

Питання 89

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 56-ти років при падінні у відкритий каналізаційний люк дістав закритий вивих правого плеча. Який вид транспортної іммобілізації слід використати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Іммобілізація підручними засобами
- ☐ б. М'яка пов'язка Дезо і Вельпо
- ☐ в. Косинкова іммобілізація
- ☐ г. Фіксація верхньої кінцівки до тулуба
- ☐ е. Драбинчаста шина від променево-зап'ясткового суглоба до кута здорової лопатки


Коментар

Правильна відповідь: Драбинчаста шина від променево-зап'ясткового суглоба до кута здорової лопатки

Питання 90

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з інфекційним ендокардитом з ураженням аортального клапану виник інтенсивний біль у попереку, зліва та справа, який був розцінений як інфаркт нирок. Протягом доби у хворого посилювались загальна слабкість, апатія, тахікардія, артеріальний тиск знизився до 60/0 мм рт.ст., з'явилися блювання, пронос, холодний липкий піт, олігоурія. Чим ускладнився перебіг захворювання?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра ниркова недостатність внаслідок інфаркту нирки
- ☐ б. Гостра надниркова недостатність внаслідок крововиливу у наднирники
- ☐ в. Гостра серцева недостатність
- ☐ г. Інфаркт селезінки
- ☐ е. Інфаркт мозку

Коментар

Правильна відповідь: Гостра надниркова недостатність внаслідок крововиливу у наднирники

Питання 91

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 34 тижні вагітності в жінки з хронічною артеріальною гіпертензією середнього ступеня тяжкості, плацентарною недостатністю, затримкою розвитку плоду III ступеня, з'явився раптовий біль у матці. Об'єктивно: Рс- 120/хв, АТ- 70/40 мм рт.ст. Матка в гіпертонусі. Серцебиття плоду - відсутнє. Із піхви помірні кров'яністі виділення. Яка причина антенатальної загибелі плоду?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Плацентарна недостатність
- ☐ б. Передчасне відшарування плаценти, легка форма
- ☐ в. Затримка внутрішньоутробного розвитку
- ☐ г. Передчасне відшарування плаценти, тяжка форма
- ☐ д. Гіпертонічна хвороба


Коментар

Правильна відповідь: Передчасне відшарування плаценти, тяжка форма

Питання 92

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Грудна клітка потерпілої 38-ми років була притиснута бортом вантажівки до стіни. Скарги на загальну слабкість, задишку, біль і відчуття тяжкості в грудній клітці на стороні ураження. Об'єктивно: блідість шкіри, тахікардія, пульс слабого наповнення, артеріальний тиск знижений, симптоми недостатності дихання. Вкажіть обсяг первинної лікарської допомоги:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Катетеризація центральної вени, інфузій на терапія
- ☐ б. Плевральна пункція у VII міжребір'ї
- ☐ в. Негайна госпіталізація до травматологічного відділення
- ☐ г. Серцеві глікозиди, дихальні аналептики
- ☐ д. Напівсидяче положення, анальгетики, інгаляція кисню

Коментар

Правильна відповідь: Напівсидяче положення, анальгетики, інгаляція кисню

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 8-ми років захворіла раптово: підвищилась температура тіла до 39 — 40°C, турбує головний біль дифузного характеру, який посилюється при повороті голови, значних світлових і звукових подразниках, блювання без нудоти. Дитина сонлива, лежить на боці з відкинутою головою і приведеними до живота колінами. Виражена ригідність потиличних м'язів. Яке захворювання найімовірніше у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Пухлина мозку
- ☐ b. Менінгіт
- ☐ c. Крововилив в головний мозок
- ☐ d. Струс головного мозку
- ☐ e. Енцефаліт


Коментар

Правильна відповідь: Менінгіт

Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 11-ти років грала у футбол та під час падіння отримала травму. Встановлено попередній діагноз: закритий вивих правого передпліччя. Який обсяг допомоги повинен надати лікар на місці пригоди?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Знеболювання, транспортна іммобілізація косинкою
- ☐ b. Косинкова пов'язка на праву верхню кінцівку
- ☐ c. Знеболювання, спроба вправлення вивиху
- ☐ d. Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною
- ☐ e. Восьмиподібна пов'язка на правий ліктьовий суглоб

Коментар

Правильна відповідь: Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія олігоанурії. У хворого відзначається м'язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ (розширення інтервалів PQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці T). Які біохімічні зміни викликають ці порушення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ацидоз
- ☐ b. Гіпокаліємія
- ☐ c. Гіперкаліємія
- ☐ d. Гіпокальціємія
- ☐ e. Гіперкальціємія


Коментар

Правильна відповідь: Гіперкаліємія

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Реанімаційна бригада швидкої медичної допомоги прибула на виклик до опіятного наркомана 23-х років. Об'єктивно: свідомість відсутня, ціаноз, брадипное, брадикардія. Що терміново показано хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Призначення налорфіну
- ☐ b. Оксигенотерапія через маску
- ☐ c. Інфузійна терапія
- ☐ d. Штучна вентиляція легень
- ☐ e. Форсований діурез


Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 97

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінку 77-ми років доставлено в лікарню без свідомості. Неврологічний статус: лівобічна параплегія. Протромбін за Квіком становить 108%. На КТ-сканах відзначається: у правій півкулі головного мозку ділянка з нерівномірним зниженням оптичної щільності. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ішемічний інсульт
- ☐ b. Геморагічний інсульт
- ☐ c. Менінгоенцефаліт
- ☐ d. Метастази у головний мозок
- ☐ e. Субарахноїдальний крововилив


Коментар

Правильна відповідь: Ішемічний інсульт

Питання 98

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Будівельник 27-ми років під час виконання робіт був притиснутий до стіни будинку бортом автомобіля. Скаржиться на біль у ділянці таза, неможливість підняти прямі нижні кінцівки, слабкість, запаморочення. Який додатковий метод діагностики є оптимальним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. КТ таза
- ☐ b. ЯМРТ таза
- ☐ c. Рентгеноскопія таза
- ☐ d. Оглядова рентгенографія таза
- ☐ e. ЯМРТ, КТ, оглядова рентгенографія таза


Коментар

Правильна відповідь: Оглядова рентгенографія таза

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У постраждалого в ДТП лікар швидкої допомоги виявив деформацію та патологічну рухливість у середній третині правого стегна та його вкорочення. Після проведення знеболювання проведена транспортна іммобілізація. Чим оптимально проводити транспортну іммобілізацію при подібних пошкодженнях?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Укладання на щит
- ☐ b. Гіпсова лонгета
- ☐ c. Підручні засоби
- ☐ d. Дві шини Крамера
- ☐ e. Шина Дітерікса


Коментар

Правильна відповідь: Шина Дітерікса

Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий був збитий автомашиною. У верхній третині лівого стегна рана 4x10 см, з якої виступає уламок кістки, значна варусна деформація стегна. Виберіть оптимальний метод іммобілізації:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Шина Томаса
- ☐ b. Шини Дітерікса та Крамера
- ☐ c. Дві драбинчасті шини
- ☐ d. Три драбинчасті шини
- ☐ e. Шина Дітерікса

Коментар

Правильна відповідь: Три драбинчасті шини

Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 41-го року поступив зі скаргами на утруднене дихання, кашель, підвищення температури тіла до 37,80С, болі під час ковтання, слабкість. Вважає себе хворим впродовж 3-х днів. Об'єктивно: інфільтрація та гіперемія слизової надгортанника, гортані, вхід у гортань частково звужений, дихання стенотичне. Яке захворювання викликало описану клінічну симптоматику? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Стороннє тіло гортані
- ☐ b. Гематома гортані
- ☐ c. Склерома гортані
- ☐ d. набряк гортані
- ☐ e. Пухлина гортані


Коментар

Правильна відповідь: набряк гортані

Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 28-ми років, вагітність 30 тижнів, знаходилася вдома. Мала набряки гомілок І ступеня. Раптово поскаржилася на головний біль та втратила свідомість. На момент огляду констатовано опістотонус, голова закинута, зіниці розширені, дихання відсутнє, язика прикушено, пульс визначити важко. Яка стадія еклампсії у хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Період тонічних судом
- ☐ b. Прееклампсія
- ☐ c. Період розрешення нападу
- ☐ d. Передсудомний період
- ☐ e. Позасудомний період

Коментар

Правильна відповідь: Період тонічних судом

Питання 103

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У постраждалого внаслідок дії іонізуючого випромінювання виникли симптоми первинної реакції гострої променевої хвороби. Госпіталізований до стаціонару через 2 доби. Які з показників периферичної крові мають найбільше діагностичне значення у цей період? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. ШЗЕ
- ☐ б. Нейтрофіли
- ☐ в. Еритроцити
- ☐ г. Лімфоцити
- ☐ д. Тромбоцити


Коментар

Правильна відповідь: Лімфоцити

Питання 104

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 56-ти років хворіє на виразкову хворобу 12-палої кишки більше 12-ти років. Приблизно 2 місяці тому з'явилося періодичне блювання після прийому їжі, які за останній тиждень почастишали і турбують майже кожного дня. Встановлений попередній діагноз: стеноз вихідного відділу шлунку. Яким методом дослідження можна встановити ступінь компенсації? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. УЗД
- ☐ б. Фіброгастроскопічний
- ☐ в. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини
- ☐ г. Рентгенологічний
- ☐ д. Діагностична лапароскопія

Коментар

Правильна відповідь: Рентгенологічний

Питання 105

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 43-х років оглянута на місці пожежі у лісі бригадою швидкої медичної допомоги. Встановлено: відсутність свідомості, опіки I ступеню 15% поверхні тіла. АТ- 70/40 мм рт.ст., Рs- 128/хв., дихання часте, поверхнєве. Аускультативно: жорстке дихання, послаблене в нижньобоккових відділах, хрипів немає. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Опіковий шок
- ☐ б. Отруєння чадним газом
- ☐ в. Отруєння фосфорорганічними речовинами
- ☐ г. Отруєння продуктами горіння пластмаси
- ☐ д. Гіповолемічний шок


Коментар

Правильна відповідь: Отруєння чадним газом

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 36-ти років раптово з'явився біль у епігастральній ділянці 3 години тому. Пульс 60/хв. Живіт напружений, різко болючий у всіх відділах, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий апендицит
- ☐ б. Гострий холецистит
- ☐ в. Гострий панкреатит
- ☐ г. Гостра кишкова непрохідність
- ☐ д. Перфоративна гастродуоденальна виразка

Коментар

Правильна відповідь: Перфоративна гастродуоденальна виразка

Питання 107

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 44-х років, що лікується з приводу гострого абсцесу середньої частки правої легені виник біль у правій половині грудної клітки, задишка, стан різко погіршився. Об'єктивно: ЧД- 28/хв., ціаноз, асиметрія грудної клітки. Над правою легенею визначається притуплення перкуторного звуку в нижніх відділах та тимпаніт у верхніх відділах. Аускультативно: різко ослаблене везикулярне дихання. Яке найбільш імовірне ускладнення виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Правобічний ексудативний плеврит
- ☐ б. Правобічний тотальний піопневмоторакс
- ☐ в. Правобічний гемопневмоторакс
- ☐ г. Правобічна емпієма плеври
- ☐ д. Правобічний обмежений піопневмоторакс


Коментар

Правильна відповідь: Правобічний тотальний піопневмоторакс

Питання 108

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

З вогнища радіаційної катастрофи до медичного пункту полку доставлено 15 потерпілих. Через 20-25 хвилин після вибуху потерпілі стали відчувати різку слабкість, запаморочення, нудоту, з'явилося невпинне блювання. Стан хворих тяжкий. Кволі, апатичні, на запитання відповідають з великою затримкою. ЧСС- 120/хв. з частими екстрасистолами, АТ- 70/30 мм рт.ст., ЧД- 28/хв. За даними індивідуального дозиметра доза отриманого випромінювання склала 8 Гр. Якій стадії гострої променевої хвороби відповідає наведена симптоматика?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. III
- ☐ б. IV
- ☐ в. II
- ☐ г. V
- ☐ д. I

Коментар

Правильна відповідь: IV

Питання 109

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвору 30-ти років впродовж 10-12 років турбує періодично виникаючий (1-2 рази на місяць) однобічний, різкий, пульсуючий головний біль, що супроводжується фотопсіями, "пеленою" перед очима, нудотою та блюванням, загальною гіперестезією. Провокується напад болю перевтомленням, менструацією, емоційно-стресовими ситуаціями, уживанням сиру, шоколаду або червоного вина. З анамнезу відомо, що у матері хворої спостерігалися подібні приступи головного болю. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Класична офтальмічна мігрень
- ☐ б. Головний біль напруження
- ☐ в. Бактеріальний менінгіт
- ☐ г. Субарахноїдальний крововилив
- ☐ д. Транзиторна ішемічна атака

Коментар

Правильна відповідь: Класична офтальмічна мігрень

Питання 110

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий поступив у клініку у вкрай важкому стані: кінцівки холодні, акроціаноз, шкіра і слизові сухі, темні кола навколо очей, повторне блювання, живіт безболісний, АТ- 40/0 мм рт.ст., багаторазові водянисті випорожнення без домішок. Діагноз: холера. Вкажіть ступінь зневоднення:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. IV
- ☐ б. III
- ☐ в. V
- ☐ г. I
- ☐ д. II

Коментар

Правильна відповідь: IV

Питання 111

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 62-х років звернулась до лікаря зі скаргами на головний біль, біль у лівому оці, нудоту, блювання та біль у животі. Об'єктивно: гіперемія ока, набряк рогівки, розширена овальна зіниця, мілка передня камера. Очне яблуко тверде під час пальпації. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Харчове отруєння
- ☐ b. Гострий напад глаукоми
- ☐ c. Гострий живіт
- ☐ d. Субарахноїдальний крововилив
- ☐ e. Менінгіт

Коментар

Правильна відповідь: Гострий напад глаукоми

Питання 112

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У перші години після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу тиреотоксикозу у хворої з'явилося виражене психічне і рухове збудження. Різка гіперемія обличчя, шиї, верхніх і нижніх кінцівок. Температура тіла 41,0С, підвищена пітливість. Стрімко зростає тахікардія до 140- 200/хв., миготлива аритмія. Яке ускладнення розвивається у хворої?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гіпаратиреоз
- ☐ b. Асфіксія
- ☐ c. Анафілактичний шок
- ☐ d. Інфаркт міокарда
- ☐ e. Тиреотоксичний криз


Коментар

Правильна відповідь: Тиреотоксичний криз

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінці 22-х років, що оперована з приводу позаматкової вагітності, із замісною метою в післяопераційному періоді переливалася еритроцитарна маса. Під час проведення гемотрансфузії в неї виникла різка слабкість, запаморочення, лихоманка, сильний біль за грудниною та в поперековій ділянці, одноразове блювання. Тахікардія до 110/хв. Артеріальний тиск знизився до 80/60 мм рт.ст. Яке імовірне ускладнення має місце?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Цитратний шок
- ☐ б. Гостра серцево-судинна недостатність
- ☐ в. Анафілактичний шок
- ☐ г. Гемотрансфузійний шок
- ☐ д. Гостра ниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Гемотрансфузійний шок

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчина 26-ти років, з метою суїциду, прийняла 50 таблеток снодійного. Стан вкрай важкий: непритомна, зіниці широкі без реакції на світло. Дихання хрипле, 10/хв., за участю допоміжних м'язів, ціаноз. В легенях численні вологі хрипи. Р8- 124/хв., поверхневий, АТ- 90/40 мм рт.ст. В чому буде полягати невідкладна допомога?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Стимуляція діурезу і компенсація плазмо-замінниками
- ☐ б. Гіпербарична оксигенація
- ☐ в. Допоміжне дихання респіратором "Амбу"
- ☐ г. Туалет трахеобронхіального дерева
- ☐ д. Інтубація трахеї

Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї

Питання 115

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 40-ка років скаржиться на багаторазове блювання, що з'явилося через 30 хвилин після опромінення на АЕС, біль у животі, озноб, високу температуру 38 - 39,0С, зниження артеріального тиску. Пізніше, на 2-й день спостерігається пронос. Доза загального опромінення 20 Гр. Яка форма гострої променевої хвороби розвинулась?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Токсемічна форма
- ☐ b. Кишково-мозкова форма
- ☐ c. Церебральна форма
- ☐ d. Це прояви не променевої хвороби
- ☐ e. Кишкова форма

Коментар

Правильна відповідь: Кишкова форма

Питання 116

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 24-х років захворювання почалося гостро з появи нудоти, багаторазового блювання, ознобу, болю у верхніх відділах живота. Практично одночасно з'явилися рідкі водянисті випорожнення без патологічних домішок 2 рази. Об'єктивно: стан середньої важкості, температура 37,60С, Рс- 86/хв., АТ-100/60 мм рт.ст., шкіра бліда, тургор збережений, язик незначно обкладений білим нальотом, живіт м'який, чутливий в епігастрії. Яку терапію слід провести у першу чергу? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Промивання шлунка
- ☐ b. Призначення сольового послаблюючого
- ☐ c. Регідрон
- ☐ d. 5% розчин глюкози
- ☐ e. Лоперамід

Коментар

Правильна відповідь: Промивання шлунка

Питання 117

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна з центральним передлежанням плаценти розроджена в 37 тижнів гестації шляхом корпорального кесарева розтину. Операція була ускладнена гіпотонією матки, яка ліквідувалася після введення утеротоніків. Загальний об'єм крововтрати становив 900 мл. Через декілька хвилин, вже під час ушивання передньої черевної стінки, матка знову розслаблюється, тонус не відновлюється. Які подальші дії операційної бригади?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення препарату новоссеєвен
- ☐ b. Ретельний облік об'єму крововтрати
- ☐ c. Масаж матки на кулаці
- ☐ d. Хірургічна зупинка кровотечі
- ☐ e. Посилення інфузійної терапії

Коментар

Правильна відповідь: Хірургічна зупинка кровотечі

Питання 118

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На фоні гіпертермії та сильного головного болю в дитини 5-ти років виникли зорові галюцинації жахливого змісту, марення, дезорієнтація. Шкіра гіперемована, з дрібною висипкою, рожевого кольору. Шкіра носогубного трикутника бліда, ознаки напруження м'язів потилиці, симптоми Керніга, Брудзинського, пожвавлення рефлексів без різниці між сторонами. Який діагноз можна припустити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Коровий менінгіт із деліріозним синдромом
- ☐ b. Менінгококовий менінгіт з деліріозним синдромом
- ☐ c. Деліріозний синдром при черепно- мозковій травмі
- ☐ d. Деліріозний синдром при алергічному захворюванні
- ☐ e. Деліріозний синдром при отруєнні їжею

Коментар

Правильна відповідь: Коровий менінгіт із деліріозним синдромом

Питання 119

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 34-х років скаржиться на біль та скутість у грудному та поперековому відділах хребта після довготривалого сидіння та в нічний час. Об'єктивно: невелика сутулість, ходіння скутне, позитивні симптоми Томаєра і Шобера, ознаки правобічного іридоцикліту. Рентгенографія кісток тазу: крижово-здухвинні з'єднання нерівні, нечіткі, ділянки остеосклерозу, їх щілини з обох боків нерівномірно звужені. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Псоріатичний артрит, сакроілеїт
- ☐ b. Хвороба Рейтера, сакроілеїт
- ☐ c. Туберкульозне ураження хребта
- ☐ d. Анкілозуючий спондилоартрит
- ☐ e. Остеоартроз із ураженням хребта

Коментар

Правильна відповідь: Анкілозуючий спондилоартрит

Питання 120

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В медичну роту механізованої бригади поступили з поля бою 10 легкопоранених, 15 поранених середньої важкості і 20 тяжкопоранених. Якими принципами та вимогами керується медичний персонал, який виконує сортування поранених в приймально-сортувальному відділенні медичної роти?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Сортування поранених за принципом "Пироговських рядів"
- ☐ b. За потребою місця надання медичної допомоги пораненим
- ☐ c. За потребою якнайшвидшої евакуації поранених до наступного етапу медичної евакуації
- ☐ d. Єдина класифікація хвороб і травм та єдині вимоги до методики сортування
- ☐ e. За потребою розподілу та по важкості стану поранених

Коментар

Правильна відповідь: Єдина класифікація хвороб і травм та єдині вимоги до методики сортування

Питання 121

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 42-х років доставлений у стаціонар. Раптово виникло блювання малозміненою кров'ю. В анамнезі 8 років тому хворів на вірусний гепатит В. При огляді на животі виявляється значна венозна сітка у вигляді "голови медузи", пальпується збільшена селезінка і щільний край печінки на рівні реберної дуги. PS- 115/хв. АТ- 100/50 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Синдром Мелорі-Вейса
- ☐ б. Гострокровоточива дуоденальна виразка
- ☐ в. Кровотеча з варикозно змінених вен стравоходу
- ☐ г. Легенева кровотеча
- ☐ д. Кровотеча з пухлини шлунку

Коментар

Правильна відповідь: Кровотеча з варикозно змінених вен стравоходу

Питання 122

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Травмований мотоцикліст лежить на проїжджій частині дороги. Ліве стегно його деформоване в нижній третині, через зовнішню рану фонтанує кров. Де і який кровоспинний джгут необхідно застосувати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Венозний джгут на верхню третину гомілки
- ☐ б. Венозний джгут безпосередньо над раною
- ☐ в. Артеріальний джгут в середній третині стегна
- ☐ г. Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна
- ☐ д. Артеріальний джгут в верхній третині стегна

Коментар

Правильна відповідь: Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна

Питання 123

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого періодично виникають напади клонічних судом у лівій руці, які іноді розповсюджуються на ліву половину обличчя. Напад триває 5 хвилин, після чого відмічається слабкість у лівій руці, яка поступово зникає впродовж 2-3 годин. Який варіант судомного синдрому наведено? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Напад Кожевніковської епілепсії
- ☐ b. Напад скроневої епілепсії
- ☐ c. Генералізований епілептичний напад
- ☐ d. Напад Джексонівської епілепсії
- ☐ e. Малий епілептичний напад

Коментар

Правильна відповідь: Напад Джексонівської епілепсії

Питання 124

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після використання інсектициду у хворої 45-ти років з'явився головний біль, загальна слабкість, погіршення зору, напади задухи, болі в ділянці серця. Хвора у вимушеному положенні, плечовий пояс фіксований, шкіра та слизові ціанотичні, фібрилярні посмикування м'язів обличчя, міоз. В легенях жорстке дихання, множинні сухі свистячі хрипи, брадикардія, зниження АТ до 90/60 мм рт.ст. Яка початкова доза введення 0,1% р-ну атропіну? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 4-8 мл
- ☐ b. 8-10 мл
- ☐ c. 2-4 мл
- ☐ d. 1-2 мл
- ☐ e. 6-8 мл

Коментар

Правильна відповідь: 2-4 мл

Питання 125

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ встановлена асистолія. Першочерговим терапевтичним заходом має бути:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення лідокаїну
- ☐ b. Введення адреналіну
- ☐ c. Введення атропіну
- ☐ d. Електрична дефібриляція
- ☐ e. Введення хлориду кальцію

Коментар

Правильна відповідь: Введення адреналіну

Питання 126

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвору 23-х років доставлено з вулиці в реанімаційне відділення з нападами Морган'ї-Адамса-Стокса. Об'єктивно: ЧСС- 36/хв., ЧД - 18/хв., АТ- 80/40 мм рт.ст.З анамнезу стало відомо, що приймає пропранолол в добовій дозі 160 мг. Яка тактика ведення хворої?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Дексаметазон в/в
- ☐ b. Плазмаферез
- ☐ c. Інфузійна терапія
- ☐ d. Негайна відміна пропранололу, атропін п/к
- ☐ e. Адреналін в/в

Коментар

Правильна відповідь: Негайна відміна пропранололу, атропін п/к

Питання 127

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 28-ми років субфебрильна температура, біль у животі, рідкі випорожнення з домішками слизу до 3-4 разів на добу. Хворіє протягом 3-х діб. Язик вологий, обкладений білим нальотом. Живіт м'який, болючий в лівій здухвинній ділянці, сигмоподібна кишка спазмована, болюча. Який метод дослідження буде найбільш інформативним для постановки діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Копроцитограма
- ☐ b. Загальний аналіз сечі
- ☐ c. РНГА
- ☐ d. Копрокультура
- ☐ e. Загальний аналіз крові

Коментар

Правильна відповідь: Копрокультура

Питання 128

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнтки психомоторне збудження, виразні афективні і вегетативні розлади. Відповіді на питання звучать у вигляді нерозбірливих звуків. Відмічаються суїцидальні тенденції. В соматичному статусі серцебиття, сухість у роті, пітливість, тремтіння кінцівок, глибоке судомне дихання. Симптоми паніки зникли після призначення 5 мг діазепаму та проведення психотерапевтичної бесіди, під час якої пацієнтка уривчасто повідомила про насильницький інтимно-неприємний епізод. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гостра респіраторна вірусна інфекція
- ☐ b. Психогенне збудження внаслідок сексуального насильства
- ☐ c. Харчове отруєння
- ☐ d. Алкогольна інтоксикація
- ☐ e. Опійна інтоксикація

Коментар

Правильна відповідь: Психогенне збудження внаслідок сексуального насильства

Питання 129

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення доставлено чоловіка 30-ти років після втоплення у прісній воді, яке відбулося близько 40 хвилин тому і супроводжувалося клінічною смертю та успішною реанімацією. Чоловік у свідомості, при аускультатії у легенях вислуховуються хрипи над всіма легеновими полями. Основний напрямок подальшої терапії:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення інгібіторів протеолізу
- ☐ b. Дегідратація
- ☐ c. Введення глюкокортикоїдів
- ☐ d. Киснетерапія
- ☐ e. Відновлення ОЦК

Коментар

Правильна відповідь: Дегідратація

Питання 130

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В консультацію звернулася жінка зі скаргами на біль у нижній частині живота, який виник раптово на 17-й день менструального циклу. Біль супроводжувався відчуттям тиску на пряму кишку. Об'єктивно: температура тіла 36,9°C, Ря- 89/хв., АТ- 110/65 мм рт.ст. Вагінально: матка щільна, безболісна, рухома, нормальних розмірів. Додатки з лівої сторони помірно збільшені, болісні. При пункції черевної порожнини через заднє склепіння отримано 15 мл серозно-геморагічної рідини. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Розрив кісти яєчника
- ☐ b. Гострий апендицит
- ☐ c. Апоплексія яєчника
- ☐ d. Перекрут ніжки кісти яєчника
- ☐ e. Позаматкова вагітність


Коментар

Правильна відповідь: Апоплексія яєчника

Питання 131

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчини 13-ти років при тривалому перебуванні в задушливому приміщенні з'явилися скарги на запаморочення, слабкість. Різно зблідла, тіло вкрилося холодним потом, шкіра набула "мармурового" малюнку, з'явилися ціаноз губ, сопорозна свідомість, часте поверхневе дихання, тахікардія. Тони серця послаблені, АТ- 50/10 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Мігрень
- ☐ б. Колапс
- ☐ в. Гостра серцева недостатність
- ☐ г. Задушливо-ціанотичний напад
- ☐ е. -


Коментар

Правильна відповідь: Колапс

Питання 132

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловікові близько 60-ти років. Стрибав у воду з причалу. Стан після втоплення. На березі йому розпочинають серцево-легеневу реанімацію. Які особливості техніки реанімації у даному випадку? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Непрямий масаж серця розпочинають раніше, ніж штучну вентиляцію легень
- ☐ б. Не виконують виведення нижньої щелепи
- ☐ в. Завжди виконують прийом Геймліха
- ☐ г. Не виконують закидання голови
- ☐ е. Штучна вентиляція легень проводиться подвійним дихальним об'ємом

Коментар

Правильна відповідь: Не виконують закидання голови

Питання 133

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 30-ти років знаходиться на лікуванні у відділенні реанімації з діагнозом: отруєння невідомою отрутою важкого ступеня. Кома. З анамнезу: знайдений вдома у непритомному стані. На АКТ головного мозку - без патології. Дані біохімічних досліджень крові: білірубін загальний - 120 мкмоль/л, глюкоза - 5 ммоль/л, ПТІ - 36%, загальний білок - 40 г/л, альбумін - 30%. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Отруєння атропіном
- ☐ b. Отруєння серцевими глікозидами
- ☐ c. Отруєння ФОІ
- ☐ d. Отруєння протитуберкульозними препаратами
- ☐ e. Отруєння дихлоретаном

Коментар

Правильна відповідь: Отруєння дихлоретаном

Питання 134

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка, 30 тижнів вагітності, доставлена в інфекційну лікарню з діагнозом гострий гепатит В та зі скаргами на різку слабкість, повторне блювання, виражену жовтяницю. При перкусії над печінкою тимпаніт. Яке дослідження треба терміново виконати разом з печінковими пробами?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. HBeAg, aHBe
- ☐ b. ПЛР HBV
- ☐ c. Протромбіновий індекс
- ☐ d. HBsAg, aHBc
- ☐ e. Посів блювотних мас

Коментар

Правильна відповідь: Протромбіновий індекс

Питання 135

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого після автомобільної аварії з'явилися скарги на різку задишку, кашель з кров'ю. Об'єктивно: шкіра бліда, ціанотична. Підшкірна емфізема в ділянці грудної клітки, живота, шиї справа. Аускультативно: справа дихання не вислуховується. Рс- 130/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., Нt- 0,25, Нb- 88 г/л. Які першочергові заходи лікаря на догоспітальному етапі? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Активна аспірація повітря справа
- ☐ b. Трансфузія еритромаси відповідно до групової і резусної належності
- ☐ с. Дофамін 2-5 мкг/кг/хв., інфузія колоїдних розчинів
- ☐ d. Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди
- ☐ e. Негайна штучна вентиляція легень

Коментар

Правильна відповідь: Активна аспірація повітря справа

Питання 136

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілого 33-х років через 3 години після землетрусу доставлено до клініки. Об'єктивно: відірвана верхня права кінцівка, кукса під джгутом. АТ- 60/30 мм рт.ст., ЧСС- 140/хв. Який ступінь шоку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. I
- ☐ b. IV
- ☐ с. III
- ☐ d. II
- ☐ e. V

Коментар

Правильна відповідь: III

Питання 137

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 8-ми років, яка під час поїздки на дачу з'їла багато полуниць, раптово з'явилась рожева папульозна та пухирчаста висипка на обличчі та тулубі. Висипка супроводжується значним свербезом. Назвіть найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Раптова екзантема
- ☐ b. Інфекційна еритема
- ☐ c. Реакція на укуси комарів
- ☐ d. Кропив'янка
- ☐ e. Кір

Коментар

Правильна відповідь: Кропив'янка

Питання 138

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 51-го року доставлений у відділення кардіореанімації (інтенсивної терапії), скаржиться на тривалий пекучий за груднинний біль, який виник 40 хвилин тому, задишку. Об'єктивно: в легенях - дихання з жорстким відтінком, тони серця різко ослаблені, АТ- 110/70 мм рт.ст. На ЕКГ виявлено підйом сегменту ST на 5 мм над ізолінією у відведеннях I, V1 - V4 та депресію сегмента ST у відведеннях III і aVF. Який препарат потрібно застосувати у даній ситуації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Нітрогліцерин
- ☐ b. Альтеплаза
- ☐ c. Добутамін
- ☐ d. Метопролол
- ☐ e. Аміодарон

Коментар

Правильна відповідь: Альтеплаза

Питання 139

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитячій дошкільній установі серед 120 дітей зареєстровано спалах дизентерії Зонне. На 2-3 добу із середнім ступенем важкості та важкими клінічними формами було госпіталізовано 35 дітей та 4 працівника дитячої установи із різних груп. Вкажіть найбільш імовірний тип спалаху:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Водний
- ☐ b. Харчовий
- ☐ c. Контактно-побутовий
- ☐ d. Фекально-оральний
- ☐ e. Контактний

Коментар

Правильна відповідь: Харчовий

Питання 140

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 59-ти років звернувся до лікаря із скаргами на пожовтіння шкірних покривів, свербіж. Пожовтів 4 дні тому після перенесеного болювого нападу. Об'єктивно: шкірні покриви і склери жовтушні. На тілі наявні численні розчули. У крові: білірубін - 218 ммоль/л., пряма фракція - 182 ммоль/л, лужна фосфатаза - 4,2 мкмоль/год мл, білок - 68 г/л., АсАТ - 0,716, АлАТ - 0,813. Який провідний клінічний синдром у хворого?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Холестазу
- ☐ b. Мезенхімально-запальний
- ☐ c. Портальної гіпертензії
- ☐ d. Печінково-клітинної недостатності
- ☐ e. Астено-невротичний

Коментар

Правильна відповідь: Холестазу

Питання 141

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У породіллі 34-х років на 6-ту добу після пологів раптово з'явився тупий біль розпираючого характеру в крижово-поперековій ділянці, нижніх відділах живота та правому стегні. Поступово став наростати набряк правої ноги у ділянці стегна та гомілки, ціаноз шкіри. Температура підвищилася до 38,50С. Яке ускладнення виникло в хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий післяпологовий параметрит
- ☐ b. Гострий ілеофemorальний флеботромбоз
- ☐ c. Біла флегмазія
- ☐ d. Гострий тромбофлебіт тазових вен
- ☐ e. Синя флегмазія

Коментар

Правильна відповідь: Гострий ілеофemorальний флеботромбоз

Питання 142

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При променевому ураженні шкіри у хворого 33-х років спостерігається вологий дерматит, пухирі малі, ненапружені, займають менш ніж 50% поля. Така клінічна картина виникає при дозі опромінення:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 10-15 Гр
- ☐ b. 7-13 Гр
- ☐ c. 20-30 Гр
- ☐ d. 5-8 Гр
- ☐ e. 15-20 Гр

Коментар

Правильна відповідь: 15-20 Гр

Питання 143

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина трьох років, на фоні тривалого підвищення температури, "бачила велику муху", ковдру сприймала як змію, закривалась від неї руками, був виражений афект страху, неспокій, не впізнавала рідних. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Маніакально-депресивний психоз
- ☐ b. Ранній дитячий аутизм Канера
- ☐ c. Шизофренія
- ☐ d. Інфекційний делірій
- ☐ e. Алкогольний делірій

Коментар

Правильна відповідь: Інфекційний делірій

Питання 144

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий 42-х років, виявлений на місці ДТП, скаржиться на біль у ділянці таза та правого стегна. Об'єктивно: загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. ЧДР- 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле, у верхній його третині патологічна рухливість, крепітація кісткових уламків. Великий крововилив, набряк та біль під час пальпації в правих пахвинній, здухвинній та сідничній ділянках. Рс- 112/хв, АТ- 80/45 мм рт. ст. Якому ступеню травматичного шоку відповідає стан потерпілого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. II
- ☐ b. I
- ☐ c. III
- ☐ d. IV

Коментар

Правильна відповідь: II

Питання 145

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 60-ти років скаржиться на сильний біль у правій гомілці розпираючого характеру, підвищення температури тіла до 38,0°C. Об'єктивно: шкіра гомілки набрякла, гіперемована, під час пальпації різко болісна у ділянці гомілкових м'язів. Захворювання прогресує протягом 5 діб. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий флеботромбоз глибоких вен правої гомілки
- ☐ b. Післятромбофлебітичний синдром
- ☐ c. Облітеруючий атеросклероз судин правої нижньої кінцівки
- ☐ d. Тромбофлебіт підшкірних вен правої гомілки
- ☐ e. Бешихове запалення правої гомілки

Коментар

Правильна відповідь: Гострий флеботромбоз глибоких вен правої гомілки

Питання 146

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 16-ти років поступила з ювенільною кровотечею. В анамнезі - переливання резус-позитивної крові I (0) групи, без ускладнень. Hb - 60 г/л. Розпочата трансфузія резус-позитивної крові I (0) групи. З'явився озноб, біль у ділянці нирок, задишка, втрата свідомості. АТ- 80/60 мм рт.ст. Сеча темно-бурого кольору. При повторній перевірці з'ясовано, що у хворої кров резус-негативна. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Порушення менструального циклу. Анемія III ст.
- ☐ b. Порушення менструального циклу. Анемія I ст. Гломерулонефрит
- ☐ c. Менорагія. Переливання несумісної крові. Гломерулонефрит
- ☐ d. Ювенільна кровотеча. Анемія III ст. Переливання несумісної крові
- ☐ e. Менорагія. Анемія II ст. Гломерулонефрит

Коментар

Правильна відповідь: Ювенільна кровотеча. Анемія III ст. Переливання несумісної крові

Питання 147

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 7-ми років внаслідок падіння з турніка виник біль у лівому підребер'ї. При ультразвуковому дослідженні є підозра на розрив селезінки у воріт та кровотечу. Який метод лікування показаний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Динамічне спостереження за хворим
- ☐ б. Лапаротомія, перев'язка артерії селезінки
- ☐ в. Лапароцентез, страхувальний дренаж
- ☐ г. Переливання еритроцитарної маси
- ☐ д. Спленектомія

Коментар

Правильна відповідь: Спленектомія

Питання 148

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 35-ти років надійшла на пологи з доношеною вагітністю. Протягом останніх 2 діб не відчуває рухи плоду. Вагітність VI, пологи III, та 2 штучних аборти без ускладнень. Об'єктивно: загальний стан задовільний, Ps- 94/хв., температура тіла - 36,60С, АТ-110/70 мм рт.ст. Положення плоду поздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Серцебиття плоду не прослуховується. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Вагітність 40 тижнів. Пізня неонатальна загибель плоду
- ☐ б. Вагітність 40 тижнів. Рання неонатальна загибель плоду
- ☐ в. Вагітність 40 тижнів. Постнатальна загибель плоду
- ☐ г. Вагітність 40 тижнів. Антенатальна загибель плоду
- ☐ д. Вагітність 40 тижнів. Інтранатальна загибель плоду

Коментар

Правильна відповідь: Вагітність 40 тижнів. Антенатальна загибель плоду

Питання 149

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Група рибалок-аматорів із 6 чоловік під час зимового лову риби потрапила до води внаслідок руйнування криги. Через 1020 хвилин були витягнуті на берег та власним транспортом доставлені до лікарні. Які методи відігрівання можна використати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Обкладання грілками
- ☐ b. Інфузія теплих розчинів
- ☐ c. Зігрівання в ванні
- ☐ d. Інфрачервоне опромінювання
- ☐ e. Алкоголь всередину

Коментар

Правильна відповідь: Інфузія теплих розчинів

Питання 150

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 35-ти років доставлений в клініку зі скаргами на різкий біль і похолодання правої нижньої кінцівки, а також відсутність активних рухів через різкий біль. Біль з'явився раптово під час ходьби 20 хвилин тому. 3 роки тому переніс інфаркт міокарда. Об'єктивно: шкіра гомілки і стегна бліда, холодна на дотик, поверхневі вени не наповнені. Відсутня пульсація на артеріях ступні та підколінній артерії, на стегновій - пульсація збережена. Тактильна і больова чутливість різко знижені, глибока збережена. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Емболія стегново-підколінного сегменту стегнової артерії
- ☐ b. Гострий тромбоз підколінної артерії
- ☐ c. Гострий тромбоз підколінної вени
- ☐ d. Гострий венозний ілеофemorальний тромбоз
- ☐ e. Гострий артеріальний тромбоз стегново-підколінного сегменту

Коментар

Правильна відповідь: Емболія стегново-підколінного сегменту стегнової артерії

Питання 151

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 25-ти років у терміні 32 тижні страждає на міастенію. З'явились розлади дихання, тахікардія, психомоторне збудження, яке змінюється в'ялістю, парезом кишечника та сфінктерів. Які першочергові засоби невідкладної допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Штучна вентиляція легень
- ☐ b. Профілактика гіпоксії плоду
- ☐ c. Призначення прозерину
- ☐ d. Застосування міорелаксантів
- ☐ e. Термінове розродження

Коментар

Правильна відповідь: Призначення прозерину

Питання 152

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого після важкої скелетної травми на другу добу раптово виникло зниження артеріального тиску, порушення свідомості та самостійного дихання, дрібноточкові крововиливи на шкірі. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Синдром тривалого стиснення
- ☐ b. Травматичний шок
- ☐ c. Анафілактичний шок
- ☐ d. Септичний шок
- ☐ e. Жирова емболія

Коментар

Правильна відповідь: Жирова емболія

Питання 153

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 2-х місяців відмічається жовтяничність шкіри, склер, лихоманка. Дитина загальмована, задишка, тахікардія. Печінка +2,5 см. Сеча темна, кал світлий. З анамнезу: дитина у ранньому неонаталь- ному віці перенесла гемолітичну хворобу новонароджених, операцію замінного переливання крові. Яка найбільш імовірна причина, що обумовила стан дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гемолітична хвороба
- ☐ b. Гепатит
- ☐ c. Тирозинемія
- ☐ d. Синдром «жовчної пробки»
- ☐ e. Атрезія жовчних ходів

Коментар

Правильна відповідь: Гепатит

Питання 154

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого на фоні епістатуса виникла зупинка дихання та кровообігу. Родичі допомоги не надавали, бригада швидкої допомоги прибула через 25 хвилин. При огляді хворого - дихання відсутнє, пульс на магістральних судинах відсутній, зіниці широкі, шкіра сірого кольору. Який діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Кома
- ☐ b. Біологічна смерть
- ☐ c. Сопор
- ☐ d. Клінічна смерть
- ☐ e. Декортикація

Коментар

Правильна відповідь: Біологічна смерть

Питання 155

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У постраждалого на тлі гострого отруєння фосгеном розвинулася клініка дихальної та серцево-судинної недостатності. Який показник є несприятливим симптомом щодо прогнозу перебігу отруєння?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Тахікардія до 120/хв.
- ☐ b. Згущення крові
- ☐ c. Підвищення температури тіла до 37, 50C
- ☐ d. Загальна слабкість
- ☐ e. Зниження артеріального тиску до 100 мм рт.ст.

Коментар

Правильна відповідь: Згущення крові

Питання 156

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В дитяче відділення була доставлена дівчинка 7-ми років з гострою гематурією. Тиждень тому перенесла ГРВГ На розгинальних поверхнях кінцівок - дрібнопапульозна геморагічна висипка. Помірно виражені болі в животі. Сеча темно-бурого кольору. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Геморагічний васкуліт
- ☐ b. Дисметаболічна нефропатія
- ☐ c. Гострий гломерулонефрит
- ☐ d. Синдром Альпорта
- ☐ e. Запалення сечового міхура

Коментар

Правильна відповідь: Геморагічний васкуліт

Питання 157

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 45-ти років отримала термічний опік передньої поверхні грудної клітки внаслідок дії рідини високої температури та парою. Об'єктивно: загальний стан не порушений. Визначається гіперемія та набряк шкіри, окремі пухирі різної величини, які наповнені прозорою рідиною жовтого кольору, визначається виражена гіперестезія. Надайте першу медичну допомогу:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Зчистити з опікової поверхні фіксовані сторонні тіла, шматки одягу
- ☐ б. Накласти на рану мазеву або ватну пов'язку
- ☐ в. Розкрити пухирі
- ☐ г. Накласти на уражену ділянку стерильну суху пов'язку
- ☐ ґ. Застосувати лід для місцевого охолодження


Коментар

Правильна відповідь: Накласти на уражену ділянку стерильну суху пов'язку

Питання 158

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 56-ти років, яка знаходиться на лікуванні в терапевтичному відділенні з приводу хронічного бронхіту, раптово з'явився різкий біль у лівій половині грудної клітки, задишка, біль у ділянці серця, серцебиття, сухий надсадний кашель. Об'єктивно: виражений акроціаноз, розширення міжреберних проміжків та різке обмеження дихальної екскурсії. Перкуторно - зліва тимпаніт. Аускультативно - різке ослаблення дихання. Яку невідкладну допомогу слід надати хворій?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення анальгетиків
- ☐ б. Введення еуфіліну
- ☐ в. Терміново транспортувати до відділення торакальної хірургії
- ☐ г. Забезпечити доступ кисню
- ☐ ґ. Пункція плевральної порожнини

Коментар

Правильна відповідь: Пункція плевральної порожнини

Питання 159

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 35-ти років поступила з діагнозом: вагітність III, 19 тижнів, обтяжений акушерський анамнез, загроза переривання вагітності. Істмікоцервікальна недостатність. В анамнезі 2 мимовільних аборти в 12 та 16 тижнів вагітності. При піхвовому дослідженні: шийка матки скорочена до 1,5 см, зовнішнє вічко пропускає кінчик пальця. Яка допомога потрібна вагітній?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Лікування не потребує
- ☐ b. Переривання вагітності
- ☐ c. Гормональна терапія
- ☐ d. Спазмолітична терапія
- ☐ e. Накладання циркулярного шва на шийку матки

Коментар

Правильна відповідь: Накладання циркулярного шва на шийку матки

Питання 160

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий 30-ти років одержав одноразову дозу зовнішнього опромінення в 3 Гр, доставлений на I етап медичної евакуації з вогнища радіаційного зараження зі скаргами на нудоту, блювання, постійний головний біль, слабкість, біль в кістках. Об'єктивно: свідомість ясна, збуджений. Температура тіла 37,80С. Спостерігається ін'єкція склер, гіперемія шкірних покривів. АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧСС- 100/хв. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гостра променева хвороба, кишкова форма, період розпалу захворювання
- ☐ b. Гостра променева хвороба, церебральна форма, період відновлення
- ☐ c. Гостра променева хвороба, кістково-мозкова форма, період первинної реакції
- ☐ d. Гостра променева хвороба, судинно-токсемічна форма, латентний період
- ☐ e. Гостра променева хвороба, кишкова форма, період відновлення

Коментар

Правильна відповідь: Гостра променева хвороба, кістково-мозкова форма, період первинної реакції

Питання 161

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий похилого віку доставлений з приводу повної атріо-вентрикулярної блокади. Після призначення лікування (фуросемід, атропіну сульфат, нітросорбід, преднізолон, мілдронат) у хворого виникла гостра затримка сечі. Який препарат призвів до даного ускладнення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Атропіну сульфат
- ☐ b. Фуросемід
- ☐ c. Нітросорбід
- ☐ d. Мілдронат
- ☐ e. Преднізолон

Коментар

Правильна відповідь: Атропіну сульфат

Питання 162

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час проведення регламентних робіт на АЕС трапилась аварія з викидом радіоактивних речовин. 32 працівника чергової зміни отримали різні дози зовнішнього опромінення. Яка доза опромінення зумовлює гостру променеву хворобу легкого ступеня?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 8-10 Гр
- ☐ b. 0,25-0,5 Гр
- ☐ c. 12-15 Гр
- ☐ d. 1-2 Гр
- ☐ e. 4-6 Гр

Коментар

Правильна відповідь: 1-2 Гр

Питання 163

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 7-ми років лікувався з приводу неревматичного кардиту серцевими глікозидами. При обстеженні: брадикардія, шлуночкова екстрасистолія, передсердно-шлуночкова блокада, миготлива аритмія, знижений апетит, блювання, адинамія, головний біль, депресія, порушення зору. Яке ускладнення у дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інтоксикація серцевими глікозидами
- ☐ б. Кардіоміопатія
- ☐ в. Кардіогенний шок
- ☐ г. Синдром Морганії-Адамса-Стокса
- ☐ д. Гостра судинна недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Інтоксикація серцевими глікозидами

Питання 164

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий 40-ка років отримав травму внаслідок артилерійського обстрілу. Стан хворого задовільний. Рс- 74/хв., АТ- 120/80 мм рт. ст. В ділянці лівої гомілки припухлість м'яких тканин та деформація в середній третині, рвано-забійна рана довжиною до 5 см в середній третині. В рану виступають кісткові відламки. Яку першу медичну допомогу необхідно надати в такому випадку? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Знеболювання, асептична пов'язка, іммобілізація
- ☐ б. Накладання гіпсової пов'язки
- ☐ в. Анестезія місця перелому, асептична пов'язка
- ☐ г. Первинна хірургічна обробка рани, іммобілізація
- ☐ д. Іммобілізація, транспортування в стаціонар

Коментар

Правильна відповідь: Знеболювання, асептична пов'язка, іммобілізація

Питання 165

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 45-ти років розвинувся гострий біль за грудниною тривалістю 15 хвилин. На ЕКГ: зубець QI, aVL, V4 - V6; елевація ST в I, V4 - V5. Який із зазначених показників є основним для діагностики захворювання в перші 1-3 години?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Підвищення фібриногену
- ☐ б. Підвищення активності АлАТ, АсАТ
- ☐ с. Вміст тропоніну - Т
- ☐ d. Лейкоцитоз
- ☐ е. Лімфоцитопенія

Коментар

Правильна відповідь: Вміст тропоніну - Т

Питання 166

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець доставлений на МПП після хімічного ураження. Лікар встановив діагноз отруєння синильною кислотою. На попередніх етапах антидот не вводився. Яка перша лікарська допомога потрібна хворому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Амілнітри інгаляційно
- ☐ б. Будаксим внутрішньом'язово
- ☐ с. Унітіол внутрішньовенно
- ☐ d. Антиціан внутрішньовенно
- ☐ е. Атропін підшкірно

Коментар

Правильна відповідь: Антиціан внутрішньовенно

Питання 167

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 60-ти років доставлена в приймальне відділення без свідомості, з гіпореклексією, зниженим артеріальним тиском, брадикардією, брадикардією. Рік тому перенесла субтотальну резекцію щитоподібної залози. Замісну терапію не отримувала. Для якого стану характерні наведені ознаки? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпопаратиреоїдизм
- ☐ б. Отруєння невідомою отрутою
- ☐ в. Геморагічний шок
- ☐ г. Мікседематозна кома
- ☐ д. Тиреотоксичний криз


Коментар

Правильна відповідь: Мікседематозна кома

Питання 168

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 39-ти років під час бійки отримав удар по шиї ребром долоні. Внаслідок травми знепритомнів, дихання різко утруднене, із утрудненим вдихом, шкіра обличчя та рук сіро-синього кольору. Що треба терміново зробити хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інтубація, трахеостомія
- ☐ б. Трахеостомія
- ☐ в. Трахеотомія
- ☐ г. Інтубація трахеї
- ☐ д. Конікотомія

Коментар

Правильна відповідь: Конікотомія

Питання 169

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вранці мама знайшла 5-місячного хлопчика в ліжечку вже мертвим з трупними плямами, обличчям донизу. Перед цим дитина була здоровою. Яка найбільш імовірна причина смерті дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Кардіогенний шок
- ☐ b. Аспірація блювотними масами
- ☐ с. Менінгоенцефаліт
- ☐ d. Епілептичний статус
- ☐ е. Синдром раптової смерті


Коментар

Правильна відповідь: Синдром раптової смерті

Питання 170

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 15-ти років у тяжкому стані доставлена в клініку. При огляді скаржиться на зростаючу слабкість, сухість у роті, запаморочення, ниючий біль у епігастрії. Об'єктивно: шкіра бліда, тонус м'язів знижений, Рс- 120/хв., ниткоподібний, значне напруження передньої черевної стінки. АТ- 70/40 мм рт.ст. В блювотних масах кров. Що зумовило цей невідкладний стан?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Кардіогенний шок
- ☐ b. Гострий апендицит
- ☐ с. Гостре отруєння
- ☐ d. Шлункова кровотеча
- ☐ е. Гостра надниркова недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Шлункова кровотеча

Питання 171

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 43-х років викликав швидку медичну допомогу. Скаржиться на різкий біль у лівій половині живота з іррадіацією в ліву ногу. В анамнезі сечокам'яна хвороба. Об'єктивно: шкіра бліда, Р8-100/хв., АТ- 160/90 мм рт.ст. Симптом Пастернацького різко позитивний зліва. Почати лікування найбільш доцільно із призначення:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Спазмалгон перорально
- ☐ b. Морфін в/в
- ☐ c. Анальгін в/м
- ☐ d. Уролесан перорально
- ☐ e. Баралгін в/в


Коментар

Правильна відповідь: Баралгін в/в

Питання 172

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 27-ми років доставлена до приймального відділення після автокатастрофи. Виражена задишка (60/хв.), дихальні шуми значно послаблені справа. Першим кроком в лікуванні повинно бути:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Виконання перикардіоцентезу
- ☐ b. Інфузійна терапія
- ☐ c. Пункція правої плевральної порожнини
- ☐ d. Трахеостомія
- ☐ e. Інтубація трахеї

Коментар

Правильна відповідь: Пункція правої плевральної порожнини

Питання 173

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час ядерного вибуху військовослужбовець отримав опіки шкіри III-Б ст., 5%. Під час проведення дозиметричного контролю доза опромінення становить 3 Гр. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гостра променева хвороба
- ☐ б. Комбінована радіаційно-термічна травма
- ☐ в. Опікова хвороба
- ☐ г. Травматична хвороба
- ☐ д. Політравма


Коментар

Правильна відповідь: Комбінована радіаційно-термічна травма

Питання 174

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 46-ти років з імплантованим електрокардіостимулятором під час ремонту настільної лампи отримав легку травму електрострумом, після чого він впродовж декількох хвилин був непритомний. Об'єктивно: ціаноз шкіри, АТ- 60/0 мм рт.ст., ЧСС- 25/хв. Найбільш імовірною причиною неефективності кровообігу є:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ішемічний інсульт
- ☐ б. Електро механічна дисоціація
- ☐ в. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ г. Травматичний шок
- ☐ д. Атріовентрикулярна блокада


Коментар

Правильна відповідь: Атріовентрикулярна блокада

Питання 175

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 30-ти років працює 8 років фасувальником анілінових барвників. Останню зміну працював у приміщенні, де вийшла з ладу вентиляція. Доставлений зі скаргами на головний біль, запаморочення, сонливість, різку загальну слабкість, пітливість. Об'єктивно: сірувато-синє забарвлення шкірних покривів, тони серця приглушені, Ря- 105/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., дихання поверхневе, ЧД- 25/хв. Печінка +2 см, чутлива. У крові: 10% еритроцитів з тільцями Гейнца-Ерліха, лейк.- 8,5x10⁹/л, ШЗЕ- 2 мм/год. Які дослідження слід призначити для верифікації діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Аналіз крові на карб оксигемоглобін
- ☐ b. Аналіз сечі на порфірини
- ☐ с. Аналіз крові на метгемоглобін
- ☐ d. Аналіз сечі на свинець
- ☐ е. Аналіз сечі на метгемоглобін


Коментар

Правильна відповідь: Аналіз крові на метгемоглобін

Питання 176

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вночі у хворого з'явилися задиха, кашель з рясним харкотинням рожевого кольору. З анамнезу: страждає на гіпертонічну хворобу, варикозне розширення вен обох кінцівок, 2 роки тому переніс інфаркт міокарда. Об'єктивно: неспокійний, положення ортопное, акроціаноз, ЧДР- 40/хв. АТ- 220/110 мм рт.ст. У легенях - різнокаліберні середньо- і великопухирчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Крупозна пневмонія
- ☐ b. Гостра лівошлуночкова недостатність
- ☐ с. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ d. Астматичний статус
- ☐ е. Легенева кровотеча

Коментар

Правильна відповідь: Гостра лівошлуночкова недостатність

Питання 177

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Військовослужбовець 20-ти років потрапив у осередок дії ОР Евакуйований до МПБ, введено підшкірно 4 мл 0,1% розчину атропіну. Скарги на загальну слабкість, спрагу, сухість у горлі, охриплість голосу, збудження, дратівливість. Шкіра обличчя гіперемована, зіниці розширені. В легенях жорстке дихання. Р8- 112/хв, АТ- 140/90 мм рт.ст. Що стало причиною зазначеної картини? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Передозування реактиваторів холінестерази
- ☐ б. Ураження дифосгеном
- ☐ в. Атропінізація організму
- ☐ г. Ураження зоманом
- ☐ д. Ураження зарином

Коментар

Правильна відповідь: Атропінізація організму

Питання 178

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 48-ми років доставлений в клініку через 3 години після розвитку гострого інфаркту міокарда. Під час транспортування в машині швидкої допомоги хворий декілька разів непритомнів на 5-10 секунд. Цей стан супроводжувався судомами. Стан хворого тяжкий, в свідомості, адекватний. АТ- 80/50 мм рт.ст., ЧСС- 34/хв. На ЕКГ: повна АВ-блокада, елевация сегменту ST в II, III, aVF. Які з невідкладних заходів потрібно проводити в стаціонарі в першу чергу? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Призначення сечогінних препаратів
- ☐ б. Проведення електрокардіостимуляції
- ☐ в. Призначення адреналіну
- ☐ г. Призначення добутаміну
- ☐ д. Електроімпульсна терапія

Коментар

Правильна відповідь: Проведення електрокардіостимуляції

Питання 179

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

6-ти річна дитина госпіталізована у важкому стані. Шкіра та видимі слизові різко бліді, дрібноточкові геморагічні висипання, кровотеча з ясен. До 2-3 см збільшені шийні, підщелепові, аксиллярні лімфовузли (щільні, рухомі, не болючі). Печінка +5 см з-під правої реберної дуги, селезінка +2 см з-під лівої реберної дуги. У крові: лейкоц.- $2,6 \cdot 10^9/\text{л}$, ер.- $2,01 \cdot 10^{12}/\text{л}$, Hb- 53 г/л, КП- 0,79, тромбоц.- $12 \cdot 10^9/\text{л}$, пал.-1%, сегм.- 3%, мон.- 3%, лімф.- 80%, еоз.- 1%, баз.- 0%, бласти - 12%. ШЗЕ- 39 мм/год. Попередній діагноз:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Реактивний лімфаденіт шийних, підщелепових та аксиллярних лімфовузлів
- ☐ б. Гостра лейкемія
- ☐ в. Цитомегаловірусна інфекція
- ☐ г. Імунна тромбоцитопенічна пурпура
- ☐ д. Інфекційний мононуклеоз

Коментар

Правильна відповідь: Гостра лейкемія

Питання 180

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час оперативного втручання з приводу апендициту в хворого на хронічний гепатит В його кров потрапила на пошкоджену шкіру правої кисті хірурга, який не щеплений проти гепатиту В. Які дії щодо термінової постконтактної профілактики гепатиту В?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Щеплення вакциною проти гепатиту В за схемою 1,3,6 місяців з ревакцинацією через 12 місяців
- ☐ б. Щеплення вакциною проти гепатиту В за схемою 0, 7, 21 день з ревакцинацією через 12 місяців і одночасне введення специфічного імуноглобуліну
- ☐ в. Щеплення вакциною проти гепатиту В за схемою 1-й день, 1 місяць, 6 місяців з ревакцинацією через 12 місяців і одночасне введення специфічного імуноглобуліну проти гепатиту В
- ☐ г. Термінової постконтактної профілактики гепатиту В не існує
- ☐ д. Щеплення вакциною проти гепатиту В за схемою 1, 2, 5 місяців і одночасне введення специфічного імуноглобуліну

Коментар

Правильна відповідь: Щеплення вакциною проти гепатиту В за схемою 0, 7, 21 день з ревакцинацією через 12 місяців і одночасне введення специфічного імуноглобуліну

Питання 181

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора звернулась зі скаргами на розширення вен правої нижньої кінцівки, наявність пігментації шкіри, набряку м'яких тканин правої гомілки. Права гомілка набрякла, шкіра гіперпігментована, багряно-синюшного кольору, гаряча на дотик. Яка подальша тактика?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Консультація дерматолога
- ☐ b. Призначення гепаринотерапії
- ☐ c. Призначення венорутону
- ☐ d. Туге бинтування кінцівки
- ☐ e. Консультація судинного хірурга

Коментар

Правильна відповідь: Консультація судинного хірурга

Питання 182

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

З місця ДТП доставлений чоловік 40- ка років із відкритими переломами кісток гомілки і великими, забрудненими землею та обривками одягу, рваними ранами нижніх кінцівок. Про профілактику яких інфекційних ускладнень необхідно думати в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Профілактика аеробної інфекції
- ☐ b. Профілактика газової гангрені та правця
- ☐ c. Профілактика анаеробної інфекції
- ☐ d. Профілактика правця
- ☐ e. Профілактика газової гангрені

Коментар

Правильна відповідь: Профілактика газової гангрені та правця

Питання 183

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 6-ти років захворіла 3 дні тому назад, коли вперше з'явилося жовтяничне забарвлення шкіри та слизових, потемнішала сеча. У крові підвищення рівнів трансаміназ, у 15 разів, АлАТ більше ніж АсАТ, білірубін у якості прямого та непрямого в 10 разів вище верхньої межі норми. При огляді дитина спить, після пробудження важко вступає в контакт, після припинення спілкування засинає знову. Якою має бути тактика лікаря сільської лікарської амбулаторії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Дитина потребує негайного проведення екстракорпоральної детоксикації
- ☐ b. Дитина потребує застосування гепато-протекторів
- ☐ c. Дитина потребує негайного переведення до лікарні, де є реанімаційне відділення
- ☐ d. Дитина може продовжувати лікуватися на рівні сільської лікарської амбулаторії
- ☐ e. Дитина може бути виписана додому під нагляд дільничного лікаря

Коментар

Правильна відповідь: Дитина потребує негайного переведення до лікарні, де є реанімаційне відділення

Питання 184

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 37-ми років раптово знепритомнів, посинів, з'явилися судоми. Пульс і артеріальний тиск не визначаються. Дихання відсутнє. Зіниці широкі. Тони серця не вислухуються. На ЕКГ: замість звичайних шлуночкових комплексів фіксується велика кількість безладних, різної величини і форми хвиль, що реєструються одна за одною, майже без інтервалів. Яку невідкладну терапію слід призначити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення преднізолону
- ☐ b. Введення атропіну
- ☐ c. Ургентна електрична дефібриляція
- ☐ d. Введення кордарону
- ☐ e. Введення строфантину

Коментар

Правильна відповідь: Ургентна електрична дефібриляція

Питання 185

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років після аварії на виробництві був госпіталізований із скаргами на металевий присмак та печіння у роті, нудоту, слинотечу, багаторазове блювання, пронос з домішками слизу та крові, біль у епігастральній та поперековій ділянках. Об'єктивно: стан важкий, виразковий стоматит, гінгівіт, некроз слизової оболонки носа, набряк гортані. АТ- 150/100 мм рт.ст., PS- 48/хв, тони серця глухі. Поліурія, гіпостенурія, альбумінурія, гематурія. Який антидот слід ввести хворому?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Атропіну сульфат
- ☐ б. Дієтиоксим
- ☐ в. Антарсин
- ☐ г. Унітіол
- ☐ д. Хромосмон

Коментар

Правильна відповідь: Унітіол

Питання 186

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років поступив у відділення зі скаргами на пекучий біль, сильне розпирання тканин пальців обох стоп. Об'єктивно: пухирі, наповнені геморагічною рідиною; після зняття пухирів видно некротизовану шкіру, котра нечутлива і не болюча. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Відмороження I ступеня
- ☐ б. Відмороження II ступеня
- ☐ в. Термічний опік II ступеня
- ☐ г. Термічний опік III А ступеня
- ☐ д. Відмороження III ступеня


Коментар

Правильна відповідь: Відмороження III ступеня

Питання 187

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий, моряк закордонного плавання, звернувся зі скаргами на підвищення температури до 40°C, кашель з пінистим іржавим харкотинням. Об'єктивно: блідий, ціаноз слизових, ЧД- 30/хв., тахікардія. Дихання в легенях ослаблене, поодинокі вологі хрипи, крепітація. Попередній діагноз: чума, первинно-легенева форма. Які методи специфічної діагностики?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Посів на кров'яний агар
- ☐ b. Використання вірусологічного метода
- ☐ c. Шкірно-алергічна проба
- ☐ d. Посів на анаеробні середовища
- ☐ e. Посів не потрібен


Коментар

Правильна відповідь: Посів на кров'яний агар

Питання 188

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 9-ти років, яка хворіє на цукровий діабет, на тлі кишкової інфекції виникли і наростають неврологічні симптоми: порушення орієнтації, галюцинації, фокальні судоми. Наявні ознаки дегідратації III ступеня, дихальних порушень немає, запах ацетону відсутній. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпоглікемічна кома
- ☐ b. Пухлина головного мозку
- ☐ c. Енцефаліт
- ☐ d. Діабетична кетоацидотична кома
- ☐ e. Гіперосмолярна кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

Питання 189

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік молодого віку у непритомному стані був знайдений перехожим вночі на вулиці. При обстеженні лікарем швидкої медичної допомоги очевидних зовнішніх ушкоджень не визначається, кома II, анізокорія. Ps- 62/хв., АТ- 50/0 мм рт.ст. В яке відділення треба як найшвидше госпіталізувати хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Нейрохірургічне
- ☐ b. Неврологічне
- ☐ c. Інтенсивної терапії
- ☐ d. Терапевтичне
- ☐ e. Токсикологічне


Коментар

Правильна відповідь: Інтенсивної терапії

Питання 190

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика, хворого на лакунарну ангіну, на 3-й день з'явився гавкаючий кашель, голос став хриплим, а потім - беззвучним. Дитина неспокійна, бліда, акроціаноз. На мигдаликах - біло-сірі щільні нашарування. Тахікардія. Дихання утруднене, супроводжується втягуванням міжреберних проміжків. Чим обумовлена дихальна недостатність?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дифтерія, комбінована форма (мигдаликів і ларингеальна)
- ☐ b. Парагрип. Несправжній круп
- ☐ c. Інфекційний мононуклеоз
- ☐ d. Кашлюк
- ☐ e. Стороннє тіло


Коментар

Правильна відповідь: Дифтерія, комбінована форма (мигдаликів і ларингеальна)

Питання 191

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 5-ти років, що зазнала падіння з висоти, діагностований перелом стегна та проводиться зупинка середньотяжкої зовнішньої кровотечі. Свідомість затьмарена, дихання поверхневе, часте, пульс слабкий, артеріальна гіпотензія, РаО₂ 80 мм рт.ст. Підозрюючи травматичний шок, слід: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Проконсультуватись з невропатологом
- ☐ б. Проводити оральну гідратацію
- ☐ в. Призначити оксигенотерапію
- ☐ г. Госпіталізувати до хірургічного стаціонару
- ☐ д. Призначити знеболюючі та в/в інфузію кристалоїдів


Коментар

Правильна відповідь: Призначити знеболюючі та в/в інфузію кристалоїдів

Питання 192

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 28-ми років на фоні бронхопневмонії розвинулася кома. Об'єктивно: ЧСС- 122/хв, екстрасистолія. АТ- 80/45 мм рт.ст. Шкіра суха, тургор знижений. Дихання глибоке, шумне, рідке. Різкий запах ацетону. Печінка +5 см. Глікемія - 32 ммоль/л; рН крові - 7,0. Який розчин буде найбільш ефективним для нормалізації дихання?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 5% розчин глюкози
- ☐ б. Реополіглюкін
- ☐ в. 1% розчин калію хлориду
- ☐ г. 4,2% розчин натрію бікарбонату
- ☐ д. 0,9% розчин натрію хлориду

Коментар

Правильна відповідь: 4,2% розчин натрію бікарбонату

Питання 193

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 21-го року, що страждає на цукровий діабет типу 1, раптово після швидкої ходи розвинулися різка слабкість, тремор, пітливість, психомоторне збудження, дисфазія. Об'єктивно: шкіра волога, періостальні рефлекси підвищені, симптом Бабінського (+). Які дії лікаря? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Дати вдихнути пари нашатирного спирту
- ☐ б. Викликати бригаду швидкої допомоги
- ☐ в. Внутрішньом'язово ввести 1 мг глюкагону
- ☐ г. Дати випити 200 мл соку або з'їсти 2-4 цукерки
- ☐ е. Седативні засоби

Коментар

Правильна відповідь: Дати випити 200 мл соку або з'їсти 2-4 цукерки

Питання 194

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 76-ти років звернувся до лікаря зі скаргами на наявність безболісних нерухливих утворень в пахвинних ділянках, розмірами до 2-3 см в діаметрі. З анамнезу: останнім часом погіршився апетит, втратив вагу, у випорожненнях періодично відмічає свіжу кров. Яке дослідження для встановлення діагнозу необхідно провести першочергово? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ультразвукове дослідження пахвинної ділянки
- ☐ б. Іригографія
- ☐ в. Пальцеве дослідження прямої кишки
- ☐ г. Комп'ютерна томографія
- ☐ е. Ультразвукове дослідження лімфовузлів пахвинної ділянки

Коментар

Правильна відповідь: Пальцеве дослідження прямої кишки

Питання 195

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У робочого, що працює на виробництві ртутних термометрів, після вдихання в закритому приміщенні повітря з парами розлитої ртуті виникли металевий присмак у роті, слинотеча, біль у животі, кривавий пронос. Який препарат найбільш показаний у даному випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Активоване вугілля
- ☐ b. Преднізолон
- ☐ c. Альмагель
- ☐ d. Левоміцетин
- ☐ e. Унітіол

Коментар

Правильна відповідь: Унітіол

Питання 196

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 4-х років скаржиться на загальну слабкість, кашель. Вночі раптово підвищилася температура до 39,80С, хвора стала неспокійною. Гавкаючий кашель, шумне свистяче дихання з втягуванням над- та підключичних западин, міжреберних проміжків, шкіра бліда. Контактувала з хворими на ГРВІ сестрами. Що необхідно призначити дитині в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Папаверин, вітамін С
- ☐ b. Дибазол, еуфілін
- ☐ c. Астмопент, діазолін
- ☐ d. Преднізолон, гарячі ніжні ванни
- ☐ e. Антибіотики, димедрол

Коментар

Правильна відповідь: Преднізолон, гарячі ніжні ванни

Питання 197

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 45-ти років впав з висоти на правій бік. Лікарем швидкої медичної допомоги діагностовано перелом тазових кісток. Як слід транспортувати хворого до лікарні?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. На твердих ношах з валиком під колінами
- ☐ b. На твердих ношах в положенні на боку із зігнутими колінами
- ☐ c. Накласти шини Дітерікса на нижні кінцівки
- ☐ d. На твердих ношах в положенні на животі
- ☐ e. На м'яких ношах з валиком під колінами

Коментар

Правильна відповідь: На твердих ношах з валиком під колінами

Питання 198

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 50-ти років поступила в клініку зі скаргами на напади сильного головного болю, запаморочення, відчуття пульсації в голові, пітливість, м'язову слабкість. Під час нападу підвищується артеріальний тиск до 280/170 мм рт.ст. Напади тривають до 30 хвилин. Останнім часом частішали. За даними УЗД - визначається об'ємне утворення правого наднирника. Який препарат найбільш показаний хворій?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Пентамін в/в
- ☐ b. Аентоламін в/в
- ☐ c. Папаверин в/в
- ☐ d. Дибазол в/в
- ☐ e. Фуросемід в/в

Коментар

Правильна відповідь: Аентоламін в/в

Питання 199

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого виявлені тахікардія, пітливість, гіперемія шкіри обличчя, збільшена печінка, температура тіла 38,0°C. У крові: лейкоцитоз, ШЗЕ- 26 мм/год. Аллопсихічна дезорієнтація. Зорові галюцинації зоологічного змісту. Маячні ідеї переслідування. Психомоторне збудження. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Інфекційний психоз
- ☐ b. Алкогольний делірій
- ☐ c. Інфекційний гепатит
- ☐ d. Абстинентний синдром
- ☐ e. Енцефалопатія Гайє-Верніке

Коментар

Правильна відповідь: Алкогольний делірій

Питання 200

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий на варикозну хворобу нижніх кінцівок 5 днів знаходився у ліжку з приводу важкого грипу. При спробі встати раптом відчув запаморочення, виражену задишку, біль у правій половині грудної клітки, серцебиття, з'явилося харкотиння з домішками крові. Об'єктивно: ціаноз обличчя, здуття шийних вен, ЧСС- 120/хв, акцент тону над легеневою артерією, АТ- 90/60 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ b. Правобічна пневмонія
- ☐ c. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ d. Правобічний спонтанний пневмоторакс
- ☐ e. набряк легенів

Коментар

Правильна відповідь: Тромбоемболія легеневої артерії

Пропустити Перехід по тесту[illegible]

На цій сторінці Питання 195 На цій сторінці Питання 196 На цій сторінці Питання 197 На цій сторінці
Питання 198 На цій сторінці Питання 199 На цій сторінці Питання 200 На цій сторінці
Показати одну сторінку за разЗавершити перегляд

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

Учасники

Відзнаки

Компетентності

Журнал оцінок

Загальне

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Контрольні тестування

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Секція 9

Секція 10

Секція 11

Секція 12

Секція 13

Секція 14

Секція 15

Особистий кабінет

Домашня сторінка

Календар

Особисті файли

Мої курси

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручняк Оксана Богданівна](#) ([Вийти](#))

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Українська \(uk\)](#)
 - - [English \(en\)](#)
 - [Русский \(ru\)](#)
 - [Українська \(uk\)](#)