

[Перейти до головного вмісту](#)
Бокова панель
КРОК-123

(Інтерн БДМУ) Підручняк Оксана Богданівна

П

Особистий кабінетПрофіль користувачаОцінкиПовідомленняУподобанняВийтиПовідомлення
[Нове повідомлення](#)

Позначити все як прочитане
Налаштування повідомлення



[Переглянути всі](#)

Сповідання

Позначити все як прочитане
Налаштування сповіщень



[Переглянути всі](#)

[Українська \(uk\)](#)


[English \(en\)](#)[Русский \(ru\)](#)[Українська \(uk\)](#)

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Особистий кабінет](#)
- [Мої курси](#)
- [КРОК 3. Загальна лікарська підготовка](#)
- [Секція 3](#)
- [2015 осінь](#)

Розпочато	Tuesday 14 February 2023 20:35 PM
Стан	Завершено
Завершено	Tuesday 14 February 2023 20:35 PM
Витрачено часу	9 сек
Балів	0,00/200,00
Оцінка	0,00 з 100,00 можливих
Питання 1	

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка з терміном вагітності 6 тижнів скаржиться на спрагу, свербіння шкіри, порушення зору, поліурію. В анамнезі I тип цукрового діабету. В аналізі крові: цукор 9 ммоль/л натще, після навантаження глюкозою - 12 ммоль/л. Огляд окуліста: проліферативна ретинопатія. Що необхідно запропонувати жінці?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Зберігання вагітності
- ☐ b. Лікування дієтою
- ☐ c. Подальше обстеження
- ☐ d. Перервати вагітність
- ☐ e. Лікування інсуліном


Коментар

Правильна відповідь: Перервати вагітність

Питання 2

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 47-ми років доставлено в токсикологічне відділення в тяжкому стані. Об'єктивно: свідомість за типом оглушення, АТ- 75/40 мм рт.ст., ЧСС- 40/хв. З анамнезу: 1 годину тому прийняв 3 таблетки клофеліну з суїцидальною метою. Діагноз: отруєння клофеліном. Яка тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Промивання шлунка, спостереження
- ☐ b. Кордіамін в/в, інфузійна терапія
- ☐ c. Інфузійна терапія, промивання шлунка
- ☐ d. Преднізолон в/в, інфузійна терапія, промивання шлунка
- ☐ e. Інфузійна терапія, атропіну сульфат в/в, промивання шлунка

Коментар

Правильна відповідь: Інфузійна терапія, атропіну сульфат в/в, промивання шлунка

Питання 3

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 38-ми років доставлений у клініку у зв'язку з множинними забоями живота. Гемодинаміка стабільна, живіт болючий на ділянках забоїв і лівому під ребер'ї. У відлогих місцях - притуплення перкуторного звуку. Синдроми подразнення очеревини негативні. Яке дослідження показане в першу чергу для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Лапаротомія
- ☐ б. УЗД органів черевної порожнини
- ☐ в. Загальний аналіз крові і сечі
- ☐ г. Введення "пошукового" катетера
- ☐ д. Оглядова рентгенограма черевної порожнини


Коментар

Правильна відповідь: Введення "пошукового" катетера

Питання 4

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10-ти місяців, що постійно вигодовувалася коров'ячим молоком, спостерігається виражений систолічний шум на верхівці серця та акроціаноз. Сонографічно вади серця не виявлено. У крові: Нb- 38 г/л, КП- 0,7. Першочергова терапія:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Трансфузія цільної крові
- ☐ б. Серцеві глікозиди за швидкою схемою насичення
- ☐ в. Введення рекормону
- ☐ г. Трансфузія еритроцитарної маси
- ☐ д. Ентеральне введення препаратів заліза


Коментар

Правильна відповідь: Трансфузія еритроцитарної маси

Питання 5

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі 35-ти років відбулися треті термінові нормальні пологи. Загальна крововтрата склала 400 мл, через 1 годину з піхви з'явилося 100 мл кров'янистих виділень із згортками. Які діагностичні заходи необхідно провести для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Зондування порожнини матки
- ☐ b. Огляд шийки матки в дзеркалах
- ☐ c. Визначення висоти стояння дна матки
- ☐ d. Кюретаж порожнини матки
- ☐ e. Загальний аналіз крові


Коментар

Правильна відповідь: Огляд шийки матки в дзеркалах

Питання 6

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 40-ка років скаржиться на інтенсивні болі в горлі при ковтанні, виражену задишку, що посилюється у горизонтальному положенні і супроводжується нападами задухи. При непрямій ларингоскопії виявлений абсцес надгортанника. Відділи гортані розташовані нижче оглянути не вдається. Від трахеотомії хворий категорично відмовився. На висоті чергового нападу задухи розвинулися ціаноз, судоми та наступила зупинка дихання. Яку першочергову допомогу слід надати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Конікотомія
- ☐ b. Інтубація трахеї
- ☐ c. Штучна вентиляція легенів методом з роту в рот
- ☐ d. Трахеотомія
- ☐ e. Ендоларингеальне розкриття абсцесу під контролем прямої ларингоскопії


Коментар

Правильна відповідь: Конікотомія

Питання 7

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловіка 40-ка років доставлено до приймального відділення. Відзначається запах алкоголю з рота, очі не розплющує, на запитання не відповідає, нецілеспрямований рух є реакцією на біль. Об'єктивно: дихання часте (>40/хв.), поверхнєве, АТ- 90/40 мм рт.ст., PS- 112/хв. Що треба зробити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Внутрішньовенно бемегрид
- ☐ б. Зондове промивання шлунка
- ☐ в. Інтубація трахеї
- ☐ г. Позаниркові методи детоксикації (гемодіаліз, гемосорбція)
- ☐ ґ. Форсований діурез


Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї

Питання 8

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 36-ти років, скаржиться на нападоподібний біль в лівому підребер'ї через 1,5-2 години після вживання жирної їжі, який супроводжується блюванням, що не приносить полегшення. Об'єктивно: язик обкладений білим нальотом. Живіт м'який, чутливий під час пальпації в пілородуоденальній зоні. Активність трипсину крові - 5,2 од/мл. α -амілаза сечі - 32 ОД. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Хронічний панкреатит
- ☐ б. Хронічний ентероколіт
- ☐ в. Хронічний гепатит
- ☐ г. Хронічний холецистит
- ☐ ґ. Хронічний гастрит

Коментар

Правильна відповідь: Хронічний панкреатит

Питання 9

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 54-х років з міомою матки й анемією (Hb- 52 г/л, Ht- 17%) скаржиться на головний біль, слабкість, запаморочення. Лікар призначив жінці трансфузію одногрупних відмитих еритроцитів. Яка основна мета гемотрансфузії в цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Стимулювальна
- ☐ b. Гемодинамічна
- ☐ c. Детоксикаційна
- ☐ d. Замісна
- ☐ e. Поживна

Коментар

Правильна відповідь: Замісна

Питання 10

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У спекотну погоду юнак 14-ти років відпочивав на пляжі. Через 6 годин вдома поскаржився на загальну слабкість, головний біль, запаморочення, нудоту та блювання. Об'єктивно: гіперемія шкіри обличчя та голови, одутлість обличчя. Шкірні покриви вологі. ЧД- 19/хв., АТ- 125/80 мм рт.ст., ЧСС=PS=104/хв. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тепловий удар середнього ступеня
- ☐ b. Сонячний удар
- ☐ c. Тепловий удар важкого ступеня
- ☐ d. Нейроциркуляторна дистонія
- ☐ e. Тепловий удар легкого ступеня


Коментар

Правильна відповідь: Сонячний удар

Питання 11

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 42-х років, оглянутий лікарем-психіатром, перебуває в стані оглушення, що періодично змінюється тривогою, відчаєм, афективними спалахами, гіперактивністю. На запитання не реагує. Відомо, що стан виник через декілька хвилин після бойових дій та триває 2 години. Який імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Тривожна реакція
- ☐ b. Іпохондричний невроз
- ☐ c. Параноїдна реакція
- ☐ d. Конверсійна реакція
- ☐ e. Гостра реакція на стрес


Коментар

Правильна відповідь: Гостра реакція на стрес

Питання 12

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий, 21 рік, скаржиться на головний біль, нудоту, блювання, зниження гостроти зору. Скарги з'явилися після перенесеної рік тому черепно-мозкової травми. Об'єктивно: напівптоз, легка асиметрія вишкіру зубів зліва. Глибокі рефлекс симетрично підвищені з обох сторін. М'язовий тонус незначно підвищений за пластичним типом. Вкажіть найбільш імовірну причину головного болю:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Лікворно-гіпотензійний синдром
- ☐ b. Посттравматичний паркінсонізм
- ☐ c. Посттравматична гідроцефалія
- ☐ d. Синдром венозного застою
- ☐ e. Посттравматична енцефалопатія

Коментар

Правильна відповідь: Посттравматична гідроцефалія

Питання 13

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 60-ти років доставлена до приймального відділення непритомною, з гіпореклексією, зниженим артеріальним тиском, брадикардією, брадикардією. Рік тому перенесла субтотальну резекцію щитоподібної залози. Замісну терапію не проходила. Для якого стану характерні наведені ознаки?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Отруєння невідомою отрутою
- ☐ b. Гіпопаратиреоїдизм
- ☐ c. Геморагічний шок
- ☐ d. Тиреотоксичний криз
- ☐ e. Мікседематозна кома

Коментар

Правильна відповідь: Мікседематозна кома

Питання 14

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 13-ти років на прийомі у лікаря була дуже знервована, хвилювалася, боялася відповідати на запитання. Зненацька дівчина зблідла, поскаржилася на запаморочення, нудоту, на лобі та на верхній губі у неї з'явилися великі краплини поту, потім вона "обм'якла" та впала на долівку. Що треба зробити першочергово для виведення її зі стану зомління?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Підняти нижні кінцівки та забезпечити надходження свіжого повітря до приміщення (відчинити вікна та двері)
- ☐ b. Негайно зігріти кінцівки хворої грілками
- ☐ c. Негайно ввести внутрішньовенно глюкокортикоїди (в дозі 5 мг/кг з розрахунку на преднізолон)
- ☐ d. Негайно забезпечити венозний доступ і почати інфузію колоїдних розчинів для підтримки ОЦК
- ☐ e. Забезпечити симпатоміметичну підтримку кровообігу адреналіном 0,5 мкг/кг • год та допаміном 2-4 мкг/кг • год

Коментар

Правильна відповідь: Підняти нижні кінцівки та забезпечити надходження свіжого повітря до приміщення (відчинити вікна та двері)

Питання 15

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 44-х років скарги на загальну слабкість, гіпертермію до 39,0°C, свербіння шкіри, висип, болісність і припухлість суглобів. Об'єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., папульозно-макульозний висип, генералізоване збільшення лімфовузлів, припухлість суглобів, збільшення селезінки. 7 днів тому у травмпункті провели первинну хірургічну обробку рани стопи та ввели протиправцеву сироватку. Вкажіть причину розвитку даного стану:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Сепсис
- ☐ б. Геморагічний васкуліт
- ☐ в. Сироваткова хвороба
- ☐ г. Менінгіт
- ☐ д. Анафілактична реакція

Коментар

Правильна відповідь: Сироваткова хвороба

Питання 16

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Солдат після несення нічної караульної служби раптово втратив свідомість і впав. При цьому у нього розвинулись тоніко-клонічні судоми. Яку невідкладну допомогу слід надати на місці події?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Зафіксувати потерпілого
- ☐ б. Поплескати по обличчю, щоб привести до тями
- ☐ в. Проводити штучну вентиляцію легень
- ☐ г. Забезпечити прохідність дихальних шляхів
- ☐ д. Проводити непрямий масаж серця

Коментар

Правильна відповідь: Забезпечити прохідність дихальних шляхів

Питання 17

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На 4-ту добу після переливання несумісної по групі крові, у хворого різко зменшився діурез, розвинулася анурія, різко погіршився загальний стан, підвищився артеріальний тиск. При лабораторних дослідженнях: креатинін плазми - 680 мкмоль/л, сечовина плазми - 24 мкмоль/л. Яке захворювання і яку його стадію можна припустити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Анафілактичний шок, гостра ниркова недостатність, анурія
- ☐ б. Постгеморагічна гостра ниркова недостатність, анурія
- ☐ в. Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія
- ☐ г. Гемотрансфузійний шок, постренальна гостра ниркова недостатність, анурія
- ☐ д. Гострий інтерстиціальний нефрит, обтураційна анурія

Коментар

Правильна відповідь: Гемотрансфузійна гостра ниркова недостатність, анурія

Питання 18

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта 40-ка років, який впродовж 17-ти років хворіє на неспецифічний виразковий коліт, в ході останнього ендоскопічного дослідження виявлено множинні запальні псевдополіпи у всіх відділах товстої кишки. Результати біопсії показали наявність в поліпах дисплазії II-III ст. Яке лікування необхідно застосувати для даного хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Медикаментозне
- ☐ б. Рентгенотерапія
- ☐ в. Трансендоскопічне видалення поліпів
- ☐ г. Хіміотерапія
- ☐ д. Хірургічне

Коментар

Правильна відповідь: Хірургічне

Питання 19

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років. Тиждень тому зазнав сильного удару по печінці. На наступний день підвищилася температура до 38°C, відчув важкість в правому підребер'ї. Вчора з'явився сильний біль в правому підребер'ї, живіт збільшився у розмірах, з'явилась сітка розширених підшкірних вен на грудях, бокових поверхнях живота, нижніх кінцівках. Яке ускладнення розвинулося у хворого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий тромбоз ворітної вени
- ☐ б. Гострий холецистит
- ☐ в. Піддіафрагмальний абсцес
- ☐ г. Гострий абсцес печінки
- ☐ д. Травма печінки

Коментар

Правильна відповідь: Гострий тромбоз ворітної вени

Питання 20

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При променевому ураженні шкіри у хворого 33-х років спостерігається вологий дерматит, пухирі малі, ненапружені, займають менш ніж 50% поля. Така клінічна картина виникає при дозі опромінення:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. 5-8 Гр
- ☐ б. 10-15 Гр
- ☐ в. 7-13 Гр
- ☐ г. 15-20 Гр
- ☐ д. 20-30 Гр

Коментар

Правильна відповідь: 15-20 Гр

Питання 21

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10 місяців на тлі легкого перебігу ГРВІ з'явилися повторні клонічні судоми. В ході огляду виявлено затримку психомоторного розвитку, краніотабес, деформацію грудної клітки, потовщення метафізів трубчатих кісток. Рівень кальцію крові - 1,6 ммоль/л, інтервал Т на ЕКГ подовжений - 0,33 сек. Даних про перинатальне ушкодження ЦНС немає. Спинномозкова рідина інтактна, витікала під тиском. Вигодовування штучне, без овочевих страв. Про яке захворювання йдеться?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Енцефаліт
- ☐ b. Нейротоксикоз
- ☐ с. Менінгіт
- ☐ d. Енцефалітична реакція
- ☐ e. Спазмофілія

Коментар

Правильна відповідь: Спазмофілія

Питання 22

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина від першої вагітності, термінових пологів, з дистocieєю плечиків, народилася з вагою 4620 г, довжина 54 см. Оцінка за шкалою Апгар 8 балів. При народженні закричав одразу, реакція на огляд помірно знижена. Крик гучний, роздратований. Через 30 хвилин після народження дитина стогне, з'явилися дихальні розлади, через годину - тонічні судоми. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Сидром дихальних розладів
- ☐ b. Асфіксія
- ☐ с. Пологова травма
- ☐ d. Вроджена вада серця
- ☐ e. Вроджена пневмонія

Коментар

Правильна відповідь: Пологова травма

Питання 23

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 11-ти років грала у футбол та під час падіння отримала травму. Встановлено попередній діагноз: закритий вивих правого передпліччя. Який обсяг допомоги повинен надати лікар на місці пригоди?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною
- ☐ б. Восьмиподібна пов'язка на правий ліктьовий суглоб
- ☐ в. Знеболювання, спроба вправлення вивиху
- ☐ г. Косинкова пов'язка на праву верхню кінцівку
- ☐ д. Знеболювання, транспортна іммобілізація косинкою

Коментар

Правильна відповідь: Знеболювання, транспортна іммобілізація шиною

Питання 24

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До реанімаційної доставлена вагітна жінка. Травмована під час дорожньо-транспортної пригоди - діагностовано забиття грудної клітини та зупинка серця. З обмінної карти відомо, що вагітність неускладнена, 28 тижнів. В ході огляду: травма живота, кров'яні виділення з піхви не виявлені. Яка тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Термінове УЗД живота
- ☐ б. Реанімаційні заходи не проводяться до огляду гінеколога
- ☐ в. Термінове розродження
- ☐ г. Термінові реанімаційні заходи на загальних принципах
- ☐ д. Початкова інтубація трахеї

Коментар

Правильна відповідь: Термінові реанімаційні заходи на загальних принципах

Питання 25

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 38-ми років впродовж 23-х років страждає на часті, серійні генералізовані судомні напади. Прогресує зниження пам'яті, інертність мислення, гарячність. 12 годин тому розпочалися генералізовані тоніко-клонічні напади. Впродовж останніх двох годин між нападами свідомість не відновлюється. Який першочерговий захід надання допомоги?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Введення внутрішньовенно натрію оксибутирату
- ☐ b. Введення внутрішньом'язово гексеналу
- ☐ c. Введення в клізмі хлоралгідрату
- ☐ d. Введення внутрішньовенно діазепаму
- ☐ e. Введення внутрішньом'язово магнію сульфату

Коментар

Правильна відповідь: Введення внутрішньовенно діазепаму

Питання 26

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 70-ти років, який страждає на хронічну печінкову недостатність з явищами асцити, під час проведення лапароцентезу було евакуйовано близько 5 л рідини з черевної порожнини. Раптово на тлі швидкого видалення рідини та декомпресії органів грудної порожнини у хворого виникла зупинка серцевої діяльності (асистолія). Яка лікувальна тактика?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Електрична дефібриляція
- ☐ b. Розпочати введення норадреналіну
- ☐ c. Розпочати серцево-легеневу реанімацію та припинити виконання лапароцентезу
- ☐ d. Розпочати серцево-легеневу реанімацію та продовження виконання лапароцентезу
- ☐ e. Розпочати введення атропіну

Коментар

Правильна відповідь: Розпочати серцево-легеневу реанімацію та припинити виконання лапароцентезу

Питання 27

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з інфекційним ендокардитом з ураженням аортального клапану виник інтенсивний біль у попереку, зліва та справа, який був діагностований як інфаркт нирок. Протягом доби у хворого посилились загальна слабкість, апатія, тахікардія, артеріальний тиск знизився до 60/0 мм рт.ст., з'явилися блювання, пронос, холодний липкий піт, олігурія. Чим ускладнився перебіг захворювання?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гостра надниркова недостатність внаслідок крововиливу у наднирники
- ☐ б. Гостра серцева недостатність
- ☐ в. Інфаркт селезінки
- ☐ г. Гостра ниркова недостатність внаслідок інфаркту нирки
- ☐ д. Інфаркт мозку

Коментар

Правильна відповідь: Гостра надниркова недостатність внаслідок крововиливу у наднирники

Питання 28

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років надійшов до приймально-діагностичного відділення з попереднім діагнозом: защемлена пупкова грижа. Під час обстеження раптово зблід, втратив свідомість. Дихання відсутнє. Пульсація на магістральних артеріях припинилася 30 секунд тому. Зіниці розширені, на світло не реагують. З чого треба розпочати реанімаційні заходи?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Медикаментозна терапія
- ☐ б. Штучне дихання
- ☐ в. Закритий масаж серця
- ☐ г. Прекардіальний удар
- ☐ д. Електродефібриляція

Коментар

Правильна відповідь: Закритий масаж серця

Питання 29

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 30-ти років під час їжі раптово розвинувся напад кашлю, ядухи, ціаноз шкірних покривів, втрата свідомості. Діагностовано стороннє тіло в дихальних шляхах. Для його видалення насамперед може бути використаний наступний прийом:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Прекардіальний удар
- ☐ b. Перкусійний масаж
- ☐ c. Масаж ділянки каротидного синуса
- ☐ d. Трахеостомія
- ☐ e. Удар в міжлопаткову ділянку

Коментар

Правильна відповідь: Удар в міжлопаткову ділянку

Питання 30

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення військового госпіталю доставлено військо-вослужбовця з вогнепальним пораненням в ділянку черевної порожнини. Шкіра бліда, АТ- 90/60 мм рт.ст., Рс- 100/хв. Симптоми подразнення очеревини сумнівні. Яке дослідження треба виконати для уточнення діагнозу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. УЗД органів черевної порожнини
- ☐ b. Комп'ютерна томографія органів черевної порожнини
- ☐ c. Оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини
- ☐ d. Лапаротомія
- ☐ e. Фіброгастродуоденоскопія

Коментар

Правильна відповідь: УЗД органів черевної порожнини

Питання 31

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Очікувана доза опромінення населення, що мешкає на забрудненій радіонуклідами території, за перший рік становить 500 мЗв. Яких заходів захисту потребує це населення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ніяку, тому що дози х-опромінення не перевищують допустимі рівні
- ☐ b. Потрібно провести йодну профілактику
- ☐ c. За даних умов потрібне переселення або евакуація населення
- ☐ d. Обмежити вживання забруднених радіонуклідами харчових продуктів та питної води
- ☐ e. Використовуються укриття та засоби захисту органів дихання та шкірного покриву

Коментар

Правильна відповідь: За даних умов потрібне переселення або евакуація населення

Питання 32

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 59-ти років проходить курс реабілітаційного лікування після перенесеного інфаркту міокарда. Гемодинамічні показники стабільні. Фракція викиду 50%. Які засоби профілактики раптової серцевої смерті потрібно застосувати у даного пацієнта?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Антагоністи кальцію, іАПФ, статини
- ☐ b. Хірургічна корекція
- ☐ c. β -адреноблокатори, іАПФ, статини
- ☐ d. Аміодарон, α -адреноблокатори
- ☐ e. Діуретики, іАПФ, статини

Коментар

Правильна відповідь: β -адреноблокатори, іАПФ, статини

Питання 33

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий 25-ти років після застосування хімічної зброї (іприту) скаржиться на слабкість, відчуття піску в очах, сльозотечу, світлобоязнь. Загальмований, виражений набряк і гіперемія повік, блефароспазм, еритема обличчя. Дихання жорстке. PS- 55/хв., ритмічний. Тони серця ослаблені, АТ- 85/55 мм рт.ст. Який спосіб евакуації найбільш доцільний для постраждалого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. В другу чергу в положенні лежачи
- ☐ б. Своім ходом
- ☐ с. В другу чергу в положенні сидячи
- ☐ d. Загальним транспортом
- ☐ е. В першу чергу в положенні сидячи

Коментар

Правильна відповідь: В першу чергу в положенні сидячи

Питання 34

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 4-тижневого віку через 2 тижні від початку захворювання, що проявляється блюванням "фонтаном", вираженою гіпотрофією і ексикозом, педіатр припустив вроджений пілоро- стеноз. При надходженні до дитячого відділення стан вкрай важкий: риси обличчя загострені, адинамія, сильна спрага, анурія, запах сечі з рота, сірість шкірних покривів. У сироватці крові: натрій - 135 моль/л, калій - 3,7 ммоль/л. Коматозний стан якого характеру розвинувся у дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Кетоацидотична кома
- ☐ б. Гіпоглікемічна кома
- ☐ с. Гіпохлоремічна кома
- ☐ d. Гіперосмолярна кома
- ☐ е. Азотемічна кома

Коментар

Правильна відповідь: Гіпохлоремічна кома

Питання 35

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 52-х років через 20 хвилин після гемотрансфузії однокрупної крові з'явилися загальний дискомфорт, біль в м'язах кінцівок, біль у попереку, головний біль, підвищення температури тіла до 37°C. Які лікарські засоби необхідно ввести в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Сульфаніламід
- ☐ b. Внутрішньовенне введення ізотонічного розчину натрію хлориду
- ☐ c. Антибіотики
- ☐ d. Анальгін
- ☐ e. Нестероїдні протизапальні препарати

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне введення ізотонічного розчину натрію хлориду

Питання 36

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 24-х років скаржиться на неможливість самостійного сечовипускання, болісні відчуття внизу живота. Сечовипускання не було більше 16 годин. Після емоційного стресу (машина збила пішохода) відчувала сильний позив до сечовипускання, але не мала можливості відвідати туалет, після чого не змогла мочитися. При огляді: хвора неспокійна, руками тримається за низ живота. В надлобковій області визначається симптом "кулі". Перкуторно сечовий міхур на 10 см вище лона. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гострий аднексит
- ☐ b. Гострий пієлонефрит
- ☐ c. Гострий цистит
- ☐ d. Гостра затримка сечі
- ☐ e. Вагітність

Коментар

Правильна відповідь: Гостра затримка сечі

Питання 37

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 65-ти років скаржиться на зміну кольору сечі. Сеча червона, з домішками кров'яних згустків, що нагадують "черв'яків", болю немає, непокоїть слабкість. У сечі: гематурія. У крові: НЬ- 84 г/л, ШОЕ- 31 мм/год. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий гломерулонефрит
- ☐ б. Гострий пієлонефрит
- ☐ в. Гострий цистит
- ☐ г. Сечокам'яна хвороба
- ☐ д. Пухлина нирки

Коментар

Правильна відповідь: Пухлина нирки

Питання 38

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До відділення спеціальної обробки (ВСО) надходять постраждалі військовослужбовці із вогнища отруєння СДОР Кількість постраждалих достеменно невідома, але включає в себе різні категорії за важкістю ураження. Які засоби індивідуального захисту зобов'язаний використовувати особистий склад ВСО?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Протигаз, ЗЗК або Л-1
- ☐ б. Протичумний костюм
- ☐ в. Респіратор, фартух, гумові рукавички, чоботи і нарукавники
- ☐ г. Використання засобів індивідуального захисту у цих випадках не потрібне
- ☐ д. Респіратор Р2


Коментар

Правильна відповідь: Протигаз, ЗЗК або Л-1

Питання 39

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні бригадою ШМД доставлено жінку 32-х років. З анамнезу: протягом останніх 2-х років перебувала на диспансерному обліку з приводу аутоїмунної гемолітичної анемії. Об'єктивно: стан середньої важкості, $t - 30^{\circ}\text{C}$, шкіра лимонно-жовтого кольору, Рс- 98/хв. АТ- 80/55 мм рт.ст., збільшена селезінка. У крові: ер.- 2,6 $10^{12}/\text{л}$, НЬ- 70 г/л, КР- 0,94, лейкоц.- 6,1 $\times 10^9/\text{л}$, ШОЕ- 19 мм/год, непрямий білірубін - 58 мкмоль/л. Що необхідно призначити в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інтерферон
- ☐ б. Преднізолон
- ☐ в. Еритроцитарна маса
- ☐ г. Ферум-лек
- ☐ д. Трансфузія консервованої крові


Коментар

Правильна відповідь: Преднізолон

Питання 40

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 37-ми років, що вживав напередодні копчену рибу власного виробництва, поступово розвинулись м'язова слабкість, неможливість читати газетний текст, на другий день - порушення ковтання. Об'єктивно: стан тяжкий, ціаноз шкіри, страбізм, ЧД- 50/хв., РС- 120/хв. Голос гугнявий, парез зіниць, метеоризм 2 ступеня. Випорожнення відсутні 2 доби. Який лікувальний захід показаний у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Штучна вентиляція легень
- ☐ б. Штучне дихання "рот у рот"
- ☐ в. Трахеостомія
- ☐ г. Введення діуретиків
- ☐ д. Призначення прозерину

Коментар

Правильна відповідь: Штучна вентиляція легень

Питання 41

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення доставлено чоловіка 30-ти років, який пережив втоплення у прісній воді, що відбулося близько 40 хвилин тому і супроводжувалося клінічною смертю та успішною реанімацією. Чоловік притомний, під час аускультації у легенях прослуховуються хрипи над всіма легеновими полями. Основний напрямок подальшої терапії:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Відновлення ОЦК
- ☐ b. Введення глюкокортикоїдів
- ☐ c. Введення інгібіторів протеолізу
- ☐ d. Дегідратація
- ☐ e. Киснетерапія

Коментар

Правильна відповідь: Дегідратація

Питання 42

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В хлопчика 3-х років, хворого на кишкову інфекцію, при огляді визначено значне зниження маси тіла, блідість та мармуровість шкіри, сухість слизових оболонок та зниження тургору тканин, висока лихоманка, рідке випорожнювання 10 разів на добу, олігурія. Які лікувальні заходи є невідкладними?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Парентеральне годування
- ☐ b. Подальше спостереження стану дитини
- ☐ c. Дрібне годування дитини
- ☐ d. Негайний початок інфузійної терапії
- ☐ e. Оральна регідратація

Коментар

Правильна відповідь: Негайний початок інфузійної терапії

Питання 43

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Після використання супротивником хімічної зброї у більшості військових спостерігаються кашель, утруднення дихання, слинотеча, які майже зникли після виходу постраждалих з зони хімічного зараження. Через 6 годин у всіх отруєних з'явився різкий кашель з великою кількістю пінистого харкотиння, вислуховуються численні вологі хрипи різного характеру. Яка бойова хімічна речовина була використана супротивником?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Фосген
- ☐ b. Табун
- ☐ c. Зарін
- ☐ d. Люїзит
- ☐ e. Адамсит

Коментар

Правильна відповідь: Фосген

Питання 44

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої доношеної дитини віком 2 дні розвинулося багаторазове блювання з домішками жовчі, наростає здуття живота. Меконіальний стілець відсутній від народження, гази не відходять. Об'єктивно: живіт різко здутий, виражена венозна сітка на передній черевній стінці, контуруються роздуті петлі кишечника, після очисної клізми стул та гази не відходять. Рентгенологічно виявляються розширені та заповнені газом петлі товстої кишки. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Перитоніт новонароджених
- ☐ b. Адрено-генітальний синдром
- ☐ c. Вроджена висока непрохідність кишок
- ☐ d. Вроджена низька непрохідність кишок
- ☐ e. Виразково-некротичний ентероколіт новонародженого

Коментар

Правильна відповідь: Вроджена низька непрохідність кишок

Питання 45

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 38-ми років, що страждає на нирковий туберкульоз, в непритомному стані привезений родичами до районної лікарні. Об'єктивно: кома 1. Гіпотрофія 2 ст. Шкіра та слизові оболонки коричневого кольору з бронзовим полиском. На шкірі спостерігаються окремі осередки вітиліго. АТ-65/0 мм рт.ст., ЧСС – 44 уд/хв. Діагностована гостра надниркова недостатність. Який препарат треба ввести в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Реополіглюкін
- ☐ b. Новодрин
- ☐ c. Адреналін
- ☐ d. Мезатон
- ☐ e. Дексаметазон

Коментар

Правильна відповідь: Дексаметазон

Питання 46

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікарні надійшла дівчинка 14-ти років, яка 2 години тому з суїцидальними намірами випила 100 мл оцту. Дитина притомна, емоційно лабільна. Скарги на біль у роті та епігастрії, спрагу, слинотечу. В ході огляду - слизова оболонка рота гіперемована. Пальпаторно - напруження передньої черевної стінки. Для надання допомоги необхідно:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Викликати штучне блювання
- ☐ b. Промити шлунок розчином соди через зонд
- ☐ c. Не промивати шлунок, ввести активоване вугілля
- ☐ d. Промити шлунок розчином калію перманганату
- ☐ e. Промити шлунок холодною кип'яченою водою через зонд

Коментар

Правильна відповідь: Промити шлунок холодною кип'яченою водою через зонд

Питання 47

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Боець отримав поранення грудної клітки, внаслідок чого у нього розвинувся напружений пневмоторакс. Було надано допомогу у вигляді накладання оклюзійної пов'язки та декомпресії грудної клітки. Боець у свідомості, намагається сісти, мотивуючи це тим, що так йому легше дихати. В якому положенні слід евакуювати пораненого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. На здоровому боці (бік без введенного катетера)
- ☐ b. Положення сидячи (Фовлера)
- ☐ c. На спині
- ☐ d. На животі
- ☐ e. На пошкодженому боці (бік з введенним катетером)

Коментар

Правильна відповідь: Положення сидячи (Фовлера)

Питання 48

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого спостерігаються болі в грудній клітці, які виникли після травми, задишка, слабкість. Об'єктивно: тахіпное, відставання правої половини грудної клітки в диханні, розширені вени шиї. Прогресує дихальна недостатність. Рентгенологічно: відсутність легеневого малюнка правої легені, середостіння зміщене вліво, під час вдиху зміщується вправо. Купол діафрагми зміщений донизу. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Емфізема середостіння
- ☐ b. Закритий пневмоторакс
- ☐ c. Гемопневмоторакс
- ☐ d. Напружений пневмоторакс
- ☐ e. Емболія легеневої артерії

Коментар

Правильна відповідь: Напружений пневмоторакс

Питання 49

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Породіллі в післяпологовому періоді для ушивання розриву промежини II ступеня дали внутрішньовенний наркоз. Під час наркозу виникли аспірація шлункового вмісту та зупинка дихання. Які реанімаційні заходи необхідно виконати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інтубація, санація та лаваж трахеобронхіального дерева
- ☐ б. Дезінтоксикаційна терапія
- ☐ в. Непрямий та прямий масаж серця
- ☐ г. Конікотомія
- ☐ д. Пункція та катетеризація центральних вен

Коментар

Правильна відповідь: Інтубація, санація та лаваж трахеобронхіального дерева

Питання 50

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На фоні гіпертермії та сильного головного болю в дитини 5-ти років виникли зорові галюцинації жахливого змісту, марення, дезорієнтація. Шкіра гіперемована, з дрібною висипкою, рожевого кольору. Шкіра носогубного трикутника бліда, ознаки напруження м'язів потилиці, симптоми Керніга, Брудзинського, поживавлення рефлексів без різниці між сторонами. Який діагноз можна припустити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Деліріозний синдром при черепно-мозковій травмі
- ☐ б. Деліріозний синдром при отруєнні їжею
- ☐ в. Коровий менінгіт із деліріозним синдромом
- ☐ г. Деліріозний синдром при алергічному захворюванні
- ☐ д. Менінгококовий менінгіт з деліріозним синдромом

Коментар

Правильна відповідь: Коровий менінгіт із деліріозним синдромом

Питання 51

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 36-ти років скаржиться на інтенсивний біль у епігастральній ділянці, багаторазове блювання, яке не приносить полегшення, виражену загальну слабкість. Об'єктивно: загальний стан важкий, шкіра та видимі слизові оболонки - бліді, з поодинокими фіолетовими плямами. Рс- 100/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Під час пальпації живота визначається ригідність черевної стінки та різка болючість у епігастральній ділянці на 6 см вище пупка та у лівому реберно-хребетному куті. Пульсація аорти у епігастральній ділянці не визначається. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гострий апендицит
- ☐ б. Перфоративна виразка
- ☐ с. Гострий холецистит
- ☐ d. Гострий панкреатит
- ☐ е. Розшаровуюча аневризма аорти

Коментар

Правильна відповідь: Гострий панкреатит

Питання 52

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 49-ти років потрапив у ДТП. Об'єктивно: стан важкий, міжреберні проміжки згладжені, ліва половина грудної клітки відстає при диханні. Над лівим легеневим полем тимпаніт. Аускультативно: дихання зліва не проводиться, ЧДР- 32/хв. Інші пошкодження відсутні. Як транспортувати потерпілого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. В положенні Волковича на щиті
- ☐ б. В напівсидячому чи напівлежачому положенні
- ☐ с. На правому боці лежачи
- ☐ d. Грудна клітина фіксується шинами Крамера до щита
- ☐ е. На лівому боці лежачи

Коментар

Правильна відповідь: В напівсидячому чи напівлежачому положенні

Питання 53

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий орієнтується, трохи розплющує очі лише у відповідь на прохання, у відповідь на біль виникають цілеспрямовані захисні дії, при звертанні дає правильні, але сповільнені відповіді. Яка оцінка глибини загальнономозкових розладів за шкалою Глазго?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ясна свідомість
- ☐ b. Кома
- ☐ c. Оглушення
- ☐ d. Смерть мозку
- ☐ e. Сопор

Коментар

Правильна відповідь: Оглушення

Питання 54

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 64-х років перебуває на лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби. На момент огляду АТ- 200/110 мм рт.ст., ЧСС- 96/хв. Застосування якого препарату протипоказано в даній ситуації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Рибоксин
- ☐ b. Каптоприл
- ☐ c. Фуросемід
- ☐ d. Добутамін
- ☐ e. Клофелін

Коментар

Правильна відповідь: Добутамін

Питання 55

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

З перших годин життя у новонародженого відзначено задишку і ціаноз. Ліва половина грудної клітки відстає в акті дихання, міжреберні проміжки розширені. Перкуторно: середостіння зміщено праворуч. Живіт човноподібної форми, м'який. На рентгенограмі: множинні просвітлення у вигляді "комірчастої сітки" у лівій плевральній порожнині. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Вроджена напружена кіста легені
- ☐ b. Спонтанний пневмоторакс
- ☐ c. Вроджена діафрагмальна грижа
- ☐ d. Вроджена лобарна емфізема
- ☐ e. Ателектаз легені

Коментар

Правильна відповідь: Вроджена діафрагмальна грижа

Питання 56

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого, який перебуває в гіперглікемічній комі, через 4 години після початку інсулінотерапії раптово розвинулися тахікардія, м'язова гіпотонія; АТ- 80/40 мм рт.ст. На ЕКГ: подовження інтервалу Т, зниження S — Т, розширення і сплюснення Т. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіперкаліємія
- ☐ b. Гіперглікемія
- ☐ c. Гіповолемія
- ☐ d. Гіпокаліємія
- ☐ e. Гіпоглікемія

Коментар

Правильна відповідь: Гіпокаліємія

Питання 57

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Боєць був відкинутий вибуховою хвилею при розриві снаряда та знайдений через 2 години. Стан важкий. Визначається патологічна рухливість та деформація в середній третині правого плеча та верхній третині правого стегна. Вкажіть іммобілізацію при першій лікарській допомозі:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Іммобілізація еластичними бинтами
- ☐ б. Іммобілізація положенням
- ☐ в. Іммобілізація кінцівок за допомогою підручних засобів
- ☐ г. Іммобілізація правого плеча драбинчастою шиною, правого стегна - шиною Дітерікса
- ☐ д. Іммобілізація стандартними гіпсовими пов'язками

Коментар

Правильна відповідь: Іммобілізація правого плеча драбинчастою шиною, правого стегна - шиною Дітерікса

Питання 58

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 8-ми років протягом тижня скаржиться на головний біль, втомлюваність. В анамнезі: бронхоаденіт у 4 роки. Стан погіршився, t- 37,80С. Об'єктивно: дитина лежить на боці з приведеними до тулуба ногами, голова закинута. Ригідність м'язів потилиці, симптом Керніга. Ліквор прозорий, через 12 годин на поверхні утворилася плівка. Який найбільш імовірний діагноз?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Пневмококовий менінгіт
- ☐ б. Менінгококовий менінгіт
- ☐ в. Туберкульозний менінгіт
- ☐ г. Туберкульозний енцефаліт
- ☐ д. Стрептококовий менінгіт

Коментар

Правильна відповідь: Туберкульозний менінгіт

Питання 59

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної з терміном 38 тижнів, що лежить на спині, раптово з'явилося утруднене дихання, блідість шкірних покривів, холодний липкий піт, знизився АТ. Яка тактика надання невідкладної допомоги? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Провести кисне терапію
- ☐ б. Вкласти пацієнтку на лівий бік
- ☐ в. Почати інфузійну терапію
- ☐ г. Ввести глюкокортикоїди
- ☐ д. Ввести адреноміметики

Коментар

Правильна відповідь: Вкласти пацієнтку на лівий бік

Питання 60

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До дільничного лікаря звернулася жінка 55-ти років зі скаргами на біль у лівій гомілці, розширення вен, набряк. Об'єктивно: гомілка багряно-синюшного кольору, гаряча на дотик, пульсація на артеріях кінцівки збережена. Яка тактика лікаря? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Призначити туге бинтування
- ☐ б. Спостерігати у динаміці
- ☐ в. Направити на консультацію до ангіохірурга
- ☐ г. Госпіталізувати до терапевтичного відділення
- ☐ д. Призначити гепаринотерапію

Коментар

Правильна відповідь: Направити на консультацію до ангіохірурга

Питання 61

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До лікаря загальної практики - сімейної медицини - звернулася пацієнтка, яку два дні тому, при спробі погодувати, вкусив собака. Пацієнтка повідомила, що собака належить сусідові, живе у вольєрі, розміщеному на огороженому подвір'ї. В регіоні не зареєстровано випадків сказу серед домашніх тварин, однак були випадки захворювання на цю недугу лисиць. Визначте тактику лікаря: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Негайно ввести антирабічний імуноглобулін
- ☐ b. Негайно обколоти рану антирабічним імуноглобуліном
- ☐ c. Встановити ветеринарне спостереження за собакою впродовж 10 діб
- ☐ d. Встановити вакцинальний статус собаки
- ☐ e. Дослідити слину собаки на наявність вірусу сказу

Коментар

Правильна відповідь: Встановити ветеринарне спостереження за собакою впродовж 10 діб

Питання 62

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 28-ми років, вагітність 30 тижнів, перебувала вдома. Мала набряки гомілок 1 ступеня. Раптово поскаржилася на головний біль та втратила свідомість. На момент огляду констатовано опістотонус, голова закинута, зіниці розширені, дихання відсутнє, язика прикушено, пульс визначити важко. Яка стадія еклампсії у хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Прееклампсія
- ☐ b. Період тонічних судом
- ☐ c. Передсудомний період
- ☐ d. Період розрешення нападу
- ☐ e. Позасудомний період

Коментар

Правильна відповідь: Період тонічних судом

Питання 63

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 2-х місяців спостерігаються жовтяничність шкіри, склер, лихоманка. Дитина загальмована, задишка, тахікардія. Печінка +2,5 см. Сеча темна, кал світлий. З анамнезу: дитина у ранньому неонатальному віці перенесла гемолітичну хворобу новонароджених, операцію замінного переливання крові. Яка найбільш імовірна причина, що обумовила стан дитини?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Синдром "жовчної пробки"
- ☐ b. Гемолітична хвороба
- ☐ c. Тирозинемія
- ☐ d. Атрезія жовчних ходів
- ☐ e. Гепатит

Коментар

Правильна відповідь: Гепатит

Питання 64

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У породіллі на другому тижні післяпологового періоду спостерігається субінволюція матки, кров'янисті виділення. Під час піхвового дослідження виявляється збільшення, болючість та пом'якшення матки; на бокових поверхнях матки пальпуються звивисті, щільні, болючі тяжі. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Тромбофлебіт вен матки
- ☐ b. Ендартеріїт
- ☐ c. Параметрит
- ☐ d. Ендометрит
- ☐ e. Панметрит

Коментар

Правильна відповідь: Тромбофлебіт вен матки

Питання 65

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий скаржиться на головний біль, біль у ділянці серця, нудоту, сухість у роті, безсоння. Об'єктивно: обличчя гіперемоване, тремор язика та пальців рук, хода некоординована, підвищена пітливість, настрій різко знижений. Зловживає спиртними напоями, протягом останньої доби алкоголь не вживав. Визначте психопатологічний синдром:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Астенічний
- ☐ б. Аментивний
- ☐ в. Депресивний
- ☐ г. Деліріозний
- ☐ ґ. Абстинентний

Коментар

Правильна відповідь: Абстинентний

Питання 66

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На прийомі в жіночій консультації вагітна з терміном вагітності 18 тижнів, у якої після значного фізичного навантаження з піхви з'явилася помірна кровотеча, що поступово зменшується. Яка подальша тактика лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Негайно викликати машину швидкої медичної допомоги і у супроводі лікаря доставити до пологового будинку
- ☐ б. Рекомендувати гемостатичну терапію
- ☐ в. Призначити токолітики
- ☐ г. Призначити ліжковий режим та відправити вагітну додому
- ☐ ґ. Внутрішньом'язово ввести спазмолітики

Коментар

Правильна відповідь: Негайно викликати машину швидкої медичної допомоги і у супроводі лікаря доставити до пологового будинку

Питання 67

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 12-ти років з нервово-артритичним діатезом після вживання в їжу значної кількості м'яса з кетчупом раптово виник гострий переймоподібний біль у животі та попереку, який іррадіює у статеві органи. При сечовипусканні отримано каламутну сечу з домішками крові. Найбільш імовірна причина гематурії?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Геморагічний цистит
- ☐ б. Нефритичний синдром
- ☐ в. Ниркова колька
- ☐ г. Травматичне ушкодження сечовивідних шляхів
- ☐ ґ. Гострий гломерулонефрит

Коментар

Правильна відповідь: Ниркова колька

Питання 68

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 10-ти років зупинена артеріальна кровотеча (плечова артерія) через 10 хвилин після травми. При надходженні АТ- 90/50 мм рт.ст., еритроцити - $2,5 \cdot 10^{12}/л$, Hb- 60 г/л. Раніше при переливанні цільної крові була анафілактоїдна реакція. Який препарат крові найбільш безпечний для корекції крововтрати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Цільна кров
- ☐ б. Еритроцитарна маса
- ☐ в. Лейкоконцентрат
- ☐ г. Відмиті еритроцити
- ☐ ґ. Свіжозаморожена плазма

Коментар

Правильна відповідь: Відмиті еритроцити

Питання 69

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікар швидкої медичної допомоги прибув на місце пригоди та знайшов потерпілого від електротравми у непритомному стані. Людина лежала горілиць, біля потерпілого був електричний дріт під напругою 2 кВ. Якими рухами найдоцільніше наблизитися лікарю до хворого? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Плазуючи
- ☐ b. Одразу підбігти
- ☐ c. Чекати вимкнення електроструму
- ☐ d. Великими кроками
- ☐ e. Стрибками на двох ногах

Коментар

Правильна відповідь: Стрибками на двох ногах

Питання 70

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення лікарні звернувся постраждалий у стані легкого алкогольного сп'яніння зі скаргами на порушення зору, що виникли після вживання спиртного. Найбільш імовірний діагноз: Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Гострий напад глаукоми
- ☐ b. Отруєння етанолом
- ☐ c. Отруєння етиленгліколем
- ☐ d. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ e. Отруєння метанолом

Коментар

Правильна відповідь: Отруєння метанолом

Питання 71

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 83-х років, що перебуває в палаті інтенсивної терапії з приводу загострення ішемічної хвороби серця, раптом втратив свідомість. Зафіксовано клінічну смерть. Вкажіть цільові значення сатурації киснем артеріальної крові (SpO₂) постраждалого після повернення спонтанного кровообігу:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 91-93%
- ☐ b. 100%
- ☐ c. 86-90%
- ☐ d. 85%
- ☐ e. 96-98%


Коментар

Правильна відповідь: 96-98%

Питання 72

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До хворого 35-ти років викликано бригаду швидкої допомоги. Скарги на гострий нестерпний біль у поперековій і правій пахвинній ділянці, статевих органах і правій нозі, нудоту, блювання. При огляді: хворий неспокійний, живіт напружений. Незначна болючість в правій здухвинній ділянці при глибокій пальпації. Позитивний симптом Пастернацького справа. Дизурія. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ниркова коліка
- ☐ b. Гострий холецистит
- ☐ c. Печінкова коліка
- ☐ d. Гострий панкреатит
- ☐ e. Кишкова коліка


Коментар

Правильна відповідь: Ниркова коліка

Питання 73

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 26-ти років неадекватно себе поводить, звернувся до відділку міліції з вимогами, щоб його передали до суду, оскільки він відчуває себе винним за розповсюдження зла та насильства у світі. Співробітникам міліції вдалося встановити особу чоловіка, зв'язатися з його родичами, які повідомили, що за останні 5 років хворий неодноразово лікувався у психіатричних закладах. При огляді збуджений, легко стає злобливим, підозрілим. Стверджує, що голос всередині голови говорить: "я заслуговую на смерть". Який тип психомоторного збудження у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Маніакальне
- ☐ b. Кататонічне
- ☐ c. Психопатичне
- ☐ d. Галюцинаторно-параноїдне
- ☐ e. Депресивне


Коментар

Правильна відповідь: Галюцинаторно-параноїдне

Питання 74

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До інфекційного відділення надійшов хворий 20-ти років з ознаками дегідратації III ступеня. Спостерігаються судоми, блювання фонтаном, різке зниження артеріального тиску, тахікардія, температура тіла - 35,50C. З якою швидкістю треба проводити в/в інфузію для відновлення водно-електролітного балансу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 30-50 мл/хв.
- ☐ b. Швидкість не має значення
- ☐ c. 100-120 мл/хв.
- ☐ d. 80-100 мл/хв.
- ☐ e. 50-80 мл/хв.

Коментар

Правильна відповідь: 100-120 мл/хв.

Питання 75

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 38-ми років протягом тривалого часу відчував зубний біль. Згодом з'явилися біль голови і ока, загальна слабкість, підвищилася температура тіла. Об'єктивно: хемоз кон'юнктиви, застійна ін'єкція очного яблука, екзофтальм, обмеження рухів очного яблука. В крові: лейкоцитоз, ШОЕ- 24 мм/год. На рентгенограмі орбіт патології не виявлено. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Целюліт орбіти
- ☐ b. Ретробульбарний крововилив
- ☐ c. Запальний псевдотумор орбіти
- ☐ d. Флегмона орбіти
- ☐ e. Теноніт

Коментар

Правильна відповідь: Флегмона орбіти

Питання 76

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 15-річного хлопчика діагностовано бубонну форму чуми. Які антибактеріальні препарати слід призначити дитині?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Бісептол або сульфален
- ☐ b. Тетрациклін або доксициклін
- ☐ c. Гентаміцин або нетроміцин
- ☐ d. Стрептоміцин або хлорамфенікол
- ☐ e. Пеніцилін або цефотаксим

Коментар

Правильна відповідь: Стрептоміцин або хлорамфенікол

Питання 77

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 15-ти років доставлена непритомною до приймального відділення бригадою швидкої допомоги у супроводі батьків. Хворий потребує негайної допомоги і госпіталізації у ВРІТ. Чи потрібно лікарю отримати згоду на медичне втручання?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Батьки мають право вибору методів медичного втручання
- ☐ б. Батьки можуть відмовитись від надання допомоги
- ☐ с. Медичне втручання особам від 15 до 18 років проводиться за їх згодою
- ☐ d. В даному випадку згода не потрібна
- ☐ е. Лікар зобов'язаний пояснити пацієнтові в доступній формі методи і об'єм медичного втручання


Коментар

Правильна відповідь: В даному випадку згода не потрібна

Питання 78

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 38-ми років скаржиться на біль у міжлопатковій ділянці, болісність рухів тулубу. Травма була отримана внаслідок ДТП, потерпілий - пасажир, було пряме зіткнення автомобілів. Під час огляду - збільшений кіфоз грудного відділу хребта. Якою повинна бути транспортна іммобілізація хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Шина Белера
- ☐ б. На медичних ношах
- ☐ с. Комір Шанса
- ☐ d. Сидячи
- ☐ е. На дерев'яному щіті з м'яким валиком в поперековому та шийному відділах хребта


Коментар

Правильна відповідь: На дерев'яному щіті з м'яким валиком в поперековому та шийному відділах хребта

Питання 79

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

З вогнища радіаційної катастрофи до медичного пункту полку доставлено 15 потерпілих. Через 20-25 хвилин після вибуху потерпілі стали відчувати різку слабкість, запаморочення, нудоту, розвинулося невпинне блювання. Стан хворих тяжкий. Кволі, апатичні, на запитання відповідають з великою затримкою. ЧСС- 120/хв. 3 частими екстрасистолами, АТ- 70/30 мм рт.ст., ЧД- 28/хв. За даними індивідуального дозиметра доза отриманого випромінювання склала 8 Гр. Якій стадії гострої променевої хвороби відповідає наведена симптоматика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. II
- ☐ b. V
- ☐ c. IV
- ☐ d. III
- ☐ e. I


Коментар

Правильна відповідь: IV

Питання 80

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У приміщенні аеропорту під час оформлення квитків пасажир 63-х років раптово знепритомнів, ознак кровообігу та дихання не має. Оточуючими розпочато проведення реанімаційних заходів згідно стандарту В^8: закритий масаж серця та штучна вентиляція легень. Яким заходом потрібно доповнити реанімацію?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Внутрішньовенне введення 1,0 мл 0,1% розчину адреналіну
- ☐ b. Внутрішньовенне введення 10 мл розчину аміодарону
- ☐ c. Проведення прекардіального удару
- ☐ d. Використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора
- ☐ e. Проведення інтубації трахеї

Коментар

Правильна відповідь: Використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора

Питання 81

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінку 77-ми років доставлено до лікарні непритомною. Неврологічний статус: лівобічна параплегія. Протромбін за Квіком становить 108%. На КТ-сканах відзначається: у правій півкулі головного мозку ділянка з нерівномірним зниженням оптичної щільності. Який патологічний стан розвинувся у пацієнтки?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Ішемічний інсульт
- ☐ b. Субарахноїдальний крововилив
- ☐ c. Метастази у головний мозок
- ☐ d. Геморагічний інсульт
- ☐ e. Менінгоенцефаліт

Коментар

Правильна відповідь: Ішемічний інсульт

Питання 82

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинку 5-ти років на вулиці вкусила кішка. В ході огляду рани виявлено незначне пошкодження шкірних покривів. Першочергові дії лікаря?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Промити рану антисептиком, накласти пов'язку
- ☐ b. Госпіталізація
- ☐ c. Вакцинація проти сказу і правця
- ☐ d. Обробити рану розчином йоду
- ☐ e. Промити рану стерильним ізотонічним розчином

Коментар

Правильна відповідь: Промити рану антисептиком, накласти пов'язку

Питання 83

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінці 28-ми років виконано кесарів розтин за показаннями слабкості пологової діяльності. Під час операції крововтрата склала 1200 мл та була негайно відновлена переливанням еритроцитарної маси у кількості 350 мл, плазми 800 мл, кристалоїдів - 1500 мл. Після операції виведена сеча у кількості 150 мл бурого кольору. При лабораторному дослідженні у сечі кров'яний детрит. Яке виникло ускладнення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Характеризує початок розвитку ДВЗ синдрому
- ☐ б. Ушкодження сечоводу
- ☐ в. Ушкодження сечового міхура
- ☐ г. Ускладнень немає
- ☐ д. Переливання несумісної крові


Коментар

Правильна відповідь: Переливання несумісної крові

Питання 84

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 51-го року доставлений до відділення кардіореанімації (інтенсивної терапії), скаржиться на тривалий пекучий за грудинний біль, який виник 40 хвилин тому, задишку. Об'єктивно: в легенях - дихання з жорстким відтінком, тони серця різко ослаблені, АТ- 110/70 мм рт.ст. На ЕКГ виявлено підйом сегменту ST на 5 мм над ізолінією у відведеннях I, V1 — V4 та депресію сегмента ST у відведеннях III і aVF. Який препарат потрібно застосувати у даній ситуації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Альтеплаза
- ☐ б. Аміодарон
- ☐ в. Нітрогліцерин
- ☐ г. Добутамін
- ☐ д. Метопролол

Коментар

Правильна відповідь: Альтеплаза

Питання 85

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 7-ми років внаслідок падіння з турніка виник біль у лівому підребер'ї. Ультразвукове дослідження дозволяє припустити розрив селезінки в ділянці воріт та кровотечу. Який метод лікування показаний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Лапаротомія, перев'язка артерії селезінки
- ☐ б. Переливання еритроцитарної маси
- ☐ в. Спленектомія
- ☐ г. Динамічне спостереження за хворим
- ☐ д. Лапароцентез, страхувальний дренаж

Коментар

Правильна відповідь: Спленектомія

Питання 86

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Бригадою ШМД доставлено хвору 28-ми років, яка отримала травму після падіння з 3-го поверху. Хвора притомна, здатна до контакту. Скарги на болі в спині. ЧСС-92/хв., АТ- 125/60 мм рт.ст. Яку маніпуляцію обов'язково треба провести?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Плевральна пункція з обох боків
- ☐ б. Катетеризація сечового міхура
- ☐ в. Накладання комірця Шанца до виключення перелому шийного відділу хребта
- ☐ г. Катетеризація периферичної вени
- ☐ д. Встановлення катетера Сванца-Ганса

Коментар

Правильна відповідь: Накладання комірця Шанца до виключення перелому шийного відділу хребта

Питання 87

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Студент 24-х років скаржиться на ядуху, гавкаючий кашель, свербіння шкіри після прийому анальгін у анамнезі - кропивниця. Об'єктивно: набряк обличчя. Дихання гучне. Міжреберні проміжки втягуються на вдиху. Над легеньми стридорозне дихання. АТ-115/70 мм рт.ст. Який препарат необхідно ввести хворому?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Преднізолон
- ☐ б. Кордіамін
- ☐ в. Атровент
- ☐ г. Димедрол
- ☐ д. Морфін


Коментар

Правильна відповідь: Преднізолон

Питання 88

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 72-х років раптово розвинулось блювання кров'ю з крововтратою до 1,0 л. Об'єктивно: АТ- 70/40 мм рт.ст., ЧСС- 112/хв. ЦВТ- 0. Які інфузійні середовища першочергово треба застосувати для лікування?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Жирові емульсії
- ☐ б. Колоїдні розчини
- ☐ в. Кристалоїдні розчини
- ☐ г. Свіжозаморожена плазма
- ☐ д. Розчини глюкози


Коментар

Правильна відповідь: Кристалоїдні розчини

Питання 89

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Щільність забруднення ґрунту радіонуклідами аварійного викиду ядерного реактора складає: для цезію-137 більше 15 Кі/км², для стронцію-90 більше 3 Кі/км², для плутонію-239 більше 0,1 Кі/км². Дози опромінення населення перевищують 5 мЗв/рік. До якої зони слід віднести таку територію? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Дози х-опромінення не перевищують дозволений рівень
- ☐ б. За даних умов потрібна профілактична обробка населення та приміщень
- ☐ в. Потрібно провести йодну профілактику
- ☐ г. Зона безумовного (обов'язкового) відселення
- ☐ д. Використовуються укриття та засоби захисту органів дихання та шкірного покриву


Коментар

Правильна відповідь: Зона безумовного (обов'язкового) відселення

Питання 90

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 11-ти років протягом 30-ти хвилин на тлі непритомності спостерігаються напади судом у вигляді тонічного напруження м'язів обличчя, розгиначів кінцівок, яке змінюється короткими посмикуваннями різних м'язових груп тулуба і кінцівок з відхиленням очних яблук вгору і в бік. Який найбільш імовірний попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Епілептична реакція
- ☐ б. Судомна реакція
- ☐ в. Генералізований епілептичний статус
- ☐ г. Судомний напад неуточненого ґенезу
- ☐ д. Епілептичний синдром

Коментар

Правильна відповідь: Генералізований епілептичний статус

Питання 91

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Травмований мотоцикліст лежить на проїжджій частині дороги. Ліве стегно його деформоване в нижній третині, через зовнішню рану фонтанує кров. Де і який кровоспинний джгут необхідно застосувати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Артеріальний джгут в верхній третині стегна
- ☐ б. Артеріальний джгут в середній третині стегна
- ☐ в. Венозний джгут на верхню третину гомілки
- ☐ г. Венозний джгут безпосередньо над раною
- ☐ д. Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна


Коментар

Правильна відповідь: Артеріальний джгут безпосередньо над раною стегна

Питання 92

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На другу добу після субтотальної резекції щитоподібної залози з приводу дифузного токсичного зобу у хворої з'явилися тонічні судоми пальців ("рука акушера"), позитивні симптоми Хвостека, Вейса, Труссо. Яке ускладнення операції виникло?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпопаратиреоз
- ☐ б. Анафілактичний шок
- ☐ в. Асфіксія
- ☐ г. Тиреотоксичний криз
- ☐ д. Інфаркт міокарда


Коментар

Правильна відповідь: Гіпопаратиреоз

Питання 93

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У підвальному приміщенні знайдено хлопчика 6-ти років. Права нижня кінцівка на рівні нижньої третини стегна придавлена металевими дверима. Нога холодна на дотик, бліда з синюшним відтінком, щільний набряк, тактильна та больова чутливість різко знижені. Пульс на дистальних відділах кінцівки відсутній. Нестерпні ішемічні болі в м'язах правої ноги. Який з невідкладних заходів необхідно надати першочергово?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. В/в крапельно 4% розчин гідрокарбонату натрію
- ☐ б. В/м 0,1 % - 0,6 мл промедолу
- ☐ в. Накласти джгут вище місця стиснення кінцівки
- ☐ г. В/в крапельно реополіглюкін
- ☐ ґ. П/ш гепарин 100-150 од/кг м.т./добу


Коментар

Правильна відповідь: Накласти джгут вище місця стиснення кінцівки

Питання 94

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілих внаслідок аварії, що супроводжувалася вибоєм брону, спостерігаються нежить, слюзотеча, відчуття стискання в грудях, носова кровотеча. Яка антидотна терапія показана хворим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Натрію гіпосульфід
- ☐ б. Унітіол
- ☐ в. Атропіну сульфат
- ☐ г. Метиленовий синій
- ☐ ґ. Прозерин


Коментар

Правильна відповідь: Натрію гіпосульфід

Питання 95

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У породіллі 29-ти років, з групою крові А (II) Rh позитивною, через 40 хвилин після трансфузії еритроцитарної маси у зв'язку з післяпологовою кровотечею з'явилися симптоми післятрансфузійного ускладнення: болі в поперековій області і ділянці серця, остуда, тахікардія, гіпотонія, блідість шкіри, гематурія, гемоліз. Що, найімовірніше, стало причиною такого ускладнення?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Недооблік протипоказань до гемотрансфузії
- ☐ б. Трансфузія недоброякісної крові
- ☐ в. Недоліки в техніці гемотрансфузії
- ☐ г. Невідповідні показання до гемотрансфузії
- ☐ е. Переливання крові, несумісної за АВ0-системою


Коментар

Правильна відповідь: Переливання крові, несумісної за АВ0-системою

Питання 96

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 46-ти років скаржиться на підйом температури до 38°C, біль за грудиною. В анамнезі апластична анемія. 1,5 години тому була проведена трансфузія еритроцитарної маси. Об'єктивно: ЧСС- 110/хв., ритм правильний, ЧДД- 21/хв., АТ- 160/80 мм рт.ст. Тони серця приглушені, ритм правильний, акцент II тона над легеневою артерією. У крові: лейкоц.- 9, 2 • 10⁹/л, НЬ- 67 г/л, ретикулоцити - 2%, ер.- 3, 7 • 10¹²/л, ШОЕ- 57 мм/год. Яке найбільш імовірне ускладнення? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Анафілактичний шок
- ☐ б. Гострий лейкоз
- ☐ в. Ретикулоцитарний криз
- ☐ г. Гемотрансфузійний шок
- ☐ е. Травматичний шок

Коментар

Правильна відповідь: Гемотрансфузійний шок

Питання 97

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна з терміном 32 тижні страждає на міастенію. З'явилися розлади дихання, тахікардія, психомоторне збудження, яке чергується з млявістю, апатією, парезом кишечника та сфінктерів. Першочергові заходи невідкладної допомоги:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Профілактика гіпоксії плоду
- ☐ б. Призначення прозерину
- ☐ в. Введення транквілізаторів
- ☐ г. Термінове розродження
- ☐ ґ. ШВЛ с застосуванням міорелаксантів курареподібної дії

Коментар

Правильна відповідь: Призначення прозерину

Питання 98

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час спортивного змагання на стадіоні виникла бійка між вболівальниками. Постраждало більше ніж 50 осіб, які отримали переважно поєднані травми різного ступеня важкості. Де надаватиметься перша долікарська допомога постраждалим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. В закладі другого рівня
- ☐ б. В закладі третього рівня
- ☐ в. На сортувальному майданчику на гральному полі або на площі перед стадіоном
- ☐ г. В приймальному відділенні
- ☐ ґ. В машині ШМД


Коментар

Правильна відповідь: На сортувальному майданчику на гральному полі або на площі перед стадіоном

Питання 99

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 9-ти років, яка хворіє на цукровий діабет, на тлі кишкової інфекції виникли і наростають неврологічні симптоми: порушення орієнтації, галюцинації, фокальні судоми. Наявні ознаки дегідратації III ступеня, дихальних порушень немає, запах ацетону відсутній. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіперосмолярна кома
- ☐ б. Діабетична кетоацидотична кома
- ☐ в. Пухлина головного мозку
- ☐ г. Енцефаліт
- ☐ д. Гіпоглікемічна кома


Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

Питання 100

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитину 3-х років каретою швидкої допомоги доставлено до стаціонару. На момент надходження температура тіла 38,0°C, двічі блювання, скарги на болі в області живота, сон порушений, відмовляється від їжі, випорожнення без особливостей. В ході огляду у дитини спостерігаються явища токсикозу, не контактна, ригідність потиличних м'язів. Який попередній діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гострий апендицит
- ☐ б. Глистна інвазія
- ☐ в. Муковісцидоз
- ☐ г. Гострий менінгіт
- ☐ д. Інвагінація кишечника


Коментар

Правильна відповідь: Гострий менінгіт

Питання 101

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хлопчика 15-ти років раптово підвищилася температура тіла до 39,50С, виник біль у горлі під час ковтання. На другу добу на обличчі, шиї, верхній частині тулуба на тлі гіперемованої шкіри тулуба виник дрібнокрапковий розеолезний висип з блідим носогубним трикутником. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Краснуха
- ☐ b. Вітряна віспа
- ☐ c. Кір
- ☐ d. Скарлатина
- ☐ e. Інфекційний мононуклеоз


Коментар

Правильна відповідь: Скарлатина

Питання 102

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Постраждалий 42-х років, виявлений на місці ДТП, скаржиться на біль у ділянці таза та правого стегна. Об'єктивно: загальмований, стогне, шкіра бліда, язик сухий. ЧДР- 28/хв. Праве стегно деформоване, набрякле, у верхній його третині патологічна рухливість, крепітація кісткових уламків. Великий крововилив, набряк та біль під час пальпації в правих пахвинній, здухвинній та сідничній ділянках. PS- 112/хв., АТ-80/45 мм рт.ст. Якому ступеню травматичного шоку відповідає стан потерпілого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. ІУ
- ☐ b. ІІ
- ☐ c. І
- ☐ d. ІІІ

Коментар

Правильна відповідь: ІІ

Питання 103

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 53-х років, хворого на цукровий діабет II типу, розвинулася кома. Глікемія - 36 ммоль/л, калій – 4,4 ммоль/л, натрій - 160 ммоль/л, рН крові - 7,24, стандартний бікарбонат - 20 ммоль/л, зсув буферних основ - 4 ммоль/л, сечовина - 16 ммоль/л. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Діабетичний кетоацидоз
- ☐ б. Гостра серцева недостатність
- ☐ в. Гіперосмолярна кома
- ☐ г. Гіпоглікемічна кома
- ☐ е. Гіперлактацидемічна кома

Коментар

Правильна відповідь: Гіперосмолярна кома

Питання 104

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 45-ти років поступив у відділення зі скаргами на пекучий біль, сильне розпирання тканин пальців обох стоп. Об'єктивно: пухирі, наповнені геморагічною рідиною; після зняття пухирів видно некротизовану шкіру, яка є нечутливою і неbolючою. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Термічний опік III А ступеня
- ☐ б. Відмороження II ступеня
- ☐ в. Відмороження I ступеня
- ☐ г. Відмороження III ступеня
- ☐ е. Термічний опік II ступеня

Коментар

Правильна відповідь: Відмороження III ступеня

Питання 105

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий, моряк закордонного плавання, звернувся зі скаргами на підвищення температури до 40°C, кашель з пінистим іржавим харкотинням. Об'єктивно: блідий, ціаноз слизових, ЧД- 30/хв., тахікардія. Дихання в легенях ослаблене, поодинокі вологі хрипи, крепітація. Попередній діагноз: чума, первинно-легенева форма. Які методи специфічної діагностики?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Посів не потрібен
- ☐ b. Використання вірусологічного метода
- ☐ c. Посів на анаеробні середовища
- ☐ d. Посів на кров'яний агар
- ☐ e. Шкірно-алергічна проба


Коментар

Правильна відповідь: Посів на кров'яний агар

Питання 106

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 30-ти років в ході огляду в поліклініці терапевтом виявлено ножове поранення правої половини живота. Живіт м'який, біль відсутній. В крові: НЬ-140 г/л, лейкоц.- $6,8 \cdot 10^9$ /л. Яку тактику слід обрати лікарю?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Призначити рентгенографію органів черевної порожнини
- ☐ b. Амбулаторне лікування
- ☐ c. Направити постраждалого до хірургічного стаціонару
- ☐ d. Призначити УЗД органів черевної порожнини
- ☐ e. Направити на планове лікування до хірургічного відділення

Коментар

Правильна відповідь: Направити постраждалого до хірургічного стаціонару

Питання 107

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вночі у хворого з'явилися задуха, кашель з рясним харкотинням рожевого кольору. З анамнезу: страждає на гіпертонічну хворобу, варикозне розширення вен обох кінцівок, 2 роки тому переніс інфаркт міокарда. Об'єктивно: неспокійний, положення ортопное, акроціаноз, ЧДР- 40/хв. АТ- 220/110 мм рт.ст. У легенях - різнокаліберні середньо- і великопухирчасті хрипи. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Астматичний статус
- ☐ b. Крупозна пневмонія
- ☐ с. Гостра лівошлуночкова недостатність
- ☐ d. Легенева кровотеча
- ☐ е. Тромбоемболія легеневої артерії


Коментар

Правильна відповідь: Гостра лівошлуночкова недостатність

Питання 108

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 6-ти років госпіталізована до дитячого відділення з бронхопневмонією. Страждає на atopічний дерматит. Після внутрішньом'язового введення ампіциліну з'явилися відчуття стиснення у грудях, запаморочення, різка блідість, ціаноз, холодний піт, прискорене шумне дихання. Який з перерахованих препаратів слід ввести в маніпуляційній негайно?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Розчин еуфіліну внутрішньовенно
- ☐ b. Розчин строфантину внутрішньовенно
- ☐ с. Розчин адреналіну підшкірно
- ☐ d. Розчин тавегілу внутрішньовенно
- ☐ е. Розчин преднізолону внутрішньовенно


Коментар

Правильна відповідь: Розчин адреналіну підшкірно

Питання 109

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 50-ти років, що перебуває у інфарктному відділенні з трансмуральним інфарктом, раптово знепритомнів. Об'єктивно: зупинка серцевої діяльності та дихання, електромеханічна дисоціація. Розпочато серцево-легеневу реанімацію. Які наступні дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Внутрішньовенне введення новокаїнамід
- ☐ б. Внутрішньовенне введення строфантину
- ☐ с. Внутрішньосерцеве введення адреналіну
- ☐ d. Внутрішньовенне введення лідокаїну
- ☐ е. Дефібриляція


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньосерцеве введення адреналіну

Питання 110

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До приймального відділення доставлено хворого у непритомному стані після ДТП. Після огляду спеціалістів діагностовані переломи кінцівок, забій передньої черевної стінки з імовірністю ушкодження внутрішніх органів черевної порожнини. Який додатковий метод обстеження найбільш доцільний у цій ситуації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Лапароскопія
- ☐ b. УЗД
- ☐ с. Ендоскопія
- ☐ d. Комп'ютерна томографія
- ☐ е. Оглядова рентгеноскопія черевної порожнини


Коментар

Правильна відповідь: Лапароскопія

Питання 111

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На хімічному підприємстві, у закритому цеху, стався вибух резервуара з азотною кислотою. 17 потерпілих працівників терміново наділи протигази та були виведені з зони ураження. Стан робітників задовільний. Якими мають бути подальші тактичні заходи у даному випадку? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Госпіталізація у відділення загального профілю без санітарної обробки
- ☐ б. Повна санітарна обробка, термінова госпіталізація у відділення інтенсивної терапії
- ☐ в. Повна санітарна обробка, антидот перорально, евакуація до відділення загального профілю
- ☐ г. Часткова санітарна обробка, евакуація до відділення загального профілю
- ☐ д. Повна санітарна обробка, амбулаторне спостереження


Коментар

Правильна відповідь: Часткова санітарна обробка, евакуація до відділення загального профілю

Питання 112

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вантажник 36-ти років був притиснутий бортом автомобіля до стіни у ділянці грудної клітки. Скарги на загальну слабкість, задишку, біль і відчуття важкості в грудній клітці з боку ураження. Об'єктивно: блідість шкіри, тахікардія, пульс слабого наповнення, артеріальний тиск знижений, симптоми недостатності дихання. Вкажіть обсяг первинної лікарської допомоги: Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Катетеризація центральної вени, інфузійна терапія
- ☐ б. Серцеві глікозиди, дихальні аналептики
- ☐ в. Негайна госпіталізація до травматологічного відділення
- ☐ г. Напівсидяче положення, анальгетики, інгаляція кисню
- ☐ д. Плевральна пункція у VII міжребер'ї


Коментар

Правильна відповідь: Напівсидяче положення, анальгетики, інгаляція кисню

Питання 113

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 8-ми років підвищення температури до 39,0°C, нежить зі значними гнійними виділеннями, вологий кашель, кон'юнктивіт з гнійними виділеннями, світлобоязнь. На слизовій оболонці щік білуваті ділянки висівкоподібно злученого епітелію. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Грип
- ☐ б. Корова краснуха
- ☐ в. Кір
- ☐ г. Висипний тиф
- ☐ д. Скарлатина


Коментар

Правильна відповідь: Кір

Питання 114

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 36-ти років скаржиться на неможливість самотійного сечовипускання при наявності покликів. З години тому - падіння в каналізаційний люк з забоєм промежини. Об'єктивно: виділення крові з зовнішнього отвору сечівника, помірно виражена гематома промежини. Ознаків переломів немає. Яка подальша лікувальна тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Пункційна цистостомія
- ☐ б. Однократна катетеризація
- ☐ в. Стимуляція діурезу
- ☐ г. Встановлення постійного катетера
- ☐ д. Відкрите накладення цисто стоми


Коментар

Правильна відповідь: Пункційна цистостомія

Питання 115

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 47-ми років 3 дні тому з'явилися помірний біль у горлі, кашель, захриплість голосу, температура 37,80С, поступово наросла інспіраторна задишка, кашель став афонічним. Об'єктивно: стан важкий, неспокійна, шкіра бліда з ціанотичним відтінком. В акті дихання бере участь допоміжна мускулатура. На мигдаликах, з розповсюдженням на піднебінні дужки, нальоти сірувато-білого кольору. Яку терапію слід призначити? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Специфічна сироватка, антибіотики
- ☐ б. ГБО, специфічна сироватка
- ☐ в. Селективні β_2 --адреноміметики, специфічна сироватка
- ☐ г. Глюкокортикостероїди, антибіотики
- ☐ е. ШВЛ, специфічна сироватка, антибіотики


Коментар

Правильна відповідь: ШВЛ, специфічна сироватка, антибіотики

Питання 116

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 45-ти років непокоять багаторазове блювання, затримка випорожнень і газів, болісна припухлість. Об'єктивно: у правій пахвинній ділянці визначається випинання розмірами до 6 см у діаметрі, різко болісне, шкіра над ним змінена. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Пахвинний лімфаденіт
- ☐ б. Защемлена пахвинна грижа
- ☐ в. Гострий тромбофлебіт поверхневих вен правого стегна
- ☐ г. Гострий апендицит
- ☐ е. Тромбоз мезентеріальних судин


Коментар

Правильна відповідь: Защемлена пахвинна грижа

Питання 117

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілого 33-х років через 3 години після землетрусу доставлено до клініки. Об'єктивно: відірвана верхня права кінцівка, кукса під джгутом. АТ- 60/30 мм рт.ст., ЧСС- 140/хв. Який ступінь шоку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. II
- ☐ b. У
- ☐ c. I
- ☐ d. III
- ☐ e. ІУ


Коментар

Правильна відповідь: III

Питання 118

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора після згвалтування виконує багато хаотичних рухів, кричить або виє, розірвала на собі одяг, б'ється головою об стіни, розбила вікно. Шкіра обличчя бліда, артеріальний тиск підвищений, тахікардія, виражена пітливість. Не пам'ятає, що з нею сталося. Які психотропні засоби необхідно призначити хворій в першу чергу для надання невідкладної допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Ноотропи
- ☐ b. Нейролептики
- ☐ c. Транквілізатори
- ☐ d. Психостимулятори
- ☐ e. Антидепресанти

Коментар

Правильна відповідь: Транквілізатори

Питання 119

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пологи другі, вчасні. 3 години тому відійшли навколоплідні води. Пологова діяльність активна, загальнорівномірнорозвужений таз II ступеня. Передбачувана маса плоду 3900 г. Серцебиття плоду не вислуховується. При піхвовому дослідженні відкриття шийки матки повне, плідного міхура немає, передлежить голівка плоду, притиснута до входу в малий таз. Стрілоподібний шов у поперечному розмірі. Яка лікарська тактика?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Накладання акушерських щипців
- ☐ b. Ведення пологів через природні статеві шляхи
- ☐ c. Кесарів розтин
- ☐ d. Краніотомія
- ☐ e. Стимуляція пологової діяльності окситоцином


Коментар

Правильна відповідь: Краніотомія

Питання 120

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом. Що із перерахованого є першочерговим під час надання долікарської допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Забезпечення прохідності дихальних шляхів
- ☐ b. Введення еуфіліну
- ☐ c. Подача кисню
- ☐ d. Інгаляційний наркоз
- ☐ e. Вимірювання артеріального тиску


Коментар

Правильна відповідь: Забезпечення прохідності дихальних шляхів

Питання 121

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дитини 2-х місяців протягом 12 годин було блювання 5 разів, водянисті випорожнення 10 разів. Об'єктивно: стан важкий. Температура тіла - 38,0°C. Дитина млява, відмовляється від їжі та пиття. Шкіра суха, бліда, складки розправляються погано, знижений тургор м'яких тканин. Велике тім'ячко запале. Вага до захворювання - 5 кг, зараз - 4,6 кг. Яке лабораторне дослідження є найбільш інформативним для призначення адекватної регідраційної терапії з урахуванням типу дегідратації?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Визначення рівня глюкози крові
- ☐ б. Визначення рівня креатиніну крові
- ☐ в. Визначення вмісту електролітів у сироватці крові
- ☐ г. Визначення рівня АлАТ, АсАТ
- ☐ д. Визначення рівня загального білку крові


Коментар

Правильна відповідь: Визначення вмісту електролітів у сироватці крові

Питання 122

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 33-х років, вантажника, тиждень тому під час підйому вантажу з'явився біль у попереку з іррадіацією в праву ногу, біль посилюється під час кашлю. Об'єктивно: позитивний симптом Ласега справа під кутом 40°, зниження правого ахілового рефлексу, атрофія і гіпотонія м'язів правої гомілки. Який з вказаних діагностичних методів слід призначити у першу чергу?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта
- ☐ б. Низхідна мієлографія
- ☐ в. УЗД нирок
- ☐ г. Екскреторна урографія
- ☐ д. Електроміографія

Коментар

Правильна відповідь: Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта

Питання 123

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворому 52-х років виконана екскреторна урографія. Через 10 хвилин після внутрішньовенного введення контрастної речовини стан хворого різко погіршився. Непритомний. АТ- 50/20 мм рт.ст., PS- 120/хв., ритмічний. В анамнезі: медикаментозна алергія. З метою лікування необхідно ввести: Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньом'язово димедрол, преднізолон
- ☐ б. Адреналін внутрішньовенно, швидка інфузія кристалоїдів
- ☐ в. Внутрішньовенно еуфілін
- ☐ г. Внутрішньовенно преднізолон, інфузія кристалоїдів
- ☐ д. Адреналін підшкірно, димедрол внутрішньовенно

Коментар

Правильна відповідь: Адреналін внутрішньовенно, швидка інфузія кристалоїдів

Питання 124

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворого 28-ми років в екстрено доставлено до операційної з приводу профузної шлунково-кишкової кровотечі. Загальний стан тяжкий, свідомість оглушення, АТ- 80/40 мм рт.ст., ЧСС- 110/хв., олігурія. Вкажіть об'єм крововтрати:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 20-25% дефіциту ОЦК (1250-1750 мл)
- ☐ б. >40% дефіциту ОЦК (>2000 мл)
- ☐ в. 15% дефіциту ОЦК (750-1250 мл)
- ☐ г. Крововтрати немає
- ☐ д. 30-40% дефіциту ОЦК (>1750 мл)

Коментар

Правильна відповідь: 30-40% дефіциту ОЦК (>1750 мл)

Питання 125

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт надійшов до приймального відділення психікарні. Зловживає алкоголем 15 років, неодноразово лікувався. Останній запій тривав 2 місяці. 3 дні не вживав алкоголю, став збудженим, вночі не спав. При огляді: шкірні покриви вологі, гіперемія обличчя, виражений тремор; озирається, під ліжком бачить щурів та павуків, намагається їх спіймати. Дезорієнтований у місці, часі.

Лікування має проводитися:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. У відділенні інтенсивної терапії
- ☐ б. У неврологічному відділенні
- ☐ в. В умовах приймального покою
- ☐ г. В домашніх умовах
- ☐ ґ. У терапевтичному відділенні


Коментар

Правильна відповідь: У відділенні інтенсивної терапії

Питання 126

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі 25-ти років із вродженою вадою серця в I періоді пологів з'явився кашель, задишка, харкотиння, болі за грудиною, тахікардія. АТ- 90/60 мм рт.ст., t0- 36,80C. Роділля перебуває у вимушеному сидячому положенні. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. набряк легень
- ☐ б. Розрив матки
- ☐ в. Напад бронхіальної астми
- ☐ г. Емболія навколоплідними водами
- ☐ ґ. Інфаркт міокарда

Коментар

Правильна відповідь: набряк легень

Питання 127

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт під час ковтання цукерки захрипів, схопився за шию, посинів і через 3 хвилини знепритомнів. Об'єктивно: свідомість відсутня, обличчя і шия ціанотичні, нерегулярні та непродуктивні рухи грудної клітки. На сонних артеріях - слабка пульсація. При пальцевій ревізії ротоглотки визначається округле стороннє тіло, змістити яке не вдається. Спроба змістити його при перекиданні пацієнта через коліно - невдала. Які подальші дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Верхня трахеотомія
- ☐ b. Нижня трахеотомія
- ☐ c. Транспортування до стаціонару
- ☐ d. Пункція трахеї
- ☐ e. Крікотиреотомія


Коментар

Правильна відповідь: Крікотиреотомія

Питання 128

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У приймальному відділенні постраждалому у ДТП проводили реанімаційні заходи. Відновлено кровообіг. Самостійне дихання відсутнє, свідомість відсутня. До якого відділення необхідно перевести хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Травматологічне
- ☐ b. Діагностичне
- ☐ c. Терапевтичне
- ☐ d. Відділення реанімації та інтенсивної терапії
- ☐ e. Залишити на санпропускнику


Коментар

Правильна відповідь: Відділення реанімації та інтенсивної терапії

Питання 129

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 47-ми років, хворіє на циротичний туберкульоз легень протягом 7-ми років. Під час проходження курсу лікування у хворого в крові було виявлено лейкоцитоз - $11,0 \cdot 10^9/\text{л}$, еозинофілія - 10%, підвищення ШОЕ - 22 мм/год. Не-зважаючи на проведений курс лікування в аналізі крові продовжує визначатися еозинофілія та підвищена ШОЕ. В сечі з'явилася протеїнурія. Розвиток якого ускладнення можна припустити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Хронічне легеневе серце
- ☐ b. Туберкульоз нирок
- ☐ c. Амілоїдоз
- ☐ d. Гострий нефрит
- ☐ e. Ниркова недостатність


Коментар

Правильна відповідь: Туберкульоз нирок

Питання 130

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

На стаціонарному лікуванні перебуває вагітна жінка 33-х років. Строк вагітності 34 тижні. Впродовж останніх 2-х діб скаржиться на головний біль, запаморочення, відчуття тяжкості в ділянці потилиці, зорові розлади. Мають місце набряки. АТ-160/120 мм рт.ст., ЧСС-88/хв. В сечі: протягом доби зростаюча протеїнурія до 3,2 г/л. Діурез знижений. Яка найбільш імовірна патологія зумовила цю симптоматику?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіпертонічний криз
- ☐ b. Гостре порушення мозкового кровообігу
- ☐ c. Еклампсія
- ☐ d. Тяжка прееклампсія
- ☐ e. Прееклампсія середньої тяжкості

Коментар

Правильна відповідь: Тяжка прееклампсія

Питання 131

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У потерпілого 36-ти років, що переніс закриту черепно-мозкову травму, в процесі проведення ехо-енцефалоскопії виявлено зміщення серединного еха на 5 мм. Про що це свідчить?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Тріщина кісток склепіння черепа
- ☐ b. Перелом основи черепа
- ☐ c. Наявність підболонкової гематоми
- ☐ d. Травматичний субарахноїдальний крововилив
- ☐ e. Ехо-ЕС патології не виявила

Коментар

Правильна відповідь: Наявність підболонкової гематоми

Питання 132

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Рядовий поранений кулею у спину. Встановлено діагноз: кульове сліпе поранення поперекового відділу хребта з повним порушенням провідності спинного мозку. Вогнепальний перелом ШІІ хребця. Гостра затримка сечі. Як потрібно провести іммобілізацію за відсутності щита?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. У положенні лежачи на правому боці на ношах
- ☐ b. У положенні лежачи на спині на ношах
- ☐ c. У положенні сидячи
- ☐ d. У положенні лежачи на животі на ношах
- ☐ e. У положенні лежачи на лівому боці на ношах

Коментар

Правильна відповідь: У положенні лежачи на животі на ношах

Питання 133

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Потерпілий 69-ти років доставлений з місця пожежі в стані важкого отруєння чадним газом. Який препарат необхідно ввести в першу чергу?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Розчин строфантину
- ☐ b. Гідрокортизон
- ☐ c. Бемегрид
- ☐ d. Цитітон
- ☐ e. Цитохром С


Коментар

Правильна відповідь: Цитохром С

Питання 134

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитині 6-ти років, оперованій з приводу розлитого перитоніту, в процесі забезпечення анестезіологічного засобу, проводиться штучна вентиляція легень у режимі помірної гіпервентиляції. На яких цифрах необхідно підтримувати рівень pCO_2 у КЛС-грамі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. 50-55 мм рт.ст.
- ☐ b. 30-35 мм рт.ст.
- ☐ c. 40-45 мм рт.ст.
- ☐ d. 35-40 мм рт.ст.
- ☐ e. 20-25 мм рт.ст.

Коментар

Правильна відповідь: 30-35 мм рт.ст.

Питання 135

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час проведення бойових дій, для організації надання медичної допомоги пораненим та хворим, медична служба повинна розгорнути певні етапи медичної евакуації з фронту в тил. Медичною службою бригади розгорнуто МПБ та медичну роту бригади. Які ще етапи повинні бути розгорнуті для надання пораненим та хворим всіх видів медичної допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. ВППГ, пересувна госпітальна база, територіальна госпітальна база
- ☐ б. Медичний пост роти, ВППГ, пересувна госпітальна база
- ☐ в. Медичний пост роти, пересувна госпітальна база
- ☐ г. МП окремої військової частини, ВППГ, медичний пост роти
- ☐ д. МПБ, МП окремої військової частини, територіальна госпітальна база


Коментар

Правильна відповідь: ВППГ, пересувна госпітальна база, територіальна госпітальна база

Питання 136

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В медичну роту механізованої бригади поступили з поля бою 10 легкопоранених, 15 поранених середньої важкості і 20 тяжкопоранених. Якими принципами та вимогами керується медичний персонал, який виконує сортування поранених в приймально-сортувальному відділенні медичної роти?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. За потребою розподілу та за тяжкістю стану поранених
- ☐ б. Сортування поранених за принципом "Пироговських рядів"
- ☐ в. Єдина класифікація хвороб і травм та єдині вимоги до методики сортування
- ☐ г. За потребою якнайшвидшої евакуації поранених до наступного етапу медичної евакуації
- ☐ д. За потребою місця надання медичної допомоги пораненим

Коментар

Правильна відповідь: Єдина класифікація хвороб і травм та єдині вимоги до методики сортування

Питання 137

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 46-ти років з імплантованим електрокардіостимулятором під час ремонту настільної лампи отримав легку травму електрострумом, після чого він впродовж декількох хвилин був непритомний. Об'єктивно: ціаноз шкіри, АТ-60/0 мм рт.ст., ЧСС- 25/хв. Найбільш імовірною причиною неефективності кровообігу є:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Електромеханічна дисоціація
- ☐ b. Травматичний шок
- ☐ с. Ішемічний інсульт
- ☐ d. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ е. Атріовентрикулярна блокада


Коментар

Правильна відповідь: Атріовентрикулярна блокада

Питання 138

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У новонародженої дитини на третю добу життя з'явилися ознаки шлунково-кишкової кровотечі (блювання з домішками крові, мелена), постгеморагічної анемії. З якого розчину слід розпочати парентеральне лікування геморагічного синдрому у дитини?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоцитарна маса
- ☐ b. Свіжозаморожена плазма
- ☐ с. Реополіглюкін
- ☐ d. Глюкозо-сольовий розчин
- ☐ е. Амінокапронова кислота


Коментар

Правильна відповідь: Свіжозаморожена плазма

Питання 139

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Солдат доставлений у непритомному стані до медичної роти з казарми. Зі слів товаришів по службі, приблизно за 6 годин до цього він прав обмундирування в закритому приміщенні в розчині технічної рідини. Об'єктивно: непритомний, однак реакція на больові подразники збережена. Шкіра і видимі слизові оболонки бліді, у повітрі, що видихається, солодкий запах. PS- 80/хв., ритмічний, тони серця звучні, АТ- 90/60 мм рт.ст., ЧДР- 18/хв., дихання везикулярне, живіт м'який, неболючий. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Отруєння етиленгліколем важкого ступеня
- ☐ б. Отруєння ароматичними вуглеводнями середнього ступеня
- ☐ в. Інгаляційне отруєння тетраетилсвинцем важкого ступеня
- ☐ г. Інгаляційне отруєння хлорованими вуглеводнями
- ☐ д. Пероральне отруєння хлорованими вуглеводнями важкого ступеня


Коментар

Правильна відповідь: Інгаляційне отруєнням хлорованими вуглеводнями

Питання 140

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Під час діагностичної ендоскопії у хворого 45-ти років виникла асистолія, яка діагностована електрокардіографічно. З яких заходів слід негайно розпочати лікування?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Введення атропіну
- ☐ б. Масаж серця, ШВЛ, адреналін
- ☐ в. Дефібриляція
- ☐ г. Електрокардіостимуляція
- ☐ д. Інфузія гідрокарбонату натрію


Коментар

Правильна відповідь: Масаж серця, ШВЛ, адреналін

Питання 141

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 10-ти років знайдений біля трансформаторної будки непритомним, з поодинокими серцевими скороченнями, пульс на променевих артеріях не визначається. Які невідкладні заходи необхідно провести першочергово?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Парентеральне поповнення ОЦК
- ☐ б. Штучне дихання
- ☐ в. Закритий масаж серця
- ☐ г. Внутрішньосерцеве введення адреналіну
- ☐ д. Призначити кисень


Коментар

Правильна відповідь: Штучне дихання

Питання 142

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 45-ти років раптом з'явилися головний біль, нудота, блювання, запаморочення. АТ- 170/110 мм рт.ст., PS- 68/хв. Шкіра обличчя гіперемована. Симптом Керніга (+), симптоми Брудзинського (+). Яке дослідження дозволить провести диференційну діагностику?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Бакпосів ліквору
- ☐ б. Комп'ютерна томографія мозку
- ☐ в. Люмбальна пункція
- ☐ г. Загальний аналіз крові
- ☐ д. Бактеріоскопія мазку крові

Коментар

Правильна відповідь: Люмбальна пункція

Питання 143

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Роділля перебуває в пологах 2 години. Пологова діяльність бурхлива. Несподівано з'явилися ядуха, кашель, ціаноз, ознаки дихальної недостатності, озноб, підвищилася температура тіла, тахікардія, почав падати артеріальний тиск, розвинувся набряк легень. Роділля неспокійна. Яке ускладнення виникло?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Надниркова недостатність
- ☐ b. Септичний шок
- ☐ c. Емболія навколоплідними водами
- ☐ d. Еклампсія
- ☐ e. Розрив матки


Коментар

Правильна відповідь: Емболія навколоплідними водами

Питання 144

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До клініки дитячої хірургії доставлено новонародженого 3-х тижнів життя. На тлі повного благополуччя відзначається блювання "фонтаном" впродовж останніх двох тижнів. Блювотні маси не містять жовчі. Попередній діагноз - пілоростеноз. Який вид обстеження буде найінформативнішим?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Рентгенконтрастне дослідження шлунку
- ☐ b. Лапароскопія
- ☐ c. Оглядова рентгенографія органів черевної порожнини
- ☐ d. Колоноскопія
- ☐ e. УЗД органів черевної порожнини


Коментар

Правильна відповідь: Рентгенконтрастне дослідження шлунку

Питання 145

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У роділлі 24-х років під час пологів раптом погіршилося серцебиття плода, матка в постійному гіпертонусі, з'явилися значні кров'янисті виділення з піхви. Роділля зблідла, PS- 130/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Клінічно вузький таз
- ☐ б. Передчасне відшарування плаценти
- ☐ в. Гострий апендицит
- ☐ г. Розрив шийки матки
- ☐ д. Розрив матки


Коментар

Правильна відповідь: Передчасне відшарування плаценти

Питання 146

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 54-х років скаржиться на нестерпний біль у першому плюсно-фаланговому суглобі правої ноги, що з'явився вночі. Об'єктивно: суглоб дефігурований, шкіра над ним гіперемована, пальпація і рухи різко болісні. Оберіть препарат для швидкого припинення больового синдрому:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Делагіл
- ☐ б. Пеніцилін
- ☐ в. Алопуринол
- ☐ г. Роваміцин
- ☐ д. Диклофенак-натрій

Коментар

Правильна відповідь: Диклофенак-натрій

Питання 147

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчина 26-ти років з метою суїциду прийняла 50 таблеток снодійного. Стан вкрай важкий: непритомна, зіниці широкі, без реакції на світло. Дихання хрипле, 10/хв., за участю допоміжних м'язів, ціаноз. В легенях численні вологі хрипи. Рс- 124/хв., поверхневий, АТ- 90/40 мм рт.ст. В чому буде полягати невідкладна допомога?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіпербарична оксигенація
- ☐ b. Інтубація трахеї
- ☐ с. Стимуляція діурезу і компенсація плазмозамінниками
- ☐ d. Туалет трахеобронхіального дерева
- ☐ е. Допоміжне дихання респіратором "Амбу"


Коментар

Правильна відповідь: Інтубація трахеї

Питання 148

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого після автомобільної аварії з'явилися скарги на різку задишку, кашель з кров'ю. Об'єктивно: шкіра бліда, ціанотична. Підшкірна емфізема в ділянці грудної клітки, живота, шиї справа. Аускультативно: справа дихання не вислуховується. РС- 130/хв., АТ- 95/60 мм рт.ст., Нt- 0,25, Нb- 88 г/л. Які першочергові заходи лікаря на догоспітальному етапі?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Трансфузія еритромаси відповідно до групової і резусної належності
- ☐ b. Дофамін 2-5 мкг/кг/хв., інфузія колоїдних розчинів
- ☐ с. Колоїди, еритроцитарна маса, кристалоїди
- ☐ d. Активна аспірація повітря справа
- ☐ е. Негайна штучна вентиляція легень


Коментар

Правильна відповідь: Активна аспірація повітря справа

Питання 149

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 56-ти років госпіталізований зі скаргами на відчуття «важкості» верхніх відділах живота, схуднення, періодичні блювання з'їденою їжею. Виразковий анамнез - 30 років. При пальпації визначається "шум плескоту" натщесерце. Добовий діурез до 800 мл на добу. При рентгенослідженні шлунка - затримання барієвої суспензії в шлунку до 14 годин, деформація піло родуоденальної зони. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Декомпенсований виразковий пілоростеноз
- ☐ б. Компенсований виразковий пілоростеноз
- ☐ в. Субкомпенсований виразковий пілоростеноз
- ☐ г. Гострий панкреатит
- ☐ д. Гострий пієлонефрит


Коментар

Правильна відповідь: Субкомпенсований виразковий пілоростеноз

Питання 150

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До медичної роти доставлено постраждалого з тяжким вогнепальним пораненням нижньої третини правого стегна. Кістка роздроблена. Магістральні судини пошкоджені. Кінцівка висить на клапті м'яких тканин. До якого виду медичної допомоги відноситься проведення відсікання кінцівки, яка висить на клапті м'яких тканин?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Спеціалізована медична допомога
- ☐ б. Кваліфікована медична допомога
- ☐ в. Долікарська (фельдшерська) медична допомога
- ☐ г. Перша медична допомога
- ☐ д. Перша лікарська допомога


Коментар

Правильна відповідь: Перша лікарська допомога

Питання 151

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 66-ти років скаржиться на серцебиття, біль у серці, слабкість. Симптоми з'явилися раптово, після фізичного навантаження. На ЕКГ: комплекси QRS поширені до 0,12 секунд, зубець Р перед шлуночковим комплексом відсутній, ЧСС- 200/хв. Який препарат є препаратом вибору в цьому випадку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Верапаміл
- ☐ b. Обзидан
- ☐ c. Дигоксин
- ☐ d. Хінідин
- ☐ e. Лідокаїн


Коментар

Правильна відповідь: Лідокаїн

Питання 152

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 43-х років викликав швидку медичну допомогу. Скаржиться на різкий біль у лівій половині живота з іррадіацією в ліву ногу. В анамнезі сечокам'яна хвороба. Об'єктивно: шкіра бліда, PS- 100/хв., АТ- 160/90 мм рт.ст. Симптом Пастернацького різко позитивний зліва. Почати лікування найбільш доцільно з призначення:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Уролесан перорально
- ☐ b. Спазмалгон перорально
- ☐ c. Морфін в/в
- ☐ d. Анальгін в/м
- ☐ e. Баралгін в/в


Коментар

Правильна відповідь: Баралгін в/в

Питання 153

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 6-ти років скаржиться на загальну слабкість, генералізоване свербіння та почервоніння шкіри, гостре підвищення температури тіла до 38,0°C. З анамнезу: перший день хвороби. Протягом кількох годин після обробки невеликого садна іхтіоловою маззю з'явилися поширені гіперемовані папульозно-уртикарні висипання, що виступають над поверхнею шкіри в ділянці передпліччя, живота, стегон, гомілок. Вкажіть найбільш імовірний діагноз:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Генералізована кропивниця
- ☐ б. Алергічний контактний дерматит
- ☐ в. Токсикодермія
- ☐ г. Атопічний дерматит - нейродерміт, період загострення
- ☐ д. набряк Квінке


Коментар

Правильна відповідь: Генералізована кропивниця

Питання 154

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У чоловіка 28-ми років на тлі бронхопневмонії розвинулася кома. Об'єктивно: ЧСС-122/хв, екстрасистолія. АТ-80/45 мм рт.ст. Шкіра суха, тургор знижений. Дихання глибоке, шумне, рідке. Різкий запах ацетону. Печінка +5 см. Глікемія - 32 ммоль/л; рН крові - 7,0. Який розчин буде найбільш ефективним для нормалізації дихання?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Реополіглюкін
- ☐ б. 4,2% розчин натрію бікарбонату
- ☐ в. 5% розчин глюкози
- ☐ г. 1% розчин калію хлориду
- ☐ д. 0,9% розчин натрію хлориду

Коментар

Правильна відповідь: 4,2% розчин натрію бікарбонату

Питання 155

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого під час операції на шлунку було ушкоджено селезінкову артерію, в результаті чого виникла масивна кровотеча, яка призвела до зупинки кровообігу. Найдоцільніше проводити: Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Абдомінальну компресію
- ☐ b. Непрямий масаж серця
- ☐ c. Введення гідрокортизону
- ☐ d. Електрокардіостимуляцію
- ☐ e. Прямий масаж серця

Коментар

Правильна відповідь: Прямий масаж серця

Питання 156

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У відділенні променевої терапії має бути організовано контроль опромінення робітників, отриманого за час перебування в радіаційно небезпечних зонах. За допомогою якого приладу здійснюється такий контроль? Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Дихальний прилад ДП-5В
- ☐ b. Протирадіаційний халат ПРХ-МВ
- ☐ c. Механічний прилад хімічної розвідки МПХР
- ☐ d. Механічний прилад хімічної розвідки МПХЛ
- ☐ e. Індивідуальний дозиметр 11 або Індивідуальний дозиметр 1

Коментар

Правильна відповідь: Індивідуальний дозиметр 11 або Індивідуальний дозиметр 1

Питання 157

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Породілля 23-х років, на другий день після пологів відчула наростаючий біль в правій нозі, важкість. Об'єктивно: стан хворої середньої важкості. PS- 100/хв., температура - 37, 30С, тони серця приглушені, ритм синусовий, в легенях дихання везикулярне, 18-20/хв. Ліва нога на всьому протязі набрякла, синюшна, порівняно з правою температура знижена. Пульсація артерій лівої ноги на всьому протязі пальпується, ослаблена. Який найбільш імовірний діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоемболія клубової артерії
- ☐ б. Гострий тромбофлебіт вен правої нижньої кінцівки
- ☐ в. Тромбофлебіт глибоких вен правої нижньої кінцівки, післяпологовий сепсис
- ☐ г. Гострий клубово-стегновий флеботромбоз
- ☐ е. Тромбоемболія стегнової артерії


Коментар

Правильна відповідь: Гострий клубово-стегновий флеботромбоз

Питання 158

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 44-х років звернувся до дільничного лікаря на 7-й день хвороби зі скаргами на підвищену температуру тіла, поганий сон, закріп. Початок хвороби поступовий. В ході огляду: блідість шкірних покривів, температура - 38,20С, ЧСС- 68/хв. Печінка збільшена. Які методи дослідження допоможуть підтвердити діагноз? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. РМАЛ
- ☐ б. Полімеразна ланцюгова реакція на віруси гепатитів
- ☐ в. Реакція Пауль-Буннеля
- ☐ г. Гемокультура, реакція Відаля
- ☐ е. Паразитоскопічне дослідження фекалій


Коментар

Правильна відповідь: Гемокультура, реакція Відаля

Питання 159

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

В консультацію звернулася жінка зі скаргами на біль у нижній частині живота, який виник раптово на 17-й день менструального циклу. Біль супроводжувався відчуттям тиску на пряму кишку. Об'єктивно: температура тіла - 36,90C, PS- 89/хв., АТ - 110/65 мм рт.ст. Вагінально: матка щільна, безболісна, рухома, нормальних розмірів. Додатки з лівої сторони помірно збільшені, болісні. В ході пункції черевної порожнини через заднє склепіння отримано 15 мл серозно-геморагічної рідини. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Апоплексія яєчника
- ☐ b. Розрив кісти яєчника
- ☐ c. Позаматкова вагітність
- ☐ d. Перекрут ніжки кісти яєчника
- ☐ e. Гострий апендицит


Коментар

Правильна відповідь: Апоплексія яєчника

Питання 160

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого із вкрай важким ступенем кістковомозкової форми гострої променевої хвороби у початковому періоді з'явилися: лихоманка, сильний головний біль, адинамія, біль у м'язах і суглобах. Який синдром гострої променевої хвороби у хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Синдром ураження нервової системи
- ☐ b. Геморагічний синдром
- ☐ c. Синдром загальної токсемії
- ☐ d. Гастроінтестинальний синдром
- ☐ e. Синдром інфекційних ускладнень

Коментар

Правильна відповідь: Синдром загальної токсемії

Питання 161

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого з тяжким перебігом пневмонії за клініко-епідеміологічними даними можна припустити легеневу форму сибірки. Який з методів профілактики захворювання серед представників медичного персоналу, які контактували з цим хворим, слід вважати найбільш ефективним? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Вакцинація
- ☐ b. Дератизація
- ☐ c. Дезінсекція
- ☐ d. Екстрена антибіотикопрофілактика
- ☐ e. Методи поточної дезінфекції

Коментар

Правильна відповідь: Екстрена антибіотикопрофілактика

Питання 162

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 10-ти місяців бригадою швидкої допомоги доставлений у реанімаційне відділення. Під час проведення серцево-легеневої реанімації на електрокардіограмі реєструється шлуночкова брадикардія. Якому з наведених медикаментозних заходів необхідно надати перевагу? Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньовенне введення 4% NaHCO₃ - 2 мг/кг
- ☐ b. Внутрішньовенне введення мезатону
- ☐ c. Електрична дефібриляція серця
- ☐ d. Електрична дефібриляція серця + введення адреналіну
- ☐ e. Внутрішньовенне введення атропіну 0,01 мг/кг

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне введення атропіну 0,01 мг/кг

Питання 163

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 56-ти років через падіння у відкритий каналізаційний люк дістав закритий вивих правого плеча. Який вид транспортної іммобілізації слід використати?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. М'яка пов'язка Дезо і Вельпо
- ☐ б. Драбинчаста шина від променевого-п'ясткового суглоба до кута здорової лопатки
- ☐ в. Косинкова іммобілізація
- ☐ г. Іммобілізація підручними засобами
- ☐ д. Фіксація верхньої кінцівки до тулуба


Коментар

Правильна відповідь: Драбинчаста шина від променевого-п'ясткового суглоба до кута здорової лопатки

Питання 164

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У 34 тижні вагітності в жінки з хронічною артеріальною гіпертензією середнього ступеня тяжкості, плацентарною недостатністю, затримкою розвитку плоду III ступеня, з'явився раптовий біль у матці. Об'єктивно: PS- 120/хв., АТ- 70/40 мм рт.ст. Матка в гіпертонусі. Серцебиття плоду - відсутнє. З піхви помірні кров'яністі виділення. Яка причина антенатальної загибелі плоду? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Передчасне відшарування плаценти, легка форма
- ☐ б. Гіпертонічна хвороба
- ☐ в. Плацентарна недостатність
- ☐ г. Передчасне відшарування плаценти, тяжка форма
- ☐ д. Затримка внутрішньоутробного розвитку

Коментар

Правильна відповідь: Передчасне відшарування плаценти, тяжка форма

Питання 165

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Селективні α -адреноміметики недоцільно застосовувати для поновлення серцевої діяльності внаслідок:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Відсутності позитивного ефекту на міокард
- ☐ b. Значного підвищення потреби міокарда у кисні
- ☐ c. Нездатності підвищувати діастолічний артеріальний тиск
- ☐ d. Здатності підвищувати систолічний артеріальний тиск
- ☐ e. Вираженості аритмогенного ефекту


Коментар

Правильна відповідь: Нездатності підвищувати діастолічний артеріальний тиск

Питання 166

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 16-ти років під час землетрусу було здавлено уламками залізобетонної споруди обидві нижні кінцівки. Визволити нижні кінцівки з-під уламків вдалося тільки через 4 години. Розвиток якого патологічного стану загрожує підлітку?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Критична гіпокаліємія
- ☐ b. Гіпоглікемія
- ☐ c. Критична гіпокальціємія
- ☐ d. Фібриноліз
- ☐ e. Гостра ниркова недостатність

Коментар

Правильна відповідь: Гостра ниркова недостатність

Питання 167

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Першовагітна 25-ти років з терміном гестації 26 тижнів звернулася до лікаря жіночої консультації зі скаргами на погіршення загального стану, спрагу, слабкість, блювання, сонливість, болі по всьому животу впродовж останніх 8-ми діб. Хворіє на цукровий діабет. Запах ацетону з рота. PS- 100/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст. Рівень цукру в крові – 19,4 ммоль/л. Набряки ніжних кінцівок. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гіперлактацидемічна кома
- ☐ b. Гіперосмолярна кома
- ☐ c. Кетонемічна кома
- ☐ d. Гіпоглікемічна кома
- ☐ e. Прееклампсія, тяжка форма


Коментар

Правильна відповідь: Кетонемічна кома

Питання 168

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 10 років надійшла до лікарні в сопорозному стані. Хворіє на цукровий діабет. Після введення інсуліну не приймала їжу. Через 2,5 години стан дитини різко погіршився: з'явилися слабкість, сонливість, втрата свідомості, холодний піт, гіпертонус, судоми. Визначте об'єм надання медичної допомоги:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. 5% розчин глюкози 10 мл
- ☐ b. 5% розчин глюкози 15 мл
- ☐ c. 10% розчин глюкози + 0,1% розчину адреналіну
- ☐ d. 40% розчину глюкози 20-50 мл
- ☐ e. 10% розчин глюкози 100 мл


Коментар

Правильна відповідь: 40% розчину глюкози 20-50 мл

Питання 169

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 54-х років, що перебуває в стаціонарі з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово знепритомнів. В ході огляду діагностовано зупинку серцевої діяльності та дихання, розпочато легенево-серцеву реанімацію. На ЕКГ спостерігається асистолія. Далі необхідно:
Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Ввести внутрішньовенно лідокаїн
- ☐ б. Дефібриляція
- ☐ с. Ввести внутрішньовенно строфантин
- ☐ d. Ввести внутрішньосерцево адреналін
- ☐ е. Ввести внутрішньовенно новокаїнамід


Коментар

Правильна відповідь: Ввести внутрішньосерцево адреналін

Питання 170

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта 25-ти років, що страждає на епілепсію, розвиваються тоніко-клонічні напади, частота яких складає 20 нападів за годину. Слід кваліфікувати симптоматику як:
Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Серія епілептичних нападів
- ☐ б. Розвиток на тлі епілепсії енцефаліту
- ☐ с. Частішання нападів
- ☐ d. Епілептичний статус
- ☐ е. Ускладнення епілепсії додатковою інтоксикацією

Коментар

Правильна відповідь: Епілептичний статус

Питання 171

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 46-ти років скаржиться на появу протягом двох тижнів випорожнень кров'ю більш за 12 разів на добу, болю в животі, суглобах; болючі висипи у порожнині рота та на нижніх кінцівках, набряк колінних та гомілковостопних суглобів, слабкість, підвищення температури тіла понад 390С, втрату маси тіла. Який метод обстеження є найбільш інформативним?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Рентгенологічне дослідження кишечника
- ☐ б. Біопсія кишечника та шкіри
- ☐ в. Рентгенографія суглобів
- ☐ г. Загальний аналіз крові
- ☐ д. Ендоскопічне дослідження


Коментар

Правильна відповідь: Ендоскопічне дослідження

Питання 172

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До сімейної амбулаторії звернувся хворий 31-го року зі скаргами на блювання, пронос, $t_0 - 37,80^{\circ}\text{C}$. Напередодні їв сирі яйця. Попередній діагноз: сальмонельоз. Мешкає в упорядженій квартирі з родиною (дружина - кондитер, донька відвідує дитячий садок, мати - пенсіонерка). Які протиепідемічні заходи слід провести в осередку інфекції?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Госпіталізація хворого, спостереження за контактними 7 діб, бакдослідження калу дружини
- ☐ б. Госпіталізація хворого, спостереження за контактними 7 діб, бакдослідження калу дружини і доньки
- ☐ в. Лікування хворого на дому, спостереження за контактними 7 діб, бакдослідження калу дружини і доньки
- ☐ г. Госпіталізація хворого, спостереження за контактними 7 діб
- ☐ д. Госпіталізація хворого, спостереження за контактними 7 діб, бакдослідження калу всіх членів родини

Коментар

Правильна відповідь: Госпіталізація хворого, спостереження за контактними 7 діб, бакдослідження калу дружини і доньки

Питання 173

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До медичного пункту батальйону доставлено військовослужбовця з осколковим пораненням тазу з пошкодженням уретри. Загальний стан важкий. PS- 120/хв. Систолічний АТ- 80 мм рт.ст. Шкіра та видимі слизові оболонки бліді. Опірність тазу порушена. Кровотеча і витікання сечі з рани в момент сечовипускання. В якому положенні необхідно евакуювати пораненого на наступний етап медичної евакуації?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Лежачи
- ☐ b. Лежачи на щиті з валиком під колінними ямками
- ☐ с. Лежачи на спині з піднятим головним кінцем носилок
- ☐ d. Лежачи на боці
- ☐ e. Лежачи на щиті

Коментар

Правильна відповідь: Лежачи на щиті з валиком під колінними ямками

Питання 174

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дівчинка 14-ти років доставлена до лікарні непритомною. Хворіє на цукровий діабет. Отримує вранці 52 ОД інсуліну короткої дії і 32 ОД пролонгованого. У 13:00 раптово знепритомніла. Шкіра волога. Судоми м'язів рук і ніг. Зіниці нормального розміру. PS - 86/хв., ритмічний, АТ-100/60 мм рт.ст. З яких препаратів слід почати лікування хворої?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Інсулін короткої дії
- ☐ b. 40% розчин глюкози
- ☐ с. Інсулін тривалої дії
- ☐ d. 5% розчин глюкози
- ☐ e. Преднізолон

Коментар

Правильна відповідь: 40% розчин глюкози

Питання 175

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Дитина 1-го року доставлена до лікарні з діагнозом: гостра ниркова недостатність, стадія олігоанурії. У хворого спостерігаються м'язова слабкість, аритмія, зміни на ЕКГ (розширення інтервалів PQ та QRS, високі, вузькі та симетричні зубці Т). Які біохімічні зміни викликають ці порушення?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Гіперкальціємія
- ☐ b. Гіперкаліємія
- ☐ c. Гіпокальціємія
- ☐ d. Гіпокаліємія
- ☐ e. Ацидоз

Коментар

Правильна відповідь: Гіперкаліємія

Питання 176

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 29-ти років захворів гостро 18 годин тому: після вживання заливної риби з'явилися нудота, повторне блювання, часті пінисті рідкі зеленуваті випорожнення, підвищення температури до 39,0°C. Об'єктивно: стан важкий, блідий, млявий, тургор шкіри різко знижений, сухість слизової оболонки рота, АТ- 80/40 мм рт.ст., пульс слабого наповнення, PS- 112/хв., живіт болючий в епігастрії, біляпупковій та ілеоцекальній ділянках, зменшення виділення сечі. Які невідкладні терапевтичні заходи?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ a. Парентеральне введення антибіотиків
- ☐ b. Внутрішньовенне введення сольових розчинів
- ☐ c. Введення глюкокортикостероїдів
- ☐ d. Внутрішньовенне введення розчину глюкози
- ☐ e. Внутрішньовенне введення реополіглюкіну


Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне введення сольових розчинів

Питання 177

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик у віці 6 місяців хворіє на тяжку форму кашлюка: число нападів кашлю становить 25, напади тяжкі, тривалістю до 10 хвилин, мають 6-8 репризів, закінчуються блюванням. Один з нападів кашлю призвів до апное. Які невідкладні дії?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Лобелін в/м
- ☐ b. Налагодити подачу кисню
- ☐ c. Штучне дихання (в ручному режимі)
- ☐ d. Преднізолон в/м
- ☐ e. Седуксен в/м


Коментар

Правильна відповідь: Штучне дихання (в ручному режимі)

Питання 178

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 31-го року з клінічною картиною геморагічного шоку надійшов до хірургічного відділення. Причина кровотечі - виразка 12-палої кишки. На момент огляду ФГДС - кровотеча не продовжується. Обсяг крововтрати склав 38% ОЦК. Протягом 9-ти годин хворому перелито біля 1 л еритроцитарної маси (взята 19 діб тому), яка сумісна за групою та резус-фактором та після проведення біологічної проби. Після цього у хворого виникли брадикардія з аритмічним компонентом, знизився артеріальний тиск. Через деякий час почала розвиватися фібриляція шлуночків. Яке ускладнення виникло у хворого?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Тромбоемболія легеневої артерії
- ☐ b. Алергічна реакція
- ☐ c. Цитратна інтоксикація
- ☐ d. Гемотрансфузійний шок
- ☐ e. Калієва інтоксикація


Коментар

Правильна відповідь: Калієва інтоксикація

Питання 179

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Вагітна 19-ти років в терміні 30 тижнів поскаржилася на головний біль, порушення зору, блювання з домішками крові. Стан важкий, АТ-160/100 мм рт.ст., склери жовтушні, підшкірні крововиливи, набряки нижніх кінцівок, сеча геморагічного кольору. В крові: тромбоцитопенія. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Гепатоз вагітних
- ☐ b. Еклампсія
- ☐ с. ДВЗ -синдром
- ☐ d. Хвороба Боткіна
- ☐ е. HELP синдром


Коментар

Правильна відповідь: HELP синдром

Питання 180

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого після важкої скелетної травми на другу добу раптово виникло зниження артеріального тиску, порушення свідомості та самостійного дихання, дрібноточкові крововиливи на шкірі. Який найбільш імовірний діагноз?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Анафілактичний шок
- ☐ b. Септичний шок
- ☐ с. Синдром тривалого стиснення
- ☐ d. Жирова емболія
- ☐ е. Травматичний шок


Коментар

Правильна відповідь: Жирова емболія

Питання 181

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пацієнт 52-х років перебуває на лікуванні у хірургічному відділенні з приводу кровотечі з вен стравоходу. Внаслідок проведеного консервативного лікування кровотеча припинилась, але виникла сонливість, апатія, відсутність апетиту. Чим викликані вказані скарги? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Геморагічний шок
- ☐ б. Постгемотрансфузійна реакція
- ☐ в. Прогресування печінкової недостатності
- ☐ г. Побічна дія гемостатичної терапії
- ☐ д. Постгеморагічна анемія


Коментар

Правильна відповідь: Прогресування печінкової недостатності

Питання 182

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хворий 50-ти років після аварії на виробництві був госпіталізований зі скаргами на металевий присмак та печіння у роті, нудоту, слинотечу, багаторазове блювання, пронос з домішками слизу та крові, біль у епігастральній та поперековій ділянках. Об'єктивно: стан важкий, виразковий стоматит, гінгівіт, некроз слизової оболонки носа, набряк гортані. АТ- 150/100 мм рт.ст., РS- 48/хв., тони серця глухі. Поліурія, гіпостенурія, альбумінурія, гематурія. Який антидот слід ввести хворому? Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Хромосмон
- ☐ б. Дієтиоксим
- ☐ в. Унітіол
- ☐ г. Антарсин
- ☐ д. Атропіну сульфат


Коментар

Правильна відповідь: Унітіол

Питання 183

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У дівчини 19-ти років після зґвалтування виникли постійна плаксивість, тривога, настрій став пригніченим, знизилася працездатність, рухи загальмовані, з'явилися думки про недоцільність життя. Визначте психопатологічний стан:

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Інволюційна депресія
- ☐ б. Тривожна депресія
- ☐ в. Реактивна депресія
- ☐ г. Ендогенна депресія
- ☐ д. Судинна депресія


Коментар

Правильна відповідь: Реактивна депресія

Питання 184

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хлопчик 12-ти років хворіє на atopічну бронхіальну астму з важким перебігом. Під час останнього нападу 4 інгаляції сальбутамолу ефекту не дали. Підвищилися задишка, тахікардія, неспокій. Шкіра бліда з ціанотичним відтінком. У легенях різко ослаблене дихання, хрипи не вислуховуються. Який з перерахованих заходів є першочерговим?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньовенне введення преднізолону
- ☐ б. Внутрішньовенне введення амброксолу
- ☐ в. Інгаляція зволоженого кисню
- ☐ г. Внутрішньовенне введення еуфіліну
- ☐ д. Внутрішньовенне введення кларитроміцину

Коментар

Правильна відповідь: Внутрішньовенне введення преднізолону

Питання 185

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Санітар 38-ми років захворів раптово 5 днів тому: озноб, гарячка, сильний головний біль, виражена слабкість, безсоння. Об'єктивно: температура - 40,20С. Збуджений, гіперемія обличчя, ін'єкція судин склер з крововиливами, рясний розеолезно-петехіальний висип на тілі, тремор язика, тахікардія, гепатоспленомегалія. Виявлено педикульоз. Яке дослідження підтвердить діагноз? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Реакція аглютинації Відаля
- ☐ b. Посів крові на жовчний бульйон
- ☐ c. Мікроскопія товстої краплі крові
- ☐ d. Реакція Райта і Хеддльсона
- ☐ e. РЗК і РА рикетсій Провачека

Коментар

Правильна відповідь: РЗК і РА рикетсій Провачека

Питання 186

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворої 24-х років захворювання почалося гостро з появи нудоти, багаторазового блювання, ознобу, болю у верхніх відділах живота. Практично одночасно з'явилися рідкі водянисті випорожнення без патологічних домішок 2 рази. Об'єктивно: стан середньої важкості, температура 37,60С, РС- 86/хв., АТ- 100/60 мм рт.ст., шкіра бліда, тургор збережений, язик незначно обкладений білим нальотом, живіт м'який, чутливий в епігастрії. Яку терапію слід провести у першу чергу? Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. 5% розчин глюкози
- ☐ b. Призначення сольового послаблюючого
- ☐ c. Регідрон
- ☐ d. Лоперамід
- ☐ e. Промивання шлунка

Коментар

Правильна відповідь: Промивання шлунка

Питання 187

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У пацієнта з симптомами відсутності кровообігу на ЕКГ встановлена асистолія. Першочерговим терапевтичним заходом має бути:
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Введення лідокаїну
- ☐ b. Введення атропіну
- ☐ c. Введення хлориду кальцію
- ☐ d. Введення адреналіну
- ☐ e. Електрична дефібриляція

Коментар

Правильна відповідь: Введення адреналіну

Питання 188

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого 35-ти років, що перебуває в стаціонарі з приводу правобічного пневмотораксу, незважаючи на двохпозиційне дренирування плевральної порожнини з активною аспірацією, легень залишається колабованою впродовж 2-х діб. Яке лікування треба застосувати?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ a. Роздування легені дихальним апаратом
- ☐ b. Торакотомія з ушиванням ушкодженої частини легені
- ☐ c. Додаткове дренирування
- ☐ d. Сегментектомія
- ☐ e. Лобектомія

Коментар

Правильна відповідь: Торакотомія з ушиванням ушкодженої частини легені

Питання 189

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Непритомну хвору 28-ми років доставлено до лікарні машиною швидкої допомоги. Об'єктивно: запах ацетону у повітрі, що видихається, шкіра суха, язик обкладений коричневим нальотом, сухий, тонус очних яблук знижений, дихання за типом Куссмауля. Цукор крові - 25,2 ммоль/л, ацетон сечі ++, осмолярність крові - 280 мосмоль/л. Які невідкладні заходи потрібно вжити?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Внутрішньовенне краплинне введення 2,5% розчину бікарбонату натрію
- ☐ б. Внутрішньом'язове введення 1% розчину глюкагону
- ☐ в. Проведення регідратації, дробне введення інсуліну
- ☐ г. Внутрішньовенне краплинне введення 5% розчину глюкози
- ☐ д. Внутрішньовенне струминне введення 40% розчину глюкози

Коментар

Правильна відповідь: Проведення регідратації, дробне введення інсуліну

Питання 190

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікар швидкої допомоги, приїхавши на місце ДТП, діагностував закритий перелом правого стегна в середній третині. Яким повинен бути обсяг допомоги?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Знеболення введенням в місце перелому 1% р-ну новокаїну, іммобілізація шиною Дітеріхса, внутрішньовенне введення розчинів
- ☐ б. Іммобілізація трьома шинами Крамера до кульшового суглоба
- ☐ в. Знеболення наркотичними препаратами, фіксація пошкодженої кінцівки до здорової
- ☐ г. Знеболення, іммобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія
- ☐ д. Іммобілізація трьома шинами Крамера до пахвинної ділянки


Коментар

Правильна відповідь: Знеболення, іммобілізація шиною Дітеріхса, інфузійна терапія

Питання 191

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

У хворого періодично виникають напади клонічних судом у лівій руці, які іноді розповсюджуються на ліву половину обличчя. Напад триває 5 хвилин, після чого спостерігається слабкість у лівій руці, яка поступово зникає впродовж 2-3 годин. Який варіант судомного синдрому наведено?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Напад Джексонівської епілепсії
- ☐ б. Напад Кожевніковської епілепсії
- ☐ в. Напад скроневої епілепсії
- ☐ г. Малий епілептичний напад
- ☐ д. Генералізований епілептичний напад


Коментар

Правильна відповідь: Напад Джексонівської епілепсії

Питання 192

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Чоловік 23-х років доставлений до приймального покою у коматозному стані. З анамнезу: тиждень тому впав і вдарився головою, після чого з'явилися головний біль, порушення сну, а через кілька днів - прогресуюче порушення свідомості. Дихання адекватне самостійне, АТ- 150/70 мм рт.ст., ЧСС- 60/хв. На Ехо-енцефалоскопії - зміщення серединних структур мозку на 3 мм вправо. Який діагноз можна припустити?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Абсцес мозку
- ☐ б. Субдуральна гематома
- ☐ в. Забій головного мозку
- ☐ г. Менінгоенцефаліт
- ☐ д. Гостре порушення мозкового кровообігу


Коментар

Правильна відповідь: Субдуральна гематома

Питання 193

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Лікар невідкладної допомоги оглядає хлопчика 10-ти років, який скаржиться на нудоту, блювання, болі в животі. Об'єктивно: язик обкладений коричневим нальотом, різкий запах ацетону у повітрі, що видихається, ознаки дегідратації II ступеня, тахікардія, артеріальна гіпотонія, зниження м'язового тону, глікемія 22 ммоль/л. Оберіть тактику ведення даного пацієнта:
Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Негайна госпіталізація у відділення інтенсивної терапії
- ☐ б. Госпіталізація у педіатричний стаціонар
- ☐ в. Динамічне спостереження
- ☐ г. Госпіталізація в інфекційну лікарню
- ☐ д. Консультація дитячого хірурга


Коментар

Правильна відповідь: Негайна госпіталізація у відділення інтенсивної терапії

Питання 194

Відповіді не було

Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пологи у 36 тижнів. Вагітність перебігала на тлі загрози переривання у 28 тижнів, гострої респіраторної вірусної інфекції у 24 тижні. Навколоплідні води світлі. Новонароджена дівчинка з масою 2400 г, довжиною 45 см. При народженні самостійне дихання відсутнє, м'язевий тонус значно знижений. Після проведення штучної вентиляції легенів за допомогою маски та мішка 100% киснем впродовж 30 секунд самостійне дихання не відновилося, частота серцевих скорочень складає 50/хв., зберігається акроціаноз. Яка подальша тактика лікаря?
Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Киснева допомога вільним потоком
- ☐ б. Санація верхніх дихальних шляхів
- ☐ в. Введення адреналіну
- ☐ г. Корекція гіповолемії
- ☐ д. Непрямий масаж серця

Коментар

Правильна відповідь: Непрямий масаж серця

Питання 195

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До медичної роти доставлено військовослужбовця з вогнепальним пораненням лівої гомілки, переломом великогомілкової кістки та пошкодженням магістральних судин. Загальний стан важкий. Свідомість відсутня. Систолічний АТ- 80 мм рт.ст., PS- 190/хв., ниткоподібний. Шкіра і видимі слизові оболонки бліді. Визначте сортувальну групу для пораненого:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Небезпечні для оточуючих
- ☐ б. Ті, що отримали ураження, несумісні з життям, і потребують тільки догляду (агонуючі)
- ☐ в. Ті, що потребують надання медичної допомоги на даному етапі медичної евакуації в першу чергу
- ☐ г. Ті, що потребують надання медичної допомоги на даному етапі медичної евакуації в другу чергу
- ☐ д. Ті, що підлягають подальшій евакуації без надання їм медичної допомоги

Коментар

Правильна відповідь: Ті, що потребують надання медичної допомоги на даному етапі медичної евакуації в першу чергу

Питання 196

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

При проведенні закритого масажу серця людини 76-ти років, що знаходиться у стані клінічної смерті, необхідно здійснювати компресії з частотою:

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Не менше 80 на 1 хвилину
- ☐ б. Не менше 60 на 1 хвилину
- ☐ в. Не менше 100 на 1 хвилину
- ☐ г. Не менше 40 на 1 хвилину
- ☐ д. Не менше 120 на 1 хвилину

Коментар

Правильна відповідь: Не менше 100 на 1 хвилину

Питання 197

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Пішохід 62-х років під час ожеледиці послизнувся та впав на руку на бордюр тротуару. Є локалізований біль у ділянці верхньої третини лівого передпліччя. Спостерігаються тахікардія, підвищення артеріального тиску, припухлість, деформація, синець та крепітація в ділянці верхньої третини лівого передпліччя, рухи кінцівки неможливі. Можна припустити пошкодження верхньої третини лівого передпліччя. Як ви будете транспортувати хворого?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Прибинтувавши праву верхню кінцівку до грудної клітини та здорової кінцівки
- ☐ б. Наклавши шину Крамера з фіксацією плечового, ліктьового, променево-зап'ясткового суглобів
- ☐ в. В напівсидячому положенні з палкою в ліктьових згинах
- ☐ г. Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п'ястно-фалангових суглобів
- ☐ д. Наклавши пов'язку Дезо з валиком в пахвовій ділянці

Коментар

Правильна відповідь: Наклавши шину Крамера від верхньої третини плеча до п'ястно-фалангових суглобів

Питання 198

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Хвора 29-ти років, робітниця хімічного підприємства, відчула металевий присмак у роті, "клубок у горлі", задишку, нудоту, біль у животі, блювання. Об'єктивно: сонлива, тремор пальців верхніх кінцівок. Виразки язика, піднебіння, значне слиновиділення, мідно-червоний колір слизової оболонки ротової порожнини та глотки, тахікардія, кров'яністі випорожнення. Яка речовина зумовила отруєння?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Ртуть
- ☐ б. Хлор
- ☐ в. Арсен
- ☐ г. Анілінові барвники
- ☐ д. Індометацин

Коментар

Правильна відповідь: Ртуть

Питання 199

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

Жінка 32-х років хворіє на цукровий діабет тип 1 впродовж 20-ти років. Під час роботи на городі знепритомніла. Шкіра волога, високий тонус м'язів, зіниці розширені, запаху ацетону немає, Рс-72/хв., АТ- 120/75 мм рт.ст. Який діагноз найбільш імовірний?

Виберіть одну відповідь:


- ☐ а. Гіпоглікемічна кома
- ☐ b. Тепловий удар середньої важкості
- ☐ с. Вегетативний криз
- ☐ d. Гіпертензивний криз
- ☐ е. Колапс

Коментар

Правильна відповідь: Гіпоглікемічна кома

Питання 200

Відповіді не було
Макс. оцінка до 1,00



Відмітити питання

Текст питання

До медичної роти 14 механізованої бригади, що розгорнута в районі населеного пункту, з механізованого та танкового батальйонів надійшло 68 поранених від вогнепальної зброї та 16 хворих. Який вид медичної допомоги буде наданий пораненим та хворим в функціональних підрозділах медичної роти бригади?

Виберіть одну відповідь:

- ☐ а. Долікарська та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги
- ☐ b. Перша лікарська та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги
- ☐ с. Всі види медичної допомоги
- ☐ d. Перша медична допомога та перша лікарська допомога
- ☐ е. Перша медична, долікарська та перша лікарська медична допомога

Коментар

Правильна відповідь: Перша лікарська та невідкладні заходи кваліфікованої медичної допомоги

[Завершити перегляд](#)

Перехід по тесту

[illegible]

Показати одну сторінку за разЗавершити перегляд

КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

Учасники

Відзнаки

Компетентності

Журнал оцінок

Загальне

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Контрольні тестування

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Секція 9

Секція 10

Секція 11

Секція 12

Секція 13

Секція 14

Секція 15

Особистий кабінет

Домашня сторінка

Календар

Особисті файли

Мої курси

Ви зайшли під ім'ям [\(Інтерн БДМУ\) Підручник Оксана Богданівна \(Вийти\)](#)
КРОК 3. Загальна лікарська підготовка

- [Українська \(uk\)](#)
 - - [English \(en\)](#)
 - [Русский \(ru\)](#)
 - [Українська \(uk\)](#)