LABORATOIRE MEDI-LAB

Guide des analyses

Tableau complet

Medi Lab

2015

60 Avenue Omar Ibn Al Khattab, Tanger, Maroc.

Légende symboles et choix du tube de prélèvement en fonction de l'analyse.

	Prélèvement à jeun impératif.
	Prélèvement à distance d'un repas (2 à 3 heures après).
	Prise de sang impérativement le matin.
	Dosage de l'activité résiduelle. Prélèvement juste avant la prise médicamenteuse. Préciser le médicament, la posologie et l'heure de prise.
	Prise de sang au laboratoire - Sauf accord du biologiste.
URG	Analyse urgente (à apporter très rapidement au laboratoire dans un délai < à 30 minutes).
	Plasma ou sérum à congeler (< 3h).
	Remise des résultats suite à l'appel téléphonique par le laboratoire.
PT	Plateau Technique
	laboratoire spécialisé
	Prélèvements de selles
	pot stérile récolteur d'urines

Légende tubes					
		Tube sec			Tube EDTA
		Tube citraté			Tube iodoacétate
		Tube hépariné			Tube à VS

LETTRE A							Délais
Acétone urine						Acétone urinaire (corps cétoniques) sur urines sans borate	jour même
ACC						ACC: Anticoagulant circulant (épreuve de correction et temps de thromboplastine diluée). **Prélèvement à acheminer dans l'heure au laboratoire.** **A congeler rapidement.**	
ACE						Antigène carcino-embryonnaire.	jour même
Acide 5 hydroxy indol acétique (5HIA urinaire)	 (24h)					Pendant les 48 heures précédent le recueil des urines, arrêt de toute thérapeutique et s'abstenir d'aliments riches en sérotonine (tomate, pamplemousse, prunes, chocolat, ananas, noix, banane, avocat, fruits secs, agrumes, thé, café). Acheminer le recueil d'urines dans les 2 heures au laboratoire. Acidifier les urines. Examen transmis à un laboratoire spécialisé. Préciser diurèse.	
Acide folique						Folates sériques (vitamine B9). 12 heures de jeûne.	24h
Acide homovanillique	 (24h)					Recueil sur urines de 24 heures (cf. protocole d'informations) Eviter dans les 48 h précédant le dosage la consommation de banane, chocolat, café, thé, vanille. Acidifier les urines. Examen transmis à un laboratoire spécialisé. Préciser diurèse.	
Acide lactique					URG	Les patients à jeun doivent rester au repos complet pendant 30 minutes avant le prélèvement. Prélèvement à réaliser impérativement au laboratoire.	jour même
Acide urique dans le sang						Prélèvement à distance du petit déjeuner et le matin	jour même
Acide urique dans les urines	 **(24h)**					Si dosage sur 24 heures (cas le plus fréquent) recueil dans flacon de 2 litres	jour même
Acide valproïque						Acide valproïque = cf. Dépakine Toujours prélever avant la prise médicamenteuse (mesure du taux résiduel).	

ACTH				Tube EDTA +aprotinine		**Tube spécifique** pour cette analyse. Prélèvement à réaliser au laboratoire entre 7h et 10h du matin. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Activité anti-Xa						Activité Anti-Xa (Héparine de Bas Poids Moléculaire). Délai maximum d'acheminement au laboratoire : **4 heures. A congeler.** **FRAXIPARINE, LOVENOX, FRAGMINE :** Heure de prélèvement : 3 à 4 heures après injection. **FRAXODI, INNOHEP :** Heure de prélèvement : 4 à 6 heures après injection.	
Adénovirus (selles)						Recherche d'adénovirus par technique latex dans les selles	jour même
AFP (Alpha FoetoProtéine)						Peut aussi se doser dans le liquide amniotique	jour même
Agglutinines froides				5ml + 1ml		Analyse transmise à un laboratoire spécialisé.	
Agglutinines irrégulières						**Le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, la date de naissance et le sexe doivent figurer sur l'échantillon.**	jour même
ALAT						ALAT = Alanine aminotransférase ou TGP ou Transaminases	jour même
Albumine dans le sang							jour même
Albumine dans les urines	**(24h)**					Albumine urinaire sur échantillon (premières urines du matin) ou sur urines de 24heures.	jour même
Alcool						Désinfecter la zone de prélèvement avec un désinfectant autre que l'alcool. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Aldolase						Prélèvement à réaliser après 30 minutes de repos. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Allergènes (alimentaires – mixtes pédiatriques - respiratoires)						Prélever un grand tube sec.	36h

AMH (Hormone anti-Müllérienne)		❄			**Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 4 heures** Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Ammoniémie				SEK	Prélèvement à réaliser au laboratoire. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	jour même
Amphétamines dans les urines					Amphétamines : dosage urinaire sur urines sans conservateur	jour même
Amylase dans le sang						jour même
Amylase dans les urines					Amylase urinaire: dosage sur urines sans borate	jour même
Angiotensine II					Prélèvement à réaliser au laboratoire. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Anguillules selles					Recherche d'anguillules	jour même
Anti-D passif					Recherche de l'anti-D passif. Pour les femmes enceintes prélever un tube EDTA et un tube sec avec gel.	
Anti-streptodornase					Recherche d'anticorps antistreptodornase (ASD). Anticorps anti-streptocoques). Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Anti-streptolysine (ASLO)					ASL ou ASLO (anticorps anti-streptocoques).	jour même
Anti-TG (ISA ou ISG)					Dosage des anticorps anti-thyroglobuline.	24h
Anti-tissus					- Auto-anticorps anti-cytosol - Auto-anticorps anti-LKM - Auto-anticorps anti-microsomes hépatiques - Auto-anticorps anti-mitochondries - Auto-anticorps anti-muscles lisses - Auto-anticorps anti-réticulum endoplasmique. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Anti-TPO				PT	Anticorps anti-thyroperoxydase	24h
Anticoagulant circulant	❄				ACC: Anticoagulant circulant (épreuve de correction et temps de thromboplastine diluée). **Prélèvement à acheminer dans l'heure au laboratoire. A congeler !**	

Anticorps anti-centromères						Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Anticorps anti-CMV						Cytomégalovirus. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
ANCA					PT	Anticorps anti neutrophiles cytoplasmiques	24h
Anticorps anti-DNA natif					PT		24h
Anticorps anti-HAV (IgG et IgM)						Hépatite A	jour même
Anticorps anti-Hbc (IgG et IgM)						Hépatite B	jour même
Anticorps anti-Hbs - Antigène Hbs						Hépatite B	jour même
Anticorps anti-HCV						Hépatite C	jour même
Anticorps anti-nucléaires					PT		48h- 72h
Anticorps anti-peptides citrullinés					PT	Anticorps anti CCP	24h
Anticorps anti-récepteurs de TSH (TRAK)						Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Anticorps anti-transglutaminase					PT		24h
Anticorps anti-VIH						HIV	jour même
Antidépresseurs tricycliques dans les urines						Dosage d'antidépresseurs tricycliques dans les urines sur échantillon sans conservateur	
Antigène carcino-embryonnaire						ACE	jour même
Antigène Hbs						Hépatite B	jour même
Antigène p24						HIV	jour même
Antigènes solubles						- Auto-anticorps anti-Jo 1 - Auto-anticorps anti-nRNP/SM - Auto-anticorps anti-SCL 70 - Auto-anticorps anti-SM - Auto-anticorps anti-SSA et SSB	72h

Antithrombine 3		❄			Dosage de l'anti-thrombine 3 activité. Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 6 heures.	
Apo A					Apolipoprotéine A 12 heures de jeûne.	
Apo B					Apolipoprotéine B- 12 heures de jeûne.	
ASAT					ASAT = TGO ou Transaminases ou aspartate aminotransférase.	jour même
Lettre B						
Barbitémie					Prélever toujours à la même heure avant une nouvelle prise médicamenteuse (mesure du taux résiduel).	
β2 microglobuline						jour même
Bence Jones					Recherche d'une protéinurie de Bence Jones (urines de 24 heures sans conservateur). Délai maximum d'acheminement au laboratoire après le recueil : 2 heures. Stockage réfrigéré des urines pendant le recueil recommandé.	
Bicarbonate (réserves alcalines)						jour même
Bilharzie					Type déchantillon : Urines recueillies sur flacon sans conservateur après effort. Recherche d'oeufs de Bilharzies dans un prélèvement urinaire.	jour même
Bilirubine totale et directe					Abri de la lumière recommandé.	jour même
BK (culture)	crachat					3 semaines
BK (examen direct)	crachat					Le lendemain à 13h
BNP		❄				jour même
Lettre C						
CA 125					Marqueur tumoral	jour même

CA 15.3						Marqueur tumoral	jour même
CA 19.9						Marqueur tumoral	jour même
Calcitonine						Prélèvement à réaliser au laboratoire. Cas particuliers (ex : paraplégiques, ...) : à déposer dans l'heure au laboratoire	
Calcium corrigé						Dosage du calcium corrigé en fonction du taux d'albumine. **Ajouter Albumine**.	jour même
Calcium dans le sang						Dosage du calcium sanguin	jour même
Calcium ionisé						Prélèvement à réaliser au laboratoire. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Calcium urinaire						Conditions de recueil : Urines de 24 heures sans conservateur	jour même
Carbamazépine						Prélever toujours à la même heure avant une nouvelle prise médicamenteuse (mesure du taux résiduel). Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Catécholamines						Prélèvement à réaliser au laboratoire. Examen transmis à un laboratoire spécialisé. A congeler dans l'heure.	
Catécholamines urinaires	(24h)			(Acidifier les urines)		Urines de 24 heures sans conservateur. Régime recommandé (voir la fiche de préconisation). Examen transmis à un laboratoire spécialisé. .	
CDT						Transferrine carboxy déficient.	
Charges virales (HIV, Hépatite B et C)						3 tubes EDTA Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 3 heures. Examen transmis à un laboratoire spécialisé. A congeler	
Chlamydiae trachomatis (autres)	kit					Recherche de Chlamydiae par **PCR** en endocervical et en uréthral à l'aide d'un kit fourni par votre laboratoire.	
Chlamydiae Trachomatis dans le sang						Sérologie Chlamydiae Trachomatis	

Chlamydiae trachomatis dans les urines						Recueil dans flacon urine stérile sans conservateur. Antigène Voir la fiche de préconisation.	jour même
Chlore dans le sang						Dosage du chlore dans le sang	jour même
Chlore urinaire						Dosage du chlore urinaire sur urines sans conservateur	jour même
Cholestérol total/HDL						12 heures de jeûne	jour même
Chromogranine A						Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 3 heures Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Ciclosporine						2 types de prélèvements possibles. Préciser impérativement : - prélevé avant la prise médicamenteuse (mesure du taux résiduel) - ou prélevé 2 heures après la prise médicamenteuse (mesure du taux d'exposition). Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
CLA mixte						Si tube sec avec gel, à transmettre dans l'heure.	36h
CLA pneumallergènes						Si tube sec avec gel, à transmettre dans l'heure.	36h
CLA trophallergènes						Si tube sec avec gel, à transmettre dans l'heure.	36h
Clairance créatinine calculée						Clairance de la créatinine calculée selon la méthode CocKroft et MDRD. Pour la stabilité de l'analyte dans le sang : cf. Créatinine.	jour même
Clairance créatinine mesurée		 (24h)				Clairance de la créatinine sur sang et urines de 24 heures sans conservateur. Pour la stabilité de l'analyte dans le sang et urines : cf. Créatinine.	jour même
Clostridium toxine						Recherche de toxine A et B de Clostridium difficile dans les selles.	
CMV (IgG et IgM)						Sérologie cytomégalovirus (Ac Anti-CMV)	
Cocaïne dans les urines						Dosage de la cocaïne dans les urines recueillies dans flacon stérile sans conservateur.	jour même

Coefficient de saturation de la transferrine						Coefficient de saturation de la sidérophiline/transferrine.	24h
Complément (fractions)						Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Complément hémolytique total (CH50)						Prélèvement à réaliser au laboratoire. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Compte d'Addis (HLM)	 (3h)					Flacon urines de 3 heures. Voir fiche de préconisation.	jour même
Coombs direct						Le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, la date de naissance et le sexe doivent figurer sur l'échantillon.	jour même
Coombs indirect (RAI)						Le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, la date de naissance et le sexe doivent figurer sur l'échantillon.	jour même
Coproculture						Voir la fiche de préconisation.	76h
Corps cétoniques						Recherche d'acétone sur urines recueillies dans flacon stérile sans conservateur.	jour même
Cortisol (8h – 16h)						Prélèvement entre 7h et 10h. Pour le soir respecter l'heure de prélèvement	jour même
CPK						Dosage de la CPK : Créatinine Phospho Kinase. Examen non cumulable avec la Troponine et CPKMb	jour même
Créatinine dans le sang						Dosage de la créatinine dans le sang.	jour même
Créatinine Urines	 (24h)					Dosage de la créatinine sur les urines recueillies dans flacon sans conservateur (échantillon ou 24 heures).	jour même
CRP						Protéine C réactive	jour même
Cryoglobuline						Prélèvement impératif au laboratoire . Prendre RDV au laboratoire.	
Culot urinaire						Urines (culot) recueillies dans flacon stérile avec ou sans conservateur.	jour même
Lettre D							
D-Dimères						A transmettre rapidement au laboratoire.	jour même

Dépakine						Dépakine = cf. Acide valproïque. Toujours prélever avant la prise médicamenteuse (mesure du taux résiduel).	
Digoxine (ou digitoxine)						Prélèvement 8 à 24 heures après l'administration de la dose et pour le suivi toujours prélever au même moment.	
Lettre E							
EBV						Sérologie d'Epstein Barr. Anticorps anti EBNA IgG, VCA IgM, VCA IgG	
ECA						Enzyme de conversion de l'angiotensine.	jour même
ECBC		crachat				Examen cytobactériologique des crachats. Recueil après 12 heures de jeûne dans un flacon stérile sans conservateur. Le prélèvement doit être acheminé au laboratoire immédiatement après le recueil.	76h
ECBU						ECBU sur échantillon urinaire recueilli dans un flacon stérile avec ou sans conservateur. Voir la fiche de préconisation.	48h
ECBU par sondage						Voir la fiche de préconisation.	48h
Electrophorèse de l'hémoglobine					BIOLab	Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Electrophorèse des protéines					SEK	Electrophorèse des protéines. Analyses réalisée le Mardi et Jeudi	Mardi ou jeudi
Enzyme de conversion de l'angiotensine						cf ECA	jour même
Estradiol							jour même
Estradiol rapide						17Béta Estradiol rapide pour les inductions. Prélèvement à réaliser le matin.	jour même
Examen cytobactériologique des crachats	crachat					cf ECBC	72h
Examen cytobactériologique des urines						Cf.ECBU - sur échantillon urinaire recueilli dans un flacon stérile avec ou sans conservateur. Voir la fiche de préconisation.	48h
Examen parasitologique des selles						Voir fiche de préconisation.	jour même

Lettre F						
Facteur II					Facteur de coagulation. A congeler. Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 heures. Si délai d'acheminement supérieur à 8 heures l'analyse ne sera pas réalisée.	
Facteur IX					Facteur de coagulation. A congeler. Prélèvement à réaliser au laboratoire. Cas particuliers (ex : paraplégiques, ...) : à déposer dans l'heure au laboratoire	
Facteur V					Facteur de coagulation. A congeler. Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 heures. Si délai d'acheminement supérieur à 8 heures l'analyse ne sera pas réalisée.	
Facteur VII					Facteur de coagulation. A congeler. Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 heures. Si délai d'acheminement supérieur à 8 heures l'analyse ne sera pas réalisée.	
Facteur VIII					Facteur de coagulation. A congeler. Prélèvement à réaliser au laboratoire. Cas particuliers (ex : paraplégiques, ...) : à déposer dans l'heure au laboratoire	
Facteur X					Facteur de coagulation. A congeler. Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 heures. Si délai d'acheminement supérieur à 8 heures l'analyse ne sera pas réalisée.	
Facteur XI					Facteur de coagulation. A congeler. Prélèvement à réaliser au laboratoire. Cas particuliers (ex : paraplégiques, ...) : à déposer dans l'heure au laboratoire.	
Facteur XII					Facteur de coagulation. A congeler. Prélèvement à réaliser au laboratoire. Cas particuliers (ex : paraplégiques, ...) : à déposer dans l'heure au laboratoire	
Facteurs rhumatoïdes						jour même
Fer sérique					Prélèvement à réaliser le matin.	jour même
Ferritine						jour même

Fibrinogène (facteur I)						Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 6 heures.	jour même
Folates érythrocytaires					BIOLab	12 heures de jeûne.	76h
Folates sériques (Vit. B9)					BIOLab	12 heures de jeûne.	76h
Fragment N-terminal du peptide natriurétique de type B (NT-ProBNP)						Attention ne pas confondre avec la BNP.	jour même
Fructosamine						Non cumulable avec l'HbA1c : demander l'accord du patient pour la fructosamine (non remboursable dans ce cas).	
FSH et FSH 3è jour						Hormone Folliculo Stimulante. Prélèvement à réaliser le matin avant 10 heures.	jour même
Lettre G							
Gastrine						12 heures de jeûne. Prélèvement à réaliser au laboratoire ou à transmettre au laboratoire dans les 3 heures après le prélèvement.	
GGT						Gamma-Glutamyl-Transférase.	jour même
Glucose liquide						Dosage du glucose dans les liquides.	jour même
Glucosurie ou glycosurie	(24h)					Sur urines recueillies dans un flacon stérile sans conservateur ou flacon urines de 24 heures.	jour même
Glycémie						Dosage de la glycémie après 8 heures de jeûne.	jour même
Glycémie après charge en glucose						Dosage de la glycémie après une charge en glucose.	jour même
Glycémie à heure fixe						Indiquer l'heure de prélèvement (12 heures de jeûne, ...).	jour même
Glycémie post prandiale						Dosage de la glycémie post-prandiale entre 1h30 et 2h après le début du repas.	jour même
Glycorachie						Dosage du glucose dans le LCR.	jour même
Gonadotrophine Chorionique Humaine pour les femmes (HCG)							jour même

Gonadotrophine Chorionique Humaine pour les hommes (HCG)		❄			Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 3 heures. Analyse transmise à un laboratoire spécialisé.	
Lettre H						
Haptoglobine						jour même
Hématies foetales					Test de Kleihauer. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Hémocult					Recherche de sang dans les selles 3 jours de suite. Voir la fiche de préconisation.	jour même
Hémocultures					Prélever les flacons d'hémoculture aérobie et anaérobie avant tout autre tube. Prélever pendant un pic fébrile. Désinfection du point de ponction avec de l'alcool iodé sauf contre-indication (allergie à l'iode).	72h
Hémoglobine A1c (glyquée)					Non cumulable avec la fructosamine	jour même
Héparinémie (Héparine non fractionnée) par AXA					Délai maximum d'acheminement au laboratoire : **2 heures.** Si délai d'acheminement supérieur à 2 heures l'analyse ne sera pas réalisée. **HEPARINE SODIQUE (perf IV continue) :** Heure de prélèvement : 4 heures après début de perfusion. **HEPARINE CALCIQUE (CALCIPARINE) :** Heure de prélèvement : A mi-temps entre 2 injections.	
Héparine de bas poids moléculaire					Activité Anti-Xa (Héparine de Bas Poids Moléculaire). Délai maximum d'acheminement au laboratoire : **4 heures.** Si délai d'acheminement supérieur à 4 heures l'analyse ne sera pas réalisée. **FRAXIPARINE, LOVENOX, FRAGMINE :** Heure de prélèvement : 3 à 4 heures après injection. **FRAXODI, INNOHEP :** Heure de prélèvement : 4 à 6 heures après injection.	

Hépatite A IgG IgM							jour même
Hépatite B						Anticorps anti-Hbc (IgG et IgM). Anticorps anti-Hbs. Antigène Hbs.	jour même
Hépatite C							jour même
HCG dépistage urines (TG4)						HCG : dépistage dans les urines recueillies dans un flacon stérile sans conservateur. Prélèvement le matin après restriction hydrique	jour même
HCG pour les femmes						Gonadotrophine Chorionique Humaine. Renseigner la date des dernières règles.	jour même
HCG pour les hommes						Gonadotrophine Chorionique Humaine. Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 3 heures. Analyse transmise à un laboratoire spécialisé.	
HDL Cholestérol						12 heures de jeûne.	jour même
Helminthes (Recherche d'oeufs sur la marge de l'anus)				Scotch test.		Prélèvement à faire impérativement le matin au lever avant la toilette. Voir la fiche de préconisation.	jour même
HGPO						OMS : 75g glucose – Complete 100g glucose 12 heures de jeûne. Test à réaliser sous surveillance. Prélèvement à réaliser au laboratoire.	jour même
HIV (1 et 2)							jour même
HLA B27						Le prélèvement doit être accompagné d'une attestation de consultation. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
HLM (Hématies leucocytes minute)						**Compte d'Addis.** Voir la fiche de préconisation.	jour même
Homocystéine						12 heures de jeûne. Prélèvement à réaliser au laboratoire le matin ou à transmettre au laboratoire dans les 3 heures après le prélèvement. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	

Hormone anti-Müllérienne (AMH)		❄			Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 4 heures	
Huhner (Test de)					Test post-coïtal. (9à 12h après rapport) Prélèvement à réaliser impérativement au laboratoire le matin. Prise de rendez-vous au laboratoire avec les biologistes réalisant cet examen. Voir la fiche de préconisation.	24h
Hydroxyproline libre et totale	(24h)				Flacon urines de 24 heures. Régime recommandé. Voir la fiche de préconisation. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Hyperglycémie provoquée					12 heures de jeûne. Test à réaliser sous surveillance. Prélèvements à réaliser au laboratoire. Rappel : Hyperglycémie provoquée (hors femme enceinte) : 75g avec prélèvement T0 et T2h. Si femme enceinte prélèvement à T0, T1h et T2h.	jour même
Lettre I						
IgA anti-transglutaminases				PT	Examen transmis au plateau technique	24h
IgE spécifiques					RAST	
IgE totales						jour même
IGF1-Somatomédine C		❄			Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 3 heures. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Immuno-électrophorèse					Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Immunoglobuline A (IgA)						jour même
Immunoglobuline D (IgD)					Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Immunoglobuline G (IgG)						jour même

Immunoglobuline M (IgM)							jour même
Immunoglobuline monoclonale						Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Inhibine B (J3)						Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
INR						Taux de prothrombine, Temps de Quick, TP. Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 6 heures.	jour même
Ionogramme (Na, K, Cl)							jour même
Insuline						Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Lettres J-K							
K (Potassium)							jour même
Kleihauer (Hématies foetales)						Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Lettre L							
Lactates (acide lactique)		 URG			SEK	12 heures de jeûne. Prélèvement à réaliser le matin après 30 minutes de repos. Prélèvement à réaliser impérativement au laboratoire.	jour même
Latex Waler Rose						Transformé en Facteurs rhumatoïdes et Anticorps anti peptides citrullinés cyclisés.	jour même
LCR culture		URG				Liquide céphalorachidien Prélèvement en milieu hospitalier dans un flacon stérile. A acheminer le plus rapidement possible au laboratoire	72h
LDH dans le sang						Lactate déshydrogénase	jour même
Légionelles dans les urines (Recherche dAg)						Recherche d'Ag sur urines recueillies dans un flacon stérile sans conservateur.	

LH					Prélèvement à réaliser le matin avant 10 heures.	jour même
Lipase dans le sang						jour même
Lipides (bilan)					10 à 12 heures de jeûne.	jour même
Lithium					Forme standard : prélèvement le matin 12 heures après la prise et avant toute nouvelle prise soit la mesure du taux résiduel. Forme LP : (libération prolongée) administrée le soir : - si prélèvement le matin 12 heures après la prise : mesure du taux intermédiaire. - si prélèvement le soir 24 heures après la prise et avant toute nouvelle prise : mesure du taux résiduel.	jour même
Lyme (sérologie)					Sérologie de Lyme. Borréliose provoquée par Borrelia burgdorferi	
Lettre M						
Magnésium						jour même
Magnésium érythrocytaire (globulaire)					TUBE HEPARINE SANS GEL. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Marqueur tumoral (CA 125, CA 15.3, CA 19.9)						jour même
Marqueurs de la trisomie 21					Prélever 2 tubes secs avec gel. Le prélèvement doit être accompagné de la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques et échographiques et d'un formulaire de consentement dûment rempli et signé. Délai maximum d'acheminement : 4 heures. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Marqueurs lymphocytaires					Examen non réalisé les jeudi, vendredi, samedi et veilles de jours fériés. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Métanéphrines	(24h)				Flacon urines de 24 heures. Régime recommandé. Examen transmis à un laboratoire spécialisé. Voir la fiche de préconisation.	

Microalbuminurie et microalbuminurie 24h	(24h)					Sur urines recueillies dans un flacon stérile sans conservateur ou sur flacon urines de 24 heures.	jour même
MNI test ou Mononucléose							jour même
Mycoplasmes génitaux						Prélèvement du col	72h
Lettre N							
Na (Sodium dans le sang)							jour même
Nitrites						Sur urines recueillies dans flacon stérile sans conservateur.	jour même
NSE (Neuron specific enolase)						Prélèvement à réaliser au laboratoire. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
NTproBNP						Fragment N-terminal du peptide natriurétique de type B. Attention, ne pas confondre avec la BNP.	jour même
Numération formule sanguine (NFS)							jour même
Lettre O							
O'Sullivan (Test)						12 heures de jeûne. Test à réaliser sous surveillance. Prélèvement à réaliser au laboratoire. Test transformé en Hyperglycémie provoquée sur 2 heures.	jour même
Opiacés						Sur urines recueillies dans flacon stérile sans conservateur.	jour même
Orosomucoïde						Examen transmis à un laboratoire spécialisé	
Osmolarité plasmatique						12 heures de jeûne. Osmolarité plasmatique : urémie + glycémie + (Na + K) x2 1 tube rouge + 1 tube gris	jour même
Osmolarité urinaire						Osmolarité urinaire sur urines recueillies dans flacon stérile sans conservateur (Na + K) x 2 + Urée + Glucose	jour même
Lettre P							

PAL						PAL : Phosphatases alcalines	jour même
Paludisme						Recherche de paludisme sur frottis + test immunochromatographique : Frottis sanguin à partir du tube EDTA ou frottis sanguin réalisé au bout du doigt.	jour même
Parasite						Recherche et identification de parasites : helminthe, arthropode, etc. ... Recherche sur cheveux, ongles, …	jour même
Parasitologie des selles						Voir la fiche de préconisation.	24h
Parathormone intacte (PTH)							jour même
PDF						PDF : Produits de la Dégradation du Fibrinogène. Prélèvement à réaliser impérativement au laboratoire.	
pH urinaire						pH à mesurer sur des urines fraichement émises au laboratoire dans flacon stérile sans conservateur.	jour même
PHADIATOP						Screening allergie respiratoire.	
Phénobarbital						TUBE HEPARINE SANS GEL. Prélever toujours à la même heure avant une nouvelle prise médicamenteuse (mesure du taux résiduel). Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Phosphatases alcalines (PAL)							jour même
Phosphore dans le sang						Prélèvement à réaliser le matin.	jour même
Phosphore dans les urines	(24h)					Urines de 24 heures à conserver si possible au réfrigérateur pendant la durée du recueil.	jour même
Pigments biliaires						Pigments et sels biliaires sur urines recueillies dans flacon stérile sans conservateur.	
Plomb						TUBE HEPARINE SANS GEL. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	

Pneumoallergènes (ClAP)						48h
Ponctions : Ascite, Synovial, Pleural, LCR.					Prélèvements en milieu hospitalier Cytologie, Chimie, Bactériologie	72h
Potassium dans le sang						jour même
Potassium dans les urines					Flacon d'urine stérile sans conservateur ou flacon urines de 24 heures.	jour même
Procalcitonine					Prélèvement à apporter dans les 3 heures au laboratoire.	jour même
Progestérone (+17OH progestérone)						jour même
Prolactine					Prélèvement à réaliser à n'importe quel moment de la journée après 20 minutes de repos.	jour même
Protéine C anticoagulante					Prélèvement à réaliser au laboratoire. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Protéine C réactive (CRP)						jour même
Protéine S anticoagulante					Prélèvement à réaliser au laboratoire. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Protéinogramme (électrophorèse)						Mardi et jeudi
Protéines totales (protides)					Protéines sériques ou plasmatiques totales	jour même
Protides dans les urines	 (24h)				Flacon d'urine stérile sans conservateur ou flacon urines de 24 heures. Protides urinaires (albumine) sur échantillon et/ou sur 24 heures.	jour même
PSA libre						jour même
PSA total						jour même
PTH (Parathormone intacte)					Prélèvement sur tube sec sans gel.	jour même
Lettre R						
RAI					RAI (Recherche d'Agglutinines Irrégulières). Le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, la date de naissance et le sexe doivent figurer sur l'échantillon.	jour même

RAST (IgE spécifiques)						
Rénine debout ou couché					Prélèvement à réaliser le matin. Préciser s'il s'agit de la Rénine debout (après 1 heure de déambulation) ou couché (après 3 heures de décubitus). Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 3 heures. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Réserve alcaline dans le sang						jour même
Réticulocytes		+NFS			Toujours avec NFS	jour même
Rotavirus					Recherche de Rotavirus et d'adénovirus dans les selles. Recueil dans pot stérile.	jour même
RPCa					Résistance à la protéine C activée. Prélèvement à réaliser au laboratoire. Examen remplacé par le facteur V Leiden (contacter le laboratoire). Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Rubéole					Sérologie de la Rubéole IgG – Ig M	jour même
Lettre S						
Salmonellose (sérologie)					Sérodiagnostic de Widal-Félix	jour même
Salmonellose (selles)						72h
Sang dans les selles					Le prélèvement doit être renouvelé 3 jours de suite et acheminé le jour même du recueil au laboratoire. Voir fiche de préconisation.	jour même
Sang dans les urines					Recherche de sang dans les urines recueillies dans flacon stérile sans conservateur pour étude microscopique et bandelette réactive.	jour même
Sérologie Chlamydiae Trachomatis					IgG + IgA	jour même
Sérologie d'Epstein Barr					- EBNA IgG - VCA IgM - VCA IgG	

Sérologie de Lyme						
Sérologie rubéole						jour même
Sérologie syphilitique (VDRL + TPHA)						jour même
Sérologie Toxoplasmose IgG et IgM)						jour même
Sérotonine dans le sang					TUBE HEPARINE SANS GEL. Prélèvement à réaliser au laboratoire. Pendant les 48 heures précédant le recueil des urines, éviter la consommation de banane, chocolat, fruits secs, agrumes, avocat, tomate, prune, kiwi, ananas et mollusques. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Sérotonine urinaire	 (24h)				Recueil des urines de 24 heures. Régime recommandé. Voir la fiche de préconisation. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Scotch test					Scotch test : recherche d'oeux d'helminthes sur la marge anale. Prélèvement à faire impérativement le matin au lever avant la toilette. Voir la fiche de préconisation.	jour même
Sodium dans le sang (Na)						jour même
Sodium dans les urines					Recueil des urines dans flacon stérile sans conservateur ou flacon urines de 24 heures.	jour même
Sperme dans les urines					Urines et sperme. Prendre rendez-vous au laboratoire. Voir la fiche de préconisation.	24h
Spermoculture					Prendre rendez-vous au laboratoire. Voir la fiche de préconisation.	48h
Spermogramme, Spermocytogramme					Prendre rendez-vous au laboratoire. Voir la fiche de préconisation.	48h 72h
Sperme (enrichissement – FIV)					Enrichissement pour insémination I.U.	jour même
Syphilis					VDRL – TPHA Qualitative – TPHA Quantitative	jour même

Lettre T						
T3 Libre					Le prélèvement doit se faire au minimum 9 heures après la prise de Levothyrox donc si le médicament est pris le matin, la prise de sang se fera avant la prise médicamenteuse.	jour même
T4 Libre					Le prélèvement doit se faire au minimum 9 heures après la prise de Levothyrox donc si le médicament est pris le matin, la prise de sang se fera avant la prise médicamenteuse.	jour même
Tacrolimus					Prélèvement à réaliser juste avant la prise médicamenteuse (mesure du taux résiduel). Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Taux de prothrombine					TPQ ou TPK ou INR ou temps de Quick. Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 heures.	jour même
Tégrétol					TUBE HEPARINE SANS GEL. Prélever toujours à la même heure avant une nouvelle prise médicamenteuse (mesure du taux résiduel). Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Tétrahydrocannabinol					Recueil des urines dans flacon stérile sans conservateur.	jour même
TCA					TCA : Temps de Céphaline Activé. - Patient sans traitement : délai d'acheminement au laboratoire dans les 8 heures. - Patient sous traitement HBPM : délai d'acheminement au laboratoire dans les 4 heures. - Patient sous traitement Héparine : délai d'acheminement au laboratoire dans les 2 heures	jour même
TCK					TCK : temps de Céphaline Kaolin. Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 heures.	jour même
Temps de Quick					Taux de Prothrombine, TPQ, TPK, INR. Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 heures.	jour même
Test de Coombs direct					Le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, la date de naissance et le sexe doivent figurer sur l'échantillon.	jour même
Test de Coombs indirect (RAI)					Le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, la date de naissance et le sexe doivent figurer sur l'échantillon.	jour même

Test de Huhner						Prélèvement à réaliser impérativement au laboratoire le matin. (9-12h après rapport) Prise de rendez-vous au laboratoire avec les biologistes réalisant cet examen. Voir la fiche de préconisation.	24h
Test Helikit ou INFAI ou Helicobacter Pylori						Air expiré. Voir la fiche de préconisation. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Testostérone biodisponible						12 heures de jeûne. Prélèvement à réaliser le matin. Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 6 heures. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Testostérone pour homme et femme						Prélèvement à réaliser le matin avant 10 heures avec activité physique limitée avant la prise de sang.	jour même
TGO						cf. ASAT (transaminases), Aspartate Aminotransférase.	jour même
TGP						cf. ALAT (transaminases), Alanine Aminotransférase.	jour même
Toxiques urinaires						Toxiques urinaires sur urines recueillies dans flacon stérile sans conservateur.	jour même
Toxoplasmose IgG et IgM							jour même
TP						Taux de Prothrombine, Temps de Quick, INR. Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 8 heures.	jour même
Transaminases						TGO et TGP. Aspartate Aminotransférase (ASAT). Alanine Aminotransférase (ALAT).	jour même
Transferrine							24h
Transferrine Carboxy Deficient (CDT)						Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Triglycérides						12 heures de jeûne.	jour même
Trisomie 21						Marqueurs de la trisomie 21. Prélever 2 tubes secs sans gel.	

				Le prélèvement doit être accompagné de la prescription médicale, de la fiche de renseignements cliniques et échographiques et d'un formulaire de consentement dûment rempli et signé. Délai maximum d'acheminement au laboratoire : 4 heures. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Trophallergènes				Allergie alimentaire.	48h
TROPHATOP Adulte				Screening allergie alimentaire pour les adultes.	
TROPHATOP Enfant (< 15 ans)				Screening allergie alimentaire pour les enfants de moins de 15 ans	
Troponine I (cardiaque)				Examen non cumulable avec la CPK ni CKMB : Ne faire que Troponine. EXAMEN URGENT	jour même
TSH				Prélèvement à réaliser n'importe quand dans la journée même après prise de Levothyrox.	jour même
Lettre U					
Urée dans le sang					jour même
Urée dans les urines				Recueil des urines dans flacon stérile sans conservateur ou flacon urines de 24 heures.	jour même
Uréthral (prélèvement)				+ ATB	72h
Lettre V					
VDRL				Sérologie syphilitique	jour même
VGM				Volume globulaire moyen. Pour les demandes de la préfecture, merci de nous indiquer si le contrôle d'identité a bien été effectué s'il est demandé (indiquer le numéro du document vérifié).	jour même
Vitamine B12			SEK		24h
Vitamine B9 (Acide folique)			BIOLab	12 heures de jeûne.	24h
Vitamine D 25-OH				12 heures de jeûne.	jour même
Vitesse de sédimentation				Tube citraté VS	jour même

VMA	 (24h)		Flacon urines de 24 heures. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Lettre W				
Wright			Sérodiagnostic de la Brucellose (Wright). Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Lettres X-Y-Z				
Zinc érythrocytaire			TUBE HEPARINE SANS GEL. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	
Zinc dans le plasma			Tube spécifique à la demande. Examen transmis à un laboratoire spécialisé.	