La granitisation

Résumé de cours

I. Le granite

Roche magmatique plutonique, grenue : quartz + feldspaths (orthose, plagioclase) + micas. Riche en silice (≈ 70 %), claire, peu dense (≈ 2,7) ; constituant majeur de la croûte continentale.

II. L'anatexie

Fusion partielle des roches crustales (gneiss, micaschistes) à ≈ 650–700 °C en présence d'eau. Quartz et feldspaths fondent en premier → liquide granitique ; minéraux ferromagnésiens restent solides. **Migmatite** = leucosome clair (granitique) + mélanosome sombre (restite, foliation conservée).

III. Deux types de granites

Granite d'anatexie (autochtone)	Granite intrusif (allochtone)
cristallise sur place ; contacts progressifs (gneiss → migmatites → granite) ; associé au métamorphisme régional	magma monté dans la croûte ; contacts nets, filons sécants, enclaves ; auréole de métamorphisme de contact (cornéennes, schistes tachetés)

IV. Granitisation et collision

Épaississement crustal → hausse de température en profondeur → métamorphisme régional → anatexie → granites. Exemples : leucogranites de l'Himalaya ; granites hercyniens du Maroc (Massif central, Tichka).

Ressource originale proposée aux professeurs · Programme officiel marocain