



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

โรงพยาบาลรัฐประเทศ
เลขรับที่ 5289
วันที่ 30 ก.ย. 65
เวลา 08.15 น.

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ โทร. ๐ ๓๗๔๒ ๕๑๔๑-๔ ต่อ ๓๐๙
ที่ สก.๐๐๓๓.๐๐๓ / ๖๖๑๓/ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามสถานการณ์ และดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
นำโดยผู้ลงลายในช่วงการระบาด

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ

๑. เรื่องเดิม

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ พบผู้ป่วยสะสม ๑๙,๓๘๐ ราย มีผู้เสียชีวิต ๑๖ ราย ซึ่งมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงกว่าปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๖๗ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วยสะสม ๔๒๔ ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม ๕๓ ราย โดยทั้ง ๓ โรค มีแนวโน้มพบผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการโรคโควิด ๑๙ ประชาชนสามารถเดินทางและทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะได้มากขึ้น ประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน - กันยายน) ทำให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น เป็นปัจจัยทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกอาจพบผู้ป่วยสูงถึง ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ รายต่อเดือน อาจพบผู้ป่วยตลอดทั้งปีถึง ๔๕,๐๐๐ ราย

๒. ข้อเท็จจริง

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในช่วงการระบาด ดังนี้

๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง

๒. สนับสนุนการควบคุมโรค เมื่อพบผู้ป่วยทันที เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งแพร่โรคตามมาตรการ ๓-๓-๑ และดำเนินการต่อเนื่อง ๒๘ วัน

๓. สื่อสารแนวทางการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลายให้สถานพยาบาลในพื้นที่

๔. ในสถานพยาบาลพิจารณาเปิดจุดคัดกรองโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว และให้ใช้ Dengue Chart กรณีผู้ป่วยในที่มีวินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกแดงก็ทุกราย โดยไม่ต้องรอให้เข้าสู่ระยะวิกฤต

๕. สื่อสารประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิต เช่น โรคอ้วน โรคประจำตัว (โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง) หากมีไข้สูงเกิน ๒ วัน ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แนะนำให้ทานยาพาราเซตามอล เพื่อลดไข้ และให้หลีกเลี่ยงยาประเภท NSAIDs

๓. ข้อพิจารณา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลายต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ



เพื่อโปรดทราบ



เพื่อโปรดพิจารณา



เห็นควรมอบ..... นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด



อื่นๆ

(นายอิทธิพล อุดตมะปัญญา)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ(ด้านเวชกรรม)

ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

(นายราเชษฎ์ เจริญพนม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรัฐประเทศ



ที่ สธ ๐๔๑๑.๔/๓๐๙๙

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
รับเลขที่ 10990
วันที่ 23 มิ.ย. 2565
เวลา 16.19

กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓) กันยายน ๒๕๖๕

กลุ่มงานควบคุมโรค

เรื่อง ขอความร่วมมือติดตามสถานการณ์ และดำเนินการมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อใน
ในช่วงการระบาด

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ แผ่น
๒. คำแนะนำการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ พบผู้ป่วยสะสม ๑๙,๓๘๐ ราย มีผู้เสียชีวิต ๑๖ ราย ซึ่งมีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงกว่าปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑๖๗ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วยสะสม ๔๒๔ ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และโรคติดต่อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม ๕๓ ราย โดยทั้ง ๓ โรค มีแนวโน้มพบผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นเนื่องจากการผ่อนคลายมาตรการโรคโควิด 19 ประชาชนสามารถเดินทางและทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะได้มากขึ้น ประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน - กันยายน) ทำให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น เป็นปัจจัยทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกอาจพบผู้ป่วยสูงถึง ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ รายต่อเดือน อาจพบผู้ป่วยตลอดทั้งปีถึง ๔๕,๐๐๐ ราย

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือเร่งดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ในช่วงการระบาด ดังนี้

๑. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
๒. สนับสนุนการควบคุมโรคเมื่อพบผู้ป่วยทันที เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งแพร่โรคตามมาตรการ ๓-๓-๑ และดำเนินการต่อเนื่อง ๒๘ วัน
๓. สื่อสารแนวทางการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ นำโดยยุงลายให้สถานพยาบาลในพื้นที่
๔. ในสถานพยาบาลพิจารณาเปิดจุดคัดกรองโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ให้ได้รับการวินิจฉัย และรักษาอย่างรวดเร็ว และให้ใช้ Dengue Chart กรณีผู้ป่วยในที่วินิจฉัยเป็นไข้เลือดออกแดงก็ทุกราย โดยไม่ต้องรอให้เข้าสู่ระยะวิกฤติ
๕. สื่อสารประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิต เช่น โรคอ้วน โรคประจำตัว (โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง) หากมีไข้สูงเกิน ๒ วัน ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล แนะนำให้ทานยาพาราเซตามอล เพื่อลดไข้ และให้หลีกเลี่ยงยาประเภท NSAIDs เช่น ไอบูโพรเฟน แอสไพริน โคโคโรฟีแนค เป็นต้น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อภายใน

โทร. ๐ ๒๕๔๐ ๓๑๐๔ - ๕

โทรสาร ๐ ๒๕๔๓ ๘๔๒๒

สำเนาส่ง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

(นายแพทย์ เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับ นท. สสจ

กสธ. ขอความเห็นชอบเพื่อติดตามสถานการณ์ กสธ.
ดำเนินการตาม แผนงานวิจัยเกี่ยวกับความรุนแรง
ในครอบครัว

มติที่ประชุม กสธ. และ กพ. ทุกหน่วยงาน
ทราบ. เพื่อพิจารณา และดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป.

สุรพันธ์
28 กันยายน 65
28 กย 65

กพ. กสธ. (สสจ. กสธ.).



28 กย 65

(นายสิทธิพล อุดมระปัญญา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)
ปฏิบัติราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ.ศ. ๒๕๖๕

กองโรคติดต่อฯ โดยแมลง กรมควบคุมโรค

๑. การเฝ้าระวังโรค

- ๑.๑ มีทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) วิเคราะห์สถานการณ์โดยชี้เป้าอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ที่มีการระบาด และรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรับทราบ
- ๑.๒ เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) ในจังหวัดหรืออำเภอที่เข้าเกณฑ์
- ๑.๓ กำกับและติดตามสถานพยาบาลภายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีการรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออก เข้าระบบเฝ้าระวังโรคตามความเป็นจริง เพื่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรค

๒. การป้องกันและควบคุมโรค

- ๒.๑ สนับสนุนการควบคุมโรคเมื่อพบผู้ป่วยทันที เพื่อเป็นการกำจัดแหล่งแพร่โรคและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคไปยังพื้นที่อื่น ตามมาตรการ ๓-๓-๑ และดำเนินการต่อเนื่อง ๒๘ วัน
- ๒.๒ เร่งรัดการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในชุมชนและสถานที่ที่มีคนรวมกันทำกิจกรรมจำนวนมาก เช่น วัด โรงเรียน โรงพยาบาล โรงงาน สถานที่ราชการ และสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างต่อเนื่อง
- ๒.๓ ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องมือ สารเคมี ให้เพียงพอและพร้อมใช้ในการควบคุมโรค เช่น ทีมพ่นสารเคมี ยาพ่นกันยุง ทราายกำจัดลูกน้ำยุง สารเคมี และเครื่องพ่นสารเคมี

๓. การวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย

- ๓.๑ สื่อสารสถานการณ์การระบาดและการเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปยังสถานพยาบาลภายในจังหวัด เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ตระหนักถึงผู้ป่วยที่มารับการรักษา อาจป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก ควรให้การวินิจฉัยและรักษาตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกโดยเร็ว เพื่อลดโอกาสเกิดอาการรุนแรงและป้องกันการเสียชีวิต
- ๓.๒ ทบทวนทำเนียบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งกุมารแพทย์และอายุรแพทย์ในระดับจังหวัด ที่สามารถให้คำปรึกษาในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และจัดระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลในลำดับสูงขึ้นไปอย่างเหมาะสม
- ๓.๓ กรณีที่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต ให้ทำ Dead case conference ทุกราย เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง สาเหตุของการเสียชีวิต และแนวทางในการป้องกันการเสียชีวิต
- ๓.๔ ให้สถานพยาบาลพิจารณาเปิดจุดคัดกรอง (dengue corner) เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายโรคไข้เลือดออกให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็ว ในกรณีผู้ป่วยนอกต้องให้คำแนะนำอาการที่ต้องมากกลับมาโรงพยาบาล รวมทั้งแนะนำวิธีการป้องกันตนเองจากยุงกัด และกรณีผู้ป่วยที่รับรักษาในโรงพยาบาลให้ใช้ Dengue Chart ในการติดตามการรักษาผู้ป่วยที่วินิจฉัยเป็นโรคไข้เลือดออกเดงกี ทุกราย โดยไม่ต้องรอให้เข้าสู่ระยะวิกฤติ

๔. การสื่อสารความเสี่ยง

- ๔.๑ สื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนทราบสถานการณ์และความรุนแรงของโรค และให้สุศึกษาประชาชน เรื่องวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลายและการป้องกันยุงกัด รวมถึงอาการสำคัญที่ต้องไปพบแพทย์ และไม่ควรซื้อยา NSAIDs ทานเอง
- ๔.๒ สื่อสารไปยังประชาชนทุกกลุ่มให้ทราบสถานการณ์และความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงเสียชีวิต เช่น ผู้ที่มีโรคอ้วน ผู้ที่มีโรคประจำตัว (เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง) หากมีไข้สูงเกิน ๒ วัน ควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที แนะนำให้รับประทานยาพาราเซตามอล เพื่อลดไข้ ห้ามรับประทานยาประเภท NSAIDs เช่น ไอบูโพรเฟน แอสไพริน ไดโคลฟีแนค โดยเด็ดขาด
- ๔.๓ สื่อสารไปยังคลินิก ร้านขายยา งดจ่ายยา NSAIDs เช่น แอสไพริน ไอบูโพรเฟน ไดโคลฟีแนค เป็นต้น ในผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูง เนื่องจากอาจป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก หากได้รับยาดังกล่าวมีโอกาสเกิดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้



<https://bit.ly/3OWedLl>

เอกสารที่เกี่ยวข้อง



<https://bit.ly/3baJHij>

สถานการณ์โรคไข้เลือดออก

คำแนะนำการดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย

ในสถานการณ์ที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก พ.ศ ๒๕๖๕ ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พบผู้ป่วยสะสม ๑๙,๓๘๐ ราย มีผู้เสียชีวิตจำนวน ๑๖ ราย ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงกว่าปี ๒๕๖๔ ถึงร้อยละ ๑๖๗ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วยสะสมจำนวน ๔๒๔ ราย ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม จำนวน ๕๓ ราย โดยทั้ง ๓ โรค มีแนวโน้มพบผู้ป่วยจำนวนมากขึ้นเนื่องจากมีการผ่อนคลายมาตรการโรคโควิด-๑๙ ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางและทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะได้มากขึ้น เช่น โรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ทำงาน ประกอบกับอยู่ในช่วงฤดูฝน (มิถุนายน - กันยายน) ทำให้ปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น เป็นปัจจัยทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายจากการสำรวจลูกน้ำยุงลายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพบว่าร้อยละ ๔๐-๖๐ ของโรงเรียน วัด โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน และสถานที่ราชการพบลูกน้ำยุงลาย จึงเป็นสาเหตุส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกอาจพบผู้ป่วยสูงถึง ๑๐,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ รายต่อเดือน และอาจพบผู้ป่วยตลอดทั้งปีถึง ๙๕,๐๐๐ ราย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Dashboard สถานการณ์โรคติดต่อ นำโดยแมลง กองโรคติดต่อ นำโดยแมลง กรมควบคุมโรค <https://ddc.moph.go.th/dvb/news.php?news=๖๙๖&deptcode=>

จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลายในช่วงการระบาด และเพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรมีความปลอดภัยต่อการติดเชื้อ COVID - ๑๙ แต่ยังสามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลายได้ กองโรคติดต่อ นำโดยแมลง จึงได้จัดทำคำแนะนำการดำเนินการมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ในสถานการณ์ที่มีการระบาดโรค COVID - ๑๙ ดังต่อไปนี้

	การสำรวจลูกน้ำยุงลาย	การควบคุมยุงตัวเต็มวัย
ก่อนการปฏิบัติงาน	<p>๑. เน้นย้ำมาตรการ VUCA แก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ V (Vaccine) ควรได้รับการฉีดวัคซีน Covid-๑๙ จำนวน ๓-๔ เข็ม ครอบคลุมเวลาที่กำหนด U (Universal Prevention) ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา โดยเฉพาะเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก โดยสวมอย่างถูกวิธีทั้งหน้ากากผ้าและหน้ากากอนามัย ป้องกันการติดเชื้อและป่วยหนักได้ C (COVID free setting) สถานที่บริการควรมีความพร้อมปลอดภัย ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนครบและตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ A (Antigen Test kit) ควรมีการตรวจหาเชื้อ Covid-๑๙ เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการสงสัยเข้าได้กับนิยามโรค Covid-๑๙</p> <p>๒. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ควรมีมาตรการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานก่อนลงพื้นที่ทุกครั้ง หากพบผู้ปฏิบัติงานมีไข้ มากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรืออาการเข้าได้กับนิยาม โรค COVID - ๑๙ ให้งดปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลกรณีป้องกันโรค COVID - ๑๙ ทันที</p> <p>๓. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เจลล้างมือ ให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>๔. สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่อาจจะต้องใช้ร่วมกัน เช่น ไฟฉาย คลิปบอร์ด เป็นต้น ให้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ ๗๕% ก่อนการใช้งานเสมอ</p> <p>๕. ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาสุขอนามัยตนเองเสมอ เช่น หมั่นล้างมือก่อนหยิบจับสิ่งของ เป็นต้น</p> <p>๖. ผู้ปฏิบัติงานพ่นสารเคมีควรสวมชุดป้องกันสารเคมี หน้ากากที่สามารถกรองตัวทำละลายอินทรีย์ ฝุ่นมือ และรองเท้าบูท</p> <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - สำหรับเครื่องพ่นหมอกควันหากมีการสลับเปลี่ยนผู้ใช้งาน ให้เช็ดบริเวณกระบอกสูบ และด้ามจับด้วยแอลกอฮอล์ ๗๕% ก่อนปฏิบัติงานเสมอ - สำหรับเครื่องพ่น ULV สะพายหลัง ให้เช็ดบริเวณด้ามจับด้วยแอลกอฮอล์ ๗๕% ก่อนปฏิบัติงานเสมอ 	

	การสำรวจลูกน้ำยุงลาย	การควบคุมยุงตัวเต็มวัย
	<p>สำหรับเครื่องพ่น ULV ดิตรอยนต์ ควรมีการเช็ดบริเวณ พวงมาลัย เกียร์ คอนโทรลเครื่องพ่น หรือสิ่งที่ต้องจับต้องร่วมกัน ด้วยแอลกอฮอล์ ๗๕% ก่อนปฏิบัติงานเสมอ</p>	
ระหว่างการทำงาน	<p>๑. ผู้ปฏิบัติงานสำรวจลูกน้ำยุงลาย ควรเข้าไปในบ้านไม่เกิน ๒ - ๓ คนต่อหลังคาเรือน</p> <p>๒. เว้นระยะห่างระหว่างผู้สำรวจลูกน้ำยุงลาย และเจ้าของบ้าน อย่างน้อย ๑ - ๑.๕ เมตร</p> <p>๓. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ระหว่างปฏิบัติงานในชุมชน</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานต้องหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจล แอลกอฮอล์ระหว่างปฏิบัติงาน</p> <p>๕. หากมีการต้องสนับสนุนสิ่งของระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ยาทากันยุง ทราายที่มีฟอส เป็นต้น ให้ใช้วิธีการวาง แทนการยื่นให้ถึงมือเจ้าของบ้าน หรือสมาชิกในบ้าน</p> <p>๖. การให้สุศึกษา ควรเว้นระยะห่างกับเจ้าของบ้านหรือสมาชิกในบ้าน อย่างน้อย ๑ - ๑.๕ เมตร และไม่ควรเกิน ๓๐ นาที</p>	<p>๑. การเตรียมชุมชนก่อนการพ่นสารเคมี ผู้ปฏิบัติงานควรเว้นระยะห่างจากเจ้าของบ้าน อย่างน้อย ๑ - ๑.๕ เมตร หรือใช้เสียงตามสายของชุมชนในการ ชี้แจงการพ่นสารเคมี</p> <p>๒. ผู้ปฏิบัติงานพ่นสารเคมี ควรสวมชุด ป้องกันสารเคมี หน้ากากที่สามารถกรอง ตัวทำละลายอินทรีย์ ถุงมือ และรองเท้า บูทตลอดเวลา</p> <p>๓. ผู้พ่นสารเคมีควรเว้นระยะห่างจาก สมาชิกในทีม และบุคคลอื่น อย่างน้อย ๑ - ๑.๕ เมตร</p> <p>๔. ผู้ปฏิบัติงานต้องหมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ระหว่างปฏิบัติงาน</p> <p>๕. ในกรณีบ้านผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อนำ โดยยุงลายจำเป็นต้องพ่นสารเคมี โดยให้ เจ้าของบ้าน และสมาชิกในบ้าน ออกมา อยู่นอกบ้าน ให้อยู่ห่างกัน ๑ - ๑.๕ เมตร ขณะผู้พ่นกำลังดำเนินการพ่น สารเคมี ในบ้านและบริเวณบ้าน</p>
หลังการทำงาน	<p>๑. หลังจากการปฏิบัติการลงพื้นที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตอาการของตนเอง หากมีไข้ มากกว่า ๓๗.๕ องศาเซลเซียส หรืออาการเข้าได้กับนิยาม โรค COVID - ๑๙ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล กรณีป้องกันโรค COVID - ๑๙ ทันที</p> <p>๒. หลังใช้สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่อาจจะต้องใช้ร่วมกันเสร็จสิ้นให้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ ๗๕% เสมอ</p>	

หมายเหตุ

- หากไม่สามารถดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลายตามแผนการดำเนินงานปกติได้ ให้บูรณาการการดำเนินการ ควบคู่กับการลงพื้นที่ในการเฝ้าระวังโรค COVID - ๑๙

กันยายน ๒๕๖๕
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข