

1

(1) 最小正原根

检验可得模 (23) 的最小正原根为 $g=5$.

(2) 以 (5) 为底的指数表 (幂表) 与指标表 (对数表)

幂表 ($k=0,1,\dots,21$) : $5^k \pmod{23}$:

(k)	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
$5^k \pmod{23}$	1	5	2	10	4	20	8	17	16	11	9	22

(k)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
$5^k \pmod{23}$	18	21	13	19	3	15	6	7	12	14

定义指标 (离散对数) : $\operatorname{ind}_5(a)=k \iff 5^k \equiv a \pmod{23}$. 例如从表读出 $\operatorname{ind}_5(2)=2, \operatorname{ind}_5(3)=16, \operatorname{ind}_5(14)=21$.

(3) 用指数表解

令 $x \equiv 5^t \pmod{23}$. 由表 : $3 \equiv 5^{16} \pmod{23}, 2 \equiv 5^2 \pmod{23}$. 代入 : $3x^{14} \equiv 2 \iff 5^{16} \cdot (5^t)^{14} \equiv 5^2 \pmod{23} \iff 5^{16+14t} \equiv 5^2 \pmod{23}$. 由于 (5) 为原根 · 指数同余 (模 (22)) : $16+14t \equiv 2 \pmod{22} \iff 14t \equiv -14 \equiv 8 \pmod{22}$. $\gcd(14,22)=2 \Rightarrow 7t \equiv 4 \pmod{11}$. 在模 (11) 下 $7^{-1} \equiv 8 \pmod{11} \Rightarrow 7 \cdot 8 = 56 \equiv 1 \pmod{11}$, 所以 $t \equiv 4 \cdot 8 \equiv 32 \equiv 10 \pmod{11}$. 因此 (模 (22)) 有两解 : $t \equiv 10, 21 \pmod{22}$. 对应 $x \equiv 5^{10} \equiv 9 \pmod{23}, x \equiv 5^{21} \equiv 14 \pmod{23}$. 结论 : $\{x \equiv 9 \pmod{23} \text{ 或 } x \equiv 14 \pmod{23}\}$

2

$m=3 \cdot 13 \cdot 17=663$. 令 $m_1=3, m_2=13, m_3=17, M_i=\frac{m}{m_i}$. 则 $M_1=221, M_2=51, M_3=39$. 求逆元 :

- $(221 \equiv 2 \pmod{3}, (2^{-1} \equiv 2 \pmod{3}))$ · 取 $e_1=M_1 \cdot 2=442$.
- $(51 \equiv 12 \pmod{13}, (12^{-1} \equiv 12 \pmod{13}))$ · 取 $e_2=M_2 \cdot 12=612$.
- $(39 \equiv 5 \pmod{17}, (5^{-1} \equiv 7 \pmod{17}))$ · 取 $e_3=M_3 \cdot 7=273$.

取各模的既约剩余系 : $R_3=\{1,2\}, R_{13}=\{1,2,\dots,12\}, R_{17}=\{1,2,\dots,16\}$. 则模 (663) 的一个既约剩余系可写为 $\{R_{663}=\left\{\bigl(442a+612b+273c\bigr)\bmod 663 \mid a \in R_3, b \in R_{13}, c \in R_{17}\right\}\}$ 其大小 : $\varphi(663)=\varphi(3)\varphi(13)\varphi(17)=2 \cdot 12 \cdot 16=384$.

3.

设 (g) 是模 (m) 的原根，则 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}^\times = \langle g \rangle$, $\text{ord}_m(g) = \varphi(m)$. 所以任意单位都可表示为 $g^k \pmod m$. 由于 $(m > 2)$ ，有 $-1 \not\equiv 1 \pmod m$ ，且 $(-1)^2 \equiv 1 \pmod m$ ，所以 (-1) 在该乘法群中的阶为 (2) 。

在阶为 (n) 的循环群 $\langle g \rangle$ 中，阶为 (2) 的元素只能是 $g^{n/2}$ 。取 $n = \varphi(m)$ ，得 $-1 \equiv g^{\varphi(m)/2} \pmod m$. 所以以任一原根 (g) 为底的指标满足 $\text{ind}_g(-1) = \frac{\varphi(m)}{2}$.

4.

记 $\langle a_0, a_1, \dots, a_n \rangle = [a_0; a_1, \dots, a_n]$.

(a)

$[1; 2, 3] = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}} = 1 + \frac{1}{\frac{7}{3}} = 1 + \frac{3}{7} = \frac{10}{7}$. 渐进分数 (逐步截断) : $\{\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{10}{7}\}$

(b)

计算可得 $[2; 1, 1, 4, 1, 1] = \frac{51}{20}$. 渐进分数 : $\{\frac{2}{1}, \frac{3}{1}, \frac{5}{2}, \frac{23}{9}, \frac{28}{11}, \frac{51}{20}\}$

5.

(a)

$\frac{121}{21} = 5 + \frac{16}{21} = 5 + \frac{1}{\frac{21}{16}} = 5 + \frac{1}{1 + \frac{5}{16}} = 5 + \frac{1}{1 + \frac{1}{\frac{16}{5}}} = [5; 1, 3, 5]$. 因此 $\frac{121}{21} = \langle 5, 1, 3, 5 \rangle$. 渐进分数 : $\{\frac{5}{1}, \frac{6}{1}, \frac{23}{4}, \frac{121}{21}\}$

(b)

欧几里得算法给出 $\frac{177}{292} = [0; 1, 1, 1, 1, 5, 1, 8]$. 因此 $\frac{177}{292} = \langle 0, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 8 \rangle$. 渐进分数 : $\{\frac{0}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{5}, \frac{17}{28}, \frac{20}{33}, \frac{177}{292}\}$