Concept et Calcul des Normales Climatologiques Standard pour 1991-2020

Driss BARI

Centre National du Climat Direction Générale de la Météorologie, Casablanca, Maroc bari.driss@gmail.com (avec la contribution de Peer Hechler)

Atelier sur la gestion des données climatologiques, le partage et l'échange des données

DGM-OMM 4-5 et 8 Novembre 2021

Plan

- 1 Introduction sur les normales climatologiques standard
- 2 Directives OMM pour le calcul des normales climatologiques standard
- 3 Mécanismes de soumission et de collecte des normales climatiques
- Références utiles



Plan

- 1 Introduction sur les normales climatologiques standard



Définition

La résolution 16 (Cg-17) de 2015 a approuvé les amendements proposés au Règlement Technique (OMM-N 49), Volume I, en ce qui concerne la définition des normales climatologiques standard comme suit :

Normale climatologique standard: Moyenne des données climatologiques calculées pour les périodes consécutives de 30 ans suivantes se terminant par '0' : 1er janvier 1981-31 décembre 2010, 1er janvier 1991-31 décembre 2020, et ainsi de suite ;

Période de référence de l'OMM pour l'évaluation du changement climatique à long terme : La période consécutive de 30 ans du 1er janvier 1961 au 31 décembre 1990

Il est à noter que dans le passé, les normales climatologiques standard se référaient à des périodes de 30 ans non chevauchantes : 1901-1930, 1931-1960 et 1961-1990.



Importance des normales

Les normales climatologiques standard proviennent de la reconnaissance que les données climatologiques doivent être traitées sur des périodes uniformes conventionnelles, afin d'assurer la comparabilité entre les données collectées dans les stations du monde entier ainsi que de fournir une valeur de référence à long terme ou 'normale' avec laquelle des données de plus courte durée peuvent être comparées (par exemple mensuellement) .

Les normales climatologiques standard servent de base précieuse pour la recherche en climat, sa surveillance, les études de diagnostic du climat, ainsi que les applications et services climatiques.



But



Les normales climatologiques standard sont utilisées à deux fins principales :

- Elles servent de référence par rapport à laquelle les observations récentes ou actuelles peuvent être comparées, notamment en fournissant une base pour de nombreux ensembles de données climatiques basées sur des anomalies (par exemple, les températures moyennes mondiales : année yyyy était z degrés trop chaude/trop froide par rapport à la normale).
- Elles sont également largement utilisés, implicitement ou explicitement, comme prédiction des conditions les plus susceptibles d'être rencontrées dans un endroit donné.



Plan

- 1 Introduction sur les normales climatologiques standard
- 2 Directives OMM pour le calcul des normales climatologiques standard



WMO OMM

World Meteorological Organization Organisation météorologique mondiale Organización Meteorológica Mundial Всемирная метеорологическая организация النظمة العالبة للأرصاد الجوبأ # R = \$ iB iO

Notre réf.: 16953/2021/S/CS/CMP/CLINO9120 Annexes: 2 (disponibles en anglais seulement)

Objet: Recueil par l'OMM des normales climatologiques standard pour la

période 1991-2020 Suite à donner: Communiquer les données dès que possible à compter du 1er octobre 2021 et au plus tard le 31 mars 2022

Secrétariat

4 août 2021

7 bis, avenue de la Paix - Case postale 2300 CH 1211 Genève 2 - Suisse Tél: +41 (0) 22 730 81 11 Fax: +41 (0) 22 730 81 81 L'appel de l'OMM fournit wmo@wmo.int - public.wmo.int

> des informations détaillées sur le processus de soumission des CLINO, v compris les stations, les paramètres et les

formats.

Soumissions (EXCEL ou ASCII) à envoyer à wcdmp@wmo.int

Madame, Monsieur,

Je souhaite vous informer que l'Organisation météorologique mondiale (OMM) a pris des dispositions pour recueillir les normales climatologiques standard pour la période 1991-2020. Comme vous vous en souviendrez peut-être, le Dix-septième Congrès météorologique mondial (2015) a adopté la résolution 16 (Cg-17) - Rapport de la seizième

	ANNEXE 2, p. 2
World Meteocological Organization Climate Normals for 1965-2020 Single Station Data Sheet For All Climatological Surface Parameters	CONTENTS
Station Needer Record	BACKGROUND 1.1. World Meteorological Organization climate normals
	1.2 Submission channels
1980) teng prof tiladd Chon ving kystem (1980) (Varian skertline)F andråde) (2000) 2001. (Frankline) (Frankline) (Frankline) (Frankline) (Frankline) (Frankline) (Frankline) (Frankline) (Frankline)	METHODOLOGY FOR REPRESENTING THE CLIMATOLOGICAL STANDARD NORMALS FOR 1991-2020 1.1 Station header information 2.2 Statistical descriptors
Parameter Code Parameter Name India Parameter Code Description Total mm	Principal climatological surface parameters and units
WAID Number Parameter Code Calculation Name Calculation Code January February Wards	3. EXCEL SUBMISSION FOR EACH STATION RECORD
70261 5 548 4 119 222 9.4 70261 2 807 58 50 503 503	4. ASCII SUBMISSION IN COMMA SEPARATED VALUES FORMAT (*.CSV)
	5. SUBMISSION OF EXPLANATORY NOTES



Page

Les stations cibles pour CLINO

Les Membres sont invités à communiquer CLINO pour le plus de stations possible, y compris les stations enregistrées dans OSCAR/Surface, notamment les stations qui

- constituent les Réseaux Climatologiques de Base Régionaux (RBCN),
- transmettent des messages CLIMAT mensuels
- contribuent au recueil des World Weather Records.

Les éléments météorologique des CLINO

Principaux paramètres climatologiques de surface :

- Total des précipitations
- Nombre de jours avec précipitations ≥ 1 mm
- Valeurs moyennes mensuelles des températures maximales, minimales et moyennes journalières
- Valeur moyenne de la pression au niveau de la mer
- Pression de vapeur moyenne
- Nombre total d'heures d'ensoleillement

Paramètres climatologiques secondaires de surface : ...

Autres paramètres climatologiques de surface : ...



Qualité des données

Les normales climatologiques standard, par nature, constituent des données de haute qualité.

Les membres rejetteront prudemment les stations avec des données chronologiques douteuses.

Les données de séries chronologiques homogénéisées sont préférées, si elles sont disponibles.

L'automatisation à grande échelle des réseaux d'observation a commencé dans les années 1990 ; cela pose un défi particulier et requiert une sagesse nationale. Traitement des données de haute fréquence : **Approche conservatrice** (récupérer les temps conventionnels des observations) en cas de doute.



Données manquantes et lacunes


OMM-No. 1203 fournit certaines exigences de haut niveau concernant l'exhaustivité des données et l'estimation des données qui doivent être respectées.

Les bonnes pratiques nationales sont privilégiées dans les cas, où les règles mondiales ne sont pas applicables (la cohérence des relevés climatiques nationaux ne doit pas être compromise).

Considérez la priorité du **sauvetage des données** pour générer suffisamment de données de séries chronologiques pour le calcul CLINO 1991-2020.



Calcul des CLINO



Calcul des normales pour des périodes plurimensuelles (par exemple, saisonnières et annuelles) à partir des valeurs mensuelles

Calcul d'une normale mensuelle à partir des valeurs mensuelles individuelles pendant la période référence

Les normales annuelles doivent être calculées à partir des normales mensuelles et non à partir des valeurs annuelles individuelles. Les deux méthodes produiront des résultats identiques (à part, peut-être, de petites différences dues à l'arrondi) s'il n'y a pas de valeurs mensuelles manquantes, mais peuvent différer si certaines valeurs mensuelles sont manquantes.



Les paramètres à calculer pour CLINO

	Valeur moyenne	Valeur extrême	Valeur cumulée	dénombrement
Valeur mensuelle individuelle	La moyenne des valeurs quotidiennes enregistrées pendant le mois	La valeur la plus élevée ou la plus basse (suivant le cas) enregistrée au cours du mois		
Normale mensuelle	La moyenne de toutes les valeurs non manquantes pendant la période de référence pour le mois en question	La valeur la plus élevée (ou la plus basse) pendant la période de référence pour le mois en question	non manquantes pendant la période de	Cf. diapo. suivante
Normale plurimensuelle	La moyenne des normales mensuelles des mois considérés	Les valeurs mensuelles les plus élevées/basses des mois considérés	normales mensuelles	



Les paramètres à calculer pour CLINO

	Valeur de dénombrement
Valeur mensuelle individuelle	Pour le calcul de ce type de valeur, le nombre de jours au cours desquels se produit un phénomène (ou au cours desquels un seuil est dépassé) doit être converti en ratio ou en pourcentage du nombre de jours d'observation. Ainsi, si le phénomène s'est produit au cours de 22 jours d'un mois comptant 25 jours d'observations, on obtiendra un ratio de 0,88 ou un pourcentage de 88 %.
Normale mensuelle	On procède d'abord au calcul d'un ratio / pourcentage moyen pour le mois à partir des ratios / pourcentages de chaque mois pendant la période de référence. Il convient alors de reconvertir les ratios / pourcentages moyens obtenus en nombre moyen de jours du mois en les multipliant par le nombre de jours que compte le mois. Ainsi, un ratio moyen de 0,88 pour janvier correspond à (0,88 x 31)=27,28 jours, ou une valeur arrondie de 27,3 jours (on multipliera les valeurs obtenues pour le mois de février par 28,25 jours).



Exhaustivité des données

	Valeur mensuelle individuelle	Normale mensuelle
Valeur moyenne Valeur de dénombre ment	il ne doit pas être calculé si l'un des critères suivants est satisfait : -> Les observations sont manquantes pendant 11 jours ou plus au cours du mois ; -> Les observations sont manquantes pour une période de 5 jours consécutifs ou plus au cours du mois.	Il peut être calculé lorsqu'il existe des valeurs mensuelles valides dans au moins 80 % des années de la période
Valeur cumulée	Il ne peut être calculé que s'il existe des données complètes sur le mois (exceptions : disponibilité des valeurs cumulées, potentiel d'estimation)	de référence (sans critère supplémentaire d'années consécutives) ;
Valeur extrême	Il doit être calculé pour un mois, quelle que soit la quantité de données disponibles au cours de ce mois.	lorsqu'il existe des valeurs mensuelles valides pour la moyenne de l'élément sous-jacent dans au moins 80 % des années de la période de référence



Exhaustivité des données

- Dans tous les cas, on ne procédera au calcul de la normale que si les critères d'exhaustivité des données sont remplis. Mais, les bonnes pratiques nationales sont privilégiées dans les cas où les règles générales strictes ne sont pas applicables (la cohérence des relevés climatiques nationaux ne doit pas être compromise).
- Une valeur jugée douteuse ou erronée à l'issue du contrôle de qualité est considérée comme manquante.
- Si la normale mensuelle de l'un des mois de la période de référence est manquante, la normale plurimensuelle sera considérée comme manquante également.



Précision et arrondissement des données

- Il est recommandé d'arrondir au dixièmé près les valeurs mensuelles individuelles, les normales mensuelles ainsi que plurimensuelles.
- Pour l'arrondi, il est préférable d'utiliser l'arrondissement au 'pair' le plus proche (où une valeur ayant comme décimale .5 est arrondie au nombre pair le plus proche).

Metadonnées

Les métadonnées qui devraient être incluses avec les normales climatiques comprennent :

- Indicatifs actuels de chaque station (Indicatif OMM, identifiant national et nom de la station) ;
- La latitude, longitude et élévation de chaque station à la fin de la période de référence;
- Informations sur tout changement notable s'étant produit dans les stations pendant ou après la période de référence et, s'il y a lieu, des méthodes employées pour l'ajustement des données;
- La définition de la journée climatologique ;
- La méthode de calcul des moyennes quotidiennes de la température, de la pression et de la tension de vapeur.



Plan

- 1 Introduction sur les normales climatologiques standard
- Mécanismes de soumission et de collecte des normales climatiques



WMO OMM



World Meteorological Organization Organisation météorologique mondiale Organización Meteorológica Mundial Всемирная метеорологическая организация المنظمة العالمة للأرصاد الجوبة 世界气象组织

Secrétariat 7 bis, avenue de la Paix - Case postale 2300 CH 1211 Genève 2 - Suisse Tél: +41 (0) 22 730 81 11 Fax: +41 (0) 22 730 81 81 wmo@wmo.int - public.wmo.int

4 anût 2021

Notre réf.: 16953/2021/S/CS/CMP/CLINO9120

Annexes: 2 (disponibles en anglais seulement)

Objet:

Recueil par l'OMM des normales climatologiques standard pour la

période 1991-2020

Suite à donner: Communiquer les données dès que possible à compter du 1er octobre 2021

et au plus tard le 31 mars 2022

Afin de faciliter la publication des normales climatologiques standard de l'OMM pour la période 1991-2020, je vous saurais gré de communiquer vos données le plus rapidement possible, à partir du 1er octobre 2021 et au plus tard le 31 mars 2022, au Secrétariat de l'OMM (wcdmp@wmo.int), Veuillez utiliser l'obiet suivant pour votre soumission: «CLINO [nom du pays/territoire]» (exemple: CLINO Allemagne).



Format des livrables

- Pour une seule station, le fichier est nommé comme suit : StationName_Number.xls (.csv) sans espaces ni caractères spéciaux.
- Si nécessaire, soumettez plusieurs fichiers sous format compressé compatible avec Windows. Le nom du fichier est nommé comme suit: CountryName WMO Normals 9120.zip sans espaces.
- Soumission sous format ASCII : **Un seul fichier *.csv par station.**
- Soumissions sous format Excel: Un pays membre peut soumettre des fichiers individuels par station, ou en utilisant un seul fichier Excel pour toutes les stations. Pour les fichiers avec plusieurs stations, ne pas mettre plusieurs stations dans une seule feuille Excel. Chaque station doit avoir sa propre feuille, avec le nom de cette feuille comme suit: StationName_Number sans espaces ni caractères spéciaux.
- Si une valeur est manquante, laissez le champ vide. Les points décimaux sont représentés par point ".". S'il n'y a pas de précipitation ou il y a seulement des traces, le champ doit être "0.0".



Fichier Excel modèle

	ological Organization Climate Normals for 1981-2010					
Single Station (Data Sheet For All Climatological Surface Parameters					
Station Header	Record					
Country_Name	UNITED_STATES_OF_AMERICA					
Station_Name	FAIRBANKS_INTL					
WMO_Number	Latitude	Longitude	Station_Height			
70261	64 49 00 N	147 52 00 W	133			
WMO Integrated G	ilobal Observing System (WIGOS) Station Identifier (if available)					
0-20000-0-70261						
Principal Climat	tological Surface Parameters					
Parameter_Code	Parameter_Name	Units				
Parameter_Code	Parameter_Name Precipitation_Total	Units mm				
1			Calculation_Code	January	February	March
1 WMO_Number	Precipitation_Total	mm	Calculation_Code	January 11.9	February	March 9.4
Parameter_Code 1 WMO_Number 70261 70261	Precipitation_Total	mm Calculation_Name	Calculation_Code 4 98	_		
WMO_Number	Precipitation_Total	mm Calculation_Name Sum	4	11.9	10.2	9.4
1 WMO_Number 70261 70261	Precipitation_Total	mm Calculation_Name Sum	4	11.9	10.2	9.4
1 WMO_Number 70261 70261 Parameter_Code	Precipitation_Total Parameter_Code 1	Cakulation_Name Sum NOY	4	11.9	10.2	9.4
1 WMO_Number 70261 70261 Parameter_Code	Precipitation_Total Parameter_Code 1 Parameter_Name	Cakulation_Name Sum NOY	4	11.9	10.2	9.4
1 WMO_Number 70261 70261 Parameter_Code 2	Precipitation_Total Parameter_Code 1 1 1 Parameter_Name Number_of_Days_with_Precipitation_>=_1_trin	Calculation_Name Sum NOY Units count_%	4 98	11.9	10.2 30.0	9.4
WMO_Number	Precipitation_Total Parameter_Code 1 1 1 Parameter_Name Number_of_Days_with_Precipitation_>=_1_trin	Calculation_Name Sum NOY Units count_5i Calculation_Name	4 98	11.9 30.0	10.2 30.0 February	9. 30.



Fichier CSV modèle

```
World Meteorological Organization Climate Normals for 1981-2010
Single Station Data Sheet For All Climatological Surface Parameters
Station Header Record
Country_Name,UNITED_STATES_OF_AMERICA
Station Name.FAIRBANKS INTL
WMO_Number,Latitude,Longitude,Station_Height
70261.64|49|00|N.147|52100|W.133
WMO Integrated Global Observing System (WIGOS) Station Identifier (if available)
0-20000-0-70261
Principal Climatological Surface Parameters
Parameter_Code.Parameter_Name.Units
1.Precipitation Total.mm
wMo_Number,Parameter_Code,Calculation_Name,Calculation_Code,January,February,March,April,May,
70261.1.Sum.4.11.9.10.2.9.4.8.1.15.5.34.8.47.5.49.8.24.1.22.9.20.3.21.6.276.1
Parameter_Code.Parameter_Name.Units
2.Number_of_Days_with_Precipitation_>=_1_mm,count_%
wMO_Number, Parameter_Code, Calculation_Name, Calculation_Code, January, February, March, April, May,
70261,2,Count %,5,12,3,9,9,9,7,9,0,12,3,23,7,28,0,27,4,8,7,21,3,20,0,18,4,17,6
```



Collection des normales climatiques

Ces normales seront collectées et hébergées pour un accès mondial à la NOAA aux États-Unis comme cela a été fait au milieu des années 1990s, lorsque les normales climatiques de 1961-1990 ont été collectées pour l'OMM et sont toujours disponibles au site web du Centre de météorologie d'Asheville :

https://www.ncei.noaa.gov/products/wmo-climate-normals.



Remise des notes explicatives

Il est fortement recommandé de fournir des notes explicatives avec la soumission des données au format texte (document WORD ou fichier TEXTE; nom de fichier :

CountryName_WMO_Normals_9120_Additional.doc), en utilisant l'une des langues de l'OMM.


Les notes explicatives documentent les informations nécessaires pour interpréter correctement les normales climatologiques standard soumises. Les exemples de notes explicatives incluent des informations sur

- l'homogénéité des séries temporelles sous-jacentes,
- l'utilisation de méthodes d'estimation des données pour combler les lacunes dans les séries chronologiques sous-jacentes,
- les implications de l'automatisation de la station,
- moins de 30 ans d'observations,
- la formule utilisée pour le calcul de la pression de vapeur
- etc.



Notes sur les aspects de communication

- La définition et l'utilisation des normales climatiques doivent être documentées et communiquées de manière claire et précise pour éviter les erreurs d'interprétation.
- En cas de mise à jour des normales climatologiques standard, il est recommandé de produire une note explicative pour tous les utilisateurs des produits et services concernés.
- Le processus de calcul des CLINO doit être bien documenté en interne. Cela inclut les ensembles de données utilisés, les méthodes de calcul, les ajustements de données, etc. Une telle documentation est indispensable pour les futurs questions, évaluations, applications, erecalculs, etc.



https://www.meteoswiss.admin.ch/home/climate/the-climate-of-switzerland/climate-normals.html

Plan

- 1 Introduction sur les normales climatologiques standard

- Références utiles



Références utiles



Organisation Météorologique Mondiale

WMO No. 1203

Directives de l'OMM pour le calcul des normales climatiques

Edition 2017

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=4220



Références utiles



Organisation Météorologique Mondiale

WMO No. 100

Guide des pratiques climatologiques

Edition 2018

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=9864



MERCI

Driss BARI bari.driss@gmail.com

