

Mẹo làm Abstract Reasoning nhanh và đúng

Tài liệu đi kèm trang thi thử Cognitive Test. Phần Abstract Reasoning có 50 câu trong 10 phút, tức khoảng 12 giây mỗi câu. Mỗi mẹo dưới đây đều có ví dụ minh họa: dãy hình được đánh số, ô "?" là hình cần tìm, ô viền xanh là đáp án đúng.

Tóm tắt nhanh

Việc cần làm	Vì sao
Nhìn 4 phương án trước	Biết ngay chỉ cần kiểm tra yếu tố nào
Kiểm tra theo thứ tự cố định: số lượng, xoay, vị trí, màu, kích thước	Không bỏ sót, không mất thời gian nghĩ nên xem gì
Tìm được quy luật nào, loại đáp án ngay	Thường chỉ cần 2 quy luật là ra đáp án
Quá 20 giây thì đoán và đi tiếp	Kẹt 1 câu 1 phút là mất 4–5 câu khác
Không bao giờ bỏ trống	Đoán bừa vẫn có 25% cơ hội đúng

1. Nhìn đáp án trước

Trước khi phân tích dãy hình, liếc qua 4 phương án. Chúng thường giống nhau ở hầu hết chi tiết và chỉ khác ở 1–2 điểm. Những điểm khác nhau đó là yếu tố duy nhất bạn cần kiểm tra.

Ví dụ 1



1



2



3



4




Phương án



A



B



C



D

Quan sát phương án: cả 4 đều là mũi tên hướng lên, chỉ khác số chấm (4, 5 hoặc 6) và tô đặc hay rỗng. Vậy không cần xem hướng hay hình dạng.

Số chấm: 1, 2, 3, 4, nên hình 5 có 5 chấm. Loại B và D.

Màu: rỗng, đặc, rỗng, đặc, nên hình 5 rỗng. Loại A.

Đáp án: C. Toàn bộ chỉ mất khoảng 5 giây.

2. Kiểm tra theo một thứ tự cố định

Luôn dò các yếu tố theo cùng một thứ tự: **số lượng, xoay, vị trí, màu, kích thước**. Làm vậy vài chục câu là thành phần xạ, mất tự biết nhìn vào đâu. Dưới đây là ví dụ cho từng yếu tố.

2.1. Số lượng: cạnh, chấm, đường kẻ, số hình

Ví dụ 2: số cạnh tăng dần




Tam giác (3 cạnh), hình vuông (4), ngũ giác (5), lục giác (6). Mỗi bước thêm 1 cạnh, nên hình 5 có **7 cạnh**.

Mẹo đếm: với hình nhiều cạnh, đếm số đỉnh nhọn nhanh hơn đếm cạnh. Đếm thầm bằng ngón tay trên bàn để khỏi phải đếm lại.

2.2. Xoay


Ví dụ 3: xoay 90° theo chiều kim đồng hồ



Mũi tên chỉ lên, sang phải, xuống, sang trái. Mỗi bước xoay 90° theo chiều kim đồng hồ.

Bước tiếp theo quay về vị trí ban đầu: **mũi tên chỉ lên**. Xoay 4 lần 90° là đủ một vòng 360° .

Ví dụ 4: xoay 45° mỗi bước




Mũi tên lần lượt chỉ lên, chéo lên phải, sang phải, chéo xuống phải. Mỗi bước 45° theo chiều kim đồng hồ.

Hình 5: thêm 45° nữa, nên **mũi tên chỉ thẳng xuống**.

Bẫy thường gặp: phương án sai hay là hình xoay 90° (chéo xuống trái) hoặc lặp lại hình 4.

2.3. Vị trí

Ví dụ 5: ô vuông nhỏ đi theo chiều kim đồng hồ



Ô vuông nhỏ đi từ góc trên trái, sang trên phải, xuống dưới phải, rồi dưới trái. Mỗi bước 1 góc theo chiều kim đồng hồ.

Hình 5: ô vuông quay về **góc trên trái**.

Lưu ý: nếu ô vuông nhảy sang góc đối diện thì đó là bước 2 góc. Khi đó hình 1, 3, 5 giống nhau và hình 2, 4 giống nhau.

2.4. Màu: tô đặc hay rỗng

Ví dụ 6: chu kỳ 3



Đặc, rỗng, rỗng, đặc. Hình 4 giống hệt hình 1, nên quy luật lặp lại sau mỗi 3 hình.

Hình 5 phải giống hình 2: **ngũ giác rỗng**.

Mẹo: tìm xem hình nào giống hình 1. Nếu hình 3 giống hình 1 thì chu kỳ 2; nếu hình 4 giống hình 1 thì chu kỳ 3.

2.5. Kích thước

Ví dụ 7: to dần




Tam giác to dần đều qua mỗi bước, nên hình 5 là **tam giác lớn hơn hình 4**.

Lưu ý: kích thước khó so bằng mắt nhất. Hãy so hình 4 với các phương án, đừng so với hình 1.


3. Loại trừ: mỗi quy luật loại một đáp án

Câu khó thường có 2–3 quy luật chạy cùng lúc. Không cần tìm hết rồi mới chọn. Tìm ra quy luật nào thì gạch ngay đáp án vi phạm quy luật đó. Mỗi phương án sai thường chỉ sai đúng **một** yếu tố, nên hai phương án gần giống nhau thì chỗ khác nhau chính là chi tiết quyết định.

Ví dụ 8: ba quy luật cùng lúc



Phương án



Quy luật 1, số cạnh tăng 1: 3, 4, 5, 6, nên hình 5 có 7 cạnh. B có 6 cạnh, **loại B**.

Quy luật 2, màu xen kẽ: rỗng, đặc, rỗng, đặc, nên hình 5 rỗng. A tô đặc, **loại A**.

Quy luật 3, ô vuông đi theo chiều kim đồng hồ: hình 5 quay về góc trên trái. C ở góc trên phải, **loại C**.

Đáp án: D. Để ý rằng A, B, C mỗi phương án chỉ sai đúng một yếu tố.


Phương án	Số cạnh = 7	Rỗng	Góc trên trái	Kết luận
A	✓	✗	✓	Loại
B	✗	✓	✓	Loại
C	✓	✓	✗	Loại
D	✓	✓	✓	Đúng

4. Mẹo nhận diện nhanh

4.1. So hình đầu với hình cuối

Trước khi xem từng bước, so hình 1 với hình 4 để thấy xu hướng chung, rồi chia đều cho 3 bước.

Ví dụ 9: số chấm tăng 2




Hình 1 có 1 chấm, hình 4 có 7 chấm: tăng 6 qua 3 bước, tức **mỗi bước +2**.

Hình 5: $7 + 2 = 9$ **chấm**. Không cần đếm kỹ hình 2 và hình 3.

4.2. Hình 1 giống hình 3 thì gần như chắc chắn là xen kẽ

Ví dụ 10: lật qua lại




Mũi tên chỉ lên, xuống, lên, xuống. Hình 5 lặp lại hình 1 và hình 3: **chỉ lên**.

Dạng này làm được trong 2–3 giây nếu nhận ra ngay hình 1 và hình 3 giống nhau.

4.3. Theo dõi một điểm cố định khi hình xoay

Ví dụ 11: xoay ngược chiều kim đồng hồ



Chỉ nhìn vào đầu mũi tên: phải, lên, trái, xuống. Đầu mũi tên đi **ngược chiều kim đồng hồ** 90° mỗi bước.

Hình 5: đầu mũi tên **chỉ sang phải**. Với hình phức tạp, chọn một chi tiết dễ nhận (một góc, một chấm, một đầu nhọn) và chỉ theo dõi chi tiết đó.

5. Quản lý thời gian

Trung bình 12 giây mỗi câu, nhưng không phải câu nào cũng tốn 12 giây. Câu một quy luật nên xong trong 5–8 giây để dành thời gian cho câu khó. Dùng các mốc sau để biết mình đang nhanh hay chậm:


Đồng hồ còn	Nên làm xong khoảng	Nếu chậm hơn
8:00	Câu 10	Tăng tốc, đoán sớm hơn ở câu khó
6:00	Câu 20	Áp dụng nghiêm ngặt quy tắc 20 giây
4:00	Câu 30	
2:00	Câu 40	
0:30	Câu 47–48	Chọn nhanh các câu còn lại, không bỏ trống

- **Quy tắc 20 giây:** quá 20 giây chưa ra thì chọn phương án khả dĩ nhất (thường là phương án thỏa mãn nhiều quy luật bạn đã tìm được nhất) và đi tiếp.
- **Không đổi đáp án** sau khi đã chọn, trừ khi thấy rõ mình sai.
- **Không bao giờ bỏ trống:** đoán bừa có 25% cơ hội đúng, bỏ trống chắc chắn là 0.

6. Các dạng khác có thể gặp trong đề thật

Trang thi thử luyện dạng dãy hình. Đề thật có thể có thêm ma trận 3×3 hoặc tìm hình khác loại. Cách kiểm tra từng yếu tố và loại trừ vẫn áp dụng y nguyên.

Ví dụ 12: ma trận 3×3




Theo hàng: mỗi hàng có cùng số chấm (hàng 1: 1 chấm, hàng 2: 2 chấm, hàng 3: 3 chấm).

Theo cột: mỗi cột có cùng hình (tam giác, hình vuông, ngũ giác).

Ô trống ở hàng 3, cột 3: **ngũ giác có 3 chấm**. Với ma trận, luôn xét riêng quy luật theo hàng và theo cột.

Ví dụ 13: tìm hình khác loại



Bốn hình lần lượt là A, B, C, D. Quy luật chung: **số chấm bằng số cạnh** (3–3, 4–4, 6–6).

Hình C là ngũ giác nhưng chỉ có 4 chấm, nên **C là hình khác loại**.

Mẹo: với dạng này, tìm mối quan hệ giữa hai yếu tố trong cùng một hình (số chấm và số cạnh, màu và hướng), không chỉ so các hình với nhau.

7. Lộ trình luyện với trang thi thử

Bước	Làm gì	Mục tiêu
1	Mở "Xem đề và đáp án", chọn Abstract, mức Dễ. Đọc giải thích của 50 câu.	Nhận ra 5 dạng quy luật trong vài giây
2	"Luyện riêng" Abstract ở mức Dễ, có tính giờ.	Đúng trên 45/50, trung bình dưới 10 giây mỗi câu
3	Luyện mức Trung bình rồi Khó. Sau mỗi lần, lọc câu Sai trong trang kết quả.	Tìm ra quy luật mình hay bỏ sót
4	Làm "Thi thử đầy đủ" mức Tăng dần.	Giữ nhịp độ khi đã mệt sau 2 phần đầu

Ở trang kết quả, xem dòng "trung bình ... giây mỗi câu" của phần Abstract. Nếu con số trên 12 giây, ưu tiên tập ra quyết định nhanh hơn trước khi lo về độ chính xác.