Université d'Angers
Master 2 Ingénierie des Données et Évaluations Économétriques

Dossier de Recherche Opérationnelle et Optimisation
Sujet 3 : problème de gestion des stocks

Gestion des stocks d'un supermarché

Quand y a-t-il rupture, quand et combien commander,
comment répartir le stock entre le rayon et la réserve ?

Programmation linéaire et algorithme du simplexe :
un cas résolu à la main, puis une application Python

Diakhou Mbengue

Année universitaire 2026 à 2027

Résumé

Ce dossier étudie la gestion des stocks d'un supermarché et répond à trois questions : quand y a-t-il rupture, quand et combien commander, comment répartir le stock entre le rayon et la réserve. Il utilise les méthodes du cours : programmation linéaire, méthode graphique, méthode des sommets et algorithme du simplexe.

La démarche se fait en deux temps. Dans la partie 2, les trois questions sont traitées **entièrement à la main sur un magasin de deux produits**, ce qui permet de voir chaque étape : le programme linéaire, la méthode graphique, les trois tableaux du simplexe, puis la lecture des ruptures, du calendrier de commande et du partage du rayon. Dans la partie 3, la même démarche est programmée en Python pour obtenir une **application** qui accepte un nombre quelconque de produits : elle est vérifiée sur le cas à deux produits, appliquée aux six produits d'un Super U, puis testée jusqu'à 1 000 produits.

Sur le cas à six produits, la marge maximale est de 5 630,55 € par semaine, avec un budget entièrement dépensé. Les ruptures (lait et yaourts à partir du vendredi soir, eau le dimanche) coûtent 711,45 € par semaine. Un meilleur partage du rayon rapporte 44,88 € par jour, et un second remplissage quotidien supprime toutes les ventes perdues en rayon.

Mots-clés : gestion des stocks, programmation linéaire, algorithme du simplexe, variables d'écart, rupture, rayon, réserve, application Python.

Les chiffres clés

	2 produits (à la main)	6 produits (application)
Marge hebdomadaire maximale	550 €	5 630,55 €
Nombre de pivots du simplexe « commandes »	2	8
Marge perdue chaque semaine à cause des ruptures	570 €	711,45 €
Marge par jour, rayon actuel → rayon optimal	120 → 130 €	806 → 850,88 €

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Contexte et problématique . . . 3
1.2 Démarche : d'abord à la main, ensuite par une application . . . 3

2 Le cas manuel : un magasin de deux produits **4**
2.1 Les données . . . 4
2.2 Combien commander ? . . . 4
2.3 Quand y a-t-il rupture ? . . . 6
2.4 Quand commander ? . . . 6
2.5 Rayon ou réserve ? . . . 7
2.6 Synthèse du cas à deux produits . . . 8

3 L'application Python : un nombre quelconque de produits **9**
3.1 Pourquoi une application . . . 9
3.2 Comment elle fonctionne . . . 9
3.3 Vérification sur le cas à deux produits . . . 10
3.4 Application aux six produits d'un Super U . . . 11
3.4.1 Combien commander ? . . . 11
3.4.2 Quand y a-t-il rupture ? . . . 12
3.4.3 Quand commander ? . . . 13
3.4.4 Rayon ou réserve ? . . . 13
3.5 Passage à l'échelle . . . 14

4 Discussion : limites **15**

5 Conclusion **15**

Bibliographie **16**

Annexe : le cœur de l'algorithme **16**

1 Introduction

1.1 Contexte et problématique

Dans la grande distribution, le stock est à la fois une nécessité et un coût. S'il est trop faible, le rayon est vide, la vente est perdue et le client peut changer d'enseigne. S'il est trop élevé, il immobilise de la trésorerie et occupe une réserve dont la surface est limitée. Le responsable d'un magasin doit donc répartir des ressources rares, l'argent et la place, entre des produits qui n'ont ni le même coût, ni le même volume, ni la même marge.

La recherche opérationnelle regroupe les méthodes qui aident à prendre ce type de décision : modéliser un problème, puis chercher la meilleure solution avec un algorithme. La programmation linéaire consiste à maximiser une fonction économique linéaire sous des contraintes linéaires : c'est exactement la forme du problème du magasin. Ce dossier pose trois questions :

1. **Quand y a-t-il rupture ?**
2. **Quand et combien commander ?**
3. **Comment répartir le stock entre le rayon et la réserve ?**

1.2 Démarche : d'abord à la main, ensuite par une application

Une solution calculée par un programme n'a de valeur que si l'on comprend ce que le programme fait. Le dossier procède donc en deux temps.

- **Partie 2 : un magasin de deux produits, résolu à la main.** Avec deux produits, les tableaux du simplexe tiennent sur une page et la méthode graphique se dessine. Les trois questions y sont traitées l'une après l'autre.
- **Partie 3 : une application Python pour un nombre quelconque de produits.** La même démarche est programmée. L'application est d'abord vérifiée sur le cas à deux produits, puis appliquée aux six produits d'un Super U (hypothèses imaginaires), puis testée sur 10, 100, 300 et 1 000 produits.

Tableau 1 – Les questions du dossier et les méthodes du cours utilisées

Question	Méthode	Cours
Combien commander ?	Programme linéaire « commandes », méthode graphique, méthode des sommets, algorithme du simplexe	Chapitre 1
Quand y a-t-il rupture ?	Lecture des variables d'écart du tableau final	Chapitre 1
Quand commander ?	Calendrier construit à partir des délais de livraison	Calcul simple
Rayon ou réserve ?	Programme linéaire « rayon », résolu de la même façon	Chapitre 1

2 Le cas manuel : un magasin de deux produits

2.1 Les données

Un petit magasin vend deux produits, A et B. Les chiffres sont choisis pour que les calculs tombent juste. Le magasin est livré le lundi matin et le rayon est rempli une fois par jour, le matin.

Tableau 2 – Données du magasin à deux produits

	Produit A	Produit B
Demande par jour	20	20
Demande par semaine $H_i = 7\,d_i$	140	140
Coût d'achat c_i	2 €	4 €
Prix de vente p_i	5 €	9 €
Marge $m_i = p_i - c_i$	3 €	5 €
Volume v_i	1 litre	1 litre
Délai de livraison L_i	2 jours	3 jours
Stock de sécurité SS_i	20	20
Places actuelles en rayon	15	15

Ressources du magasin : **budget de 400 € par semaine**, **réserve de 150 litres**, **rayon de 30 litres** (les 15 + 15 places actuelles).

Servir toute la demande coûterait $2 \times 140 + 4 \times 140 = 840$ € et occuperait 280 litres : c'est plus que le budget et la réserve. Le magasin ne peut donc pas tout commander, et il faut choisir quoi commander en priorité.

2.2 Combien commander ?

Le programme linéaire

On note a et b les quantités de A et de B commandées pour la semaine.

$$
\begin{aligned}
&\max\ Z = 3a + 5b && \text{(fonction économique : marge de la semaine)}\\
\text{SC}:\quad &2a + 4b \le 400 && \text{(budget)}\\
&a + b \le 150 && \text{(réserve)}\\
&a \le 140, \quad b \le 140 && \text{(plafonds : on ne vend pas plus que la demande)}\\
&a,\ b \ge 0
\end{aligned}
$$

Méthode graphique et méthode des sommets




Figure 1 – Méthode graphique : programme admissible et optimum

Le programme admissible est le polygone grisé de la figure 1. On déplace la droite $Z = 3a + 5b$ parallèlement à elle-même, le plus loin possible de l'origine : elle quitte le programme admissible au point $(100; 50)$. La méthode des sommets confirme ce résultat, car la solution optimale est en l'un des sommets du programme admissible :

Sommet	$O(0;0)$	$A(140;0)$	$B(140;10)$	$C(100;50)$	$D(0;100)$
Valeur de Z	0	420	470	**550**	500

Le sommet C est à l'intersection du budget et de la réserve : $a+b = 150$ et $2a+4b = 400$ donnent $b = 50$ et $a = 100$. Solution optimale : $(Z^*; a^*; b^*) = (550; 100; 50)$.

Algorithme du simplexe

On intègre les variables d'écart e_1 (budget non dépensé), e_2 (litres libres en réserve), e_3 et e_4 (demande de A et de B non servie). La solution réalisable de base initiale, où l'on ne commande rien, est $S_0 = (Z; a; b; e_1; e_2; e_3; e_4) = (0; 0; 0; 400; 150; 140; 140)$. À chaque étape, la variable entrante est celle dont le profit marginal Δ_j est le plus grand, et la variable sortante celle dont le rapport b_i/a_{ij} est le plus petit (uniquement pour les a_{ij} strictement positifs).

Tableau 1 : b entre ($\Delta = 5$), e_1 sort (rapport 100), le pivot est 4.

c_B	Base	a	b	e_1	e_2	e_3	e_4	b_i	Rapport
0	e_1	2	**4**	1	0	0	0	400	**100**
0	e_2	1	1	0	1	0	0	150	150
0	e_3	1	0	0	0	1	0	140	
0	e_4	0	1	0	0	0	1	140	140
	Δ_j	3	**5**	0	0	0	0	0	

Tableau 2 : $S_1 = (500; 0; 100; 0; 50; 140; 40)$; a entre ($\Delta = 0{,}5$), e_2 sort (rapport 100), le pivot est 0,5.

c_B	Base	a	b	e_1	e_2	e_3	e_4	b_i	Rapport
5	b	0,5	1	0,25	0	0	0	100	200
0	e_2	**0,5**	0	−0,25	1	0	0	50	**100**
0	e_3	1	0	0	0	1	0	140	140
0	e_4	−0,5	0	−0,25	0	0	1	40	
	Δ_j	**0,5**	0	−1,25	0	0	0	−500	

Tableau 3 : tous les Δ_j sont négatifs ou nuls, la solution est optimale.

c_B	Base	a	b	e_1	e_2	e_3	e_4	b_i
5	b	0	1	0,5	−1	0	0	50
3	a	1	0	−0,5	2	0	0	100
0	e_3	0	0	0,5	−2	1	0	40
0	e_4	0	0	−0,5	1	0	1	90
	Δ_j	0	0	−1	−1	0	0	−550

La solution optimale est $S^* = (550; 100; 50; 0; 0; 40; 90)$, identique à celle des deux méthodes précédentes : **il faut commander 100 unités de A et 50 unités de B**, pour une marge de 550 € par semaine. Le budget et la réserve sont saturés ($e_1 = e_2 = 0$). Comme les profits marginaux des variables hors base (e_1 et e_2) sont non nuls, la solution est unique.

2.3 Quand y a-t-il rupture ?

Les variables d'écart $e_3 = 40$ et $e_4 = 90$ du tableau final donnent la réponse : ce sont les quantités de la demande hebdomadaire qui ne seront pas servies. Il y a rupture dès que le stock commandé est épuisé. Avec une demande de 20 par jour, la commande tient x_i^*/d_i jours :

$$\text{produit A} : \frac{100}{20} = 5 \text{ jours}, \qquad \text{produit B} : \frac{50}{20} = 2{,}5 \text{ jours}.$$

La livraison arrivant le lundi matin, le produit A est servi du lundi au vendredi et manque **à partir du samedi**. Le produit B manque **à partir du mercredi**.

La marge perdue est $40 \times 3 + 90 \times 5 = 120 + 450 = 570$ € par semaine. On le vérifie : servir toute la demande rapporterait $3 \times 140 + 5 \times 140 = 1\,120$ €, et $1\,120 - 550 = 570$.

À retenir. Ces ruptures sont le prix des ressources limitées. Le budget favorise A (1,5 € de marge par euro dépensé, contre 1,25 € pour B), tandis que la réserve favorise B (5 € de marge par litre, contre 3 € pour A). Le mélange optimal (100; 50) est celui qui épuise les deux ressources à la fois ; aucun des deux produits ne peut être servi entièrement.

2.4 Quand commander ?

Le programme donne les quantités ; la date dépend du délai de livraison. Pour que la marchandise soit en réserve le lundi matin, il faut commander L_i jours avant : le produit A (2 jours) se commande **le samedi** précédent, le produit B (3 jours) **le vendredi**.

Entre deux livraisons, un seuil d'alerte permet de réagir : si le stock descend sous le point de commande $s_i = d_i\, L_i + SS_i$ (la demande pendant le délai, plus le stock de sécurité), une commande doit déjà être en route. Ici $s_A = 20 \times 2 + 20 = 60$ et $s_B = 20 \times 3 + 20 = 80$.

2.5 Rayon ou réserve ?

Le problème

La marchandise livrée va en réserve, mais le client ne se sert que dans le rayon, rempli une fois par jour. Avec 15 places pour chaque produit, on ne vend que 15 unités de A et 15 unités de B par jour, alors que la demande est de 20 : la marge est de $3 \times 15 + 5 \times 15 = 120\,€$ par jour, même si la réserve est pleine. Comment partager les 30 litres du rayon ?

Le programme linéaire

On note r_A et r_B le nombre de places de chaque produit, et n le nombre de remplissages par jour (d'abord $n = 1$) : on vend au plus $n\,r_i$ unités par jour.

$$\begin{aligned} \max\ Z &= 3\,n\,r_A + 5\,n\,r_B && \text{(marge vendue par jour)} \\ \text{SC :}\quad r_A + r_B &\le 30 && \text{(volume du rayon)} \\ n\,r_A \le 20,\quad n\,r_B &\le 20 && \text{(inutile d'exposer plus que la demande)} \\ r_A,\ r_B &\ge 0 \end{aligned}$$




Figure 2 – Partage du rayon pour $n = 1$: programme admissible, partage actuel et optimum

Les sommets du programme admissible sont $(0;0)$, $(20;0)$, $(20;10)$, $(10;20)$ et $(0;20)$, avec $Z = 0$, 60, 110, **130** et 100. L'optimum est $(10;20)$.

Le simplexe en deux pivots

Variables d'écart : e_1 (litres libres dans le rayon), e_2 et e_3 (demande de A et de B non couverte).

Tableau 1 : r_B entre ($\Delta = 5$), e_3 sort (rapport 20), le pivot est 1.

c_B	Base	r_A	r_B	e_1	e_2	e_3	b_i	Rapport
0	e_1	1	1	1	0	0	30	30
0	e_2	1	0	0	1	0	20	
0	e_3	0	**1**	0	0	1	20	**20**
	Δ_j	3	**5**	0	0	0	0	

Tableau 2 : r_A entre ($\Delta = 3$), e_1 sort (rapport 10), le pivot est 1.

c_B	Base	r_A	r_B	e_1	e_2	e_3	b_i	Rapport
0	e_1	**1**	0	1	0	-1	10	**10**
0	e_2	1	0	0	1	0	20	20
5	r_B	0	1	0	0	1	20	
	Δ_j	**3**	0	0	0	-5	-100	

Tableau 3 : tous les Δ_j sont négatifs ou nuls, la solution est optimale.

c_B	Base	r_A	r_B	e_1	e_2	e_3	b_i
3	r_A	1	0	1	0	-1	10
0	e_2	0	0	-1	1	1	10
5	r_B	0	1	0	0	1	20
	Δ_j	0	0	-3	0	-2	-130

Réponse pour $n = 1$: il faut donner 10 places à A et 20 places à B. La marge passe de 120 € à 130 € par jour : le produit B, plus rentable par litre, passe en priorité. Le rayon est entièrement utilisé ($e_1 = 0$), et il reste $e_2 = 10$ unités de la demande de A que le rayon ne peut pas servir.

Avec deux remplissages par jour

Si le rayon est rempli deux fois (le matin et à la mi-journée), on vend $2\,r_i$ unités par jour, et les contraintes de demande deviennent $2\,r_A \leq 20$ et $2\,r_B \leq 20$. Le simplexe, avec les mêmes deux pivots, donne $r_A = r_B = 10$ et $Z = 160$ € par jour : toute la demande est servie ($3 \times 20 + 5 \times 20 = 160$). Le rayon n'est plus saturé : il reste $e_1 = 10$ litres libres, donc l'agrandir serait inutile.

2.6 Synthèse du cas à deux produits

Tableau 3 – Les trois réponses pour le magasin à deux produits

Question	Réponse
Quand y a-t-il rupture ?	Le produit A à partir du samedi, le produit B à partir du mercredi (570 € de marge perdue par semaine).
Combien commander ?	100 unités de A et 50 unités de B, pour une marge de 550 € par semaine.
Quand commander ?	A le samedi, B le vendredi, pour une livraison le lundi matin.
Rayon ou réserve ?	10 places pour A et 20 places pour B : la marge passe de 120 à 130 € par jour. Avec deux remplissages, 160 € par jour.

3 L'application Python : un nombre quelconque de produits

3.1 Pourquoi une application

La méthode de la partie 2 s'applique telle quelle à n'importe quel magasin, mais le calcul à la main devient impossible. Pour n produits, le tableau du simplexe « commandes » compte $n+2$ lignes et $2n+3$ colonnes : 4 lignes et 7 colonnes pour deux produits, 8 lignes et 15 colonnes pour six, 102 lignes et 203 colonnes pour cent, 1 002 lignes et 2 003 colonnes pour mille. Les étapes sont les mêmes ; seule la taille change, et c'est précisément ce qu'un programme sait faire.

3.2 Comment elle fonctionne

L'application reprend, étape par étape, la démarche de la partie 2.

1. **Lecture des produits.** Les données sont dans un fichier CSV (une ligne par produit) ou dans `donnees.py`. Colonnes : produit, demande par jour, coût d'achat, prix de vente, délai, stock de sécurité, places en rayon, volume.
2. **Programme « commandes ».** L'application écrit le programme linéaire, le met sous forme canonique et le résout par l'algorithme du simplexe.
3. **Ruptures.** Elle lit les variables d'écart des plafonds et calcule les jours couverts x_i^*/d_i.
4. **Calendrier.** Elle déduit le jour de commande de chaque délai.
5. **Programme « rayon ».** Elle écrit et résout le second programme linéaire.

Le modèle pour n produits. Les deux programmes sont ceux de la partie 2, avec deux ajouts. D'abord un service minimum s : on commande au moins $s \times H_i$ de chaque produit (70 % dans le cas à six produits, 0 dans l'exemple à la main). Ensuite n produits au lieu de deux.

$$\text{Commandes :}\quad \max \sum_i m_i\, x_i \quad \text{SC :}\quad \sum_i c_i\, x_i \le B,\ \ \sum_i v_i\, x_i \le V,\ \ s\, H_i \le x_i \le H_i$$

$$\text{Rayon :}\quad \max \sum_i m_i\, n\, r_i \quad \text{SC :}\quad \sum_i v_i\, r_i \le S,\ \ n\, r_i \le d_i$$

où B est le budget, V la réserve, S le volume du rayon et n le nombre de remplissages par jour. Pour que le simplexe s'applique directement, on pose $x_i = s\, H_i + z_i$ avec $z_i \ge 0$: la quantité z_i est ce que l'on commande *au-delà* du minimum, et toutes les contraintes deviennent des « $\le$ » à second membre positif (programme linéaire canonique du cours).

Les fichiers.

Fichier	Rôle
`simplexe.py`	l'algorithme du simplexe en tableaux (le même qu'à la main)
`modele.py`	les deux programmes linéaires, les ruptures, le calendrier
`application.py`	lit les produits, répond aux trois questions, affiche
`app_streamlit.py`	la même application dans le navigateur (interface Streamlit)
`donnees.py`	les produits et les paramètres du cas d'étude
`exemple_*_produits.csv`	des fichiers de produits (2 et 6 produits)

Utilisation. Quatre commandes suffisent :

```
python application.py --deux-produits          # l'exemple resolu a la main
python application.py                          # les 6 produits du Super U
python application.py --fichier mes_produits.csv
python application.py --aleatoire 100          # 100 produits generes au hasard
```

Le budget, la réserve, le service minimum, le volume du rayon et le nombre de remplissages se changent par des options (`-budget 9000`, `-remplissages 2`, etc.). Pour un petit magasin, l'application affiche tous les tableaux du simplexe ; pour un grand, elle n'affiche que les résultats principaux.

Interface web. Le fichier `app_streamlit.py` propose la même application dans le navigateur (`python -m streamlit run app_streamlit.py`). Une fois lancée, elle s'ouvre à l'adresse `http://localhost:8501/` ; ce lien n'est valable que sur l'ordinateur où l'application tourne. On y choisit le cas (2 produits, 6 produits, un fichier CSV ou des produits aléatoires), on modifie directement le tableau des produits, on règle le budget, la réserve, le service minimum et le nombre de remplissages du rayon avec le menu de gauche, et le calcul se refait aussitôt. Les réponses aux trois questions sont dans des onglets, et un onglet « Simplexe pas à pas » affiche les tableaux pour les petits magasins (figure 3).




Figure 3 – L'application Streamlit sur les six produits, onglet « Rayon ou réserve »

3.3 Vérification sur le cas à deux produits

Avant de lui faire confiance, on vérifie que l'application retrouve les calculs de la partie 2. La commande `python application.py -deux-produits` affiche exactement :

- les trois tableaux du simplexe « commandes », avec les mêmes pivots (4 puis 0,5) ;
- la solution $a = 100$, $b = 50$, $Z = 550\,€$, et les écarts 40 et 90 ;
- les jours couverts 5 et 2,5, donc les ruptures le samedi et le mercredi, et 570 € de marge perdue ;
- le calendrier : samedi pour A, vendredi pour B ;

- le partage du rayon : 10 et 20 places, $Z = 130\,€$ (160 € avec deux remplissages).

Ces contrôles sont automatisés dans `test_modele.py` (huit tests, tous réussis). À titre de contrôle supplémentaire, 30 magasins tirés au hasard (de 2 à 300 produits, soit 60 programmes linéaires) ont aussi été résolus avec le solveur SciPy (Virtanen et al., 2020) : l'écart avec notre simplexe est de l'ordre de 10^{-9}. Le solveur n'est utilisé que pour ce contrôle, pas dans l'application.

3.4 Application aux six produits d'un Super U

Les données

Tableau 4 – Données des six produits (hypothèses)

i	Produit	d_i	c_i	p_i	m_i	v_i	R_i	L_i
1	Pain de mie	400	0,45	1,00	0,55	3	300	1
2	Lait frais 1 L	250	0,80	1,15	0,35	1,2	250	2
3	Yaourts (pack de 4)	300	1,10	1,75	0,65	1	350	2
4	Eau (pack 6 x 1,5 L)	200	1,50	2,40	0,90	10	150	3
5	Lessive 2 L	40	5,50	8,90	3,40	2,5	80	5
6	Cosmétiques (gel douche)	25	4,00	7,50	3,50	0,5	100	7

d_i : demande par jour ; c_i : coût d'achat (€) ; p_i : prix de vente (€) ; m_i : marge unitaire (€) ; v_i : volume (litres) ; R_i : places actuelles en rayon ; L_i : délai de livraison (jours).

Paramètres : budget de 8 000 € par semaine, réserve de 25 000 litres (25 m^3), service minimum de 70 %, rayon de 3 300 litres (le volume des places actuelles), livraison le lundi matin, un remplissage du rayon par jour. Servir toute la demande coûterait 9 310 € et occuperait 27 388 litres : comme dans le cas à deux produits, le magasin ne peut pas tout commander.

3.4.1 Combien commander ?

Le service minimum de 70 % fait partie du modèle : le minimum coûte 6 517 €, occupe 19 171,25 litres et rapporte déjà 4 439,40 € de marge. Il reste 1 483 € de budget et 5 828,75 litres à répartir. On note e_1 le budget non dépensé, e_2 les litres libres en réserve, et e_3 à e_8 la demande non servie des produits 1 à 6. Le simplexe s'arrête après huit pivots :

Tableau 5 – Les huit pivots successifs

Étape	Entrante	Δ_j	Sortante	Rapport	Pivot	Z'	Lecture
1	z_6	3,50	e_8	52,5	1	183,75	cosmétiques au plafond
2	z_5	3,40	e_7	84	1	469,35	lessive au plafond
3	z_4	0,90	e_6	420	1	847,35	eau au plafond
4	z_3	0,65	e_1	164,55	1,10	954,30	yaourts : le budget est épuisé
5	z_1	0,28	z_3	402,22	0,41	1 068,57	le pain remplace les yaourts
6	e_7	3,32	e_2	5,44	34,17	1 086,64	moins de lessive, la réserve sature
7	e_6	0,93	e_3	111,39	3,33	1 190,61	moins d'eau, pain au plafond
8	e_2	0,003	e_7	185,83	0,03	1 191,15	lessive de nouveau au plafond

Les quatre premiers pivots servent les produits dans l'ordre de leur marge unitaire, jusqu'à épuiser le budget. L'étape 5 corrige ce choix : le pain rapporte moins par unité que les yaourts (0,55 contre 0,65), mais il coûte beaucoup moins cher, donc il rapporte plus par euro de budget. Les étapes 6 à 8 réduisent l'eau, qui consomme beaucoup de budget et de réserve, au profit du pain. Comme dans la partie 2, la marge augmente à chaque pivot.

Tableau 6 – Solution optimale du programme « commandes »

Produit	Minimum	z_i^*	x_i^*	Plafond H_i	Situation
Pain de mie	1 960	840	2 800	2 800	plafond saturé
Lait frais 1 L	1 225	0	1 225	1 750	service minimum
Yaourts (pack de 4)	1 470	0	1 470	2 100	service minimum
Eau (pack 6 x 1,5 L)	980	288,67	1 268,67	1 400	entre les deux
Lessive 2 L	196	84	280	280	plafond saturé
Cosmétiques	122,5	52,5	175	175	plafond saturé




Figure 4 – Part de la demande hebdomadaire commandée à l'optimum (bleu : plafond ; vert : entre les bornes ; orange : service minimum)

La marge optimale est 4 439,40+1 191,15 = **5 630,55 €** par semaine. Le budget est saturé ($e_1 = 0$) ; la réserve ne l'est pas ($e_2 = 185{,}83$ litres libres). Le simplexe a retrouvé de lui-même le bon critère : la marge par euro dépensé m_i/c_i (pain 1,22 ; cosmétiques 0,88 ; lessive 0,62 ; eau 0,60 ; yaourts 0,59 ; lait 0,44). Les trois premiers sont servis entièrement, l'eau reçoit le budget restant, les deux derniers restent au minimum.

3.4.2 Quand y a-t-il rupture ?

Tableau 7 – Ruptures prévues par le programme (livraison le lundi matin)

Produit	x_i^*	Écart (non servi)	Jours couverts	Rupture	Marge perdue
Pain de mie	2 800	0	7,0	aucune	0
Lait frais 1 L	1 225	525	4,9	vendredi soir	183,75 €
Yaourts (pack de 4)	1 470	630	4,9	vendredi soir	409,50 €
Eau (pack 6 x 1,5 L)	1 268,67	131,33	6,3	dimanche	118,20 €
Lessive 2 L	280	0	7,0	aucune	0
Cosmétiques	175	0	7,0	aucune	0
Total					711,45 €




Figure 5 – Nombre de jours de vente couverts par la commande optimale (rouge : rupture avant la fin de la semaine)

Comme dans le cas à deux produits, les ruptures se lisent dans les variables d'écart : le lait et les yaourts manquent à partir du vendredi soir et tout le week-end, l'eau le dimanche. Ce sont des ruptures que le magasin *choisit*, parce que ce sont celles qui coûtent le moins de marge par euro économisé. La marge perdue, 711,45 € par semaine, est l'écart entre la marge si tout était servi (6 342 €) et la marge optimale (5 630,55 €).

3.4.3 Quand commander ?

Tableau 8 – Calendrier de commande pour une livraison le lundi matin

Produit	Délai L_i	Jour de commande	Stock de sécurité SS_i	Point de commande s_i
Pain de mie	1 jour	dimanche	200	600
Lait frais 1 L	2 jours	samedi	150	650
Yaourts (pack de 4)	2 jours	samedi	200	800
Eau (pack 6 x 1,5 L)	3 jours	vendredi	200	800
Lessive 2 L	5 jours	mercredi	60	260
Cosmétiques	7 jours	lundi précédent	50	225

3.4.4 Rayon ou réserve ?

Le rayon actuel est mal partagé : 100 places pour 25 ventes par jour de cosmétiques, mais seulement 300 places pour 400 ventes de pain de mie et 150 pour 200 d'eau. Le programme « rayon » partage les 3 300 litres entre les six produits ; son simplexe s'arrête après sept pivots.

Tableau 9 – Les sept pivots du programme « rayon » ($n = 1$)

Étape	Entrante	Δ_j	Sortante	Rapport	Pivot	Z	Lecture
1	r_6	3,50	e_7	25	1	87,50	cosmétiques : toute la demande
2	r_5	3,40	e_6	40	1	223,50	lessive : toute la demande
3	r_4	0,90	e_5	200	1	403,50	eau : toute la demande
4	r_3	0,65	e_4	300	1	598,50	yaourts : toute la demande
5	r_1	0,55	e_1	295,83	3	761,21	pain : le rayon est plein
6	e_5	0,93	e_2	31,25	3,33	790,38	moins d'eau, pain complet
7	r_2	0,24	e_3	250	1	850,88	lait : toute la demande

Tableau 10 – Partage actuel et partage optimal du rayon ($n = 1$)

	Demande	Places en rayon		Marge par jour	
Produit	par jour	actuelles	optimales	actuelle	optimale
Pain de mie	400	300	400	165,00	220,00
Lait frais 1 L	250	250	250	87,50	87,50
Yaourts (pack de 4)	300	350	300	195,00	195,00
Eau (pack 6 x 1,5 L)	200	150	138,75	135,00	124,88
Lessive 2 L	40	80	40	136,00	136,00
Cosmétiques	25	100	25	87,50	87,50
Total				806,00 €	850,88 €




Figure 6 – Places en rayon : partage actuel, partage optimal et demande d'une journée

Le simplexe reprend la place gaspillée (cosmétiques, lessive, yaourts) et la donne au pain de mie, qui passe de 300 à 400 places. Le gain est de 850,88 − 806,00 = 44,88 € par jour, soit environ 16 400 € par an, sans agrandir le rayon. Le seul produit encore en rupture en rayon est l'eau (138,75 places pour 200 ventes), parce que c'est celui qui rapporte le moins par litre de rayon (0,90/10 = 0,09 €).

Avec deux remplissages par jour (`-remplissages 2`), il suffit de $d_i/2$ places par produit, soit 1 956 litres. Le simplexe donne 906 € par jour : toute la demande est servie, le rayon n'est plus saturé, et l'agrandir serait inutile. Le gain est de 906 − 806 = 100 € par jour.

3.5 Passage à l'échelle

L'application est testée sur des magasins de 10 à 1 000 produits, générés au hasard (`-aleatoire`). Le budget y est fixé à 85 % du coût de la demande et la réserve à 90 % de son volume, comme dans le cas à six produits où le budget est inférieur à ce qu'il faudrait pour tout servir.

Tableau 11 – L'application sur des magasins de plus en plus grands

Produits	Tableau	Pivots	Temps	Marge par semaine	En rupture	Gain du rayon par jour
6	8 × 15	15	< 0,1 s	5 631 €	3 sur 6	45 €
10	12 × 23	17	< 0,1 s	25 872 €	7 sur 10	499 €
100	102 × 203	164	0,05 s	162 402 €	47 sur 100	2 889 €
300	302 × 603	516	0,4 s	538 942 €	133 sur 300	9 246 €
1 000	1 002 × 2 003	1 648	environ 8 s	1 920 246 €	498 sur 1 000	31 340 €

« Tableau » est la taille du tableau du simplexe « commandes », et « Pivots » le nombre total des deux programmes. Les temps sont ceux d'un ordinateur ordinaire. Le nombre de pivots reste de l'ordre de 1,5 à 2 fois le nombre de produits : l'algorithme ne parcourt qu'une toute petite partie des sommets du programme admissible, ce qui le rend utilisable sur de grands magasins. Les résultats se lisent comme dans le cas à deux produits ; seul le nombre de lignes change. Comme les données sont tirées au hasard, ces chiffres montrent que l'application tient la charge, pas ce qui se passerait dans un magasin réel.

4 Discussion : limites

Des données imaginaires. Les conclusions chiffrées valent pour ces hypothèses. La méthode, elle, s'applique à des données réelles : il suffit de remplacer le fichier des produits.

Une demande certaine. La programmation linéaire suppose que la demande est connue. En réalité elle varie d'un jour à l'autre, et les livraisons peuvent être en retard. Le stock de sécurité sert à couvrir cet aléa, mais son niveau n'est pas optimisé par le modèle.

Des quantités non entières. Le simplexe donne 1 268,67 packs d'eau et 138,75 places en rayon. À cette échelle, l'arrondi ne change presque rien : à 1 268 packs, le budget et la réserve restent respectés et la marge baisse de moins d'un euro.

Deux programmes séparés. Le programme « commandes » et le programme « rayon » sont résolus l'un après l'autre. Le second suppose que la marchandise est disponible en réserve, ce qui n'est pas vrai le week-end pour le lait et les yaourts. Un programme unique serait plus juste, mais ses tableaux seraient plus grands.

Un simplexe maison. L'algorithme programmé est celui du cours : il est lisible et suffit jusqu'à quelques milliers de produits. Au-delà, un solveur professionnel serait plus rapide, mais on perdrait la possibilité d'afficher et d'expliquer chaque tableau.

Un seul critère. Le modèle maximise la marge. Un client qui ne trouve pas de lait le samedi peut aller faire toutes ses courses ailleurs : ce coût d'image n'est pas compté. Le service minimum de 70 % en tient compte de façon approximative.

5 Conclusion

Ce dossier répond aux trois questions en deux temps : à la main sur un magasin de deux produits, puis avec une application sur un nombre quelconque de produits.

Quand y a-t-il rupture ? Quand la quantité commandée est épuisée : elle couvre x_i^*/d_i jours, et la demande non servie se lit dans les variables d'écart du tableau final. Avec deux produits, A manque à partir du samedi et B à partir du mercredi. Avec six produits, le lait et les yaourts manquent à partir du vendredi soir et l'eau le dimanche.

Quand et combien commander ? Les quantités viennent du simplexe : 100 unités de A et 50 de B (550 € par semaine) pour deux produits, et 5 630,55 € par semaine pour six produits, avec un budget entièrement dépensé. Les dates viennent des délais : on commande de un à sept jours avant la livraison du lundi.

Comment répartir le stock entre le rayon et la réserve ? Un second programme linéaire partage la place du rayon : 10 places pour A et 20 pour B (130 € par jour au lieu de 120), et 44,88 € par jour de plus pour les six produits. Avec deux remplissages par jour, toutes les ventes perdues en rayon disparaissent.

L'intérêt de la démarche est qu'elle se comprend en entier sur le cas à deux produits, et que l'application ne fait ensuite rien d'autre que répéter les mêmes étapes à grande échelle. Deux

recommandations en découlent pour le magasin : remplir le rayon deux fois par jour, et redistribuer les places du rayon en faveur des produits qui se vendent le plus.

Bibliographie

Recherche opérationnelle et optimisation, support de cours et travaux dirigés, Master 2, Université d'Angers.

Faure, R., Lemaire, B., et Picouleau, C. *Précis de recherche opérationnelle*. Dunod.

Teghem, J. *Recherche opérationnelle*. Ellipses.

Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0 : fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods*, 17, 261-272.

Annexe : le cœur de l'algorithme

Le simplexe de `simplexe.py` tient en quelques lignes. Il suit exactement les étapes de la partie 2 : profits marginaux, variable entrante, rapports, variable sortante, pivot.

```
while True:
    delta = profits_marginaux(tableau, couts, base)   # ligne Delta_j
    colonne = choisir_entrante(delta)                 # variable entrante
    if colonne is None:                               # optimum atteint
        break
    rapports = calculer_rapports(tableau, colonne)    # b_i / a_ij
    ligne = int(np.argmin(rapports))                  # variable sortante
    pivoter(tableau, ligne, colonne)                  # mise a jour
    base[ligne] = colonne
```