Rapport de campagne 2025 : suivi du mildiou de la pomme de terre à Dalaba (Guinée)

Station expérimentale fictive de Dalaba (SEFD) — équipe : A. Barry, F. Camara, M. Sow. Rapport interne no 2025-07, version du 14 octobre 2025.

Résumé

Entre le 2 juin et le 29 septembre 2025, l'équipe a suivi 4 parcelles de pomme de terre à Dalaba pour mesurer l'apparition et la progression du mildiou (Phytophthora infestans) selon la variété et la protection fongicide. L'incidence moyenne finale atteint 38 % des plants. Les parcelles protégées ont produit en moyenne 19,8 t/ha contre 11,1 t/ha pour les parcelles non protégées. La saison a été très humide, avec 50 jours favorables à la maladie.

1. Contexte

Le plateau du Fouta Djalon est la principale zone de production de pomme de terre de Guinée. Les producteurs signalent des pertes importantes pendant la saison des pluies, de juin à octobre. Ce rapport décrit la campagne de suivi de 2025, première année d'un programme prévu sur trois ans.

2. Matériel et méthodes

Cinq parcelles de 400 m² (P1 à P5) ont été plantées le 2 juin 2025 sur le site de la station, à 1 180 m d'altitude. Deux variétés ont été utilisées : Spunta (P1, P2, P5) et Pamina (P3, P4). Les parcelles P1 et P3 ont reçu une protection fongicide complète tous les 10 jours ; P5 a reçu une protection réduite (tous les 20 jours) ; P2 et P4 n'ont pas été traitées.

Les observations ont eu lieu chaque semaine, du 2 juin au 29 septembre, soit 18 passages. À chaque passage, 100 plants par parcelle ont été examinés ; un plant est compté malade dès qu'une lésion est visible. L'incidence est le pourcentage de plants malades.

Une station météorologique installée au centre du site mesure la température et l'humidité relative à 2 m (capteur SHT31) toutes les 30 minutes, ainsi que la pluie (pluviomètre à auget). Un jour est dit favorable au mildiou lorsque l'humidité relative dépasse 90 % pendant au moins 10 heures et que la température moyenne reste comprise entre 10 et 25 °C.

3. Résultats

3.1 Conditions météorologiques

Le tableau 1 résume les conditions mensuelles. Le cumul de pluie de la saison atteint 1 487 mm. Août a été le mois le plus humide et le plus favorable à la maladie.

Tableau 1. Conditions météorologiques mensuelles à la station (juin à septembre 2025).

Mois	T moyenne (°C)	HR moyenne (%)	Pluie (mm)	Jours favorables
Juin	22,4	84	241	6
Juillet	21,1	91	389	14
Août	20,8	93	455	19
Septembre	21,6	88	302	11

Au total, 50 jours favorables ont été enregistrés, dont plus des deux tiers en juillet et en août.

3.2 Maladie et rendement

Le tableau 2 donne, pour chaque parcelle, la date du premier symptôme, l'incidence finale (passage du 29 septembre) et le rendement en tubercules.

Tableau 2. Mildiou et rendement par parcelle.

Parcelle	Variété	Protection	Premier symptôme	Incidence finale	Rendement (t/ha)
P1	Spunta	complète	29 juillet	22 %	18,4
P2	Spunta	aucune	8 juillet	61 %	9,7
P3	Pamina	complète	5 août	15 %	21,2
P4	Pamina	aucune	15 juillet	47 %	12,5
P5	Spunta	réduite	15 juillet	60 %	14,0

Les parcelles traitées ont un rendement moyen de 19,8 t/ha. La variété Pamina résiste mieux que Spunta : à protection égale, son incidence finale est plus faible et son rendement plus élevé.

4. Discussion et recommandations

Le premier symptôme est apparu sur P2, 36 jours après la plantation, au début de la période la plus humide. La protection réduite de P5 n'a pas suffi : son incidence finale est presque celle d'une parcelle non traitée. La parcelle P1 a produit 18,4 kg/ha, ce qui confirme l'intérêt d'une protection régulière.

Recommandations pour 2026 : (1) commencer la protection dès la plantation pendant la saison des pluies ; (2) préférer la variété Pamina ; (3) utiliser l'indicateur de jours favorables pour décider des traitements, avec une alerte dès 3 jours favorables consécutifs ; (4) ajouter une seconde station météorologique pour vérifier les mesures de pluie.

Limites : une seule saison, un seul site, et des parcelles non répétées ; les différences entre variétés et protections doivent être confirmées les années suivantes.