

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE VALOR INICIAL

Manuel Carlevaro

Departamento de Ingeniería Mecánica

Grupo de Materiales Granulares - UTN FRLP

manuel.carlevaro@gmail.com

Cálculo Avanzado • 2023

 ·  · 

Problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y'(t) = f[t, y(t)], & t_0 \leq t \leq T \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y'(t) = f[t, y(t)], & t_0 \leq t \leq T \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Definición : Condición de Lipschitz.

Una función $f(t, y)$ satisface una **condición de Lipschitz** en la variable y en un conjunto $D \in \mathbf{R}^2$ si existe una constante $L > 0$ tal que

$$|f(t, y_1) - f(t, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$$

siempre que (t, y_1) y (t, y_2) estén en D . La constante L se llama **constante de Lipschitz** para f .

Ejemplo: mostrar que $f(t, y) = t|y|$ satisface una condición de Lipschitz en el intervalo

$$D = \{(t, y) \mid 1 \leq t \leq 2 \text{ y } -3 \leq y \leq 4\}:$$

Para cada par de puntos (t, y_1) y (t, y_2) en D , tenemos:

$$\begin{aligned} |f(t, y_1) - f(t, y_2)| &= |t|y_1| - t|y_2|| \\ &= |t| ||y_1| - |y_2|| \\ &\leq 2 |y_1 - y_2| \end{aligned}$$


f satisface una condición de Lipschitz sobre D con $L = 2$ (menor valor posible). Por ejemplo:

$$|f(2, 1) - f(2, 0)| = |2 - 0| = 2 |1 - 0|$$


Definición : Conjunto convexo.

Un conjunto $D \in \mathbf{R}^2$ se dice que es **convexo** si, dados (t_1, y_1) y (t_2, y_2) pertenecientes a D , entonces

$$[(1 - \lambda)t_1 + \lambda t_2, (1 - \lambda)y_1 + \lambda y_2] \in D \quad \forall \lambda \in [0, 1]$$



Convexo



No convexo

Teorema : .

Sea $f(t, y)$ definida en un conjunto convexo $D \in \mathbf{R}^2$.

Si existe una constante $L > 0$ tal que

$$\left| \frac{\partial f(t, y)}{\partial y} \right| \leq L, \quad \forall (t, y) \in D$$

entonces f satisface una condición de Lipschitz sobre D en la variable y con constante de Lipschitz L .

Teorema : .

Sea $D = \{(t, y) \mid t_0 \leq t \leq T \text{ y } -\infty < y < \infty\}$, y $f(t, y)$ continua en D . Si f satisface una condición de Lipschitz sobre D en la variable y , entonces el problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y), & t_0 \leq t \leq T \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

tiene una solución única $y(t)$ para $t_0 \leq t \leq T$.

Problema bien formulado:

- ▶ Existencia: el problema tiene al menos una solución.
- ▶ Unicidad: el problema tiene solución única.
- ▶ Estabilidad: pequeñas variaciones en los datos de entrada no generan grandes cambios en la solución.

Problema bien formulado:

- ▶ Existencia: el problema tiene al menos una solución.
- ▶ Unicidad: el problema tiene solución única.
- ▶ Estabilidad: pequeñas variaciones en los datos de entrada no generan grandes cambios en la solución.

El problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y), & t_0 \leq t \leq T \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

está bien formulado si:

- ▶ Existe una solución única $y(t)$, y
- ▶ Existen constantes $\varepsilon_0 > 0$ y $k > 0$ tal que para cada $0 < \varepsilon < \varepsilon_0$, siempre que $\delta(t)$ sea continua con $|\delta(t)| < \varepsilon, \forall t \in [t_0, T]$, y cuando $|\delta_0| < \varepsilon$, el problema de valor inicial:

$$\begin{cases} z'(t) = f(t, z) + \delta(t), & t_0 \leq t \leq T \\ z(t_0) = y_0 + \delta_0 \end{cases}$$

tiene una solución única que satisface

$$|z(t) - y(t)| < k\varepsilon, \forall t \in [t_0, T]$$

Teorema : .

Sea $D = \{(t, y) \mid t_0 \leq t \leq T \text{ y } -\infty < y < \infty\}$. Si f es continua y satisface una condición de Lipschitz en la variable y sobre el conjunto D , el problema de valor inicial:

$$\begin{cases} y'(t) = f(t, y), & t_0 \leq t \leq T \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

está bien formulado.

- ▶ R.L. Burden, D.J. Faires y A.M. Burden. ***Análisis numérico***. 10.^a ed. Mexico: Cengage Learning, 2017. Capítulo 6.
- ▶ Gilbert Strang. ***Linear Algebra and Its Applications, 4th Edition***. 4th. Brooks Cole, 2006. Capítulo 7.
- ▶ A.J. Salgado y S.M. Wise. ***Classical Numerical Analysis***. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2023. doi: [10.1017/9781108942607](https://doi.org/10.1017/9781108942607). Capítulo 3.
- ▶ A. Quarteroni, R. Sacco y F. Saleri. ***Numerical Mathematics***. New York, United States: Springer-Verlag, 2000. Capítulo 3.