



# Fondazione "Opera BCS" Poliambulatorio Demo Bcs

Piazza Vittorio Veneto 39 - 22036 Erba

Tel. 031-647500

www.bcs.it bcs@bcs.it

## SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

<b>Cognome e Nome</b>	PRODSISS CINQUANTANOVE	<b>Data Esecuzione</b>	
<b>Sesso</b>	F	<b>Ac. Num.</b>	2710692020000012
<b>Data Nascita</b>		<b>Referto n.</b>	2020 / 12
<b>Codice Fiscale</b>			
<b>PID</b>		<b>Provenienza</b>	
<b>Indirizzo di residenza</b>	MILANO V. C/O LOMBARDIA INFORMATICA V,		

Invariati i restanti reperti.

Al controllo odierno non lesioni pleuro-parenchimali in atto.

Alcune disventilazioni in sede bibasale.

Cuore nei limiti.

Non lesioni parenchimali polmonari.

Ombra cardiaca nei limiti di norma.

In esiti d'artroprotesi d'anca sinistra, con elemento protesico in sede, senza segni di scollamento osseo periprotetico.

Nell'unica proiezione eseguita a paziente supino si segnala ispessimento interstiziale sovrabasale a destra.

Ombra cardiaca in asse nei limiti.

Non disponibili precedenti analoghi esami per confronto.

All'esame eseguito nelle scansioni di base non si rilevano alterazioni della densità parenchimale encefalica.

Nella norma le distensione minzione del sistema ventricolare e la rappresentazione degli spazi liquorali periferici.

Puntiformi calcificazioni sono apprezzabili sulle pareti dei sifoni carotidei.

Non disponibili precedenti analoghi esami per confronto.

Non si rilevano addensamenti parenchimali con carattere di attività.

D'ambo i lati sono apprezzabili alcuni aspecifici micronoduli localizzati in sede submantellare, in particolare due nel lobo superiore di destra, con diametro fino a 3 mm, uno nel lobo inferiore omolaterale (4 mm), due nel lobo inferiore di sinistra, rispettivamente di 3 mm in sede dorsale e di 4 mm in sede parascissurale.

Non versamenti pleurici.

Didimo versamento pericardico con spessore massimo di 7 mm in sede basale.

Non linfadenomegalie patologiche a sede mediastinica né ilare limitatamente alla mancata somministrazione di MdC.

Modesto quadro di gonartrosi caratterizzata da riduzione di ampiezza delle rime articolari femoro-tibiali, più evidente sul versante mediale.

Asse femoro-tibiale in limiti di norma.

Non segni di versamento endoarticolare.

Esame ecografico della regione scrotale, ha messo in evidenza tessuto adiposo che avvolge entrambi i didimi, regolari per morfologia, ecostruttura e vascolarizzazione al color-Doppler, in quadro di verosimile ernia inguino-scrotale bilaterale ed associato idrocele corpuscolato sia a destra che a sinistra.

Nella norma gli epididimi bilateralmente.

**Medico refertante**

MEDICO PROVA