ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Prevalencia de hipertensión arterial y factores de riesgo asociados en pacientes adultos de consultorio externo

Ana Lucía Martínez; Carlos Andrés Ramírez

Servicio de Medicina Interna — Hospital General de Itapúa

Noviembre de 2025

DOCUMENTO DE PRUEBA — Contenido ficticio elaborado con fines académicos para validar el Repositorio Digital del Hospital General de Itapúa. Los autores, datos y resultados son simulados.

Resumen

Objetivo: estimar la prevalencia de hipertensión arterial (HTA) y describir los factores de riesgo asociados en adultos atendidos en consultorio externo. Métodos: estudio observacional, descriptivo y de corte transversal con una muestra simulada de 412 pacientes. Resultados: la prevalencia estimada de HTA fue del 34,2 %; la obesidad, el sedentarismo y el antecedente familiar se asociaron con mayor frecuencia de HTA. Conclusión: los datos ficticios ilustran la importancia del tamizaje sistemático de la presión arterial en la consulta ambulatoria.

Introducción

La hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular modificables. Conocer su frecuencia en la población atendida permite planificar estrategias de prevención, diagnóstico oportuno y seguimiento en los servicios de salud.

Métodos

Diseño observacional, descriptivo y transversal. Población: pacientes de 18 años o más que acudieron a consultorio externo durante un período de seis meses (datos simulados). Variables: presión arterial, índice de masa corporal, actividad física, tabaquismo y antecedentes familiares. Se calcularon frecuencias absolutas y relativas, y razones de prevalencia con intervalos de confianza del 95 %.

Resultados (simulados)

De los 412 pacientes incluidos, 141 presentaron cifras compatibles con HTA (34,2 %). La frecuencia fue mayor en mayores de 60 años y en pacientes con obesidad. El 58 % de los pacientes con HTA desconocía su diagnóstico antes de la consulta.

Conclusiones

En este ejercicio ficticio, uno de cada tres adultos presentó HTA y más de la mitad desconocía su condición. Se recomienda reforzar la medición rutinaria de la presión arterial y la educación sobre estilos de vida saludables.

Palabras clave

hipertensión arterial; prevalencia; factores de riesgo; atención ambulatoria.