

Tarea 3

Diego Leipen Lara

Metodos Variacionales

Sean Ω un subconjunto abierto de \mathbb{R}^N y $F \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ tal que $F(0) = 0$. Supongamos que su derivada, a la que denotamos por $f := F'$, satisface

(f_1) Existen $p > 1$ y $C > 0$ tales que

$$|f(t)| \leq C|t|^{p-1}.$$

Demuestra las siguientes afirmaciones.

1. La función

$$\begin{aligned}\Phi : L^p(\Omega) &\rightarrow \mathbb{R} \\ u &\mapsto \int_{\Omega} F(u(x))dx\end{aligned}$$

esta bien definida, i.e., $F \circ u$ es integrable en Ω para todo $u \in L^p(\Omega)$.

2. La función $\Phi : L^p(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ es de clase \mathcal{C}^1 y su derivada esta dada por

$$\Phi'(u)v = \int_{\Omega} f(u(x))v(x)dx.$$

Demostración.

1. Por el teorema del valor medio, para todo $t \in \mathbb{R}$ existe $t^* \in \mathbb{R}$ tal que $|t^*| \leq |t|$ y

$$|F(t) - F(0)| = |f(t^*)||t - 0|.$$

Entonces

$$\begin{aligned}|F(t)| &= |F(t) - F(0)| && \text{(pues } F(0) = 0) \\ &= |f(t^*)||t - 0| \\ &\leq C|t^*|^{p-1}|t| && \text{(por } (f_1)) \\ &\leq C|t|^{p-1}|t| && \text{(pues } |t^*| \leq |t|) \\ &= C|t|^p.\end{aligned}$$

Sea $u \in L^p(\Omega)$. Entonces

$$|F(u(x))| \leq C|u(x)|^p \text{ para todo } x \in \Omega.$$

Como $u \in L^p(\Omega)$, integrando obtenemos

$$\int_{\Omega} |F \circ u| \leq \int_{\Omega} C|u|^p < \infty.$$

Por lo tanto, $|F \circ u|$ es integrable en Ω y en particular, $F \circ u$ también.

¹Estamos aplicando el teorema del valor medio a F en los números 0 y t . Este induce una $t^* \in \mathbb{R}$ tal que (dependiendo del signo de t) $0 < t^* < t$ ó $t < t^* < 0$. En cualquier caso, $|t^*| \leq |t|$.

2. Siguiendo la sugerencia, recordamos la Proposición 1.42.

Proposición 1.42. $\Phi : \mathcal{O} \rightarrow W$ es de clase \mathcal{C}^1 si y solo si satisface las siguientes tres condiciones:

(i) Para cualesquiera $u \in \mathcal{O}$ y $v \in V$ existe el límite

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Phi(u + tv) - \Phi(u)}{t} =: \mathcal{G}\Phi(u)v.$$

(ii) $\mathcal{G}\Phi(u) \in \mathcal{B}(V, W)$ para todo $u \in \mathcal{O}$.

(iii) La función $\mathcal{G}\Phi : \mathcal{O} \rightarrow \mathcal{B}(V, W)$ es continua.

Veamos que Φ verifica estas tres condiciones.

(i) Sean $u, v \in L^p(\Omega)$. Entonces para todo $x \in \Omega$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(u(x) + tv(x)) - F(u(x))}{t} = F'(u(x))v(x) = ((f \circ u)v)(x). \quad (1)$$

Por otro lado, sean $s, r \in \mathbb{R}$ y $t \in [-1, 1]$ fijos y arbitrarios. Aplicando el teorema del valor medio a la función $\alpha \mapsto F(s + \alpha)$ en los números 0 y tr obtenemos $\alpha_0 \leq |tr|$ tal que

$$\begin{aligned} |F(s + tr) - F(s)| &= |f(\alpha_0)||tr| \\ &\leq C|\alpha_0|^{p-1}|tr| && \text{(por } (f_1)) \\ &\leq C|tr|^{p-1}|tr|. && \text{(pues } \alpha_0 \leq |tr|) \\ &\leq C|t||r|^p && \text{(pues } t \in [-1, 1]) \end{aligned}$$

Entonces para todo $x \in \Omega$ y $t \in [-1, 1]$

$$\frac{|F(u(x) + tv(x)) - F(u(x))|}{|t|} \leq C|v(x)|^p. \quad (2)$$

Pero $v \in L^p(\Omega)$. Por lo tanto, usando (1), (2), y el teorema de convergencia dominada obtenemos

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Phi(u + tv) - \Phi(u)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\int_{\Omega} F(u + tv) - \int_{\Omega} F(u)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{F(u + tv) - F(u)}{t} = \int_{\Omega} (f \circ u)v.$$

(ii) Sea $u : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Por (f_1) , para todo $x \in \Omega$

$$|(f \circ u)(x)| \leq C|u(x)|^{p-1}.$$

En particular,

$$|(f \circ u)(x)|^{p/(p-1)} \leq C^{p/(p-1)}|u(x)|^p.$$

Por lo tanto,

$$f \circ u \in L^{p/(p-1)} \text{ para todo } u \in L^p(\Omega). \quad (3)$$

Por otro lado, claramente,

$$\begin{aligned} \mathcal{G}\Phi(u) : L^p(\Omega) &\rightarrow \mathbb{R} \\ v &\mapsto \int_{\Omega} (f \circ u)v \end{aligned}$$

es lineal. Además, aplicando la desigualdad de Hölder²,

$$|\mathcal{G}\Phi(u)v| = \left| \int_{\Omega} (f \circ u)v \right| \leq \int_{\Omega} |(f \circ u)v| \leq \|f \circ u\|_{p/(p-1)} \|v\|_p.$$

Por lo tanto, $\mathcal{G}\Phi(u) \in \mathcal{B}(L^p(\Omega), \mathbb{R})$.

²Posible por (3).

- (iii) Supongamos que $u_k \rightarrow u$ en $L^p(\Omega)$. Por el Teorema 14.28, existe una sucesión (a la que por simplicidad, denotaremos del mismo modo) y una función $h \in L^p(\Omega)$ tales que

$$u_k(x) \rightarrow u(x) \quad \text{y} \quad |u_k(x)| \leq h(x) \quad \text{pct } x \in \Omega.$$

Como f es continua,

$$(f \circ u_k)(x) \rightarrow (f \circ u)(x) \quad \text{pct } x \in \Omega. \quad (4)$$

Por (4),

$$|(f \circ u_k)(x)| \leq C|u_k(x)|^{p-1} \leq Ch(x)^{p-1} \quad (5)$$

Pero $h^{p-1} \in L^{p/(p-1)}(\Omega)$, pues $h \in L^p(\Omega)$. Por lo tanto, usando (4), (5), y el teorema de convergencia dominada obtenemos

$$f \circ u_k \rightarrow f \circ u \text{ en } L^{p/(p-1)}(\Omega).$$

Por lo tanto, por la desigualdad de Hölder,

$$\begin{aligned} \|\mathcal{G}\Phi(u_k) - \mathcal{G}\Phi(u)\|_{\mathcal{B}(L^p(\Omega), \mathbb{R})} &= \sup_{\substack{v \in V \\ v \neq 0}} \frac{|\int_{\Omega} (f \circ u_k - f \circ u) v|}{|v|_p} \\ &\leq \sup_{\substack{v \in V \\ v \neq 0}} \frac{|f \circ u_k - f \circ u|_{p/(p-1)} |v|_p}{|v|_p} \\ &= |f \circ u_k - f \circ u|_{p/(p-1)} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

□