

# Tarea 13

Diego Leipen Lara

Metodos Variacionales

Considera el problema

$$\begin{cases} -\Delta u + \lambda u = |u|^{2^*-2}u \\ u \in D^{1,2}(\Omega) \end{cases} \quad (\wp_\lambda)$$

donde  $\Omega$  es un dominio acotado en  $\mathbb{R}^N$ ,  $N \geq 3$ , y  $\lambda \geq 0$ .

En este caso,  $D_0^{1,2}(\Omega) = H_0^1(\Omega)$ ,

$$\|u\|_\lambda := \left( \int_\Omega (|\nabla u|^2 + \lambda u^2) \right)^{1/2}$$

esta bien definida y es una norma equivalente a la norma de  $D_0^{1,2}(\Omega)$ . Las soluciones no triviales del problema  $(\wp_\lambda)$  son los puntos críticos del funcional

$$J_\lambda(u) = \frac{1}{2} \|u\|_\lambda^2 - \frac{1}{2^*} |u|_{2^*}^{2^*}$$

sobre la variedad de Nehari  $\mathcal{N}_\lambda := \{u \in D_0^{1,2}(\Omega) : \|u\|_\lambda^2 = |u|_{2^*}^{2^*}\}$ , y

$$c_\lambda := \inf_{\mathcal{N}_\lambda} J_\lambda = \frac{1}{N} S_\lambda^{N/2}, \quad \text{donde } S_\lambda := \inf_{\substack{u \in D_0^{1,2}(\Omega) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|_\lambda^2}{|u|_{2^*}^{2^*}}.$$

El objetivo de esta tarea es probar que  $(\wp_\lambda)$  no tiene solución de energía mínima si  $\lambda \geq 0$ .

**1.** Sean  $R > 0$  y  $\varphi \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}^N)$  tal que  $0 \leq \varphi(x) \leq 1$ ,  $\varphi(x) = 1$  si  $|x| \leq R$  y  $\varphi(x) = 0$  si  $|x| \geq 2R$ . Para cada  $\epsilon > 0$  definimos

$$u_\epsilon(x) := \varphi(x) U_\epsilon(x), \quad \text{donde } U_\epsilon(x) := a_N \left( \frac{\epsilon}{\epsilon^2 + |x|^2} \right)^{\frac{N-2}{2}}.$$

Prueba que

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{B_{2R}} u_\epsilon^2 = 0.$$

*Demostración.* Para todo  $x \neq 0$ ,

$$|u_\epsilon(x)| = |\varphi(x) U_\epsilon(x)| \leq a_N \left( \frac{\epsilon}{\epsilon^2 + |x|^2} \right)^{\frac{N-2}{2}} \xrightarrow{\epsilon \rightarrow 0} 0. \quad (1)$$

Por otro lado, sean  $\epsilon > 0$  y  $x \neq 0$ . Claramente,

$$\epsilon^2 - 2\epsilon|x| + |x|^2 = (\epsilon - |x|)^2 \geq 0.$$

De donde,

$$\frac{\epsilon}{\epsilon^2 + |x|^2} \leq \frac{1}{2|x|}.$$

Por lo tanto,

$$|u_\epsilon(x)| = |\varphi(x)U_\epsilon(x)| \leq a_N \left( \frac{1}{2|x|} \right)^{\frac{N-2}{2}} \quad \forall \epsilon > 0, \forall x \neq 0. \quad (2)$$

Además,

$$\left( \frac{1}{|x|} \right)^{\frac{N-2}{2}} \in L^2(B_{2R}) \quad (3)$$

pues

$$\int_{B_{2R}} \left( \frac{1}{|x|} \right)^{N-2} = \int_{B_{2R}} |x|^{2-N} < \infty$$

donde la última integral es finita pues  $(2-N)+N > 0$  (cf. Proposición 13.31). De (1), (2), (3), y el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, se sigue que

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_{B_{2R}} u_\epsilon^2 = 0.$$

□

**2.** Prueba que si  $\lambda \geq 0$ , entonces

$$S_\lambda = S := \inf_{\substack{u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|^2}{|u|_{2^*}^2}.$$

*Demostración.* Recordemos que en el Teorema 5.8 vimos que

$$S = S_\Omega := \inf_{\substack{u \in D_0^{1,2}(\Omega) \\ u \neq 0}} \frac{\|u\|^2}{|u|_{2^*}^2}.$$

Ahora bien, como  $\lambda \geq 0$ , entonces

$$\|u\|^2 \leq \|u\|_\lambda^2 \quad \forall u \in D_0^{1,2}(\Omega).$$

De donde,

$$S = S_\Omega \leq S_\lambda. \quad (4)$$

Conversamente, supongamos sin pérdida de generalidad que  $\Omega$  contiene al origen. Sea  $R > 0$  tal que  $B_{2R} \subset \Omega$  y para cada  $\epsilon > 0$  sea  $u_\epsilon$  como en el ejercicio 1. Entonces

$$\begin{aligned} S_\lambda &\leq \frac{\|u_\epsilon\|_\lambda^2}{|u_\epsilon|_{2^*}^2} && (u_\epsilon \in C_c^\infty(B_{2R}) \subset D_0^{1,2}(\Omega) \text{ para todo } \epsilon > 0) \\ &= \frac{\|u_\epsilon\|^2}{|u_\epsilon|_{2^*}^2} + \lambda \frac{|u_\epsilon|_2^2}{|u_\epsilon|_{2^*}^2} && (\text{por def. de } \|\cdot\|_\lambda) \\ &= \frac{S^{N/2} + O(\epsilon^{N-2})}{(S^{N/2} + O(\epsilon^N))^{\frac{2}{2^*}}} + \lambda \frac{|u_\epsilon|_2^2}{(S^{N/2} + O(\epsilon^N))^{\frac{2}{2^*}}}. && (\text{cf. Lema 5.30}) \end{aligned}$$

Tomando el límite cuando  $\epsilon \rightarrow 0$  obtenemos

$$S_\lambda = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} S_\lambda \leq \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \left( \frac{S^{N/2} + O(\epsilon^{N-2})}{(S^{N/2} + O(\epsilon^N))^{\frac{2}{2^*}}} + \lambda \frac{|u_\epsilon|_2^2}{(S^{N/2} + O(\epsilon^N))^{\frac{2}{2^*}}} \right) = \frac{S^{N/2}}{(S^{N/2})^{\frac{2}{2^*}}} + 0 = S. \quad (5)$$

De (4) y (5) se sigue lo deseado. □

**3.** Prueba que si  $\lambda \geq 0$ , entonces  $c_\lambda$  no se alcanza.

*Demostración.* Si  $\lambda = 0$ , esto es precisamente lo que garantiza el teorema 5.8.ii. Por eso, supongamos que  $\lambda > 0$  y argumentando por contradicción, supongamos que existe  $u \in \mathcal{N}_\lambda$  tal que

$$J_\lambda(u) = \inf_{\mathcal{N}_\lambda} J_\lambda = \frac{1}{N} S_\lambda^{N/2}. \quad (6)$$

Entonces

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} |u|_{2^*}^{2^*} &= \frac{2^* - 2}{2^* 2} |u|_{2^*}^{2^*} && \text{(pues } \frac{2^* - 2}{2^* 2} = \frac{1}{N} \text{)} \\ &= \frac{1}{2} \|u\|_\lambda^2 - \frac{1}{2^*} |u|_{2^*}^{2^*} && \text{(pues } u \in \mathcal{N}_\lambda \text{)} \\ &= J_\lambda(u) && \text{(def. de } J_\lambda \text{)} \\ &= \frac{1}{N} S_\lambda^{N/2} && \text{(cf. (6))} \\ &= \frac{1}{N} S^{N/2}. && \text{(cf. Ejercicio 2)} \end{aligned}$$

En particular,

$$|u|_{2^*}^{\frac{4}{N-2}} = \left( |u|_{2^*}^{2^*} \right)^{2/N} = S. \quad (7)$$

pues  $2^* \left( \frac{2}{N} \right) = \frac{4}{N-2}$ . Por otro lado,

$$\begin{aligned} \frac{\|u\|^2}{|u|_{2^*}^{2^*}} + \lambda \frac{|u|_2^2}{|u|_{2^*}^{2^*}} &= \frac{\|u\|_\lambda^2}{|u|_{2^*}^{2^*}} && \text{(por def. de } \|\cdot\|_\lambda \text{)} \\ &= \frac{|u|_{2^*}^{2^*}}{|u|_{2^*}^{2^*}} && \text{(pues } u \in \mathcal{N}_\lambda \text{)} \\ &= |u|_{2^*}^{2^* - 2} \\ &= |u|_{2^*}^{\frac{4}{N-2}} && \text{(pues } 2^* - 2 = \frac{4}{N-2} \text{)} \\ &= S && \text{(cf. (7))} \\ &\leq \frac{\|u\|^2}{|u|_{2^*}^{2^*}}. && \text{(por def. de } S \text{)} \end{aligned}$$

Como  $\lambda > 0$ , esto implica que  $|u|_2 = 0$ . De donde,

$$\|u\|^2 = \|u\|_\lambda^2 = |u|_{2^*}^{2^*}$$

es decir,  $u \in \mathcal{N}_{\mathbb{R}^N}$ . Luego,

$$J(u) = \frac{1}{2} \|u\|^2 - \frac{1}{2^*} |u|_{2^*}^{2^*} = \frac{2^* - 2}{2^* 2} |u|_{2^*}^{2^*} = \frac{1}{N} |u|_{2^*}^{2^*} = \frac{1}{N} S^{N/2}.$$

Es decir,  $u$  es una solución de energía mínima del problema

$$\begin{cases} -\Delta u = |u|^{2^*-2} u, \\ u \in D^{1,2}(\mathbb{R}^N). \end{cases}$$

Procediendo de la misma manera que en la demostración del teorema 5.8.ii, obtenemos que  $u$  es estrictamente positiva o estrictamente negativa. Una contradicción pues  $u(x) = 0$  para todo  $x \in \mathbb{R}^N \setminus \Omega$ .  $\square$