



PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS



Qué hacer emocionalmente *después de un terremoto*



Una guía para entender lo que pasa en tu cuerpo
y encontrar herramientas sencillas para las
primeras horas y días.



Esta guía no reemplaza atención
psicológica o médica profesional.



CREADA POR STEPHANIE ESSENFELD, LMFT
Y EL EQUIPO DE MÁS PAZ MENTAL

¿Qué puede pasar después de un terremoto?

Cada persona reacciona diferente, pero es común experimentar lo siguiente:



EN EL CUERPO

- Taquicardia
- Tensión muscular
- Temblor
- Dolor de cabeza
- Cansancio extremo
- Náuseas
- Sensación de que el piso sigue moviéndose



EN LAS EMOCIONES

- Miedo intenso
- Tristeza
- Irritabilidad
- Ansiedad
- Llanto inesperado
- Sensación de vacío



EN LOS PENSAMIENTOS

- "¿Y si vuelve a pasar?"
- Dificultad para concentrarte
- Recordar constantemente lo ocurrido



EN EL SUEÑO

- Insomnio
- Despertarte sobresaltado
- Pesadillas
- Dormir demasiado por agotamiento



No significa que seas débil. No significa que estés perdiendo el control. Tu sistema nervioso está intentando recuperarse, y eso toma tiempo.



Cinco cosas que sí ayudan

Pequeñas acciones pueden hacer una gran diferencia para que tu sistema nervioso vuelva a sentirse seguro.

1



Recuerda dónde estás

Cuando el miedo aparece, mira alrededor y pregúntate: ¿dónde estoy?, ¿qué día es hoy?, ¿estoy en un lugar seguro en este momento? Ayudar a tu cerebro a orientarse en el presente puede disminuir la sensación de amenaza.

2



Respira sin forzar

No necesitas respiraciones complicadas. Solo procura que la exhalación sea un poco más larga que la inhalación.

Inhala 4 • Exhala 6 • durante 1-2 minutos

El objetivo no es eliminar el miedo, sino enviar una señal de calma a tu sistema nervioso.

3



Conecta con alguien

El trauma puede hacernos sentir solos. Hablar con alguien de confianza, incluso unos minutos, puede ayudarte a sentirte acompañado.

No necesitas las palabras perfectas; puedes decir simplemente: **“todavía tengo mucho miedo.”**

4



Mantén pequeñas rutinas si es seguro hacerlo

Come algo ligero, toma agua, cámbiate de ropa, lávate la cara, intenta descansar. Las pequeñas acciones cotidianas ayudan al cerebro a recuperar cierta sensación de estabilidad.

5



Date permiso para sentir

No tienes que ser fuerte todo el tiempo. No tienes que controlar tus emociones. No tienes que dejar de llorar. Sentir no significa que estés retrocediendo.



Lo que sientes tiene sentido.

Estás haciendo lo mejor que puedes con lo que viviste.





4 Cinco cosas que pueden empeorar el malestar



Exponerte durante horas a videos del desastre

Revivir constantemente las imágenes no suele ayudar. Elige uno o dos momentos al día para revisar fuentes oficiales y luego toma distancia.



Exigirte actuar como si nada hubiera pasado

Tu cuerpo necesita tiempo. No esperes rendir igual que antes inmediatamente.



Juzgar tus emociones

Evita decirte “debería estar mejor” o “no debería sentir miedo”. Las emociones no obedecen a órdenes.



Aislarte completamente

Aunque necesites momentos de silencio, procura mantener algún contacto con personas de confianza.



Dormir muy poco durante varios días

El descanso favorece la recuperación. Si el insomnio persiste o se vuelve muy intenso, considera buscar apoyo profesional.



No estás solo. Tu sistema nervioso solo necesita tiempo, comprensión y apoyo.



¿Sientes que el piso sigue moviéndose?



Es una sensación frecuente: el cerebro permanece en estado de alerta y sigue interpretando señales relacionadas con el movimiento.



Mira un objeto fijo

Fija tu mirada en un punto estable.




Toca una pared o una mesa

Siente la textura, la temperatura, la firmeza.



Siente tus pies apoyados en el suelo

Presiona tus pies contra el piso. Estás aquí, ahora.



Respira lentamente

Inhala 4 • Exhala 6 • Repite de 1 a 2 minutos.



Si la sensación persiste, aumenta o interfiere con tu vida diaria, busca evaluación médica y psicológica.

Cómo ayudar a los niños



Los niños no procesan el miedo con palabras: lo procesan con el cuerpo y la conducta. Esto es lo que necesitas saber.



Su malestar puede verse como: querer estar pegados a un adulto, regresiones (chuparse el dedo, hacerse pipí), berrinches, miedo a la oscuridad o a separarse, dolores sin causa médica, repetir el juego del terremoto o preguntar una y otra vez “¿va a volver a temblar?”. Todo esto es normal: es su forma de digerir lo vivido.



¿Qué puedes contestar?



A veces no sabemos qué decir. Estas frases simples, honestas y calmadas pueden ayudar mucho.

- ♥ “Sí, fue un susto muy grande.”
- ♥ “Ahora estamos juntos y estoy aquí contigo.”
- ♥ “Si vuelves a sentir miedo, puedes decírmelo cuantas veces quieras.”
- ♥ “Tu cuerpo está reaccionando porque tuvo mucho miedo, es normal.”
- ♥ “No tienes que tener las palabras exactas, solo dime lo que sientes.”
- ♥ “Yo también tuve miedo, y aquí estamos los dos a salvo.”



Evita prometer: “nunca volverá a pasar”. Nadie puede garantizarlo — es más útil transmitir disponibilidad que certeza absoluta.



7 **Cómo ayudar a los niños según su edad**



2 a 6 años



- Frases cortas y concretas, sin detalles innecesarios sobre el peligro.
- Ofrece contacto físico: abrazos, sostener la mano, mecerlos.
- Mantén objetos y rutinas conocidas cerca (peluche, manta, horario de comida).
- Permite el juego simbólico del terremoto sin interrumpirlo, es su forma de procesar.

7 a 12 años



- Responde sus preguntas con honestidad, de forma simple y ajustada a su edad.
- Invítalos a dibujar o escribir lo que sintieron.
- Explícales qué son las réplicas para que no las vivan como "otro terremoto".
- Involúcralos en pequeñas tareas: sentirse útiles reduce la indefensión.

Adolescentes



- Evita minimizar ("no fue tan grave") o exagerar la preocupación.
- Permite que hablen con sus propias palabras, sin forzar la conversación.
- Respeta su necesidad de hablar con pares, pero mantente disponible.
- Ayuda a poner límites de tiempo a redes/videos del desastre, sin prohibir la información.



Lo más importante es que se sientan escuchados, acompañados y seguros.



Busca apoyo profesional para un niño (si, tras varias semanas:



El miedo o la ansiedad no disminuyen o empeoran



Hay conductas regresivas intensas y sostenidas



Hay terrores nocturnos frecuentes o rechazo total a dormir



Se aísla o pierde interés en lo que antes disfrutaba



Hay síntomas físicos persistentes sin causa médica



Si acompañas a un adulto mayor

Habla despacio. Responde preguntas con calma. Ayuda a mantener horarios de comida, hidratación y descanso — la rutina favorece la orientación y reduce el estrés.



Respira.



Lo que viviste fue muy difícil.
Tu cuerpo está intentando
volver a sentirse seguro.
Y eso toma tiempo.

No estás rot@.
No estás exagerand@.
No estás sol@.



Gracias por cuidarte.
Un paso a la vez.

Con cariño,
Más Paz Mental

