

ANCLAS DE RESILIENCIA

FICHAS PSICOLÓGICAS: PASOS SIMPLES EN UN CONTEXTO COMPLEJO



@psicojoelcol

Terapias
Contextuales

SOBRE ESTE DOCUMENTO

Esta herramienta es una guía práctica de recursos psicológicos, creada en forma de fichas pensando en las distintas situaciones que pueden ocurrir y personas que lo puedan usar. Tiene como base las guías internacionales de soporte de la OMS, APA y Cruz Roja, integrando la flexibilidad de las terapias contextuales. No constituye un protocolo oficial institucional, sino un marco operativo de apoyo en terreno diseñado para una lectura ágil y modular.

MAPA DE LAS FICHAS PSICOLÓGICAS

- **Ficha General:** Acción Psicológica en el Primer Día (Primeras 24 Horas).
- **Ficha 1:** Gestión del pánico y crisis.
- **Ficha 2:** Contención y validación para redes de apoyo.
- **Ficha 3:** Regulación del operador de emergencia, rescatistas o voluntarios (Personal de primera línea).
- **Ficha 4:** Gestión de la sobrecarga informativa.
- **Ficha 5:** Apoyo para Niños.
- **Ficha 6:** Manejo inicial de pérdidas súbitas.

⚠ PASO OBLIGATORIO: TRIAJE DE SEGURIDAD FÍSICA

Ninguna intervención psicológica es efectiva ni éticamente viable si el individuo permanece bajo amenaza ambiental real o descompensación médica.

- **Perímetro seguro:** Aleje a las personas de estructuras agrietadas, postes, tendido eléctrico dañado o zonas propensas a colapso secundario. Mueva al grupo a áreas abiertas y despejadas.
- **Prioridad médica:** Si la persona sangra, presenta contusiones severas o dificultad respiratoria mecánica por inhalación de polvo/humo, la atención médica desplaza por completo al soporte psicológico inmediato. Asegure hidratación básica y abrigo si hay temblores por hipotermia reactiva.



FICHA GENERAL: PROTOCOLO GENERAL DE ACCIÓN EN TERRENO (PRIMERAS 24 HORAS)



@psicojoelcol

El debriefing psicológico mandatorio (forzar la narrativa detallada del trauma) incrementa el riesgo de Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) por reconsolidación de la memoria bajo niveles críticos de cortisol. Se prioriza el soporte social orgánico y pragmático.

- **Ofrecer contacto calmado:** Preséntese con su nombre y rol, hable con voz baja, pausada y segura. Explique brevemente hechos reales y verificados de lo que está sucediendo. Jamás presione a nadie a relatar lo que vivió.
- **Reunión familiar y lazos sociales:** El soporte social actúa como el amortiguador biológico más potente contra la cronicidad del trauma. Ayude activamente a las personas a contactar a sus seres queridos.
- **Brindar información precisa y frenar rumores:** Comparta solo datos confirmados sobre refugios activos y zonas seguras. Desmienta rumores falsos de forma directa para bloquear pánicos colectivos masivos.
- **Apoyar el afrontamiento práctico:** Anime a las personas a enfocarse únicamente en las herramientas inmediatas del momento. Reduzca la carga cognitiva impidiendo proyecciones e incertidumbres futuras.
- **Identificar perfiles de alto riesgo:** Monitoree y priorice la atención de niños, adultos mayores, personas con discapacidades o afecciones de salud mental previas, y quienes hayan perdido familiares directos.

Cuándo usar: Si encuentra a un individuo gritando descontroladamente, hiperventilando (sintiendo que se asfixia), temblando de forma incapacitante o en un estado de mutismo catatónico (congelado) incapaz de responder tras el impacto.

"La regulación emocional no consiste en deshacerse de las emociones o destruirlas, sino en aprender a surfear la ola del afecto intenso sin permitir que la tormenta biológica gobierne tu comportamiento."

— MARSHA LINEHAN

Herramienta 1: Interrupción del secuestro amigdalino (Captar la atención)

Qué hacer:

GUION ESTÁNDAR INTERNACIONAL DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

(Posición: De lado, a su nivel de altura, voz baja y calmada).

"Hola. Mi nombre es [Tu Nombre]. Trabajo con [Nombre de tu organización / el equipo de apoyo].

(Pausa)

Estoy aquí para ver cómo puedo ayudarte. ¿Está bien si me quedo aquí contigo?

(Espera respuesta o asentimiento)

Necesito que me escuches con atención. Dime, ¿cuál es tu nombre?

(Escucha el nombre)

[Nombre], estás a salvo aquí. Sé que lo que pasó fue muy difícil, pero la emergencia ya pasó y ahora estás seguro/a conmigo.

(Pausa)

No tienes que hablar de lo que pasó si no quieres. Solo concéntrate en mi voz. Pon tus pies firmes en el suelo y respira conmigo, despacio. Aquí estoy."

Las 3 claves técnicas de esta herramienta única:

1. **Establece autoridad segura:** Decir tu nombre y organización le da un marco de orden legal y comunitario al caos.
2. **Pide consentimiento:** Al preguntar "*¿Está bien si me quedo?*", el manual te obliga a devolverle el control a la víctima. El pánico cede cuando la persona siente que vuelve a tomar decisiones.
3. **Quita la presión narrativa:** Decir explícitamente "*No tienes que hablar de lo que pasó*" frena inmediatamente la ansiedad de tener que explicar el trauma, que es lo que más asusta al cerebro en los primeros minutos.

Por qué funciona: El pánico anula la corteza prefrontal. Un comando directivo y un estímulo visual nítido actúan como un disruptor top-down que obliga al cerebro a procesar un estímulo externo prioritario, rompiendo el bucle disociativo.

Herramienta 2: Lavarse el rostro con agua fría

Qué hacer: Guíe de manera amable a la persona a un baño o puesto de agua. Pídele que tome aire por la nariz y ****aguante la respiración de forma continua durante un lapso de entre 10 a 20 segundos**** mientras se lava suavemente el rostro completo, humedeciéndose generosamente con agua fría las sienes, pómulos y la nuca.

Por qué funciona: No se trata de arrojarle agua de sorpresa (lo cual asusta y violenta al paciente). Lavarse intencionalmente con agua helada simula el Reflejo de Inmersión. Envía una señal directa e instantánea al cerebro para reducir los latidos altos, detener el temblor simpático y restaurar la calma de forma compasiva y respetuosa.

Herramienta 3: Seguir una forma rectangular para respirar lentamente

Qué hacer: Haga que la persona mire cualquier objeto rectangular del entorno (una ventana, una puerta). Guíela a seguir el borde con la vista juntos: Inhalar por la nariz durante 3 segundos al subir el borde corto / Exhalar lentamente por la boca (como soplando una vela) durante 5 segundos al recorrer el borde largo. Repetir 5 ciclos.

Por qué funciona: Evita la retención forzada del aire (que asfixia a asmáticos). Exhalar más tiempo del que se inhala de forma extendida de forma rítmica de estimula la relajación corporal interna y revierte los mareos causados por respirar muy rápido en la crisis.

Herramienta 4: El ejercicio de los 5 sentidos para conectar con el presente

Qué hacer: Pídele a la persona que se quede quieta, mire a su alrededor de forma pausada y responda en voz alta a tus comandos sencillos:

1. ``Dime **5 cosas** que puedas ver a tu alrededor ahora mismo`` *(espera que las nombre)*.
2. ``Dime **4 cosas** físicas que puedas sentir o tocar en este instante`` *(ej. el suelo bajo tus pies, tu ropa, la tela de la silla)*.
3. ``Dime **3 sonidos** diferentes que alcances a escuchar de fondo`` *(ej. el viento, voces, pasos)*.
4. ``Dime **2 olores** que notes en el ambiente en este segundo``.
5. ``Dime **1 cosa** buena o un pensamiento útil que tengas justo ahora``.

Por qué funciona: El pánico bloquea la mente y hace que la persona sienta una irrealidad enorme, como si flotara o estuviera desconectada de la tierra. Esta dinámica obliga a los sentidos a captar estímulos reales del entorno físico inmediato. La mente se ve obligada de forma lógica a apagar las ideas de terror del futuro para poder responder a las preguntas sencillas del presente.

Herramienta 5: Caminar a paso rápido para liberar la tensión

Qué hacer: Tómala del brazo firmemente (si lo permite) y camina con ella a paso rápido, coordinado y braceando en un perímetro despejado y seguro durante 3 minutos seguidos.

Por qué funciona: El pánico inunda los músculos de una energía física inmensa lista para huir. Si el paciente se queda estático, esa fuerza atrapada se transforma en temblores severos. Caminar de forma decidida gasta esa química del estrés de forma segura.



Cuándo usar: Con personas o núcleos familiares en zonas de espera prolongada (afueras de hospitales, centros de acopio, perímetros de remoción de escombros) que muestran desesperación, llanto desbordado o parálisis por incertidumbre (Soporte basado en la Cruz Roja).

"La validación radical no significa aprobar el caos, significa reconocer la verdad profunda de lo que la persona está sintiendo en este preciso instante. Solo cuando alguien se siente profundamente escuchado, encuentra el suelo firme necesario para volver a ponerse en pie."

— MARSHA LINEHAN

Regla de Oro:

Está estrictamente prohibido reprimir la expresión del dolor mediante frases de falsa calma ("no llores", "tienes que ser fuerte"). Estas intervenciones invalidan la experiencia, rompen la alianza de apoyo y elevan de forma secundaria la reactividad fisiológica.

Aplicación Práctica de los 3 Niveles de Validación:

Es crucial saber exactamente cuándo aplicar cada nivel según el estado del paciente para guiar la conversación con efectividad técnica:

Nivel de Validación	Cuándo usarlo (Indicación Clínica)	Herramienta de Aplicación Directa
Nivel 1: Atención Plena y Presencia	Úsalo de entrada con cualquier persona en crisis. Especialmente cuando la persona está llorando con fuerza, desahogándose o en shock inicial. En este momento, las palabras sobran y el cerebro necesita percibir seguridad no verbal.	Mantenga el dispositivo móvil guardado, establezca contacto visual directo a la misma altura, asienta con la cabeza y permita el llanto libre sin interrumpir.
Nivel 2: Reflejo Preciso	Úsalo cuando la persona empiece a articular palabras o frases de queja e incertidumbre. Sirve para ordenar el caos mental devolviéndole sus propios pensamientos de forma limpia, demostrando que está siendo escuchado sin juicios.	"Te escucho perfectamente. Entiendo que te desespera y te da un terror inmenso ver que pasan las horas, que no hay señal telefónica y sigues sin noticias de tu familia."
Nivel 3: Contextualización	Úsalo cuando notes que la persona siente culpa, vergüenza por su llanto o cree que está perdiendo el control. Su función es normalizar la respuesta emocional del paciente conectándola de forma lógica con la gravedad de la catástrofe vivida.	"Cualquiera en tu posición estaría igual de angustiado. No estás exagerando ni te estás volviendo loco; tu cuerpo responde así ante una amenaza real porque los amas profundamente."

Herramienta Somática de Bajada a Tierra (Grounding Propioceptivo):

Si nota que el familiar se encuentra en un estado de hipervigilancia constante, con respiración entrecortada y sensación de irrealidad ("siento que todo se sigue moviendo"), ejecute estas acciones:

1. **Presión en muslos:** Guíe al paciente a apoyar las palmas de sus manos firmemente sobre sus propios muslos.
2. **Anclaje de talones:** Pídale que pise el suelo con fuerza, concentrando todo su peso en ambos talones.
3. **Instrucción directiva:** ***"Ancla tus dos pies firmes en el suelo, siente la presión de tus talones contra la tierra. Ahora pon tus manos sobre tus muslos y empuja con fuerza hacia abajo. Nota cómo el suelo te sostiene de verdad. Tus pensamientos están atrapados en el miedo, pero tus pies están en el suelo real, firme y seguro. Concéntrate solo en esa presión."***

Entender lo que pasa: El sismo y el susto de las réplicas

Cuando ocurre un temblor fuerte, el cuerpo queda asustado y en alerta. Si hay ****réplicas** (nuevos temblores pequeños)**, el miedo vuelve con la misma fuerza del primer día. Es completamente normal que la persona reviva el sismo, sienta que todo se mueve aunque esté quieto, le cueste dormir o sienta que le falta el aire. No significa que se esté volviendo loca; es su cuerpo que sigue intentando protegerse. Para apagar esa falsa alarma de peligro y calmar el pecho, es necesario usar una herramienta física muy fácil que le recuerde al cuerpo que ya está a salvo.

Herramienta Práctica de Regulación: Respiración de Rescate Sostenida

Posición del cuerpo: Pídele que se siente **en una silla con la espalda bien apoyada y los pies firmes y planos en el suelo**. Si no hay dónde sentarse, guíela a hacerlo **de pie, separando un poco las piernas y doblando apenas un poco las rodillas** para dar estabilidad. (Estar sentados o de pie ayuda a recuperar el control. Solo acuéstala si se marea por completo).

Guía paso a paso en palabras sencillas:

"Quiero que te sientes firme en esa silla y pongas tu espalda derecha pero floja. Siente tus pies tocando el suelo con fuerza.

Ahora, vas a tomar aire suavemente por la nariz inflando el pecho... 1, 2, 3 segundos.

Sostén ese aire un momentito adentro... 1, 2 segundos.

Ahora, saca el aire por la boca soplando muy despacio, muy lento, como si quisieras mover el humo de un fósforo sin apagarlo... vacía todo el aire... 1, 2, 3, 4, 5 segundos.

Quédate un instante con el pecho vacío antes de volver a empezar... 1, 2 segundos.

Vamos a repetirlo juntos. Toma aire... aguanta... saca el aire largo y suave... descansa. Muy bien."



FICHA 3: REGULACIÓN DEL OPERADOR DE EMERGENCIA, RESCATISTAS O VOLUNTARIOS



@psicojoelcol

Cuándo usar: Exclusivamente con el personal de primera línea (bomberos, paramédicos, voluntarios) durante sus bloques de relevo obligatorio, o si nota signos de torpeza motora, irritabilidad irracional, mirada perdida o bloqueo cognitivo (Salud Ocupacional en Medicina de Emergencias de la Cruz Roja).

"Si quieres cuidar de otros, debes recordar que tu propia humanidad y vulnerabilidad también requieren un refugio. Detenerse a respirar y descargar la tensión no es un acto de debilidad, es la estrategia fundamental del guerrero compasivo para seguir siendo útil."

— AARON BECK

- **Agua en operaciones (Romper la visión de túnel):** Cuando el operador experimente taquicardia de fondo o disociación leve tras un rescate complejo, debe lavarse el rostro y los ojos con agua fría durante 20 segundos para restaurar el tono simpaticovagal y mitigar la visión de túnel táctica.
- **Relajación post-isométrica refleja:** Durante la pausa, guíe al rescatista a inhalar profundamente mientras tensa sus puños o empuja sus pies contra el suelo con su máxima fuerza durante 7 segundos, y luego libere la tensión por completo de golpe mientras exhala todo el aire. Repetir 3 veces. Esto rompe la contractura muscular defensiva del cuerpo ante el peligro continuo.
- **Encuadre técnico del descanso (Eliminar la culpa):** El brigadista suele rechazar el relevo por hiperresponsabilidad. Debe ordenarse bajo una estricta lógica técnica operativa: "Detenerte 10 minutos a tomar agua, comer algo y regular tu cuerpo no es abandonar la misión; es el mantenimiento técnico obligatorio que tu organismo exige para seguir siendo un recurso eficiente y seguro en la siguiente hora. Si colapsas tú, te conviertes en una carga y restas un rescatista a la operación. Regúlate por orden técnica."



Cuándo usar: Con ciudadanos confinados en sus hogares o población en el exterior atrapados en la revisión compulsiva de redes sociales, experimentando insomnio severo, rumiación mental e impotencia dolorosa.

"El dolor es inevitable, pero sufrir por anticipado a través de un laberinto infinito de pantallas nos aleja de donde la vida nos necesita hoy. Suelta el control de lo incontrolable y ánclate firmemente en el único lugar donde puedes actuar: el aquí y el ahora."

— STEVEN HAYES

El Mecanismo Psicológico del "Doomscrolling" (Evitación Experiencial):

Buscar noticias e imágenes trágicas de forma frenética en el teléfono (hacer *refresh* constante en redes) representa una conducta de evitación. La persona consume contenido de forma compulsiva para evitar conectar de manera directa con su propia angustia e impotencia ante la incertidumbre. Esto genera un bucle destructivo: las imágenes asustan a la amígdala cerebral, el nivel de ansiedad sube, y la mente obliga al sujeto a seguir buscando más información en un intento desesperado por calmarse, atrapándolo en una adicción al terror.

Activación Guiada por Valores (Tu Círculo de Control):

Al sentir el impulso compulsivo de abrir redes para calmar la angustia, reconozca la emoción ("Noto que tengo miedo e impotencia"), deje el teléfono y canalice esa energía de inmediato en una micro-acción útil real alineada con lo que valora:

Por ejemplo:

- **Si valoras la Protección Familiar:** Verifique físicamente el bolso de emergencia de tu casa, asegure una reserva de agua potable o siéntese a conversar y calmar con serenidad a los niños o adultos mayores que tienes cerca.
- **Si valoras la Solidaridad (Diáspora):** Organice de manera intencional canales de acopio reales, gestione recursos de soporte económico directo o sirva como el pilar telefónico sereno que llama a sus familiares a transmitir paz.

Acciones de rutina diaria, de cuidado personal, de orden también son importantes en estos momentos.

Cuándo usar: Menores de 11 años en refugios temporales o con sus familias que muestren signos de mutismo reactivo, llanto inconsolable o conductas de apego ansioso extremo hacia sus cuidadores. Esta ficha es muy importante que sea práctica, simple y los padres pueden seguirla sin problema para ****fomentar el apego seguro en medio de la incertidumbre****.

"Para un niño asustado, el mundo entero recobra el orden no cuando cesa la tormenta externa, sino cuando el adulto a su lado se convierte en un puerto inquebrantable de calma, verdad y de ternura háptica."

— JOHN BOWLBY

Principio de Co-Regulación:

La resiliencia infantil depende directamente de la estabilidad del adulto de referencia. Los niños mides el peligro mirando tu rostro y oyendo tu tono de voz. Calma tu propia respiración antes de intervenir.

Respuestas de Contención ante Diálogos Infantiles Comunes:

- **Si el menor dice:** "Tengo miedo, ¿se va a caer la casa otra vez? ¿Nos vamos a morir?"

Herramienta de acción: Agáchese hasta quedar exactamente a la altura de sus ojos. Tome sus manos con firmeza y díglele con voz lenta y pausada: "Hubo un sismo muy fuerte y la tierra hizo un ruido asustador, es completamente normal violentarse o sentir miedo; yo también lo sentí. Pero en este momento estamos en un lugar seguro, y yo estoy aquí contigo para cuidarte. Estamos a salvo."

- **Si el menor:** Se queda completamente mudo (mutismo), tiembla o se agarra con fuerza de tu ropa.

Herramienta de acción: No lo obligue a hablar ni lo sature con preguntas. Abrázalo de forma firme y contenida (si lo permite), mantenga una respiración lenta (usted como adulto) y díglele: "Siente cómo respiro yo, despacio. Siente mi abrazo. Estás seguro conmigo. Deja que tu cuerpo tiemble un poquito si quiere, ya va a pasar."

- **Si el menor dice:** "Es mi culpa por portarme mal, por eso Dios / la Tierra se enojó."

Herramienta de acción: Desvincule la responsabilidad de forma tajante y dulce: "No, mi amor, para nada. Los temblores son cosas naturales que le pasan a la Tierra; a veces se mueve un poquito por dentro para acomodarse, como cuando tú te estiras al despertarte. No tiene nada que ver con cómo te portas. Tú eres un niño bueno y estás seguro."

Herramientas de trabajo con niños o dinámicas:

- **A. "Darle Nombre a los Latidos" (Validación Emocional Directa):**

Cómo guiar: Invite al niño a colocar su mano derecha directamente sobre su propio pecho para sentir su corazón acelerado. Díglele con calma: "¿Sientes cómo va rápido? Tu corazón está diciendo en este momento: 'tengo miedo, el ruido me asustó'. Y eso está muy bien, es normal. Vamos a respirar juntos despacio para avisarle al corazón que ya lo escuchamos y que aquí afuera ya estamos a salvo." Respiren juntos hasta notar cómo el ritmo cardíaco desacelera de forma natural.

- **B. El Abrazo de la Tortuga (Protección Corporal Simplificada):**

Cómo guiar: Sienten al niño en el suelo o una silla. Dile: "¿Sabías que las tortugas tienen una casa-caparazón que es durísima y las protege de cualquier tormenta? Vamos a convertirnos en tortugas fuertes. Cruza tus brazos y abraza tu propio cuerpo apretándote duro, encoge un poquito tus hombros y mete tu cabecita hacia el pecho. Ahora, toma aire inflando tu pancita muy despacio... 1, 2, 3 segundos. Suelta el aire como un suspiro largo... Siente tu caparazón, estás seguro/a aquí adentro." Repetir 3 veces.

- **C. Dibujar el "Monstruo del Ruido" (Ventilación Gráfica con Lápiz y Papel):**

Cómo guiar: Entrégale cualquier hoja de papel y un lápiz o color. Dile: "El temblor y el ruido asustan mucho,

parece un monstruo invisible. Quiero que dibujes en esta hoja cómo te imaginas que es ese monstruo. Hazlo tan grande o feo como quieras." Una vez que termine, miren el dibujo juntos y dile con cariño: *"Mira, ahora el monstruo está atrapado en este papel, ya no está afuera. Si quieres, podemos arrugar la hoja juntos y encerrarlo en una bola de papel para que no moleste más."*

- **D. "El Clima en el Suelo" (Ventilación Narrativa Primitiva):**

Cómo guiar: Utilizando únicamente elementos naturales del piso (tierra, arena, palitos o piedras pequeñas).

Pídele al niño que ordene los palitos para mostrar "el momento en que la tierra se movió" y que luego sople con fuerza sobre el suelo para simular que el viento se lleva el susto. Finalmente, invítalo a aplanar la tierra con sus manos para dejar el suelo firme, liso y ordenado otra vez.

- **E. Establecer Rutinas Rápidas de Seguridad (Predictibilidad):**

Cómo guiar: El cerebro infantil colapsa cuando todo cambia. En el refugio o campamento, crea micro-rutinas predecibles inmediatamente. Asígnale una tarea pequeña y útil: *"Tú vas a ser el guardián de los colores de tu hermano"*, o fijen un hito diario invariable: *"Pase lo que pase, todas las noches antes de cerrar los ojos vamos a cantar tu canción favorita o contar la misma historia"*. Esto le devuelve la estructura y la calma al niño.

- **F. Cuento Terapéutico Corto: "El Árbol Viejo y el Viento Solitario"**

Cómo narrar: Siéntate pegado al niño y cuéntale despacio:

"En medio de un bosque vivía un Árbol muy grande que cuidaba a los pajaritos en sus ramas. Una noche, la tierra se sacudió con un rugido muy fuerte y un viento helado empezó a soplar con furia. Las hojitas del árbol temblaban de miedo y los pajaritos piaban asustados creyendo que se iban a caer. El Árbol, sintiendo el mismo susto, respiró profundo, hundió sus raíces con mucha fuerza en la tierra y abrazó a los pajaritos cerrando sus ramitas apretado. El Árbol les dijo al oído: 'Sé que el suelo se mueve y el viento hace ruido, pero mis raíces son fuertes, yo los tengo bien sujetos y de aquí no se van a caer. La tormenta va a pasar'. Y así fue: los pajaritos se durmieron al ritmo del corazón del Árbol, y a la mañana siguiente, el sol volvió a brillar en un bosque en calma."

Cuándo usar: En las primeras horas (primeras 24-72 horas) inmediatamente después de confirmarse un fallecimiento o desaparición traumática en el sitio del desastre. Enfocado en dar pautas de contención claras e intuitivas.

"El dolor de una pérdida súbita desgarrar nuestra estructura y nos confronta con el vacío absoluto; sin embargo, honrar ese dolor desgarrador sin huir de él es el primer hilo invisible con el que, con profunda compasión, reconstruiremos paso a paso el significado de la vida."

— VIKTOR FRANKL

En fases de shock agudo no se realiza procesamiento profundo del dolor ni intervenciones terapéuticas estructuradas. El objetivo absoluto es la estabilización somática, el resguardo del individuo y el soporte compasivo sin patologizar las respuestas inmediatas del sufrimiento.

Herramienta 1: Asegurar el Entorno Sensorial (Aislamiento Protector):

Qué hacer: Aísle e inmunice de forma inmediata a la persona del foco caótico, ruidos masivos, presencia de curiosos o periodistas. Ofrezca un vaso de agua limpia y provea abrigo físico real (una manta o chaqueta pesada).

Por qué funciona: El cerebro en shock agudo sufre una marcada vasoconstricción periférica (hipotermia reactiva) y es incapaz de iniciar la regulación emocional si los sentidos continúan procesando estímulos ambientales desorganizados.

Herramienta 2: Validación Radical del Dolor (Sin Maquillar la Realidad):

Qué hacer: Permita y respete el espacio para el llanto libre, los gritos de descarga o el silencio de shock. Elimine por completo frases de falsa calma o consuelo bienintencionado que bloqueen la ventilación ("tienes que ser fuerte", "ya dejó de sufrir").

"Sé que es un horror absoluto lo que estás viviendo y que sientes que tu vida se terminó en este segundo. No tengo palabras para quitarte este dolor, y tienes todo el derecho a sentirte destrozado/a. No estás exagerando. Aquí estoy contigo, sostén mi mano, no te voy a dejar solo/a en esto."

Herramienta 3: Regulación Biológica del Espasmo de Llanto por Corregulación Guiada:

Qué hacer: Si el impacto de la noticia desencadena una crisis de hiperventilación grave o temblores masivos, ****aplique corregulación respiratoria directa****. Colóquese frente al paciente, tome sus manos de forma firme pero amable, y pídale que mire su pecho. Comience a respirar usted de forma muy marcada y exageradamente lenta para que él lo imite. Sincronice el ritmo y ****vaya bajando e igualando la velocidad de la respiración de forma progresiva****, guiándolo paso a paso a estabilizar el paso del aire mediante el reflejo espejo de tu cuerpo.

Por qué funciona: En shock agudo, el paciente pierde el control voluntario de sus pulmones. Tu cuerpo calmado y tu respiración rítmica actúan como un marcapasos biológico externo. Al respirar de manera progresiva junto a él, forzas el descenso de su ritmo cardíaco de forma orgánica.

Herramienta 4: Activación por Micro-Herramientas (Restaurar la Agencia):

Qué hacer: No hable de trámites legales, sepelios ni del futuro; la carga cognitiva está saturada. Redirija su mente hacia una única acción práctica, inmediata y controlable en el aquí y ahora para sacarlo de la indefensión aprendida.

"No pienses en nada más ahora mismo. Concéntrate solo en este minuto. Dime: ¿A qué familiar directo o amigo de total confianza quieres que llamemos en este instante para que venga a estar aquí a tu lado?"

"En medio del desastre y de las horas más difíciles, recordemos siempre que lo más importante es ser humanos, acercarnos con empatía profunda y ayudarnos incondicionalmente los unos a los otros."

ANCLAS DE RESILIENCIA • @psicojoelcol

Formato portátil adaptado para reenvío libre y fotocopiado de campaña en terreno.