

# ¿Cómo acompañar un ataque de pánico después del *terremoto en Venezuela?*

Sin invadir, minimizar ni asustar más.

01

# Primero: identifica lo que puede estar pasando

Un ataque de pánico puede verse como:



Respiración rápida



Manos temblando



Sudor frío



Palidez



Mirada perdida o muy alerta



Sensación de ahogo



Miedo a morir



Querer salir corriendo



...o quedarse paralizad@.



02

## Recuerda: no siempre se ve igual

### HACIA ADENTRO

Algunas personas se quedan congeladas y en silencio.

### HACIA AFUERA

Otras hablan rápido, se mueven mucho o piden ayuda directamente.

Ambas pueden ser respuestas de pánico, shock o alarma después de un susto extremo.

Y estos días pueden aparecer aunque ya no esté temblando.



03

## Antes de asumir que es pánico, revisa la seguridad física

No todo es emocional. Busca atención médica si hay:

- ! Golpe en la cabeza
- ! Dificultad real para respirar
- ! Dolor en el pecho que no cede
- ! Pérdida de conciencia
- ! Lesión visible
- ! Confusión intensa



**Ante la duda, prioriza la revisión médica.**



04

## Acércate sin invadir

- ✓ Quédate cerca, pero no encima.
- ✓ Baja tu tono de voz.
- ✓ Habla más lento.
- ✓ Muévete con calma.

En una crisis, tu cuerpo también comunica.

Tu calma puede ayudarle a su cuerpo a encontrar un ritmo más seguro.



05

## Usa frases simples

No expliques demasiado. Dile algo breve y firme:

“Estoy aquí contigo.”

“Vamos a buscar estar lo más seguros posible ahora.”

“Esto se siente horrible, pero no tienes que atravesarlo solo.”

“Vamos paso a paso.”



06

## Evita frases que invalidan

No digas:

×

“Tranquilízate.”

×

“Ya pasó.”

×

“No es para tanto.”

×

“Hay gente peor.”

×

“Tienes que ser fuerte.”

Aunque quieras ayudar, esas frases pueden hacer que la persona se sienta más sola o avergonzada.





07

## No la fuerces a hablar ni la toques sin permiso

- × No le hagas muchas preguntas de golpe.
- × No le pidas que cuente lo que pasó en detalle.
- × No la sujetes sin avisar.

Antes de tocarla, pregunta:

“¿Quieres que te dé la mano o prefieres espacio?”





08

## Ayúdale a volver al presente

Puedes decir:

“¿Sientes tus pies en el piso?”

“Toca algo firme: una pared, una silla, una manta o mi mano.”

“Dime 3 cosas que ves ahora, aquí, conmigo.”

No necesitas convencerla de que todo está bien. Solo ayudarla a volver a este momento.



09

## Ejercicio 5·4·3·2·1

Ayúdalo a volver al presente usando sus sentidos. Guíalo paso a paso; no tiene que ser perfecto.

5

**Identifica cinco cosas que puedes ver**

Una pared, una silla, una luz, una puerta, una planta.

4

**Identifica cuatro cosas que puedes sentir**

Tus pies en el piso, la ropa, una silla, el aire, tus manos.

3

**Identifica tres cosas que puedes escuchar**

Una voz, un carro, tu respiración, un sonido lejano.

2

**Identifica dos cosas que puedes oler**

Tu ropa, una crema, el café... o 2 olores que te gusten.

1

**Identifica una cosa que puedes saborear**

Agua, menta, café... o el sabor de este momento.



## 10 Respira tú primero

No le digas solo “respira”. En ese momento puede no saber cómo.

Respira tú primero: lento, visible, sin presión.

Si puede seguirte, invítal@ a inhalar suave y exhalar un poquito más largo.

No tiene que hacerlo perfecto.



11

## Valida el miedo a las réplicas

Después de un terremoto, cualquier disparador puede despertar el pánico otra vez:

Vibración

Ruido fuerte

Movimiento

Alarma

Una grieta

No es exageración. No es “ya deberías estar bien”. El cuerpo sigue en alerta intentando protegerse.

Valida antes de corregir.



12

## Quédate mientras pasa

Un ataque de pánico no tiene un tiempo exacto. Puede durar minutos.

Quédate cerca aunque sientas que “no estás haciendo nada”.

A veces acompañar es simplemente no dejar a la persona sola con su miedo.



13

## Después, no le pidas explicaciones

Cuando baje la intensidad, no le preguntes de inmediato:

- × “¿Qué pasó?”
- × “¿Por qué te dio?”
- × “¿En qué estabas pensando?”



Mejor pregunta

“¿Qué necesitas ahora?”

Puede necesitar:

Agua

Silencio

Compañía

Sentarse

Descansar

Avisarle a alguien

Ayuda práctica



14

## Cuándo buscar ayuda urgente

Busca apoyo profesional, médico o de emergencia si:

- ! Los ataques se repiten mucho.
- ! No logra dormir o funcionar.
- ! Está desorientad@.
- ! Dice que quiere hacerse daño.
- ! No puede mantenerse segur@.
- ! Hay dolor físico intenso o dudas médicas.

No tienen que atravesar esto sol@s.





● PARA RECORDAR

Después de un terremoto, el cuerpo puede seguir reaccionando como si el peligro continuara.

Acompañar no es apagar el miedo a la fuerza. Es ayudar a que la persona vuelva, *poco a poco*, al presente.



Guárdalo y compártelo con alguien que pueda necesitarlo.

