



# Lógica Computacional

Diego Silveira Costa Nascimento

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte  
diego.nascimento@ifrn.edu.br

18 de abril de 2019

1 Introdução

2 Lógica Proposicional



## 1 Introdução

## 2 Lógica Proposicional



## Definição

É a ciência das leis ideais do pensamento e a arte de aplicá-las à pesquisa e à demonstração da verdade.

- Deriva do Grego (logos); e
- Significa:
  - palavra;
  - pensamento;
  - ideia;
  - argumento;
  - relato;
  - razão
  - lógica; ou
  - princípio lógico.



# Origem

- A Lógica teve início na Grécia em 342 a.C.;
- Aristóteles sistematizou os conhecimentos existentes em Lógica, elevando-a à categoria de ciência;
- Obra chamada Organon (Ferramenta para o correto pensar);
- Aristóteles preocupava-se com as formas de raciocínio que, a partir de conhecimentos considerados verdadeiros, permitiam obter novos conhecimentos; e
- A partir dos conhecimentos tidos como verdadeiros, caberia à Lógica a formulação de leis gerais de encadeamentos lógicos que levariam à descoberta de novas verdades.

## Aristóteles



## Organon



# Princípios Lógico

A Lógica Formal repousa sobre três princípios fundamentais que permitem todo seu desenvolvimento posterior, e que dão validade a todos os atos do pensamento e do raciocínio.

## Princípio da Identidade

Afirma  $A = A$  e não pode ser  $B$ , o que é, é.

## Princípio da Não Contradição

$A = A$  e nunca pode ser não- $A$ , o que é, é e não pode ser sua negação, ou seja, o ser é, o não ser não é.

## Princípio do Terceiro Excluído

Afirma que Ou  $A$  é  $x$  ou  $A$  é  $y$ , não existe uma terceira possibilidade.



1 Introdução

2 Lógica Proposicional



# Proposição

- Chama-se proposição todo o conjunto de palavras ou símbolos que exprimem um pensamento de sentido completo;
- As proposições transmitem pensamentos; e
- Afirmam fatos ou exprimem juízos que formamos a respeito de determinados entes.

## Exemplos

A Lua é um satélite da terra

Sócrates é um homem

Eu estudo lógica

Não está chovendo





Considere o conjunto de símbolos:

$$A = \{ (, ), \neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, p, q, r, \dots \}$$

- A esse conjunto é chamado de alfabeto da Lógica Proposicional;
- As letras são símbolos não lógico (letras sentenciais); e
- O restante são símbolos lógicos (parênteses e conectivos lógicos).



# Letras Sentenciais

As letras sentenciais são usadas para representar proposições elementares ou atômicas, isto é, proposições que não possuem partes que sejam também proposições.

## Exemplos

$p$  = O céu é azul

$Q$  = Eu estudo lógica

$r$  =  $2 + 2 = 4$

$s$  = Sócrates é um homem

## Importante

As partes dessas proposições não são proposições mais simples, mas sim, componentes subsentenciais: expressões, palavras, sílabas ou letras.



- As proposições compostas são obtidas combinando proposições simples através de certos termos chamados conectivos;
- A Lógica dispõe de cinco tipos de conectivos e seus operadores:
  - Não (Negação),  $\neg$ ;
  - E (Conjunção),  $\wedge$ ;
  - Ou (Disjunção),  $\vee$ ;
  - Se – então (Condicional),  $\rightarrow$ ; e
  - Se e somente se (Bicondicional),  $\leftrightarrow$ .



A característica peculiar da negação, tal como ela se apresenta na lógica proposicional clássica, é que toda proposição submetida à operação de negação resulta na sua contraditória.

## Exemplos

$p$  = Está chovendo.

Ler-se  $\neg p$ , como: “**Não** está chovendo”.



# Tabela-verdade para Negação

- Se  $p$  é uma proposição, a expressão  $\neg p$  é chamada negação de  $p$ ; e
- Claramente, a negação inverte o valor verdade de uma expressão.

## Exemplos

$p$	$\neg p$
V	F
F	V



# Operador de Conjunção

A característica peculiar da conjunção está no fato de fórmulas conjuntivas expressarem a concomitância de fatos. A fórmula  $(p \wedge q)$  expressa que o fato expresso por  $p$  ocorre ao mesmo tempo que o fato expresso por  $q$ .

## Exemplos

$p$  = Está chovendo.

$q$  = Está ventando.

Ler-se  $p \wedge q$ , como: “Está chovendo e está ventando.”



# Tabela-verdade para Conjunção

- Se  $p$  e  $q$  são proposições, a expressão  $p \wedge q$  é chamada conjunção de  $p$  e  $q$ ; e
- As proposições  $p$  e  $q$  são chamadas fatores da expressão.

## Exemplos

$p$	$q$	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F



# Operador de Disjunção

A característica peculiar da disjunção consiste no fato de proposições disjuntivas expressarem que pelo menos um de dois fatos ocorre. A fórmula  $(p \vee q)$  expressa que, dentre os fatos expressos por  $p$  e  $q$  respectivamente, pelo menos um deles ocorre.

## Exemplos

$p$  = Está nublado.

$q$  = Está chovendo.

Ler-se  $p \vee q$ , como: “Está nublado ou está chovendo.”





# Tabela-verdade para Disjunção

- Se  $p$  e  $q$  são proposições, a expressão  $p \vee q$  é chamada disjunção inclusiva de  $p$  e  $q$ ; e
- As proposições  $p$  e  $q$  são chamadas parcelas da expressão.

## Exemplos

$p$	$q$	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F



A característica peculiar dessa operação consiste em que um condicional ( $p \rightarrow q$ ) expressa que a ocorrência do fato expresso por  $p$  garante necessariamente a ocorrência do fato expresso por  $q$ .

## Exemplos

$p$  = Choveu.

$q$  = Está molhado.

Ler-se  $p \rightarrow q$ , como: “Se choveu, então está molhado.”



# Tabela-verdade para Condicional

- Se  $p$  e  $q$  são proposições, a expressão  $p \rightarrow q$  é chamada condicional de  $p$  e  $q$ ;
- A proposição  $p$  é chamada antecedente, e a proposição  $q$  consequente da condicional; e
- A operação de condicionamento indica que o acontecimento de  $p$  é uma condição para que  $q$  aconteça.

## Exemplos

$p$	$q$	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V



# Operador Bicondicional

A característica peculiar dessa operação consiste em que um bicondicional ( $p \leftrightarrow q$ ) assevera que os fatos expressos por  $p$  e  $q$  são interdependentes, isto é, ou os dois ocorrem juntos ou nenhum dos dois ocorrem.

## Exemplos

$p$  = Será aprovado.

$q$  = Estudar.

Ler-se  $p \leftrightarrow q$ , como: “Aprenderá, **se e somente se** estudar”.



# Tabela-verdade para Bicondicional

- Se  $p$  e  $q$  são proposições, a expressão  $p \leftrightarrow q$  é chamada bicondicional de  $p$  e  $q$ ; e
- A operação de bicondicionamento indica que  $p$  é uma condição para que  $q$  aconteça, e vice-versa.

## Exemplos

$p$	$q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V



A necessidade de usar parênteses na simbolização das proposições se deve ao fato de se evitar qualquer tipo de ambiguidade.

## Exemplos

$p$  = Estudar.

$q$  = Fazer a prova.

$r$  = Fazer o trabalho.

$s$  = Serei aprovado.

Ler-se  $((p \wedge q) \vee r) \rightarrow s$ , como:

“Se ((estudar e fazer a prova) ou fazer o trabalho), então será aprovado.”

