

Outlier & Pattern Analysis

Week 7 - Exploratory Data Analysis Lanjutan

Tujuan Analisis

Analisis outlier digunakan untuk menemukan nilai yang berbeda jauh dari pola umum data.

Metode

Metode Interquartile Range (IQR) digunakan dengan batas bawah $Q1 - 1.5 \times IQR$ dan batas atas $Q3 + 1.5 \times IQR$.

Hasil

Boxplot digunakan untuk melihat distribusi dan kemungkinan nilai ekstrem.


Scatter plot digunakan untuk melihat pola hubungan antara petal length dan petal width.

Korelasi antara petal length dan petal width adalah sekitar 0.963, yang menunjukkan hubungan linear yang sangat kuat.


Dampak Bisnis

Karena dataset Iris bukan dataset bisnis, dampak bisnis berikut bersifat hipotetis. Pada data bisnis nyata, outlier dapat memengaruhi rata-rata, laporan KPI, model analitik, dan keputusan bisnis.

Outlier tidak boleh langsung dihapus. Data perlu diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah merupakan kesalahan atau kondisi yang memang valid.



Distribusi Variabel Numerik Dataset Iris



Scatter Plot - Petal Length vs Petal Width

