

第三章 逼近与拟合

内容提要


3.1 基本概念

3.2 最佳平方逼近

3.3 曲线拟合的最小二乘法

3.1 基本概念

1、**函数逼近问题**：对于函数类 A 中给定的函数 $f(x)$ ，记作 $f(x) \in A$ ，要求在另一类简单的便于计算的函数类 C 中求函数 $p(x) \in C$ ，使 $p(x)$ 与 $f(x)$ 的误差在某种度量意义下达到最小。



2、范数与赋范线性空间

定义3-1 设 S 是实数域上的线性空间, $x \in S$, 如果存在唯一实数取值的函数 $\|\cdot\|$, 满足条件:

- (1) $\|x\| \geq 0$; 当且仅当 $x = 0$ 时, $\|x\| = 0$; (正定性)
- (2) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$, $\alpha \in \mathbf{R}$; (齐次性)
- (3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, $x, y \in S$; (三角不等式)

则称 $\|\cdot\|$ 为线性空间 S 上的**范数**, S 与 $\|\cdot\|$ 一起称为**赋范线性空间**, 记为 X .

例如，对 \mathbf{R}^n 上的向量 $x = (x_1, \cdots, x_n)^T$ ，有三种常用范数：

$$\|x\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|, \quad \text{称为 } \infty\text{-范数或最大范数},$$

∞ 最大

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \text{称为 } 1\text{-范数},$$

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \text{称为 } 2\text{-范数}.$$

类似地，对连续函数空间 $C[a, b]$ ，若 $f \in C[a, b]$ ，可定义三种常用范数：

$$\|f\|_{\infty} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)|, \quad \text{称为 } \infty\text{-范数},$$

∞ 最大

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(x)| dx, \quad \text{称为 } 1\text{-范数},$$

$$\|f\|_2 = \left(\int_a^b f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \text{称为 } 2\text{-范数}.$$

例如 计算函数 $f(x) = (x-1)^3$ 关于 $[0,1]$ 的 $\|f\|_\infty$ 、 $\|f\|_1$ 与 $\|f\|_2$

解 因 $f'(x) = 3(x-1)^2 > 0, x \in (0,1)$,

故 $f(x)$ 单调增加, 于是

$$\begin{aligned}\|f\|_\infty &= \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)| = \max_{0 \leq x \leq 1} |(x-1)^3| \\ &= \max_{0 \leq x \leq 1} \{|f(0)|, |f(1)|\} = 1\end{aligned}$$

$$\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx = \int_0^1 (1-x)^3 dx = \frac{1}{4}$$

$$\|f\|_2 = \left(\int_0^1 f^2(x) dx \right)^{\frac{1}{2}} = \left[\int_0^1 (1-x)^6 dx \right]^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{7}}$$

验算

3、内积与内积空间

定义3-2 设 X 是数域 K (\mathbb{R} 或 \mathbb{C}) 上的线性空间, 对 $\forall u, v \in X$, 有 K 中一个数与之对应, 记为 (u, v) , 并满足以下条件:

- (1) $(u, v) = \overline{(v, u)}, \forall u, v \in X$;
- (2) $(\alpha u, v) = \alpha(u, v), \forall \alpha \in K, \forall u, v \in X$;
- (3) $(u + v, w) = (u, w) + (v, w), \forall u, v, w \in X$;
- (4) $(u, u) \geq 0$; 当且仅当 $u = 0$ 时, $(u, u) = 0$.

则称 (u, v) 为 X 上的 u 与 v 的**内积**。定义了内积的线性空间称为**内积空间**, $\overline{(v, u)}$ 为 (u, v) 的共轭, 当 $K = \mathbb{R}$ 时 $(v, u) = (u, v)$ 。

例如线性代数中, \mathbb{R}^n 中两个向量 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 及

$y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ 的内积定义为

$$(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

例如 (1) 在 \mathbb{R}^n 上, $x, y \in \mathbb{R}^n$, $\rho_i > 0$ ($i=1, 2, \dots, n$) 为权系数, 可以定义带权内积与

相应的范数为

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n \rho_i x_i y_i \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n \rho_i x_i^2 \right)^{1/2}$$

(2) 在 $C[a, b]$ 上, $f(x), g(x) \in C[a, b]$, $\rho(x)$ 是 $[a, b]$ 上的权函数, 可以定义带权内积与相应的范数为

$$(f(x), g(x)) = \int_a^b \rho(x) f(x) g(x) dx \quad \|f(x)\|_2 = (f(x), f(x))^{1/2} = \left[\int_a^b \rho(x) f^2(x) dx \right]^{1/2}$$

定理3-1 设 X 为一个内积空间, $u_1, u_2, \dots, u_n \in X$, 矩阵

$$G = \begin{bmatrix} (u_1, u_1) & (u_2, u_1) & \cdots & (u_n, u_1) \\ (u_1, u_2) & (u_2, u_2) & \cdots & (u_n, u_2) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (u_1, u_n) & (u_2, u_n) & \cdots & (u_n, u_n) \end{bmatrix}$$

称为 Gram 矩阵, 则 G 非奇异的充要条件是 u_1, u_2, \dots, u_n 线性无关。

3.2 最佳平方逼近

1、最佳平方逼近

对 $f(x) \in C[a, b]$, 及 $C[a, b]$ 中的一个子集

$\phi = \text{span}\{\phi_0(x), \phi_1(x), \dots, \phi_n(x)\}$, 若存在 $S^*(x) \in \phi$ 使

$$\begin{aligned}\|f(x) - S^*(x)\|_2^2 &= \min_{S(x) \in \phi} \|f(x) - S(x)\|_2^2 \\ &= \min_{S(x) \in \phi} \int_a^b \rho(x) [f(x) - S(x)]^2 dx,\end{aligned}$$

则称 $S^*(x)$ 为 $f(x)$ 在子集 $\phi \subset C[a, b]$ 中的最佳平方逼近函数。

2、最佳平方逼近的计算

求解 $S^*(x)$ 问题 \Rightarrow 求多元函数 $I(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 最小值问题,

$$\text{其中 } I(a_0, a_1, \dots, a_n) = \int_a^b \rho(x) \left[\sum_{j=0}^n a_j \phi_j - f(x) \right]^2 dx$$

利用多元函数求极值的必要条件

$$\frac{\partial I}{\partial a_k} = 0 \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

得

$$\frac{\partial I(a_0, \dots, a_n)}{\partial a_k} = 2 \int_a^b \rho(x) \left[\sum_{j=0}^n a_j \phi_j(x) - f(x) \right] \phi_k(x) dx = 0$$

$$\Rightarrow 2 \left(\sum_{j=0}^n a_j \phi_j(x) - f(x), \phi_k(x) \right) = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{j=0}^n (a_j \phi_j(x), \phi_k(x)) - (f(x), \phi_k(x)) = 0$$

于是有

$$\sum_{j=0}^n (\phi_j(x), \phi_k(x)) a_j = (f(x), \phi_k(x)) \quad (k = 0, 1, \dots, n)$$

推导

$$\begin{bmatrix} (\phi_0, \phi_0) & (\phi_0, \phi_1) & \cdots & (\phi_0, \phi_n) \\ (\phi_1, \phi_0) & (\phi_1, \phi_1) & \cdots & (\phi_1, \phi_n) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (\phi_n, \phi_0) & (\phi_n, \phi_1) & \cdots & (\phi_n, \phi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \phi_0) \\ (f, \phi_1) \\ \vdots \\ (f, \phi_n) \end{bmatrix},$$

关于 a_0, a_1, \dots, a_n 的线性方程组, 称为**法方程**, 由于 $\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n$ 线性无关, 故系数 $\det G(\phi_0, \phi_1, \dots, \phi_n) \neq 0$, 方程组有唯一解。从而得到

$$S^*(x) = a_0^* \phi_0(x) + \cdots + a_n^* \phi_n(x)$$

进一步可以证明 $\int_a^b \rho(x)[f(x) - S^*(x)]^2 dx \leq \int_a^b \rho(x)[f(x) - S(x)]^2 dx, \forall S \in \phi$.

从而, $S^*(x)$ 是 $f(x)$ 在 ϕ 中的最佳平方逼近函数。

若令 $\delta(x) = f(x) - S^*(x)$, 则最佳平方逼近的误差为

$$\begin{aligned} \|\delta(x)\|_2^2 &= (f(x) - S^*(x), f(x) - S^*(x)) \\ &= (f(x), f(x)) - (S^*(x), f(x)) \\ &= \|f(x)\|_2^2 - \sum_{k=0}^n a_k^* (\phi_k(x), f(x)) \end{aligned}$$

由于 $S^*(x)$ 的系数 a_k^* 是线性方程组(3.3)的解, 故

$$\int_a^b \rho(x)[f(x) - S^*(x)]\phi_k(x) dx = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

见教材68页

例3-1 求 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $\left[\frac{1}{4}, 1\right]$ 上的在 $\phi = \text{span}\{1, x\}$ 中的关于 $\rho(x) = 1$ 的最佳平方逼近多项式，并求出平方逼近的误差。

解 已知 $\phi_0 = 1$, $\phi_1 = x$, 设所求 $S_1^*(x) = a_0 + a_1x$, 得法方程

$$\begin{bmatrix} (\phi_0, \phi_0) & (\phi_0, \phi_1) \\ (\phi_1, \phi_0) & (\phi_1, \phi_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \phi_0) \\ (f, \phi_1) \end{bmatrix},$$

$$(\phi_0, \phi_0) = \int_{\frac{1}{4}}^1 dx = \frac{3}{4}, \quad (\phi_1, \phi_1) = \int_{\frac{1}{4}}^1 x^2 dx = \frac{21}{64}$$

$$(\phi_1, \phi_0) = (\phi_0, \phi_1) = \int_{\frac{1}{4}}^1 x dx = \frac{15}{32}$$

$$(f, \phi_0) = \int_{\frac{1}{4}}^1 \sqrt{x} dx = \frac{7}{12}$$

$$(f, \phi_1) = \int_{\frac{1}{4}}^1 x\sqrt{x} dx = \frac{31}{80}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{15}{32} \\ \frac{15}{32} & \frac{21}{64} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{12} \\ \frac{31}{80} \end{bmatrix}, \Rightarrow \begin{cases} a_0 = \frac{10}{27}, \\ a_1 = \frac{88}{135}. \end{cases}$$

$$S_1^*(x) = \frac{10}{27} + \frac{88}{135}x.$$

最佳平方逼近的误差

$$\|\delta(x)\|_2^2 = \int_{\frac{1}{4}}^1 x \, dx - \left(\frac{10}{27} \times \frac{7}{12} + \frac{31}{80} \times \frac{88}{135} \right) = 0.0001082$$

例3-2 设 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$, 求 $[0,1]$ 上的一次最佳平方逼近多项式。
分析：本题可利用希尔伯特矩阵直接写出系数矩阵。详见教材 p68 关于希尔伯特矩阵的定义。

解: $(f, \phi_0) = \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+\sqrt{2}) + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1.147$

$$(f, \phi_1) = \int_0^1 x\sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{3} (1+x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2\sqrt{2}-1}{3} \approx 0.609$$

得线性方程组

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.147 \\ 0.609 \end{bmatrix}$$

解得 $a_0 = 0.934, \quad a_1 = 0.426$

故 $S_1^*(x) = 0.934 + 0.426x$

最佳平方逼近误差为

$$\|\delta(x)\|_2^2 = (f(x), f(x)) - (S_1^*(x), f(x))$$

$$= \int_0^1 (1+x^2) dx - (0.426(f, \phi_1) + 0.934(f, \phi_0)) = 0.0026$$

3.3 曲线拟合的最小二乘法

最小二乘法及其计算

测量数据的拟合是一个既古老, 但又非常实用的问题。
设已获得一组杂乱无章的实验数据

$$(x_i, y_i), i = 0, 1, 2, \dots, m \gg n$$

我们希望能从中找出规律来, 也就是构造一个近似函数 $s(x)$
去逼近所求函数 $y = f(x)$ 。

最小二乘问题一般提法: 对于给定的数据 (x_i, y_i)
($i = 0, 1, \dots, m$), 要求在给定函数类 $\phi = \text{span}\{\phi_0, \dots, \phi_n\}$ 中
找一函数

$$s^*(x) = \sum_{j=0}^n a_j^* \phi_j, \quad n < m,$$

使 $s^*(x)$ 满足

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{\delta}\|_2^2 &= \sum_{i=0}^m \delta_i^2 = \sum_{i=0}^m [s^*(x_i) - y_i]^2 \\ &= \min_{s(x) \in \phi} \sum_{i=0}^m [s(x_i) - y_i]^2.\end{aligned}$$

更一般提法, 使 $s^*(x)$ 满足

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{\delta}\|_2^2 &= \sum_{i=0}^m \delta_i^2 = \sum_{i=0}^m \rho(x_i) [s^*(x_i) - f(x_i)]^2 \\ &= \min_{s(x) \in \phi} \sum_{i=0}^m \rho(x_i) [s(x_i) - f(x_i)]^2\end{aligned}$$

其中 $\rho(x)$ 是 $[a, b]$ 上的权函数。

问题归结为求 $s^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k^* \phi_k(x)$, 即求系数 a_k^* , 使得

$$I(a_0, \dots, a_n) = \sum_{i=0}^m \rho(x_i) \left[\sum_{k=0}^n a_k \phi_k(x_i) - f(x_i) \right]^2$$

取得极小值.

由多元函数求极值的必要条件

$$\frac{\partial I}{\partial a_k} = 2 \sum_{i=0}^m \rho(x_i) \left[\sum_{j=0}^n a_j \phi_j(x_i) - f(x_i) \right] \phi_k(x_i) = 0$$
$$(k = 0, 1, \dots, n)$$

引进内积

$$(\phi_k, \phi_j) = \sum_{i=0}^m \rho(x_i) \phi_k(x_i) \phi_j(x_i)$$

$$(f, \phi_j) = \sum_{i=0}^m \rho(x_i) f(x_i) \phi_j(x_i)$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} (\phi_0, \phi_0) & (\phi_0, \phi_1) & \cdots & (\phi_0, \phi_n) \\ (\phi_1, \phi_0) & (\phi_1, \phi_1) & \cdots & (\phi_1, \phi_n) \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ (\phi_n, \phi_0) & (\phi_n, \phi_1) & \cdots & (\phi_n, \phi_n) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \phi_0) \\ (f, \phi_1) \\ \vdots \\ (f, \phi_n) \end{bmatrix}$$

称为法方程. 但是 $\phi_0(x), \dots, \phi_n(x)$ 在 $C[a, b]$ 上线性无关,
不能保证其系数矩阵非奇异.

例如, $\phi_0 = \sin x, \phi_1 = \sin 2x, x \in [0, 2\pi], x_k = k\pi, k = 0, 1, 2$.

$$G = \begin{bmatrix} (\phi_0, \phi_0) & (\phi_0, \phi_1) \\ (\phi_1, \phi_0) & (\phi_1, \phi_1) \end{bmatrix} = 0$$

定义3-3 设 $\phi_0(x), \dots, \phi_n(x) \in C[a, b]$ 的任意线性组合在点集 $\{x_i, i = 0, 1, \dots, m\} (m \geq n)$ 上至多只有 n 个不同的零点, 则称 $\phi_0(x), \dots, \phi_n(x)$ 在点集 $\{x_i, i = 0, 1, \dots, m\}$ 上满足**Haar条件**。

显然 $1, x, \dots, x^n$ 在任意 $m(m \geq n)$ 个点上满足Haar**条件**。

可证, 若 $\phi_0(x), \dots, \phi_n(x) \in C[a, b]$ 在 $\{x_i\}_0^m$ 上满足Haar**条件**, 则 $\det(G_n) \neq 0$.

可求出 a_j^* , 得到
$$s^*(x) = \sum_{j=0}^n a_j^* \phi_j.$$

进一步可以证明
$$\sum_{i=0}^m \rho(x_i) [s^*(x_i) - f(x_i)]^2 \leq \sum_{i=0}^m \rho(x_i) [s(x_i) - f(x_i)]^2, \quad \forall s \in \phi.$$

从而, $s^*(x)$ 是最小二乘解.


常用多项式拟合: $\phi = \text{span}\{\phi_0, \dots, \phi_n\} = \text{span}\{1, x, \dots, x^n\},$

$s^*(x) = \sum_{k=0}^n a_k^* x^k$. 法方程为

$$\begin{bmatrix} \sum \rho_i & \sum \rho_i x_i & \cdots & \sum \rho_i x_i^n \\ \sum \rho_i x_i & \sum \rho_i x_i^2 & \cdots & \sum \rho_i x_i^{n+1} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \sum \rho_i x_i^n & \sum \rho_i x_i^{n+1} & \cdots & \sum \rho_i x_i^{2n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum \rho_i y_i \\ \sum \rho_i x_i y_i \\ \vdots \\ \sum \rho_i x_i^n y_i \end{bmatrix}$$

例3-3 已知实测数据表如下, 求它的拟合曲线

x_i	1	2	3	4	5
y_i	4	4.5	6	8	8.5
p_i	2	1	3	1	1



解： 设 $s_1(x) = a_0 + a_1x$, $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x$, 故

$$(\varphi_0(x), \varphi_0(x)) = \sum_{i=0}^4 \rho_i = 8$$

$$(\varphi_0(x), \varphi_1(x)) = (\varphi_1(x), \varphi_0(x)) = \sum_{i=0}^4 \rho_i x_i = 22$$

$$(\varphi_1(x), \varphi_1(x)) = \sum_{i=0}^4 \rho_i x_i^2 = 74$$

$$(\varphi_0(x), f) = \sum_{i=0}^4 \rho_i f_i = 47, \quad (\varphi_1(x), f) = \sum_{i=0}^4 \rho_i x_i f_i = 145.5$$

法方程组为

$$\begin{bmatrix} 8 & 22 \\ 22 & 74 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47 \\ 145.5 \end{bmatrix},$$

解得 $a_0 = 2.5648$, $a_1 = 1.2037$

于是所求拟合曲线为 $s_1^*(x) = 2.5648 + 1.2037x$.

验算

例3-4 已知实测数据表如下，确定数学模型 $y=ae^{bx}$ ，
用最小二乘法确定 a ， b 。

i	0	1	2	3	4
x_i	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
y_i	5.10	5.79	6.53	7.45	8.46

分析：根据给定数据描图也可确定拟合曲线方程，但它不是线性形式。因此首先要将经验曲线**线性化**。本题可以采取等式两边取对数的形式线性化。数据表中的数值也相应的转化为取对数之后的数值，见下表。

解：曲线方程不是线性形式，两边取对数得

$$\ln y = \ln a + bx,$$

若令 $\underline{y} = \ln y$, $A = \ln a$, 则得 $\underline{y} = A + bx$, $\phi = \{1, x\}$.

i	0	1	2	3	4
x_i	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00
y_i	5.10	5.79	6.53	7.45	8.46
\underline{y}_i	1.629	1.756	1.876	2.008	2.135

根据最小二乘法, $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x$, $\rho(x) \equiv 1$,

$$(\varphi_0(x), \varphi_0(x)) = \sum_{i=0}^4 1 = 5$$

$$(\varphi_0(x), \varphi_1(x)) = (\varphi_1(x), \varphi_0(x)) = \sum_{i=0}^4 x_i = 7.5$$

$$(\varphi_1(x), \varphi_1(x)) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 = 11.875$$

$$(\varphi_0(x), \underline{y}) = \sum_{i=0}^4 \underline{y}_i = 9.404, \quad (\varphi_1(x), \underline{y}) = \sum_{i=0}^4 x_i \underline{y}_i = 14.422.$$

法方程组为

$$\begin{bmatrix} 5 & 7.50 \\ 7.50 & 11.875 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9.404 \\ 14.422 \end{bmatrix},$$

解得 $A = 1.122$, $b = 0.505$, $a = e^A = 3.071$,

于是最小二乘拟合曲线为

$$y = 3.071e^{0.505x}$$

例 3-5 已知实验数据如下表所示，用最小二乘法求形如 $y = a + bx^2$ 的经验公式，并计算拟合误差。

i	0	1	2	3	4
x_i	19	25	31	38	44
y_i	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

解： $\varphi_0(x) = 1$, $\varphi_1(x) = x^2$, $\rho(x) \equiv 1$,

$$(\varphi_0(x), \varphi_0(x)) = \sum_{i=0}^4 1 = 5, \quad (\varphi_0(x), \varphi_1(x)) = (\varphi_1(x), \varphi_0(x)) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 = 5327$$

$$(\varphi_1(x), \varphi_1(x)) = \sum_{i=0}^4 x_i^4 = 7277699$$

$$(\varphi_0(x), y) = \sum_{i=0}^4 y_i = 271.4, \quad (\varphi_1(x), y) = \sum_{i=0}^4 x_i^2 y_i = 369321.5$$

验算

法方程组为

$$\begin{bmatrix} 5 & 5327 \\ 5327 & 7277699 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 271.4 \\ 369321.5 \end{bmatrix},$$

得 $a = 0.972579$, $b = 0.050035$

于是最小二乘拟合曲线为

$$y = 0.972579 + 0.050035x^2$$

$$\text{误差 } \delta = \left(\sum_{i=0}^4 [y(x_i) - y_i]^2 \right)^{\frac{1}{2}} \approx 0.1226$$

例12 用最小二乘法求如下超定方程组的近似解.

$$3x-2y=1, \quad 2x+y=2, \quad x-4y=-1, \quad 3x+2y=-3$$

解 记 $r(x,y)=(3x-2y-1)^2+(2x+y-2)^2+(x-4y+1)^2+(3x+2y+3)^2$

$$\text{令 } \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial y} = 0$$

则有

$$\begin{cases} 6(3x-2y-1)+4(2x+y-2)+2(x-4y+1)+6(3x+2y+3)=0 \\ -4(3x-2y-1)+2(2x+y-2)-8(x-4y+1)+4(3x+2y+3)=0 \end{cases}$$

即

有无更简单解法?

$$\begin{cases} 23x-2y=-3 \\ -2x+25y=-2 \end{cases}$$

解得 $x=-0.138354, y=-0.091068$

知识结构图

函数逼近理论

预备知识

范数（定义、常用范数）

内积（定义、柯西-施瓦茨不等式、内积诱导范数）

正交多项式（性质、正交化方法、常用正交多项式的定义和性质）

函数逼近与曲线拟合

最佳一致逼近多项式

定义

存在唯一性定理

切比雪夫定理

最佳一致一次逼近多项式

最佳平方逼近

定义

法方程组和逼近误差

基于正交基的最佳平方逼近

最小二乘拟合

离散内积定义

法方程组及哈尔条件

基于正交基的最小二乘拟合

复习与思考题(无需提交)

P92: 1, 2, 4, 5

习题(需提交)

P95: 16, 17

A3.2 正交多项式

定理A3 若 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_n(x)$ 为 $C[a, b]$ 上的一组线性无关函数, 则可得到 $C[a, b]$ 上一组两两正交的函数组 $g_0(x), g_1(x), \dots, g_n(x)$ 满足

- (1) $g_k(x)$ 为 $f_0(x), f_1(x), \dots, f_k(x)$ 的线性组合;
- (2) $f_k(x)$ 为 $g_0(x), g_1(x), \dots, g_k(x)$ 的线性组合.

证 只要按**Schmidt正交化过程**构造

$$g_0(x) = f_0(x),$$

$$g_1(x) = f_1(x) - \frac{(f_1, g_0)}{(g_0, g_0)} g_0(x),$$

$$\vdots$$

$$g_n(x) = f_n(x) - \sum_{i=0}^{n-1} \frac{(f_n, g_i)}{(g_i, g_i)} g_i(x).$$

$g_0(x), g_1(x), \dots, g_n(x)$ 两两正交且满足(1), (2). 再令

$$e_k(x) = \frac{1}{\|g_k\|_2} g_k(x), k = 0, 1, \dots, n$$

称函数组 $e_0(x), e_1(x), \dots, e_n(x)$ 为**规范正交组**.

P_n 上由线性无关函数 $1, x, x^2, \dots, x^n$ 经过Schemite正交化过程得到的多项式 $p_0(x), p_1(x), \dots, p_n(x)$ 称为 $[a, b]$ 上的**正交多项式**.

例9 求区间 $[-1, 1]$ 上, 权函数 $\rho(x)=1$ 的正交多项式.

解 按Schemite正交化过程有

$$p_0(x) = 1,$$

$$p_1(x) = x - \frac{(x, 1)}{(1, 1)} \times 1 = x - \frac{\int_{-1}^1 x dx}{\int_{-1}^1 dx} = x$$

$$p_2(x) = x^2 - \frac{(x^2, 1)}{(1, 1)} \times 1 - \frac{(x^2, x)}{(x, x)} x$$

$$= x^2 - \frac{\int_{-1}^1 x^2 dx}{\int_{-1}^1 dx} - \frac{\int_{-1}^1 x^3 dx}{\int_{-1}^1 x^2 dx} x = x^2 - \frac{1}{3}$$

$$p_3(x) = x^3 - \frac{(x^3, 1)}{(1, 1)} \times 1 - \frac{(x^3, x)}{(x, x)} x - \frac{(x^3, x^2 - \frac{1}{3})}{(x^2 - \frac{1}{3}, x^2 - \frac{1}{3})} (x^2 - \frac{1}{3})$$

$$= x^3 - \frac{\int_{-1}^1 x^3 dx}{\int_{-1}^1 dx} - \frac{\int_{-1}^1 x^4 dx}{\int_{-1}^1 x^2 dx} x - \frac{\int_{-1}^1 x^5 - \frac{1}{3} x^3 dx}{\int_{-1}^1 (x^2 - \frac{1}{3})^2 dx} (x^2 - \frac{1}{3})^2$$

$$= x^3 - \frac{3}{5} x$$

⋮

推算

若 $p_0(x), p_1(x), \dots, p_n(x)$ 是 $[a, b]$ 上权函数为 $\rho(x)$ 的正交多项式, 则有下列性质:

- (1) $p_k(x)$ 是首项系数不为零的 k 次多项式;
- (2) $p_0(x), p_1(x), \dots, p_n(x)$ 构成 P_n 上的一组正交基;
- (3) $p_n(x)$ 与任一不高于 $n-1$ 次的多项式正交, $p_n(x) \perp P_{n-1}$
- (4) 方程 $p_n(x)=0$ 在 $[a, b]$ 上有 n 个单根;

下面介绍四组常用的正交多项式(见教材59页):

1. Legendre多项式(见教材61页)

2. Chebyshev多项式

3. Laguerre多项式

4. Hermite多项式

重要知识 (数值积分需用)