

Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Agrarias

Caracterización morfológica, fisiológica y molecular de entradas de algodón (*Gossypium*
hirsutum L.) e identificación de QTL de importancia agronómica

Ing. Agr. Pablo Nahuel Dileo

Doctorado en Recursos Naturales

Año 2025

Aprobado por Director y Co-Director de Tesis

Director

Dr. Gustavo Rubén Rodríguez

Co-Director

Dr. Marcelo Javier Paytas

Agradecimientos

Agradecimientos aquí..

Dedicatoria

Dedicatoria aquí..

Publicaciones

Lista de publicaciones a congresos y revistas aquí..

Índice General

Introducción	1
Capítulo 1: Caracterización morfológica	4
1.1. Introducción	4
1.2. Objetivo	4
1.3. Materiales y métodos	4
1.3.1. Variables medidas:	5
1.3.2. Análisis estadístico	7
1.4. Resultados	8
1.4.1. Fenología	8
1.4.2. Mapeo y descriptores morfológicos	8
1.4.3. Componentes del rendimiento y calidad de fibra	8
1.5. Discusión	15
1.6. Conclusión	15
Capítulo 2: Caracterización fisiológica	16
2.1. Introducción	16

2.2. Objetivo	16
2.3. Materiales y métodos	16
2.4. Resultados	17
2.5. Discusión	17
2.6. Conclusión	17
Capítulo 3: Caracterización molecular	18
3.1. Introducción	18
3.2. Objetivo	18
3.3. Materiales y métodos	18
3.3.1. Análisis estadístico	21
3.4. Resultados	23
3.4.1. Generation of variability from the biparental cross BGSP-00166 x SP-41255	23
3.5. Discusión	24
3.6. Conclusión	24
Conclusión	25
Apéndice A: Primer Apéndice	26
Apéndice B: Segundo Apéndice	27
Referencias	28

Lista de Abreviaturas

IF	Índice de fibra
IS	Índice de semillas
IU	Índice de uniformidad de fibras
Mic	Micronaire
NC	Número de capullos
NSC	Numero de semillas por capullo
PC	Peso promedio de capullos
RB	Rendimiento de algodón bruto
RF	Rendimiento de fibra
RFD	Rendimiento de fibra al desmote
Str	Resistencia de las fibras
UHML	Longitud de las fibras
zContinua...	Otras abreviaturas

Resumen

Primer párrafo del resumen en español.

Segundo párrafo del resumen aquí.

Abstract

Primer párrafo del resumen en inglés.

Segundo párrafo del resumen aquí.

Índice de Tablas

1.1. Entradas de <i>Gossypium hirsutum</i> L. y su procedencia	5
1.2. Fenología de las entradas evaluadas	9
1.3. Valores medios, error estándar (entre paréntesis) y prueba L.S.D. (diferencia mínima significativa) de Fisher para rendimiento y sus componentes	10
1.4. Valores medios, error estándar (entre paréntesis) y prueba L.S.D.(diferencia mínima significativa) de Fisher para rendimiento y sus componentes.	11
1.5. Correlación de Pearson entre los rasgos evaluados en el germoplasma de colección	14
3.1. Mean and variance (in parentheses) of the traits in the non-segregating generations (BGSP-00166, SP-41255 and F1) and the segregating generation F2	24

Índice de Figuras

1.1.	Biplot del análisis de componentes principales con puntos que representan las proyecciones de las accesiones (1) y las variables (2) en el espacio definido por las dos primeras dimensiones (Dim) o componentes principales. RB: Rendimiento de algodón bruto en g, RF: Rendimiento de fibra en g, RFD: Rendimiento de fibra al desmote en %, PC: Peso promedio de capullos en g, NC: Número de capullos por planta, IS: Índice de semilla en g, IF: Índice de fibra g, NSC: Número de semilla por capullo, UHML: Longitud de la fibra en mm, Str: Resistencia de la fibra en g tex^{-1} , MIC: Micronaire, FU: Fibre uniformity in %.	13
3.1.	Description of the field trial, showing the two populations generated from the cross in the direction SP-41255 x BGSP-00166 and its reciprocal. Within the trial, plants from the parent SP-41255 (1), Filial 1 (2), and parent BGSP-00166 (3) were randomly distributed.	21
3.2.	Plant of the parental genotypes SP-41255 and BGSP-00166	23

Introducción

El algodón (*Gossypium hirsutum* L.) se cultiva en más de 80 países y desempeña un papel crucial en la producción textil como fuente de fibra. Argentina es el segundo productor de algodón de América Latina después de Brasil y desempeña un papel clave en los sistemas productivos de la región noreste del país. La producción de fibra cubre la demanda interna a la vez que facilita la exportación a países como Vietnam, Pakistán, Turquía, China, Indonesia, Colombia e India (ICAC, 2023; Paytas & Ploschuk, 2013). Se han desarrollado nuevas variedades y sistemas de producción para adaptarse a diversas condiciones medioambientales. En Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) cuenta con un programa de mejora genética del algodón que utiliza el germoplasma disponible para desarrollar variedades que mejoren el rendimiento y la calidad de la fibra. El programa ha logrado aumentar tanto el rendimiento como la calidad de la fibra y también ha incorporado la resistencia genética a enfermedades importantes como mancha angular, enfermedad azul y marchitez por fusarium, en numerosas variedades (Royo et al., 2007; Scarpin et al., 2022; Scarpin et al., 2023).

Recientemente, Scarpin et al. (2022) informaron de un progreso genético en el rendimiento de fibra, el porcentaje de desmote, el rendimiento de algodón bruto y el número de cápsulas (NC), mostrando una tasa media de crecimiento anual de 3,24 kg ha⁻¹, 0,05 %, 4,86 kg ha⁻¹ y 0,12 NC, respectivamente. Como resultado, las variedades más recientemente tienen un mayor rendimiento de fibra, porcentaje de desmote, rendimiento de algodón bruto y número de cápsulas que las variedades más antiguas. Estos resultados

indican que el programa de mejoramiento genético del algodón en Argentina han logrado un progreso genético sustancial para el rendimiento de fibra y sus componentes. Además, Scarpin et al. (2023) enfatizaron que este progreso no resultó en una disminución de la calidad del algodón. Sin embargo, se necesita más investigación para mejorar el rendimiento de fibra, la calidad de la fibra y la adaptabilidad a diferentes ambientes. En la provincia de Santa Fe (Argentina), el cultivo de algodón se concentra en los departamentos de 9 de Julio, Vera y General Obligado, cada uno de los cuales presenta disparidades distintivas en cuanto a la composición del suelo y las condiciones ambientales. El tipo de clima en el norte de la provincia es subtropical según la clasificación climática de Köppen, con una estación seca en la región noroeste y sin estación seca en la región noreste de la provincia (ANIDA, 2024). Debido a estas diferencias, es esencial desarrollar genotipos para estas diferentes condiciones para avanzar en la mejora de los cultivos. Además, se necesitan esfuerzos adicionales para identificar genes o QTLs asociados con rasgos agronómicos y de calidad de fibra en variedades de algodón en Argentina a través de métodos de mapeo genético.

En un programa de mejora genética del algodón, combinar un alto rendimiento y calidad de la fibra es un reto clave. El primer paso crucial para un programa de mejora eficaz es caracterizar el germoplasma del algodón. Kearsey y Pooni (1996) destacaron la importancia de comprender las diferencias genéticas y la heredabilidad de los rasgos a la hora de cruzar plantas. La heredabilidad muestra en qué medida los rasgos están influidos por la genética y puede estimarse comparando las varianzas de las generaciones segregantes y no segregantes. En el algodón, se han notificado estimaciones de heredabilidad para varios rasgos, como el rendimiento de fibra, los componentes del rendimiento, la calidad de la fibra, la altura de la planta, el aceite de semilla, el nudo de la primera rama reproductiva, la cápsulas a prueba de tormentas, entre otros (De Carvalho et al., 2022; Meredith, 1984; Nidagundi et al., 2023; Ribeiro et al., 2017; Tang et al., 1996). Estos estimadores ayudan a los mejoradores a decidir la selección individual y a predecir cuánto

pueden mejorar ciertos rasgos. Sin embargo, merece la pena tener en cuenta que el nivel de heredabilidad cambia en función del rasgo, la población y el ambiente en el que se cultivan.

Capítulo 1

Caracterización morfológica

1.1. Introducción

Aquí una breve introducción del capítulo

1.2. Objetivo

Caracterizar entradas de algodón del banco de germoplasma de INTA con diferente procedencia mediante caracteres morfológicos relacionados al rendimiento.

1.3. Materiales y métodos

Los ensayos se llevaron adelante en invernadero con condiciones semi-controladas de la Estación Experimental INTA Reconquista. Se utilizaron 26 entradas de *Gossypium hirsutum* L., coleccionados por el banco de germoplasma de INTA, procedentes de diversos sitios tanto nacionales como del extranjero (Tabla 1.1).

Tabla 1.1: Entradas de *Gossypium hirsutum* L. y su procedencia

Entradas	Procedencia
BGSP-00177	Argentina
BGSP-00192	Argentina
BGSP-00193	Argentina
BGSP-00194	Argentina
BGSP-00166	Argentina
BGSP-00207	Argentina
BGSP-00269	Argentina
SP 41255	Argentina-Línea avanzada
SP 6565	Argentina-Línea avanzada
BGSP-00514	Australia
BGSP-00072	Camerún
BGSP-00088	Camerún
BGSP-00070	Chad
BGSP-00748	China
BGSP-00752	China
BGSP-00755	China
BGSP-00759	China
BGSP-00779	China
BGSP-00067	Costa de Marfil
BGSP-00028	EEUU
BGSP-00145	EEUU
BGSP-00428	EEUU
BGSP-00159	EEUU
BGSP-00425	EEUU
BGSP-00715	Pakistán
BGSP-00126	Senegal
aquí footnote	

1.3.1. Variables medidas:

Las variables que se mencionan a continuación fueron registradas en todas las plantas (Kerby et al., 2010): i) Precocidad: se determinó tomando el porcentaje de cápsulas abiertas a 100 días después de la emergencia (DDE); ii) Altura: se midieron las plantas

desde la base del tallo hasta la punta del ápice; iii) N° de nudos: se contó el número de nudos presentes en el tallo de cada planta muestreada; iv) N° de ramas vegetativas: se contaron las ramas vegetativas presentes en cada momento de muestreo; v) N° de ramas reproductivas: se contaron el número de ramas reproductivas presentes en todas las plantas de cada momento de muestreo; vi) Nudo de inserción de la primera rama reproductiva: se registró el nudo donde se inserta la 1ª rama reproductiva en cada planta muestreada; vii) Distancia de la primera posición al tallo principal: se midió la distancia que existe entre el tallo principal y la primera posición de la primera rama reproductiva de cada una de las plantas; viii) Área foliar: para el cálculo de esta variable, se midieron todas las hojas de las plantas a través de los equipos LICOR 3000 y LICOR 3050; ix) Dinámica de la floración: junto con las mediciones de las características morfológicas mencionadas en los puntos anteriores, se realizaron mapeos de dinámica de floración en todas las plantas seleccionadas para la partición de asimilados. Este procedimiento se realiza registrando en cada una de las posiciones reproductivas que genera la planta, la presencia de un pimpollo, una flor, una bocha verde, una cápsula abierta o un aborto (Kerby & Hake, 1996). Con estos datos se realizó la dinámica de floración de las diferentes variedades y porcentaje de retención final a la que llegan cada una de las plantas seleccionadas para el mapeo; x) Rendimiento: Para calcular el rendimiento de las diferentes entradas y sus componentes se efectuaron las siguientes mediciones: a) Rendimiento bruto de algodón: se recolectó la fibra-semilla de algodón de todas las cápsulas presentes en las plantas. Las muestras obtenidas fueron pesadas en balanzas de precisión y se realizó medición de la humedad de cada una de ellas; b) % de desmote: se tomó cada muestra de algodón proveniente de las mediciones de rendimiento bruto, se realizó el desmote en una mini-desmotadora experimental y se pesó en una balanza de precisión la fibra y semillas por separado. El porcentaje de desmote fue la relación entre el peso de la fibra sobre el peso de la fibra más la semilla; c) Rendimiento de fibra: se multiplicó el rendimiento bruto de algodón por el % de desmote obtenido; d) N° de cápsulas por plan-

ta: se determinará dividiendo el peso total de la muestra recolectada en cada parcela con el peso por cápsula (Wells & Meredith, 1984); e) N° semillas / cápsula: se contó el número de semillas presentes en la muestra (Worley et al., 1974); f) Fibra/semilla: este valor surge al dividir el peso de la fibra de algodón que resulta luego de desmotar los capullos por el número de semillas que tiene la muestra; g) Índice de semillas: se obtuvo al pesar 100 semillas de cada una de las muestras de las variedades de algodón (Pettigrew et al., 2013); x) Parámetros de calidad tecnológica de fibra de algodón. Para obtener estos parámetros se enviaron las muestras de fibra de algodón obtenidas al laboratorio de HVI (Uster 1000) en Reconquista, Santa Fe. Los parámetros de calidad tecnológica de fibra a evaluar fueron: Índice de Hilabilidad (SCI, por sus siglas en inglés), Micronaire (MIC), Índice de madurez (MAC), longitud promedio de la mitad superior (UHML, por sus siglas en inglés), longitud media (ML, por sus siglas en inglés), % de uniformidad, índice de fibras cortas (SFI, por sus siglas en inglés), resistencia de fibra (Str), elongación (Elg), contenido de humedad de la muestra, color (Rd y +b), grado de color (C.G) y contenido de basura; xi) Fenología. Se registró el tiempo en días necesario para que las plantas alcancen los estados de: emergencia, 1º pimpollo, 1º flor abierta, cut out y 1º bocha abierta. El estado de cut out se determinará cuando el número de nudos por encima de la última flor blanca en el tallo sea menor que 4 (Bourland et al., 1992).

El ensayo se realizó en un diseño en bloque completamente aleatorizado, utilizando macetas de 5 litros (con una mezcla de suelo y sustrato comercial) en el cual se colocó 1 planta por maceta. Se utilizaron las entradas detalladas en las tablas N° 1.1. **Detallar el número de repeticiones**

1.3.2. Análisis estadístico

Para la caracterización de la colección de germoplasma de algodón, se realizaron análisis de varianza (ANOVA) y análisis de correlación de Pearson de todos los rasgos medidos utilizando el software R (R Core Team 2024). La distribución normal de cada rasgo se

confirmó mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Las diferencias estadísticas se evaluaron con un nivel de confianza del 95 % ($p \leq 0,05$) según la prueba L.S.D de Fisher, considerando las entradas como efecto fijo, mientras que el experimento y los bloques dentro de cada experimento como efectos aleatorios. A continuación, se realizó un estudio completo de la diversidad genética disponible en ese conjunto de entradas mediante el análisis de componentes principales.

1.4. Resultados

1.4.1. Fenología

La fenología se muestra en la tabla 1.2

1.4.2. Mapeo y descriptores morfológicos

Puede incluirse resultados morfológicos de las entradas...

1.4.3. Componentes del rendimiento y calidad de fibra

Las entradas de algodón mostraron diferencias significativas en todos los rasgos relacionados con el rendimiento y la calidad de la fibra ($p < 0.05$, Tabla 1.4).

La entrada SP-41255 presentó los valores medios más elevados para RB, RF, RFD y NC, con valores de 34.2 g planta⁻¹, 15.8 g planta⁻¹, 45.8 %, y 9.2 capullos planta⁻¹ respectivamente, sin embargo, presentó el valor medio más bajo de IS, con 7.7 g. BGSP-00159 tuvo la media más baja de RB con 26,2 g planta⁻¹. BGSP-00166 tuvo los valores medios más bajos para RF, RFD, MIC y NC con valores de 8.6 g planta⁻¹, 31.1 %, 3.2 y 5.8 capullos planta⁻¹ respectivamente, no obstante, presentó los valores medios más elevados de PC, IS, UHML, Str y IU con valores de 4.6 g capullo⁻¹, 11.5 g, 33.2 mm, 37.3 g tex⁻¹ y 85.8 % respectivamente. BGSP-00269 presentó los valores medios más bajos de PC, NSC

Tabla 1.2: Fenología de las entradas evaluadas

Entrada	Procedencia	DPP	DPF	DCO	DPCA	DFC
BGSP-00159	USA	22	49	74	114	161
BGSP-00428	USA	23	49	74	113	163
BGSP-00028	USA	25	51	74	118	163
BGSP-00207	Argentina	23	52	79	135	164
BGSP-00269	Argentina	23	52	75	133	163
SP 41255	Argentina-Línea avanzada	23	52	76	124	162
BGSP-00166	Argentina	23	52	74	124	163
BGSP-00145	USA	25	52	73	121	163
BGSP-00514	Australia	23	52	76	117	161
BGSP-00748	China	23	52	74	135	NA
BGSP-00425	USA	25	53	73	130	163
BGSP-00177	Argentina	26	53	75	127	164
BGSP-00070	Chad	27	53	76	128	163
BGSP-00755	China	25	53	75	124	163
BGSP-00126	Senegal	25	54	79	132	163
BGSP-00067	Costa de Marfil	25	54	74	128	163
BGSP-00192	Argentina	25	54	76	124	162
BGSP-00759	China	25	54	77	134	163
BGSP-00072	Camerún	25	54	80	130	162
BGSP-00088	Camerún	25	54	78	135	163
SP 6565	Argentina-Línea avanzada	25	55	79	131	162
BGSP-00715	Pakistán	24	55	78	134	163
BGSP-00752	China	25	55	79	135	162
BGSP-00194	Argentina	25	55	75	118	163
BGSP-00193	Argentina	25	55	78	137	162
BGSP-00779	China	25	55	76	126	161

DPP: Días a primer pimpollo, DPF: Días a primera flor, DCO: Días a Cut Out, DPCA: Días a primer cápsula abierta, DFC: días a fin de ciclo

y UHML, con valores de 3.4 g capullo⁻¹, 22.8 semilla capullo⁻¹, y 28.3 mm respectivamente, mientras que tuvo el valor medio más alto para IF y Mic con valores de 6.5 g y 4.3. BGSP-00425 tuvo la NSC media mas alta, con un 30.6 semillas cápsula⁻¹ mientras que los valores medios más bajos para IF y IU con valores de 4.0 g y 82.2 %, respectivamente.

Tabla 1.3: Valores medios, error estándar (entre paréntesis) y prueba L.S.D. (diferencia mínima significativa) de Fisher para rendimiento y sus componentes

Entradas	Caracteres				
	RB	RF	RFD	PC	NC
BGSP-00028	24.1 (2.0)	8.7 (0.6)	36.5 (0.7)	4.3 (0.3)	5.7 (0.3)
BGSP-00067	23.3 (3.3)	8.2 (1.0)	36.0 (1.9)	2.8 (0.2)	8.3 (1.2)
BGSP-00070	19.9 (1.3)	7.7 (0.8)	39.6 (0.8)	3.4 (0.3)	6.0 (0.6)
BGSP-00072	26.3 (2.2)	9.8 (0.9)	38.3 (0.6)	3.5 (0.4)	7.7 (0.3)
BGSP-00088	31.0 (3.2)	11.3 (1.1)	37.1 (0.4)	4.4 (0.2)	7.0 (0.6)
BGSP-00126	16.0 (0.6)	6.6 (0.3)	42.9 (0.3)	2.7 (0.2)	6.0 (0.3)
BGSP-00145	16.1 (3.1)	6.1 (1.1)	38.6 (0.7)	3.6 (0.6)	4.7 (0.9)
BGSP-00159	14.3 (0.6)	5.1 (0.2)	36.8 (0.6)	2.7 (0.1)	5.2 (0.2)
BGSP-00166	18.2 (0.5)	5.5 (0.2)	31.1 (0.4)	3.6 (0.1)	5.1 (0.2)
BGSP-00177	24.5 (2.2)	7.9 (0.8)	33.0 (0.4)	4.2 (0.8)	6.0 (0.6)
BGSP-00192	18.7 (3.3)	7.1 (1.1)	37.9 (2.0)	3.3 (0.4)	5.7 (0.3)
BGSP-00193	29.4 (3.9)	10.9 (1.4)	38.1 (1.8)	4.2 (0.6)	7.0 (0.0)
BGSP-00194	24.0 (3.1)	9.6 (1.4)	40.9 (0.8)	3.7 (0.4)	6.7 (0.9)
BGSP-00207	16.2 (0.6)	6.7 (0.2)	43.6 (0.5)	2.8 (0.1)	5.8 (0.2)
BGSP-00269	16.9 (0.5)	7.1 (0.3)	43.7 (0.5)	2.9 (0.2)	6.1 (0.3)
BGSP-00425	15.1 (0.5)	4.6 (0.2)	31.5 (0.3)	2.6 (0.1)	5.8 (0.3)
BGSP-00428	21.4 (3.6)	8.7 (1.4)	40.1 (0.4)	4.3 (0.7)	5.0 (0.6)
BGSP-00514	28.0 (2.8)	11.7 (1.2)	42.3 (0.4)	4.2 (0.2)	6.7 (0.9)
BGSP-00715	24.0 (3.6)	9.8 (1.2)	41.6 (1.2)	3.4 (0.4)	7.0 (0.6)
BGSP-00748	33.5 (1.8)	12.3 (1.0)	39.0 (2.4)	4.4 (0.1)	7.7 (0.3)
BGSP-00752	27.2 (2.1)	11.3 (1.2)	42.1 (1.9)	4.1 (0.1)	6.7 (0.3)
BGSP-00755	26.3 (2.0)	10.0 (0.7)	38.5 (0.8)	4.7 (0.2)	5.7 (0.7)
BGSP-00759	24.6 (3.6)	8.7 (1.5)	38.3 (1.1)	4.7 (0.6)	5.7 (1.5)
BGSP-00779	26.3 (1.5)	10.4 (0.5)	40.5 (0.7)	3.0 (0.1)	8.7 (0.3)
SP 41255	20.7 (0.7)	8.8 (0.4)	44.7 (0.5)	2.8 (0.1)	7.3 (0.3)
SP 6565	17.3 (0.5)	6.9 (0.2)	41.2 (0.3)	2.6 (0.1)	6.8 (0.3)
p-value	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Fisher's L.S.D	4.3	1.76	2.46	0.76	1.42

Referencias: RB, Rendimiento bruto en g; RF, Rendimiento de fibra en g; RFD, Rendimiento de fibra al desmote en %; PC, Peso promedio de capullos g; NC, Numero de capullos por planta.

BGSP-00207 presentó los valores medios más bajos de UHML y Str con valores de 28.3 mm y 29.2 g tex⁻¹ respectivamente. En particular, las accesiones BGSP-00166 y SP-41255 fueron significativamente diferentes para casi todos los caracteres estudiados excepto

Tabla 1.4: Valores medios, error estándar (entre paréntesis) y prueba L.S.D.(diferencia mínima significativa) de Fisher para rendimiento y sus compo-nentes.

Entradas	Caracteres											
	RB	RF	RFD	PC	NC	IS	IF	NSC	UHML	Str	Mic	IU
BGSP-00126	30.5 (6.6)	13.2 (2.9)	43.1 (0.4)	3.6 (0.4)	8.0 (1.0)	8.7 (0.3)	6.2 (0.3)	25.0 (1.6)	29.8 (0.3)	30.4 (1.3)	3.5 (0.4)	83.8 (1.0)
BGSP-00159	26.2 (5.4)	9.5 (1.9)	36.3 (0.8)	4.1 (0.5)	6.2 (0.6)	10.3 (1.0)	5.6 (0.7)	26.8 (0.7)	28.4 (0.9)	33.2 (2.1)	3.7 (0.5)	82.7 (0.5)
BGSP-00166	27.5 (4.3)	8.6 (1.4)	31.2 (0.3)	4.6 (0.4)	5.8 (0.5)	11.5 (0.5)	5.0 (0.4)	28.9 (0.8)	33.2 (0.5)	37.3 (2.0)	3.2 (0.3)	85.8 (0.6)
BGSP-00207	30.2 (6.3)	13.1 (2.7)	43.5 (0.4)	3.6 (0.4)	8.0 (1.0)	8.3 (0.2)	6.2 (0.3)	25.2 (2.0)	28.3 (0.4)	29.2 (0.7)	3.4 (0.3)	83.5 (0.4)
BGSP-00269	29.8 (5.8)	12.9 (2.5)	43.4 (0.4)	3.4 (0.2)	8.6 (1.1)	8.8 (0.4)	6.5 (0.2)	22.8 (1.9)	28.3 (0.5)	31.6 (1.2)	4.3 (0.2)	83.7 (0.3)
BGSP-00425	31.5 (7.4)	11.3 (2.9)	34.2 (1.2)	3.6 (0.4)	8.3 (1.1)	7.9 (0.4)	4.0 (0.6)	30.6 (0.9)	30.4 (1.0)	31.3 (1.6)	3.4 (0.5)	82.2 (0.2)
SP-41255	34.2 (6.1)	15.8 (3.0)	45.8 (0.6)	3.7 (0.5)	9.2 (1.0)	7.7 (0.1)	6.2 (0.3)	26.8 (2.8)	29.8 (0.7)	32.2 (1.2)	3.8 (0.3)	83.6 (0.7)
SP-6565	30.1 (5.8)	12.5 (2.4)	41.4 (1.0)	3.7 (0.6)	8.2 (0.7)	8.9 (0.4)	5.9 (0.2)	25.5 (3.0)	30.1 (0.5)	32.5 (0.9)	3.7 (0.3)	84.9 (0.6)
p-value	0.005	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.014	<0.001	0.017	<0.001	0.003
Fisher's L.S.D	3.68	1.91	1.99	0.57	1.19	1.35	0.75	4.04	1.38	4.03	0.43	1.66

RB: Seed cotton yield in g, LY: Lint yield in g, LP: Lint percentage in %, BW: Boll weight in g, BN: Boll number per plant, SI: Seed index in g, LI: Lint index in g, SNPB: Seed number per boll, FL: Fibre length in mm, FS: Fibre strength g tex⁻¹, Mic: Micronaire, FU: Fibre uniformity in %.

para NSC ($p < 0,01$).

Estos resultados indican que existe variación fenotípica entre las accesiones de algodón tanto en términos de rendimiento como de calidad de la fibra.

El primer componente principal explicó el 45,61 % de la varianza de los datos, mientras que el segundo componente principal explicó el 21,97 % (Figura 1.1). Los rasgos más asociados con el primer componente fueron RB, Mic, RF, IF y NC, mientras que UHML, Str, IU, IS, NSC, PC y RFD fueron los más asociados con el segundo componente. Las entradas situadas en el cuadrante superior izquierdo fueron BGSP-00166, BGSP-00159 y BGSP-00425, estando estas entradas asociadas con valores más altos de calidad de fibra (UHML, Str, IU) y tamaño de semilla (IS) y valores más bajos en caracteres relacionados con el rendimiento como RB, RF, IF, NC, RFD. Las entradas situadas en el cuadrante in-

ferior derecho como SP-41255, BGSP-00269, BGSP-00207 y BGSP-00126, mostraron un comportamiento opuesto a las descritas.




Figura 1.1: Biplot del análisis de componentes principales con puntos que representan las proyecciones de las accesiones (1) y las variables (2) en el espacio definido por las dos primeras dimensiones (Dim) o componentes principales. RB: Rendimiento de algodón bruto en g, RF: Rendimiento de fibra en g, RFD: Rendimiento de fibra al desmote en %, PC: Peso promedio de capullos en g, NC: Número de capullos por planta, IS: Índice de semilla en g, IF: Índice de fibra g, NSC: Número de semilla por capullo, UHML: Longitud de la fibra en mm, Str: Resistencia de la fibra en g tex^{-1} , MIC: Micronaire, FU: Fibre uniformity in %.

En particular, las entradas BGSP-00166 y SP-41255 presentaron más contraste en cuanto a los rasgos medidos. Estas accesiones mostraron valores diferentes para la mayoría de los rasgos medidos relacionados tanto con el rendimiento como con la calidad de la fibra. Por lo tanto, seleccionamos estas accesiones para realizar un cruce biparental y generar una población segregante para estimar los parámetros genéticos y, a continuación, seleccionar fenotipos prometedores para el rendimiento y los rasgos relacionados con la calidad.

Tabla 1.5: Correlación de Pearson entre los rasgos evaluados en el germoplasma de colección

	RB	RF	RFD	PC	NC	IS	IF	NSC	UHML	Str	Mic
RF	.97***	-									
RFD	.18	.41**	-								
PC	.78***	.66***	-.21	-							
NC	.86***	.91***	.44**	.37**	-						
IS	.09	-.09	-.51***	.54***	-.27	-					
IF	.55***	.63***	.62***	.47***	.47***	.28	-				
NSC	.62***	.54***	-.31*	.72***	.32*	.00	-.09	-			
UHML	-.36*	-.43**	-.49***	-.09	-.44**	.12	-.50***	.09	-		
Str	-.25	-.33*	-.43**	-.01	-.37*	.41**	-.25	-.08	.41**	-	
Mic	.85***	.84***	.32*	.67***	.75***	.19	.73***	.34*	-.52***	-.30*	-
IU	-.07	-.08	-.07	.09	-.14	.29*	.09	-.08	.40**	.50***	-.07

*p < 0.05, **p < 0.01 and *** p < 0.001. RB: Rendimiento de algodón bruto en g, RF: Rendimiento de fibra en g, RFD: Rendimiento de fibra al desmote en %, PC: Peso promedio de capullos en g, NC: Número de capullos por planta, IS: Índice de semilla en g, IF: Índice de fibra g, NSC: Número de semilla por capullo, UHML: Longitud de la fibra en mm, Str: Resistencia de la fibra en g tex⁻¹, Mic: Micronaire, IU: Índice de uniformidad de fibras %.

Varias correlaciones fenotípicas fueron estadísticamente significativas (Tabla 1.5). Para el análisis, se consideraron correlaciones fuertes los valores superiores a 0,80, moderadas las comprendidas entre 0,40 y 0,80, y bajas las inferiores a 0,40. El RF mostró una fuerte correlación positiva con el NC. También mostró una correlación positiva moderada con PC. La RFD mostró una correlación positiva moderada con el RF y el NC. Sin embargo, mostró una correlación negativa moderada con IS. El UHML mostró correlaciones negativas moderadas con el RF, lo que indica que, a medida que aumenta el rendimiento de fibra, disminuye la longitud de la misma.

1.5. Discusión

Aquí la discusión del capítulo 1

1.6. Conclusión

Aquí la conclusión del capítulo 1

Capítulo 2

Caracterización fisiológica

2.1. Introducción

Aquí una breve introducción del capítulo

2.2. Objetivo

Evaluar procesos fisiológicos que intervienen en la determinación del rendimiento de fibra de entradas de algodón del banco de germoplasma de INTA.

2.3. Materiales y métodos

Variables medidas:

La medición de las variables fisiológicas se llevaron a cabo en un ensayo en invernadero. Las mediciones se realizaron en seis momentos durante el ciclo de la planta siguiendo lo propuesto por (Luo et al., 2017). Los equipos utilizados para las mediciones propuestas fueron a) Fotosíntesis: LICOR 6400; b) Contenido de clorofila: Minolta SPAD 502; c) Apertura y cierre estomático: LICOR 6400. Para las mediciones de estas variables, se utilizaron las entradas ~~detallar~~ entradas del diseño planteado en “Caracterización morfológica”.

Por otra parte, se realizaron muestreos destructivos de plantas para la determinación de materia seca y partición de los asimilados. Los cortes se realizaron a los 30, 60, 90 y 120 días (correspondientes a los estados fenológicos 1er pimpollo, 1era flor, 1era bocha abierta y fin de ciclo). En cada uno de estos momentos se seccionaron las plantas en tallo, ramas reproductivas, ramas vegetativas, pimpollos y flores, bochas cerradas, capsulas abiertas, fibra y rebrote de tallo según el momento de muestreo. Todas las muestras de las partes de la planta fueron llevadas a estufa a 65 ° C hasta peso constante (96 horas). El ensayo se realizó en un diseño en bloques al azar con arreglo en parcelas divididas, con los 4 momentos de corte y las entradas incluidas en cada parcela, con cuatro repeticiones. Se utilizaron macetas de 5 litros (con una mezcla de suelo y sustrato comercial), en el cual se colocó 1 planta por maceta.

2.4. Resultados

Aquí los resultados del capítulo 2

2.5. Discusión

Aquí la discusión del capítulo 2

2.6. Conclusión

Aquí la conclusión del capítulo 2

Capítulo 3

Caracterización molecular

3.1. Introducción

Aquí una breve introducción del capítulo

3.2. Objetivo

Mapear QTL (Quantitative Trait Loci) asociados a caracteres de rendimiento de fibra mediante el análisis de una población segregante F_2 obtenida del cruzamiento de progenitores contrastantes.

3.3. Materiales y métodos

Se caracterizaron marcadores moleculares del tipo SSR (Single Sequence Repeats o microsatélites) asociados a QTLs de importancia agronómica. Se utilizaron 55 SSR ~~chequear n° de marcadores~~ que fueron seleccionados acorde tanto a trabajos científicos (Ademe et al., 2017; An et al., 2010; Baytar et al., 2018; Iqbal & Rahman, 2017; Li et al., 2017; R. Liu et al., 2012; R. Liu et al., 2018; X. Liu et al., 2017; Qin et al., 2015; Shen et al., 2007; Shi et al., 2015; Su et al., 2016; B. Wang et al., 2007; H. Wang et al., 2015; M. Wang et al., 2014; Xia et al., 2014; S. Zhang et al., 2016; Z.-S. Zhang

et al., 2005) como la base de datos de CottonGen (<http://www.cottongen.org>). Dicha actividad se realizó en el laboratorio de biotecnología de INTA Reconquista. A partir de las entradas contrastantes para las características de interés, se realizaron cruzamientos y por autofecundación de las F_1 se obtuvo la población F_2 . A continuación, se detallan las etapas:

- i. Obtención de la población segregante para los loci de los marcadores (M) y los QTLs. Luego de la caracterización morfológica y fisiológica, las entradas fueron seleccionadas para ser utilizadas como parentales contrastantes en los respectivos cruzamientos de este estudio. Para los mismos se utilizaron las entradas de alto porcentaje de desmote como parentales masculinos. Considerando que por cada bocha se obtiene, en promedio, 20 semillas (Naeem et al., 2017) se tomó una flor de cada parental para dicho cruzamiento, para la generación de la población F_1 (20 plantas). La población segregante (F_2) resultó de la autofecundación de las F_1 , para llegar a una población F_2 aproximada de 200 plantas (Bardak et al., 2018; T. Zhang et al., 2003). BGSP-00166 and SP-41255 were the selected parental genotypes. Both parents have Argentine origin. The first parent is an inbreed line derived from the cross between Chaco 510 x SP 6269, while the second parent is other inbreed line selected from the cross between SP-81270-7 x Mij. 3. Morphologically, they differ in their plant structure (Figure 3.2). BGSP-00166 is more compact with a shorter distance between the first fruiting position and the stem, SP-41255 has a plant structure more open. The crossing was performed in both directions to evaluate the existence of reciprocal effect. The emasculation was performed in the plants used as female parent by removing the stamens with tweezers before flower anthesis (candle shape stage), during the afternoon hours. The next day, the crossing was performed by transferring pollen from male to female parents (emasculated flowers) as described in Acquaah (2012). Then F_1 seeds from

the cotton crosses were sown under greenhouse conditions and self-pollinated to produce F_2 . In the 2019-2020 growing season, the F_2 population was sown in non-replicated rows under field conditions. Each row was 10 m long and spaced 1 m apart, with 50 plants per row (Figure 3.1). The non-segregating generations (both F_1 , SP-41255 x BGSP-00166 and BGSP-00166 x SP-41255, and the parental genotypes) were also sown under the same conditions. All these generations were subjected to phenotypic evaluation. In the crossbreeding direction of SP-41255 x BGSP-00166, an F_2 segregating population of 205 plants was achieved, while for the reverse crossbreeding direction, 234 plants were obtained. In the same trial, as shown in Figure 3.1, 17 plants from the BGSP-00166 parent, 19 plants from the SP-41255 parent, and 11 plants from the F_1 (half and half generated from a cross direction and its reciprocal) were evenly sown and achieved.

- II. Medición de la característica fenotípica controlada por los QTL. Se realizarán las mediciones de rendimiento y calidad de fibra detalladas en el apartado "Caracterización morfológica". For the experiment of the biparental cross, each plant (from both segregating and non-segregating populations) was also individually harvested at maturity stage to evaluate yield and quality-related characteristics: SCY, LY, LP, BW, BN, FL, FS, FU and MIC were measured as described above.
- III. Caracterización molecular por SSR de los de los parentales y cada planta de la población F_2 . El ADN genómico se aisló utilizando hojas jóvenes procedentes de los progenitores y la población segregante, mediante método CTAB modificado (Patterson et al., 1993; J. Zhang & Stewart, 2000). Se evaluó la cantidad y calidad del ADN mediante espectrofotometría para comparación. La amplificación por PCR y la tinción con plata se realizó según Lin et al. (2005). Los productos de PCR de los SSR se separaron en geles de poliacrilamida desnaturalizantes al 2 % y revelados con carbonato de sodio (Lin et al., 2005).




Figura 3.1: Description of the field trial, showing the two populations generated from the cross in the direction SP-41255 x BGSP-00166 and its reciprocal. Within the trial, plants from the parent SP-41255 (1), Filial 1 (2), and parent BGSP-00166 (3) were randomly distributed.

3.3.1. Análisis estadístico

For the biparental cross experiment, a Levene's test was done to confirm homogeneous variance in non-segregating generations, while normal distribution was confirmed by the Shapiro-Wilk's test. Fisher's L.S.D test was conducted to compare the parentals P_1 , P_2 and the F_1 generation. In addition, a comparison of the means of the reciprocal F_1 and F_2 generations was also performed to detect the existence of a reciprocal effect on the characteristics under study. A Chi-Square goodness of fit test was performed to detect transgressive segregation following the approach proposed by **rodriguez2005**<empty citation>. Thus, it was considered that the parent generation had a size equal to that of the F_2 generation. The expected frequencies were calculated assuming equal size between the parent generation and the F_2 , and extreme phenotypes were considered to be those individuals in the F_2 that exceeded the average of the trait in the parent generation and two standard deviations (one-tailed test, the 2.5 % of individuals in a normal distribution). Under these assumptions, when the

observed proportion of extreme individuals in the F_2 generation exceeded this expected proportion (a significant χ^2), it was considered that the trait showed a transgressive inheritance pattern.

The broad sense heritability (h_{bs}^2) was estimated from the variance components of the non-segregating generations (P_1 , P_2 and F_1) and the F_2 generation as follows (Kearsey & Pooni, 1996):

$$h_{bs}^2 = \frac{\sigma^2 G}{\sigma^2 Ph} \times 100$$

Where h_{bs}^2 = broad sense heritability, $\sigma^2 G$ = Genotypic variance, $\sigma^2 Ph$ = Phenotypic variance.

Variance among plants within the F_1 's and the parents P_1 and P_2 was equated to environmental variance and subtracted from the variance among F_2 plants to obtain estimates of genotypic variance.

$$\sigma^2 E = \frac{\sigma^2 P_1 + \sigma^2 P_2 + \sigma^2 F_1}{3}$$

Where $\sigma^2 E$ = Environmental variance, $\sigma^2 P_1$ = Variance of parent 1, $\sigma^2 P_2$ = Variance of parent 2, $\sigma^2 F_1$ = Variance of F_1 generation.

$$\sigma^2 G = \sigma^2 Ph - \sigma^2 E$$

To estimate the genetic correlation among traits the methodology proposed by Kearsey y Pooni (1996) was used.

3.4. Resultados



Figura 3.2: Plant of the parental genotypes SP-41255 and BGSP-00166

3.4.1. Generation of variability from the biparental cross BGSP-00166 x SP-41255

The parental genotypes BGSP-00166 and SP-41255 were significant different for all the evaluated traits with exception of SCY (Table 3.1). On the other hand, the mean values for all traits did not show significant differences between the F_1 and F_2 reciprocal ($p > 0.05$) as shown in Table S1. This means no existence the reciprocal effect in this cross for the analyzed traits. Therefore, we then decided to merge both the F_1 and F_2 reciprocal

populations.

Tabla 3.1: Mean and variance (in parentheses) of the traits in the non-segregating generations (BGSP-00166, SP-41255 and F1) and the segregating generation F2

Generations	Caracteres								
	SCY	LY	LP	BW	BN	FL	FS	MIC	FU
BGSP-00166	89.5a	25.8a	30.9a	6.2b	14.5a	32.5b	37.1b	3.9a	85.5b
	(1266.4)	(110.3)	(0.9)	(0.4)	(29.8)	(0.3)	(2.8)	(0.1)	(1.8)
SP-41255	86.9a	36.6b	43.4c	4.6a	19.1b	26.9a	30.7a	4.8c	82.0a
	(761.8)	(126.1)	(0.8)	(0.3)	(29.6)	(0.6)	(2.9)	(0.1)	(2.1)
F~1~	123.5b	44.1b	37.4b	6.4b	19.4b	32.0b	37.4b	4.2b	86.1b
	(1013.1)	(126.6)	(0.4)	(0.6)	(26.7)	(0.3)	(0.9)	(0.1)	(0.9)
F~2~	114.1	37.5	37.2	5.9	19.7	31.3	36.1	4.3	84.9
	(1957.2)	(227.3)	(4.4)	(0.9)	(52.5)	(1.5)	(5.2)	(0.2)	(1.7)

RB: Seed cotton yield in g, LY: Lint yield in g, LP: Lint percentage in %, BW: Boll weight in g, BN: Boll number per plant, SI: Seed index in g, LI: Lint index in g, SNPB: Seed number per boll, FL: Fibre length in mm, FS: Fibre strength g tex⁻¹, Mic: Micronaire, FU: Fibre uniformity in %.

3.5. Discusión

Aquí la discusión del capítulo 3

3.6. Conclusión

Aquí la conclusión del capítulo 3

Conclusión

Las conclusiones de la tesis aquí..

Apéndice A

Primer Apéndice

Sí es necesario incluir un apéndice, iría aquí..

En capítulo 1:

Descripción aquí..

Apéndice B

Segundo Apéndice

Este sería el segundo apéndice..

Referencias

- Acquaah, G. (2012). *Principles of plant genetics and breeding* (2. ed). Wiley-Blackwell.
- Ademe, M. S., He, S., Pan, Z., Sun, J., Wang, Q., Qin, H., Liu, J., Liu, H., Yang, J., Xu, D., Yang, J., Ma, Z., Zhang, J., Li, Z., Cai, Z., Zhang, X., Zhang, X., Huang, A., Yi, X., ... Du, X. (2017). Association mapping analysis of fiber yield and quality traits in upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.) *Molecular Genetics and Genomics*, 292(6), 1267-1280. <https://doi.org/10.1007/s00438-017-1346-9>
- An, C., Jenkins, J. N., Wu, J., Guo, Y., & McCarty, J. C. (2010). Use of fiber and fuzz mutants to detect qtl for yield components, seed, and fiber traits of upland cotton. *Euphytica*, 172(1), 21-34. <https://doi.org/10.1007/s10681-009-0009-2>
- ANIDA. (2024). Tipos climáticos en Argentina. Available at: <https://ide.ign.gob.ar/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=b58d8b8841ef472e962317cac879e87f> (Accessed: 24 Apr 2024).
- Bardak, A., Hayat, K., Erdogan, O., Mahmood, Z., Khan, N.-I., Iqbal, M. A., Tekerek, H., & Mehboob-ur-Rahman. (2018). Genetic mapping in cotton [DOI: 10.5772/intechopen.74513]. En Mehboob-Ur-Rahman & Y. Zafar (Eds.). InTech. <https://doi.org/10.5772/intechopen.74513>
- Baytar, A. A., Peynircioğlu, C., Sezener, V., Basal, H., Frary, A., Frary, A., & Doğanlar, S. (2018). Genome-wide association mapping of yield components and drought tolerance-related traits in cotton. *Molecular Breeding*, 38(6), 74. <https://doi.org/10.1007/s11032-018-0831-0>

- Bourland, F. M., Oosterhuis, D. M., & Tugwell, N. P. (1992). Concept for monitoring the growth and development of cotton plants using main-stem node counts. *Journal of Production Agriculture*, 5(4), 532-538. <https://doi.org/10.2134/jpa1992.0532>
- De Carvalho, L., Farias, F., Teodoro, L., & Teodoro, P. (2022). Genotype selection for fiber quality traits in cotton in the Brazilian Northeast. *Agronomy Journal*, 114. <https://doi.org/10.1002/agj2.21176>
- ICAC. (2023). Situación del Algodón en la Argentina, INFORME CAMPAÑA 2022/2023.
- Iqbal, M. A., & Rahman, M.-u. (2017). Identification of marker-trait associations for lint traits in cotton. *Frontiers in Plant Science*, 8. <https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00086>
- Kearsey, M. J., & Pooni, H. S. (1996). *The genetical analysis of quantitative traits* [DOI: 10.1007/978-1-4899-4441-2]. Springer US. <https://doi.org/10.1007/978-1-4899-4441-2>
- Kerby, T. A., Bourland, F. M., & Hake, K. D. (2010). Physiological rationales in plant monitoring and mapping [DOI: 10.1007/978-90-481-3195-2_27]. En J. M. Stewart, D. M. Oosterhuis, J. J. Heitholt & J. R. Mauney (Eds.). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-90-481-3195-2_27
- Kerby, T. A., & Hake, K. D. (1996). Monitoring cotton's growth. *Cotton production manual*, 335-355.
- Li, C. Q., Dong, N., Fu, Y. Z., Sun, R. R., & Wang, Q. L. (2017). Marker detection and elite allele mining for yield traits in upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.) by association mapping. *The Journal of Agricultural Science*, 155(4), 613-628. <https://doi.org/10.1017/S0021859616000745>
- Lin, Z., He, D., Zhang, X., Nie, Y., Guo, X., Feng, C., & Stewart, J. M. (2005). Linkage map construction and mapping qtl for cotton fibre quality using srnp, ssr and rapd. *Plant Breeding*, 124(2), 180-187. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0523.2004.01039.x>

- Liu, R., Wang, B., Guo, W., Qin, Y., Wang, L., Zhang, Y., & Zhang, T. (2012). Quantitative trait loci mapping for yield and its components by using two immortalized populations of a heterotic hybrid in *Gossypium hirsutum* L. *Molecular Breeding*, 29(2), 297-311. <https://doi.org/10.1007/s11032-011-9547-0>
- Liu, R., Gong, J., Xiao, X., Zhang, Z., Li, J., Liu, A., Lu, Q., Shang, H., Shi, Y., Ge, Q., Iqbal, M. S., Deng, X., Li, S., Pan, J., Duan, L., Zhang, Q., Jiang, X., Zou, X., Hafeez, A., ... Yuan, Y. (2018). Gwas analysis and qtl identification of fiber quality traits and yield components in upland cotton using enriched high-density snp markers. *Frontiers in Plant Science*, 9, 1067. <https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01067>
- Liu, X., Teng, Z., Wang, J., Wu, T., Zhang, Z., Deng, X., Fang, X., Tan, Z., Ali, I., Liu, D., Zhang, J., Liu, D., Liu, F., & Zhang, Z. (2017). Enriching an intraspecific genetic map and identifying qtl for fiber quality and yield component traits across multiple environments in upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.) *Molecular Genetics and Genomics*, 292(6), 1281-1306. <https://doi.org/10.1007/s00438-017-1347-8>
- Luo, H. H., Zhang, H. L., Zhang, Y. L., & Zhang, W. F. (2017). Evolution characteristics related to photosynthesis, growth and yield in some old and new cotton cultivars. *Photosynthetica*, 55(2), 301-307. <https://doi.org/10.1007/s11099-016-0223-9>
- Meredith, W. R. (1984). Quantitative genetics [DOI: 10.2134/agronmonogr24.c5]. En R. J. Kohel & C. F. Lewis (Eds.). American Society of Agronomy, Crop Science Society of America, Soil Science Society of America. <https://doi.org/10.2134/agronmonogr24.c5>
- Naeem, M., Iqbal, M., Sami-Ul-Allah, W. N., & Zahid, W. (2017). QTL Identification for Within-Boll Yield Components of *Gossypium hirsutum* L. *Philippine Agricultural Scientist*, 100(3).
- Nidagundi, J. M., Shiva, K., Revanasiddayya, Patil, S., S., R., Hanchinal, S. G., & Ajayakumar, M. Y. (2023). Comparative variability studies for yield and fibre quality traits in F2 generations derived from single and double crosses in cotton (*Gossypium*

- hirsutum L). *Emergent Life Sciences Research*, 09(02), 265-275. <https://doi.org/10.31783/elsr.2023.92265275>
- Paterson, A. H., Brubaker, C. L., & Wendel, J. F. (1993). A rapid method for extraction of cotton (*Gossypium* spp.) genomic DNA suitable for RFLP or PCR analysis. *Plant Molecular Biology Reporter*, 11(2), 122-127. <https://doi.org/10.1007/BF02670470>
- Paytas, M. J., & Ploschuk, E. L. (2013). Cultivos industriales-Capítulo Algodón. En E. De La Fuente, A. Gil & A. Kantolil (Eds.). Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires.
- Pettigrew, W. T., Meredith Jr, W., & Zeng, L. (2013). Response of obsolete and modern cotton genotypes to varying plant densities. [Publisher: Cotton Foundation]. *Journal of Cotton Science*, 17(4), 253-262.
- Qin, H., Chen, M., Yi, X., Bie, S., Zhang, C., Zhang, Y., Lan, J., Meng, Y., Yuan, Y., & Jiao, C. (2015). Identification of associated SSR markers for yield component and fiber quality traits based on frame map and upland cotton collections (D. D. Fang, Ed.). *PLOS ONE*, 10(1), e0118073. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118073>
- Ribeiro, L. P., Carvalho, L. P. d., Farias, F., Rodrigues, J. I. d. S., Teodoro, P. E., & Bhering, L. L. (2017). Genetic gains in agronomic and technological traits of elite cotton genotypes [Publisher: Instituto Agronômico de Campinas]. *Bragantia*, 77, 466-475. <https://doi.org/10.1590/1678-4499.2017329>
- Royo, O. M., Poisson, J., Bonacic, I., Montenegro, A., Ibaló, S., Mazza, S., & Giménez, L. (2007). Direction of cotton breeding in Argentina.
- Scarpin, G. J., Dileo, P. N., Winkler, H. M., Cereijo, A. E., Lorenzini, F. G., Roeschlin, R. A., Muchut, R. J., Acuña, C., & Paytas, M. (2022). Genetic progress in cotton lint and yield components in Argentina. *Field Crops Research*, 275, 108322. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2021.108322>
- Scarpin, G. J., Dileo, P. N., Winkler, H. M., Cereijo, A. E., Lorenzini, F. G., Muchut, R. J., Roeschlin, R. A., Mattalia, P., Acuña, C., & Paytas, M. (2023). Genetic progress

- in seed and fiber quality traits of cotton in Argentina. *Field Crops Research*, 302, 109106. <https://doi.org/10.1016/j.fcr.2023.109106>
- Shen, X., Guo, W., Lu, Q., Zhu, X., Yuan, Y., & Zhang, T. (2007). Genetic mapping of quantitative trait loci for fiber quality and yield trait by ril approach in upland cotton. *Euphytica*, 155(3), 371-380. <https://doi.org/10.1007/s10681-006-9338-6>
- Shi, Y., Li, W., Li, A., Ge, R., Zhang, B., Li, J., Liu, G., Li, J., Liu, A., & Shang, H. (2015). Constructing a high-density linkage map for *Gossypium hirsutum* × *Gossypium barbadense* and identifying QTLs for lint percentage [Publisher: Wiley Online Library]. *Journal of integrative plant biology*, 57(5), 450-467.
- Su, J., Fan, S., Li, L., Wei, H., Wang, C., Wang, H., Song, M., Zhang, C., Gu, L., Zhao, S., Mao, G., Wang, C., Pang, C., & Yu, S. (2016). Detection of favorable qtl alleles and candidate genes for lint percentage by gwas in chinese upland cotton. *Frontiers in Plant Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01576>
- Tang, B., Jenkins, J. N., Watson, C. E., McCarty, J. C., & Creech, R. G. (1996). Evaluation of genetic variances, heritabilities, and correlations for yield and fiber traits among cotton f2 hybrid populations. *Euphytica*, 91(3), 315-322. <https://doi.org/10.1007/BF00033093>
- Wang, B., Guo, W., Zhu, X., Wu, Y., Huang, N., & Zhang, T. (2007). Qtl mapping of yield and yield components for elite hybrid derived-rils in upland cotton. *Journal of Genetics and Genomics*, 34(1), 35-45. [https://doi.org/10.1016/S1673-8527\(07\)60005-8](https://doi.org/10.1016/S1673-8527(07)60005-8)
- Wang, H., Huang, C., Guo, H., Li, X., Zhao, W., Dai, B., Yan, Z., & Lin, Z. (2015). Qtl mapping for fiber and yield traits in upland cotton under multiple environments (K. Wang, Ed.). *PLOS ONE*, 10(6), e0130742. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130742>
- Wang, M., Li, C., & Wang, Q. (2014). Quantitative trait loci mapping and genetic dissection for lint percentage in upland cotton (*Gossypium hirsutum*). *Journal of Genetics*, 93(2), 371-378. <https://doi.org/10.1007/s12041-014-0385-9>

- Wells, R., & Meredith, W. (1984). Comparative Growth of Obsolete and Modern Cotton Cultivars. III. Relationship of Yield to Observed Growth Characteristics1. *Crop Science - CROP SCI*, 24. <https://doi.org/10.2135/cropsci1984.0011183X002400050010x>
- Worley, S., Culp, T., & Harrell, D. (1974). The relative contributions of yield components to lint yield of upland cotton, *Gossypium hirsutum* L. [Publisher: Springer]. *Euphytica*, 23(2), 399-403.
- Xia, Z., Zhang, X., Liu, Y.-y., Jia, Z.-f., Zhao, H.-h., Li, C.-q., & Wang, Q.-l. (2014). Major gene identification and quantitative trait locus mapping for yield-related traits in upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.) *Journal of Integrative Agriculture*, 13(2), 299-309. [https://doi.org/10.1016/S2095-3119\(13\)60508-0](https://doi.org/10.1016/S2095-3119(13)60508-0)
- Zhang, J., & Stewart, J. M. (2000). Economical and rapid method for extracting cotton genomic dna. *J Cotton Sci*, 4(3).
- Zhang, S., Feng, L., Xing, L., Yang, B., Gao, X., Zhu, X., Zhang, T., & Zhou, B. (2016). New QTLs for lint percentage and boll weight mined in introgression lines from two feral landraces into *Gossypium hirsutum* acc TM-1 [Publisher: Wiley Online Library]. *Plant Breeding*, 135(1), 90-101.
- Zhang, T., Yuan, Y., Yu, J., Guo, W., & Kohel, R. J. (2003). Molecular tagging of a major qtl for fiber strength in upland cotton and its marker-assisted selection. *Theoretical and Applied Genetics*, 106(2), 262-268. <https://doi.org/10.1007/s00122-002-1101-3>
- Zhang, Z.-S., Xiao, Y.-H., Luo, M., Li, X.-B., Luo, X.-Y., Hou, L., Li, D.-M., & Pei, Y. (2005). Construction of a genetic linkage map and qtl analysis of fiber-related traits in upland cotton (*Gossypium hirsutum* L.) *Euphytica*, 144(1-2), 91-99. <https://doi.org/10.1007/s10681-005-4629-x>