

Towards Practical First-Order Model Counting

Ananth K. Kidambi¹ Guramrit Singh¹ **Paulius Dilkas**^{2,3}
Kuldeep S. Meel^{4,2}

¹IIT Bombay, India


²University of Toronto, Canada

³Vector Institute, Canada

⁴Georgia Tech, USA

SAT 2025

Knowledge Compilation Workflow



Benchmarks

► Friends & Smokers

$$(\forall x, y \in \Delta. S(x) \wedge F(x, y) \rightarrow S(y)) \wedge (\forall x \in \Delta. S(x) \rightarrow C(x))$$


► Functions

$$(\forall x \in \Gamma. \exists y \in \Delta. P(x, y)) \wedge \\ (\forall x \in \Gamma. \forall y, z \in \Delta. P(x, y) \wedge P(x, z) \rightarrow y = z)$$


► Bijections

$$(\forall x \in \Gamma. \exists y \in \Delta. P(x, y)) \wedge \\ (\forall y \in \Delta. \exists x \in \Gamma. P(x, y)) \wedge \\ (\forall x \in \Gamma. \forall y, z \in \Delta. P(x, y) \wedge P(x, z) \rightarrow y = z) \wedge \\ (\forall x, z \in \Gamma. \forall y \in \Delta. P(x, y) \wedge P(z, y) \rightarrow x = z)$$

Friends & Smokers



Bijections



Functions

