

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

Стрепсилс® плюс

таблетки для рассасывания

Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд, Великобритания

Изменение № 1

Дата внесения Изменения «___» 28 05 12 2011 г.

| Старая редакция | Новая редакция |
|--|--|
| <p>Описание:</p> <p>Плоскоцилиндрические таблетки голубовато-зеленого цвета с запахом ментола. Допускается наличие белого налета, незначительных пузырьков воздуха внутри карамельной массы и неровности краев.</p> <p>Состав:</p> <p>Одна таблетка для рассасывания содержит активные вещества: 2,4-дихлорбензиловый спирт – 1,2 мг, амилметакрезол – 0,6 мг, лидокаина гидрохлорида моногидрат – 10 мг;</p> <p>вспомогательные вещества: винная кислота, натрия сахаринат, левоментол, мяты перечной листьев масло, аниса семян масло, краситель хинолиновый желтый, индигокармин, сахароза жидкая, декстроза жидкая [декстроза, олиго- и полисахариды].</p> | <p>Описание:</p> <p>Плоскоцилиндрические таблетки голубовато-зеленого цвета с изображением буквы S с 2-х сторон таблетки, с запахом ментола.</p> <p>Допускается наличие белого налета, незначительных пузырьков воздуха внутри карамельной массы и неровности краев.</p> <p>Состав:</p> <p>Одна таблетка для рассасывания содержит <i>активные вещества</i>: 2,4-дихлорбензиловый спирт – 1,2 мг, амилметакрезол – 0,6 мг, лидокаина гидрохлорида моногидрат – 10 мг;</p> <p><i>вспомогательные вещества</i>: винная кислота 26 мг, натрия сахаринат 2,08 мг, левоментол 2,08 мг, мяты перечной листьев масло 2,08 мг, аниса семян масло 0,52 мг, краситель хинолиновый желтый 0,0046 мг, индигокармин 0,0156 мг, сахароза жидкая 1523,4 мг, декстроза жидкая [декстроза, олиго- и полисахариды] 980,9 мг.</p> |

| | |
|---|--|
| Особые указания: При возможной потере чувствительности языка, рекомендуется соблюдать осторожность при приеме горячей пищи и воды. Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. При назначении больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что 1 таблетка содержит 2,6 мг сахара. | Особые указания: При возможной потере чувствительности языка, рекомендуется соблюдать осторожность при приеме горячей пищи и воды. Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. При назначении больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что 1 таблетка содержит 2,6 г сахара. |
|---|--|

Специалист по регистрации

ООО "Рекитт Бенкизер Хэлскэр"



К.А. Семихатова