Strepsils

№1 для лечения боли в горле



СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Виды заболеваний. Причины боли в горле.
- 2. Антибактериальная терапия.
- 3. Формы выпуска препаратов.
- 4. Стрепсилс.
- 5. Обзор конкурентов.
- 6. Маркетинговая поддержка.











1. Виды заболеваний. Причины боли в горле



КАК УСТРОЕНО ГОРЛО

Ротовая полость. Слюна обладает антибактериальными свойствами, благодаря присутствию лизоцима и антител. Поэтому слюна представляет собой нашу первую линию обороны в борьбе с бактериями и вирусами, которые могут вызывать гингивиты, стоматиты и фарингиты.

Ротовая **полость**

Гортань - следующий после глотки отдел дыхательных путей. Кроме дыхательной функции, гортань также играет важную роль в процессе глотания, препятствуя попаданию пищи в дыхательные пути. В гортани также расположены голосовые связки, которые участвуют в произнесении и модуляции звуков.

пазухи

Миндалины. Миндалины - это два одинаковых и симметричных лимфатических органа, расположенные в ротовой полости и видимые лишь частично в глубине горла. Они выполняют важную функцию

в горле.

Миндалины

Носовые

защиты дыха́тель́ного аппарата. Находясь в самом начале пути воздуха, которым мы дышим, и пищи, которую мы поглощаем, миндалины являются первой точкой контакта с микробами, поступающими из внешнего мира. Миндалины отвечают за производство клеток, способных вырабатывать антитела для борьбы с микробами.

Носовые пазухи. Раздражение слизистых,

покрывающих носовые полости, например в результате вдыхания чересчур холодного воздуха, либо вследствие вирусной

инфекции, приводит к появлению симптомов простуды: заложенность носа, насморк, боль

Глотка

<u>Глотка.</u> Глотка представляет собой мускульно-мембранный канал, который является соединительным звеном между полостью носа и рта с одной стороны, и пищеводом и гортанью - с другой.

Голосовые связки

Голосовые связки представляют собой лоскуты эластичной ткани, которые вибрируют при прохождении через них воздуха, в результате чего появляется голос. Расположены в гортани. Пространство между голосовыми связками называется голосовой щелью. При дыхании через нее пропускается воздух, благодаря чему могут произноситься звуки. Раздражение или воспаление связок может привести к потере голоса и затруднениям в произнесении звуков

Трахея

<u>Трахея</u> относится к нижним дыхательным путям. Она начинается от гортани и заканчивается разветвлением на два бронха. Трахея представляет собой хрящевой орган, покрытый изнутри слизистой оболочкой, которая выстлана реснитчатым эпителием. Слизь, которая постоянно вырабатывается в трахее, перехватывает мельчайшую атмосферную пыль (частицы пыли, цветочную пыльцу, бактерии и т.п.), в то время как реснички эпителия продвигают инородные частицы вверх к выходу и поддерживают чистоту дыхательных путей.

Гортань













ОСНОВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

ФАРИНГИТ



Чаще всего!

ТОНЗИЛЛИТ

ЛАРИНГИТ












ФАРИНГИТ – воспаление слизистой оболочки глотки

Клинические проявления:

- •Сухость
- •Першение
- •Дискомфорт в горле
- •Покраснение слизистой оболочки глотки




ТОНЗИЛЛИТ – воспаление небных миндалин.

Клинические проявления:

- •Боль при глотании
- •Першение
- •Саднение

Тонзиллофарингит:

- когда тонзиллит сопровождается явлениями фарингита (воспалением слизистой оболочки глотки)



АНГИНА – ОСТРАЯ ФОРМА ТОНЗИЛЛИТА И ФАРИНГИТА

ОСТРЫЙ ФАРИНГИТ



АНГИНА!

ОСТРЫЙ ТОНЗИЛЛИТ

- высокая температура (до 39° и выше)
- слабость и местные симптомы –боль в горле, часто сильная, нарушение глотания (вплоть до трудностей при глотании жидкостей)

Осложнения стрептококкового фарингита и тонзиллита

- •Бактериальный тонзиллит и фарингит могут иметь осложнения со стороны суставов и сердца (ревматизм), и почек.
- •Это особенно опасно в детском возрасте.

Хронические формы

- периодически повторяющееся в течение года, инфекционно-воспалительное заболевание












ЛАРИНГИТ - воспаление гортани, связанное, как правило, с ОРЗ

Клинические проявления:

- ощущение сухости
- першение
- саднение в горле
- сухой кашель
- охриплость голоса, вплоть до афонии

Развитию заболевания способствуют:

- •Переохлаждение.
- •Дыхание через рот.
- •Запылённый воздух.
- •Перенапряжение гортани.



Ларингит встречается реже, чем фарингит или тонзиллит











ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОЛИ В ГОРЛЕ













ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ В ГОРЛЕ














2. Антибактериальная терапия.



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

Антибиотики не всегда эффективны против боли в горле, т.к. действуют только на бактерии и беспомощны против вирусов.




РИСКИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ

Боль в горле



Микрофлора = Полезные бактерии + Вредные бактерии



Устойчивость бактерий к действию антибиотиков



Антибиотики могут не сработать, когда действительно будут нужны!



3. Формы выпуска препаратов



Лекарственные формы препаратов от боли в горле

Спреи Полоскания Таблетки Лекарственные леденцы
43%
7%
30%
20%

% от продаж в деньгах



ОСОБЕННОСТИ СПРЕЕВ







3A

- •Впрыскивается высокая концентрация активного вещества
- •Можно воздействовать непосредственно на очаг воспаления

- •Невозможно покрыть все воспаленные участки
- •Требует подготовительных действий (сборка балончика)
- •Требует ухода
- •Часть действующего вещества немедленно проглатывается
- •Процедура использования не всегда хорошо воспринимается пациентами (особенно детьми)
- •Неприятный вкус
- •Неудобно брать в дорогу











ОСОБЕННОСТИ ПОЛОСКАНИЯ









3A

- •Помогает избавиться от избыточной слизи в горле
- •Способствует увлажнению тканей
- •Основное назначение полосканияудаление болезнетворных микроорганизмов и гнойных налетов

- •Действующее вещество практически не задерживается в тканях глотки
- •При полоскании не происходит избавления от вирусных частиц, т.к. вирус проникает в клетки эпителия
- •Эффективность зависит от правильности выполнения процедуры (продолжительность и частота 1,5-2 часа)











Преимущества лекарственных леденцов и таблеток для рассасывания





3A

- •Действующее вещество присутствует в тканях глотки дольше и в большей концентрации
- •При рассасывании усиливается продукция слюны- дополнительное смягчающее действие
- •Приятный вкус
- •Положительное эмоциональное воздействие
- •Удобно брать с собой

- •Некоторые пациенты не любят формат таблеток
- •Для получение эффекта нужно рассасывать таблетку
- •Часть потребителей не воспринимает данный формат как серьезное лекарство











НЕЛЕКАРСТВЕННЫЕ ЛЕДЕНЦЫ













3A

- •Смягчающее действие за счет продукции слюны
- •Низкая стоимость
- •Воспринимаются как более натуральный метод лечения

- •Не содержат лекарственного вещества
- •Отсутствие выраженного лечебного действия
- •Содержат сахар и вкусовые добавки











4. Стрепсилс



ЧТО ТАКОЕ СТРЕПСИЛС

Средство для лечения боли в горле

Форма выпуска

<u>Таблетки для рассасывания</u> с активными веществами

Фармо группа

Антисептическое средство

Показания к применению

Симптоматическое лечение боли в горле при инфекционно-воспалительных заболеваниях: тонзилит, фарингит, ларингит и др.











С какими симптомами борется Стрепсилс?











ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

симптомы, %



Самые популярные симптомы отмечены темным цветом



Q4_1: Какие симптомы у вас бывают во время болезни? Исследование IPSOS, март 2013 г.











КАК МЫ РАЗДЕЛЯЕМ НАШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Стадия Заболевания горла

Легкая форма

Тяжелая форма

Описание

Раздражение и дискомфорт, начальная стадия

Заболевание,

вызванные инфекцией и воспалением

Симптомы

Сухость

Першение

Больно глотать

Сухость и сильная боль

Отек











КАК РАЗЛИЧАТЬ ПРОДУКТЫ СТРЕПСИЛС

Раздражение и дискомфорт

Для взрослых









Для детей





Воспаление и сильная боль

Против воспаления



Анестетик Быстрое действие

















СТРЕПСИЛС

Раздражение и дискомфорт



















- •При раздражении и сухости в горле
- •При первых симптомах инфекции
- •При заболеваниях профессионального характера (преподаватели, дикторы)
- •При охриплости











СТРЕПСИЛС



Лечение боли в горле

Активные вещества **2,4-дихлорбензиловый спирт** 1,2 мг; **амилметакрезол** 0,6 мг

Применяется

при инфекционно-воспалительных заболеваниях: <u>тонзиллите</u>, фарингите, <u>ларингите</u>.











ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ



можно применять людям с сахарным диабетом (не содержит сахара).

Противомикробное

Антисептический комбинированный препарат для местного применения в ЛОР-практике и стоматологии

Противогрибковое

Активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов in vitro

Смягчающее

Содержит натуральные лечебные добавки











СТРЕПСИЛС С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЭФФЕКТАМИ

Продукт	Дополнительный эффект	Действие
29%* Strepsils* Characteristic Compensation Agencies of the Compensation Agencies of the Compensation Agencies of the Compensation Agencies of the Compensation Advanced page packetoners Market page packetoners Market page packetoners	Смягчающее действие с медом и лимоном.	Смягчает горло, благодаря активным веществам в сочетании с медом и лимонным маслом
13% CBUTAMUHOM C O INYON A BROBLES HOUSE A REMOTE A CORPORATION A R	С витамином С, со вкусом апельсина.	Помогает организму при простуде, благодаря Витамину С, который обладает антиоксидантными свойствами.
2% Strepsils Corpesamum Spekmom 24 Industria gas paracunanas	С согревающим эффектом.	Создает согревающий эффект, содержит имбирный компонент и компонент с эффектом согревания.
Prevenue Gonu a ropne Strepsils Crpencur Cherropode Management Hota Cherropode Management A suppode postcombund Reduction of Management A suppode postcombund Reduction of Management A suppode postcombund Reduction of Management Reduction of Management Reduction of Management Company Compan	От боли в горле и заложенности носа, с ментолом и эквалиптом.	Уменьшает заложенность носа и оказывает бактерицидное действие, благодаря маслам ментола и эвкалипта.

^{*}от чистой прибыли Strepsils

СТРЕПСИЛС ДЛЯ ДЕТЕЙ

Раздражение и дискомфорт



















- •Безопасен для детей с 6 лет
- •Без сахара











ДЕТСКАЯ СТАТИСТИКА



В среднем дети болеют ОРЗ от 4 до 10 раз в год



90% от всей инфекционной патологии в детском возрасте составляют заболевания верхних дыхательных путей*



Чаще всего на боль в горле жалуются дети старше 4 лет и подростки*



Согласно статистике, 54% от всех посещений педиатров с жалобой на боль в горле приходится на возрастную категорию детей от 5 до 11 лет*











ПРЕИМУЩЕСТВА СТРЕПСИЛС ДЛЯ ДЕТЕЙ







Не содержит сахара, который может провоцировать развитие кариеса;



Обладает приятным вкусом (лимонный и клубничный);



Для детей с 6 лет.











ТИПИЧНЫЙ РАЗГОВОР С ФАРМОЦЕВТОМ

Порекомендуйте мне, что-нибудь от боли в горле!





ТИПИЧНЫЙ РАЗГОВОР С ФАРМОЦЕВТОМ

Горло першит, наверное начинаю заболевать ☺



Выбирайте Стрепсилс на ваш вкус, например, с медом и лимоном поможет смягчить горло.












СТРЕПСИЛС ПРОТИВ ВОСПАЛЕНИЯ

Стрепсилс Интенсив – самый лучший продукт в линейке стрепсилс,

№1 приоритет в продажах!



Воспаление и сильная боль























Причиной боли чаще всего является - ВОСПАЛЕНИЕ

Вирусы и бактерии вызывают **воспалительный процесс**



Боль в горле

Затруднение глотания

Отек











СТРЕПСИЛ ИНТЕНСИВ – НАШ ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ!



Нестероидный противовоспалительный препарат

Активные вещества

Флурбипрофен 8,75 мг.

Применяется

для облегчения боли в горле при инфекционно воспалительных заболеваниях полости рта и глотки











ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ



Оказывает противовоспалительное действие

Снимает воспаление

флурбипрофен обладает выраженной противоспалительной активностью;

Облегчает боль

облегчение боли в горле отмечается уже через 2 мин и отчетливое снижение боли наблюдается через 15 мин, действие длится более 3 часов;

Снижает отечность

снижение отека слизистой оболочки до 4-6 часов, что значительно облегчает затрудненное глотание.










УНИКАЛЬНОСТЬ ФЛУРБИПРОФЕНА













Сравнение флурбипрофена с бензидамина гидрохлорид

Св-во	Флурбипрофен 8,75 мг	Бензидамина Гидрохлорид	
Время действия	Не менее 3 часов	В течение 1.5 часов	
Безопасность	Хорошо изученный механизм действия и хороший профиль безопасности.	Механизм действия не совсем ясен, нельзя четко охарактеризовать профиль его безопасности, и риск возникновения тех или иных побочных реакций.	
Эффективность воздействия	В формате таблетки легко проникает в ткани слизистой оболочки, воздействует на патологический процесс непосредственно в очаге воспаления.	В виде раствора для полоскания оказывает воздействие на большую поверхность полости рта, но слабо распространяется на заднюю стенку горла, где особенно выражен воспалительный процесс	
Препараты	Стрепсилс Интенсив	Тантум Верде	










Отчетливое снижение боли уже через 15 мин!













СТРЕПСИЛС ПЛЮС ОТ СИЛЬНОЙ БОЛИ

Для лечения сильной боли:


Антисептик

Анестетик

Против отеков



Против воспаления





















СТРЕПСИЛС ПЛЮС ОТ СИЛЬНОЙ БОЛИ





Лечение сильной боли

Активные вещества

Применяется

1,2 мг дихлорбензилового спирта и 0,6 мг амилметакрезола, и анестетик (лидокаин 10 мг).

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваниях полости рта и глотки. Препарат можно применять людям с сахарным диабетом (не содержит сахара).









ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ





Лечение сильной боли

Антисептическое

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов in vitro, обладает антимикотическим действием

Анестезируещее и противоотечное

Лидокаин оказывает местноанестезирующее и противоотечное действие

Быстродействующие

Начинает действовать в течение первой минуты после применения









ЛИДОКАИН ДЕЙСТВУЕТ БЫСТРО ДОЛГО И БЕЗОПАСНО

Анестетики	Лидокаин (амидные)	Бензокаин (эфирные)	
Гидрофильность (всасывание)	Высокая, анестезия через 2-5 мин.	Низкая, затруднено всасывание со слизистой, быстро смывается слюной, короткое действие 5-10 мин.	
Период полувыведения	До 30-60 мин , метаболизм под действием ферментов печени,	5-10 мин , гидролиз под действием холинэстеразы, циркулирующей в плазме крови,	
Метаболиты	Удлинение срока действия, образуются 2 метаболита с остаточной анестезирующей активностью.	Короткий срок действия, образуются неактивные метаболиты.	
Образование антигенов	Не образуется, нет перекрестной реакции между эфирными и амидными анестетиками, можно назначать при аллергии к эфирным анестетикам.	Образующаяся пара- аминобензойная кислота может быть антигеном, отвечающим за последующие аллергические реакции.	
Препараты	Стрепсилс Плюс	Септолете, Гексорал таблетки, Граммидин с анестетиком Нео	











Спрей – для тех кто не любит таблетки!



Многие потребители предпочитают использовать лекарства только в формате спрея, для такой группы мы предлагаем Стрепсилс плюс!











СПОСОБ ПРИЕМА

Стрепсилс	Возраст	Дозировка	Суточный предел
Интенсив		по 1 табл. по мере необходимости	не более 5 табл., не более 3 дней
Плюс	старше 12 лет	по 1 табл. каждые 2-3 часа	не более 8 табл., не более 5 дней.
Плюс, спрей		оросить воспаленный участок, дважды нажав на головку флакона, повторять каждые 3 часа.	не более 6 раз, не более 5 дней.
Остальные	старше 6 лет	по 1 табл. каждые 2-3 часа	от 6 до 12 лет не более 12 табл.











Противопоказания, побочные эффекты

Противопоказано

При повышенной чувствительности к компонентам препарата, также см. возрастные ограничения.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции, в линейке Плюс – потеря чувствительности языка.

Срок годности

3 года, Стрепсилс с согревающим эффектом – 2 года.











ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА СТРЕПСИЛС

Раздражение и дискомфорт

Дихлорбензиловый спирт (ДБС), амилметакрезол (AMK)















с 6 лет

Воспаление и сильная боль

Флурбипрофен



ДБС+АМК+ Лидокаин





с 12 лет











ТИПИЧНЫЙ РАЗГОВОР С ФАРМАЦЕВТОМ

Порекомендуйте мне, что-нибудь от боли в горле!





ТИПИЧНЫЙ РАЗГОВОР С ФАРМАЦЕВТОМ



Похоже у вас воспаление, возьмите Стрепсил Интенсив! **Strepsils**









ТИПИЧНЫЙ РАЗГОВОР С ФАРМАЦЕВТОМ

Ой, вы знаете, я просто терпеть не могу таблетки, есть спрей?



Тогда возьмите спрей Стрепсил Плюс, он поможет быстро снять боль и отек!



5. Конкурентный обзор



ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ СТРЕПСИЛС

	Гексорал	Тантум Верде	Биопарокс	Граммидин
	Tekcopan Tage Tekcop	TAHTYM BEPAE	SHORTADOKC Agency of State Control of S	TP MMUAUH.
Активное вещество	Гексэтидин	Бензадемин	Фузафунгин	Грамицидин С, +анестетик
Действие	Антисептик	Анестетик	Антибиотик	Антибиотик, Анестетик
Главное сообщение	Действует быстрее чем можно ожидать	Лекарство от боли в горле		Свобода от боли в горле
Формы выпуска	Аэрозоль, таблетки для рассасывания	Аэрозоль, таблетки	Аэрозоль	Таблетки









ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ СТРЕПСИЛС 2

	Ингалипт	Имудон	Лизобакт
	MHEADURE AND	2d radinor ran jura percebanananan Jungahan Jung	30 TRÉMETOR PROPRIE POR
Активное в-во	Хлоробутанологидрат, камфора, левометанол	Смесь лизатов бактерий	Лизоцим, пиридоксин
Действие	Противомикробное комбинированное средство	Иммуномодулятор	Антисептик, противовирусный
Главное сообщение		Тройной эффект при боли в горле! (бактерии, вирусы, грибы)	Лечит горло естественно!
Формы выпуска	Аэрозоль	Таблетки для рассасывания	Таблетки для рассасывания











СРАВНЕНИЕ СТРЕПСИЛС С ГЕКСОРАЛОМ



Недостатки Гексорала

- Обезболивание наступает медленнее;
- Вызывает сухость слизистой;
- Неудобно носить с собой;
- Нельзя применять часто, прием только утром и вечером.





- -Обезболивание происходит быстрее (в препаратах с лидокаином);
- -Таблетки более удобны в применении;
- -Можно применять каждые 2-3 часа.











СРАВНЕНИЕ СТРЕПСИЛС С ГЕКСОРАЛ ТАБС (Классик)



Недостатки Гексорала

-не содержит натурального меда -не оригинальный препарат без проверенного профиля

безопасности









Преимущества Стрепсилс

-содержит натуральный мед, который оказывает смягчающее действие и др. присущие ему эффекты -благоприятный профиль безопасности -оригинальный препарат

Активные вещества идентичны!











СТРАВНЕНИЕ СТРЕПСИЛС С ТАНТУМ ВЕРДЕ





Недостатки Тантум

- Короткое время действия, 1,5 часа.
- Не ясный механизм действия (сложно судить о побочных реакциях).
- Неудобно носить с собой (спрей).



- Время действия, не менее 3 часов.
- Обладает высоким профилем безопасности.
- В форме таблетки для рассасывания более эффективен.











СРАВНЕНИЕ СТРЕПСИЛС С БИАПОРОКСОМ



Недостатки Биапорокс

- Не купирует боль.
- На фоне приёма препарата часто развивается дисбиоз верхних дыхательных путей, в т.ч. на фоне приёма отмечены случаи кандидоза. -Не удобен:
- 1.необходимо чётко придерживаться схемы применения препарата
- 2.при генерализации инфекции необходимо комбинировать с антибиотиками системного действия, что увеличивает риск развития дисбиоза полости рта.



- -Борется с воспалением.
- -Облегчает боль.
- -Удобен в применении.











СРАВНЕНИЕ СТРЕПСИЛС С ГРАММИДИНОМ



Недостатки Граммидин

- Местный антибиотик
- Ограниченный спектр действия (антимикробный)
- После применения нельзя есть и пить 2 часа











- -Более широкий спектр действия (+вирусы, грибы);
- Удобство в применении;
- Различные вкусы (включая без caxapa);
- Европейское качество.











СРАВНЕНИЕ СТРЕПСИЛС С ИМУДОНОМ





- Нет антисептических компонентов,
- скорость развития эффекта ниже.
- Не рекомендован беременным женщинам.
- Высокая стоимость.









- Широкий спектр применения
- Начинает действовать уже через 5 мин.
- Доступная цена.











6. Маркетинговая поддержка



МАРКЕТИНГОВАЯ ПОДДЕРЖКА 2014



СТРЕПСИЛС ИНТЕНСИВ - №1 ПРИОРИТЕТ!



ПРЕССА 2,4 МЛН



ПОСТЕРЫ 1.4 МЛН



TB



ВИДЕО В ИНТЕРНЕТЕ 400 тыс.



Strepsils.ru ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО





МОБИЛЬНЫЙ ТЕСТ 300 тыс









ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ


САЙТ



МОБИЛЬНЫЙ ТЕСТ



YOUTUBE КАНАЛ, ВИДЕО И ТЕСТ!



ПОСТЕРЫ В ПОЛИКЛИНИКАХ





ШКОЛА ГОВОРИ СТРЕПСИЛС

ПРОДВИЖЕНИЕ


4,7 МЛН

видео в интернете

320 ТЫС

ПОПУЛЯРНЫЙ БЛОГГЕР


КАНАЛ на YOUTUBE







5 МЛН



280 ТЫС











ОБОРУДОВАНИЕ В АПТЕКИ

















СПАСИБО!

