

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Лемсип® Лимон

Регистрационный номер:

Торговое название: Лемсип® Лимон

МНН или группировочное название: парацетамол+фенилэфрин

Лекарственная форма:

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (лимонный)

Состав

1 пакет содержит

Активные вещества:

Парацетамол - 650 мг

Фенилэфрина гидрохлорид - 10 мг

Вспомогательные компоненты: сахарная пудра, сахароза тонкого помола, лимонная кислота безводная гранулированная, натрия цитрат, ароматизатор лимонный, аспартам, аскорбиновая кислота, натрия сахаринат, куркумин.

Вес содержимого одного пакета 4,8 г.

Описание: Порошок светло-желтого цвета с запахом лимона.

Фармакотерапевтическая группа: ОРЗ и «простуды» симптомов средство устранения (анальгезирующее ненаркотическое средство + альфа –адреномиметик)

Код АТХ: N02BE51

Фармакологические свойства

Парацетамол обладает жаропонижающим и обезболивающим действием.

Фенилэфрин суживает сосуды носа, уменьшает отёк слизистой оболочки полости носа, облегчая насморк и заложенность носа.

Эффект отмечается через 15-20 мин после приема препарата и продолжается 4-6 часов.

Показания к применению

Для устранения и облегчения симптомов острых респираторных заболеваний («простуды») и гриппа:

- повышенная температура тела,

- головная боль,
- озноб,
- заложенность носа, насморк,
- боли в горле и носовых пазухах.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к парацетамолу и другим компонентам, входящим в состав препарата; прием других препаратов, содержащих вещества, входящие в состав Лемсип® Лимон; одновременный прием бета-адреноблокаторов, трициклических антидепрессантов, ингибиторов МАО (в т.ч. в течение 14 дней после их отмены); наследственные нарушения всасывания глюкозы; беременность, период лактации; детский возраст (до 12 лет); заболевания сердечнососудистой системы: артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз коронарных артерий, выраженный аортальный стеноз, острый инфаркт миокарда, тахикардия; тиреотоксикоз, феохромоцитома, закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы; выраженная почечная/печеночная недостаточность;

С осторожностью - сахарный диабет (для препаратов, содержащих сахар); бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, заболевания крови, врожденные гипербилирубинемии (синдромы Жильбера, Дубина-Джонсона и Ротора), гипероксалурия.

Применение при беременности и лактации

Препарат не следует применять во время беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Содержимое одного пакета соответствует разовой дозе. Для приготовления горячего напитка содержимое пакета растворите в одном стакане горячей воды (но не кипятка). Помешивайте до растворения. Свежеприготовленный напиток выпить горячим или теплым.

Препарат можно принимать повторно через 4-6 часов. Максимальная суточная доза - 4 пакета.

Взрослым - по 1 пакету каждые 4-6 ч, но не более 4 пакетов в течение 24 ч; детям старше 12 лет - по 1 пакету каждые 6 ч, но не более 3 пакетов в течение 24 ч. Курс лечения - не более 5 дней.

Не превышайте указанную дозу.

Побочное действие

При приеме парацетамола побочное действие наблюдается редко. Иногда могут возникнуть аллергические реакции в виде кожной сыпи, крапивницы, ангионевротического отека. Крайне редко при длительном применении с превышением рекомендованной дозы могут наблюдаться нарушения картины крови (анемия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия, апластическая анемия, метгемоглобинемия, панцитопения); гепатотоксическое действие, нефротоксичность (папиллярный некроз); бронхообструкция.

В редких случаях фенилэфрин может вызвать головокружение, нарушение засыпания, повышенную возбудимость, мидриаз; повышение артериального давления, тахикардию; тошноту, рвоту, сухость во рту; задержку мочи, парез аккомодации, повышение внутриглазного давления. Эти эффекты проходят после прекращения приема препарата.

Передозировка

Симптомы (обусловленные парацетамолом): бледность кожных покровов, анорексия, тошнота, рвота, повышение активности "печеночных" трансаминаз, увеличение протромбинового времени, гепатонекроз.

Лечение: промывание желудка, активированный уголь, симптоматическая терапия. Специфическим антидотом парацетамола является ацетилцистеин.

В случае превышения рекомендованной дозы незамедлительно обратитесь к врачу. Повреждение печени может проявиться через 12-48 часов после попадания парацетамола внутрь, поэтому обратиться к врачу необходимо даже при отсутствии симптомов.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Стимуляторы микросомального окисления в печени (фенитоин, этанол, барбитураты, рифампицин, фенилбутазон, трициклические антидепрессанты и др.) увеличивают продукцию гидроксилированных активных метаболитов парацетамола, что обуславливает возможность развития тяжелых интоксикаций при небольших передозировках. Препарат может усиливать эффекты ингибиторов МАО, седативных препаратов, этанола. Антидепрессанты, противопаркинсонические средства, антипсихотические средства, фенотиазиновые производные - повышают риск развития задержки мочи, сухости во рту, запоров. Глюкокортикостероиды увеличивают риск развития глаукомы. Парацетамол снижает эффективность урикозурических препаратов. Трициклические антидепрессанты усиливают адреномиметическое действие фенилэфрина, одновременное назначение галотана повышает риск развития желудочковой аритмии.

Скорость всасывания парацетамола может увеличиваться под действием метоклопрамида или домперидона, а всасывание может снижаться под действием колестирамина.

Противосвёртывающее действие варфарина и других кумаринов может усиливаться при продолжительном регулярном ежедневном применении парацетамола.

Если Вы принимаете другие лекарственные средства, посоветуйтесь с врачом перед приемом препарата во избежание возможных лекарственных взаимодействий.

Особые указания

Препарат нельзя сочетать с приемом алкоголя. В период лечения следует воздержаться от приема снотворных и анксиолитических (транквилизаторы) лекарственных средств. Препарат не следует применять одновременно с другими препаратами, содержащими парацетамол.

Препарат искажает результаты лабораторных тестов, оценивающих концентрацию глюкозы и мочевой кислоты в плазме.

Каждый пакет содержит 2,62 г сахара.

Если симптомы сохраняются более 5 дней, обратитесь к врачу.

Форма выпуска

Порошок для приготовления раствора для приема внутрь (лимонный).

По 4,8 г порошка помещают в герметично запаянные трехслойные пакеты из алюминиевой фольги, полиэтилена и бумаги. По 5 или 10 пакетов в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

Срок годности

Три года. Не использовать после истечения срока годности.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °С в сухом месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта врача.

Производитель

Рекитт Бенкизер Хелскэр (Великобритания) Лимитед, Великобритания.
Дэнсом Лейн, Халл, Ист Йоркшир, Великобритания, ХЮ8 7ДС.
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, East Yorkshire, United Kingdom.

Представитель в России:

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»,

115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14. Тел./факс (495) 961-25-65

Директор ИДКЭД
проф. Чельцов В.В.



Представитель фирмы
Менеджер по регистрации
Бесчастнова С.В.

