

Содержание

- 1) Проблематика
- 2) Распространенность проблемы
- 3) Терапия (типы лекарственных средств)
- 4) Гевискон (линейка, механизм действия, ключевые особенности)
- 5) Изжога у беременных
- 6) Основные конкуренты
- 7) Ситуация на рынке
- 8) Поддержка Гевискон


Анатомия верхних отделов ЖКТ

Пищевод


Сфинктер пищевода, пропускающий пищу из пищевода в желудок

Желудок

Сфинктер желудка, пропускающий пищу из желудка в ДПК



Рефлюкс



принимает хронический характер, речь идет о ГЭРБ.

ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь)

это хроническое рецидивирующее заболевание, которое вызывает повреждение слизистой пищевода и/или характерных клинических симптомов вследствие повторяющегося заброса в пищевод желудочного содержимого

Проявления ГЭРБ



Пищеводные синдромы

- 1) Изжога
- 2) Нарушение пищеварения, вызванные переизбытком кислоты
- 3) Регургитация (отрыжка)
- 4) Боль за грудиной



Внепищеводные синдромы

- 1) Постоянный, особенно ночной кашель
- 2) Рецидивирующие пневмонии
- 3) Хронический бронхит
- 4) Фарингит
- 5) Кариес зубов

Изжога

Изжога – один из самых распространенных симптомов ГЭРБ, - возникает в результате рефлюкса



Определение изжоги

Чувство жжения за грудиной, распространяющееся снизу вверх, иногда сопровождающееся ощущением кислоты и/или горечи во рту, возникающее натощак или после употребления пищи, напитков, табакокурен

Эпизодическая изжога

Изжога не всегда является признаком наличия ГЭРБ, иногда она имеет эпизодический характер

Может возникнуть в результате:

- Переедания и приема острой и жирной пищи
- Употребления алкоголя, кофе
- Курения
- Приема лекарственных средств
- Беременности



Нарушение пищеварения, связанные с избытком кислоты в желудке

- 1) Дискомфорт в верхних отделах живота
- 2) Чувство переполнения
- 3) Тошнота



В некоторых случаях (у 1 из 3 людей, хронически страдающих от изжоги), могут наблюдаться и другие симптомы – нарушение пищеварения.

Изжога и «нарушение пищеварения», как правило, возникают во время или в течение первых 3-х часов после



Распространенность ГЭРБ в РФ

Исследование «МЭГРЕ» ЦНИИГ, 7 812 участников





Распространенность ГЭРБ в среднем по России – **13,3%**


47,5% участников исследования испытывают изжогу в среднем в течение года

Распространенность ГЭРБ

Половых различий нет



- Встречается в любом возрасте
- Однако после 40 лет встречается чаще





Терапия ГЭРБ



Лекарственные средства, обладающие способностью сокращать продукцию соляной кислоты

Пример: Омез, Омепрозол, Париет



Антациды

Лекарственные средства, обладающие способностью нейтрализовать соляную кислоту желудочного сока

Пример: Ренни, Гастал, Маалокс, Альмагель



Альгинаты

Лекарственные средства, которые образуют прочный гелевый барьер, подавляя рефлюкс содержимого желудка

Пример: Гевискон



Линейка препаратов Гевискон

Гевискон

Форте

Двойное Действие

При **беременности**
























- •Суспензия 150, 300 мл
- •Таблетки # 16, 32
- •Таблетки в контейнере # 16
- •Суспензия 150 мл
- •Суспензия 150 мл
- •Таблетки # 8, 16
- •Суспензия в саше

•Суспензия в саше



Механизм действия Гевискон

- 1) Избыток кислоты время от времени может попадать в пищевод, вызывая раздражение пищевода и боль (рефлюкс)
- 2) Гевискон, попадая в пищевод, оказывает смягчающее и успокаивающее действие
 - 3) Альгинат Натрия образует гелевый барьер («плот») на поверхности содержимого желудка сразу после контакта с ним
 - 4) Гидрокарбонат обеспечивает плавучесть «плота»
 - 5) Кальций придает барьеру прочность
 - 6) Барьер препятствует попаданию кислоты в пищевод



Гевискон

Гевискон Форте

Натрия альгинат – 500 мг Натрия гидрокарбонат Кальция карбонат Натрия альгинат – 1000 мг Натрия гидрокарбонат Кальция карбонат



Формирует гелевый барьер при взаимодействии с содержимым желудка



Формирует более прочный гелевый барьер при взаимодействии с содержимым желудка



При изжоге



При сильной изжоге

Особенности Гевискон и Гевискон Форте

- Имеет физический несистемный механизм действия (не всасывается в кровь)
- Быстрое наступление эффекта (~3 мин)
- Длительное действие (до 4-х часов)
- Высокий профиль безопасности
- Разрешен к приему у беременных
- Разрешен к приему у детей с 6 лет (Гевискон), с 12 лет (Гевискон Форте)
- Имеет приятный мятный вкус
- Не содержит углеводы

GAVISCON®

ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ









«Кислотный карман»

- После еды образуется 2 см «карман» кислоты
- Он имеется у всех людей, но в случае патологии может быть чрезвычайно выражен, существовать более длительно, что может приводить к развитию болезни и осложнениям



Старое понимание проблемы




Медицинский факт

«Кислотный» карман

«Кислотный карман»

Это фактор риска возникновения рефлюкса, который вызывает

- изжогу
- «нарушение пищеварения»



Гевискон Двойное Действие




Альгинат



Антацид



Формирует защитный барьер на самом верху желудка, препятствуя рефлюксу



Антацид

Нейтрализует «кислотный карман» устраняет симптомы «нарушения пищеварения»

Особенности Гевискон Двойное Действие

- Не только устраняет изжогу, но и «нарушение пищеварения»
- Быстрое наступление эффекта
- Длительное действие (до 4-х часов)
- Высокий профиль безопасности
- Разрешен к приему у беременных
- Разрешен к приему у детей с 12 лет
- Не содержит углеводы
- Имеет приятный мятный вкус



Посоветуйте мне что-нибудь от изжоги. Мне нужно, чтобы было быстро и действовало долго!









Ой! А у меня такая сильная изжога!

А Вам подойдет Гевискон Форте! Он создает более прочный гелевый барьер и помогает справиться даже с сильной изжогой!





Подскажите, что принять, если у меня чазжога и неприятные ощущения в желудке...тяжесть, дискомфорт...

Могу порекомендовать Вам Гевискон Двойное Действие! Он помогает при изжоге и «нарушении пищеварения»!







А для меня чтонибудь найдется? Но мне очень важно, чтобы лекарство было безопасным! Вам подойдет Гевискон Форте при беременности! Он имеет физический механизм действия и не всасывается в кровь. Препарат обладает высоким профилем безопасности!



Почему именно Гевискон?

- Гевискон vs. Антациды
- Гевискон + ИПП

Почему Гевискон лучше, чем антациды?

- Антациды не подавляют рефлюкс основную причину изжоги
- Некоторые антациды (всасывающиеся) имеют системное действие (всасываются в кровь)
- Действие антацидов краткосрочно (~30-70 мин)
- В отличие от Гевискон Двойное Действие антациды не способны нейтрализовывать кислотный карман



VS



Гевискон + ИПП

Диагноз ипп 1-2 раза в сутки 6-8 недель

Однако при приеме ИПП:

- Симптомы не купируются быстро
- Случаются кислотные прорывы (особенно в ночное время)
- Ограниченный курс терапии, требующий перерывов



- Показания
- Противопоказания
- Побочные действия

Показания к применению

Симптоматическое лечение заболеваний, связанных с нарушением пищеварения, повышенной кислотностью желудочного сока и ГЭР (изжога, отрыжка), ощущение тяжести в желудке, дискомфорт после приема пищи.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Побочные действия

В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае передозировки возможны запоры и гиперкальцемия.



72% беременных испытывают

изжогу к 3-ему триместру



Почему у беременных возникает изжога?

Причина 1:

• Выработка гормона прогестерона, вызывающего расслабление мышц, в т.ч. Расслабление сфинктера пищевода

Причина 2:

Увеличение давления в брюшной полости из-за роста
плода (сфинктер пищевода может открываться все чаще)

Какой препарат от изжоги ищут беременные?

Эффективный

Безопасный для матери и малыша

Гевискон Форте при беременности

Результаты клинического исследования (144 участников)

- Эффективность
 - Купирование изжоги отмечалось в течение 10-20 мин у **91%** беременных

- 96% беременных оценили эффективность как «хорошую» и «очень хорошую»

GÁVISCON°FO


• Безопасность

Профиль безопасности оценен как благоприятный (95% новорожденных имели 7 и более баллов по Апгар на 5 мин)

Шкала Апгар – шкала, по которой оценивается состояние новорожденного по 5 критериям: пульс, движение, гримаса, мышечная активность, внешний вид (максимальный показатель -10)

Ключевое отличие от конкурентов

В отличие от других средств от изжоги, разрешенных к приему у беременных, действие Гевискона не зависит от всасывания, за счет чего достигается высокий профиль безопасности



Ренни

Состав: Карбонат кальция, Гидрокарбонат магния



- Не подавляет рефлюкс
- Всасывается в кровь
- «Кислотный рикошет» резко понижает
 кислотность и провоцирует
 вторичную выработку
 кислоты
- Краткосрочное действие
- Отсутствие жидкой формы



- Быстрое действие
- Приятный вкус
- Хорошо знаком потребителю
- Можно беременным



Гастал



- Не подавляет рефлюкс
- Краткосрочное действие
- Отсутствие жидкой формы
- Больше побочных эффектов

- Не всасывается в кровь
- Быстрое действие
- Приятный вкус
- Можно беременным



Маалокс

- Не подавляет рефлюкс
- Не сбалансированный состав – возможны нарушения стула
- Не разрешен к приему у беременных



- Обладает обволакивающим свойством (при гастрите, язве)
- Не всасывается в кровь
- Разнообразие форм выпуска



Альмагель

+

- Не подавляет рефлюкс
- Отсутствие таблетированной формы
- Состав не сбалансирован: возможны нарушения стула
- Не разрешен к приему у беременных

- Не всасывается в кровь
- 3 формы 3 действия (от изжоги, от боли, при вздутии)



Фосфалюгель

- Не подавляет рефлюкс
- Длительное наступление эффекта
- Отсутствие таблетированной формы
- Не разрешен к приему у беременных
- Неприятный вкус




- Не всасывается в кровь
- Обладает адсорбирующей способностью (при отравлениях)





Доля рынка Гевискон в упаковках (13%)


Продажи на рынке средств от изжоги: 30 млн. упаковок



Источник: IMS Retail Audit, MAT Январь 2014

Доля рынка Гевискон в денежном выражении (12%)


Продажи на рынке средств от изжоги: 5 млрд. руб.



Источник: IMS Retail Audit, MAT Январь 2014


Выписка Гевискона среди гастроэнтерологов демонстрирует положительную динамику

Гевискон - №2 по рекомендациям гастроэнтерологов среди антацидных препаратов




Источник: Synovate Comcon, Apr,12


Гевискон - №1 по рекомендациям фармацевтов



Источник: Synovate Comcon, Antacids: evaluation preparations pharmacists, Oct'13



Поддержка в 1 полугодии 2014 года



Основной акцент в продвижении — на Гевискон Двойное Действие



Спасибо за внимание и удачных продаж!