МИНЗДРАВ РОССИИ

/7 N 015151/01 - 05 09 13


ФССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СОГЛАСОВАНО

C. 1

Стрепсилс® таблетки для рассасывания [лимонные] Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд, Великобритания

Макет первичной упаковки (блистер)



Менеджер по регистрации ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»



А.В. Самочернова

Стрепсилс® таблетки для рассасывания [лимонные] Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешил Лтд, Великобритания

Макет вторичной упаковки (картонная пачка, 16 таблеток)

Ink & Varnish Free Area

LTE LTH LTH LTH

Великобритания. Ноттингем, ИG90 2DB, . Литернешил Лтд, Тейн Роуд, производитель: ьсі Бэпионноє Хиостовєрениє: 🗓 Й015121701 Отпуск без рецепта. лри температуре не выше +25 °С. Хранить в сухом месте

> этээм мэтэд кид **МОНПТЬ ПРЕПАРАТ В НЕДОСТУПНОМ**

(Е 104), натрия сахаринат, изомальтоза, сироп мальтитола. кислота, ароматизатор лимонный 74940-74, краситель хинолиновый желтый 1,2 мг, амилметакрезол – 0,6 мг. Кроме того, в состав препарата входят: винная – тqипэ йідволиєнедопхид-4,2 :68129шев вещества: 2,4-дихиордез содержий типра.

Продолжительность курса терапии – 3 дня таблетке каждые 2-3 часа. Не принимать более 8 таблеток в течение 24 часов. Местно. Взрослым и детям старше 6 лет медленно рассасывать по одной

со вкусом лимона

микроорганизмов.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных Комбинированный противомикробный препарат. Обладает антисептическим действием. Препарат можно применять людям с сахарным диабетом (не содержит сахара). (облегчает боль и смягчает раздражение в горле).

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки

Стрепсилс ДЛЯ ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ Без с

таблетки для рассасывания лимонные



Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки

2,4-Дихлорбензиловый спирт 1,2 мг Амилметакрезол 0,6 мг

16 таблеток для рассасывания

Стрепсил

ДЛЯ ДЕТЕЙ С




А.В. Самочернова

Менеджер по регистрации ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Стрепсилс® таблетки для рассасывания [лимонные] Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешил Лтд, Великобритания

Макет вторичной упаковки (картонная пачка, XX таблеток)



Ink & Varnish Free Area

. Бегистрационное удостоверение: П №015151/01 Отпуск без рецепта.

Хранить в сухом месте

этээм йэтэд кид МОНПҮТ ПРЕПАРАТ В НЕДОСТУПНОМ

(Е 104), натрия сахаринат, изомальтоза, сироп мальтитола. кислота, ароматизатор лимонный 74940-74, краситель хинолиновый желтый 1.2 мг, амилметакрезол – 0,6 мг. Кроме того, в состав препарата входят: винная . Каждая таблетка содержит активные вещества: 2,4-дихлорбеналловый спирт

продолжительность курса терапии – 3 дня таблетке каждые 2-3 часа. Не принимать более 8 таблеток в течение 24 часов. Местно. Вэрослым и детям старше 6 лет медленно рассасывать по одном

со вкусом лимона

wnкроорганизмов.

Активен в невительного и киннагратижен почены и грамительных А Комбинированный противомикробный препарат. Обладает антисептическим действием. Препарат можно применять людям с сахарным диабетом (не содержит сахара).

(облегчает боль и смягчает раздражение в горле). лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки

Великобритания.

Производитель:

Ноттингем, NG90 2DB,

Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд, Тейн Роуд,

таблетки для рассасывания лимонные



Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки

2,4-Дихлорбензиловый спирт 1,2 мг Амилметакрезол 0,6 мг

XX таблетки для рассасывания

XX = 4, 6, 8, 12 или 24Менеджер по регистрации ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»





А.В. Самочернова

Стрепсилс[®] таблетки для рассасывания [клубничные] Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешил Лтд, Великобритания

Макет первичной упаковки (блистер)



Стрепсилс[®] таблетки для рассасывания [клубничные] Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд, Великобритания

Макет вторичной упаковки (картонная пачка, 16 таблеток)

Process Magenta		Process Yellow		Varnish-Water Based	
	LTH		LTH		LTH
Emboss		Process Black		Process Cyan	
	4		5 LTH		6 LTH

Ink & Varnish Free Area

и Осилск без рецепта Отпуск без рецепта. Произ в сухом месте Мранить в сухом месте

МОНПҮТ ПРЕПАРАТ В НЕДОСТУПНОМ БТАНАТЬ В МЕСТЕ.

Каждая таблетка содержит активные вещества: 2,4-дихлорбензиловый спирт – '1,2 мг, амилметакрезол – 0,6 мг. Кроме того, в состав препарата входят: винная кислота, ароматизатор клубничный (Flav P 052312B), краситель антоцианин розовый P-WS (E163), натрия сахаринат, изомальтоза, сироп мальтитола.

Местно. Взрослым и детно. Взрослым и детям старше 6 лет медленно рассасывать по одной таблетке каждые 2-3 часов. По принимать более 8 таблеток в течение 24 часов. По принимать более 8 таблеток в течение 24 часов.

со вкусом клубники

. (облегчает боль и смягчает раздражение в горле). Препарат можно применять людям с сахарным диабетом (не содержит сахара). Комбинированный противомикробный препарат. Обладает антисептическим действием. Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов.

лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (облегиает боль и смагчает такенте в смасия в смасия)



великооритания

Ноттингем, NG90 2DB,

дүо9 нйэТ ,дтП пншэндэтнN,

ь Бекитт Бенкизер Хелскэр Производитель:

ДЛЯ ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ Без сахара





ДЛЯ ДЕТЕЙ С 6 ЛЕТ Без сахара

2,4-Дихлорбензиловый спирт 1,2 мг Амилметакрезол 0,6 мг

16 таблеток для рассасывания клубничных



ДЛЯ ДЕТЕЯ С ЛЕТ Безсаход




Менеджер по регистрации ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»



Стрепсилс[®] таблетки для рассасывания [клубничные] Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешил Лтд, Великобритания

Макет вторичной упаковки (картонная пачка, XX таблеток)



Ink & Varnish Free Area

Хранить в сухом месте дри температуре не выше +25°С. Отпуск без рецепта. Регистрационное удостоверение: П И015151/01

ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ В НЕДОСТУПНОМ КРАНИТЬ ПРЕПАРАТ В НЕДОСТУПНОМ КРАНИТЬ ПРЕПАРАТИВНИЕМ В НЕДОСТУПНОМ КРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ В НЕДОСТО

Каждая таблетка содержит активные вещества: 2,4-дихлорбензиловый спирт – 1,2 мг, амилметзкрезол – 0,6 мг. Кроме того, в состзв препарата входят: винная киспота, ароматизатор клубничный (Flav P 052312В), краситель антоцианин розовый P-WS (E163), натрия сахаринат, изомальтоза, сироп мальтитола.

Местно. В Зарослым и детям старше 6 летно 24 часов. Местно. В зрослым и детям старше 6 лет медленно рассасывать по одном таблетке каждые 2-3 часов. Продолжительность курса терапии – 3 дня

со вкусом клубники

микроорганизмов.

(облегчает боль и смягчает раздражение в горле). Препарат можно применять людям с сахарным диабетом (не содержит сахара). Комбинированный противомикробный препарат. Обладает антисептическим действием. Активен в отношении грамголожительных и грамотрицательных

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (облегчает боль и смягчает раздражение в горле).



великооритания.

: Производитель:

HOTTINHTEM, NG90 2DB,

,дүоЧ нйэГ ,дтП пншэнqэтнN

Рекитт Бенкизер Хелскэр

Без Сахара

таблетки для рассасывания клубничные





2,4-Дихлорбензиловый спирт 1,2 мг Амилметакрезол 0,6 мг

XX таблетки для рассасывания клубничные

Стрепсилс

Без Сахара



XX = 4, 6, 8, 12 или 24 Менеджер по регистрации ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»



А.В. Самочернова

МИНЗДРАВ РОССИИ 17N015151/01-050913

COPEACOBAHO

всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью стролье менеджер по регистрации Самочернова А.В.