

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения
ГЕВИСКОН® ФОРТЕ

Регистрационный номер:

Торговое название: Гевискон® форте

МНН или группировочное название: не имеет

Лекарственная форма: суспензия для приема внутрь [анисовая], [мятная]

Состав

10 мл суспензии содержат:

активные вещества: натрия алгинат 1000 мг, калия гидрокарбонат 200 мг, и
вспомогательные вещества:

суспензия для приема внутрь [анисовая]: кальция карбонат 200 мг, карбомер 40 мг, метилпарагидроксибензоат 40 мг, пропилпарагидроксибензоат 6 мг, натрия гидроксид 14,44 мг, натрия сахаринат 10 мг, ароматизатор фенхеля 7 мг, вода очищенная до 10 мл;

суспензия для приема внутрь [мятная]: кальция карбонат 200 мг, карбомер 40 мг, метилпарагидроксибензоат 40 мг, пропилпарагидроксибензоат 6 мг, натрия гидроксид 14,44 мг, натрия сахаринат 10 мг, ароматизатор мятный 6 мг, вода очищенная до 10 мл;

Описание

Суспензия для приема внутрь [анисовая]: Вязкая суспензия, от почти белого до светло-коричневого цвета, с анисовым запахом.

Суспензия для приема внутрь [мятная]: Вязкая суспензия, от почти белого до светло-коричневого цвета, с мятным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: средство лечения рефлюкс-эзофагита.

Код АТХ: А02ВХ.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика. При приёме внутрь *Гевискон[®] форте* быстро реагирует с кислым содержимым желудка. При этом образуется гель альгината, препятствующий возникновению гастроэзофагеального рефлюкса. В случае регургитации гель попадает в пищевод, где он уменьшает раздражение слизистой оболочки.

Фармакокинетика. Механизм действия препарата *Гевискон[®] форте* является физическим процессом и не зависит от всасывания в системный кровоток.

Показания к применению

Симптоматическое лечение диспепсии, связанной с повышенной кислотностью желудочного сока и гастроэзофагеальным рефлюксом (изжога, кислая отрыжка), ощущение тяжести в желудке после приема пищи, в том числе в период беременности.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 12 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Гевискон[®] Форте может применяться во время беременности и кормления грудью.

Способ применения и дозы

Внутрь.

Взрослые и дети старше 12 лет: по 5 – 10 мл после приёмов пищи и перед сном.
Максимальная суточная доза – 40 мл.

Для пациентов пожилого возраста изменения дозы не требуется.

Использование пакетиков: перед открытием пакетика помните его пальцами, перемешивая содержимое.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (крапивница, бронхоспазм, анафилактические реакции).

Передозировка

Симптомы: Может отмечаться вздутие живота.

Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Так как кальция карбонат, входящий в состав препарата проявляет антацидную активность, то между приемом препарата *Гевискон[®] форте* и других препаратов должно пройти не менее 2 часов (особенно при одновременном приеме с блокаторами H₂-гистаминовых рецепторов, антибиотиков из группы тетрациклина, дигоксина, фторхинолона, солей железа, кетоконазола, нейролептиков, тироксина, пенициллина, бета-адреноблокаторов, глюкокортикостероидов, хлорохина и дифосфатов).

Особые указания

В 10 мл суспензии содержание натрия составляет 106 мг (4,6 ммоль) и калия 78 мг (2,0 ммоль). Это следует учитывать при необходимости соблюдения диеты с очень ограниченным содержанием соли, например, в некоторых случаях застойной сердечной недостаточности и при нарушениях функции

почек или при приеме лекарственных средств, которые могут увеличивать уровень калия в плазме.

В 10 мл суспензии содержание кальция карбоната составляет 200 мг (2,0 ммоль). Препарат следует с осторожностью принимать пациентам с гиперкальциемией, нейрокальцинозом и рецидивирующим образованием почечных камней, содержащих кальций.

При отсутствии улучшения в симптоматике в течение 7 дней необходимо проконсультироваться с врачом.

Эффект на способность управлять механизмами и автомобилем

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Суспензия для приема внутрь [анисовая], суспензия для приема внутрь [мятная].

По 80 мл, 150 мл или 250 мл во флаконы темного стекла с полипропиленовой крышкой, обеспечивающей контроль первого вскрытия. Инструкция по применению находится под этикеткой.

Суспензия для приема внутрь [мятная]: По 10 мл суспензии в многослойных пакетиках (полиэстер, алюминий, полиэтилен). По 20 пакетиков вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре 15 - 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель

Рекитт Бенкизер Хелскэр (Великобритания) Лимитед, Дэнсом Лейн, Халл,
Ист Йоркшир, ХЮ8 7ДС, Великобритания.

Представительство в России/адрес для предъявления претензий

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Россия, 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д.14

Тел. 8-800-505-1-500 (звонок бесплатный), contact_ru@reckittbenckiser.com

Специалист по регистрации

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»



К.А.Семихатова