

**Европейское качество  
по справедливой цене**



**Действенное средство для борьбы  
с симптомами **гриппа и простуды****



Рег. удостоверения: ЛСП-001518/08 ЛСП-001925/08, ЛСП-001493/08.  
Номер материала: 000152 Дата материала: январь-февраль, 2014

Информация предоставлена для фармацевтов. Предоставляя информацию, наша компания ни в коей мере не рассчитывает на первоочередную рекомендацию нашей продукции и не требует первоочередной передачи информации о компании конечному потребителю.

**ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ**

# Отличительные особенности Лемсип®:



- ✓ **содержит только те действующие вещества, которые необходимы для облегчения состояния пациента при ОРЗ и гриппе;**
- ✓ **содержит оптимальные с точки зрения профиля эффективности и безопасности дозы [1,2,3];**
- ✓ **обладает высоким профилем эффективности в отношении лихорадки, облегчения головной боли, заложенности носа и боли в носовых пазухах [1,4,5];**
- ✓ **отличается хорошей переносимостью (6) лечения при отсутствии риска сонливости и снижения концентрации внимания [7];**
- ✓ **эффект наступает уже через 15 - 20 минут после приема и продолжается 4-6 часов [7];**
- ✓ **препарат европейского качества (страна производства: Великобритания).**

1. Sperber S.et al. Effectiveness of Pseudoephedrine Plus Acetaminophen for Treatment of Symptoms Attributed to the Paranasal Sinuses Associated With the Common Cold. Arch Fam Med. 2000;9:979-985

2. Eccles D.R. Current best treatments for inflammation-based cold symptoms. Int Pharm J, 1995;6:7-10.

3. Kollar C. et al. Clinical Therapeutics, 2007 (29):1057-1070.

4. Perrott D.A. Efficacy and Safety of Acetaminophen vs Ibuprofen for Treating Children's Pain or Fever Arch Pediatr Adolesc Med. 2004;158:521-526.

5. Jackson C.H. et al. Acetaminophen: a practical pharmacologic overview. Can Med. Assoc. J, VOL. 131, JULY 1, 1984:25-37

6. Hatton R.C.et al. Efficacy and safety of oral phenylephrine. Systematic review and meta-analysis. Annals of Pharmacotherapy. 2007(41):381-390.

7. Инструкция по медицинскому применению препарата Лемсип.

Лемсип® содержит стандартный набор активных веществ для симптоматического лечения ОРВИ и гриппа по более низкой цене

Наименование препарата	ЛЕМСИП®			ТЕРА ФЛЮ		ФЕРВЕКС	КОЛДРЕКС	
	Лимон	Черная смородина	Макс	Основная линейка, первые симптомы	Экстра		Хот рем Максиколд	Макс грипп
Разовая доза парацетамола в составе, мг	650	650	1000	325	650	500	750	1000
Соответствие минимальной разовой дозе парацетамола, рекомендованной ВОЗ	да	да	да	нет	да	да	да	да
Суточная доза парацетамола, мг	2600	2600	4000	975	1950	1000-1500	3000	4000
Соответствие минимальной эффективной суточной дозе парацетамола, рекомендованной ВОЗ (в случае наличия болевого синдрома)	да	да	да	нет	нет	нет	да	да
Средство от заложенности носа, мг	Фенилэфрин 10	Фенилэфрин 10	Фенилэфрин 12,2	Фенирамин 20 Фенилэфрин 10	Фенирамин 20 Фенилэфрин 10	Фенирамин 25	Фенилэфрин 10	Фенилэфрин 10
Аскорбиновая кислота, мг	–	50	–	50	–	200	60	40
Кофеин, мг	–	–	–	–	–	–	–	–
Стоимость, руб (10 пакетов)*	171,09	170,46	203,21	342,04	421,58	242	256,58	294,69

\* Средние розничные цены в 59-ти субъектах РФ за период с января по август 2013 года, по данным аудита IMS.

# Лемсип® – это комбинированный препарат для лечения симптомов простуды и гриппа

При первых симптомах  
простуды и гриппа



## Активные вещества

Парацетамол- 650 мг  
Фенилэфрина  
гидрохлорид – 10 мг

## Активные вещества

Парацетамол- 650 мг  
Фенилэфрина  
гидрохлорид – 10 мг  
Аскорбиновая кислота – 50 мг

При выраженных симптомах  
простуды и гриппа



## Активные вещества

Парацетамол- 1000 мг  
Фенилэфрина  
гидрохлорид – 12,2 мг