

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
СТРЕПСИЛС® ПЛЮС
(STREPSILS® PLUS)

Регистрационный номер:

Торговое название: Стрепсилс® Плюс

Лекарственная форма: спрей для местного применения дозированный

МНН или группировочное название: Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт+Лидокаин

Состав:

Одно нажатие на клапан содержит активные ингредиенты: амилметакрезол – 0.290 мг, 2,4-дихлорбензиловый спирт – 0.580 мг, лидокаин – 0.78 мг, и вспомогательные вещества: этанол 96%, лимонная кислота, глицерол, сорбитола раствор 70% (некристаллизованный), сахарин, левоментол, мяты перечной листьев масло, аниса семян масло, азорубин (кармозин эдикол), вода очищенная, натрия гидроксид, хлористоводородная кислота концентрированная.

Описание: прозрачный раствор красного цвета с характерным запахом.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: R02AA20.

Фармакологическое действие. Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов in vitro, обладает антимикотическим действием. Оказывает также местноанестезирующее и противоотечное действие.

Показания к применению. Симптоматическое лечение боли в ротовой полости, горле, гортани при инфекционно-воспалительных заболеваниях: тонзиллит, фарингит, ларингит (в т.ч. профессионального характера - у преподавателей, дикторов, работников химической и угольной промышленности), охриплости, воспалении слизистой оболочки полости рта и десен (афтозный стоматит, гингивит, молочница).

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст (до 12 лет).

С осторожностью: беременность, период лактации.

Применение при беременности и лактации: Применение препарата во время беременности и в период лактации возможно только под контролем врача.

Способ применения и дозы.

Местно. Взрослые и дети старше 12 лет: оросить воспаленный участок, дважды нажав на головку флакона (одна доза). При необходимости повторять процедуру каждые 3 часа, не более 6 раз в течение 24 часов. Продолжительность применения препарата не более 5 дней.

Побочные действия:

Аллергические реакции, потеря чувствительности языка.

Передозировка.

Маловероятна, возможная передозировка может привести к анестезии верхних отделов пищеварительного тракта.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не зарегистрировано.

Особые указания.

При возможной потере чувствительности языка, рекомендуется соблюдать осторожность при приеме горячей пищи и воды. Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

Форма выпуска.

Спрей для местного применения дозированный. 20 мл спрея (не менее 140 нажатий на клапан (70 доз)) в стеклянный флакон, закрытый белой пластиковой крышкой с дозирующим устройством, с белым пластиковым колпачком сверху.

Флакон помещают в пачку картонную вместе с инструкцией по применению.

Срок годности.

3 года.

Не использовать препарат с истекшим сроком годности.

Условия хранения.

При температуре не выше 30 °С, в сухом месте, недоступном для детей.

Отпуск из аптек.

Без рецепта.

Производитель:

«Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл ЛТД», произведено
«БСМ Лтд», Тейн Роуд, Ноттингем, NG2 3AA, Великобритания;
«Фамар Нидерланд Б.В.», Индустривег 1, 5531 АД Бладель, Нидерланды.

Представитель в России:

ООО «Рекитт Бенкизер Хелскэр»


Россия 115114 г. Москва, Кожевническая ул., д. 14.

Тел./факс 8-800-505-1-500 (звонок бесплатный), contact_ru@reckittbenckiser.com

Представитель фирмы:
Менеджер по регистрации
ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»



Самочернова А.В.



45777