

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ  
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Стрепсилс® с Витамином С**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** Стрепсилс® с Витамином С

**МНН или группировочное название:** Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт+[Аскорбиновая кислота]

**Лекарственная форма:** таблетки для рассасывания [апельсиновые]

**Состав:**

Одна таблетка для рассасывания содержит:

*активные вещества:* 2,4-дихлорбензиловый спирт 1,2 мг, амилметакрезол 0,6 мг, кислота аскорбиновая 100 мг;

*вспомогательные вещества:* ароматизатор апельсиновый 78300-34 3,12 мг, левоментол 2 мг, пропиленгликоль 3 мг, краситель солнечный закат желтый 0,162 мг, краситель пунцовый [Понсо 4R] 0,0162 мг, винная кислота 26 мг, сахароза жидкая, декстроза жидкая [декстроза, олиго- и полисахариды] (жидкая глюкоза) до получения таблетки массой 2,6 г.

**Описание**

Оранжевые круглые таблетки с изображением буквы S с 2-х сторон таблетки. Допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

**Фармакотерапевтическая группа**

Антисептическое средство.

**Код АТХ:** R02AA20

**Фармакологические свойства****Фармакодинамика**

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*, оказывает антимикотическое действие.

**Показания к применению**

Симптоматическое лечение боли в ротовой полости, горле, гортани при инфекционно-воспалительных заболеваниях: тонзиллит, фарингит, ларингит (в том числе профессионального характера – у преподавателей, дикторов, работников химической и угольной промышленности), охриплости, воспалении слизистой оболочки полости рта и десен (афтозный стоматит, гингивит, молочница).

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст (до 5 лет).

**С осторожностью**

Беременность, период грудного вскармливания, бронхиальная астма.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания возможно только под контролем врача.

**Способ применения и дозы**

Местно. Взрослые и дети старше 5 лет: рассасывать по одной таблетке каждые 2-3 часа. Не принимать более 8 таблеток в течение 24 часов. Продолжительность курса лечения – 3 дня.

**Побочное действие**

Аллергические реакции (сыпь; чувство жжения или покалывания в горле, отек горла).

В случае появления необычных реакций следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего применения препарата.

**Передозировка**

Маловероятна, возможная передозировка может привести к дискомфорту со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноте.

*Лечение:* симптоматическое под контролем врача.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено. Возможно одновременное применение препарата с другими местными противомикробными средствами.

**Особые указания**

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. Больные сахарным диабетом должны учитывать, что каждая таблетка содержит около 2,6 г сахара.

**Эффект на способность управлять механизмами и автомобилем**

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания [апельсиновые].

По 4, 6, 8 или 12 таблеток в блистере (ПВХ / ПВДХ / Алюминий). По 1, 2, или 3 блистера помещают в картонную пачку, или в металлическую коробку, или в пакет из ламинированной упаковочной фольги, или закрепляют в картонную обложку вместе с инструкцией по применению.

По 10 таблеток в полипропиленовые тубы с полипропиленовой крышкой, обеспечивающей контроль первого вскрытия, с влагопоглотителем. Инструкция по применению находится под этикеткой.

### **Условия хранения**

Хранить в сухом месте при температуре не выше +25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Туба: использовать в течение 3 месяцев после вскрытия.

### **Условия отпуска**

Без рецепта.

### **Производитель**

Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд

Тейн Роуд, Ноттингем, NG90 2DB, Великобритания

*произведено:* Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд, Тейн Роуд, Ноттингем, NG90 2DB, Великобритания;

или Рекитт Бенкизер Хелскэр Мануфэкчуринг Лтд, 65 Моо 12 Лардкрабанг – Бангплии Роуд, Бангплии, Самут Пракарн 10540, Таиланд.

### **Представитель в России/адрес для предъявления претензий**

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»



115114, г. Москва, Кожевническая ул., д. 14

Тел.: 8-800-505-1-500 (звонок бесплатный), [contact\\_ru@reckittbenckiser.com](mailto:contact_ru@reckittbenckiser.com)

Специалист по регистрации

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

В.А. Бондаренко