

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

**Стрепсилс®**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название препарата:** Стрепсилс®

**МНН или группировочное название:** амилметакрезол+дихлорбензиловый спирт

**Лекарственная форма:** таблетки для рассасывания, таблетки для рассасывания [медово-лимонные]

**Состав**

Одна таблетка содержит *активные вещества*: 2,4-дихлорбензиловый спирт – 1,2 мг, амилметакрезол – 0,6 мг.

*Вспомогательные вещества:*

таблетки для рассасывания: винная кислота 26 мг, левоментол (природный) 4,49 мг, мяты перечной листьев масло 0,48 мг, аниса обыкновенного семян масло 2,3 мг, краситель пунцовый [Понсо 4R] (Эдикол CI 16255, E124) 0,32 мг, краситель азорубин (Эдикол CI 14720, E122) 0,05 мг, сахарный сироп [сахароза, вода], декстроза жидкая [декстроза, олиго- и полисахариды] до получения таблетки массой 2,6 г.

таблетки для рассасывания [медово-лимонные]: винная кислота 26 мг, мед 125,6 мг, мяты перечной листьев масло 0,62 мг, лимона масло (не содержащее терпенов) 2,03 мг, краситель хинолиновый желтый (E104) 0,099 мг, сахарный сироп [сахароза, вода], декстроза жидкая [декстроза, олиго- и полисахариды] до получения таблетки массой 2,6 г.

## Описание

Таблетки для рассасывания: красные плоскоцилиндрические таблетки с преобладающим анисовым запахом с изображением буквы S с 2-х сторон таблетки. Допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

Таблетки для рассасывания [медово-лимонные]: желтые плоскоцилиндрические таблетки с изображением буквы S с 2-х сторон таблетки. Допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

## Фармакотерапевтическая группа

Антисептическое средство.

Код АТХ: R02AA20

## Фармакологические свойства

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*, оказывает антимикотическое действие.

Таблетки для рассасывания [медово-лимонные]: натуральный мед и лимонное масло усиливают смягчающее действие.

## Показания к применению

Симптоматическое лечение боли в ротовой полости, горле, гортани при инфекционно-воспалительных заболеваниях: тонзиллит, фарингит, ларингит (в том числе профессионального характера – у преподавателей, дикторов, работников химической и угольной промышленности), охриплости, воспалении слизистой оболочки полости рта и десен (афтозный стоматит, гингивит, молочница).

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст (до 5 лет).

**С осторожностью**

Беременность, период грудного вскармливания, бронхиальная астма.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания возможно только под контролем врача.

**Способ применения и дозы**

Местно. Взрослые и дети старше 5 лет: рассасывать по одной таблетке каждые 2-3 часа. Не принимать более 8 таблеток в течение 24 часов.

**Побочное действие**

Аллергические реакции (сыпь; чувство жжения или покалывания в горле, отек горла).

В случае появления необычных реакций следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего применения препарата.

**Передозировка**

*Симптомы:* передозировка маловероятна. Возможная передозировка может привести к дискомфорту со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноте.

*Лечение:* симптоматическое под контролем врача.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено. Возможно одновременное применение препарата с другими местными противомикробными средствами.



**Особые указания**

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. Больные сахарным диабетом должны учитывать, что каждая таблетка содержит около 2,6 г сахара.

**Эффект на способность управлять механизмами и автомобилем**

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания, таблетки для рассасывания [медово-лимонные]. По 4, 6, 8 или 12 таблеток в блистере (ПВХ / ПВДХ / Алюминий). По 1, 2 или 3 блистера помещают в картонную пачку, металлическую коробку, в пакет из ламинированной упаковочной фольги или закрепляют в картонную обложку вместе с инструкцией по применению.

По 10 таблеток помещают в полипропиленовые тубы с полипропиленовой крышкой, обеспечивающей контроль первого вскрытия, с влагопоглотителем. Инструкция по применению находится под этикеткой.

**Условия хранения**

Хранить в сухом месте при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности.

Туба: использовать в течение 3 месяцев после вскрытия.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Производитель**

Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд

Тейн Роуд, Ноттингем, NG90 2DB, Великобритания

*произведено:* Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд, Тейн Роуд, Ноттингем, NG90 2DB, Великобритания;

или Рекитт Бенкизер Хелскэр Мануфэкчуринг Лтд, 65 Моо 12 Лардкрабанг – Бангплии Роуд, Бангплии, Самут Пракарн 10540, Таиланд.

**Представитель в России/адрес для предъявления претензий**

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

115114, г. Москва, Кожевническая ул., д. 14

Тел.: 8-800-505-1-500 (звонок бесплатный), [contact\\_ru@reckittbenckiser.com](mailto:contact_ru@reckittbenckiser.com)

Менеджер по регистрации

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»



А.В. Самочернова