

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

СТРЕПСИЛС®

(STREPSILS®)

Регистрационное удостоверение: П N015151/01

Торговое название: СТРЕПСИЛС®

МНН или группировочное название: амилметакрезол+дихлорбензиловый спирт

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания [лимонные], таблетки для рассасывания [клубничные]

Состав

Одна таблетка содержит *активные вещества*: 2,4-дихлорбензиловый спирт – 1,2 мг, амилметакрезол – 0,6 мг.

Вспомогательные вещества:

таблетки для рассасывания [лимонные]: винная кислота 26 мг, ароматизатор лимонный 74940-74 4,16 мг, краситель хинолиновый желтый (E104) 0,01 мг, натрия сахаринат 2 мг, изомальтоза 1834,296 мг, сироп мальтитола 458,57 мг до получения таблетки массой 2,35 г.

таблетки для рассасывания [клубничные]: винная кислота 26 мг, ароматизатор клубничный (Flav P 052312B) 9,1 мг, краситель антоцианин розовый P-WS (E163) 0,1 мг, натрия сахаринат 2 мг, изомальтоза 1830 мг, сироп мальтитола 458 мг до получения таблетки массой 2,35 г.

Описание

Таблетки для рассасывания [лимонные]: Желтые круглые таблетки из полупрозрачной карамельной массы с изображением буквы S с 2-х сторон

таблетки. Допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

Таблетки для рассасывания [клубничные]: Розовые круглые таблетки из полупрозрачной карамельной массы с изображением буквы S с 2-х сторон таблетки. Допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство

Код АТХ: R02AA20

Фармакологическое действие

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, обладает антимикотическим действием.

Показания к применению

Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний полости рта и глотки (облегчает боль и смягчает раздражение в горле).

Препарат можно применять людям с сахарным диабетом (не содержит сахара).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата; дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбация

Детский возраст (до 6 лет).

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Беременным и кормящим женщинам следует посоветоваться с врачом перед применением препарата.

Способ применения и дозы

Местно. Взрослым и детям старше 6 лет медленно рассасывать по одной таблетке каждые 2-3 часа.

Не принимать более 8 таблеток в течение 24 часов. Продолжительность курса терапии – 3 дня.

Побочные действия

Аллергические реакции.

Передозировка

Маловероятна, возможная передозировка может привести к симптомам дискомфорта со стороны желудочно-кишечного тракта. Лечение симптоматическое.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Особые указания

Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата.

В состав препарата входят изомальтоза и сироп мальтитола, которые могут оказывать легкое слабительное действие. Не рекомендуется применять препарат пациентам с наследственной непереносимостью фруктозы.

При сохранении симптомов или при появлении повышения температуры тела или головной боли, следует обратиться к врачу.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания [лимонные], таблетки для рассасывания [клубничные].

По 4, 6, 8 или 12 таблеток в блистере (ПВХ/ПВДХ/Алюминий). По 1 или 2 блистера помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

Хранить в сухом месте при температуре не выше + 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте!

Срок годности

Таблетки для рассасывания [лимонные]: 3 года.

Таблетки для рассасывания [клубничные]: 2 года.

Не использовать препарат с истекшим сроком годности.

Отпуск из аптек

Без рецепта.

Производитель

Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд, Тейн Роуд, Ноттингем, NG90 2DB, Великобритания

Представитель в России/ адрес для предъявления претензий


ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Россия, 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д. 14

Тел: 8-800-505-1-500 (звонок бесплатный), contact_ru@reckittbenckiser.com

Менеджер по регистрации

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»



А.В. Самочернова

МИНЗДРАВ РОССИИ
П/015151/01- 05 09 13
СОГЛАСОВАНО



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
Менеджер по регистрации Р.Е.ХИТ
Самочернова Анастасия