

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
СТРЕПСИЛС® ПЛЮС
(STREPSILS® PLUS)

Регистрационный номер:

Торговое наименование: СТРЕПСИЛС® ПЛЮС

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

МНН или группировочное название: Амилметакрезол+Дихлорбензиловый спирт+Лидокаин

Описание:

Плоскоцилиндрические таблетки голубовато – зеленого цвета с запахом ментола. Допускается наличие белого налета, незначительных пузырьков воздуха внутри карамельной массы и неровности краев.

Состав:

Одна таблетка для рассасывания содержит активные вещества: 2,4-дихлорбензиловый спирт – 1,2 мг, амилметакрезол – 0,6 мг, лидокаина гидрохлорида моногидрат – 10 мг; вспомогательные вещества: винная кислота, натрия сахаринат, левоментол, мяты перечной листьев масло, аниса семян масло, краситель хинолиновый желтый, индигокармин, сахароза жидкая, декстроза жидкая [декстроза, олиго-и полисахариды].

Фармакотерапевтическая группа: антисептическое средство.

Код АТХ: R02AA20

Фармакологическое действие.

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, обладает антимикотическим действием. Оказывает также местноанестезирующее и противоотечное действие.

Показания к применению.

Симптоматическое лечение боли в ротовой полости, горле, гортани при инфекционно-воспалительных заболеваниях: тонзиллит, фарингит, ларингит (в т.ч. профессионального характера - у преподавателей, дикторов, работников химической и угольной промышленности), охриплости, воспалении слизистой оболочки полости рта и десен (афтозный стоматит, гингивит, молочница).

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст (до 12 лет).

С осторожностью: беременность, период лактации.

Применение при беременности и лактации: Применение препарата во время беременности и в период лактации возможно только под контролем врача.

Способ применения и дозы.

Местно. Взрослым и детям старше 12 лет - каждые 2-3 часа рассасывать по 1 таблетке. Не применять более 8 таблеток в течение 24 часов. Продолжительность применения - не более 5 дней.

Побочные действия:

Аллергические реакции, потеря чувствительности языка.

Передозировка.

Маловероятна, возможная передозировка может привести к анестезии верхних отделов пищеварительного тракта. Лечение симптоматическое.

Взаимодействия с другими лекарственными средствами.

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не зарегистрировано.

Особые указания.

При возможной потере чувствительности языка, рекомендуется соблюдать осторожность при приеме горячей пищи и воды. Не следует использовать препарат при наличии повышенной индивидуальной чувствительности к любому компоненту, входящему в состав препарата. При назначении больным сахарным диабетом необходимо учитывать, что 1 таблетка содержит 2,6 мг сахара.

Форма выпуска.

Таблетки для рассасывания. По 4, 6, 8 или 12 таблеток в блистер из ПВХ/ПВДХ/алюминий. По 1, 2 или 3 блистера вкладываются в картонную пачку, или в металлическую коробку, или в пакет из упаковочной ламинированной фольги, или прикрепляются к картонной обложке вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения.

В сухом месте при температуре не выше + 25° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности.

3 года.

Не использовать препарат с истекшим сроком годности.

Отпуск из аптек.

Без рецепта врача.

Производитель:

«Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд», Тейн Роуд, Ноттингем, NG90 2DB, Великобритания

Представитель в России /адрес для предъявления претензий

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Россия, 115114, Москва, Кожевническая ул., д. 14

Тел: 8-800-505-1-500 (звонок бесплатный),

contact_ru@reckittbenckiser.com

Представитель фирмы:

Менеджер по регистрации

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Самочернова А.В.

