

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ**

**по применению лекарственного препарата для медицинского применения**

**ГЕВИСКОН<sup>®</sup>**

**Регистрационный номер:**

**Торговое название:** Гевискон<sup>®</sup>

**МНН или группировочное название:** не имеет

**Лекарственная форма:** суспензия для приема внутрь [мятная]

**Состав**

10 мл суспензии содержат:

*активные вещества:* натрия альгинат 500 мг, натрия гидрокарбонат 267 мг, кальция карбонат 160 мг, и *вспомогательные вещества:* карбомер 65 мг, метилпарагидроксибензоат 40 мг, пропилпарагидроксибензоат 6 мг, натрия сахаринат 10 мг, масло мяты перечной 1 мг, натрия гидроксид 26,667 мг, вода очищенная до 10 мл.

**Описание**

Вязкая непрозрачная суспензия, от почти белого до кремового цвета, с мятным запахом.

**Фармакотерапевтическая группа:** средство лечения рефлюкс-эзофагита.

**Код АТХ:** A02BX.

**Фармакологические свойства**

*Фармакодинамика.* При приеме внутрь Гевискон<sup>®</sup> быстро реагирует с кислым содержимым желудка. При этом образуется гель альгината, имеющий почти

нейтральное значение pH. Гель формирует защитную оболочку на поверхности содержимого желудка и действует до 4 часов, эффективно предотвращая возникновение гастро-эзофагеального рефлюкса. В случае регургитации гель с большей вероятностью, чем содержимое желудка, попадает в пищевод, где он уменьшает раздражение слизистой оболочки.

*Фармакокинетика.* Механизм действия препарата *Гевискон*<sup>®</sup> является физическим процессом и не зависит от всасывания в системный кровоток.

### **Показания к применению**

Симптоматическое лечение диспепсии, связанной с повышенной кислотностью желудочного сока и гастроэзофагеальным рефлюксом (изжога, кислая отрыжка), ощущение тяжести в желудке после приема пищи, в том числе в период беременности.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, детский возраст (до 6 лет).

### **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Открытые контролируемые исследования с участием 281 беременной женщины и накопленный опыт применения не продемонстрировали каких-либо значимых нежелательных эффектов препарата *Гевискон*<sup>®</sup> на течение беременности или на здоровье плода и новорожденного ребёнка. *Гевискон*<sup>®</sup> может применяться во время беременности и в период грудного вскармливания.

### **Способ применения и дозы**

Внутрь.

Взрослые и дети старше 12 лет: по 10 – 20 мл после приёмов пищи и перед сном. Максимальная суточная доза – 80 мл.

Дети от 6 до 12 лет: по 5 – 10 мл после приёмов пищи и перед сном. Максимальная суточная доза – 40 мл.

Для пациентов пожилого возраста изменения дозы не требуется.

### **Побочное действие**

Возможны аллергические реакции (крапивница, бронхоспазм, анафилактические реакции).

### **Передозировка**

*Симптомы:* Может отмечаться вздутие живота.

*Лечение:* симптоматическое.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Так как кальция карбонат, входящий в состав препарата проявляет антацидную активность, то между приемом *Гевискона*<sup>®</sup> и других препаратов должно пройти не менее 2 часов (особенно при одновременном приеме с блокаторами H<sub>2</sub>-гистаминовых рецепторов, антибиотиков из группы тетрациклина, дигоксина, фторхинолона, солей железа, кетоконазола, нейролептиков, тироксина, пенициллина, бета-адреноблокаторов, глюкокортикостероидов, хлорохина и дифосфатов).

### **Особые указания**

В 10 мл суспензии содержание натрия составляет 141 мг (6,2 ммоль). Это следует учитывать при необходимости соблюдения диеты с очень ограниченным содержанием соли, например, в некоторых случаях застойной сердечной недостаточности и при нарушениях функции почек.

При отсутствии улучшения в симптоматике в течение 7 дней необходимо проконсультироваться с врачом.

### **Эффект на способность управлять механизмами и автомобилем**

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Суспензия для приема внутрь [мятная].

По 100 мл, 150 мл или 300 мл во флаконы темного стекла с полипропиленовой крышкой, обеспечивающей контроль первого вскрытия. Инструкция по применению находится под этикеткой.

### **Условия хранения**

Хранить при температуре от 15 °С до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности**

3 года.

Не использовать после истечения срока годности.

### **Отпуск из аптек**

Без рецепта.



**Производитель**

Рекитт Бенкисер Хелскэр (Великобритания) Лимитед, Дэнсом Лейн, Халл,  
Ист Йоркшир, ХЮ8 7ДС, Великобритания.

**Представительство в России/адрес для предъявления претензий**

ООО «Рекитт Бенкисер Хэлскэр»

Россия, 115114, г. Москва, Кожевническая ул., д.14

Тел. 8-800-505-1-500 (звонок бесплатный), [contact\\_ru@reckittbenckiser.com](mailto:contact_ru@reckittbenckiser.com)

Специалист по регистрации

ООО «Рекитт Бенкисер Хэлскэр»



К.А.Семихатова