: Nelly C. Oberto Népez

Médico Cirujano - Ecografista Integral M.P.P.S.: 29.073 C.M.: 1.092 Centro Profesional Padre Pio Av. 28 entre calles 28 y 29 Local 18 Acarigua - Portuguesa

Ecografía Abdominal

Fecha:29 /02 / 16

Datos de Identificación del Paciente

Nombres y apellidos: Mildred Cravo

Edad: 48 a.

CI: 9.988.967

Médico o Institución quien refiere: Ambulatorio Adarigua

Motivo del estudio: Dolor abdominal

Datos Técnicos del Estudio Ecográfico

Marca: Teknova Tipo de Transductor: Convex Frecuencia: 3.5 MHz. Tipos de cortes ecográficos

practicados: Longitudinal, Transversal.

Otras características técnicas usadas: Modo B

HALLAZGOS ECOGRÁFICOS

HIGADO: Ubicación y Forma habitual. Borde regular y bien definido. Parénquima: granular fino, homogéneo. Sin imágenes focales. Vasos Supra hepáticos: en No. de 3, tubulares, ramificadas verticalmente. sin paredes visibles, anecoicas. Hepatómetria longitudinal derecha: 12.4cm (VN hasta15cm) Hepatometria vertical izquierda 4.8 cm(VN hasta 6cm.)

PANCREAS: Ubicación habitual, retroperitoneal, con forma de Asa. Bordes bien definidos y regulares. Parénquima granular fino, homogéneo, levemente hiperecoico. Se identifican los Marcadores Vasculares Anatómicos conservados. Se visualizan abundantes gases. Medidas: Cabeza 1.9 cm (VN Hasta 2.5 cm) - Cuerpe: 1.1 cm(VN hasta 1.6 cm.)

VESICULA BILIAR: Ubicación habitual, Periforme, paredes bien definidas, engrosadas, hiperecoicas. Contenido homogéneo, anecoico. Se visualizan 2 imágenes hiperecoicas, que dejan túnel sónico, además presencia de barro biliar Medidas: Longitudinal 9.6 cm - AP 3.5cm

BAZO: Ubicación habitual, intraperitoneal, de forma semilunar, con bordes bien definidos y regulares. Parénquima granular fino, homogéneo, e isoecoico. Hilio: visualizable, con todos sus elementos y características ecográficas normales. Sin adenopatías. Medidas : Longitudinal : 7.9 cm (VN hasta 12 cm) - AP: 6.5 cm (VN hasta 7cm).

RIÑON DERECHO: Ubicación habitual, con forma de haba. Bordes bien definidos, delgados y regulares. Parénquima con buena diferenciación. Sene central, de bordes bien definidos, irregulares, heterogéneo e hiperecoico, con buena definición de la interfase con el parénquima. Medidas: Longitudinal 10.5cm (VN 10 a 12cm) - Tranverso: 4.6cm (VN 4 a 6 cm) - AP 4.8 cm (VN 4 a 6 cm) Volumen 129ml (VN : 80 a 225ml)

ra: Nelly C. Oberto Yépez

Médico Cirujano - Ecografista Integral M.P.P.S.: 29.073 C.M.: 1.092 Centro Profesional Padre Pio Av. 28 entre calles 28 y 29 Local 18 Acarigua - Portuguesa

Ecografía Abdominal

RIÑON IZQUIERDO: Ubicación habitual, con forma de haba. Bordes bien definidos, delgados y regulares. Parénquima con buena diferenciación. Seno central, de bordes bien definidos, irregulares, contenido heterogéneo e hiperecoico, con buena definición de la interfase con el parénquima. Medidas: Longitudinal 10.6cm (VN 10 a 12cm) - Transverso: 4.8 cm (VN 4 a 6 cm) - AP 4.9 cm (VN 4 a 6 cm) Volumen 129ml (VN 80 a 225ml.)

VEJIGA: Ubicación pélvica, con distención fisiológica, con forma Cuadrilátera en corte transversal, y Ovoidea en corte Longitudinal. Paredes ecogénicas, Contenido homogéneo y anecoico. No se evidencian lesiones patológicas. Longitudinal: 78.1- Transversal: 71.8 - AP 77.1 -Volumen 226 ml (VN de 300 a 500 ml.)

CONCLUSIÓN

- Litiasis vesicular
- Colecistitis crónica

Dita.

Resto del estudio sin alteraciones ecográficas

Dra. Nelly C. Oberto Yepez

Médico Cirujano — Ecografista integral M.P.P.S.: 29.073 C.M.: 1.092 Telf. 0414-5592906

tac 1445. adulto.



04160387234-0424 845 1057 ABR -2016